

Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1783/D/2



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1783/0/2



Early European Books. Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1783/02

1783

D/2


1111 R

Joh. Georgius Hertel.

Daniel Schuster.

Georgius. Hermann.

1783
D/2



PERITISSIMO, ET MVLTIA RERVVM
 experiētia p̄redito, Doct̄ori Nicolao Capitoni, incl̄yē Urbis Ar-
 gent. Medico primario, OTHO Brunfelsius S D.

VETVS, IDQVE ADEO frequēs malū est, ut qui bonos libros edēdos cu-
 rant, tamen ab aliquibus quidem bene, ab alijs uero male mercantur. Siquidem gratiam inēūt
 ab ijs, qui cum rerum cognitione possent, quiduis nouerunt boni consulere. Inuidiam referūt,
 & mille ronchos ab imperitis, qui p̄terquam quod optimis semper obstrepunt conatibus, tū
 in d̄iudicandis quoq; rebus, non magis ualent, q̄ talpæ & uespertilionēs. Id quod cum iamdu-
 dum persuasum habeam, plane conuiuendum mihi putauī ad calumnias, sannasq; quorundā,
 qui cum toti addicti sunt suis ἀλεξίφαρμάκοις, ἀντιβαλλομένοις (uel si quid etiam aliud habent sepla-
 siariorum, & agyrtarum pixides χίρῃς scilicet τῶν θεῶν) sic in suum Auicennam, Serapionem,
 Razemq; & id genus suauissimos auctores iurauerūt, ut plane sordeant eis ueteri, Plinij, Theo-
 phrastiq; & Dioscorid. cōmentarij. Sic enī q̄dam eorū palam nūc blasphemant, parū hos me-
 dicos fuisse, uerum grammaticos & literatores, uel quiduis potius aliud, q̄ medicinæ peritos.
 Horum itaq; stultissimis, imo pestilentissimis nenijs, tanq̄ Syrenarū p̄niciosissimis sibilis dis-
 simulatis (doct̄iss. Capito Nicolae) Dioscoridem nostrum in lucem agimus. Idq; adeo sub tuo
 celeberrimo, & splendidissimo nomine, ut qui autor aliquando nobis tanti consilij fuisti, καὶ ἵσ-
 τος ἄρχος ἄνερ βουλομένης, ut uerbo Homericō utar, tuis etiam auspicijs (proscriptis barbarorum
 delyramētis) in orbem eat, in Medicorum musæis legatur, inq; manibus habeatur, medicorū
 ἀλφὰ καὶ κορυφαί. Simul ubi prodiderint huiusmodi ineptissimi graculi & coccyces se, tu nihil
 ominis longe optimo auctori patronus ut sis, uindicesq; ab malignantium iniuria. De auctoris
 p̄stantia & laude, non uideo quid publice monere debeam, quem tot nominibus commen-
 dat Galenus pharmacorum simplicium lib. 6. quod unus & solus de simplicibus effectibus be-
 ne scripserit & senferit, quodq; non aliunde mutuatus est sua, neq; ex aliorū narratione concin-
 nauit historiam, id quod barbarorum Herbariorum uulgus hactenus studuit, uerum p̄senti
 inspektione, suisq; ipsius oculis omnia contuitus est, suis manibus singula contrectauit, suocq;
 ore gustauit, neq; unius tantum et alterius regionis herbas, sed magnam orbis partem peragrās
 rebus peruestigandis, ut reuera nihil eum posset latere. Quod initio operis & ipse pariter testa-
 tur his uerbis, ἡμῶς ἰνq; δι' ὧς ἴσιν ἱπτιν ἐκ πρώτης ἡλικίας, ἀλλοτρίων ἔχοντες ἐπιθυμίαν περὶ τὴν ἱπ-
 γνῶσιν τῶν ὕλων, καὶ πολλὰν γὰρ ἐπιβρόντην. ἴσα γὰρ ἡμῖν στρατιωτικὸν τὸν βίον, συναγώχαμην τὴν πραγματί-
 αν ἐν ἑξ βιβλίοις σοῦ προτρυφένου. &c. Et rursum, παρακαλοῦμαι διὰ καὶ τοῦ ἐντεννομένου τοῖς ὑπὸν ἡμα-
 σι, μὴ τὴν ἐν λόγῳ ἡμῶν δυνάμιν σκοπεῖν, ἀλλὰ τὴν ἐν τοῖς πράγμασι μετ' ἡμῶν ἐπιμελίαν, μετὰ γὰρ πλεί-
 στος ἀκριβείας τὰ ὧν πλείστα δι' αὐτοφίας γνόντες, τὰ δ' ἐξ ἰσορίας συμφῶναι τοῖς πᾶσι καὶ ἀνακρίσω τὴν παρ'
 ἡμῶν ἐπιχαρίων ἀκριβέστατος, πειρασόμεθα καὶ τὴν τάξιν διαφῶν χρῆσασθαι, καὶ τὰ γένη, καὶ τὰς δυνάμεις
 ἐκείας αὐτῶν ἀναγράψασθαι. Nisi qd de uita eius ab eruditis dubitat, nec ferme quicq; compertū ha-
 bemus p̄ter id quod in Suidæ extat cōmentarijs, cuius hæc sunt uerba. Διωσκουρίδης ἀναρρίψας
 ἱατρος ὁ ἐπιμελὴς φασκός, διὰ τοῖς ἐπὶ αὐτοῖς. γράσσεται αὐτῷ βιβλία, καὶ τὰ πάντα ἱατρικὰ περιέχοντα.
 Virū autem a Plinio lectus sit, aut post Plinium uixerit, uel uter ab altero mutuatus sit sua, Le-
 oniceni & Pandulphicē disceptationi cōmittimus, quorū litem dirimere nunc non est consilij,
 & epistolaris breuitas nō sustinet. Quanq; Plinium Dioscorid. libros non uidisse, uel inde conij-
 ci potest: quod multa de plātis, arboribus, lapidibus, metallisq; disputat Plinius, quorum Dio-
 scorid. ne meminit quidem. Multa subinde apud Diosco. de uenenis, & id genus alijs extāt, quæ
 Plinius uel dissimulauit, uel certe nunq; uidit. Postremo sic ab utrisq; tractata sunt quædam, ut
 in utroq; alterutrius dicta desyderentur. Interdum Pliniū Dioscorides multitudinem rerum exu-
 perat: sepissime Dioscoridē Plinius. Breuiter, quod in Cathalago auctorum, nusq; illius memi-
 nit Plinius, quod tamen facturus erat fidissimus alioqui rapsodus, si ante se celebratus autor fu-
 isset. Sed neq; Celsus ullam huius uiri memoriam facit, quod equidem obseruari. Hæc de au-
 tore ipso, quem nihil tam cōmendat, q̄ suus ipsius candor, atq; rerum portentosa quædam ex-
 perientia, immo mundus ipse quidam rerum omnium cognitu dignissimarum. De ordine tan-
 tummodo, quo aggressi singula sumus, p̄cium opere est obiter saltem ut quædam p̄mone-
 amus. Quando igitur quatuor hodie circumferuntur tralationes, scilicet, uetus, Hermolai Bar-
 bari, Ruelliana, & nouissima M. Vergilij Florentini, nos eam selegimus, quæ nobis purior, sua
 uis, atq; familiarior uidebatur. Ea est Ruellij, si non fallimur, idq; ea fecimus modestia, ut inter
 im nullam calumniemur aliarum, nec aliorum iudicijs, quam ipsi magis p̄ferant, quicq; p̄-
 scribamus. Et quod sciamus, pleracq; tanti negocij esse, ut interdum omnibus opus habeat, qui

non infelicitate saltem, uel in hoc autore uersari. Quamobrem et cōmentarios subieci-
 mus, eodem nimirum delectu atq; consilio. Vnum Hermolai Barbari, qui Corollaria inscribit:
 de quibus illud affirmare habemus, nihil eruditius, nihil uberius, nihilq; magis uarium, post u-
 num Plinium, latinæ linguæ editum esse a quoq; mille retro quingentis annis, qui non solum
 gloriæ suæ, uerum literis etiam, & literans omnibus tam satisfecerit. Dignus plane qui assidue
 in manibus reratur ab omnibus studiosis, nedum ab medicis, in quibus sic *ὁ τὸν μὲν δὲ* cernes
 contractum Theophrastum, Plinium, Paulum, Aetium, Orobalsium: ex grāmaticis uero, q re-
 rum uocabula descripserunt, Athenum, Pollucem, Gellium, Suidam, Vītruium: ex Geo-
 graphis Strabonem & Solinum, ut nihil sit abstrusum in singulis (quantum ad rem qdem me-
 dicam attinet) quod idem non apertissime legas in Corollarijs. Quæ ob hoc fortasse sic inscri-
 pta, ut simplicium quidam quali Colophon existerent. In quibus id solum dolemus, quod in-
 castigatiora ad nos peruenerunt: deinde mutila, et uix in Quintum usq; librum porrecta: quæ si
 usq; ad Venenorum librum perfecta fuissent, dñ boni, præter unum Plinium fortasse, quem stu-
 duit imitari, quem haberet tamen meliorem thesaurum, seculorum omnium medicorū: cæteris
 Alterum Marcelli Vergilij iunximus, uiri ex æquo docti, & lōge diligentissimi, nec ab eruditiss
 etiam minus probati, qui tñ sicubi prolixius ea tractabat, quæ uel non admodū necessaria, uel
 non proxime ad rem facere uidebantur (sic em̄ interdū rhetoricatur & ludit homo, uel lynceo
 ipso in dñjudicādis rebus perspicacior) data opera decurtauimus: ne & in imensum cresceret uo-
 lumen, & rhetoricis magis præstigijs, q̄ utilibus & necessarijs cōmentarijs obturbaremus lecto-
 ri. Monuerunt id nos initio ipso operis aliquot studiosi, cum alioqui & ipsum quoq; integrum
 adscripturi Vergilium fuisset. Postremo, ne nostra quoq; opera abesset, sic in utrisq; cōmen-
 tarijs sudauimus, ut multo emūctiores, luculentioresq; nunc habeas, q̄ ex ueteri editione erāt.
 Vterq; sine punctis erat, uterq; sine artificio grāmatico, & ibi desierant periodi, ubi spiritus de-
 fecisset lectoris. Ex bonis græcis, mala latine facta tā multa, ut non plures neuos habuerit Ther-
 sites. Ex latinis igitur, quæ perperam scripta erant, in ordinem cōegimus, ex græcis quæ manife-
 ste deprauata erant restituiimus. Sicubi hiatus erat, uel scrupulus, quem uel instaurare, uel ex-
 cutere non ualebamus, * asterisco signauimus, ut et alijs esset ansa diuinandi: eo tamē consilio,
 ut omnia latinis literis permitteremus, partim ut consuleremus græcæ linguæ ignaris, partim
 q̄ in priuato Lexico retractamus ad uerbum omnia, nouo opere Pandectarum, longe meliori
 opera, q̄ si facta recta, quod dicitur, nunc restaurassemus. Præterea ubi illi ad uerbum ex Theo-
 phrasto, Plinioq; & alijs mutauerunt quædam, uel transcripserunt (ut in toto fere opere) no-
 tas & capita signauimus. Indicem dictauit, & cum quidem locupletis. I O A N N E S
 S C H O T T V S *ὑπερχριστὸς* operis, ut emūctæ naris, ita uigilantis. Quæ omnia quan-
 to labore nobis constiterint, quantūq; alias editiones euicerimus, nulli cērtius æstimabunt, q̄
 qui similem aliquando relam nobiscum texuerunt, aut nostram hanc cum Italiæ editionibus
 contulerint. Planeq; falsum esse conuincemus, nullos libros emaculatiores prodire, q̄ qui ex
 Italia emerferint. Id totum igitur (mi Capito) in tuum effundimus sint, tibiq; nuncupamus.
 Tui erit uicissim uetustissimum, & eundem longe utilissimum autorem nobiscum a barbaro-
 rum tyrannide uindicare: ut sicut iam pridem meliores literæ florere cœperunt, ita quoq; uetus &
 simplex Medicina caput randē exerat ac regnet. Argent. Anno ab orbe redempto. 1529.

I O. R V E L L I V S S V E S S I O N E N.

Antonio Disomo, Regio Consiliario, utriusque Linguae
peritissimo, S. D.



V M S A E P E mecum reputarem, humanissime simul ac eruditissime Antonio Disome, omnium ferme disciplinarum conditione, illud in primis cum admiratione mihi, tum miseratione dignum occurrebat, quod saluberrimae humani generi artes, uel diuinitus nobis datae, uel mortalium studio adinuentae, ita affectae iaceant, ut ad interitum spectare uideantur: quibus olim excolendis, ueteres usque eo diligentiam omnem, & operam impenderunt, ut intentatum nihil, indisseussumque reliquerint. Etenim per aliquot iam secula, & qui discunt, & qui docent, neglecta uera liberalium scientiarum maiestate, ad echinatas captionum, cauillationumque argutias diuercentes, dici docti, haberi, quod esse malunt. Quod ut in ceteris ferri, dissimularique fas sit, in ea tamen arte nefarium est, quae ad tuendam salutem hominum, nata, incorrupta semper, augustaque esse debet. Quae tamen fere iam inde ab auorum nostrorum memoria, tam turpi ac desidioso consensu deserta exoleuit, ut uerear, ne flagitiosa fortasse suis professoribus, aut inhonesta uideatur, qui principem eius partem, quae cognitione delectat, medicamentorum constat, uel rei difficultate deterriti, uel ingenio diffisi, uel iudicio lapsi, a se abdicarunt, rudique medicamentariorum ministerio delegarunt: existimantes fortasse dignitatem amplitudinique suae non parum detractum iri, suamque auctoritatem eleuari, si ea ipsi tractent, quorum officinae sibi iam cognitionem uendicarunt. Cum ceteri artifices ignominiosum sibi esse putent, si imprudentes sui negotij conspiciantur, aut uniuersam instrumentorum suppellectilem non plane ac memoriter teneant. Proinde ars illa praestantissima, sine qua natura manca merito ac mutata esse censetur, priscis temporibus clara & percelebris, literarumque monumentis diligentissime tradita, posterioribus seculis, adeo a se ipsa degenerauit, ut simulacrum eius tantum, uel potius umbra nomenque remanserit. Quippe cum olim Hærbarii iidem atque Medici essent, scidit inde se studium: hominumque inertia simul & incuria factum est, ut ab ijs destituta quorum erat propria, circulatorum, ne dicam impostorum, præda facta fuerit. Cum igitur pluribus scriptorum monumentis admonerer, apud antiquos gloriæ fuisse Simplicij curam, ac memorabiles illos Græcorum duces, hoc illustri studio semper floruisse: huic parti ruinosae, nutantis, breuique casuræ, adbibendam esse manum duxi. Nec aliud occurrebat praesentius auxilium, ut a medicis ignorantiae tenebris assereretur, ac errores expiari, innumeraque monstra domari possent, quod ut ea quae græcis literis hac de re tradita erant, latinis illustrarentur, ac quae sine graui perniciæ dissociari non poterant, a ceteris medicis partibus auulsa, suo corpori restituerentur, Pedacium igitur Dioscoridem, praestantissimum huiusce partis auctorem, tot seculorum suffragijs comprobatum, pro medio citate nostra, latinitate donauimus, tuoque nomini dicamus. Quod te acerrimi iudicii uirum, omnium bonarum literarum, ac utriusque linguae studiosissimum cognouimus: nec parum laudis tibi ex ea re peperisti. Simul ut extaret pignus mutuae inter nos beneuolentiae: simul ut mortales officio cumulatione demereremur. Quod quidem opus non paruo sane negotio a nobis elucubratum, ueluti primitias industriae nostrae & maioris laboris praedium, laeta fronte suspicias. De quo id constantissime ausim polliceri, esse quasi quoddam naturae promptuarium, ex quo res omnes, herbae, fruges, frutices, arbores, fructus, quibus arua, campi, pascua, montes, conualles, plana confragosae uestiantur, & uisceribus terrae abdita, in humani generis praesidium depromi facile possunt, ac denique ueluti a quodam rei medicamentariae seminario, in humanum usum transferri, e quo uita omnis ea haurire queat, quibus humanae salutis prospiciatur, & morbis omnibus consulatur. Quae uero meae partes fuerunt, quoniam in propria harena, ut dicitur, uersari uidebar, cum sim professione medicus, dedi operam, utinam & praestiterim, uti omnia ex fide responderent, & ut latina oratio, graeci auctoris sensum fideliter redderet: ne absurda peregrinitas, medicinam quoquomodo pollueret, etiam res ipsa elegantiam ac nitorem non facile admittat. Curaui praeterea, ut idem utrobique sensus seruaretur, nulla uocum nouitas, nec triuialia uerba, aut exposita: quibus quaerendis, latinos fere omnes euoluimus. Cum uero latina me defecerunt, graecis quidem, & fere iam receptis uti malui, quod noua, aut barbara licenter admittere. Sed nihil eque me torset, quod ueterum manu exaratorum exemplarium inopia (illud enim tantum nactus sum, quod bibliopolae typis excusum circumferunt) in quo permulta manifestissime deprauata, ex uaria auctorum lectione, & praesertim in libris Venenorum, ex uetusissimo Pauli Aeginetae codice, ad pristinam sinceritatem restitui-mus. In quibus studiosos omnes rogatos uelim, ut boni consulant. Vale Parisijs. Calendis Maij. Anno Domini. M. D. XVI.

PEDACII DIOSCORIDIS ANAZAR-

BEI, in Libroseius, de Medicinali materia,

ad ARIVM Prefatio. IO. RVEL-

LIO Succionensi interprete.



VANQVAM amicissime Ari, complures non ueterum modo, sed recentiorum quoq̃, de medicamentorum compositione, uiribus, atq̃ probatione cōmentati sunt, nobis tamen nec uanum, nec a ratione abhorrentem impetum animi ad hoc opus in cessisse, tibi ostendere tentabimus. Cum eorum nōnulli absolutum nihil ædiderant; alij q̃ plurima quæ auditu percunctando didicere, scriptis tradiderant. Siquidē Bithynus Iolas, et Heraclides Tarentinus, omiſſa prorsus Hærbarū tractatione, rem sane q̃ paucis perstrinxerūt. Neq̃ uero omnes illi de metallicis quicq̃ rebus, aut odoramentis memoriæ prodiderunt. Crateuas aut Hærbarius, & Andreas medicus, qui cæteris diligentius hac in parte uersati uidētur, radices multas apprime utileis, hærbasq̃ haudquaq̃ adnotatas reliquerūt. Nec sic quoq̃ prisci laude sua fraudandi sunt, quos & si pauca ipsis referantur accepta, magnam tamen impendisse diligentiam constat. Iunioribus minus assentiendum, e quibus Lucius Bassus, & Niceratus, & Petronius niger, & Diodotus, Asclepiadæ omnes, medicinalem materiam uernaculam cognitamq̃ uulgo, dignam censuerunt, quæ ab eis literis exacte mandaretur, ut medicamentorum uires, probationesq̃ cursim complexi, sic nullo experimento eorum effectus colligentes, inani uero reddendarum caussarum studio uerba fundentes, alia pro alijs scriptitando, rem in acruum congeriemq̃ extulerūt. Siquidem qui inter eos egregius habetur Niger, Euphorbiū nascentis in Italia, Chamelææ succum esse contendit: Androsamonq̃ eandem hærbam cum Hyperico esse: quinetiam Alōen in Iudæa fossilem nasci, & pleraq̃ his similia citra effectuum explicationem exponit, quæ prorsus ueritati refragantur. Quibus coniectura colligi potest, ea non occulta fide, sed narratione potius ab alijs accepisse. In ordine ijdem ipsi aberrarunt, partim eorum discrepanteis, nullaq̃ cognatione coniūctas uireis collidentes: alij per elementa literarum scripta in ordinem digerentes, quo facilius memoriæ mandarentur, genera, & eorum effectus, a sua cognatione disiungentes. Nos uero ab ineunte (ut ita dicam) iuuentute, iungi desyderio cognoscendæ materiæ allec̃ti, permultos Mundi tractus peragruimus (nec enim nescis, nos militare uitam exegisse) tuoq̃ hortatu cōmentationē in sex Libros contulimus: quod opus tibi dicamus Ari, grato nostro animo obsequētes, ob eum quo nos prosequeris affectum. Etenim natura cum in omneis eruditione excultos, tum uero in eos, quis

cum tibi eiusdem artis necessitudo intercedit, pronus ad amicitiam esse
soles, in nos etiam aliquanto peculiaris. Enimvero non paruum præ-
bet tuæ probitatis argumentum, optimi uiri Licinij Bassi singularis er-
ga te charitas, quam una degentes nouimus, cum mutuam inter uos be-
neuolentiam æmulatione dignam intueremur. Admonitum autem te
uelim, eosque qui in Commentarios nostros incident, ut ne in uerbis fa-
cultatem nostram æstimetis, sed potius adhibitam rebus cum peritia
curam. Etenim partim res oculis subiectas exactissime cognouimus,
partim narratione omnibus consona, indagationeque rerum apud sin-
gulos uernacularum diligenter accepimus. Dabimus igitur operam, ut
differenti ab alijs ordine utentes, genera Medicinarum, uiresque descri-
bamus. Quod autem necessaria sit Medicamentorum ratio, nemo est fer-
me qui ignoret: quæ & toti arti coniuncta sit, & ab ea expugnandis mem-
bratim uitij remedia petantur. Quare per medicamentorum composi-
tiones atque misturas, & facta in morbis pericula extendi, & incremen-
tum capessere potest, quamplurimum opitulante singulorum medicami-
num cognitione. Quinetiam uernaculam, familiaremque materiam com-
plectemur, ut perfecta sint quæ scriptis relinquemus. Verum imprimis
curam impendere oportet, ut suis temporibus singula & demetantur, &
recondantur. Intempestiue enim decerpta, conditaue, aut nullo, aut euaz-
nido munere funguntur. Serena etenim cœli constitutione demetenda
sunt. Magni siquidem refert inter colligendum, si uel squallores, uel im-
bres infesti sint: quemadmodum si loca in quibus prodeunt cliuosa, &
uentis exposita sint, & perflata, frigidaque, & aquis carentia. in his enim
locis uires eorum longe ualidiores intelliguntur. Contra, quæ in cam-
pestribus, riguis & opacis, cæterisque locis a uento silentibus enascuntur,
plærumque degenerant, & minus uiribus ualent: multoque magis, si non su-
is horis peropportune colligantur, aut si per imbecillitatem intabuerint.
Neque ignorandum, quod sepe præcoci, aut ferotina loci natura, aut anni cle-
mentia, maturius, aut celerius adolescunt. Nonnulla propria ui hyeme
florent & folia pariunt, quædam bis anno florifera. Quare cui in animo
est, horum peritiam assequi, necesse est ijs prima germinatione solo e-
mergentibus, adultis, & senescentibus adesse. Nam qui pullulanti hæ-
bæ dumtaxat astiterit, adultam cognoscere non potest: neque qui ad-
ultam tantum inspexerit, nuper erumpentem noscet. Quo fit, ut propter mu-
tatam foliorum faciem, caulium proceritates, florum, seminisque magnitu-
dinem, nonnulli qui olim has ætatum uarietates non perspexerunt, ma-
gno in errore uersentur. Quæ causa etiam nonnullis scriptoribus impo-
suit, qui hæbas quasdam, uerbi gratia Gramen, Quinquefolium, et Tussil-
aginem, emittere florem, fructum & caulē negant. Ergo qui sæpius ad ui-
sendas hæbas & earum loca se contulerit, earum cognitionē maxime conse-

quetur. Scire etiamnum conuenit, sola ex hærbaceis medicaminibus
Veratri genera, nigrum inquam & candidum, multis edurare annis: reli
qua a trimatu inutilia. Quæ uero ramis scatent, sicut Stichas, Trixago,
Polium, Abrotonum, Seriphum, Absinthium, Hyssopum, & alia id ge
nus semine pregnantia, demetantur, Flores quoque antea quam sponte
sua decidunt, Fructus autem ut maturi excutiantur necesse est, & semina
ubi sicari coeperint, priusquam defluant, Herbarum succus, et foliorum
elici debet, germinantibus adhuc cauliculis. Lac & lachrymæ excipian
tur, inciso per adolescentiam caule. Radices, & liquamenta, corticesue ut
recondantur eximere conuenit, cum hærbæ suis folijs exuuntur. Siccân
tur etiam expurgatæ inibi, locis asperginem non redolentibus: sed quæ
luto, aut puluere sunt obsitæ, aqua elui debent. Flores, & omnia quæ iu
cundum odorem efflât, arculis tiliaceis nullo situ obductis reponantur.
Nonnunquam charta, aut folijs semina, ut perennent, apte inuoluun
tur. Liquidis medicaminibus densior materia, argentea, uitreæ, aut cor
nea conuenit. Fictilis, etiam si modo rara non sit, accommodat: & li
gnea, præsertim e buxo: sed ænea uasâ liquidis
oculorum medicamentis, quæ aceto, pice
liquida, aut cedria componuntur.
Adipem autem & medul
las stagnæis uasis
recondi con
uenit,

T H O. D. Aucuparius, can
dido lectori.

Dum uirtus animi, dum mens diuina Deorum
Ad sacra uel solum scandere templa sinunt,
Dotibus his, altâ conscendit Apollinis arcem,
Sancta Dioscorides atria dignus adit.
Magnaq; pro meritis aperire sacraria Phœbi
Dum datur, has medicas arte ministrat opes.
Ille Dioscorides pater antiquissimus, autor,
Pœoniæ largas protulit artis opes,
Rerum uirtutes, rerum cognoscere causas,
Rerum naturas, historiamq; docet,
Antidotū morbis, certissima pharmaca præstat,
Et quæ præsentî cætera multa Libro.

PEDACII

D I O S C O R I D I S

De Medicinali materia. LIB. Primus.

IO. RVELLIO interprete.

¶ De IRI ^{Illyrica} CAP. I



R I S, ab aliquibus Illyrica, ab alijs Thelpide, ab alijs Vrania, a nonnullis Cathæron, aut Thaumastos, a Romanis Marica radix, a quibusdam Gladiola, ab alijs Cōsecratrix, ab Aegyptijs Nar appellat. A cœlestis arcus similitudine nomen accepit. Folia fert Gladiolę, sed maiora, latiora, & pinguiora. Flores summo caule, alterno situ incurui euariant. Siquidē candidi, pallentes, lutei, purpurei, aut cerulei conspiciuntur: qua diuersi coloris specie, quędam cœlestis arcus imago representari uidetur. Radices subiacent geniculatę, durę, odoratę: quę frustatim dissectę, in umbra siccantur, & traiectę lino reconduntur. Melior est Illyrica, & Macedonica, & inter has laudatissima quę pumili fere & densa constat radice, frangenti contumax, subruffa colore, gustu amaro, odore perq̃ suauī ac sincero, ita ut nullum prorsus situm redoleat: quę dum tunditur, sternutamēta mouet. Secundum locum habet Aphricana, candidans, gustuq̃ amara. Terebinthi in uetustate sentiunt. tunc tñ odoratiores reddi solent. Vis omnib. exsiccatoria, extenuans. Contra tussim efficac, humorum qui agre reijciuntur crassiciem digerunt. Bilem, crassamq̃ pituitam, ex hydromelite drachmis septem epotę, purgant, Somnum conciliant. Lachrymas cient. Torminibus medentur. Eadem potę ex aceto, auxiliantur serpentium icibus, lienosis, cōuulsis, a uento refrigeratis aut rigentibus, & quibus genitura effluit. Menses, ex uino potę, pellunt. Decoctum earum, fęminarum fotibus utiliter imponitur, ad emolliendos locos, laxandaq̃ in eis uenarū spiracula. Ischiadicis infunditur. Fistulas ac sinus carne explet. Radices ex melle glandis modo subditę, partus extrahunt. Quinetiam coctę & illitę, strumas, ueteresq̃ duricias emolliunt. Siccę quoq̃ ulcera replent, & cum melle purgant. Nudata ossa corpore operiunt. Dolorib. capitis, cum aceto & rosaceo magna utilitate illinuntur. Admotę cum albo veratro, et duabus mellis partibus, lentigines, & uitia cutis in facie emaculant. Pessis, Malagmatis, & Acopis inferuntur. In uniuersum, magni ad omnia usus.

HERMOLAI BARBARI

Patritij Veneti, & Aquileiē. Patriarchę
Corollarij Liber Primus.

¶ I R I S Illyrica.



R I S æstate floret. Folio arundinaceo. Caulem habet cubitalem, atq̃ rectum, similem Asphodelo, sed minorē, durioremq̃. Sunt qui Hierida appel-

A

ἰρις ἰλλυρικὴ
καθάρων
θαυμαστός

B

DIOSCORIDIS

Lib. 21. cap. 7.

Theophr. Libro
9. capite. 7.

Clent unde Consecratrix quoque dicta sit in latino. E rebus in unguenta uenientibus, nihil in Europa nasci, præter Iridem, autor est Theophrastus. In Illyrio cõmendatissima est parte mediterranea, maximeque septentrionib. exposita, & ut inquit Nicander, & Plinius, in siluestribus Drilonis ac Narone. Laudatur Iris radice tantum, Macedonica candidat. Illyrica duorum generum est. Raphanitis, a similitudine: quæ & melior. Rizonomos, subrufa. Non improbat & Pisidica Selgensium. Fossuri, tribus ante mensibus mulsæ aqua circumfusa, hoc ueluti placamentum terræ blandiuntur. Circumscriptionem mucrone, gladioue triplici cum legerint, protinus in celum attollunt: præcipiturque ante omnia, ut casti petant. Nullos cultus exigit, nisi quod ablaqueatam resiccare solent. Tractu, pustulas ambustis modo facit. Terebinib. non sicca modo, sed in terra quoque celerrime infestatur. Ostendit nobis Iridem in horto suo felix Sophia Paduæ. Re presentabat eius flos pruna perque matura odore, ob quod mire appetitur a formicis. Radicem quoque uidi rufam extra, intus percandidam. Genus unum eius Troglodyticum appellant: quam qui manducauerit, uinum quous copioso eo hausto, non obolet: ut Aphricanus scriptum reliquit. In Paulo, non troglodytin, sed Astragalitin legas, in pastilli compositione Pantolimi uocati. Philinus flores Iridis Lycos uocari tradit: quia labiorum lupi speciem reddant. Apollonius, Herophili discipulus, Iridem ex Elide ac Cilicia probat. Est & orbiculus, pastillusue, Iris appellatus, in medicina: is ex croco, alumine, myrrhaque conficitur.

MARCELLI VERGILII

in Dioscoridem ANNOTATIO.

N E S abbreviate.



PRIMUM in Iride illud animaduertisse oportet, non esse legitimam eius appellationem quod in grecis passim legitur, ἰρις ἢ ἰριδίνη. bonitatis enim laus a regione hæc est. Quæ tanta, et apud omnes tam communis illi fuit, ut petita a medico, uillicone, aut unguentario in aliquem usum Iride, non nisi ex ea regione probaretur. Et preteretur. Nec sine causa. Frigida enim, & aquilonia regio est, quo celi statu et afflatu, materia omnis, in omnes usus meliorescit. Inducant id Theophrastus, Celsus, Columella, Plinius, omnesque alij.

Illyrida. Non probamus quod Ruellius reddidit, ab aliquibus Illyrica, nec quem Barbarus in Corollario suo titulum illi adscripsit, Iris Illyrica. Videtur enim alter, bonitatis laudem a regione illi concessam, inter appellationes simpliciter numerasse. Alter uero negasse, alibi quod in Illyrico Iridem nasci, aut de Illyrica tantum hoc capite agere: tamen Iris ubique fere nascitur, et hic de omnibus agat, et in eorum censu hanc unam cunctis præferat. Meminisse etiam debuerat Ruellius, nihil pro se adiectum, qualiacumque ea sit, significare, substantiaque tantum in hæc: in Iride autem indicandam substantiam, quæ patronymico illo nomine, ex quo consensu omnium, inter appellationes, laus illa bonitatis referenda erat, nimis obscure et importune indicabat.

DErunt forte qui putabunt sic dici Illyricam, ut Vetonica, aut Gencianam, aut Lysimachiam: quæ si prima illa a ueronibus in Hispania, duæ illæ a regibus inuenta, solo possessio nomine appellatur et celebrantur.

Thalpide. Thalpidem eandem hic etiam dici ait, nulla nobis eius uocis significatione, nisi forte una tantum mutata litera, Thalpide legendum sit, manifesta congruentiaque a uerbo θαλπω, quod grecis calefacere, et fouere significat, derivatione, quod primum præcipuumque habet Iris.

Quod si suspicionibus etiam contra hæc uicia pugnandum sit, non fuerit abs re forsitan monuisse, quod Thalpidem legitur, Hieridem, siue Hierida legi posse.

Vrania, id est celestis, ideo dicta ab aliquibus fuit, quod celestis arcus specie modo floreat.

Tbaumastos, id est admirabilis, eadem illa ratione, quæ a Poetis idem ille celestis arcus Tbaumanciæ dicitur, genus, originemque hanc illi ex admiratione nouæ rei, rudi adhuc sæculo, ut primus Plato indicauit, assignantibus antiquis.

Catberon, id est purgans, notissimo participio, ἀπό τοῦ καθάρειν.

Gladiolus, quia specimen Gladiolæ herbe præfert, de qua infra. lib. 4.

Consecratrix. Credimus quidem ideo Consecratricem dictam, quod in sacrificijs, purificationibusque suis antiquitas quondam Iride usa sit: nihil tamen hætenus compertum de ea re nobis est.

Radix Marica. Quoniam autore Nicandro, probatissima nascitur in ripis Naronis, in Illyrico φανή, non Maricam, sed Naronica legendum esse suspitio est. Nicandri uersiculus est. ἰρις δὲ ἢ ἰριδίνη ἀπὸ τῶν ἰριδῶν καὶ ἰριδίνης. Relinquimus tamen hoc legentibus arbitrium, satisque sit, suspicionem hanc nostram alijs indicasse.

Flos in summis caulibus. &c. Sic uertimus. cum in grecis, nec summi, nec singuli caules, floresne ulli sint. Factumque id a nobis est. non tam quod paulo ante diximus, ut certius tota res pateret, quod in antiquis grecis aliquoties, non ἀνθὲν ἢ τῶν καυλῶν, simpliciter legitur, uerum ἀνθὲν ἢ καυλῶν, quæ uox singulis caulibus singulos distribuit flores.

Quod erat item παράλλα, ex propria grecæ uocis significatione, recta, paribusque in se specijs in altum

altum surgentes, diximus. Hoc enim, si Euclidi, & græcorum grammaticis credimus, lineis quas Parallelas dicunt, precipue comperit. Nec alio pertinet ea vox. ꝓ ut significetur, nō temere, neq; in latera, aliarum plan-
tarum modo, caules Iridis spargi, sed in altum nullo inter se concursu ferri, & flores in bis ita disponi, ne ala-
ter alterum impellat, simulque concurrat. Quod totum, ut nobis uidetur, parum feliciter reddidit Ruellius, di-
cens alterno situ flores in Iride variari.

Diximus præterea, in arcum flexos, nullo illic arcus uestigio, quoniam floris ea flexura sit, & græca vox
ἐπικμπή, quæ id exprimit, in arcu frequens reperiatur.

Subiecit deinde, & in arcu illo variantes tam multos colores, præsentis temporis participio usi: quoniam
nam quemadmodum in cœlesti arcu, colores illi plures ex mathematicorum & speculata docentium ratione,
non sunt, sed ex oppositæ lucis accessu, ita apparent, q̄ refractis lineis uidentur, non dissimili modo & Iris
cum luce colores mutet: idq; Dioscoridem intellexisse omnes uolunt, cum dixit, ὁραται, id est, uidentur, quia
non sunt in arcu illo tam multi colores, sed ratione accedentis lucis variant & uideantur.

DE ACORO. CAP. II

ACORVM aliqui Choron Aphrodisias, Romani Vencream,
aut Radicem nauticam, Galli Piper aqueum uocant. Folia Iridis
habet, angustiora tamen. Radices non dissimiles, complicatas, non in re-
ctum, sed obliquum tendentes, & summo cespite sparsas, geniculis inter-
ceptas, albicantes, gustu acres, odore non ingratas. Optimū est densum,
candidum, plenum, non exesum, odoratum, cuiusmodi colchidicum, &
galaticum, quod Asplezion dicunt. Radici uis calfactoria. Decoctum po-
tu urinam cit. Prodest lateris doloribus, & iocinoris, atq; pectoris. Item
torminibus, uulsis, ruptis. Lienem absomit. Vrinæ stillicidio, & serpen-
tum ictibus auxiliatur. Ad muliebres infusus Iridis modo utiliter impo-
nitur. Oculorum caligines succo discutit. Antidotis radix magno usu
commiscetur.

BARBARI COROLL.

Acorus, & Acorum, folijs Iridis, sed pediculo longiore. Radices ei Dioscorides subalbi-
das, Plinius nigras, minusq; uenosas reddidit. Ipse rubentem intus uidit, foris colore inter ni-
grum atq; candidum. Raram inuentu, falso tradit Apuleius. Nec nisi cum florem emiserit co-
gnoscibilem. Locis cultis, & hortis, præterq; nascentem. Legendam Augusto mense, Aphro-
disiam, & Sandicem nauticam, & Syngentianam, alio codice Radicem nauticam, & Vnguen-
tianam, & Piperapium uocatam. Ut deprauatum in Dioscoride quis putet, Piperacium, pro Pi-
perapium. Quandoquidem apes, suspensa in uasis earum herba, nunq; diffugere, idem autor
proditum reliquit. Arbitrantur & ea parte mendam esse, qua in Dioscoride, Asplezion appel-
lari legitur. Asplenon uerius existimant, q̄ radix Acori lienem comminuat. Optimæ Ponticæ,
post Galaticæ, mox Creticæ, candidiores Ponticis. Sed primæ in Colchide, iuxta Phasin am-
nem, & ubicunq; in aquosis. Recentibus uirus maius q̄ uetustis. Siccantur utribus in umbra,
digitalibus frustis. Sunt qui radicem Rusci Acoron uocent, proinde ut hanc nonnulli Acorū
siluestrem appellare malint. Acoro flores aureos, croceosue attribuunt. Semen spissum, atq;
gliscens, non sine odoris gratia. Haberi ferunt in Chio, Hellepontiq; & Euxino mari. Radi-
cem Acori subrubentem, uenis intrinsecus peruosis, prætenuibus, & candidis, eaq; indigenas
Iridis loco uti.

EX M. VERG. COM.

Acoron, genere neutro. Sunt qui, q̄ herba sit, feminino Acorum dicunt.

Aphrodisiadem. Fortasse, quia in modice uenerem excitat.

Piperapium, Solus Apuleius, quicumq; ille fuit, Piperapium dictam fuisse testatus est, quod ea in alue-
ribus suspensa, nunq; facto examine, apes in colonias fugerent: nec tamen causam reddidit, nec inuenta ba-
tremus a me est.

Idem præterea, Sandicem nauticam, & Syngentianam ait uocari, incerta nobis pariter nominum huius
eodem origine & causa. Quæ ego hoc loco non posuissim, nisi ante nos, in Corollario suo, bas uoces Bar-
barus inseruisset, pluris q̄ æquum erat fecisse eas uideret. & nisi in antiquo latino Dioscoride, in extrema

A

ἀκρον
χορον ἀφροδι-
σίας

groß galgent mangel.

ἀσπλεζιον

B

Lib. 15. cap. 13.

D I O S C O R I D I S

Capitis coronide, omnia illa ab Apuleio dicta, tanquam legitima proles scriptori huic adiecta fuissent. Obiter quoque monendum cenſeo, quod in Apuleio legitur, Sandicem nauticam dici Acorum, uideri nobis ex Dioscoride acceptum, & si id sit, corrupte Sandicē, pro radice legi, tanque facilis in una litera lapsus, radice in sandicem est, ut id potius, iudicio meo, sic legendum in Apuleio fuerit, quam importuna hoc loco notis usus inferendus.

Subinde, quoniam Iridi similis, et cognata Acorus sit, eadem illa appellatione potuisse quondam uocari. Et ut in Iride radix Marica, Naronica, donec certius aliquid inueniretur emendata nobis est, sic etiam in Acoro, pro radice nautica, Naronicam legi eodem modo posse. Nec est quod miretur aliquis, latinarum uocum tam graues mendas, cum graecarum in latinis, non dissimiles passim uidere liceat.

Primam habet bonitatis existimationem quae densa, etc. Priuatim illud opinatur, non densam, sed amarum legi quondam potuisse. Monueruntque nos, probatiores in Graecis codices, in quibus una tantum mutata litera, non πικρὸν, quod densum, sed πικρὸν, quod amarum significat, legitur. Quod & Galenus aperte innuit dicens, saporem Acori acrem, cum amaritudine aliqua esse. Non tamen communem lectionem damnamus.

DE M E O CAP. III.

μεν
μεντικόν

μεντικόν
μεντικόν

Plinius lib. 20.
capite. 23.

ME O N, quod Athamanticum uocant, in Macedonia & Hispania plurimum gignitur, Anetho folijs & caule simile, sed eo crassius. Binum ferme cubitorum altitudine attollitur, sparsis in obliquum rectumque radicibus, longis, tenuibus, odoratis, lingua ex calfacientibus. Quae feruefacta ex aqua, uel trita citra coctionem, praclusorum renum uesicaeque farcta uitia potu leniunt. Urinae difficultati medentur. Stomachi inflationes discutiunt. Torminibus, commota uulua, articularum doloribus, atque fluxionibus pectoris, trita cum melle in elegmate auxiliantur. Sanguinem per menstrua pellunt, deflectionibus feruefacta. Infantibus autem illita imo uentri, urinas mouent, quod si plus quam deceat ex his bibatur, caput dolore afficiunt.

BARBARI COROLL.

ME V, graeci μεν, producta priore syllaba, non diphthongo, sed uocali longa, ex Galeno. Genera eius duo. Nobilius Athamanticum, ita dictum, quod ab Athamante inuentum sit. Siue quod laudatissimum in Athamante reperiatur. In Italia non nisi a medicis serui solitum. Folijs Anisi, caule interim bipedali. Radicibus multis, & obnigris. Alterum rufius. Est & Geum inter herbas longe distans a Meu, radículas, ut inquit Plinius, tenues, & nigras habens, & beneolentes. pectoris & lateris doloribus quaerenda. Cruditaribus quoque discutiendis, Iocundo sapore, Sunt tamen Pliniani codices, in quibus Gerum haec, non Geum scribatur. Quod recte nescio.

EX M. VERG. COMM.

ME O N. Plinius Meu id, non Meon appellat, qua uoce posteriores etiam aliquot usi sunt. Caule, folijsque Aniso similibus. Variant in figura, & historia eius antiqui Graecorum codices. In aliis quibus enim legitur Aniso, in aliquibus, Anetho folijs similibus esse. Plinius Aniso similia dixit. Nosque in ambiguo, ueluti alterius testis accessione, quae pluribus testimonijs confirmabatur, Anisi lectionem magis probauimus.

Quod Athamanticum uocant. Cur Athamanticum diceretur, Plinius eodem loco exposuit. Nisi forte Athamanticum, substantiuum est litera, legendum, docuerit Dioscorides, & in Athamania nasci, cuius regionis gentem (autore Byzantio Stephano) aliqui Thessaliae, aliqui Illyrico adsignant. Nec refert, in Macedonia nasci Meon dixisse Dioscoridem: quoniam non longe distant inter se, Macedonia, et Thessalia. Suspicio tamen haec magis, quam decretum sit.

DE C Y P I R O.

κίπρος
κυπρίων
κυπρίων

CYpirus, quem aliqui Erysisceptrum, ut Aspalathum appellant, Romani lunci radicē, aut luncū. Folia fert Porraceis proxima, sed longiora, & exiliora. Caulem odorati lunci, cubitalem aut maiorem, argulofum. In cuius cacumine minuta folia cum semine exoriuntur. Radices, quarum

ces, quarum in medicina est usus, contiguus inter se oleis oblongis rotundisue similes, nigro colore, suauis odore, amaro gustu. In lacunosis et palustribus enascitur. Optima est grauissima, densa, fractu contumax, plena & aspera, odoris cum quadam acrimonia iucundi: qualis est Cilicia, Syriaca, & quæ a Cicladibus insulis petitur. Huic calida uis inest. Venarum spiracula laxat. Vrinam ciet. Ad calculos, aquamq; subtercutem utilissime bibitur. Aduersus scorpionum ictus remedio est. Perfrictionibus uuluarum, & præclusionibus, fotu prodest. Pellit menses. Contra ulcera oris, etiam si depascant uorentq; farina eius efficax est. Malagmatis calfacientibus, et unguentorum spissamentis adijci solet. Aliud Cypiri genus tradit in India nasci Gingiberis effigie, quod manducatum croci uim reddit, & illitum præsentem Psilotri uim exhibet.

BARBARI COROLL.

Cypirus Gladioli nomine apud nostros, aliud est q̃ Cyperus is, quem latini radicem Iunci, ut Dioscorides hoc loco, Columellaq; testatur, uel Iuncum quadratum, ut Cornelius. Cyperus pro Gladiolo, ut Theodorus Gaza uertit, a Theophrasto peculiarem habere quandam æqualitatem in caule describitur. Radice tamen inæquali, partim crassa, carnosaq; partim gracili atq; surculosa. Hanc & in altum agi. Ideoq; contumacem emori atq; uelli. Nasci e latere huius radiculam, unde cauliculus erumpat alius. Sunt qui non distinguant, uicinitate nominis fallente, sed discrimine multo separatur. Cyperus, siue Cypirus is, qui latine Gladiolus, & Xiphion a Dioscoride suo loco dicitur radice bulbosa. Laudatissimus in insulis Creta, dein Naxo, postea Phœnice uisitur. Cretico odor odorq; propinquus Nardo. Acrior hic Naxio, exilis Phœnicio, nullus Aegypto. Nardus ibi puenit. Tradunt, non egredi barbaros domibus, nisi ab hoc suffitu. uegetiores enim, firmioresq; sic fieri. Dulcis huic radix, & quæ decocta panem etiã gratiorem faciat, ut inquit Theophrastus, unde sumpsit Plinius. Ponderosior utiq; simul subacta. Hoc ipso nomine palustris alter Cypirus, siue Gladiolus ostenditur, quem Iulio mense ad radicem secari præcipiunt. Tertioq; die in sole contineri, dum candidus fiat. Quotidie autem ante solem occidentem in lectum referri: quoniam nocturni rores palustribus officiant. Sic palustris hic qui floreat uere cum Viola nigra, sed utiq; post Anemonem, quæ Timonia uocatur, comitatus Hyacinthis, & Gladiolus appellatus, an, quod magis puto, Xiphion, Theophrastum secutus, querendum & æstimandum relinquo. Est enim uagum & commune multis nomen Gladiolus. Folium simile nomini. At Cyperus, de quo nunc agitur, Iunci trianguli, ut Plinius interpretatur, ut Celsus, quadrati species, iuxta terram candidus, cacumine niger, pinguisq; proflit, cuius radicem cū oblōga est, Cyperidem appellat. Laus prima Hammoniaco. Secunda Rhodio. Tertia Thracio, si Plinium sequare. Nouissima Aegypto, qui & confundit intellectum, quoniam et Cypiros ibi nascitur, qui est Gladiolus. Sed & Cyperus pro Iunco durissima uixq; spirans in Aegypto. Cæteris odor ipsam Nardum imitans. Nonnulli distinctionis gratia Cypiron pro Gladiolo, Cyperon pro Iunco triangulari, siue quadrato nominant. Non desunt qui Pseudocypirum uocent Gladiolum: de quo Plinius, semel quod meminimus, dixit. Ocyssima omnium Cypirus, & Pseudocypirus frutex. Protinus enim, inquit, floret, semenq; profert. Quadratus & angularis, ad differentiam rotundi Iunci, quem Schoenon græci uocant, cognominatus intelligitur. Penultimam Cyperi, q̃nq; diphthongo longā, q̃nq; uocali breuem græci scribunt. Dicitur hæc & neutro genere Cyperum a Paulo. Habetur & Cyperus Indica: quam Plinius, Cyperin appellat, etiam si quibusdam exemplaribus Cypera legitur. Non possum non mirari, quam obrem Laurentius Valla, Cyperum in Herodoto, Siler, conuerterit.

EX M. VERG. COMM.

Cyperon. Non poterunt hoc loco facile secerni, Cyperus, Cypirus, & in feminino genere Cyperis, quæ tria, multa nominum similitudine, genere, & ut a toto pars inter se differunt. Cyperus siquidem, de quo nunc agimus, in Iuncorum genere, anguloso caule, & odorata radice est. a Celso. lib. 3. cap. 22. quadratus Iuncus, a Plinio lib. 21. cap. 18, triangularis primo, mox angulosus dictus, graui, inter graues auctores, in angulis eius a iij

A

Celsus Lib. 3.
cap. 22.
Theophrastus
lib. 9. cap. 7.

B

Plinius lib. 21.
cap. 18.

D I O S C O R I D I S

C discordia. Nisi Dioscorides, cum dicens, utriusque bystoriā confirmasse, & omnem inter eos, ueluti litē dī remisse uideatur.

Cypirus autem palustris herba est, Gladiolus quondam, a cultellati folij figura, ut credimus dictus, multis locis laudatus, & in Aegypto, si Plinio credimus, nullius odoris.

Cyperida postremo, feminino genere, radicem Cyperi ueteres dixerunt, non omnem, sed eā, quam hic oblonge oliuæ similem, præcipui in medicina usus, laudauit. Quæ una fuit causa, ut posteriores medici Cyperin, siue Cyperida tantum nouerint. Sic enim Paulus ægineta multis locis appellat. Quam uero Plinius eodem capite dixit, per se Indicam herbam esse, quæ Cyperis uocetur, Zingiberis effigie, & commanducatum Croci uim reddere, diuerse a Dioscoride traditur. Non enim Cyperida, sed Cyperum dicit appellari. quæ in India nascatur Zingiberis effigie. Credimusque nos, ab utroque idem dici, uarietatemque uocē, non aliud esse, quæ a potiore parte, & quæ sola usum habet, tota quondam etiam dicta fuerit planta. Quod a Romanis itidem factum est, qui Iunci radicem Cyperum dixerunt, totam plantam, et utiliorem eius partem simul signantes, quæ appellatione usus Columella aliquando est.

Sunt qui Erysipteron uocent. Nulla a nobis deprehensa hætenus appellationis huius origo est, & causa: quando, ut ex utriusque bystoria patet, nihil simile inter se habent, Cyperus & Aspalathus, & licet aliquas habeant in medicina pares uires, non tamen ἀντικαλλόμενα sunt, id est, æqualia, uel quæ hodie sic uocant, quid pro quo. Nisi fortasse multis quoque plantis commune sit hoc nomen. s. Aspalatho, Cypero, Verbenaci, aliisque. Ex quo enim per multas uagatur plantas, oportet in eo commune aliquid intelligere, quo se diuersis cōciliet robur.

Ἐν τῇ Καλλόμεινᾳ

καρδὰ μωμοῦ

DE CARDAMOMO CAP. V.

Cardamomum optimū est, quod ex Comagene, Armenia, Bosphoroque deuehitur. India quoque & Arabia prouenit. Eligi debet plenum, frangenti contumax, contractum, quod em̄ huiusmodi non est, intempestiuum iudicatur, & gustu acre, subamarum, & odore caput tentans. Excalfactoriam uini habet. Potumque ex aqua, facit ad comitiales, ischiadicos, tussis, neruorum resolutionem. Item ad rupta, uulsa, tormina. Latas uentris tineas excutit. Ex uino aut potum renibus, difficultati urinae, a scorpione ictis, neque non omnibus uenenum uiuantibus auxilio est. Cum cortice radicis Lauri epota drachma, calculos comminuit. Partus suffitu enecat. Scabiem ex aceto illitum adimit. Et ad unguentorum spissamenta additur.

D

καρδὰ μωμοῦ
καρδὰ μωμοῦ

Theophrastus
Lib. 9. cap. 7.

Plinius lib. 12.
capite. 13.
Gale. 7. simplic.

Cardamomum, Theophrastus refert, alios e Media putare, alios ex India cum Amomo atque Nardo, et plurimis id genus aduehi. Simile Amomo, frutice toto prædicat, semine oblongo. Quatuor eius genera, uiridissimum, & pingue, acutis angulis, fricanti pertinax, quod & maxime laudatur. Proximum rufio candicans. Tertium minutius atque nigrius. Pelus, uarium & friari facile, odorisque parui. Id quod uerius est, uicinius esse Costo debet. Preciū optimi, ait Plinius, in libras denarii. 2. Recentiores Mauritanii, hoc non Cardamomum, sed Cordume ni, et syluestre Caros uocant. Cardamomi uero nomine genus aliud intelligit, in geminas diuisum species. Alterum lentis amplitudine. Alterum ciceris obnigri, in quo granum albi sit, gustu mordaci. Vtrunque odoratum. Quid, quod officinæ Cardamomo utuntur alio, quod a Mauris, & a Dioscoride perscribitur, duplicis fastigij, minus & maius appellantes, cui simile id semen sit, quod uulgo Melligeta dicitur, prælatum uiribus.

A D D I T I O

Auctor Pandectarum, nescio quid hic lepidum somniat de Cardomomo & Cardumeni, indicans aliquid esse corruptum in Dioscoridis textu, & apud Plinium. Mirum, quomodo hic tam lyncens fuit, in alijs totius talpa. Quare posthac illius nenij immorari, uel eas reprobare, omitemus.

καρδὰ μωμοῦ
καρδὰ μωμοῦ

DE NARDO CAP. VI.

Duo Nardi genera, unum Indicū, alterum Syriacū appellatur. Non quod in Syria proueniat, sed quod montis in quo oritur, pars una ad Syrios, pars altera ad Indos flectitur. Ex hoc Syriaci gene

re præcipuum est recens & leue, largam gerens comam, flauum colore, perç odoratum, ac Cyperum redolens. breui spica, amaro sapore linguâ siccante, q̃ diu in sua odoris gratia permaneat. Ex Indicis autem Nardū quoddam Gangitis uocatur, a fluuio Gange, apud quem enascitur, montem præterfluente: quod genus ob multam loci in quo prodit uliginem, uiribus infirmius est, atque procerius adolescit, oppletas ferēs spicas, ab radice comatas, unaque conuolutas, ac grauiter olentes. Montanum autem odoratius, spica breui, odore Cypero uicino, cæteras habens Syriaci dotes. Est & genus quoddam, cui Sampharítico nomen locus indidit, frutice breui, in magnas se spargens spicas, cãdidiore caule, Hircoreum uirum supra modū redolente: quod improbatum. Madefactum uendi solet. Quod uitium ex eo deprehenditur, q̃ cãdida sit spica & squalida, nulloq̃ puluere obsita. Adulteratur * Stilbio cū aqua, aut Palmeo uino, in spissationis ponderisq̃ causa inspirato. Intueri autem oportet, si lutum radici bus infideat, & incerniculo puluerem excutere, eluēdis manibus utilem. Vim habent excalfactoriam & exiccantem. Urinam mouet. Alium potu sistunt. Vuluæ profluuiā, sanieq̃ apposita supprimunt. Nauseæ ex aqua frigida auxiliantur. & cardiacis, inflationi, iocineri, regio morbo, renum uitij. Aquæ autem incoctæ fotu ad infessum, uulvæ inflammationibus medetur. Ad glabras oculorum genas ualent: siquidem eas ad densiorem pilum reuocant. Perfusis humore corporibus insparguntur. Miscentur antidotis. In fictili non picato ad ocularia medicamenta reconduntur, trita in farinam, & cum uino in pastillos coacta.

NARDUM, siue Nardus, in Thracia exili odore nascitur, siue ut Theophrastus scripsit, radiculæ potius quædam imitantes odore Nardum, sed leuiter. Quanquam Plinius, inuentam in Thracia nuper herbam dicat, cuius folia nihil ab Indica Nardo specie dissentiant. Principatus in unguentis Nardo apud ueteres fuit. Frutex est graui & crassa radice, sed minuta nigraq̃ ac fragili, quamuis pingui, situm redolente, qualem Cupressi, aspero sapore. folio paruo, densoque. Cacumina in aristas se spargunt. Ideo gemina dote Nardi spicas, & folia concelebrant. Alterum genus apud Gangem in totum reijcitur. Adulterat Pseudonardo herba, quæ ubiq̃ nascitur crassiore atque latiore folio, colore languido, in candidum uergente. Sit hæc fortasse quæ Dioscorides Samphariticam appellat. Item sua radice permixta, ut Stilbio ponderis gratia, & Gummi, & Argenti spuma, & Cyperi cortice. Precium spicæ in libras denarij. 50. foliorum uero eius quod maiora hæc habet, Hadrospheron uocatur, denarij. 30. Eius autem quod minima & Mesospheron dicitur, denarij. 60. At eius quod minima, & ob id Microspheron appellatur, laudatissimumq̃ est, denarij. 75. Odoris gratia omnibus maior recentibus. Nardo color, qui in ueterauerit, nigriori melior. Indica, Syriacæ præfertur a Galeno. Nigrior, & ualidior etiā nonnunquam Syriacæ. Reliqua genera in mentione gallici Nardi, montaniquē dicemus. Sed poscimus identidem, quæ sint illæ nouem species, quas Nardum Indicum representare Plinius existimet. An Gangetis prima, Ozenitis, ab odore uirulento dicta. Secunda, Pseudonardus. Tertia, Syriacæ. Quarta, Gallica. Quinta, Cretica, id est Phu. Sexta, Baccharis. Septima, Hirculus. Octaua, Alfaron. Nona, Thracia. Quidā usum Nardi omnē abdicant, ob ancipitē ex ea medicinā, propterea q̃ in Nardo quiddā ueneni delibutorij uice nasci ferant, e quo Pison illud uocatū Indi cōficiant. Exitiale nō potu modo, sed in sudore corporibus appositū, etiā si ab legibus purgari, & elui curiosissime, moris sit, fortasseq̃ hoc sit aut nō dissimile quod Pharicō a Dioscoride, ac Plinio, Phariakon ab Atheno dicitur, gustu Nardi omnino, sed resolutionē faciens neruorū, cū alienationē mētis, atq̃ spasmus. Aduersari autē huic ueneno maxime Cydoni-

A

ἐκ τῆς πλῆθους χροῦ

γερῆς

καμφορίτης

*Barbat. σίμμο

καρδιουμ

ὀφθαλμικῇ

B

Pli. lib. 12. cap. 12.

Theophr. lib. 9

cap. 7.

Nouem species
Nardi.Nardus in her-
nenum.

Cam, Philarcus prodidit. Notatu dignū, a Dioscoride, ceterisque ueteribus, Nardū Cyperi odore cōmēdari, a Plinio Cupressi. Malim qdem librarij fuisse culpā. Sed si Plinio tribuendus error foret, affinitate uerbi lapsus esse dicerē, Cyparissizin, pro Cyperizin legentē. Nec dici potest, cōtra deceptū esse Dioscoridem, non Plinium. Quando quidem Cyperum idem ipse Plinius odorē Nardi referre alio loco scribat. Aduertēdum est & illud, omnia Nardi gener a herbas esse, prāter Indicū. In ijs probatio una, ne sint fragilia, & arida potius q̄ sicca folia. Hirculus porro, qua uitiari Nardum sinceram dicunt, nō grauitate odoris modo, sed similitudinē etiā nonnullam animalis eius nomen accepit. Græci *ῥόδον* uocant. Illud, ne quem fallamus, nō scendū. Syriacam Nardum duplicis esse generis. Vnum in India, sed parte montis in Syriam spectāte, quam Plinius sub Indicē uocabulo complectitur. Alterum in orbe nostro, id est, Syria, Ciliciaque. Hoc aliqui Gallico præponunt. Aliqui contra, Gallicum Syriaco tali præferunt. De Gallico mox dicemus. Calenus Indicam Nardum accipit quoties absolute Stachyn, id est spicam Nardi nominat, quasi spicam cæteræ non habeant, sed herbā dumtaxat, quē admodū & Plinio uidetur. In Gedrosia quoq; Nardum est. Sed sub Indico cōtineri credimus.

EX M. VERG. COMM.

Altera Indicam spectat. Credimus, statim in ipsis foribus, perisse huius capiti alteram regionem, Indicam scilicet. Siquidem incipiens hoc caput Dioscorides, duplicem esse Nardum ait, uocariq; Indicam alterā, alteram uero Syriacam: subiecitq; statim, non ideo Syriacam dici, quia in Syria nascatur, sed quod montis in quo nascitur, altera pars Indiam, altera Syriam spectat: exigebatq; rei, q̄ distinctionis sequax necessitas, ut quē admodū dixerat, non ideo Syriacam. Et sic etiam de Indica aliquid diceretur: nec aliud dici posse uidebatur, ob ea quæ statim sequuntur, q̄ quod de Syriaca dictum fuerat, non ideo scilicet Indicam dici, quia in India nascatur, sed quod. Et. Quam ob causam nos Indicam etiam reddidimus. Et in nullo grecorum inueniunt id a nobis fuerit.

Desiderari eodem loco etiam hic potest moris nomen, & situs in quo Nardus nasci dicitur, siue in India, siue alibi is esset: Et si ob ea quæ Plinius libro. 12. rettulit, & hic paulo post de Gange dixit Indicæ Nardi nates assignandi sint. Leniora tamen hæc sunt.

D Illud in medio capite grauius, in quo non diuersa tantum, sed contraria penitus omnia leguntur. In pluribus siquidem, sed minus probatis legitur. Auferendum in usu Nardi, si quid radi-^{bus} eis hæserit, cum eribro eximendus puluis. In paucioribus autem, sed probatiori fidei, ut nos, ^{rad.} mus, Auferendā scilicet in usu eius primum radices. Et. Videturq; prior lectio illa, Nardi radicibus, medicinam uti, ex quo in eum usum purgari eas iubet: idque Paulus Aegineta libro sexto etiam confirmat, iussisseq; hanc Serapionis ætate huius loci lectionem.

Profunt & stomachi erosionibus, quas Græci Cardilogmos dicunt. Sciendū illud est, quam Græci ex multo tempore *ῥόδον*, id est, cor dicunt, antiquissimis in ea gente Peloponnesiacis belli tempore, quo Hippocrates, medicinam suam commentatus est, non cor, sed uentriculum & ostium stomachi significasse. eaq; uoce intellexisse antiquissimos Græcos, stomachum & eius ostium tantum, non cor penitus aliud ab eo. Testis significationis eius est Hippocrates grauis autor, & qui pro oraculo in hīs merito habendus sit, pluribus locis ea pro stomacho usus est. Hæc multis etiam alijs in commentario suo Vergil.

A D D I T I O.

Cyperum imitante, id est, angulosum Iuncum.

Hircum spirante, id est, bircinum, uel Hircorum uirus.

Frutice pumilo. Breui, uel decurtato. Adulterant flatum Stibio. *Αδολφοι δὲ αὐτῶν ἐμψυαύτῃσι μ.* Est autem Stimmi, ut inquit Plinius lib. 33. cap. 6. lapis spumæ candidæ, nitentisq; non tamen translucens. Stimmi appellant alijs Stibis, alijs Alabastrum, alijs Larbason. Duo enim genera, mas, & femina. Et.

Abundantias foeminarum, id est, uulvæ fluxiones & proflumina.

Nono fistili, cui testorium non sit obductum. *ἰν ἀγγλῷ καὶ αὐτῷ ἀνεύτῃ, uase nouo picato.*

De NARDO Celtico.

CAP. VII

ῥόδον *ῥόδον*

Celticum Nardum nascitur in Liguriæ alpibus, Salinca patrio nomine appellatum. Prouenitq; in Istria. Exigue fruticat, & cū radice uellitur. Alligatur manualibus fasciculis, manipulatimque componitur. Folia habet oblonga, colore in flauum languido. Florem luteum. Foliorum, ac cauliculorum dumtaxat usus est, & odoris suauitas. Vnde pridie fasciculos aqua abluerē expedit, & exempta terra, pauito solo atque

lo atque humenti subiecta, charta reponere, postridie repurgare. siquidē
 utile ab acroso, alienoq; propter humoris uim, non excutitur. Adulter
 ratur imposita herba simili, quæ Hirculus uocatur, ab odoris grauitate.
 Sed facilis cognitio. Namq; herba candidior est, sine cauliculo, minorib;
 bus folijs, radice neque amara, neque odorata, uti uerum Nardum est.
 Itaque radices atque cauliculi, abiectis folijs triti, uino excipiuntur, dige
 runturque in pastillos, & ita fictili nouo diligenter operto, asseruari de
 bent. Laudatur maxime recens, iucundi odoris, radice numerosa cohæ
 rens, plenum, nec fragile. Ad eadem quæ Syriacum pollet, sed uehemen
 tius urinam cit, & stomacho utilius est. Inflammationibus iocineris, &
 felle suffusus auxiliatur. Contra stomachi inflationes, cum Absinthij de
 cocto bibitur. Item aduersus lienem, renum & uesicæ uitia, & uenenatos
 ictus ex uino. Additur in malagmata, potiones, & calfaciētia unguenta.

BARBARI COROLL.

Nardum Gallicū, siue ut Græci appellant, Celticū, laudatur in orbe nostro post Syriacum.
 quippe quod Syriaco sit leuius, neq; multū ab Indico differēs, ut Plinius existimat. Preciū sielis
 u. Hoc & Aliucā uocari, Dioscorides Alpinis populis tradit. Credo Saliuncā legendū, a uici
 nitate pro Saliuncā. Quam nostri foliosam quidē, sed breuem, & quæ necti non possit, descri
 bunt. Radici numerosæ cohæret herba uerius q; flos. Densa, ueluti manu pressa. Breuiterque
 cespes sui generis, Pannonia gignit hanc, & Norica, & Alpiū aprica. Urbium Eporedia tan
 tæ suauitatis, ut metallum esse coeperit. Vestibus interponi eam gratissimū. Seruius hanc uul
 go appellari, Orci tunica, portat. De Hirculo herba, cuius Dioscorides hoc loco meminit,
 superius mox absolui.

EX VERG. COMM.

Celticam Romanis, Id est, nascit in alpihus Lyguriae Celtica Nardus, sed ab incolis regionis
 suæ uocabulo Gallica a quo exa est. Suspicionemq; coniecturam hanc nostram confirmauit, quod est illic
 aduerbium επιχαρις, id est, iesta in Græcis significatione, quasi dicas, regionis modo q; nomine, quod totū
 nos reddidimus, ab incolis græcis suæ nomine appellata. Nec aliud est quod certū q; pro comperto nobis de ea
 dici possit, q; Genuates quidā Herbaria pro celtica Nardo, quæ est spicati floris colore inter ceruleum q;
 purpureum, Lauendulam exhibuerit, notā passim herbam. Aequè sic dicta, quoniam magnum uetigal gen
 ti illi hæc herba est, quotannis in Aphricam eam ferentibus mercatoribus, ubi lauandis, fouendisq; corporib;
 bus in balneis Lybes ea utuntur, nec nisi decocto eius abluti mane domo egrediuntur. Eadem, nullam talē her
 bam hircini odoris nouisse dicebant. Quo fit, ut peritioribus censendum relinquamus, an Celtica Dioσκο
 ridi Nardus ea sit, quam Genuates Celticam spicam, q; Lauendulam, dicunt. Nobis nō uidentur alteri alte
 rius respondere uox. Nam Dioscorides suam luteo flore describit, Genuates suam colore inter purpureum
 q; ceruleum ostendit: ob quas causas suspicantur proprii generis herbam, Gallicam hanc Nardum esse.

ἀλλογγία. Ruellius, Saliunca. Sed omnē, ut uidetur, doctissimorum nostra ætate uiroꝝ, pro Saliunca,
 q; Gallica Nardo disceptationē excitauit una Dioscoridis in hoc capite uox, quæ nec una, nec eadem in an
 tiquis græcis est, sed in aliquibus Saliunca, in aliquibus Aliunca, in aliquibus etiam geminato, ll, Alliunca le
 gitur. Ex qua tam multiplici lectione, oborta nobis suspitio est, uirum in ea uoce esse, ut plerumque fit in his
 quæ latinā a Græcis, & a latinis græca imperitis alterius linguæ librarijs scribuntur: nec Saliuncam illic le
 gendum esse, uerum ex quo sunt in quibus duplum ll est, q; in omnibus totam dictionem finit ea syllaba, Gal
 lica, pro Saliunca legi posse.

Prodest eodem modo q; lienī. In aliquibus græcis non prodesse simpliciter scribitur: ut non tantum enī
 parti, uerum in quo eius partis malo etiam mederetur, intelligeremus.

Demontano NARD O. CAP. VIII.

Montanum NARDVM, quod ab aliquibus Thylacitis, & Ni
 ris appellatur, in Cilicia & Syria nascitur, caule & folijs Eryn

A

αρχη

ικτυοεις

αλτινὴ νάρδος

Lib. 21. cap. 7.

q; Lib. 20.

B

Lauendula qua
re sic dicta est.

ἐρυνὴ νάρδος

θυλακίτις νίρις

D I O S C O R I D I S

C gio similibus, minoribus, minime tamē spinosis, asperisq̃. Radicibus binis nititur, aut pluribus, nigris, odoratis, ceu Hastulæ regię, sed lōge graciliorib. & exiliioribus. Neq̃ caulem, neq̃ fructum, neq̃ florem proferit. Ad eadem quæ Celticum efficac.

N B A R B A R I C O R O L L.

Nardus montana, quam & Syriacam, & Ciliciam uocare possis: a Galeno Pyritis appellata est, nec priuatim a Plinio describitur, sed inter Nardi genera promiscue refertur.

E X M. V E R G. C O M M.

A quibusdā Thylacitis, θυλακίς, θυλακίον q̃ masculino, nec minus θυλακίον neutro genere, græci uocāt ex animalium corio factum sacculum, peramq̃ & utrem: ab his nominibus adiectiua forma θυλακίτις uox facta est, qua ueteres Nardum hanc dicebant. propterea, q̃ ex Cilicia, Syriaq̃, mercatoribus in Græciam sacculis bis clausa, uenalis afferretur: eratq̃ id nomen quasi nota gentis, & a gente bonitatis in hac herba. Indicant id meliora græcorum Lexica, in quibus uox θυλακίφοροι, exponitur, θυλακίς περιφίροντις τὰ ἀρώματα, quod est, ex corio sacculis circumferentes aromata.

Folia cum Eryngio similia habet. Dissidet hoc quod mox a fine subiungit, Non caulem, non florem, non semen ferit. Quomodo caulem habet, & non caulem? Sed quod nouisse huic capiti credimus, rerum uocumq̃ similitudo & uicinitas est. Habent siquidem græci κλάσας κλάσας, & κλάσας, quibus diuersas in planis germinationes ostendant, ut aliquando certius nos etiam docebimus. Factuq̃ facile fuit, ut in priorē illa parte qua nunc legitur κλάσας, id est caules, non id, sed κλάσας, aut κλάσας quondam legeretur, & a partem perito, diligentiq̃ homine, altera pro altera uox accepta fuerit: ideo nos ramulos illic reddidimus. nam in posteriore illo, caules necessariō reddēdi erant. In pluribus siquidem naturæ ordo hic est, ut ad florem & semen, caulem prius proferri oporteat. Quæ duo in montana Nardo hic negaturus, tertium etiam negare cogebatur. Qui autem ab nobis ramuli in herbis dicuntur, hi sunt qui infructuoso genere, quale Absinthii, Ruta, Thymus, pluraq̃ alia sunt conferti ab uno principio, pluresq̃ oriuntur, eadem altitudine fere inrer se crescunt.

D Minora tamen, nec Eryngij modo aspera. In paucioribus græcis, si quid, quod asperum, sed ταχία, quod crassum significat legitur. Nec aliud Serapionis ætate legimus. Folia uersabatur, asperitatem ne, an crassitudinem, Dioscorides excepisse uideatur. Nos quomodo, si quid, asperitas, & aculei a Dioscoride assignantur, illud malimus, quod eiusdem scriptoris auctoritate desumimus, infirmari poterat.

D E A S A R O A P. I.

A SARV M, quod & ipsum aliqui siluestre Nardum appellant, Magi Sanguinem Martis, Latini Perpescam, alij Bacchar, Osthanes Thesam, Aegyptij Cerea, alij Nardū rusticū, Galli Bacchar, Aethrusci Succinum. Odorata herba est, qua in coronamentis utuntur, Hederae folijs, minoribus multo, rotundioribusq̃. Floribus Cytini Hyoscyami, purpureis, inter folia proxime radicem emicantibus, odoratis, in quibus semen acinosum. Cauliculos habet angulosos, asperos, & molles. Radices numerosas, geniculatas, tenues, obliquas, graminī nō dissimiles, longe tamē graciliores, odoratas, quibus odor inest Cinnamon proximus. Asperum siccumq̃ solum amat. Eius radix, ruptis, conuulsis, in tussi uetere, & spirandi difficultate, & si urina ægre redditur, opifera est. Menses ciet. Contra serpentū ictus, cum in uino bibere, salutare est. Folia, ut quæ astringant, illita, capitis doloribus, oculorum inflammationibus, incipientibus ægilopijs, mammis tumentibus a partu, ignibus sacris auxiliantur. Odor somnum gignit. Crateuas herbarius de eo ita scriptū reliquit. Asarum excalfactoriam uim habet. Urinam cit. Hydropicis, & uetusto coxendicum dolori prodest. Radices senis drachmis ex aqua mulsa potest mens

μαρτυ
μαρτυ
θισαν
βάρχαρ
αυθισαν
μαρτυ
μαρτυ

Asarum amat loca
aspera & frigida.

Radix Asari potest
in uino & salutaris
contra ictus serp.
perichim.

Crateus herbarius
barius.

menſes trahūt, & Veratri albi modo purgant. In unguenta additur. Vm broſis montibus prouenit, ſed plurimum in Ponto. Phrygia, Illyrico, & Italiae luſtiniienſi agro.

ABARBARI COROLL.
 Aſaron, præter cæteras differentias, molliora quoq; folia obtinet q̃ Hedera. Radice Galli ci Nardi, Semine, ſaporis calidi ac uinoſi. Bis anno floret, Autumno, & Vere. Optimum in Ponto, proximum in Phrygia, tertium in Illyrio. Effoditur cū mittit folia, ſicut occyſſime trahens, ac ſeneſcens. Error librariorum eſt in Plinio, qui alicubi iubere uidetur ſiccandū in ſole, alicubi in umbra. Niſi quis poſteriorē locum ita legat. Nō q̃ ſiccandum ſit in umbra, ſed q̃ ſi tū celerrime in umbra ſentiat. Non ignorandū, Baccarē aliud omnino eſſe q̃ Aſaron, etiāſi me dicinas, quas Dioſcorides Aſaro dicauit, Plinius apud nos Baccari magna ex parte acceptas retulit. Nec mirum, cū ſit earum natura uiribus & effectu proxima. Ceterum Perpenſam, ſiue Perpreſam (nā utrūq; legitur, ut in Baccare latius expoſui, non Aſaron, ut Dioſcorides, ſed Baccarē intelligi Secundus noſter uoluit. Cōtra quoq; deſcriptio Aſari a Dioſcoride facta, cōgruit Baccari multis partibus. Primū, q̃ odor ei Cinnamomo uicinus redditur, ut Aſaro. Deinde, q̃ grācilis, nec humido ſolo prouenit, ut Aſaron. Alioquin reprehēdūt a Plinio, q̃ Nardum ruſticū, radicē Baccaris appellauere: quia Nardum ruſticū proprie ſit Aſaron. Quod uero Dioſcorides Coronamentariā eſſe dicit herbam Aſaron, id Baccari potius q̃ Aſaro conuenit. Propterea, q̃ Aſaron uocari ſcribunt, quoniā in coronas atq; ſerta nō addatur. Legebatur in Dioſcoride, Romanos Aſaron Peritrefam uocare: nos Perpenſam, aut Perpreſam ex Plinio correxiſimus. Auctor is eandē opinor herbam. 21. libro Perpenſam. 26. Perpreſam nominat. Codices etiānum ſunt, in quibus non Perpreſa, ſed Sparſa legitur, ut exiſtimo corrupte. Legitur & Aſarus, non p̃ſo Aſaro, ſed pro Ariſaro mendoſe. Quid enim incolume relinquit Medicorum imperitia? De Ariſaro agemus ſuo loco.

Plinius lib. 11.
capite. 13.

Aſaron hiſi floret
anno.

deſcriptio Aſari conuenit
Baccari in multis partibus.
Idem libro. 21
capite. 6.

A M. VERG. COMM.
 Aſaron. Græciſmum eſt, ſignificatq; illis idem quod ἀσάρον, id eſt, quod in ornatu non ueniat, & quo ornari nequeamus. Auctor Plinius. Ceterum obſtat quod ſequitur. Coronaria & odorata herba, Aſaron eſt. Reſpondeo. Aduerſatur. Poſſunt enim plantæ, earumq; partes, ob præcipuam eius uſus cauſam, coronariæ eſſe, & ſicemur, & nihilominus quia aliquid aliud impedit, in coronas non addi. Sunt qui ruſticam Aſaron appellent. Haud dubium, quin ob odoris ſimilitudinē, Cæteræ appellatio nes nobis incognitæ, idcirco exentendat poſt nos alijs relinquitur.

Cogor uel nolens appellare Ruellium: quoniam & ipſe, & alijs interpretes, intelligunt in Aſaro caulicu los aſperos & molles, contrario (niſi mutata ſit latinarum uocum antiqua eſtimatio inter ſe) & ob id ſimul impoſſibili habitu. Qui enim poſſet ſimul aliquid aſperum & molle eſſe? & cur poſt ſeminis hiſtoriam, qd̃ in his quæ cauleſcunt, in caulibus, plerūq; abſoluit Aſari caules, importuna, & parum congrua ſermonis ſerie in Dioſcoride deſcripſerunt? cū nec molles, ſed raras græci omnes illic habeāt, nec caules eo loco, ſed cuſa pides, acuminatq; aliqua, quæ in eo ſemine ſe proferunt, hic ſcriptor deſcripſerit. Video lapſum. Crediderunt illi, nihil aliud græcis, & huic præſertim ſcriptori, καυλός, & καυλίς ſignificare, quam in oleribus, plantiſq; alijs, ad ſtorem, & ſemen in altum ſurgentes, ueluti uirgas, cum tamē Homerus καυλὸς δέντρος ſuos dixerit, & omnia eius gentis Lexica indicent, καυλός, & eadem ratione καυλίς, præter cōmunem illam in plantis ſignificationem, in extremo baſili ferramento acuminatam ſummam partem, in quam caua deinde cuſpis ferrea inferitur, ſignificare: qua uocis non illa eſtimatio reddendus, iudicio noſtro, fuerat hic locus. Hic enim poſt totā ſeminis figuram, quam nucleis acinorum ſimilem, dicebat habere idem ſemen, oſtendit uelut in cebina ro caſtaneæ calice, acuminata quædam, nō tamen ut in illo conſerta & denſa, ſed rara, nec mollia, uerū aſpera, neque anguloſa iridem, ſed angulorum figura modo et ſpecie. καυλὸς δὲ enim ea appellat, non καυλὸς δὲ, qd̃ ab illis fuerat diligentius obſeruandum. Nō enim parū refert in p̃ctura, ſeu modo uel ſpecie. In illo ſiquidem manifeſti anguli erunt, in hoc quod angulis ſimile ſit. Videatur tamen Plinius hoc aliter indicaffe, cum ait, Aſaro ſemen acinoſum & uenoſum eſſe, nec extare in eo acuminatū quid, ſed per longitudinē uenas extendi.

A D D I T I O.

Subtiles, obliquæ, &c. Quæ ab hoc loco ſunt, uſque ad id, Aſarum excaſſatoriā habet naturam. &c. in Vergilio deſyderatur, putatq; idē, ab ſciolo quopiam fuiſſe inſerta, qui ut Plinij ætate etiam aliqui inueniebantur. Baccarem ruſticum Nardum credidit, & appellauit eadem appellatione, deceptus, quod Aſaron ruſticum, Nardus etiam dicebatur, Aſarum et Baccarem ſimul miſcuerit, diuerſis alijs ſoliorum, radicū, & in quibus utraq; naſcitur locorum notis a Dioſcoride deſcripſis.

D I O S C O R I D I S

De P H V.

C A P.

X

C H V, quod & aliqui siluestre Nardum appellat, nascitur in Pon-
to, folio Olufatri, aut Elaphobosci, caule cubitali, aut altiore, leui,
cauo, molli, in purpuram uergente, geniculis intercepto. Floribus Nar-
ciso proximis, maioribus, teneris, & in albicante purpureis. Radice su-
perius ad digiti minoris crassitudinem, ex obliquo uillosa, in nigri Vera-
tri, aut lunci odorati modum, capillamentis inuicem contextis, hauescenti-
bus, odoratis, cum quadam odoris grauitate Nardum emulantibus. Ex
calfacit. Vrinam mouet, si sicca potui detur. Decoctum eadem praestare
potest. Ad lateris etiā dolorem efficax. Menses ciet. Antidotis inseritur.
Adulteratur radice Rusci ammissa: sed maleficium deprehenditur, quā
hæc dura est, & frangenti contumax, sine ulla odoris gratia.

Lib. 12. cap. 12.
G lib. 20. ca. 21.

P H V, Creticum Nardum nonnulli uocant. Radice uillosa, imitanteq; auium pedes. In
Plinij codicibus corrupte Aliphu, pro Phu legitur.

Q V A M pro Dioscoridis Phu, ætatis nostræ Herbarij ostendunt, s. Valerianam herbam, longe mi-
nor ea est quæ ab hoc scriptore describitur. Nec omnes omnino utriusq; inuicem sibi respondere
notæ, quæ tamen præcipue a Dioscoride numerantur, conuolutæ glomeris modo, & ut Plinius ait, uillose ra-
dices, earumq; Nardi odor, & albicans in caule purpura, in nostra pariter sentiuntur. Credimusq; nos, ut in
animalibus etiam fit, quæ non eadem mole corporis, ingenijq; sui natura ubiq; existunt, in alieno orbe cæ-
li, aut terræ beneficio, Phu hanc proceriorem nasci. Quoniam & in nostra hæc habitas aliqui uisa fuerit.

D malabathron

φού
μαλαθρον
νάρισ

M Alabathrum arbitratur aliqui esse Indici Nardi foliū, falsi qua-
dam odoris cognatione. Per multa enim malabathrum olent, quem
admodum Phu, Asarum, Niris: secus autem res se habet. Namq; Mala-
bathrū foliū sui generis est, quod Indicæ gignunt paludes, Lentis palu-
stris modo innatans aquis, sine radice. Id collectum, statim lino transsu-
itur, & siccatum reconditur. Tradunt, siccatis æstiuo feruore aquis, hu-
mum aridis fruticibus uri: quod ubi non euenerit, ne amplius quidē re-
nasci. Laudatur recens, cum nigredine quadam candidās, integrum, nec
fragile, odore caput feriens, quod diu insuauis odore permaneat, & Nar-
dum sapore imitetur, nullo salis gustu. Infirum uero & minutum con-
tufum, præsertim si cariosum uirus olet, uitiosum est. Easdem Nardo for-
titur uires, sed efficacius omnia præstat. Vrinam uehementius ciet, ac sto-
macho magis pdest, Malabathri uis. Lippitudinibus, inflammationibus-
q; tritum, & in uino seruefactum, cōmode illinitur. Subditum linguæ,
oris halitum & suauitatem cōmendat. Vestium quoq; odorem interpo-
situm seruat, & ab erosione tuetur.

Lib. 12. cap. 26.
G de medica-
mentis eius Lib.
23. capite. 4.

M Alabathrum Plinius arborem Syriæ affirmat esse, folio cōuoluto, arido colere. Fertili-
us in Aegypto. Laudatius in Indiæ paludibus, sine radice fluitans. Improbant candidū. Ce-
lerime situm in neustate sentit. Odor in uino sufferuefacti antecedit alios. In precio quidem
prodigio simile est, a singulis denarijs ad tercentum peruenire libras, ut idem inquit auctor, o-
leum autē ipsum in libras. 60. Sunt codices in quibus non oleum, sed folium scribatur. Si hæc
uera sunt,

uera sunt. Malabathri gemina conditio. Alterum palustre, ut Dioscoridi uidetur. Alterum ex arbore. Nunc medici nec primum, nec secundum, sed tertium Malabathri genus nouere, appellatum a Mauritanis suis Tenbul, cuius furculi cum folio, quale Arbuti siue Lauri est, pollicares plerumque ad nos ferantur, & fructus quoque laurinæ bacchis simillimus. Omnia tria genera folij appellatione significari consueuerunt, sed priora duo maxime. Foliatum inde unguentum, quo feminas locupletes oblini Romæ solitas, Galenus auctor est. Græci Phyllon, hoc est, folium uocant. Herbae genus in saxosis montibus repertum. Nostri uulgo Folium syluestre nominant, ut suo loco differemus. Notandum, uariare Dioscoridem a Plinio, quod alter Malabathrum probari scribat, quodam salis gustu, alter nullo.

EX M. VERG. COMM.

Malabathron. Primum illud nouisse omnes uolumus, hoc ipsum ab antiquis græcis folium simpliciter fuisse dictum. Sic Plutarchus in libello cui titulus est. Quod bruta ratione utuntur, appellat, odoramentis alijs coniungens, simulque numerans Cinnamomum, Nardum, Arabicum Calamum, & folium Malabathrum. hoc, Quæ uox ex antiquo & probatoris mihi fidei græco codice, instaurata a nobis illic est, ubi legitur. Et nisi id fiat, non nasci folium, quæ in cunctis alijs decrat. Ab hac appellatione Malabathrinum unguentum foliatum Marciali, & plerisque alijs, & græcis & latinis scriptoribus dictum est, & ob odoris similitudinem idem Nardino esse creditum aliquando.

Et Niris, quæ montana Nardus, &c. Non *νῆρις*, quæ montana Nardus ab eo dicta est, uerum *ἵρις* in aliquibus legitur. Sed nos maluimus, quod ex eodem scriptore seruari poterat. Et si forte utroque loco *ἵρις* legi quondam potuerit, non adeo tamen similis odor est, ut mutanda temere ea uox fuerit.

Probatur recens & nigredine albicans. Habet plures Græcorum codices descriptas his uerbis Malabathri notas. *ἵρις, ἢ καλὸν τὸ πρόσφατον καὶ ὑπόλευκον*. probatur scilicet recens, & quod albidum, non omnino album, id enim *τὸν ὑπόλευκον* significat. Sequitur deinde. *ἢ τὸ μιλανίζον τι ἄρκευτον καὶ ὀδύνηρον*, quæ latinis uerbis reddi quidem possunt, sed parum sequaci & congruente sensu. Si enim dicas, in nigrescendo infragile, nec in partes discerptum, quis erit sensus? & quæ rei natura? Si quidem nulla in colore causa est, cur magis, minusque frangatur aliquid, & in suis partibus integrum seruetur. Accedit & illud, quod copula illa *τι*, uerbo subiecta, alterius in sermone meminerit. Incipium facit, quique in lectione Græcorum consueuerunt, facile in alijs obsequi. Quod nisi Plinius, aliique omnes, nigricantem colorem Malabathro adsignauerint, & uicium hoc loco testemur, & ut consueuimus in integrum etiam restituerimus. Unus igitur tantum inuentus mihi est codex, in quo legitur *ἢ τὸ μιλανίζον τι ἄρκευτον καὶ ὀδύνηρον*, quorum uerborum sit sensus. Et in mollescendo infragile, & in suis partibus integrum, ut nihil de colore illic agatur, sed de tenaci lentore: doceatque Dioscorides, probari Malabathrum id, quod recens & albidum sit, quodque cum mollescit lentore admittit, tenaces uires tunc acquirit, fiatque infragile, & in suis partibus integrum seruetur. Quod in multis humor natius, & accedens facit, fiunt enim eo firmiora, & ualidiora. Quemadmodum contra arefcentia franguntur.

Prodest oculorum inflammationibus. Sunt exemplaria græca in quibus legitur, *καὶ πρὸς τὰ ὀφθαλμοὺς καὶ πρὸς τὰς φλέγμονας ὑρμώει*. & ad oculorum præterea lippitudines & inflammationes accommodatum est: ut duo intelligantur mala. Sunt itidem in quibus, *καὶ πρὸς τὰς ὀφθαλμοὺς καὶ φλέγμονας*, id est, ad oculorum inflammationes, ut unum tantum mali genus intelligatur. Nos posteriorē hanc lectionem, monente Plinio, magis probauimus, qui de unguento Malabathrino legit epiphoris, id est, inflammationibus uino expressum, utilissime imponitur.

DE CASIA CAP. XII.

Casia, cuius complura sunt genera, iuxta odoriferam Arabiam cognitur, crassi corticis sarmento, folijs Piperis. Eligenda est fuluescens, pulchri coloris, Coralij æmula, perque angusta, longa, crassa, & fistulosa, gustu mordens, & cum aliquanto feruore astringens, aromatica, uisnoso odore: cuiusmodi est quæ ab incolis Achy appellatur, ab Alexandria negociatoribus, Daphnitis. Huic præfertur crassa, purpurea, & nigricans, Zigir cognomine: quæ Rosam odore imitatur, præcipui in me-

A

φύλλον

B

κασι

αχ

διαφύτι

γίγ

b

D I O S C O R I D I S

C dicina usus. Secundum locum tenet antedicta. Tertia, cui Muscletico blasto cognomē est. Reliquæ uiles, & quæ Aphemū dicitur, nigra, insuauis, cortice tenui, ac rimoso: & quæ Darcā & Citton uocāt barbaro nomine.

Ελάστερ μουσλήτιο
Δάρκα καὶ κίττω

Theoph. li. 9.
capite. 4. 5.

Plin. lib. 12.
capite. 20.
Item lib. 122
capite. 19.

B A R B A R I C O R O L L.

Cassiam Theophrastus fruticem magnitudine Salicis Amerinæ prodidit, sed multis surculisq; brachiatam ramis. Crassiore q; Cinnamomum sarmento, præterea nervosissimā, & solo cortice commendabilem, qui ei cutis tenuitate obducitur. Neq; aliter detrahitur, q; si præsumtas corio bubulo uirgulas bicubitas, enati uermes eroserint, cortice tuto, intactoq; propter amaritudinē, odorisq; acrimoniam futuro. Hæc iuxta Cinnamomi cāpos in Ethiopia, Trogodytis permixta connubio, sed in mōtibus nascitur. Dissentit a Dioscoride Plinius, Theophrastū (ut arbitror) secutus, q; Dioscorides crassum eius corticē esse scribat. Illi cutē uerius, q; cortice uestiri tradant, quem conteri, atq; in Cinnamomo leuari exinaniriq; precium sit. Amplitudo fruticis cubitorum trium, ut idem Plinius existimat. Color triplex. Cum primum emicat, cādī dus pedali mēsurā. Deinde rubescit, additō sesquipede. Ultra nigricans: quæ pars inquit maxī melaudatur, ac deinde proxima. Damnatur uero candida. Eligendam recentem maxime, & quæ sit odoris mollissimī, breui tunicarum fistula, & non fragili, quæq; plurima, minimū ponderis faciat. Cæteræ notæ congruunt. Lactam uocant talem, barbaro uocabulo. Alia est Balsamodes, ab odore dicta, sed amara, ideoq; utilior medicis. Hanc esse, quam Dioscorides Zegir, et Galenus Gizer, Aetius Ozem uocarūt. Haud multum absum quin credam. Nominat & Mottoden Galenus speciem Cassiæ uiribus proximam, appellatā Gizer. Nigra unguentis expetebatur. Precia nullis tam diuersa. Optimæ in libras. xl. cæteris, xv. His addidere Mango nes, quam Daphnoidem uocant, Isocinnamon cognominatam, preciumq; eius faciūt, ccc. Ad ulteratur Syrace, & propter similitudinē cortice Lauri surculis tenuissimis. Forteq; Daphnoides eadē sit Cassia, quam Daphnitā a mercatoribus uocari scribit Dioscorides. Fabulæ sunt, Cassiam, Cinnamomumq; nidis auium decuti plumbatis sagittis, aut circa paludes quasdā col ligi, propugnante diro serpentium genere, ut Theophrastus ait, uespertilionumq; ut alij. Sci endum, q; ubi nos in Dioscoride conuertimus, quandam haberi Cassiam redolentem hyrcinū uirus, Mauritanī odorē Porri transfulerunt, pralīzūsam, nō tragisūsam legētes. Vtra lectio sit uerior, experti iudicent. Nō conuehitur modo Cassia, præter q; rarissima inter Xylōcinnamo mi fasciculos quandoq; inuenta, nigriciæ argumēto. Cassiam latini correpta priore syllaba pronunciāt, etiam si apud Græcos fere omnes geminata cōsonante scribitur. Vergilius. Nec Ca sia liquidi corrumpitur usus oliui.

E X M. V E G R. C O M M.

D Ab incolis quæ talis est Lada. In cunctis fere legitur. Ab incolis quæ talis est Achy. Et in aliquibus non ἄχυν, uerum ἄλν legitur, quæ uox quoniam in aliquas literas eius, quam Plinius Ladam uocari dicit, incurrit, Lada a nobis restituta est, nulla tamen certa ratione. tam enim nobis ἄχυν nunc barbara uox, quam Plinio tunc erat, & nobis modo Lada est.

Tertia est, quæ rubus Mosylyticus appellatur. Cum in cunctis fere legeretur Ελάστερ. cōmuni omni germinum appellatione ex melioribus græcis Ελάτον, idest, rubum reddidimus. Neq; (ut credimus) ab re, in fruticoso enim genere Cassia censetur, in quo & rubi numerantur, uerisimileq; est, contractiore hac rubi uoce, magis q; ampliore illa & cōmuniore germinis Cassiæ signari solitam, præsertim a regione: non aliter q; Lygusticum, Piper agreste, multa; alia in plantarum genere appellamus.

Mosylyticus. A promontorio & emporio Ethiopiæ Mosylo, unde afferebatur, dictus est.

Vt quæ Aphysemon uocatur nigra. &c. ἀφύμων in multis legitur, ἀφυσίμων in melioribus inuenitur: poniturq; ob eam appellari caussam, quod tenui & disrupto eius cortice tibiariū & fistularum more inflari non poterat, id enim φυσῆν Græci dicunt, & φυσήτρια ἀνδρῶν, idest, tibi as uocant, & hic φυσήτρια, follium, fistulam, de Cinerula, & bulla in metallicis agens, appellat.

In odorifera Arabia. Ea est, quæ inter Persicū, & Arabicū mare a geographis describitur.

Habet crassi corticis Cassia omnis sarmentum. In græcis est, πάχυν παχύφλοιον, quod significat uirgam, qualem. s. in uitibus, multisq; alijs uidemus. Eam crassi corticis dicit Dioscorides. pro crassitudine, s. totius materiæ, in qua crassissimus sit cortex, exigua interior medulla. In ali quibus hoc loco legitur, ὡσπερ ἰνὸν, uoces duæ, nihil, nisi emenduntur significantes: credimusq; ex Theophrasto restitui posse ὡσπερ ἔχυν, ueluti uiticis.

Et Piperis folio est. Legitur in aliquibus ὡσπερ ἰριωρ, in aliquibus, ὡσπερ ἰριωρ, Potiorem illā

Iectionem sequutus est Mauritanus Serapiō. Nobis in tam multa in plantarum folijs naturæ uarietate, difficilis coniectura & ratio fuit: et licet utraq; lectione dici plura potuissent, tutius tñ uisum est, ex cognatiōe locorū, uicinitateq; Piperi folio similē potius facere: credimusq; omnē hanc uarietatem ab imperitia librariorum & incognitæ rei dubitatione irrepisse.

Daphnitim. Si Plinio credimus, a Lauro facta appellatione, quoniam scilicet ob similitudinem Lauri cortice adulteratur, & a Mangonibus Daphnoides dicitur. In quo certe dissidet a Dioscoride. Verū id alijs excutiāt. Aut certe sic dicta Daphnoides, a portu Arabiæ, cuius meminit Strabo, lib. 16. qui thus, myrrham, & alia odora menta fert.

Odore Porraceo. Mutauimus & hoc, quod in quibusdam habetur *τραγίσσαν*. Nā in melioribus, porraciore odore habetur. Et Mauritanus Serapion quoq; sic legit.

De Pseudocasia CAP. XIII.

Similior huic est Pseudocasia, q̄ ut explicari possit, quæ gustu coarguitur, cum nec acris, nec odorata sit, hæretemq; medullæ corticem habeat. Inuenitur etiā lata quædam fistula, mollis, leuis, plena, ab alia distans. Damnatur candicans, scabra, hircinū uirus redolens, & quæ tenui fistula & scabra cute sit. Vim obtinet calfaciendī, urinam ciendī, siccandī, & leniter astringendī. Conuenit ad medicamenta oculorum, et malagmata, quæ præstandæ claritatis gratia concinnantur. Lentigines tollit, cum melle illita. Menses trahit. Cōtra uiperarum ictus pota auxiliatur. Aduersus intestinas, inflammationes omnes, et renū uitia, pota proficit. Fœminis in solia desidentibus, aut suffimētis, prodest ad dilationem uulvæ. Ea duplo pondere medicamenti mixta, Cinnamomi uicem supplet. Nā eosdem effectus præbet. Ad plurima perq; utilis.

HABARBARI COROLL.

Habetur & Cassia odoratæ genus herbæ, ut in Thymelæa, siue potius Chamelea demonstrabimus. Aliud etiamnū genus est, quā ætas nostra Cassiam appellat, & cognomento fistulæ. Ab aromatica, ligneæue discriminat, ueteribus ignotā, p̄inde ut fere nobis mō lignea, aliqñ in nostro quōdā orbe feri cœpta, extremiq; imp̄ij Rom. margine, qua Renus alluit. Viuere in aluearijs apum solita. Etiā si color aberat ille torridus sole, atq; ob id simul idē odor. Ceterū scire oportet, si qñ Cassiā syringa, hoc ē, fistulā, in antiq; autorib. legere cōtigerit, nō p̄ ea capiendā esse, quæ nūc Cassiā fistula dicatur, colore rubro nigrās, laminis intus carnosīs, quas parietinq; discludunt, seminibus siliquæ Ceratiæ, ad deñciendā bilē usq; mire ualēs, sed p̄ lignea, siue aromatica, cuius una quoq; species ab ipso Dioscoride platea Syrinx, idest, lata fistula nuncupari cernitur. Cassius certe Felir, si mō liber eius est, qui circūfertur, appellationē Fistulæ, simpliciter Cassiā odoratā, siue aromaticā intelligit. Inuenio tñ apud græcos autorē, q Paulū, et Oribasiū ita loquentes induxerit. Cassia Syrinx aduersus flauā bilē pdest: & itē eos, q p̄ter naturā pallescunt: itē anginas, & laterū dolores, & peripneumonicos. Hæc Paulus. At Oribasius. Refrigerrari ea inquit iecinoris calores intempatos. Hæc recētiōres græci calidā, & humetā abscessū primo phibent. Idē fere Mauritani. De Cassia qua bilis per aluū detrahitur, & p̄pterea Cathartice dici potest. Nam aromatica, siue lignea excalfacit, atq; siccāt abscessū fere tertio. Porro Cassia Cathartice partim in India, partim in Aegypto nascitur, folio Iuglādis. Alexandriæ sibi uisam Pōticus Facinus retulit, dū ista pderē. Siliquas habet plōgas, ac teretes, utrinq; fastigatas, duo fere pedes p̄ceras, carne intus nigra, gustu p̄dulci, sed plane medicato, ligneis distinguētibus mēbranis, & ossibus siliquarū intercurfantib. ut p̄dixi. Eligūt ponderosā, collucentē, plenā, & quā si cōcusseris, inclusā intus ligna nō scētias. Negociatores in hortis Alexandriæ nascentē p̄ferūt. Iam & Asiæ cōmunis facta dicitur. Seritur & apud nos, uerū frustra. q̄a nec ad frugē puenit, & celeriter opprimitur. Quid sit Myrrha Cassia Hippocrati, cuius semē laudat uolumie, sēminarū morbis dicato. *σμύρνος τὸν καρπὸν*, haud scio reddere. Nisi quis p̄ Smyrri herba cepit, cuius cibo menstrua fœminarum iuari constat. Strabo Cassiam odoratam e stagnis colligi, non solum ex arboribus in Arabia felice, quosdam in India, maiorem eius partem existimasse prodit.

D I O S C O R I D I S

E X M. V E R G. C O M M.

C Vam hodie nostræ ætatis medici ligneam appellant unguentarij, vitæque delicis magis quæ medicis quondam quælitus frutex, ideoque ab omnibus Poetis passim celebratus, diuersus omnino ab ea arbore, quæ eadem nunc Cassiæ appellatio, filiquas potius quam fistulas fert Cylindraceas, longitudine fere cubitales, lignosas, colore nigro, & quasi ex sole igniue torridas, intra quas lignosi itidem per interualla orbiculi sunt, & inter orbiculos semina concreta, ceu pulve nigra inuoluta: cuius tanta in mollienda aluo usus est, tam multus, tamque quotidianus, ut sine ea uix possit nostrorum temporum medicina stare. Quo magis ueterum negligentia, aut fortuna demerari licet, qui aut eam ignorauerint, aut uti noluerint. Neque enim hactenus de ea quicquam, aut in hoc, aut in cæteris inuentum a nobis est, quod merito miremur, & uix credibile uideatur.

Ei quoque parum recte fistulæ nomen, et ex eo diuersitatis nota adiecta est. Siliquæ enim magis, quam fistulæ nomen illi congruit, propterea, quod undique clausa, aliarum filiquarum in leguminibus modo semina sua intra se elaudit, medica hæc Cassia, et ad maturitatem perducit.

Cauendum igitur, ne in antiqua medicina, uidelicet, quæ supra Galeni ætatem tractata est, fistulam Cassiam inuenientes, medicam hanc nostræ ætatis credamus, eandemque credentes, graui periculo ea utamur. Ligneam enim illi semper intelligunt, quæ medicis & posteriori huic nomen & appellationem suam ex similitudine largiri potuit.

D E C I N N A M O M O C A P. XIII.

κινναμόμον

κινναμόνον

κινναμόνιον

Cinnamomi genera plura patrium sibi nomen uendicantia. Præfertur tamen Mosyllum, quod Cassiæ, cui Mosolyti nomen est, aliquam referat effigiem. Sed in eo genere, recens, nigrum, ex uinoso in cinereum uergens, leue, tenuibus ramulis, ac frequentibus nodis cinctum, perque iucunde olens. Optimi fere tempamenum odoris proprietate constat. Inuenitur enim in optimo, quodque seorsum nascitur, odor Cardomomo proximus. Insuper, acre et mordens, & cum calfactione quadam tenus falsum, quod non cito confricanti hirsutum, aut friati lanuginosum, leuibus tamen internodijs apertum. Si certior fieri uoles, uellito ab radice furculum. Facilis est homini probatio. Namque fragmenta, adiecticia quedam sunt. Quæ aut potētius spirant, suo halitu cum nares consuluntur, olfactum explentia, deterioris dignotione impediunt. Est etiam Mositanum, crassum, pumile, fuluescens admodum. Tertium a Mosylo, perque suauiter olet, nigrum, fruticosum, paucis intercedentibus geniculis. Quartum, fungosum, cædicum, aspectu tuberosum, uile, ac friabile, magnam habens radicem, Cassiam plane representantem. Quintum genus, gustu amarum, et cortice fuluæ Cassiæ simile, tangenti firmum, minus neruosum, densa radice firmatum. Iis quæ Thuris, Cassiæ, aut Amomi odorem spirant, minus suauitatis inest. Deligito scabrum, rugosum, leue, lignosum. Radicem autem ut inutilem reijcito.

D mo, quodque seorsum nascitur, odor Cardomomo proximus. Insuper, acre et mordens, & cum calfactione quadam tenus falsum, quod non cito confricanti hirsutum, aut friati lanuginosum, leuibus tamen internodijs apertum. Si certior fieri uoles, uellito ab radice furculum. Facilis est homini probatio. Namque fragmenta, adiecticia quedam sunt. Quæ aut potētius spirant, suo halitu cum nares consuluntur, olfactum explentia, deterioris dignotione impediunt. Est etiam Mositanum, crassum, pumile, fuluescens admodum. Tertium a Mosylo, perque suauiter olet, nigrum, fruticosum, paucis intercedentibus geniculis. Quartum, fungosum, cædicum, aspectu tuberosum, uile, ac friabile, magnam habens radicem, Cassiam plane representantem. Quintum genus, gustu amarum, et cortice fuluæ Cassiæ simile, tangenti firmum, minus neruosum, densa radice firmatum. Iis quæ Thuris, Cassiæ, aut Amomi odorem spirant, minus suauitatis inest. Deligito scabrum, rugosum, leue, lignosum. Radicem autem ut inutilem reijcito.

B A R B A R I C O R O L L.

Cinnamomum in partes quinque concidunt. Præcipua bonitas tenuissimis ad longitudinem palmi, pauloue amplioribus. Secunda proximi breuiore mensura. Vilissimæ, quæ radicem antecedunt, quoniam ibi minimum corticis, in quo summa gratia. Quæ de causa præferuntur cacumina, ubi plurimus cortex. Ipse frutex duorum cubitorum altitudine amplissimus, palmitumque minimus. Quatuor digitorum crassitudinis. Statim a terra sex digitis furculosus, arido si milis. Cum uiuet, non odoratus. Folio Origani, siccitate gaudens. Sterilior imbre, ceu contraria cæteris natura. Gignitur quidem in planis, sed densissimis in uepribus, rubisque. Difficilis collectu. Verior sententia est, nasci in Aethiopia, Troglodytis conubio permixta; Non ut Herodorus, quo sibi Liber pater educatus esset, ex inuicis rupibus, aut quicquid nidis peti, & priuatum Phœnicis. Neque, ut alij, in Arabia. Igitur mercatores illi a coterminis uehunt per maria uastis ratibus sine gubernaculo, sine remis ac uelis, sed hyberno per brumam, curis tamen maxime flantibus. Primus his portus Gebenitarum Ocila, siue Acila ut Strabo, Ptolomeus Ocelis, Produ-

Plin. libro. 12.
capite. 19.
Theophrast.
lib. 9. cap. 45.

tur uix quinto anno reuerſi mercatores, & interire multos. Contra reuehunt uireæ; & æneæ; uestes, fibulas, cum armillis, ac monilibus.

EX M. VERG. COMM.

Mosylicum. Ita legit & Plinius lib. 6. capite. 29.

Quod colore nigro, & cum uino diluitur Cinereo. Duplex in græcis eius partis lectio est. *τερπιδιον*. i. in τδ δινω. quod si uerbum uerbo reddatur, in uino cinereſcens ſignificat. Sunt itidē in quibus una adiecta ſyllaba tm̄, alius indicetur ſenſus. *τερπιδιον* in τδ δινωδελι. i. in uinoſo colore cine reſcens, quali mixtum deſcribens colorē, & ex eo uarium Cīnamomū, in quo Cinereus, & ex uino rubens color eſſet, pariterq; ac nigrū probaretur. Quam lectionē ſecutus eſt Mauritanus Serapion, priorem uero illam antiqua Dioſcoridis tralatio. Cur aut in alteram partem magis inclinauerit animus, ea ratio eſt tota ex ſermonis ſerie. Numerat hic probatoris Moſylicū plu- res notas, laudatq; recens & colore nigrum, cūq; de colore eatinus egiſſet, nulla interiecta co- pula, aut diuiſiōis nota alia, ſubijcit ſtatim *τερπιδιον* in τδ δινω. &c. id eſt, ut nos reddidimus, & cū uino diluitur cinereo, ut non ad uarium in eo colorem pertineat, ſed ad mutatum, cum uino maduerit, qualia multa uidētur quodidie oleo, aceto, humoribusq; alijs cōſperſa, ex alio in ali- um mutari colorem. Nam ſi uoluſſet uarium, & ex uini cinerisq; colore mixtum Cīnamomū pariter ac nigrum laudare, copula, diuiſionisq; alia nota aliqua alterum ab altero ſecerni oport- rebat. Cetera in commentario latiſſime.

Rutæ, Cardamomoue ſimilis odor. Fuiſſe aliqñ huius loci eam lectionem in latinis teſtatur Serapion, in græcis uero probatiſſime mihi fidei antiquiſſimus codex, in quo manifeſte nulla mutationis alicuius ſuſpitione adhuc ſeruatur & legitur, ἡ δὲ μὴ πικρὰ ἴσα καὶ καρδαμώμου ἴμμερος. quaſi latine dicas, rutēſcens, aut Cardamomo equalis odoris. Suſpecta mihi præterea eodē lo- co Cardamomi uox eſt. Si quidē inoleuit toro hoc opere multis locis idem, frequēſq; uicium, in quo ſepius uel uocum uicinitate decepti, parum diligētes græcorum librarij, uel ob uirium ſimilitudinem aliquam, equalia rati ueteres eiſdem gr̄cis medici, Cardamon, quod ſignificat Naſturtium, pro Cardamomo: inuicemq; pro Cardamo, id eſt, Naſturtio, Cardamomū ſcri- pſerint. Auxit ſuſpicionem, q̄ in antiqua tralatione Naſturtij, nō Cardamomi: præterea q̄ Cardamomū odorem tener, Cinnamomum autem ſuauiſ odoris laudatur.

DE PSEUDOCINNAMOMO. CAP. XV.

Eſt etiānum genus aliud, cui Pſeudocinamo cognomen eſt. Inuali- di odoris, ſolutariūq; uirium. Vocatur etiā Zingiber, cū tm̄ ſit Xi- locinamomū, præbens quandā Cīnamomi faciē. Eſt aut lignoſū Cīna- momum, ſarmenta longa robuſtaq; ferens, odore longe Cīnamomo in- feriore. Sunt qui Xylocinnamomū, a Cīnamomo diſſerre dicant, q̄ a na- tura eius abhorreat. Cīnamomum omne excalfacit, emollit, et cōcoquit. Vrinā ciet. Tam menſes q̄ partus potū, aut ex Myrrha impoſitū pellit. Contra beſtias quæ uirus eiaculantur, uenenaq; cōuenit. Caliginē, pupil- lis oculorū obuēſantē, diſcutit. Craſſiciem extenuat. Lentigines, & uitia cutis in facie ex melle illitū detergit. Contra tuſſes, deſluxiones, aquā ſub- tercutē fuſā, renū uitia, & urinæ difficultatē efficax eſt. Vnguentis precio- ſis inferi ſolet: & in ſumma, magni ad omnia uſus. Tritum uino excipitur, umbrāq; ſiccātū, quo diutius eduret, reconditur. Eſt & quoddam Cīna- momum, quod aliqui Pſeudocinnamomon appellant, perq̄ denſo atque craſſo ſarmento, longe tamē inualidius Cinnamomo et odore et gultu.

BARBARI COROLL.

Ipfum lignum in ſaſtidio eſt, propter Origani acrimoniā. Xylocinamomum uocatur. Preciū in libras. 20. Quidam Cinnami (nam & Cīnamū dicitur) duo genera tradidere, candidius, ni- gricanſq;. Et qñdam præferebatur candidū. Nunc contra, nigrum cōmēdatius, autore Plinio, atq; etiā uariū præferunt candido. Certiſſimo argumento, ſi ſit ſcabrum, atq; ut inuicem tri- tū cōtumaciter frietur et inhorreſcat. Im, pbatur molle imprimis, aut cui albicat cortex. Ius eius

ψευδοκιννα-
μόμον
(zingib.)

B

Ca Gebaſitarū Rege ſolo ꝑficiſcitur. Is ediſto mercatu uēdit. Precia q̄ndā fuere in libras denario-
rum mille. Auſtum id parte dimidia eſt, incēſis (ut ferunt) ſyluis ira barbarōrum: aut etiam for-
te fortuna, quoniam auſtri tam ardētes ibi afflare ſolent, ut æſtatibus ſyluas accendāt. Coronæ
ueteribus fiebant ex Cinnamomo interraſili auro incluſe. Radicem eius magni ponderis aureę
pateræ impoſitam uidiſſe, Plinius meminit, ex qua guttæ editę, annis omnibus in grana dura-
bantur. Pſeudocinnamomum, Galenus Cinnamomidem quoq; appellari ſcribit.

DE AMOMO. CAP. XVI.

AMomū exigue fruticat, ex ligno ſe cōuoluēs in uuæ modū, flore
ceu cādide Violæ, paruo. Folijſ Vitis albę ſimilib. Laudatur q̄
q̄ maxime Armeniacum, fuluo auri colore, ligno ſubruffo, ualde odo-
rato. Medicū, qm̄ in cāpeſtrib. et aquoſis enaſcitur, infirmius eſſe cōſtat.
Eſt aut magnū, ſubuiride, tactu molli, frutice uenoſo, odore Origanī. Pō-
ticū uero ſubruffū, parū, fragile, racemoſū, fructu turgēs, et odore nares
feriēs. Deligito recēs, cādidi, uel ſubrubrū. qd' nec aſtrictū cohēreat, nec
cōuoluatur, ſed ſolutū diffūdatur, ſeminis plenū, uuis paruiſ ſimile, gra-
ue, odoratū, mō cariē nō cōtraxerit, acre, guſtu mordēs, ſimplici colore,
nō euariāte. Vim habet calfaciēdi, aſtringēdi, exiccādi. Somnū allicit, et
illiū frōti, doloris ſenſū aufert. Inflammatiōes & meliceridas cōcoq̄, discu-
titq;. Iuuat q̄s ſcorpīus ꝑcuſſit, ex Ocymo illitū. Et podagricis confert. In-
flammationes oculorū uiſcerūq; lenit ex uua paſſa. Ad uuluarū uitia in peſ-
ſis, aut inſeſſionib, utile ē. Decoſtū iocineri, renibus, podagre potu cōue-
nit. Antidotis imiſceatur, & ꝑcioſiſſimis unguētis. Adulteratur herba A-
momo ſimili, quæ Amomīs uocatur, ſed ſine odore, ſine fructu. Naſcitur
in Armenia, flore Origanī. Quare in huiuſcemodi ꝑbationibus, fragmē-
ta fugiēda ſūt. Eligenda aut quæ ab una radice integros ſurculos emittūt.

BARB.
Plin. libro. 12.
cap. 17.
Theophrast.
lib. 9. cap. 7.

AMomum quidā ex Indā, aliq̄ ex Mediā importari narrāt. E uite Indica, quę ſit labruſca, ex
iſtimatur naſci, frutice uenoſo, palmi altitudine. Carpitur cū radice. Manipulatiui leniter
componitur. Protinus fragile laudatur. Punici mali folijſ ſimile, nec rugoſis, colore ruſſo. Se-
cunda bonitas pallido. Herbaceum peius. Peſſimumq; candidum: quod & uetustate uenit.
Precium uuæ in libras ſicli. 70. friato uero Amomo. 4s. Naſcitur & in Armeniæ parte, quę uo-
catur Ocene. Adulteratur mali granati folijſ, & gumī ligdo, ut cohareſcat uuę modo, conuo-
luatq; ſeſe. Eſt & quę uocatur Amomīs minus uenoſa, atq; durior, ac minus odorata, quo ap-
paret aut aliud eſſe, aut colligi imaturū. Nec mirādū, ſiquādo Pliniū a Dioſcoride noſtro diſ-
ſonat. qm̄ ſicut ꝑcia rerū, ita & notę, & experimēta quoq; uariātur. Neq; ulla medicīne pars in-
certior, q̄ quę ab alio orbe q̄ noſtro petitur, id qd' & ratio ꝑſuadet. Amomum q̄le nūc officiū
ꝑſerunt fabuloſa ſpecie, nec odoris argumēto, nec alia rōne cōgruit cū eo qd' hic deſcribitur.
Origanī odore ſentitur. In pluribus Origanī, in melioribus aut Rutæ legitur, Rutæq; anti-
quam leſionē fuiſſe ex iunioribus indicat Serapion: licet & de Origano in eo aliquid le-
gatur. Nos in parum diuerſo odoris duarū plantarum ſenſu, cōmunem in græcis leſionē, &
antiquam Dioſcoridis interpretationem ſecuti, Origanī odore ſentiri diximus.

VERG.

PRecellit Arabicus, cādidiſ, leuiſ, eximīa odoris ſuauiſſe. Secūdū
locū ſibi uēdicat Indicus, leuiſ, plenius, ut ferula niger. Tertius eſt
Syriacus, grauiſ, colore buxeus, et odoe feriēs. Optimiſ ē recens,
albus, abūdē plenius, dēſus, a terebinib. nō eroſus, ſine graueolētia, guſtu
calidus ac mordēs. Viſ ei excalfactoria. Urinā ciet. Menſes pellit. Vitijs
quę uuluā male hñt, tā impoſitu, q̄ fotu auxiliatur. Cōtra uiparū morſus

DE COSTO. CAP. XVII.

sextatē bibere pdest. Itē aduersus pectoris dolores, cōuulsa, inflatiōesq; **A**
ex uiuo & Absynthio. Venerē ex mulso stimulat. Latas uētris tīneas ex
aqua pellit. Rigētibus, ex oleo, ante febrīū significatiōes, & neruorū reso-
lutiōib. oblinitur. Vitia cutis i facie, cū aqua, uel melle illitus emēdat. Ad-
ditur in antidota & malagmata. Sūt q amīstis Helenij Comageni p̄edu-
ris radicibus, adulterēt. Qd̄ deprehēsu facile est. Siquidē neq; gustu fer-
uet Heleniū, neq; ualidum odorem uibrat, ut caput tentare possit.

Costus, & Costū dicitur, & per diminutiōē a Strabone, Costariū. Huius radix in precio.
Fructus inutilis. Plinius Indicum dumtaxat uidetur nouisse Costū. Primo statim introi-
tu amnis Indi, in Patale insula compertum. Duo eius genera faciens; nigrum, & quod melius
eo iudicat, candidum. Preciū, 16, in libras singulas.

Ex aqua et melle. Quē in grēcis est, cōiunctio i, nos mutauimus in *χρῶς*, uertimusq; ex aqua
& melle, nō ut aliq, uel p̄pterea, q̄ Mel molliēdi & exterēdi uim per se etiam habet: sic in
uctuissimis etiā legitur, & ratio etiā nō repugnati. Asperā, & discolorē ceu a sole cutē. Id
enim sic, græca habent, *ἰσχυρὰ*, *ἰσχυρὸν* em̄ illi solem, coniunctaque prepositione, *ἐκ* *ἰσχυρῶς*, quasi
in aduerbio sub sole sit, & ephilidas, multo sole adustas, namq; origo & causa a sole fuit.

De ODORATO IUNCŌ. CAP. XVIII.

Odoratus Iuncus, in Africa & Arabia nascitur. Laudatissimus ex
Nabatheis. Proximus Arabicus, quem aliqui Babyloñiū cogno-
mināt, Alij Teuchitin. Pessimus ex Africa. Eligendus est rufus, recens,
floribus refertus, tenuis, rubentibus fragmentis, qui manibus confrican-
do Rosæ odorem emittit. Ignē mordacitatis ad linguā. Floris, & arundi-
num, radicisq; est usus. Vim urīnē ciundæ habet. Menses pellit. Discutit
inflationes. Caput aggrauat. Modice astringit, cōminuit, excoquit, ac ue-
narum spiracula laxat. Vrinā mouet. Flos eius in potu utilis sanguinē re-
ijcientibus, doloribus stomachi, pulmonis, iocineris, & renum. Miscetur
antidotis. Radix astringentior est: ideo fastidijs stomachi, hydropicis, cō-
uulsis, cum parī pondere Piperis, per dies aliquot datur. Decoctum uul-
uæ inflammationibus, ad desidentium foras, utile est.

Iuncū odoratū Schoenon græci uocāt, & Hippocrates Schoenō myrep̄sicō, & Schoenō He-
idyosmō: & florē eius Schoenū anthos. Cornelius Celsus Iuncū rotūdū, ut ab angulari diffe-
rat, Cypero a grēcis appellato. Rotūdū & in Cāpania inueniri tradit, utiq; minus pollentē. In
Arabia sane cū Calamo odorato nascit, cōualle quā dicemus, nihil aspectu differens a ceteris.
Prouenit & in Syria, Cœle cognominata. Iuncū rotūdū uinosæ mordacitatis ad gustū sentiri
perhibēt. Preciū in libras, denarij qnq;. Noscendū uero Babyloñiū, & Teuchitin a Dioscoride
pro eodē genere intelligi: nō sic a ceteris, q̄ppe qui Teuchitin, eundēq; nobilissimū, qui e Naba-
thea sit, appellēt. Proximū Babyloñiū. Pessimū ex Africā, ac sine odore. Dicit̄ et Lēiscus ar-
bor siue frutex, a grēcis Schinos, nō Schoenos, ut quidam e p̄tioribus falso interpretati sunt.
Vulgaris porro lūcus quo ad utilitū nexus utimur, itē rotūdus, & odoratus, nō Schinos, sed
Schoenos, unde, funes appellati. Recētiōres lūcum odoratū cū funario palustriq; cōfundunt.
Græci quanquā & palustre & odoratū Schoenō uocāt. Quoties tamē de odorato intelligi uo-
lunt, Schoenū, i. Iuncū, absolute nomināt. Alterū uero genus Helis, hoc est, Palustris, adiectio
ne discrimināt. Dicitur & Schoenos mensura quædā sicut astarus, & parasanga barbarorū.

Schoenon, Græci cōmuni aliorum Iuncorum uoce *χόλον*, diphthongo, ut a Lentisco arbo-
re differat, quam *χίον* idem appellant. Priuatim tamen in hoc tantū genere, seruata hæc uox
ab illis est. Nam ceteros Iuncos additis communi omniū nomini notis aliquibus, Oxychoe-
non, & Oloschoenon dixerunt. Præterea cum ceteros masculino genere plerumque dixē-
rint, hanc fœminino dixerunt. Nos, quia non licebat discriminē hoc uti, docentibus Plinio &
Celfo, in Iuncorū genere eum constituimus. Deinde, quoniam non satis id erat, sed oportebat

BARB.

VERG.

χίον

τευχίτιον

B

BARB.

Plin. libro 12.
capite. 18.
Theoph. li. 9.
cap. 13. de na-
tura Iuncorū,
& li. 9. cap. 7.

VERG.

D I O S C O R I D I S

C ab alijs ratione aliqua secerni, eodem Celso autore rotundum diximus. Neque explentibus his etiam rem totam, odoratum adiecimus. Locus in eo autore est libro. 3. cap. 21. suntque eius hæc uerba. Iunci quadrati & rotundi semine. Illud Cyperum, hoc Schoenon græci dicunt. Pauloq; post. Quæ quoties posuero, non quæ hic nascitur, sed quæ inter aromata afferuntur significabo. Ex quibus ratiocinari facile est, quia Schoenos a græcis uocetur Iuncus, quia tereui forma sit rotundū, quia inter odorata numeretur, odoratū dici oportere.

Capitis grauedines tamen facit. Variat hic antiquiores græci libri. Nam in aliquibus καρι-
καριον, in aliquibus καρωτικον legitur, neq; sensu in scriptore hoc, neq; eodē in homine periculo. Siquidē prior illa uox, caput aggrauās, simpliciter significat, quod multa possunt, & inter cæ-
tera ebrietas; altera nō dissimile lethargo somnum indicat. Inexpugnabilis enim somni plura genera sunt: inter ea & κάρωσ est, a lethargo tātum differens, quod in lethargo sequitur, in Caro somnus præcedit. Hunc Plinius semper soporem reddidit. Quæ autem uerior sit, & ex re ma-
gis lectio, nō satis pro cōperto nobis est.

Frangit præterea, maturat & aperit, μαλακτικον, quod mollire est, in pluribus legitur. Credi-
musq; adiectā forte eam uocē, quoniam maturet hic Iuncus. Quod etiam θρυπτικον passiuē legi-
tur, i. frangere. Sunt in quibus legatur θρεπτικον, i. uutrire. Sed parum nobis id probatur, ideoq;

Cum pari Piperis pondere. Videtur pōderis huius mensura hic de- (nihil mutauimus,
esse, nisi forte æstimandam medicis eam reliquit.

Decoctio eius præterea insidētibus. Antiquiores aliqui græci habebāt ἀπὸ σίμα, quod deco-
ctum, alqui ἀπὸ σίμα, quod dilutū autore Plinio significat. Est autem dilutum, aqua. humor
ue aliquis, in quo maduerit quippiā. Nos quoniam maiore ui decoctum, q̄ dilutū est. illud
seruauimus quod communius erat.

De CALAMO ODORATO. CAP. XIX.
Calamus odoratus in India nascitur. Melior est fuluus dense, geni-
culatus, & qui assulose frangitur, plena arancorū fistula, albicās,
lentus in mandendo, & astringens, ac cum aliquanta acrimonia amarus.

D Vrinam potu ciēt. quare cum Graminis, aut Apij semine coctus, in aque
subter cutem fusæ morbo, renū uitijis, stillicidio urinæ, ruptisq; cōmode
bibitur. Menses & potu & appositu pellit. Tussi suffitu medetur per se,
aut ex resina Terebinthina, hausto per arundinem fumo. Ad muliebres
infectus decoquitur. Et clysteribus imponitur. Suffitionibus, malagma-
tisq; odoris gratia, commiscetur.

B A R B A R I C O R O L L.
Calamus aromaticus, siue ut Hippocrates Myrepicos, id est, unguentarius & odoratus,
in Arabia nascens, cōmunis Indiæ, atq; Syriæ est. In qua uincit omnis a nostro mari stadijs, ut
Theophr. inquit. cl. Inter Libanū montē, aliūq; ignobilem, nō ut Strabo, & aliū quidā existima-
uere Antilibanū, lacu Gennefaretide, ubi conuallis amplissima, et pulcherrima, quā Aulonem
cognominant, sed in cōualli modica prope stagnū, palustribus per cōstatē siccatis. In eo tricenis
stadijs Iuncus & Calamus odorati gignūtur. Sed præstantior odore Calamus, statim e longin-
quo inuitat. Mollior tactu, meliorq; qui minus fragilis. Araneū eius, ut ait Plin. in fistula florē
appellant, magno Domitij errore in quadā Papinij poetæ syluula, non distinguētis harundi-
nem saccarū fundentem, ab odorata. Calamo precii in libras denarij. ii. Reliqua probatio, ut
niger sit. Dānantur aliūbi. Nobilior, quo breuior & crassior, lentusq; in frangēdo. Succū eius
Elaterio similem excipiūt. Legi, & in Meotide odoratū nasci Calamū, radice subalbida, & sine
fistulis, plena intus, & amara, specie Acori. De quo & falsi quidā sunt, Acorū eam putantes.
Quanto autē amarior, tanto & calidior est Indico. Vtrūq; tamē genus Acorū odore superat.
Teredinibus ut Acorū incessitur. Omninoq; uicariū pro Acoro est, ab Ionia, & Ponto, & Her-
culis columnis, prorsusque apud omnes, qui mediterranea colunt Aphricæ, ut si eadem non
sunt plane, maxima tamen germanitate uisantur, ut autores pleriq; tradunt.

EX M. VERG. COMM.
CALAMVS odoratus a Dioscoride appellatur. A Plutarcho in libello cui titulus est.
Quod bruta ratione utuntur, Arabicus dictus est; & quam hic natale solum illi Indiam
assignat,

καλαμος
ἀρωματικός

Plin. lib. 12. ca-
pi. 22. & de a-
lijs generibus
Calamorum.
lib. 16. cap. 36.

assignat, ille Arabiā, Quod & Theophr. indicat, et Plinius, qui in Arabiā nasci eū confirmat. Communem tū Indis esse, & Syriæ, nostra græte etiā adeo notū est, ut nō sit lōgius de eo agendū.

Relinquimus præterea qd' ad amaritudinē pertinebat, ppter ea, q' in meliorib. ea uox nō legitur.

Dubitauimus etiā, legendū ne esset, simul cū gramine, & Apñ semine decoctū odoratū calā mū mederi. & c. an distūgi duo illa oporteret, cū gramine scilicet, aut Apñ semine; ppter ea, q' utriusque lectionis certæ essent in antiquis Græcis uoces.

Dubitauimus itē, reddi ne oporteret, cū gramine, aut graminis semine. Neq' ab re. cū seminis uox illa utrūq' facile cōplecti, & ambobus cōpetere posset. Placuitq' nobis in similibus, & quæ easdē uires habere disinctione uti, relinquereq' utentibus alterutrius electionem. propterea, q' in pluribus disinctim ea legebantur, & si nō satis alterū utentibus esset in usu, geminanda, & cōiungenda medicis relinquere. Placuit etiā, gramē magis, q' graminis semen reddere, propterea, q' in decretis, & medicina graminis, hic ipse post docet decoctum eius, urinæ an gustijs mederi.

Assulose fragitur. Plinio, Viētruiocq', & plerisq' etiā alijs antiqua & honesta uox est: quæ primū significant, quæ marmorarū in cædendo marmore fragmēta dispellunt, & quæ in frangendis alijs rebus in longitudinē magis, q' in latitudinē fragmenta disīciuntur. Et quoniā Calamus hic in frangēdo assulas huiusmodi ex se mittit, ideo a nobis sic redditus locus est. Id enī significant quos hic græce *σινδλινος* appellat.

Decoquitur fœminis ad insidendū. Nullum habetur certum muliebris mali genus, facile tamen est, ex curationis & remedij ratiōe muliebriū locorū affectionē aliquā intelligere. Iuniores dolores, eius partis reddiderūt. Nos quoniam nihil a Diosc. certum precipitur de ea re, medicis censendū relinquimus, nō omittentes tamen, uideri nobis ex hīs quæ alibi in similibus obseruauimus, menses, & quod ad menses pertineat magis ea uoce, q' dolores significari.

B De BALSAMO CAP. XX
Alsamum, arbor albæ Violę, Lycij, aut Pyracathæ magnitudine cōspicitur. Foliū Rutę proximū, longe cādidius, perpetuo uirēs, in Iudæa solū quadā ualle et Aegypto nascēs. Iis differēs modis, scabricia, pperitate, gracilitate. Quod igitur tenui & capillacea coma est, Theristū uocat, quasi demessile. Fortassis, quoniā ob gracilitatē facile demetatur.

BARSAMI COROLL.
Balsamo aliq' Punicæ magnitudinem reddunt. Ramis frequentibus, semine Terebinthi, colore, amplitudine, figura: quod & odoratius quidam lachryma sua prædicant, Casamum, & Carbobalsamum uocantes.

VEX M. VEGR. COMM.
Violæ, aut Lycij magnitudine crescit. Cum suspecta nobis fuisset hæc uox quæ est in græcis *λινκίς*, id est, Violæ, cuius magnitudine Balsamū cōspici Dioscorides hic ait, nihil tamē mutauimus. propterea, q' in cunctis græcis, quos hætenus uidere licuit, integra et aperta uox illa inuenitur, nullaq' diuersę lectionis, nec obsoleta quidē uestigia aliubi uidētur: cū tamē parū uerisimile sit, Dioscoridē arborē frutici plerūq' cubitali in magnitudie exquasse: Et quā Plinius Viti, Theophrastus uero Punicæ similitudinem dixerūt, Violæ cōparasse. Nō dico autē Violā florē, sed eius plantā, quæ ramosa, pendētibus ex uno pediculo pluribus aliqñ, & diuersi coloris floribus, in Italia cubitalis, pauloq' altior floret. Nisi, forte cœli terręq' bñficio speciosior Viola alibi nascitur, & arborefcit. Sed parū id uerisimile est, nec sine ueterū autoritate credēdū. Caret ratiōe etiā, ad similitudinē tertij alicuius generis, duo alia inæqualia cōiunxisse, dicereq' Balsami arborē Violæ, aut Lycij magnitudinem uideri. Siquidē Lyciū, siue Pyxacantham, i. buxæ spinā dicere candē malis tricubitali altitudine hic paulo post esse dicit, quæ in nullis Violis mensura hætenus uisa, aut audita est. Ex his, quoniā nec Theophrasto, nec Plinio, nec sibi ipsi cōueniret hoc loco Dioscorides, suspicati sumus subesse uicium. Quale autē id sit, & quomodo instaurandū, nō ausim ego adferere: qm̄ nulla sit uitis, aut Punice cū Viola in græcis appellatiōibus similitudo, nullęq' cōcurrat eadē literę, aut syllabę, ex quibus licuisset sequaci cōiectura uerę lectionis uestigia odorari. Non tatebimus tamē, quod hoc ipso momento scribētibus in mentē uenit, potuisse ab imperitis librarijs & herbarijs locū misceri. Quodq' unū, ac simplex erat *λινκίον*, i. geminari, & qm̄ notior Viola q' Lyciū sit, cū Lycio Leucoion etiā scribi, quę tota Lycij similitudinis ad Balsamū in magnitudine relatiō legitima est, & aliorū hystorię respōdet.

A

B

*βάλσαμον
πυρακάνθη*

βίσιον

Theophr. lib.
9. cap. 6.
Plinius lib. 12.
cap. 25.

C Quod Pixacautha, id est, buxæ spina dicitur. Non dixissem ego hoc loco, *πυξάκων*, id est, buxæ spinam, non *πυράκων*, quæ nulla in plantis est, legendū in Dioscoride esse, nisi interpretes alij uoces magis q̃ res secuti, numerum illic plantarum auxissent Violæ, aut Lycij, aut Pyracanthæ, &c. tria quæ, duo alioqui erāt cōnumerātes. Lycium siquidē & Pyracantha idem sunt, si huic ipsi cum de Lycio agit credēdū est. Quæ enim inter Lycium & Pyracantham disti-
ctiua legitur particula, appellationes Lycij alterat, non disiungit, & numerat plantas.

ὁποβάλσamon

De OPOBALSAMO. CAP. XXI.

A Estiuus sub ortu canis ardoribus, arbos unguibus ferreis inciditur, manatq; e plaga succus, quem Opobalsamum uocāt: sed tā exiguo stillatu, ut annis singulis, ne plures quidem q̃ senī, septeniue congij cogantur. Inibi q; pōdus duplo repēditur argēto. Succī probatio est, ut sit recens, ualidi odoris, syncerus, non ad acorem uergens, pellucidus, leuis, alstringēs, ac modice mordēs gustu. Sed uarie uiuiatur, misto ab alijs quibus Terebinthi, Cypri, Lentisci, Balani unguento. Itē Susino, Metopio, Melle, aut cypria Cæra. Quod maleficiū facile deprehenditur. Nāq; merus in lancem uestē fusus, neq; maculam facit, neq; si eluatur notā relinqt. Vitiatus autē inhæret, & ut lac instillatus coagulat, qd' adulteratus nō efficit. Quinetiā syncerus in aqua, aut lacte celerrime liquatur, lactescit q;: uitiatus uero olei modo innatat, se cōuoluēs, aut in stellę modū diffundēs. Syncerus, senescēs crassescit, deteriorq; redditur. Allucinātur q; aqua concretū pessum ire, ad ima sidere arbitrātur, postea dissipatū supnatare.

D BARBARI COROLL.

C AEditur sub canem, parte qua maxime uideatur esse pregnās, & caudice, & cacumine. Sudor e plaga manat æstate tota. Sarmēta quoq; eius & furculi odore prestāte, amputātur, & uenēt magno, alioquin grandesceret arbuscula, nisi succideretur. Balsamum Syluestre, Theophrastus reperiri nūq; testis est. Omnibus odoribus Balsamū præfertur: quōdam in duobus tantum hortis, utroq; regio, altero iugerū. xx. altero pauciorū. Hiericunta nomināt, quanquā & Palmetis constitū, tāto quæstus, ut Iudæis opes ex Opobalsami uestigalibus creuissē, Trogius pdat. Is humili Picæ, quidā Cyaso Terebinthoq; ut Strabo, quidā Myrto similē dixere. Sed Viti similitorē esse, Plinio cōstat. Maleolis feri cepta. Impletq; colles, uinearū modo, quæ pedatæ nō sunt. Tondetur, nitescitq; rastris. Intra tertiu annū a satu fructifera. Folium Tuberis (id genus mali est) a Plinio reddi putant. Sed mendosum in eo locū esse arbitror. Nec tuberis scribēdum, sed Rutæ, nam & exēplaria sunt, in quibus ita legitur, foliū proximū rubet, cotrupte, ut pleraq; alia, pro Rutæ. Alioqn Theophrastus, & Dioscorides Rutæ folio, sed exalbido Balsamū describūt. Pausanias nūc Myrto, nunc Sampfuo, a quo nō per b. sed per p, Balsamū pronūciatur. Id ipse in Arabia gigni scribit, arbore uiperis obfessa, quarum morsu nemo extinguitur: quoniā succo eo pastæ, noxiū uirus habere desinunt. Ab Hierosolymis captis ferere fiscus Balsamū cœpit. Proceritas intra bina cubita subsistit. Arbori tria genera. Capillaceū, Theristū uocāt. Alterū scabrū, incuruū, fruticosum, odoratius, Ostracō. Tertiū Eumeces: quia procerius leui cortice. Huic secūda bonitas. Nouissima Theristo. Semē eius est uiuino proximū gustu, colore ruffo, nec sine pingui, peius in grano, qd' leuius, atq; uiridius. Ramus crassior Myrto. In cidebatur ante ferreis unguibus, sed qm ferro uitalia lederētur, trāsijt usus ad uitrū, & lapides, osseosue cultellos. Incidētis manus arūfici libramēto tēperatur, ne qd ultra corticē desquamet laeessatur. Succus lanis parua colligitur in cornua, ex hīs nouo fictili conditur, crassiori similis oleo, & in musto cādīdus. Rubescit deinde, simulq; durefcit trāslucidus. Sub Alexan. & Theophr. tēporibus toto die gēstiuo unā conchā impleri iustū erat: omni uero foccūditate maiore hortō semicōgios bisseuos, e minore binos. At Plinij æuo etiā singularū arborū largior erat uena. Ter omnibus pcutitur æstatibus. Postea deputatur. Amputatio ipsa & furculus. 800. uenit. Intra qnrtū demū annum, corticis ad medicamēta precū est etiam ante q̃ ligni. Ex hoc buxosum est optimū, qd' est odoratissimū. Ex semie aut maximū, & pōderosissimū, mordēs gustu, feruēs que in ore. Lachryma debet esse pinguis & tenuis modice ruffa, & in fricādo odorata cū austero. Secūdus

L I B E R P R I M V S

ro. Secundus cādidē color, Peior uiridis, crassusq;. Pessimus niger, q̄ppe ut oleū senescit. Ex oī
in cūlura maxime p̄batur, q̄ ante semel fluxit. Vitiatur semie suo, ut uix possit dephēdi fraus.
Itē & oleo Rosē, Myrti, Resina, Galbano, neq̄ssime gūmi: quonīā ipsum quoq; inarescit manu
in uersa, & in aqua fider ut Balsamū. Quod Cera & Resina p̄mutatū est, in carbone nigriori flā
ma detegitur. Nam mentium melle, contrahit muscas. Metopio adulteratum, in aqua circulo
candido cingitur. Nec aliubi Seplassiā maior improbitas, quippe sextarius, qui mille dena-
rijs uendente fisco emebatur, mox. 300. tantum denarijs constabat.

E X M. V E R G. C O M M.

S Ectā ferreis unguibus. &c. Credimus nos unguēs ferreos a ueteribus Græcis 'Ferramenta
dicta fuisse, quæ humani unguis figura cōuexa acie essent: qualia quotidie in fabrica uidentur
adhuc multa, quæ dimidiato orbe lunata ab eius partis similitudine, nomen inuenisse potue-
runt. Sed quid, quod Plinius ferri adhibitionem omnino damnauit, in Balsamo colligendo &

Rependitur, quo loco nascitur, duplo ad pondus eius argento. Ideo scilicet, quod nullū
in eo adulterium committitur, id quod in alijs gūmis, oleis, & unguētis fit. Author Theophr.
lib. 9. qui inter cætera testatur, uendi purum & sine admixtione aliqua, duplo ad pondus eius
argento. Quod monuisse legētes placuit, ne cui frigidum id & sine ratione dictum uideretur.
Idq; etiam Plinius significasse uidetur.

Qui citissime penetret. In Græcis habetur *ὑδαίτης*, quam uocem nouissimus interpres, pel-
lucidam interpretatus est, ex Plinio ut uidetur eam auguratus, qui Balsami lachrymam, ip̄ter
cætera dixit translucidam esse. Antiquus Dioscoridis interpres, serenam, nulla, ut nobis uide-
tur, in Balsami notis significatione. Serapion, uelocis resolutionis, quasi *ὑδαίτης* tunc legere
tur. Nobis in eadem Græcorum lectione, nihil mutare placuit, sed bona fide, nec absurdo sen-
su reddere ut legitur, qui citissime penetret. quando græcis uerbū notissimum est *διατείν*, quo
διατείν uerbum, ab altero extremo p̄ mediū aliq̄d ad alterū transire, & absolui, moueriue
aliquid significet, quod tenuitate sua potest Balsami liquor, qui a Plinio etiā tenuis laudatur.

Lactis modo albescit. *γαλακτοῦται* uertimus, lactis modo albescit. ne si lactescit simpliciter di-
xissemus, incertum legentibus esset, quæ nam ex tam multis lactis qualitatibus, sapore. f. can-
dore, substantia, liquore, & hoc aut fluido, aut coagulato intelligenda esset. candoreq; elegi-
mus: quoniam lac omne, semper, et in cunctis animantibus candido colore sit, debeatq; & tuti-
us sit, ex eo magis, quod inseparabile, præcipuū, necessariū, & sine quo nullū id erit, q̄ ex cun-
ctis alijs ostendi & indicari aliquid. Sic enim lacti candor competit, & inest, ut terræ pondor &
cessatio. Nec est q̄ credat aliquis, posse eo uerbo significari fluidū lactis liquorē, debuissetq; a
nobis reddi, lactis mō liquecit: qm̄ id etiā indicarat Dioscorides, celerrime disiungī, disijciq;.

E De X Y L O B A L S A M O. C A P. XXII

E Ligni genere, quod Xylobalsamum uocāt, probatur recēs, tenue,
fuluū, odoratum, quadam tenus Opobalsamum spirās. Necessari-
us etiam seminis erumpit usus. Quare eligatur flauum, plenū, grande, pō
derosum, mordens gustu, feruens in ore, modice Opobalsamum ofens.
Adulteratur semine Hyperico simili, quod a Petra oppido defertur. Sed
coarguitur magnitudine, inanitate, uiriū ignauia, sapore Piperis. Efficac-
issima uis inest succo, & q̄ maxime calfaciens. Abstergit, quæ tenebras
oculorum pupillis offundunt. Medetur perfrictionibus uulua, cum ro-
faceo cærato appositus. Mēses quoq; secundas, & partus extrahit. Rigo-
res illitu discutit. Vlcerā sordida expurgat, & cruda concoquit. Vrinam
potu ciet. Aegre spirantibus prodest. Datur in lacte contra aconitum
haustum, aut serpentium ictus. Miscetur acopis, malagmatis, & anti-
dotis. In summa, præcipua autoritas succo, secunda semini, minima
ligno. Semen commode potui datur doloribus lateris, pulmonum ui-
tijs, tussi, ischiadicis, comitialibus, uertiginosis, orthopnoicis, uri-
næ difficultati, torminibus, ac serpentum morfibus. Ad muliebres sus-

ξύλοβάλσαμον

C fitus perquam utile est. Vuluam aperit in defeffionibus balnearum decoctum, & humorem euocat. Lignum eafdem habet vires, aliquanto minores. Ex aqua potum cruditatibus, torminofis, uulſis, uenenatorū icibus opitulatur. Vrinam cit. Ad capitis uulnera cum ficca Iri conuenit. Squamas offium extrahit. Et ad unguentorum ſpiſſamenta additur.

X Y L O B A L S A M I C O R O L L.

X Ylobaſamo præciū in libras ſex. Romæ in triūpho Impatoris Veſpaſiani arbuſculā oſtendere. Plærq; in Aegypto naſci perhibent, regione quæ nunc Solis oculus, ſiue fons dicatur, quondem Heliopolis. Incidi autumnno ad liquorem, qui & oleum Baſaminum uocatur. Strabo et in Syria Cœle naſci prodidit, ualle illa fertili quæ Libanum & Antilibanum interiacerit iuxta lacum Gennefaritin. In Arabia quoq; Sabæorum tractu maritimo. Admonendi ſumus, Dioſcoridem in huius mentionis calce dicere, Xylobaſami decoctum cum Iride ficca mederi capitis uulneribus. ἀνὰ τὴν δὲ χεῖρα λειπιδας. nos ſquamas detrahete cōuertimus, ut uel porriginem intelligas. Eſt enim porrigo, ut Celfus ait, ubi inter pilos quædam quaſi ſquamulæ furgūt eæ, quæ a cute reſoluūtur, modo ſine ulcere, modo exulcerato loco. Vel quemadmodum recentiores, de ſquamis fractorum offium. Sed & caruncula quæ inter uiuam & emortuam offis ad uſti partem ſubit expletura quod abſceſſit, quaſi teſta tenuis & anguſta, ut idem Cornelius teſtatur, ſquama, id eſt, lepis, a Græcis appellata eſt. Liberum eſtimaturis eſto.

De A S P A L A T H O. CAP. XXIII.

A ſpalathus, quem alij Eryſiſceptron, alij Phaſganon, Syri Diaxylon uocant, frutex eſt ſurculofus, multis ſpinis horrens. Naſcitur in Iſtro, Niſyro, Syria, & Rhodiorum inſula: quo ad unguentorum ſpiſſamenta pigmentarij utuntur. Optimus eſt gratis, detractio cortice rubens, aut in purpuram uergens, odoratus, guſtatu amarus. Eſt & alterū genus candidum, lignoſum, ſine odore, quod deterius habetur. Vim calfacientis cum aſtriſtione obtinet. Vnde decoctum cum uino ad oris ulcera coluenda conuenit. Ad nomas genitaliū, & ſordida ulcera inſunditur. Subiectum in peſſo partum extrahit. Aluum ſiſtit eius decoctum. Et ſanguinis reiectionem potu cohibet. Vrinæ difficultatem inſlationeſq; diſcutit.

B A R B A R I C O R O L L.

A ſpalathus in Aegypto quoque naſcitur, ſpina ſylueſtris, magnitudine arboris modicæ, cædida flore roſæ: cuius radix unguētis expetitur. Idē frutex humilior in Syria, & Niſyro, Rhodiorumque inſulis prouenit: quam alij Sceptum Eliſei, alij Adipſatheon, alij Dipſacon, alij Diacheron, ut Plinius, uel Diaxylon, ut Dioſcorides, uocant. Naſcitur & pluribus locis, ſed non perinde odoratus. Tradunt in quocunq; frutice, ſed in Aſpalatho amplius, cœleſti arcu in cum innixio ſuauiſſimam odoris inenarrabilem fieri. Laudatur colore ruſſo, uel igneo, et odore Caſtorei. Permutatur in libras quindecim. Sane per Hiſpanias multi & ad odores, & inter unguenta utuntur ſpina, quam uocant Aſpalathum. Sed ea uulgaris eſt, ex qua ſulloniæ implentur urnæ. Radiciſq; uſus tantum habetur: nec dum comperi, ſit idem uulgaris ſpina, & topiaria, de qua in Acantho diximus. Radicem nigram Hippocrates cum uocat, radicem Galeo ſignificat Aſpalathi, criſæo Phocidis agro commendatiſſimam.

E X M. V E R G. C O M M.

A ſpalathon. Admodū procliuius eſt hic lapſus in Aſphaltū. quod monemus ppter indiligētes librarios. Aſphaltus bitumē eſt, Aſpalathon inter odoratos frutices, & ſpinas cenſetur. Sunt qui Phaſganon appellant & Sphagnon. Quorum prior dictio Gladium indicat, altera autem ab iugulando, quod ϕάγνυν greci dicunt, potuiſſe fieri uidetur. Credimusq; nos ſic dictum Aſpalathū ab aliquibus, quod aculeatus frutex gladij modo aculeis ſuis pungat et uulneret. Quod in Theocriti bucolicis paſtor, a ſpina in pede ꝑcuſſus, ab alio monebatur, ne diſcalciatus per montem ingrederetur, qui Rhamnis & Aſpalathis fronderet.

Ἰνδία
ἐρυσις
ἐρυσις
ἐρυσις
ἐρυσις
ἐρυσις

Theophr. lib. 9.
cap. 7.
Pli. li. 12. ca. 24.

Syri, Dyaxilon. Eadem dicēdi forma, qua nos in Plinio eius florē Diaporphyron dici monuimus. Neq; hoc loco Diaxylo aliud significat, q̄ mediolignū. ex eo, q̄ lignosior est frutex.

Et contra narium ozenas. Ozenas nos adieciimus, quoniā & Plinius ita legit. Sanatoris ulcera, & ozenas, ut in pluribus græcorum adhuc legitur.

De MUSCO

CAP. XXIII

BRyon, id est, Muscus, a quibusdam Splachnon appellatur. In Cedro arbore, Populo alba, & Quercu inuenitur. Optimū est Cedrinum. Proximum Populneum. In quo genere cādidum & odoratius præstat, nigricans improbatur, Astringendi uim habet. Decoctum insidentium uuluis utile. Vnguento balanino, oleisq; inspissandi gratia inferitur. Thymiamatum, acoporumq; compositionibus cōueniens.

BARBARI COROLL.

BRyon, hoc est, Muscus, uerbum ex uerbo. Dicitur & Ipnon. In Cyrenaica prouincia maxime probatur. Secundum locum obtinet Cyprium, ab eo Phœnicium. Fertur & in Aegypto nasci, quin & in Gallia: nec dubitatur. Sunt & hoc nomine panni arētes muscoso uillo, quales e glādiseris sola fere, quę uocatur Aegylops, fert, non in cortice modo, uerū e ramis dependētes cubitali magnitudine, sed odore præstantes. Candidissimis, atq; altissimis prima dignatio, proxima rutilis, nulla nigricantibus, & in insulis petriscq; nati damnantur, omnesq; quibus Palmarū, atq; non suus odor est. Ex Bryo & balanino oleo expeditissimū, primūq; unguētum fuisse ueriter tradunt. Differentia hæc: q̄ Bryon aliarū arborum canī quidam sunt, ut dixi, Brion uero Populi candidæ uua circa Gnidum optima, aut Cariam, insipientibus, asperisq;. Secundā in Lycia Cedro pertinentem ad unguentum prædicat, Paulus & in Picea uel Larice Bryon nasci prodidit a Galeno priore scriptum. Est & Bryon θαλάσιον, hoc est, marinū, ut suo dicitur loco. Muscus. preciosissimum odoris genus est, & quod Muscus uulgo nominatur ab Aetio, itēq; Paulo, sed & a Phocione grāmatico. Recentior Moschus odoratus caprę, seu quod idem est, dorcadis peregrinæ fanies ē ex umbilico eius, aut uomica. Gazellā uocant animal id barbari, ut uerba Hieronymi ad Demetriadem, hoc nonnullis significant. Muscus inquit, & Oenāthe ex peregrini muris pellicula. Sed Muscus Hieronymo aliud non est q̄ Bryon, de quo hic agitur. Nam & Plinius eadem fere mentione de Bryo & Oenanthe disputat. Quis autē sit peregrinus mus, odorata celebratus pellicula, non uideo, nisi quis animal hoc intelligat, ex quo Zibetti, siue ut recentiores græci uocant Zapetion excipitur: quanquam & compositionis quoddā genus est Zapetion ex animalis Musco, Agalochō, & orientali succino. Hæc ipsa cōpositio etiā Ner uocari solet a græcis quibusdā. Sed uox est Arabica. Inuenio & Muscilion dici quandam herbam, ab odore Musci, ut conjicio, quam & Dorcida uocant, naribus uitiōsis & foetentibus accommodatā: ut Aetius existimat. nisi quis pro Distāno accipiat, q̄ & Dorcidiū appellat.

EX M. VEGR. COMM.

Splachnon. Ex qua ratione, nullam nobis habet manifestam rationē. Siquidem græci, θαλάχιον, quæ latinis exta sunt, appellauerūt, nec ē q̄ animatiū extis: & Musco arborum cōueniat. Cedro. Illud animaduertēdum, quas hic Cedros dicit, Aeginetā Pinos dicere, sed uiciū subesse credimus, quoniam statim Dioscoridi subscribens, omnibus alijs cedrinum Muscum, & ipse antefert.

Populo alba. Non uidetur & uicio carere. Cedri tantum meminit, & albę Populi, desyderatur enim Quercus. Nisi legētibus damnatam uoluerit esse, quam tacitus arborem præterisset.

Habet adstringendi uim. Ne hic etiam conuenit Dioscorides cum Paulo, quoniam hic adstringere, ille discutere, & mediocriter mollire dixit. paruo, ut uidetur, discrimine: quod peritioribus cōsultandum relinquimus.

De AGALLOCHO

CAP. XXV

AGallochum, lignum est, quod ex India atq; Arabia deportatur, Thuiæ ligno simile, maculatum, odoratum, gustu astringens, cū quadam amaritudine. Cute uestitur aliquantulum uersicolore. Mandatur, aut decocto os colluitur, cōmendandi halitus gratia. Sudores arcet to

A

Bryon

θαλάχιον

Plin. lib. 12. capite. 25.

B

θαλάχιον

Thuiæ

D I O S C O R I D I S

C to corpori insparsum. Pro Thure ad suffimenta substituitur. Radix epota drachmę unius pondere, humida stomachi uitia, et imbecillitatē, feruorēq; mulcet. Si lateris, iocinerisue dolor excruciat, si dysenterię, aut tormina infestāt, ex aqua bibere pdest.

BARB.

A Galochon Aetius & medicorum uulgus Xylaloen idest, lignum Aloes appellāt: a nonnulla similitudine coloris Aloes, ut arbitror. Nō animaduerto ubi de hoc genere loquitur Galenus. Recentiores gręci tradūt sub terra condi solitū Agalochon, nō alias odoratū futurum, q; ubi teredinibus computruit. Fastigia eius summa quatuor. Indicū, Sapphicum, ex urbe Sappho. Speon, & Hygron, idest, humidum, quod ipsum deinde in species quatuor conciditur. Arabes nonnulli semen huius arboris esse uolunt, id quod Haormiam ipsi uocāt, similitudine Piperis minuti, colore subrubēs, quapropter & Piperellam dixere. Agalochon Aetius in thymiamate myreplico idē esse, quod & Tarum putat. De Taro Plinius. Ex Cassia inquit, et Cinnami cōfinio Cancamum, & Tarum inuehitur per Nabathcos, Troglodytasq; ijs uicinos.

VERG.

Quod, scribente & commentante hęc Dioscoride, barbara appellatione Agallochon dicebatur, secuta Gręcorum atas Xylaaloem, facto ab amaritudine nomine, quasi Aloes lignum appellauit. Tradideruntq; id posteriores Gręci, quibus quantum credendū sit, ex huius scriptoris historia & notis facile erit nouisse. Paulus Aegineta, nihil non idē, Dioscoridi de eo tradit, etiam usq; ad uerbum; in hoc uno tantū diuersus, quod non πλυρῶς πόνος, ut Dioscorides, lateris doloribus, uerum πλυρίδι, idest, laterali dolori opitulari eam ait, quæ quantum differant, alibi diximus.

Thyie ligno simile. Quæ sit hęc arbor, non facile nobis fuit couicere, Theophrastus eam libro primo, inter siluestres arbores, quæ perpetuo frondent, numerauit, nec Cupressō dissimilem alibi descripsit. Crediderūtq; aliqui, eam esse, quam Homerus quinta Odissę rhapsodia, a Circe ad odorē sumi & lucē incendi dixit. Et quæ Plin. lib. 13. Trogetem, ab alijs uocari ait. Licet non iisdem literis in Homero, & Theophrasto unaq; scribatur, liceatq; ob id, non esse in utroq; eundem suspicari. Variantq; antiquiores gręci etiam hoc loco. Suntq; in quibus non Thyiæ, sed Sorbo simile Agollochō legatur: quod more nostro, ne quid, s. relinquatur, dictis hactenus a nobis adijcitur.

De Narcaphtho. CAP. XXVI.

D
νάρκαφθον
νάρκαφθον

Narcaphthum ex India defertur, corticosum, simile Sycomori libro: quod iucundi odoris gratia suffitur. Miscetur thymiamatis compositis. Constrictionibus uulux suffitu prodest.

BARBARI COROLL.

Narcaphthon prætermisum a Plinio arbitror consulto, qia incerta esset natura eius, ut aliorū quoq; pluriū: quæ ille orbi nostro tantū nominib. cognita esse tradit, ut sericatū, gabaliumq;. Paulus & Lacapsithō nominat, inter ea, quæ a quibusdā in Cyphi heliacū additū: et corticē Piceæ, uel alterius arboris existimat. Ego Lacaphthon idē esse cū Narcaphtho ratus sum.

EX M. VERG. COMM.

In antiquissimo quodam codice sublatū erat hoc caput, nec deprehendi aliquod eius uestigium potuit, sed ne Plinius quoq; meminiret: quod equidem sciam non leui suspitione, nisi Paulus id confirmaret, qui habet fere omnia, quę hic dicuntur.

Quod torminibus subuenit. Variant ab impresso duobus locis hoc capite antiquiores gręci. In aliquibus enim legitur, ὁ σποραμένιος ἀρχυ, idest, quod torminibus subuenit, nullo eius remedi antiqui alicuius scriptoris testimonio. Siquidem nec Paulus Aegineta in Narcaphtho meminit, neq; antiqua Dioscoridis translatio, ideo nos id negleximus.

Astrictis foeminarum locis. Sūt in quibus μήτραν ἰσινωμένην, & in quibus ἰσχυμένην legatur: significatq; altera uox, quod angustum præclusumq; sit, altera quod astrictū, nec humores remittens: qualia sunt nulla uitio curta, aut rimosa fictilia, primumq; illud angustiarū & præclusionis uitium, quod gręci φίμον dicunt, in ostio muliebrium locorum, ex præcedente exulceratiōe, aut durata illic inflammatione sit. Alterū ad suppressos menses, et eius partis fluores pñet. Nos in ambiguo id maluimus, qđ ab antiquo medicę, autore Pau. Aegineta cōfirmabatur.

De Cancamo. CAP. XXVII.

κάνκωμον
ζυλσεμόνη

Cancamum Arabici ligni lachryma est, Myrrhæ quodammodo similis, olidi gustus, quam ad suffimenta usurpant. Vestes

eo ex Styrace & Myrrha suffiuntur. Vim proditur obtinere extenuandi obesos, si ternum obolorum pondere ex aqua, aut mulso aceto, aliquot dies ebibatur. Lienosis datur, comitialibus, & suspiriosis. Menses cum aqua mulsa pellit. Oculorum cicatrices confestim emendat. Vino madefactum medetur eorundem hebetudinibus. Aduersus gingiuas humore pregnanteis, doloresq; dentium, non aliud efficacius.

B A R B A R I C O R O L L.

Cancamum ex collimitio Casiae, Cinnamig; per Nabathæos, Troglodytasq; confines aduehitur. Qui confedere ex Nabathæis, nomine solo compertum Plinio. Nec sum nescius Laccam a barbaris hoc genus uocari aliam, q̃ quæ de Purpurarum floccis conficitur tinctoribus. Est & gummi quoddam arboris Lacca dictum, & tinctoris utile. Nec an ea Cancamum sit hoc de quo agitur, satis habeo compertum. Democritus certe, si modo eius liber est qui de tingenda Purpura circumfertur, Lacchan nominat inter colores hoc, et florem Achaicum appellat; idē autor, sicut florē Syriacū, quod Rhiziō priuatim uocari tradit ad eundē usū. Sit autē flos Achaicus, aut Syriacus id quod nos modo Cremes dicimus, an diuersum, nō cōstat. Paulus odoratum esse Cancamum prodidit. Differt Cancamum a Cancano, q̃ Cancanus herba est a Galeno dicta, a Dioscoride Cacalia. Nam Caucalis alia est, ut post dicitur. In quo foedissime neoterici diffiluuant. Græci lignum quoq; aridum Cancanon appellant.

Laxandi uices ultra odoris usum Cancamo AEgineta tribuit. Nec relinquit etiam, quod hic ait, potu eius ad gracilitatem obesos contrahi.

Cicatrices oculorum exterit. Cicatricem uocat Galenus, cum in nigra oculi parte ex profunda ulceratione crassior oculo membrana superuenit, & candido colore conspicitur.

D E C Y P H I. CAP. XXVIII.

CYphi, thymiamatis compositio est, dicata Dijs, qua abūde AEgypti sacerdotes utuntur. In antidota misceri solet. Suspiriosis datur in potu. Permultæ cōponendi rationes, quarū una hæc est. Sumitur Cyperi dimidiū sextariū, cū pari Iuniperi adultæ modo. Vuæ passæ pinguis, exemptis uinaceis, minas duodecim. Resinæ repurgatæ minas quinq; Calami, & Iunci odoratorum, & Aspalathi, singulorum minam. Myrrhæ duodecim. Vini ueteris sextarios nouem, cum duabus Mellis minis. Vuā detractis uinaceis tufam, cū uino & Myrrha subigito. cætera tufa & cribrata adijcito. die uno humorem conbibere finito. dein mel coquito, dum sibi glutinis ascescat crassitudinem. eliquatam Resinam accurate permisceto cum reliquis diligenter contritis, & in fictile uas recondito.

B A R B A R I C O R O L L.

CYphi urebantur uestiginis omnibus AEgyptij, Matutinis Resina, Meridianis myrrha. Ea erat miscella, ut Plutarchus inquit, sexdecim literis sacris contenta, ex melle, uino, uua passa, cypero, resina, fefeli, aspalatho, myrrha, bitumine, iunco, bryo, calamo, utroq; iunipero, cardamomo, lapatho. Quamquam Lacaphitho forte, non Lapatho scribendum sit in Plutarcho, ut ex ijs quæ in Nascaphitho diximus comprehendere potest. Confundebantur hæc non temere, aut fortuito, sed præeuntibus de scripto, qui rationem & ordinem præcinerent, quo quicq; loco, tempore, mensura, coniiciendū esset. Placuit uero numerus sexdecim, q̃ is e quadrato quadratus existeret. Talis. n. linea circumcurrens per oras, æqualem cum area sua mensum habet. De quo latius in libello dictū est, quem ex antiquis autoribus de Iside & Osiride condidimus. Sunt & aliæ thymiamatis huius, & pro arbitrio cuiusq; rationes, sed duæ in medicina cognomentis insignibus, Heliacō & Seleniacum, hoc est, solarium & lunare.

E X M. V E R G. C O M M.

Erant Cyphæos huius confectioes uariæ, quod hic a principio statim testatur. Videturq; c̃ ij

Plin. libro .12.
capite. 20.

uq;

B

*

*

D I O S C O R I D I S

C hoc loco ea describi, quæ in frequentiori medicinæ usu, forte & notior omnibus erat. Nā quæ a Plutarcho describitur, amplior est. Hæc decem, illa sexdecim rebus constat, ad explendum quadratum numerum. Non tacendum etiam hoc loco, quod suspicati sæpe sumus, non esse Dioscoridis legitimum hoc caput, quod in antiquissimo omnium mihi & probatissimo codice non legitur, nec eius meminerit Paulus Aegineta, cum medicam omnem materiam lib. 6. percurreret, quod agendum nō erat homini, qui in curandis morbis, usus eo sæpenumero fuisset. Quodque in eam suspicionem nos magis traxit, illud est: quod parum uerisimile est, simplicem medicam materiam docentē hominem, compositam illi miscuisse. Nec est quod miretur aliquis, in græcorum scriptorum codicibus, tam multas & tam grāues labe. Quo em̄ malo facto latīna res iam pridē periit, eodē & Græca collabefacta est, et qd' adijciēdi cōtinue antiquorū decretis aliqd, uiciū nunc oēs tenet, idē antiquiores tenuit: dū uolumus oēs aut sapientiores uideri, aut ocio consulentes, parata & exposita eodē loco omnia habere. Suspicio tñ, non decretum hoc sit. Neq; enim nos rem damnamus, nec legētib; inutile fuerit, tā multa de Aegyptiorum Sacerdotum & medicorum Cyphi narrata a nobis, & ex antiquitate repetita fuisse.

DE CROCO. CAP. XXIX.

C Rocum ab aliquibus Castor, ab alijs Cynomorphos, a magis Herculis sanguis appellatur. Optimū in medēdi usu Coryceū, recēs, et boni coloris, paulū cādidi gerēs in capreolo, oblōgū, oibus suis partibus cōstās, nō fragile, plenū, a quo detractū ē nihil, qd' madefactas manus inficit, nec sitū redolet, aut cariē sentit, subacre. Sin huius generis nō ē, aut uetus, aut humore pfusum creditur. Secūdus locus datur Coryceo, e tractu Lyciē cōtermio. Tertius Lycio, e mōte Olympo. Dein ex Aegibus Aetoliē. Cyrenaicū e Centoria, inter sicilica oīa uiribus pstat. Omnīū ad obsonia usus. Itali tñ ob succi copiā, et coloris uenustatē, ad Thuiē infectus uisurparūt. qbus de causis magno uēditur. Utilissimū in medicina qd' ante descripsimus, Adulteratur imisto Crocomagmate tuso, atq; etiā Sapē subtilu cōtrita, q pōdus adijciatur, simul argēti spuma, aut Plumbagine. Sed maleficū declarat insidēs puluis, p̄sertū si Sapā oleat. Thessalus ipm̄ tñ odoratū esse uoluit. Alij exitiosū, trib. drachmis ex aqua potis. Proculdubio uim coquēdi, emolliēdi, atq; substringēdi habet. Vrinā cit. Elegātē colorē pstat. Qui ex Passō biberint, crapulā nō sētiēt. Oculorū fluxiōes, illi tū cū humano lacte, cohibet. Additur in potiōes, quę interaneorū caussa tempantur. Ad uulug etiā, sedisq; cataplasmata comode pmiscetur. Venerē stimulat. Vergentes ad ignem sacrum inflāmationes mulcet. Auricularijs collectionibus utile. Quo facilius conteratur, in calido fictili sole siccati oportet, celeriterq; uersari. Vrinam mouet radix ex Passō pota.

BARBARI COROLL.

Plin. lib. 21.
capite. 6.

C Rocum folio angusto, adusq; capillamenti exilitatem, germine ac flore serotino, per autumnum occasu uergiliarum: qui paucissimis diebus marcescat. Cum folio florē expellit obiter, quin & prius uidetur. Subest radix multa, carnosa, peruiacæ. Calcatum melius surgit, & quasi pereundo lætius prouenit: semitas eo fontesq; amat. Seritur radix Bulbo. Duo genera eius, montanum, & fatiū. Prius hebes, posterius odoratū, utrunq; primis imbribus. Emicat autumno, ut dixi, post Aphacem. Inodori duo genera, candidum, ac spinosum. Viret bruma, & colligitur, siccaturq; in sole. Sed in umbra melius est Hyberna. Crocū syluestre optimū. Sere in Italia nō expedit, ad scrupula usq; singula areis decoquentibus. Satiū maius, nitidiusq; sed leui momēto degenerat. Omnino infecundū natura ubiq; uel Cyrenis, ubi laudatissima oīa, Quidā Phlegreō Croco sedm̄ locū adsciscūt. Probatio, synceri, ut manu imposita crepet,

ueluti fragile: dilutum et humidū fedit. Altera pbatio, si manu plata ad os, leniter faciē, oculosq; mordeat. Esse inquit Plinius, & per se genus fatiui blādisimum, uulgo cum sit medio sui candidū Dialeucon uocatū. Cyrenaico uitiū, q; omni Croco nigrius, & q; celerrime corrūpitur. Laudatur breuibus capillis in Lycia. Año septimo, uel octauo transfertur in locū subactū: atq; ita degenerans reuocatur. Vfus eius in coronis nūq; ppter angustia folij, nisi quē ad mulcendā ebrietatē fieri a quibusdam soleāt. Vīno mire congruit, p̄cipue dulci, quo & aqua facillime soluitur, nulloq; alio dulci. Tritū ad theatra replenda, utq; hoc nonnulli apud Dioscoridem intelligant, cum *στύαν* dicit, errore librariorum *στύαν* pro *στύαν* scribentiū. Sed nos imutare lectionem antiquam, ausi non sumus. Ideoq; mortarijs tingendis, conuertimus. p̄sertim cū de mortarijs atq; Croco mentionem quodā loco habitam a Plinio sciremus. Asseruatur pixidecula e cornu. Accerrima Croco uis tribuitur; ut illatū manus palme, cōtinuo pueniat ad cor.

EX M. VEGR. COMM.

Croci appellationum nulla est a nobis certa ratio, quē plures etiā, quam in impresso Dioscoride, in antiquis alijs græcis leguntur, nihil igitur de his agemus.

Integer, friabilis. In aliquot græcis legitur, *ἄσπερος*, quod est fragile, & tenaci lentore durū. In aliquot uero, *ὑδρωσκύρος*, quod friabile significat, contrario penitus sensu; prioremq; illam lectionem, secuti sunt iuniores omnes. Plinius alteram his uerbis cōfirmat. Probatio synceri imposita manu, crepat ueluti fragile, nosq; in ambiguo hanc magis probauimus, non tam Plinij auctoritate, q̄ necessitate & usu eius admoniti, friato enī Croco plerumq; in medicinis utimur.

Et sine unguine plenus. &c. Sequitur eam mox uocem alia, quā penitus corrupta est, *ἀνδλίπης*. s. cum *ἀνδλίπης* legi oporteat, id est, qui nullo unguine uuescat, non cui nihil desit: idq; meliores græci adhuc habent. Nec obstat quod Plinius decreuit, optimū ubicunq; quod pinguisimum. Crassitudinem enim, non unguem ea uoce significauit.

Et cum malefcit, manus inficiens. Obseruauimus, non eodem modo in cunctis legi *καπτων* in *ἀνδλίπης* τὰς χεῖρας. Sed in alijs, ut modo scripsimus, manifesta significatione, infici attritu Croci manus: In aliquibus autem, *ἀνδλίπης*, id est, cum humore diluitur: quod quoniā uerbo Croco cōmune est, minus ideo nobis placuit.

Restituimus idem idem non multo post, uocem quā in cunctis alijs, præterq; in eo qui mihi omnium codex probatissimus est, perierat, illic. s. ubi hic ait. Qui enim talis non fuerit, &c. Deerat enim, *ἄσπερος*, quod nos in tempestiue lectum diximus, manifesta eius uocis iactura, & necessaria instauratiōe. Incertus ab hoc loco, nec sequax sermonis cursus est: non tñ intellectum adeo confundit, ut non facile dissimulari, aut ex Plinio in integrum restitui non potuerit.

Et ex Olympo Lyciæ monte affertur. *ἀντίρρην δὲ ὅτι τὴν πρὸς λυκίαν κυρίως, καὶ ὁ ἀπὸ τοῦ λυκικοῦ δόματος*. Articulus præpositiuus, & Coricij in genitiuo casu, illic accurrentes, legitimam sermonis seriem miscent. Ideoq; nos secundæ bonitatis, a Coricio, ex Cilicio esse diximus, eum qui nis seriem miscent. Ideoq; nos secundæ bonitatis, a Coricio, ex Cilicio esse diximus, eum qui ex agro ad Lyciam, & Lyciæ Olympo monte affertur, nullā earum uocem perire nobis utilē patientes. Cum aliqui licuisset ex Plinio, breuius & certius totam absoluere rem, Siquidem ille etiam sic decreuit. Prima nobilitas Cilicio Croco, & ibi in Corico monte, dein Lycio monte Olympo. Sed nos qualē nostra habet ætas, Dioscoridē interpretamur, nō Pliniū exscribimus.

Grauius in Cyrenaico Croco. A librarijs peccatum est, nihil enim illi redditur. Verum statim ad eos qui in Sicilia nascuntur translatus sermo est, tam incerto intellectu, ut nos hiatum illic reliquerimus, qui a doctioribus aliquando expleatur. Credimusq; nos, uitiū aliquod in Cyrenaico significasse Dioscoridem, quod tamen nunc non legitur, quale Plinius in eo nigredinem damnavit. Mox de Siculis egisse, omniumq; in ea insula nascentium Centuripinū ignauissimum, fatuosq; omnes hos esse, ideoq; ignauiores. Quoniam autore Plinio, optimum siluestre sit. In antiquorib. græcis aliquot, certissimo sēsu & intellectu hic locus adhuc inuenitur.

Miscetur præterea, &c. Desyderatur hic certi morbi genus, quod facile conijcitur.

De Crocomagmate. CAP. XXX

Iteriā ex p̄ssis unguenti crocini odoramentis, qd̄ Crocomagma uocāt. Optimū ē odoratū, modice Myrrhā olēs, graue, nigrū, ligni expers, leue, subamarū, qd̄ madefactū Croci colorē reddit, gustatūq; uehemētior dētes ac linguā inficit: multis durās aṇīs. Quale ē qd̄ a Syria deferretur. Habet suas uires ad delēda quē caliginē oculis obuersant. Vrinā cit,

A

Sed uero

B

κροκόμαγμα

c. iij

D I O S C O R I D I S

C Calfacit, concoquit, & emollit, Vires Croci proportionem representat, quandoquidem plurimam Croci partem sibi Crocomagma uendicat.

Pli. li. 21. ca. 20

C R O C O M A G M A uerbū ex uerbo sex olei Crocini est. nam feces unguetorum Magmata greci appellāt, & conspersionem, siue massam quæ subacta sit. Ecmagma, quo nomine inquit Galenus, ipsum quoque Crocomagma significamus.

E X M. V E R G. C O M M.
Sunt graecis Magmata, quæ expressa materia aliqua, supsunt, crassa, feculentā, & lignosa. Verbi causa, Si tusa Plātaginis folia in usū aliquem manib. aut p̄lo exp̄sserit medicus, quod supest terrestre, lignosūque, id Magma dici posset. Sed qm̄ nullus similitum usus ē, ideo in nullo huiuscemodi id nomē inuenit: seruatiū tñ id est tñ in ijs, q̄rū et humoris, et exp̄sse substātiā alicuius usus est: ut in Rosacio, alijsq; huiuscemodi multis. Ex hoc genere Crocomagma est.

Fita aut̄ sic. Oleū primū inspissatur, idque aliquibus aromatis. mox Crocus infunditur. post aliquot dies oleum colatur, expresso oleo. quod superest, Crocomagma dicitur. Vnde sunt pagulli. Celsus lib. 7. uocat Recrementum. Plinius, Vnguenti fecem.

Et mediocriter myrrhatum est. *μῆρος κατὰ σμύρνον*, idest, non odore solum, sed tota Myrrhe substantia mediocriter myrrhatum.

Dētesq; et linguā ad aliquot horas inficit. Nō significat qd̄ statim segitur, *ἀπὸ μῆρος τοῦ σμύρνον* qd̄ ex Gallia interps dixit, multis añis perennare Crocomagma. Non em̄ quas hic *ἄρκε* dicit, Poetarū more años significat, sed de colore eius agit Dioscorides, quē testatur, cū linguā et dētes semel infecerit, aliq̄t continuis horis pmanere, cū aliq̄n cōtinua oris pituita dilui deberet.

li. 21. ca. 21

H E L E N I Ū, qd̄ Symphitō aliq̄ uocāt, alijs Persicā, alijs Medicā, alijs Ore stiū, alijs Nectariō, alijs Cleoniā, alijs Idēā Batō, aut flomū, Latini Terminaliū, aut Enulā cāpanā, Aegyptij Lenē. Folia habet Verbasci, angustioris folij, asperiora, oblōga. Caulē qbusdā in *ἰσχυρὸν* emittit. Radicē subalbidā, interdum subruffā, odoratā, acrē, uegetā, magnā, ex qua agnatæ appendices Liliorum, aut Ari modo feruntur. Montibus in umbrosis, siccoq; solo prouenit. Foditur æstate radix, particulatimq; dissecta siccatur. Potum radice decoctum, menses & urinas ciēt. Ipsaque in eclegmate ex melle, pdest tussi, orthopnoeā, ruptis, cōuulsis, inflatiōib. et serpētū morsib. In suūa, exalfaciēs. Folia ex uīno cocta utiliter ischiadicis illinūtur. Heleniū stomacho utile, ī passio cōditū. siq̄dē salgamarij paululū siccātā radicē, mox decoctā, & frigida aqua madefactā, in Sapā cōijciunt, et ad usum recōdūt. Trita, potaq; ad cruentas excreatiōes efficax est.

Pli. li. 21. ca. 21

H E L E N I Ū, Enula, siue Inula, sed duplici natura, folio Serpilli: de qua statim post dicef. Altera folio Verbasci exilioris, de qua nūc agitur. Brevior hęc q̄ Pasinaca ē, sed torosior, amariorq; et nisi tēpetur liq̄do dulci, stomacho inimicissima. Sed plurib. modis austeritate uicta, gratiā inuenit. Nā & Vuis passis, & defruto, & melle subigif in pollinē tusa: et pinguib. quoq; Caryotis, iam Coroneis, Malis, Sorbis, et Prunis, aliquando Pipere atq; Thymo illustrata, maxime Iuliū augustē quotidiano cibo. Superuacuū eius semen. qm̄, ut Dioscorides meminit, paginibus sentur, modo quo harundines, magnisq; interuallis, neq; ullo minus quaternorū pedū: quoniam spaciōse fruticat.

E L E N I O N. Siue a lachrymis Helē, siue ut alijs dixerunt, quoniam contra serpētes ex eo primum a muliere illa remedium inuentum est. Symphyton. Inuenisse id nomen uidetur, ex sobole adnatiscq; illis, quæ in radicibus Lilio- rum modo

rum modo *συμφύονται*, idest, connascuntur, & herent.

Sūt q̄ medicā & Nectareā. Scilicet facta a regiōe noīe, et a dulcedine. Sic Persicam, sic Cleoniam dictā etiā conijcere licet. Etsi in probatissimo mihi codice, non simpliciter *κλεώνιον* legitur, sed *εὐχλωρόν κλεώνιον*, idest, Buglossum Cleonium.

Apuleius etiā Chironion Panacen dicit uocari. Vt in alterutro uidum sit; adiectumque hoc a nobis est, ne quid obseruatum & inuentum haecenus relinqueretur.

Orestium. Causam ignoramus. Nisi forte Orestis & Helenæ propinquitās, communem eius plantæ laudem & honorem ambobus fecerit.

Sunt qui Rubum Idæum. Verbasum Idæum, ex sola similitudine (ut toto hoc opere infinitæ aliæ factæ sunt. Et quoniam copiosum in mōte Ida nasceretur, ideo loci, & regionis discrimine, a proprie dictis, de Rubo & Verbasco, discretum est.

Terminaliū. Vnde Romani sic dixerint, modo integra ea uox est, nihil cōpertū habemus.

Inulam campanam. Inulam dici antiq̄ omnes testātur, nullibi tamē ex Campania magis, q̄ aliūde ab illis laudatur. Suspīcamurq; nos, multas in scriptore hoc, nō legitimas esse appellaciones, deincepsq; p̄ tēpora insertas, aliena & pegrina admiratibus cūctis, eoq; magis in Romanæ gētis fortuna et impio, hāc grēcis miscere p̄p̄rijs placuisse, & ex p̄p̄inā urbi regione laudauisse.

Folia habet angustiora folio Verbasco. &c. Id ex Verbasci historia patebit. Qd̄ utinā in caule pariter liceret, quoniā hic ait, aliquibus locis in Inula nō proferri, nulla eorū locorū certā indicatione, quā meritō omnes desyderēt, multoq; magis ubi caulescat hoc olus, & caulis, & floris, & semini certam rationem & historiam, quam iuniores aliqui non ex se, sed ab hoc scriptore acceptā rediderūt. Quod enim in impresso, cunctisq; alijs fere grēcis nō legitur, in antiquissimo & probatissimo mihi codice adhuc seruatur, describiturq; in eo caulis appellatione, quod in Inula crescit, his uerbis. Caulem ex se mittit Heleniū crassum, hirsutū, cubitalē, & aliq̄ maiorē, angulosumq; flores luteos, et in hīs semē Verbasco simile, tactu pruritū faciens. Licetq; hæc, ut diximus, tam aperte in Græcorum aliquo legātur, nō ideo tamē ceteros omnino dānamus. Obseruauimus enim, diuersitati huic causam dedisse, mediam quandā in Inula crescentium naturam, quæ nec in caulium genere, nec fruticum ramulorūue censi penitus possent. Siquidē caules plerūq; in singulis plantis, singulares sunt, nec nisi appetente flore & semine surgūt, ut in Lactucis, ac Betis, alijsq; oleribus huiuscemodi sit. Inula autē raro, & a principio statim fruticatu p̄dit. Romuli cōtra, fruticesue copiosiores & graciliores, q̄ in Inula sūt, quales in Ruta, Serpillo, alijsq; iunioris uidētur. Columella frutices, qd̄ in Inula extollit, dixit lib. 12.

Radicem habet intus albescētem, foris rubescētem. Sic ex melioribus græcis legendū est.

Radicem habet odoratam, grandē, acrem. Sunt in quibus *ἰσχυρὰ*, quod est speciosam & crassam, & in q̄bus *ἰσχυρὰ*, quod nos facili lentore mollem reddidimus, *ἰσχυρὰ* enim, τὸ ἰσχυρὸν significat. Probauimusq; hanc ratione magis, quod ad ostendendā eius quantitātē satis erat, qd̄ hic *μεγάλαν*, id est, grandem dixerat. Liberum tamen hoc legentibus relinquatur.

Suspectum est nobis, quod in græcis omnibus legitur, cruentis sputis utilem esse Inulam. Non tam quia meliores græci nihil huiusmodi habent, quam quia non legitimo loco, se id ostendit. Debuerat enim in medicina, nō in extremo capite posteam tractari, a quo loco distractum, additum magis & aduentitium, quam natium & antiquum Dioscoridi uidetur: relinquiturq; peritioribus de eo censendum.

De ALTERO HELENIO. CAP. XXXII.

Alterū Helenij genus in AEgypto gigni Crateuas tradit. Herba est cubitalibus ramulis, Serpilli modo per humum repentibus. Folijs Lenticulæ, sed longioribus, crebrisq;. Radice pallida, digiti minoris crassitudine, p̄ ima tenui, sup̄ne crassa. Cortice nigro. Nascitur in maritimis, collibusq;. Radix una in uino epota, cōtra serpētū ictus auxiliatur.

HEX M. VERG. COMM.
Helenium hoc posterius, nostris Inulam appellari posse, non uideo. Theophrastus interim Velenion, Aristoteles Belenion scripsere: si modo liber eius est, qui de plantis ad autorem Aristotelem refertur. Belenium inquit, delibutorij in Perside uenenum erat, & in AEgyptum & Palestinam translatus, sine periculo mandī coepit. Hæc commentatio Græcis perierat. Habebatur in arabico, demū cōuersa est in græcum sermonem a quodā, ut ferūt. Maximo.

D I O S C O R I D I S

C propterea quedam in eo libro barbara fruticū & radicū leguntur nomina, ut sunt, Benteli, Nenuphar, Opinais, & aliquot huiusmodi. Nenuphar pro Nymphæa quidē capitur Arabiæ: sed Benteli, & Opinais quid sit, parum liquet. Nisi quis Opinais pro Silphio intelligat: quoniam succum ex eo manare lentiusculum dicat, quem priuatim uocamus Opon. Bentelos autem initio spicata esse traditur, mox in arborem grandescere. Sed redeamus ad Helenium. Plinius hoc Helenæ lachrymis enatū refert, dum gubernatorem Canopum, Hæmorrihi serpentis ictu exanimatum fleuisset. Hilaritatem, Hippocratis testimonio facit. Prædulcis in eo cremor. Radix cōtrita, mures necat. Cādida intus est, & dulcis, Dioscoridi uero pallida. Laudatissimū in Helena insula. Huius rami dodrātales a Plinio, cubitales a Dioscoride feruntur. Addebatur in coronamenta folium.

E X M A R. V E R G. C O M M.

C Redimus etiam in Aegyp̄tia Inula corruptam esse illic uocem, quo loco in extrema totius capitis coronide, hic ait, uires illi esse, ut cū uīno pota radix eius una, serpētū moribus subueniat. Cur enim una magis, q̄ duabus, tribusue: & si quantitas in ea uoce decernenda fuerat, pondere potius q̄ numero, quod alioquin inæquale est, constitui debuerat. Id nos, una & altera litera mutatis, quod erat *μία*, id est, una, *λίαν* quod tritum significat, legendum esse arbitrati, tritam cum uīno potam Inulæ radicem, remedio esse diximus.

ὄλκινον
ὀμφάκινον

De O M P H A C I N O O L E O. C A. XXXIII.

O Leum quod ex immaturis Oliuis exprimitur, ad multos usus recte ualentibus accommodatissimū, Omphacinum id appellatur. Præstat recens, odoratum, quod non mordeat. Tale unguentorū compositionibus idoneū intelligitur. Stomacho utile est, q̄ astringat. Gingiuas contrahit. Dentes firmat, si contineatur in ore. Sudores cohibet. Et quo uetustius ac pinguius, eo ad medicamenta aptius est. Et ut reliqua in commune dicatur, onine oleum calfacit. Emollit uentrem. A perfrictionibus corpus tuetur, ipsumq̄ promptius ad obeūda munera reddit. Aluū leuigat. Vlcerationū medicamentū uires permistū lebetat. Cōtra uenena datur, assidue potum, redditumq̄ uomitionibus. Soluit aluum hemine mēfura, cum pari Pūsanæ succo, aut aqua potum. Ad tormina, calidum si mul decocta Ruta tribus sextarijs in potu datur. Ventris animalia pellit. Idem maxime Ileī intestini morbo laborātibus infunditur. Vetus magis calfacit, & uehementius discutit. Oculorū claritati sublitum cōfert. Si uetusti non sit occasio, in uase decoquitur ad mellis crassitudinem, ut uetustatem representet.

Plin. lib. 15. ca.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
de omni oleo,
Gale. 6. simp.
pharma. capi
te. 19. 20.
Ad Paternia-
num. cap. 199.

Galen. 6. sim.
cap. 19. 20.

B A R B A R I C O R O L L.

O Leum Omphacinū sit duobus modis, Olea adhuc alba expressa. Cādīdum deterius ex Druppa (ita enim uocatur a græcis, latinisq̄, priusquā tenera esui sit) iam tū luteola, coloremq̄ demutans. Hoc uiride Caro appellat, atq̄ utilius est. Est & Omphacinum siue Omphaciū e uite, de quo post Galenus Oleum nō Omphacinū, sed dulce fieri ex Druppa scribit. Alterū uero genus, qd ex immaturis, albisq̄ premitur, & Omphacinū, & Omotribes appellari tradit, unguētis utilissimum e Phaulia, ut Theophrasto placet. Simile Omphacino sit Oleum, si oleæra mus in condituram adijciatur. Quibusdam natura soli, nō conficiēdi ratio ascribitoriam uim, qualis in Omphacino sentitur, dat, ut Hispaniensi nominato. Omphacinum, ab Omphace deducitur, unde acor ex uuis, græce appellatur Omphacium, & acerbua uua Omphax, & acerbum mel Omphacomeli, ab eodem omnia uocabulo.

Oleum ex Druppa fieri dulcissimum, Galenus testis est, utiq̄ si ex maxime Druppa fiat, nō si ex Druppa tantū. Olei probi notæ apud Galenū sunt, ut sit q̄ dulcissimū, tenuissimū, purissimū, translucidum, quodq̄ modico eius cuti superfuso plurimū sese fundat, & facile combibatur. Cuiusmodi est, inquit, quod Sabina bacca premitur. Oleū cum aqua mixtū Hydrelcon uocatur, & Chydon: quanquā posterius hoc Homero lustrationem fere significat. In Baetria iuxta

I B E R P R I M V S

iuxta flumen Ochum, effossa terra fons manauit olei, quod quidem traditum ab his qui Alexā dri res scripserunt: & Strabo credidit.

A

E X M. V E R G. C O M M.

Oleum Omphacinum, ἔλαιον ὀμφοτριβίου καὶ ὀμφάκινον, ὠμα enim cruda significat, & ὀμφάκος omnium plantarum acerbos adhuc fructus græci appellant.

Datur contra lœtalia uenena, &c. Id est, cōtra Cicutam, Nigellam, herbā Apollinarē, Mādragorā, Elateriū, &c. Nam his mixtum oleum hebetat operationem & maliciam eorum.

Cyathorum sex pondere. In cunctis, excepto probatissimo mihi codice, cotylarū sex pondus legitur. In illo Cyathorū: fuisseq; & ueterem lectiōnem, & antiquam mēsuram, testatur Plinius lib. 27. dicēs tormina pellere oleum calidū, porū cyathis sex, magisq; Ruta simul decocta.

O De O L E O siluestris Oliuæ. C A P. XXXIII.

Oleum quod siluestres Oliuæ fundunt, uehementer astringit, & ad sanorum usus secundū sibi locū uendicat. In doloribus capitis utiliter pro Rosaceo substituitur. Sudores arcet. Defluētes capillos inhibet. Furfures, ulcera capitis manantia, scabiem, leprasq; abstergit. Tardius caniciem sentiunt, qui eo quotidie perunguntur. Candidū oleum fit hoc modo. Album colore, nec anniculo uetustius, in nouū fictile oris patuli funditur, centū heminarū mensura, & sub solem media quaq; die cōcha refunditur: ex altoq; demittitur, ut assidua deuolutione, ictusq; agitatū respumet. Octaua die Fcenū græcū mūdum quinquaginta drachmarū pondere, calida aqua madefaciū, donec emollescat, in supradictum oleū deiicitur, ita ne exstillet aqua. Postea tede præpinguis Piceæ, affulatum cæse, æquale pōdus adijcitur, & trāsactis octo diebus, oleū cōcha mouetur. Si intentū finem assequatur, in uas nouum uetere uino affusum recondi debet, substratis fertulæ Campanæ corollis drachmas undecim pendentibus, cum pari Iridis pondere. Sin minus, rursus soli mandandū, & idem munus obeundum, usq; dum inalbescat.

ἔλαιον ἐκ τῆς ὀγρίας ἔλαιον

ἔλαιον λευκόν

B

B A R B A R I C O R O L L.

Oleum ex Oliua siluestri, tenue, multoq; amarius q̄ ex satiuā. Vtile hoc ad medicamenta fere tantū, de quo alio quoq; Dioscorides in ratione Oleastri & Oliuarum cōmemorat. Aristissimū hoc Galenus inter olea describit: post hoc Histricū: mox Hispanū. Pinguissimū, Libycum, & Cilicium. In pingui uero tenue Sabinū. Inter hæc media fere natura eorum, quæ Græcia, & Asia, & Cyclades mittunt. Pausanias Tithoreum e Phocide cōmendat, Hispaniensi prætulit & Histrico. Pingue lenticia, tenue, perspicuitas, & puritas consequuntur.

Gale. 6. simp. cap. 19. 20.

Oleum cādidum aliud spōre, ut quod ex Oliua adhuc alba exprimitur, Omotribes uocatum. Aliud factitium, ut de quo nunc agimus.

E X M. V E R G. C O M M.

Estillud ex Columella, alijsq; rei rusticæ scriptoribus sciendum, plures antiquis fuisse oliuities. Primam, in qua acerbum oleū exprimebatur, quod ἔστιν a tempore etiam dicebatur. Secundā, quæ ante decembris Calend. fieret in qua uiride oleū a colore, quod ex uiridi adhuc bacca exprimeretur, uocabant. Tertiam decembri mēse, quam mediam Colomella dixit, & in qua maturum oleum exprimebatur. Quartam ianuario mēse. Erantq; singularum bonitatis & usus laudes aliquę. In uiridi autem id maxime laudabatur, quod satis fluere, & precio dupli caret domini redditum. Credimus q̄ nos, ob hanc causam album exigī a Diosco. oleum, ut a uiridi ea coloris nota distingueretur, quoniam a natia uiriditate non facile ad candorem mutari id posset, & ad contrahendam olei Sycionij naturam, minus aptum esset.

Super incito ex pinguislima Picea, &c. Vt parum cognitum nobis est, quid hoc sibi uel ita uehementer suspectum; dubitamus autem deesse aliquid, aut quæ sequuntur non sine uis

D I O S C O R I D I S

Cio esse, Est enim illic nō πίνος substantiue, id est, Picee arboris, uerū adiectiue πίνινος id est, qđ ex arbore aliquid significet. Verbi causa, frondē Resinam, Onicā, aut huiusmodi quippiam. Secus Iōge author Pandectarū, qui album dici existimat, quod est uetus, quoniam quo antiquius, eo quoq; albius apparet, quod subinde quoq; lotum a Myrepticis est.

σικυώνιον ἔλαιον

De OLEO SICYONIO. CAP. XXXV.
Sicyonij componendi ratio hæc est. In lebetem oris lati stanno inducū, funditur olei albi, quod crudæ Oliuæ reddiderūt, cōgius unus, aquæ congius semis. leui id igne coquitur, leniter mouēdo. At ubi bis efferbuit, & subtracto igne refrixit, innatans oleum concha tollitur. & adiecta noua aqua conferuēscit, & reliquis ut diximus peractis reponitur. In Sicyonia maxime fieri consueuit, Sicyonij inde accepto cognomine. Calfactoriam ad quēdam usq; modum uim habet. Febri ac neruorum uitijis prodest. Fœminæ, ad commendandum faciei nitorem, eo utuntur.

EX MAR. VERG. COMM.

Dealbatum oleū Sicyonium, ideo facere Diosco. docuit, quod medicis & fœminis quondam multus esset usus eius, illis in aliquot malorū curatione, his in lenocinio formæ passim contentibus. A Sicyone antiquissima Peloponēsi urbe prope Corinthum, gentile sibi nomē inuenit, incertumq; medici ne prius, an fœminæ eius confectiōem docuerint, uoluptas ne, an necessitas. Vtebatur eo passim in aliquot malis antiquitas. Sæpeq; Paulus Aegineta aliquid eo curari præcepit. Etsi libro sexto Samium magis, non Sicyonium in usu medicinæ cōmendet.

ῥυπον θαλαντίον
ῥύπος ἐν τῇσ πα-
λάστρῃσιν
ῥύπος γυμνασίων

De Strigmentis balnearum. CAP. XXXVI
Strigmenta a balneis calfaciunt, molliunt, discutiunt. Ad sedis rimas & condilomata illinuntur. Illa uero quæ ex Palæstris puluerem sibi ascuerunt, in fordīs speciem redacta, articulorū nodos imposita adiuuāt. Ischiadicis in fots, aut malagmatis locum, calida commode sufficiuntur. Derasæ Gymnasiorum parietibus, simulacrisq; sordes calfaciunt. Tubercula, quæ agre ad coctionem perducuntur, dissipant, Desquamatis, & ulceribus senum profunt.

B A R B A R I C O R O L L.

Strigmenta
balnearū.

Strigmenta, hoc sunt, quod Græci Rhypon, & Gloeon appellant. Id quod ex Celso, Plinio que colligimus. Aurium certe sordeculas, Græci uocāt Cypsellas; Rhypon Iulius Pollux pro cera quoq; sigillari, acceptum quandoq; tradit ab authoribus. Nisi quis Typon, non Rhypon in Polluce lectitet. Sed & apud Ciceronē in epistolis ad Atticum, Rhypos scriptū est pro ceris, siue formis, unde sigilla fingeantur, fortasse a situ uetustatis, appellatas: ut Plinianum quoq; illud, & expressi cera uultus, singulis disponebātur armarijs, ut essent imagines quæ comitaretur Gentilicia funera. defuncto em aliquo torus aderat familiæ eius, quinquā fuerat, populus.

Strigmenta
Palæstrarū.

Strigmenta, hoc genus aliud non sunt, qđ puluis, qui luctantium corporibus inspergitur: et oleo superuenit. Hæc pulueris inspersio, a græcis ἀψί dicebatur, puluis ipse, conis. Cū ipso te, inquit Plautus, puluisculo conuertam. Et geometricū est Puluisculus. Palæstris quidem, optimum e Nilo Sabulum, tenuissima sui parte. Oleum quo luctaturi perfundebantur, Cēroma dicitur, & Patos. Quanquā Patos proprie cœnū est, atq; lutum cēromati permixtū: cui si sudor accesserit, Conisalon uocari, ab ijs qui nimis Attici uideri uolunt, autor est Galenus. Locus in Xystis huic operi dicatus priuatim, Conisterium appellatur Vistruuio.

Strigmenta
Gymnasiorū.

Strigmenta a Parietinis, & a Palæstra significare Plinium existimo, cū ita loquitur. Vsum olei in luxuriam uertere Græci, uitiorū omniū genitores, in gymnasijs publicādo. Notū inquit, est magistratus honoris eius octogenis sesterijs Strigmenta olei uendidisse. Item. Quin & sordes inquit, hominis, in magnis fecere remedijs, quæ fuosorum gymnasia Græcorum: quippe, ea Strigmenta molliunt, calfaciunt, complent sudore & oleo, medicinam facientibus. Item alibi. Et in gymnasijs inquit, oleū cōditur odoribus, sed uilissimis. At Strigmēta statuis gymnasiolorum

fiorū detracta in quibus Galeno autore, multū olei cōburebatur: quia puluere ingt̄ carerent. & cum erugine permista colligerentur, acrioris naturæ q̄ strigmenta cætera noscuntur.

E X M. V E R G. C O M M.

Strigmēta dicūtur, quæ oleo illitis capitibus post sudorē, una cū sudore, reliq̄sq̄ humani corporis cōcreta, & in balneorū pauimētis relicta, in eos usus quos hic docet Diosc. seruabātur.

De E L A E O M E L I T E. C A P. XXXVII.

IN Palmyris Syriæ, quod Eleomeli uocant, ex quodā caudice manat, crassius melle, sapore dulci. Bilem, cruditateq̄ detrahit, sextario cū una aquæ hemina dato. Sed qui sumpsere, torpescunt, & uiribus deficiunt: quod minime uereri oportet, uerum crebro excitare, ne ueterno pressi, somnos captent. Fit & oleum e pinguitudine furculorum Oleæ. Optimum uetus, crassum, pingue, non turbidum. Calfacit. Priuatim caliginibus oculorum illinitur. Lepras, neruorumq̄ dolores, illitum emendat.

B A R B A R I C O R O L L.

Eleomeli fuit ex ipsis Oleis in Syria, tenuius Resina, sapore Mellis: unde nomen. Nō sine nausea emollit aluū. Pugnatōres certaturi, præsumūt ex eo cyathum. Plinius in maritimis Syriæ nasci prodit, cū tamē Palmyra longe a mari absit. Forte non maritimis, sed Palmyris legendum, nisi quis locum, unde id excerpserit, non Palmyris, sed Almyris legisse Plinium existimet: quod in tanto uiro dubitare, nullo modo possum. Eleomeli medicinæ tantum gignitur. sic hoc idem quod & Aeromeli dicitur, quasi mel æthereum ac cœleste, quod sacræ literæ Manna uocent: ut nō plane cōtendo, ita certe, ppenissimus sum, ut credam. Sed ita tamen, ut intelligatur aliquod discrimen esse inter id quod mandi potuerit, & id quod medicinæ tantū nascitur. De cerpi hoc Amyntas scribit, una cū ipsis quibus hest frondibus. Et in offas, pastillosue, aut etiā orbiculos conuolui, ut cū usus postulat, in lignea pocilla, quæ Tabaitas in Asia cognomināt, aliquo humore diluatur. Plane ab exortu sideris cuiusq̄, sed nobilium maxime, ut Plinius existimat, aut cœlestis arcus, si nō sequantur imbres, sed ros tepe scat solis radīs, Medicamēta potius q̄ mella gignuntur oculis, ulceribus, internisq̄ uisceribus dona cœlestia. Quod si seruetur inquit hoc, Sirio exoriente, casuq̄ congruat in eundem diem, ut sæpe Veneris, aut Iouis, Mercurij ue exortus, non alia suauitatis ususq̄ uis mortalium malis a morte reuocandis, q̄ diuini nectaris fiat: nisi hoc ut alia fraus hominum perniciē corrumpere.

E X M. V E R G. C O M M.

Non sunt Plinio, & huic de Oleomelle omnia eadē. Plin. in maritimis, hic in Palmyris Syriæ spōte sua manare, nō leui diuersitate, dicūt. Nō multi tñ faciendū id est. Illud grauius, q̄ hic arborē ex qua manet, ignorare uidetur: Plinius Oleas eius regionis esse testatur: et hic spōte sua fluere, & opere humano ex summa arboris parte confici docet, Plinius per se tñ duobus locis manare ait. Nō uidetur hic ipse etiā sibi cōuenire. Primo enim ex quodā trunco fluere, tanquā cuius arboris hic trūcus esset ignoraret, mox humano opere cōfici etiā dixit, ἡ τῶν θαλάσῃ, quā si olearū furculos indicaret, id eñ præter cōmunē in plātis nouorū germinū significationē, priuatim ea uox Atheniēsis quondā significauit: auditaq̄ τῶν θαλάσῃ uoce, Oleæ ramulos adhuc plerūq̄ intelligimus, & si eius uocis maior sit ambitus, significetq̄, ut diximus, nouas aliarum etiā plātārū germinatiōes. Nō facile ideo est, præsertim in re tēporibus nostris ignota, unde asserat, qd̄q̄ Oleomel hoc sit indicare. Eā ob causā, nō dissimulatis, uerū præteritis quæ a Plinio dicūtur, Dioscoridē latinū fecimus. Et ut primis respōderēt ultima, nō magis Oleæ, q̄ alterius arboris furculos, et germina indicare uoluimus. Verum quęcunq̄ ea arbor sit in Syria, ex eius etiā furculis Oleū cōfici diximus, eodēq̄ in loco naturā rei magis, q̄ quod legebatur secuti, qd̄ erat λεῖνον, quę uox gręcis uingūe oē indicat, λεῖνον, una tñ mutata litera, qd̄ corticē significat, mutauimus: neq̄, ut credimus ab re. qñ ubi ex trūco arboris humor per se fluit, expressus eiusdem corticibus fluere etiā poterit. Persuasitq̄ id præcipue, q̄ cōficere uerbū, eā hominis operā indicat, quę qd̄ nondū est efficiat. Vnguē autē p se propius ad olei naturā & habitū accedit. Nec rōne caret, ut qd̄ in ima arboris pte p se fluit, in sumo lateat, nec nisi ui, et humāo ope extra hi et colligi possit: pferri ex corticib. q̄ copiosiore q̄ interiores partes in pluribus humore abun-

Veruntamen quasi Veter- (dant. Nō tamē hoc adeo decernimus, ut illud damnemus, nosi torpent. Est in ea re sciendum, in cæteris scriptoribus, et in communi eius uocis æstimatione, νεῖρον καὶ νεῖροτα, tardum, pigrum, hebesque Gręcis significare, dicicq̄ ad iter νεῖρον

A

ἡλικιαν

Plin. libro .13.
capite. 4.

B

D I O S C O R I D I S

C ad agendum, intelligendum, uigiliam, motumq; omnem alium, somno, pigritia, & languore marcentem. In medicina autem, ad capitis malum, grauemq; & profundiorē somnum contracta est eius uocis significatio. Estq; ἰνωρότης quātum inexpugnabilis somni genus: quod ex humida materia sit. Nunc satis signasse sit, quos nam hic ἰνωρότης dicat, & nos ueteri torpore diximus.

De Manna.

Melligo.

Non probamus quod aliqui suspicari se dixerunt, esse Oleomel hoc quod antiquiores græci κερμελίς, idest, aerium mel uocauerunt: id scilicet quod ab Hebræorum sacris literis acceptū ueteres Man, nunc uero passim medici Maña appellāt, qđ ex huius scriptoris historia nō facile conijcitur. Siquidem ab oleo statim de eo agitur, & quasi cōgener oleo subijcitur: in censu mellis alioqui constituendum, si mellis magis q̄ olei naturam referret. Nec dixisset hic, ex trunco arboris manare, &c. cum aerium illud mel non ex trunco manet, sed in arborum folijs inueniatur. Sunt præterea in medicina, quæ aerei mellis euentibus parum conueniant. Nec nobis pro cōperto est, quod antiquioribus quibusdam aerium mel fuit, quod nostra ætas Manna appellat, sed Melliginem (sic enim nūc uoco) sub Lucanis temporibus, in arborū folijs concretum, rosidum sapore mellis humorem, quem deinde legentes apes, mel in aluearibus suis coaceruant. Nec tamen negamus, quod nunc Manna uocant, ex eadem, uel simili substantia esse, uerum nihil, ut nobis uidetur, ad Oleomel hoc. Aerium omne id mel facit, quod incensū, et nomē mellis sola saporis dulcedine adscritum est, cum tū præcipua olei uis in eo intelligatur.

κίκινον ἔλκινον

De Cicino Oleo.

C A P. XXXVIII.

Ciciniū oleum hoc modo tēperatur. Maturi Ricini qua uoles quāritate torrido sole flaccescunt, & instrati tantisper insolantur, dū uestiens cortex fractus decidat. Caro colligitur, & coniecta in pilam diligenter tunditur. Postea in lebetem stanno illitum, qui aquam habeat demittitur, subiectoq; igni feruescunt. Et ubi insitū prorsus humorem reddiderunt, sublato ab igni uase, innatans oleum concha tollitur, & recōditur. Sed in Aegypto, ubi largior increbuit usus, longe secus fieri solet. Nam repurgatos Ricinos molæ mandat, & accurate molitos per sportulam organo exprimunt. Tū quidem ematuruerunt Ricini, cum continētibus orbiculis exuuntur. Ad pforas, & ulcera capitis manātia ualeat. Prodest inflammationibus, uuluis conuersis atq; præclusis. Item indecoris cicatricibus, & aurium doloribus. Emplastra efficaciora reddit additum. Potu aquam aluo extrahit. Ventris animalia pellit.

Plinius lib. 15.
cap. 7. li. 21, ca
pit. 4.

OLEUM CICINI, e Cici arbore fit, in Aegypto copiosa: ubi sine igni & aqua sale asperum exprimitur, cibus foedū, luminibus lucernarū ppter nimiam pinguitudinem, ineptū & obscurū.

E X M. V E R G. C O M M.

Cici quondam fruticem aliqui dixerunt, quem plures græci Crotona, & Romani Riciniū, a figura seminis appellauerunt. Rura autem nostra, & omnis fere Thuscia nunc Romanū Phaselum uocat. Illi a notissimi insecti, nos a leguminis similitudine, eandem rem indicantes. Frutex hic tantum non arborefcit, feriturq; in hortis nostra ætate, ad spectaculum magis, q̄ utilitatem, altitudine, ut hic in historia eius humilis Fici, Platanī folio, & si Plinius uirgineo, nullo discrimine tamen indicat, quando Platanus uirgineo folio a cunctis describitur. Riciniū Plinius sua ætate uocari dixit, a foedissimi insecti similitudine, quod græci κρότωνε appellat. Sunt q̄ latinis Ricini, & græcis κρότωνε insecta, quæ animalibus alijs, canibusq; præsertim inherent. sine motu, cum semel inhererint, quibus cibi nullus exitus est, colore liuido, nullis discretis mēbris, in globum continue crescentia, donec plenius saginata, post aliquot dies, sponte sua decidunt. Ideoq; nos, autore Plinio, fruticem, eiusq; semen, & ex eo confectum oleum, Ricini appellatione indicauimus. Et nisi Plinium libro. 15. sine igne & aqua in Aegypto exprimi Riciniū oleum, suspicaremur, nec sine ratione, non esse hoc loco integrum Dioscoridē, qui in prima illa huius olei confectiōe, auxilio aquæ ideo uteretur, quod ob Ricinorum ariditatem aliter

aliter exprimi nequiret, mox autem in Aegypto confici, sine humore aliquo testaretur. Oportet itaque duobus, iisdemque grauissimis authoribus, in eadem re idem testantibus, constituere uuidiores in Aegypto Ricinos quam Italia nasci, eaque unguinis sui copia, nullo etiam adperso humore exprimi posse.

A De Amygdalino oleo. CAP. XXXIX
 Amygdalinum oleum, quod aliqui Metopium uocant, hoc fit modo. Semodius ex amaris nucibus repurgatis, siccatisque, in pila ligneo pistillo leniter tunditur in offas. aquae quae ferbuerit sextarius adijcitur. & ubi dimidia hora humorem hauserit, uehementius quam antea tunditur, mox tabellis premitur, & quod digitis haesit, concha excipitur. Pressis nucibus rursus hemina aquae inspergitur, & postquam ebiberint. idem opus prosequendum. Singulas heminas reddunt singuli modij. Contra uuluarum dolores, strangulatus, conuersiones, & eorundem locorum inflammationes efficax est. Vitijs renum, calculosis, difficili urinæ, suspiriosis, lienosisque proficit. Dolores capitis, grauitatem auditus, sonos incertos, tinitusque discutit. Maculas tollit in facie, er cutem erugat cum melle, radice Lilij, & cypria Cæra, aut rosaceo Cærato. Et oculorum hebetudines emendat. Vlcera capitis manantia & furfures cum uino abstergit.

ἄμυγδαλινόν
 ἔλαιον
 μετῶπιον

O B A R B A R I C O R O L L.
 Oleum ex Amygdalis, Neopum uocari legitur in Plinio. Puto corruptam esse lectionem, & aut Netopum, ut Hippocrates, aut Metopium, ut Dioscorides legendum. Adde, quod unguentum Aegypto familiare quod Metopium appellatur: ipsum quoque de nucibus amaris conditur, ut post liquebit. Paulus Amygdalinum inquit. Metopium quoque dicitur, propter Galbanum, quod Metopum in Aegypto nominatur, & in oleum hoc adijcitur. Aetius oleum hoc etiam Halion uocari tradit, ab amaritudine, ut opinor.

Pli. lib. 35. ca-
 pite. 4.

E X M. V E R G. C O M M.
 Metopium quidam dicunt. Siue a Galbano, quod Aegyptij Metopion uocant, & huic oleo miscebatur: siue ab Aegyptiorum proprio unguento, quod amaris Amygdalis conficiebatur.

Feruentes aquae heminis duabus. Variant hic antiquiores graeci in mensura. In aliquibus enim, ut nos reddimus, heminae, in alijs, cyathi, leguntur. Fecitque hoc, ut credimus, nos in utraque hac mensura similitudo. In eo nihil nos decernimus, monemus tamen. quoniam facilis & lubricus in ponderibus lapsus fuerit, coniectura, sensusque etiam uti oportere. Nobis inclinatus, modij quidam tibus, cyathi magis, quam heminae mensuram congruere, etsi contra redditus a nobis locus fuerit.

Cypriaque Ceræ. Non Cypriam a regione uoluit dicere, sed Ceroma, siue Ceratum, quod Ligustrino unguento maceratum & subactum esset.

B

S De Balanino oleo. CAP. XL.
 Simili modo fit Balaninum oleum: quod repurgat maculas, lentigines, uaros, et cicatrices nigras. Aluum soluit. Stomacho aduersatur. Contra aurium dolorem, sonos, & tinitus auxilio est cum anserino adipe instillatum. Similis Sesamini ratio. Fit etiam e nucis Iuglande oleum, quod Carynum uocant. Eandem uim habet quam Balaninum.

καλάνινον ἔλαιον

B A R B A R I C O R O L L.
 Balaninum oleum e glade fit Aegyptia: quae Myrobalanus quoque dicitur. Simplex huius compositio diu fuit. deinde Resina quoque mixta.

Oleum Sesaminum Indis refertur acceptum, qui e Castaneis quoque atque Oryza conficiant. Oleum e iuglandibus iners, & graue corpori est, sapore ingrato. Etenim si quid in nucleo compositum, totus modus deperit. Nunc tota fere, Liguria Insubriaque promiscuum & cibus & luminum, haud magnopere molestum.

Pli. li. 35. ca. 4.

D I O S C O R I D I S

E X M A R. V E R G. C O M M.

C P Aandectarum Rhapsodus interpretatur, Balaninū, idest, de Ben: cui id studiū fuisse uide-
ri potest, nō q̄ utile consueret Rhapsodium, sed quam locuples, & ingens.
Videtur & repugnare his quæ dicuntur hic ab Dioscoride. Quæ Theophrasto dicuntur lib.
4. capite. 2. Glans a fructu nomen accepit. Folium ei simile Myrto, oblongius ramen. Illæsa ma-
gnaq; arbor est, uerum non recta, sed contorta. Fructus putamine contuso. Vnguentarij uti so-
lent, est enim boni odoris, sed fructus ipse inutilis. Aut igitur in re nunc notissima dicendū est,
conficiendi modum tantum demonstrasse Dioscoridem, aut aliā unguenti ab oleo confectio-
nem fuisse, & in altero corticis, in altero fructus usum fuisse.

De Hyosciamino oleo. C A P. XLI.

ὕσκιον ὀσμυνέ
μιον

H Yosciaminum sic fit. Semen candidum, recens ac siccum tundi-
ntr. & calida aspergitur aqua, ut in Amygdalino diximus. dum-
q; insolatur, siccata partes madidis permisceantur: hoc autem fieri opor-
tet, dū nigrescat & grauiter oleat. Mox pressum atq; excolatum recondi-
tur. Ad auriū dolores efficax est. Pessis miscetur. Ad emolliendum utile.

B A R B A R I C O R O L L.
H Yosciaminum oleū ex seminibus Apollinaris herbarum conficitur, quam Hyosciamon græ-
ci uocant. Cauendum in potu, quoniam cerebri motus faciat.

De Hyoscia-
mo herba Pl.
lib. 25. cap. 9.

E X M. V E R G. C O M M.

D E eo oleo illud tacuisse inhumanum & iniustum fuerit, quod potum, cerebri motus fa-
cit, & inter letalia semen eius in cibo sumptum numeratur.

De Oleo e grano Cnidio. C A P. XLII.

F it & e grano Cnidio purgato & tuso. Vis ei aluum soluere potu.

B A R B A R I C O R O L L.

C Nidium oleum ex Cnidio grano, idest Cnidio Cocco fingitur.

E X M. V E R G. C O M M.

D C Hamælex, quam Cneoron Theophrastus uocat, granum, Cnidium, semen est. In histo-
ria plantæ lib. 4. plenius de eo agitur.

De Cnicino. C A P. XLIII.

ὕσκιον κνίκινον

N On secus Cnicinum oleum temperatur. Cui facultas eadem est
quæ facta e Cnidio grano, uerum inualidior.

B A R B A R I C O R O L L.

Plinius lib. 25.
capite. 15.

O Leum Cnicinum, ex Cnico herba, quam celebrant Aegyptij, oleo tantum, non cibo gra-
tam. Italix ignota Plinij temporibus.

E X M. V E R G. C O M M.

C arthamum nostræ ætatis medici, Græcorum Cnicon uocant. Rura autem nostra, Cro-
cum Saracenum. De eo plenius libro quarto.

De Rraphanino. C A P. XLIII.

ὕσκιον ραφάνινον

R Haphaninum e Rraphani semine fieri solet cæterorum more.
Phthiriasis mala uoletudine contractas tollit. Scabricias cutis in
facie emendat. Ad opsonia utuntur Aegyptij.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 23. ca. 4.

R Aphaninum oleum, ex radice latinis appellata, Aegyptij Rraphanum maxime cupiebāt
serere, modo licuisset: quia & quæstus maior q̄ e frumento redibat, & minus tributi pende-
bat, nullumq; copiosius erat oleum.

V E R G.

C ontra oēs pediculos Rraphanino oleo utitur Paulus. Plinius q̄q; addit, Scorpionibus ac
Cerastris aduersari, posseq; impune tractari, si quis uel semine, uel oleo perunctus sit.

D E M E L A N T H I N O. C A P. XLV.

ὕσκιον μελάνθινον

M Elanthinum idem quod Rraphaninum potest.

BARBARI COROLL.

Melanthinum oleum, nomē habet Melanthio, quod est Gīt, quasi Nigellā uerbum e uerbo dicas. Nam Melanthenon, Anthemis est, quam modo Chamæmilon uocari frequentius animaduerto, quā Plinius utrāq; Melanthiō appellat, nisi lectio deprauata ē, qđ & crediderim.

EX M. VERG. COMM.

Nigella qualis sit, et quō colore et ordine, in purpureis uasculis conspiciatur eius semen, certius in historia ostendetur.

De Sinapino CAP. XLVI.

Tritum Sinapis semen, & calida aqua madefactū, adiecto postea oleo exprimitur. Id ad diuturnos dolores efficax est. Trāsfert humores qui in aliqua parte concreuerunt,

A D D I T I O.

De Sinapi natura & medicinis Plinius libro. 20. cap. uicesimosecūdo, & 19. capite octauo.

EX M. VERG. COMM.

Variant antiquiores græci hoc capite. Alij enim calida, alij frigida aqua Sinapim aspergunt. Nos ad molliendam, soluendamq; seminum duriciem, aptiorem calorem existimamus. Plinius in eadem confectione, etiam Dioscoridi idem nō est, & aliter conficit. In medicina etiā pluribus morbis quam hic, mederi dicit, locus est lib. 20. cap. 22.

De Myrteo CAP. XLVII.

Myrtei faciendi ratio hæc est. E Myrto nigra, siluestri, aut satiuā, foliorum mollissima quæq; tusa premuntur. Succo pares Omphacini olei portiones adiunguntur. subiectisq; carbonibus inferuescunt, donec concoquantur. Innatans oleum deraditur. Sed longe facilius hæc compositio. Tenera folia contusa coquuntur in oleo & aqua, & quod innatat eximitur. Priuatim alij deiecta in oleum folia in sole macerant. Alij prius oleum inspissant Malicorio, Cupresso, Cypiro & Iunco odorato. Efficacius est amarū gustu & oleosum, uiride, translucens, & olens Myrtum. Astringit, & indurat. Ideo medicamentis miscetur quæ cicatricem obducunt. Prodest ulceribus in capite manantibus, ambustis igni, & papularum eruptionibus. Facit ad attrita & furfures, sedis rimas, condylomata, articulos laxatos, corporis sudores, & ad omnia quæ astrictionem inspissationemq; desyderant.

BARBARI COROLL.

Myrteum oleum, & hoc e latifolia nigra, siluestriq;. Prestantius, quam Oxymyrsinem, alij Chamæmyrsinam uocant. Aliqui Acoron, a similitudine. Est enim breuis, & fruticosa, minore semine, ut docebimus. Fieri et aliter oleum Myrteum solet. Tunduntur Baccæ aspersæ calida aqua, dein coquuntur. Myrtas Cato baccas huius arboris appellat. Interest, uinū, an oleū facias. Ad uinū Baccæ in ariditate siccant, ad oleū nō siccant. Inest huic oleo uini qđā sapor, simulq; pinguis liquor, præcipua uī ad corrigenda uina saccis ante perfusis. Retinet quippe siccē, nec præter purum liquore transire patitur: datq; se liquatis cōmendatione mira quali comitē.

De Laurino CAP. XLVIII.

Laurinum fit hoc modo. Maturæ Lauri baccæ in aqua coquuntur. Liquidem ex obducto cortice quandam pinguitudinem reddunt: quæ manibus expressa, cōcha excipitur. Alij Omphacinum prius oleum Cypiro, Iunco odorato, & Calamo inspissant. deinde mollia Lauri folia concoquunt. Alij etiā Baccas, donec oleū odore cōtraxerit. Alij Styracē,

d ij

A
Pli. lib. 20. ca. 17. & 22. ca. 21.

ἐλαιον σινάπινον

μυρσίνον ἐλαιον

B

Pli. li. 23. ca. 4.
& alias de
Myrto lib. 15.
cap. 29. & 23.
cap. 9.

λάφρινον ἐλαιον

D I O S C O R I D I S

Cet Myrtū addūt. Optima Laurus ad id latifolia, et mōtana. Oleum Lauri nū utilius q̄ recētius, q̄q̄ uiridius colore, amarissimū, et acre. Vis ei exca-
factoria, emolliens. Venarū spiracula laxat. Lassitudines discutit. Oibus
neruorū uitijis, horrorib. de stillatiōibus, auriū doloribus, malis renū fri-
gore contractis, illitū non aliud iuuantius. Attñ potum, nauseam parit.

Plin. lib. 13. ca
pite. 4. de ipsa
arbore lib. 15.
capite. 39.

B A R B A R I C O R O L L.
Oleum Laurinum e Druppis inquit instituitur. Nam Druppa nō olearum modo, sed ali
as quoq̄ Baccas uocamus, gr̄cos imitant, *δρυπτις* appellantes. Quidam folium & corticem
Baccarum adhibent. Laudatur siluestris & nigra baccis. Ex Delphica uero ad acopum & ce-
rata utilissimum.

E X M. V E R G. C O M M.
Aliam huius Olei confectionem tradit Palladius lib. 2. Nempe talem. Lauri Baccas quā
plurimas & maturitate turgētes, in aqua calida bullire facies, & ubi diu ferbuerint, olei qd̄ ex
se dimiserint, super natantis undam pennis leuiter cogentibus, in uasa transfundes. Sunt aut-
em Druppę in Olca & Lauro.

Parum deinde sequax sermo est in gr̄cis, ubi nos diximus, quam manibus in conchulam
exprimentes colligunt. Quod enim est illic participium *διακρίαντες*, nullum habet sensum: i-
deoq̄ nos rem magis quam uocem secuti, sic reddidimus. Volumus tamen id tam diu legenti-
bus placere, quousq̄ ex minus corrupto codice, certior confectionis huius ratio cognoscatur.
Suspiciamus & illic uitium esse ubi legitur, Miscent aliqui Styracem, & Myrrthum, Credimusq̄
pro Myrtho frutice, Myrrham legi oportere. Styraci enim Myrrha aptius copulatur, quam
Myrrthus, & in spissando oleo maiorem uim, & frequentiore usum habet. Facilis ab altera in
alteram uocem in gr̄cis lapsus fuit. Et antiquus latinus Dioscorides, Myrrtham adhuc habet,
potestq̄ una tñ mutata litera, in hunc sensum trahi. Cuiq̄ tñ suum iudicium sit, & arbitrium.

D
χίνον λευκόν

De Lentiscino. **C A P. XLIX.**
Similis Lentiscini ratio. Nam e maturo fructu temperatur, factis pri-
us spissamentis, ut in Laurino diximus. Hoc scabiem iumentorū, ca-
numq̄ sanat. Vtilissimum pessis, acopis, et leprarū medicamētis. Sudo-
res cohibet. Nec secus Terebinthinū fieri solet, qd̄ refrigerat et astringit.

χίνον χένον
Pli. li. 15. ca. 7.
lib. 24. ca. 7. li.
15. cap. 26.

B A R B A R I C O R O L L.
Lentiscinum oleum, e Lentisco fit. Gr̄ci schinon uocant. Nam schœnos Iuncus est: de qua
uicinitate nominum sæpiusculum decipimur. Durius hoc paulo q̄ Rosaceum. ceterū eiusdem
effectus. Nec mihi plane certum est, an hic Iuncinum potius, q̄ Lentiscinum interpretari debe-
am. Quandoquidem & Iuncinum Rosaceo simillimū esse prædicant. Duobus quoq̄ locis Pli-
nius hac similitudine Rosacei, altero Lentiscinum describit, altero Iuncinum; alioquin falsum,
aut lapsum affinitate, autorem illum diligentissimum, qui putem? præsertim cum fieri possit, ut
Rosaceo sit utrunq̄; natura proximum. Nam & Therminum, quod ex Lupinis cōstat, proprie-
tatem Rosaceo sororiam habere Plinius idem testatus est.

E X M. V E R G. C O M M.
Libet hoc loco addere, Lentiscini olei diuersam ex Palladio confectionem lib. 2. his uerbis
ab eo traditam. Grana matura Lentisci, quam plurima colliges, & una die ac nocte supra se a-
ceruata esse patieris. Deinde sportam granis iisdem plenam, cuiq̄ uasculo superpones; tunc ex
eo humore qui defluxerit, supernatans oleum Lentiscinum, sicut Laurinum colligetur. Me-
mento autem, ne frigore possit adstringi, aquam calidam sæpe suffundere.

μαστόχινον λευκόν

De Mastichino oleo. **C A P. L.**
Mastichinum e trita fit Mastiche, quod contra omnia uulū ma-
la efficax est. Mediocriter calfacit, astringit, & emollit. Aduer-
sus prominentes stomahi duricias, coeliacorum, dysentericorumque cru-
ciatus, utile. Faciem emaculat, & colorem nitidum facit. Optimū in Chio

insula componitur.

MASTYCHINUM oleum e Mastiche, cuius species multæ suo loco numerabuntur. Resinam Lentiscinam Dioscorides appellat.

MISCETUR idem ceratis, quæ stomacho, celiciacis, & intestinorum torminibus imponuntur. Græce πόν τὰ ἐπὶ τὸν στόμαχον ἐπιτίπτοντα σκευήματα. &c. Qui dicendi modus, nec rei, nec scriptori huic legitimus, aut honestus est, non enim stomacho superponuntur duricies. Cum autem decerneret ille stomachi, alui, intestinorum, & iecoris inflammationibus accommodatam esse Mastychen, facile opinati sumus, ex rei & sermonis ductu, quod erat σκευήματα, quæ uox omnium generum duricies, in humano corpore significat, κρώματα, idest, Cerata, siue Ceromata legendum esse: decreuissq; hunc scriptorem subactam Mastychino oleo, ceram partibus illis imponi, contra earum partium mala, ad quæ ex uiribus suis Mastiche faceret. Indicat Paulus Aegineta his uerbis, Mastiche præsertim ex Chio insula, in secundo calefacit, & siccatur: mixtas habet uires, adstringit enim simul & mollit: ideoq; stomachi, alui, & intestinorum & iecoris inflammationibus accommodata est. Aegyptia quadam tenuis nigro colore, siccatur magis et discutit, minus autem adstringit, discutendis strumis ideo accommodata. Quæ longius commentarijs his nostris adieciimus, ut ratio mutæ uocis a nobis intelligatur: obiterq; illud testemur, confirmari ab eo, quod in hoc scriptore suspectum forte uideretur, cum ait, Mastychē adstringere simul & mollire: quod aduerbium non temere. sed ex melioribus græcis additum illic a nobis, in quibus legebatur σύρον ὁμοίως καὶ μαλακούν.

DE ratione Vnguentorum consequenter tractandum existimaui: mus. quandoquidem ea in nonnullis corporum uitijs, aut medicamentis mista, aut corpori perfusa, aut naribus obiecta, plurimum profunt. In quorum probationibus consulere nares oportet, an ea oleant, ex quibus temperantur. Optimum huiuscemodi iudicium, quod in quibusdam plane obseruari non potest, propter ea quæ admiscuntur, odore cæteris præualentia. ut in Amaracino, & Crocino, Telino, & plariscq; alijs, quæ crebra circa hæc meditatione experiri conueniet.

VNGUENTA græci myra uocant, a Myrtha, siue quasi mora, ut Chrysippus inquit, q̄ in fatua ti uino & crapula fere uti soleant unguentis. Etenim cum bellarijs & corollis Vnguenta secundis mensis inferebantur. quod & Socrates apud Xenophontem, ut meretricium accusat, ut uestem ita odorem, alium pudicas, alium impudicas decere prædicās. Lacedemonij certe unguentarios eiciebant urbe, quasi corruptentes Oleum, quemadmodum & infectores: ut qui candorem uellerum accersitis medicamentis inquinare uiderentur. Prohibuit & Solon, ne quis unguenta uenderet, Proinde Sophocles et Callimachus Veneri speculum & unguenta tribuunt, oleum Mineræ, q̄ illa uoluptati, hoc uirtuti natum esset. Primus omnium Archilochus usurpauit unguenti nomen, hoc est, Myron: & lires Homero quoq; nota fuerit, oleum, non myron appellant. Vnguenta sane, quæ non de floribus, sed de aromatis conficiebantur, Thyomata uocabant: quod & Homerus nouit: cum Thethyomenon, hoc est, delibutum eo genere Iunoni corpus fuisse cecinit. Dicuntur & Myromata, non myrisomata. Hippocrates odamenta, hoc est, aromata & suffitus appellauit. Nomen & a patria unguentis est quibusdam: ut Panathenæicon, Athenis factitari solitum, & Babylone Babylonicū. Quāq; Appollonius auctoritatem & præstantiam unguentorum non locis, aut regionibus, sed peritiæ artificum, & industriae acceptam retulit. Nam Ephesina quondam in precio habebantur: nunc exoleuere. Habebantur & Alexandrina, propter duas Reginas, opibus & luxu diffuentes, Berenicem, & Arsinoem. In Cortyna quoq; diu laudatum est Rosaceum, Berenices maioris temporibus, Cœnæthinum Adramyti modice commendabatur: postea ob Stratonicem, primum Eumenis nomen obtinuit. Syriacis, præsertimq; Telino summa fuit olim autoritas, sicut & Asiaticis e Pergamo. Vnguentarij occasione Libanotion ē Thure commendantis: quod antea nusq; fuisset. Vnguentarij

A

De Mastiche
Pli.lib.12. ca-
pite. 17.

B

*

D

d iij

Cum porro preciosum innatat in fusum uili, contra mel probum, uitioso mellis additum fides. Nec omnia sane unguenta onanibus placebant. Quin sua singulis fere partibus corporis erant dicata, ut in Baccari monstrauimus. Infames huius luxuriæ Lydi sunt, a quo Sardianum mundum, Poetæ pro unguentis capiunt. In mentione sunt & Brethyon ex Lydio, pro crasso & pro Anthino quoque acceptum. Et Sagda, siue Plagdan: etiam si Nicander in uerbo Sagdanon unguentum, sed homines effeminas & profligatos moribus intelligit: alij uero suffimenti genus. Helæi celebrant, ab inuatore dictum Plagoninon. Athenis unguenti hemina quinque pondus argenti uenibat. Aliqui decem produnt. Vnguentum frequens, ut inquit Aristoteles, caniciem oblinentibus siccitatis uitio conciliat. Icesius, qui de odoribus scripsit, unguentorum duo facit discrimina. Deliciarum, quod & Chrima, siue Chrisma dicitur. Et uulgare ac promiscuum, & fere palestris dicatum, quod Alima cognominatur, et Aloemon, & Epalelima. De quo uerbo Festus quoque apud nos: unde Aliptes, & Exaliptes, quos nostri unctores, & reuictores uocant. A grecis frequentius Coniatæ christæ, ac Paedotribæ nominatur: ut quod a limo dictum Epalima, ob uilitatem scripserunt, errauerint, etiam si media stini, non medicorum ipsi medici reungerent. Habentur & quæ sicca unguenta, hoc est, Ceromata dicuntur: ut liquida, quæ Hygromyza, foeminarum auribus expetita. Sunt & Moschata, quæ alij Moschomyza, Paulus Moschelea uocauit. In quæ sicut in Arabica quoque unguenta, genus illud quod Arnabone Paulus & Aetius appellant, queritur. Sed quid sit Arnabo, nondum comperimus. De Moscho, siue Musco diximus alibi. In multa odora menta uenit & Camphora: quam Aetius Caphura nominauit: in eo unguento quod Salca dicitur, axillis & auribus foeminarum dicato. Nam & suffimentum Moschatum in eodem Aetio legas: in quod & sandala, & Nuces Indicæ defyderantur, comitante orientali succino. Est autem Nux Indica, fructus ut Mauri putant, Palma cuiusdam Indicæ præ magnus atque pinguis, cuius oleum butyro quoque præferunt, bonitate succi. Sandalorum uero tria genera, candidum, rubrum, luteum. Camphoræ quaternæ: arboris ea gummi est. In quibusdam locis medulla non aliter prouentu magno, quam si tremotus & tonitrua multa fuerint. Initio maculis rubentibus, post uel calore solis tosta, uel ignium candescit. Inuenio & Alua, et Sarua, & Scylmatis folia, siue Scymatis odores suffumigandis domibus idoneos. Primum in eorhyniamate quod Cyriæ Romuli ascribitur. Sequens in eo, quod ad Embolarchum refertur autorem. Tertium in eo, quod Myrepicon uocatur. Scylma certe hoc etiam ad Calliblepharon probatur Aetio. Nominatur inter suffitus & Masucha, siue Masuaphion a Paulo. Sed ea compositio est, non facultas simplex aliqua. Vnguenta sane quæ cerâ, uel resinam, uel aliquid huiusmodi recipiunt, non Myra simpliciter, sed Myracopa dicuntur: quoniam similia sint acopis. Talia sunt Amaracinum, & Decamyron, a decem rebus unde constat appellatum: sicut a quinque Pentamyron.

D

De Rosaceo.

C A P.

LII.

ῥοσάκειον ἔλαιον

Rosaceum oleum sic fit. lunci odorati quinque libras et bessum tundo, & subactas aqua in duabus olei libris & quincuncem subinde mouendo coquito. Dumque percolaueris, in olei libras uiginti & quincuncem adijcito Rosas non madefactas numero mille, & manibus melle perunctis identidem moueto, sensim premens. Sinito nocte rota macerari, postea exprimito: & ubi recrementum pessum ierit, mutato uase, in craterem melle illitum recondito. Caterum Rosas quæ antea pressæ fuerunt, in labellum demittito, & affusis octo libris & quadrante spissati olei, iterum premito: eritque secundarium oleum. Quod si tertias usque, quartasue perfusiones infundens exprimere uoles, secundarium fiet, tertiarium, & quartarium unguentum. Sed quoties id feceris, uasa melle oblini debent. Si uero secundam adiectionem instituere liber, in expressum oleum, numero pari recentes Rosas nullo humore imbutas iniijcito. manibus melle præmadefactis, agitans premito: & iterum, tertio aut quarto, simili modo exprimens facito. totiesque recetis Rosas detractis unguibus immittito. si

et enim

et enim ita oleū multo ualidius. Nā septies oleū Rosarū infusionē admittit, nec amplius. Prælū melle perungatur. Oleū a succo diligenter secerni oportet, nā si minimū quid relinquat, unguentū corrūpet. Alij autem de tractis unguibus, Rosas tantū oleo macerāt in sole hoc modo. Rosæ quæ selibram pōdere æquant, in sextario olei diebus octo madescūt, & usque tertiā perfusionē quadraginta diebus insolanē, & sic oleū recōditur. Alij Calamo, aut Aspalatho prius olei spissamēta faciunt. Alij coloris causa Anchusam admiscunt, & salem, quo minus oleat. Vim astringendi & refrigerandi obtinet. Fomētis & cataplasmatibus utile. Potum soluit aluū. Stomachi odorem restinguit. Vlcera caua replet, & mulcet, quæ Cacōes the uocantur. Vlcerebus in capite manantibus, atque feruidis eruptionibus illinitur. Caput dolens eo perfunditur. Dētes inter initia doloris colui prodest. Ad genarum duricias illitum efficax est. Ad laceſſita interanea & cōcitatas uulnias utilissime subiicitur.

VBARBARICOROLL.
Nguentum Rosaceū, id est, Rhodinon Phaseli, maxime diu placuit. Commendabatur & Neapolitanū, & quod in Sepalsia Caputæ diuendebatur: ut inquit Apollonius. A quibusdam addi salem, & anchusam, & rosaceum, & Dioscorides & Plinius autores sunt. Disiunctim hoc fortasse capiendum est, cum ea sit unguenti faciendi regula, quibus anchusa adiecta est, sal uti ne addatur. Simplicissima eius mixtura diu fuit, additis Omphacio, flore Rosæ, Crocino, Cinabari, Calamo, melle, luncō, salis florē, aut anchusa, uino. Huic cādīdus colos erat. Qui macerant in sole Rosas oleo conditas, uitreis uti præcipiuntur. Vnguētū Cyrenis, e Rosa preciosissimum Theophrastus predicat: quoniam Rosa ibi odoratissima sit. Inuentum est, & Rhodomeli facere, hoc est mel, Rosaceum; & aquam Hydrosolatā appellatam recentioribus grecorū.

Plin. libro. 21.
cap. 4.

QUOXMERGCOMM.
Vod statim in ipsis foribus uitium se nobis obtulit, huiusmodi est. Iubet hic in Rosacei confectio ad olei spissamentum sumenda esse, rotundi odorati lunci pōdo quinque, & uncias octo: statimque subiicitur, sumenda pariter olei pondo duo & quincuncem: nec male, incertoue sensu hætenus, si odoratus ille rotundus luncus spissando huic oleo satis esset: & nisi quod sequitur participium *κρίσεως*, male rei responderet. Et præter hoc alterum illud participium *συνέστατον* nulla ratione oleo competere posset. Qui enim turidi oleum, & macerari aqua potest: quod duo illa participia significant. alterū enim in duris & aridis tantum fit, alterum in his solum dicitur, quorum arescit alterum, liqueſcit uero alterum, ut cum dicit Transquillus, lutum sanguine maceratum, & quotidie auditur aqua macerari farinam. Accedit, quod iniusto pondere, & mala rerum inæqualitate, in spissando humore præcipitur, maiori copia sumi quod spisset, minore autem quod spissatur. Spissatur enim oleum, spissant uero aromata, quæ si copia abundant, non spissare dicuntur, sed oleo dilui. Cogerunt postremo nos, non suspicari iam, sed pro comperto uitium hoc loco habere, quæ plura in antiquioribus aliquot grecis in spissando Rosaceo numerantur. Elenium, quam nos Inulam, angulosum odoratum luncum, & odoratum itidem Calamum. Credimusque, quod oleum statim a rotundo odorato luncō legitur, non oleum, quod greci *ῥαρον*, sed *ῥαριν* Inulam, antiquam lætionem fuisse, deesseque alia deinceps, quæ prius aqua macerata, in oleo coquenda essent. tum per colum traiecto oleo, uiginti sic spissati olei pondo, & uncis quinque inqciendas esse Rosas numero mille. &c. Quæ omnia confectura tantum nostra dicuntur, quam alijs etiam relinquentes, nihil mutauimus, suspensiones, suspensionumque causas diligentioribus ostendisse contenti.

Et quia toto hoc opere passim pōderunt mētio est, testari semel id uolumus, si quid maius, minusue, pro rei natura & necessitate dici fortē uidebitur, non ideo dammandū esse laborē hūc nostrū. Lubricus enim in antiquis ponderū, & mensurarū notis, ad uitium lapsus est. Multa etiā in antiquis grecis uarietas, & nos cōdictū fidem, nō experientiam sequimur, quā medicis relinquitur, quibus licebit semper, ex aliorū decretis, aut iterū factō rei periculo, in melius conuer-

d iij

D I O S C O R I D I S

C tere, quod ex hoc scriptore parū apposite dictum a nobis fuerit.

ἑλᾶτινον ἑλᾶτινον

De ELATINO. CAP. LIII

FRACTA Elate, tusa, & scarificata in labellum deijcitur. Omphacinū oleū triduo infundit, mox p sportulā exprimit. Verū pares esse debent utriusq; portiones. dein mūdo uase ad usū recōditur. Viribus Rosaceo proportionē respondet. Aluum tamen non mollit.

E LATINUM ē Palma fit Elara: quam nostri Palmam Abietem uocāt. Dicēda per se, in loco. Lachrymam eius in unguentis misceri tradūt, ad oleū domandū, id est, Stymmatīs uisce: huius & furculos, & lachrymam uocauimus. Abietē certe grāci arborē ipsam Elatē & Spāthen nominant: lachrymā fere Spāthen. In Theophrasto nomen huic unguento, Phoenix.

A EX M. VERG. COM M.
Columella Elate lib. xij. Cortex Palmæ appellatur.

ἑλᾶτινον ἑλᾶτινον

De MELINO. CAP. LIIII.

MELINUM oleū hoc modo temperatur. Olei congius, decē aquæ serati uncia, quæ die uno macerata coquuntur, mox in uas oris patuli oleū excolatur, & indita harūdinacea crate, aut uetusta tegete, Cotonea mala superponuntur, & uestimentis operta tantisper inibi residēt, dum malorum uires ad se oleū alliciat. Aliqui Cotonea, decem dierum spacio operimentis inuoluunt: ut cōtineatur odor, nec euanescat. Postea biduo macerata oleo, exprimūtur, oleumq; reconditur. Id uim refrigeratōriam & astringentem habet. Contra scabiosa ulcera & quæ serpunt, ac furfures, perniunculosq; effectum præbet. Exulceratis uuluis infunditur. Citatam urinam sistit inditum. Sudores cohibet. Contra cantharidas, buprestin, pinorum erucas, bibitur. Laudatur maxime quod Cotonea mala olet.

Plin. libro. 33. cap. 6.

MELINUM prælatum in Coō, cotoneis malis, & struteis fit. Quidam genus hoc, tum demū in unguentum trāsire perhibent, admixtis cyprino, sesamino, balsamo, cassia, abrotōno. Quæritur, uti ne in humidis nata sint, quæ in hoc parentur: Ideo utilissima esse quæ in Sicilia nascantur. Minus probari Strutea, quamuis cognata.

ὀνάνθινον ἑλᾶτινον

De Oenanthini compositione. CAP. LV.

OENĀTHE elabrusca, optime olēs postquā emarcuit, deiecta in Omphacinum oleum mouetur, uoluiturq;: & cum biduo manserit, exprimitur: oleum reconditur. Astringit, proximum Rosaceo effectum præbēs, sed aluum non resoluit, aut mollit. Probatissimum est quod odore Oenanthem refert.

Pli. lib. 13. ca. 1. & 23. ca. 4.

OENANTHINUM in Cypro, deinde in AEGypto, præpositum est ex Adramytto. De Oenanthē in loco agetur. Sit hoc unguentum idem cum Anthino, ab Hippocrate uocato, muliebribus malis utile, an diuersum, & Anethinum potius, non liquet. Alioquin uidetur Anthinum dici posse unguentum omne, quod ex floribus componitur lilio, narcisso, rosa, iride. Cuiusmodi maxime in Bœotica Cheronea fingeantur, cōmēdata Pausaniæ. Vinum porro Anthine, siue Anthinon, aliud est q̄ uinum Oenanthinum: ut in uua Oenanthē diximus. Vn-
guentum

guentum Oenanthion, etiam Oenantharion dici posse, testis est Paulus, qui nō eo nominatū putat, q̄ accipiat Oenanthem, cum saepe fiat sine ea, sed a uino, & floribus Lilij. Vtebantur, inquit, hoc ueteres a balneis, spargebant eo mensas, & nares linebant, & contra pestilentiam ualere iudicabatur: praesertim Possidonianum, cognomento Mesopotamites.

De Telini componendi ratione. CAP. LVI.

Foeni graeci librae quinque, Calami libra una, Cypiri librae duae, olei libris nouem: septenis diebus macerantur, quotidie ter moventur, postea premuntur. Aliqui pro Calamo, Cardamomum substituant, & Cypiri loco, Xilobalsamum macerant. Alij oleo antea his odoribus spissato, Foenum graecum macerantes exprimunt. Hoc Telinū abscessus emollit, & concoquit. Omnibus uuluarum duricijs magnopere cōuenit. Foeminis difficile parientibus subijcitur, ubi praeter excretis humoribus loci siccitatem cōtraxerūt. Sedis inflammationes lenit. Tenesmo subditum prodest. Ulcera capitis manantia, furfuresq; expurgat. Ambustis & pernionibus addita caera proficit. Vitia cutis in facie emēdat. Pigmentis ad conciliandū faciei nitorem inseritur. Eligi oportet recens, quod nō uehementer Foeni graeci odorem praeseferat, & manus abstergat, sapore ex dulci in amarum inclinato. Tale enim optimum iudicatur.

BARBARI COROLL.

Telinum e Silicula, id est, Foenograeco nomen rationemq; habet. Addebant huic & mel, & fertam campanicam, & cypirum, & mellum, & maron, & amaracū. In Telo insula etiam Menandri gratia celeberrimum. Quid sit Mellum Plinio, quod & in uina fictitia, & in Surfinum addi meminit, haud ita dum inueni. Forte non Mellum, sed mel in his locis scribendum sit. Nam Amellum, de quo & Virgilius, & Columella, frutices fert apibus gratissimos, aureo ac luteo colore; ab imo foliosos: floribus purpureis, aspero gustu; cuius radices succus egroto examini cum Amineo uino dari praecipitur. Dicitur uero Amellum, q̄ pastores eum curua legant, prope flumina Mellae: is Galliae annis est. Quoadmodum a Lemano lacu, Alemanni, ut Seruius existimat. Est & Amilla flos apud graecos autores quosdam, gallico uocabulo: herba ea quae uocatur Anthenis: siue Chamemilon: ut forte Amilla, uel idem, uel similis sit Amello, nihil asseueramus, sed in medium posuisse nihil officit.

EX M. VERG. COMM.

Id q̄ in extrema Capitis huius coronide est in graecis, σμύχον τὰς χείρας, id est, manus abstergens, eodem modo in cunctis eius gentis codicibus legitur, nec nisi manus ea uoce intelliguntur. Oborta tamē suspitio nobis est, nō χείρας. i. manus, uerū τριχας. i. capillos legi oportere. Suspitionis huius causam nobis fecit, q̄ in Foenograeci historia, & medicina, quae secundo uolumine tractabitur, idē hic scriptor ait, σμύχαι δὲ καὶ τριχας καὶ πίτυρα καὶ ἀχώρασ, quod est, abstergere Foenograeco decoctū, capillū, furfures & capitis manantia ulcera, omnia eius partis uitia, ideoq; deinceps numerata, quibus uerisimile est, nō debuisse misceri manus. Ex eadēq; ui credimus, hunc nō manus, sed capillū Foenograeco unguento abstergi praecipisse. Nisi quod in unguento est bene, quod autem in Foenograeco male legatur, sitq; illic, non hic uitium. Nobis capillum legi magis placet. Non enim uidemus, cur, solam manus cutem abstergere hoc possit, reliqui uero corporis consimilem illi nequeat. Suum tamen cuiq; iudicium sit.

De SAMPVSCHINO. CAP. LVII.

Serpilli, Casiae, Abrotoni, florum Sisymbrij, frondium Myrti, Sampluchi singulae portiones, quadam pro uiribus singulorum cōiecta tione, una tunduntur. atque is Omphacini olei modus adijcitur, qui madentium uires non euincat. Haec post quatrīdium exprimuntur, denuo alia, simili mensura & aequali tempore macerata premuntur. ita enim ualidius

A

τὴν μὲν ἑλκυσιν

Plin. 15. cap. 11.

B

σάμψυχιν
ἑλκυσιν

C lidius reddi solet. Eligi oportet Sampsuchum colore nigrū, plurimū res dolens, mediocriter acre. Vim habet acrem, calfactoriam, extenuantem. Aduersus uuluae praeclusiones, conuersionesq; efficax est. Menses & secundos partus extrahit. Vuluae strangulatus recreat. Lumborum, inguinumq; dolores lenit. Sed cum melle uti eo praestat: quādoquidem uehementi astrictione locos indurat. Lassitudines illitum discutit, in opisthonicorum, uulforumq; cataplasmata utilissime additur.

B A R B A R I C O R O L L.

Sampsuchino Calamus accessit. In Cypro, & Mitylenis optimum, ubi plurima Sampsuchus. Differt hoc Dioscoridi ab Amaracino: q; aliae res in Sampsuchinū, alie in Amaracinum quaeruntur. Dubitationem Pliniana uerba faciunt. E Sampsucho inquit, oleū fit, quod Sampsuchinum uocatur, aut Amaracinum.

VERG.
Pli. 22, cap. 22.
& 11.

Nota omnibus in quotidiano sanitatis usu Amaracus est. Eam cōmuni appellatione graeci Samfuchū neutro genere uocāt; nec certe differunt, nisi diuersarum gētiū nominibus. ut in historia eius in tertio uolumine certius patebit.

Eligito Samfuchū, qui colore nigro in uiridi sit. In cunctis fere graecis legitur. μιλύχρον. Nos meliorū codicū fidē secuti, atq; naturam rei & sensum, μιλύχλον, qd' nihil significat aliud, q̄ cōiunctos mistosq; simul colores duos. q̄ a nobis, ut legi, in uiridi nigro colore, redditū sunt. Et foetus, Adieciimus eadem fidē, & foetus, quoniam menses & secundas trahere dixit.

De Ociminī compositione. CAP. LVIII.

οκίμινον

Ociminum oleum fit ut Cyprinum. Ocimi folia detrahens librarum undecim & bessis pondo, die noctuq; uiginti olei libris macerato, premito, colato. Cumq; exhauseris quallum, rursus parē olei modum fundito, & exprimito. Vocatur autem id secundarium. nam tertiae perfusionis non est capax. Deinde recens Ocimum aequali pondere, ut in Rosaceo diximus, maceratur: & cum tanto temporis spacio maduerit, exprimitur, & oleum reconditur. Quod si in animo fuerit, ter, aut quater madefacere, semper Ocimum recens addes. Potest ex Omphacino confici, sed illo modo melius. Idē qd' Sampsuchinū potest, sed inefficacius.

E X M. V E R G. C O M M.

Quod hic a principio statim dixit, confici Ociminū oleum Ligustrino, similiter ad spissamentū & odorem olei pertinet, id est, praeparationem illā, de qua longius non multo ante egimus, breuitatisq; causa ad alterius unguenti rationem olei spissamentū, in hoc Dioscorides reiecit: patetq; id quod nullis in hoc aromatis oleū praeparat, quod alioqui cōmune omnibus fere est. Indicatq; id aperte, qd' in capitis extremo calce additū est, posse & ex acerbo oleo Ociminum fieri: quali dicat, non posse simplici oleo Ociminum fieri, sed aut spissato Ligustrini modo, aut ex maturis oliuis expresso faciendum esse. Qualis autem Ligustrini spissatio & confectio quondam fuerit, certius non multo post patebit.

De Abrotonini compositione. CAP. LIX.

αβροτόνινον

Olei Cyprini odorib. imbuti libris nouē et quincūce, foliorū Abrotoni libras octo, die noctuq; madefactas, premito. Quod si in longum tempus oleū uelis asseruari, eiectionis prioribus folijs, noua appones, & macerata exprimes. Calfacit. Ad uuluae duricias, praeclusionesq; efficax est. Menstrua & secundas pellit.

De Anethini compositione. CAP. LX.

ανήθινον

Olei libris octo & dodrante, florū Anethi libras undecim & besses maceratas, manibus premito, & recondito. Quod si iterum perfundere

perfundere uelis, recentes Anethi flores consimiliter madefacito. Vulua **A**
rum duricias emollit. Venarum spiracula laxat. Contra rigores febrium
circumitu redeuntibus auxiliatur. Calfacit enim, & lassitudines discutit.
Prodest articolorum doloribus.

EX M. VERG. COMM.
Acerbum, in aliquibus græcis in unguento hoc queri oleum, præcipitur. Sed an cōfectio
nis eius antiqua hæc ratio esset, incertum nobis. Id genus olei certe quōdam laudatissimū fuit,
& inter unguenta facile receptū. Paulus Aegineta utitur eo cōtra uigilias ad somnū. Et in ad-
stricta cute corporis, iubet eo inungi, præsertimq; ex uiridi Anetho confecto.

De Susini compositione. CAP. LXI.
Svinum, quod alij Lilinum appellant, sic temperatur. Olei librę no
uem cum quincunce, Calami librę quinque & quadrans, Myrrhæ
uncie quinque, permixto odorifero uino decoquuntur. & colato oleo,
Cardamomi tusi & coelesti aqua madefacti librę tres & semis macerantur,
premunturque. Tres librę cum semisse spissati olei assumuntur. Mille Li-
lia decerpitis folijs in latum labellum demittuntur. Iniectum oleum, mani-
bus melle punctis agitur. die noctuque cōquiescunt, & in pixidem ma-
tutinis exprimuntur. Oleum protinus ab aqua, quæ simul expressa fue-
rat, colo incerni oportet. Non enim ut Rosaceum moram tolerat. Nam
concalfactum feruet, & computrescit. Quare sæpius decapulandum. Va-
sa melle illinenda. Tenuis sal inspargendus, & si qua sordes uasis fauci-
bus hæsit, eximenda. Odoramentis iam expressis, ex quasillo in label-
lum transfusis, rursum olei prius odoribus imbuti, quod primum pon-
dus æquet, & Cardamomi tusi drachmæ decem coniunguntur. Hæc ma-
nibus scite pressa, interiecta breui mora exprimuntur. Quod profluit re **B**
purgatur. tertio eadem infunduntur, adiecto Cardamomo & sale, & ma-
nibus melle madefactis. Longe optimum erit quod prius exprimitur.
Proximum quod sequitur. Tertium locum sibi uendicat, quod nouissi-
mum prodijt. Denuo in mille Lilia euulsis folijs, expressum primo ole-
um infunditur. Tum porro prosequendum, eademque facienda ut pri-
us, addito Cardamomo, dein expresso. Et quo frequentius recentia Li-
lia maceraueris, eo ualidius unguentum efficies. Deniq; cum factum ab-
unde uidebitur, singulis compositionibus miscere conuenit Myrrhæ q̄
optimæ duas & septuaginta drachmas, & Croci decem, Cardamomi
quinque & septuaginta. Croci uero & Cinamomi pares portiones tun-
duntur, & cribrate in labellū cū aqua demittuntur. Expressumq; primo un-
guētum infunditur. & paulopost excipiuntur, uasculis siccis Myrrha, aut
gūmi antea perfusis, & Croco, melle & aqua madefactis. Eadē fiunt in al-
tera aut tertia expressione. Aliqui simplex ex Balanino, alioque oleo, et Li-
lijs componunt. Optimū esse cōstat in Phœnice, mox Aegypto factum.
Sed cū primis laudatur qd' Lilia redolet. Excalfacit. Emollit. Vuluæ præ-
clusiones laxat, & collectiones aperit. Vtilissimum ad muliebria mala.
Vlcera

D I O S C O R I D I S

C Ulcera in capite manantia, feruidas eruptiones, uaros, fursuresq; emendat. Vibices, cicatricesq; celerrime ad colorem reducit, ita ut sepe fallant. In summa, extenuat. Potum bilem per aluum extrahit. Vrinam ciet. Sed stomacho alienum est, & nauseam parit.

Plin. lib. 19. ca
p. 1.

B A R B A R I C O R O L L.

Susinum omnium tenuissimum est. Hoc & Phyllinon, & Lilion, & Lilinum & Lirinum, & Lirium (ut Galenus inquit) & Syrium quoq; uocabatur; & Cinnomyron. Vnguinosum erat hoc, & e Lilio quoq; sub diuo, sole, luna, pruina maceratū, fiebat. Ipse quoq; succus floris Lirium dicebatur, atq; mel. Lilia purpurea, oleo faciendo, maxime præferuntur, quæ in Syria & Pisdia Pamphiliæ Dioscorides commemorat. Hinc Syrium appellatū crediderim. Nūc omnes fere succi, unde Syrupi uulgo, nam Syrupa Oliuæ condiendæ genus est Columellæ. Susinum porro dicitur, a Suso, quod Lilium significat. Vnde Susa Persarū regla, ut inquit Athenæus, ob amoenitatem uocata fertur. Theophrastus Lilium Aegineticum, & e Cilicia cōmendat.

E X M. V E R G. C O M M.

Susinum. Testantur Græcorum Lexica, ex Lilijs factum unguentum, Susinum dici, nullā tamen eius nominis causam & originem docent.

Sunt qui Crininon. Manifestum hoc habet intellectum. Crina enim Lilia uocant.

Excolatoq; oleo Cardamomi tusi, &c. Græce, ἡ ἀπὸ καρδίου καὶ ἀπὸ κάρδαμου. Nos deflexo in certiorē sensum, rerū & uocum ordine reddidimus. Nulla tamē melioris co dicis fide adiuti, sed sola usus, necessitatēq; in ea coniectura: quæ quam uera sit, peritorum cen suræ æstimandum relinquamus. Nobis, ut aliquam rationē harum reddamus, uisum est, bis diuersa spissatione iubere Dioscoridem, ad Lilium unguentum præparari oleū. In prima, odo rato Calamo, & Myrrha, quæ uino prius macerata, in oleo coquenda sunt. absolutaque co. ctura, & excolato ab illis oleo. In secunda Cardamomum inijci præcepisse, & cum aliquādiu in illo oleo maduerit, exprimi, &c.

D Post hæc translatis in labrum ex fiscelli expressis aromatis, &c. Non satis certū habet ex uer borum ordine sensum, facilis tamen rei cōiectura est. Iubet enim Dioscorides, iudicio nostro, ut minore sumptu, maior olei copia spilletur, expressis semel aromatis illis superinfundi rur sus oleum, sic iterum, tertium, & quartum faciendū esse. Credimnsq; participium quod illuc est ἀρωματισμὸς, quod aromatis odoratum significat, abundare, aut pro præterito futurum le gendū esse ἀρωματισμὸν, scilicet, quod odoratum significabit, unaq; hac uoce tantum muta ta, facilis sequaxq; totius rei deinceps intellectus erit: quod signasse satis sit.

Reliquimus præterea ab hoc loco statim, quod instaurari, impleriq; a nobis nō potuit, nec debuit. Priuationis enim nulla est mensura, periculosaq; temeritate, quod sic deest expletur, fa cillimumq; omnibus erit ex græcorum codicum lectione uitium deprehendere. Numero enim plurali inceptū mēbrū, singularis numerus excipit, miscetq; adeo sensum & incerta reddit quæ sequitur, ut nihil nobis eo loco cōmodius uisum fuerit, quā relicto hiatu aliq, legētes uitiū mo nuisse, ut aut cognitū nō fallat, aut instaurādo eo felicius posthac laborare aliquis cogitet.

De Narcissini compositione.

C A P. LXII.

explicatur

Narcissini olei spissamenta ita fiunt. Sex libræ Aspalathi cum se x tante tunduntur. Olei eloti libræ septuaginta cū uncijs quinq; assumuntur. Aspalathus aqua madefactus, in tertia Olei parte coquitur, quo exempto, Calamus quinque libris & besse, cum Myrrhæ gleba con tunditur: cribratusq; ac uino ueteri odorato immistus decoquitur: simul ac autem cum ijs efferbuerit, eximitur. Refrigeratum Oleum excolatur, cuius portio in labellum mittitur, Flores Narcissi q̄ plurimi conijciuntur, qui bidui spacio, ut in Susino dictum est, permoti exprimuntur. Oleum subinde decapulandum, siquidem celerrime putredinē sentit. Valet hoc ad emolliendas uulvæ duricias, præclusionesq;: sed capitis dolores facit.

De Crocini

Narcissinum ex Narcissi flore componi, desijt Plinij ætate. Id de unguento eius dictum accipio. Nam de oleo Narcissino medicinas idem Plinius persequitur.

EX M. VERG. COMM.

Variant Græcorum antiquissimi codices, quo loco hic ait, *κρόνον ὅτι ἐπὶ τῷ τρίτῳ τῆς ἰατρικῆς*. Indicant enim alij sensum, qui sit, Aspalathum coquendum esse in tertia olei parte: quod sine caussa dictum uidetur. Cur enim. 70. pondo olei hic accipi iussisset, si tertiæ tantum partis futurus erat usus? Alij concinniozem ostendunt sensum, qui sit, ad olei tertiæ fumendam esse aquam, in aqua Aspalathum maceretur. Quæ lectione rei magis congruentē nos secuti sumus.

Non habet deinde certum pondus, quod nos diximus, Myrrhæ grumum. Intelligenda tñ in eo, ea quantitas est, quæ exigua potius quam grandis sit. Siquidem græci *χρόνον*, dicunt in sale exigua frustra, & quasi quantum summis cōtractis in unum digitis capere aliquis possit. Tota res in coniectura unguentarij posita erit.

Credimus præterea deesse olei pondus, quo loco ait. Sumito postremo ex oleo. &c. Non enim decernit quantum olei sumi oporteat. Nisi forte & hoc in eiusdē coniectura relictū fuit.

Erant & alia de Narcissi flore dicenda. Sed omnia quarto uolumine in hystoria eius copiosius dicuntur.

De Crocini olei compositione. CAP. LXIII.

Cum Crocinum cōponere uoles, prius olei, ut in Sufino diximus, spissamenta facies, eisdem ponderibus & mensuris. cuius olei, libras treis & semissem, Croci unciam unam assumes. identidem in die moueto. & sexta die quam hoc assiduo peregeris, oleum a Croco colis incernito. Eidem Croco parem olei modū adijcito. Moue triduo. Dein contusa Myrrhæ atque cribratæ drachmas quadraginta permisceto, & in pila agitans recōdito. Aliqui parem Cyprini portionem oleo aromaubus ad Crocinum imbuto adijciunt. Optimum est quod abunde Crocum spirat, in medendi usu expetitum. Proximum, quod Myrrham refert. Calfacit. Somnū allicit. Quare per saphreniticis subuenit, aut perfusum, aut naribus admotum, aut illitum. Pus mouet. Vlcerā purgat. Contra uulvæ duricias atq; præclusiones, & ulcera quæ cacœthæ uocantur prodest, cum croco, cara, medulla, duplicato olei pōdere. Concoquit enim, emollit, humectat, & perinulcet. Ad oculorum glaucitates ex aqua illinitur. Huic autem simile est Butyrinum, Onychinum, & Styracinum: quæ & si nominibus distant, uiribus & compositione cognata sunt.

CROCINUM, in solis Ciliciæ diu laudatum: mox Rhodi. Additū huic & Cinnabari, et Anchusa, & uinum. Theophrastus & ex Aegina cōmendauit.

EX M. VERG. COMM.

Inelinat animus nobis, quod in omnibus græcis pariter legitur, eidemq; Croco par olei pondus superinfundito, non sic, sed contra legi oportere: mutataq; inuicem a libtarijs, aut imperiis Medicis, oleum & Crocum fuisse. nullam enim id causam habet, rationemue, cur sic faciendum. Si quis autem multo rerum ordine legat, eidemq; oleo, par Croci pondus superinfundito, cōmunē alijs cōfectionibus causam & rationē ostendet, ut geminata scilicet Croci quantitate, maiores continue & efficaciores uires Crocinum acquirat unguentum.

Confidentius non multo post literas mutauimus aliquas, quo loco hic ait, *ἐν τῷ αἵματι τῆς κυπρίνης*, quod significat, sunt etiam, qui par Cyprinum oleum, &c. Instauratusq; a nobis certiore sensu hic locus est, *ἐν τῷ αἵματι τῆς κυπρίνης*. Quod est, sunt etiam qui ad Ligustrinum unguetum aromatis, &c. Neq; enim aliter intelligi res potest. Quemadmodum Paulo ante etiam quod erat, *ἐν τῷ αἵματι τῆς κυπρίνης*, quod est, in pila, seu mortario misceto, non pilam, mortariumue

A

Pli. 21. cap. 19.

κρόνον

B

D I O S C O R I D I S

C diximus, uerum in oleo, quod uerisimile erat, cogitantes, pro *ἴλαιον*, *ἔλαιον* factum esse. Qui enim sensus potest esse, & quis rei usus, si quis tufam et excussam cribro myrrham in mortario miscat: Quod enim mortario erat tufum, iam et cribro excussum erat, nec bene sumi, et in mortario misceri præcipiebatur, in quo non recte misceri aliquid dicitur. In tundendo enim, non in miscendo mortarij usus est. Miscetur autem oleo bene, quod tufum iam est. Nec aliter, si quis locum bene odoretur, intelligi res poterit. Barbarus in cunctis his comunem lectionem securus, qualia se illa ostendebant, talia etiam uertit.

Styracinum, id est, ex Styrace.

Butyrinum, ex butyro, quod ut apparet olim pro oleo adijciebatur, miscebaturque his quæ suppurationes adiuuabant.

Onychinum, ob Onyche in testaceo genere pisce, cuius adeps pro eodem oleo in usu erat. Indicauitque id Plinius lib. 22. cap. 6.

aspriuv

O De Cyprini spissamento & olei compositione. CAP. LXIII
 Olei Omphacini eloti pars una, aquæ coelestis dimidium, cuius una parte oleum diluitur, altera adijciendis odoramentis amiscetur. dein assumptis Aspalathi libris quinque & semisse, Calami libris sex & semisse, Myrrhæ libra una, Cardamomi libris tribus & dodrante, olei libris nouē & uncijs quinque. Aspalathus tufus & aqua affusus decoquitur in oleo, donec efferuescat. Myrrha autem uino uetere odorifero subacta, cōtususcque Calamus digeruntur in offulas, quæ exempto Aspalatho immittuntur, & ubi efferbuerint, sublato ahæno, oleum percolatur. Cardamomū tufum reliqua aqua aspersum infunditur, spatha agitur, nulla dum refrixerit interpellatione. Post hæc colato oleo, in uigintiocto libras olei, floris Ligustri, quod Cyprum uocant, sex et quadraginta libræ cum besse instillantur, quæ sufficienter madefactæ, per sportulam exprimuntur. Quod si copiosius desideretur, idem florum pondus iniectum simili modo prematur, & iterum, aut tertio si quis uelit madefacere, poterit, & ita reddetur efficacius. Eligi oportet bonum, quod cum odoris suauitate nares feriat. Aliqui Cinnamomum addunt. Calfacit. Emollit. Venarum spiracula laxat. Vulgus, neruorumque uitij conuenit. Pleuriticis, fractisque, p se, uel Cærato imistum. Malagmaris imponi solet, quæ opisthotonicis, angina laborantibus, inflammationique inguinum opitulantur. Item acopis.

Pli. li. 15. ca. 7.

B A R B A R I C O R O L L.
 Cyprinum, in Cypro commendatissimū: deinde in Aegypto. Huic et Abrotonium quidam adijciebant, Alij Panacem. Optimum postea Phœnicion, e Sidone fuit, mox Aegypto. Si non addatur Sefaminum oleum, durat quadriennio. Excitatur Cynamomo. Viris dicebatur Cyprinum & Rosaceum. Colos Cyprino candidus Theophrasto, uiridis Plinio. Precium in libras quinque. E Cypro Canopica, in ripis Nili nata, laudatissimū. Ascalonem, Iudææ proximū. In Cypro tertium. Ita mutatur sæpe autoritas. Unguentum ipsum a Theophrasto, non Cyprinum, sed Cyprus quoque dicitur. Nam Cyperinon, e Cypero, quæ Cyclades fuerunt insulæ, cōponitur, Euegricon, a Theophrasto nominatum.

E X M. V E R G. C O M M.
 Desyderatur in hoc capite certum temporis spacium, quo dimittendo in oleo flores illi essent. Idque non minus, quæ cetera monuisse oportebat. In antiquo sane Dioscoride latino, notem & diem adhuc legi, quod tempus, implendis oleo floribus, miscendisque simul uiribus, satis fore uideatur. Sed nescimus, quanta illi fides habenda sit. Qui id agent, sagaci coniectura uerentur, obseruabuntque, ne breuiore tempore, abortiuum fiat unguentum, longiore uero referueant, & uidentur humentes & succosi flores.

Quod si

Quod si copiosius facere uolueris, &c. Non caret suspitione hic locus. Credimusq; com-
paratiuum nomen *πλῆν* quod illic est, aut aliud quiddam fuisse, quod non copiam, sed effica-
ciam, & uires significaret, aut uocē aliquam deesse, quæ illi coniungeretur. Verbi causa, *δύνα-
μις*, ut esset sensus, quod si maiores uires illi addere uolueris, &c. Eo enim, non ad copiam per-
tinent quæ sequuntur, ad quas augendas uires, nō bis tantum, sed ter flores addi etiam iubet:
causamq; ipse adfert, efficacius ea ratione fieri dicens. Nihil tamē his quæ passim leguntur ad-
didimus, commentatione hac nostra, quod desiderari potuit, explentes.

De Irini spissamento.

CAP. LXV.

Spathæ quam minutissime contusæ sex libras cum beffe, in tribus &
septuaginta libris & quincunce olei, æreo uase, additis decem aquæ
heminis incoquito, quoad odorem acceperit. postea in craterē melle ob-
litum colato, ex eo aromatibus imbuto oleo, Irinum primo temperatur,
macerata Iride, ut scripsimus. Sed alia est componendi ratio. In olei septu-
aginta libris & quincunce, Xylobalsami, ut dictū est contusi, libras quin-
que & sextantem excoquito. Postea detracto Xylobalsamo nouem li-
bras & dextantem adijcito, & Myrrhæ glebam uetere uino odorato per-
fusam, & in olei odoribus imbuti quatuordecim libris tantum dema-
tusæ Iridis, binis diebus ac noctibus madefacito, strenue et uehemēter distrin-
gito. Quod si uis ualidius fieri, par pondus iterum ac tertio maceratum
exprimito. Longe optimum est, quod solam Irin olet: quale est in Perge,
in Pamphilia, & Elide Achaïæ natum. Vim habet calfactoriam, atque e-
mollientem. Crustas adimit. Sordida ulcera & putrida purgat. Confert
fœminis uulug affectionibus obnoxijis. Item inflammationibus eiusdem
atque præclusionibus. Partus eijcit. Hæmorrhoidas laxat. Contra auri-
um sonitus ex aceto, Ruta, et amaris nucibus, prodest. Diuturnis destilla-
tionibus naribus illitum, & contra græueolentia earum ulcera, quas oze-
nas uocant, auxiliatur. Aluum purgat cyathus epotus. Facit ad llei cruci-
atus. Urinam mouet. Difficileis uomitiones adiuuat, perunctis eo digi-
tis, & immixtis, uel ijs quæ ad uomitum ciendum induntur. Anginæ etiā
illinitur, aut ex aqua mulsa, gargarisatur. Item contra faucium scabriti-
am. Datur ijs qui Cicutam, Coriandrum, aut uenena Fungorum hau-
serunt.

BARBARI COROLL.

Irium Corinthi, postea Cyzici placuit: ipsa quoq; per se Iris illyrica nobile unguentum fa-
cit. Sunt qui unguentum hoc, Catirion quoq; uocent.

Pli. li. 15. ca. 2.

EX. M. VERG. COMM.

Quam hic Achaïæ Elidem dicit, Arcadiæ credimus legendum esse. Illi enim, non Acha-
iæ, altera a geographis Elis assignatur. Quæ uero Medici uiderunt, græci *ἰχάρα* nomi-
nant, relictas ab igne carbonis modo & colore crustas.

Nec sunt paulo post, Ruta & Amygdalæ a nobis instillari dictæ, nisi etiam succo & oleo in-
telligendæ. Sic em̄ hic docere multa consuevit, medicis necessitatem usus in tractatione cogno-
scendam, relinquens.

De Gleucini cōpositione.

CAP. LXVI.

Gleucinum absolute constat Omphacino, Iunco, Calamo, celti-
co Nardo, Spatha, Aspalatho, Sertulā campana, Costo, & Mus-

γλευκίον

ε ι j

D I O S C O R I D I S

Cito, circumdati interim uinaceis uasi, quod aromata uinum & oleum co-
ceperat. Tricenis diebus, bis in die mouetur. postea expressum oleum re-
conditur. Calfacit, emollit, cohibet. Rigoribus, & neruorum, uuluaq; ui-
tijs auxiliatur: omni acopo iuuantius, quippe quod emolliat.

Pli. li. 29. ca. 4.
Colu. lib. 12
cap. 51

B A R B A R I C O R O L L.
Gleucinum dictum est, quia ex musto conditur: ab alijs Mustum incoquitur, uapore len-
to. Alij permittunt, sine igne consumatur oleo mustum: alioquin non Sampsuchum tantum
admiscens, sed preciosiora quoq; odoramenta;

E X M. V E R G. C O M M.
Aleram, diuersamq; ab hac fuisse quondam Gleucini confectionē, hic ipse indicat. Et Co-
lumella libro. 12. capite. 51. copiosorem eius confectionem indicat. Postremo Plinius, qui lib. 10.
capite. 4. de Gleucino agens contra Dioscoridis decreta, astringere Gleucinum et refrigerare
dixit, aut manifesto errore, quod in re tam manifesta non facile credendum est, aut de altero
Gleucino eas uires testatus. Ea nulla haecenus in graecis inuenta a nobis est. Desyderauimus e-
tiam Musci olei, aromatūq; illorum mensuras & pondera: poterit tamen qui id nouisse cu-
piat, ex Columella eodem capite uestigia eorum aliqua odorari.

De Amaracino. CAP. LXVII.

de omphacino

Amaracinum longe optimum in Cysico fieri solet ex Omphacino
& Balanino, spissamentis e Xylobalsamo, Iunco odorato, & Ca-
lamo factis, ascitaque suauitate Costi, Amomi, Nardi, Casiae, Carpobal-
sami, & Myrrhae odoribus. Aliqui, quo preciosius fiat, Cinamomum ad-
dunt. Mel autem & uinum assumuntur, hoc in uasorum illitionem, illud
ad cogendas tusorum aromatum offas. Amaracinum calfacit. Soporem
Dmouet. Venarum spiracula laxat. Emollit. Feruorē excitat. Vrinam cit.
Putridis ulceribus ac fistulis perquam utile, necnon humētib; hernijs,
postquam medica manus operam suam impenderit. Crustas, & tetra ul-
cera, quae theriomata uocant, rumpit. Difficili urinae illita sede, & eius in-
flammationibus auxiliatur. Haemorrhoidas illitu soluit. Vuluae subdi-
tum menstruos cursus euocat. Duricias, ac utuluae tumores, discutit. Vul-
neratis neruis, laceratisq; confert, leniter astringentibus madefactum &
impositum.

Pli. li. 21. ca. 22

B A R B A R I C O R O L L.
Amaracinum duplex, uulgare, & quod priuatim componebatur in Co: cui & nomen pe-
culiare inditum Hedychrum: ideoq; seorsum agitur de utroq; quanq; non distinguat Plinius.
Laudabatur & e Melo insula, ut scribit Apollonius. Hedychrum a colore dictum uideri po-
test. quoniam Theophrastus inficit hoc tradidit radice Syria, qua Chroma uocant: unde Chro-
maus forte color nomen uulgo traxit. Quamuis & alia originem dicemus in Saxifraga. Me-
minit & herbae cuiusdam Syriae uocatae Aristoteles, quam Theodorus Suriam couertit. In Co-
lumella radix Syria, genus quoddā, ut nonnulli tradunt, Rhaphani significat. Et in carmine
Assyriam radicem uocauit, quam Zythum commendari cum Lupino macerata cecinit. Ipsi-
us quoq; Amaraci Cyzicena succo preciosum unguentum fiebat. Paucarum, ut ait Plinius,
accessione specierum, melle, salis flore, omphacio, agni folio, uel ut quidam legunt, agno, po-
lea, panace. Plinius & alij Amaracum hac parte pro Sampsucho uolunt intelligi, ex quo Ama-
racina unguenta nominentur. Seruius grammaticus, Puer fuit inquit unguentarius Amara-
cus, qui casu lapsus, maiorem ex confusione odorem creauit: unde optima inquit unguenta
dicuntur Amaracina. Alioquin Amaracus proprie Galeno & Paulo, est herba illa quae a Dio-
scoride Parthenion uocatur.

E X M. V E R G. C O M M.
VNum idemq; polus Amaracus, & Sampsuchum est, non eadem tamen ubique bonitas, &
unguenti

unguenti ex eo confectio. Neq. idem omnibus locis nomen. Omnis fere græcia Samsuchum, **A** Cyziceni, hoc ipso autore in eius historia, Siciliaq. & ut in uicino sit, Sicilia propinqua Italia, Amaracum uocant. In Cyzico & Cypro laudatissimum, probatissimumque nascitur. Et si Plinius Cyprium tantum laudauerit, communiterque tota Græcia, sed minus probatum presumq. ut supra traditum.

Quotidianum eius unguenti usum in delicijs fuisse, Lucretius indicat cum canit. Aut Amaracini blandum, Staeteq. liquorem. Et in plebe notissimum pro uerbium. Quid cum Amaracino sui? Multum & ubiq. notum hoc olus est. Rura nostra Persam, reliqua omnis fere Italia Maioranam appellat, quæ appellatio in Græciam aliquando perlata, historiaq. huius scriptoris, pro romano nomine inserta, uera esse ostendit, quæ a principio de appellationibus his dicta a nobis fuerunt. Creuisse scilicet, per tempora earum numerū, adijcentibus continue medicis, herbarijsque codicibus suorum temporum, suæque gentis, & alienas appellationes. Notum enim Italiae id nomen est, ideoque historiæ Samsuci, non a Dioscoride, sed a posterioribus additum est.

De Megalino. CAP. LXVIII.

Factitabatur olim Megalinum, sed nunc compositio exoleuit & **μεγαλινον** prorsus oblitterata est. Cuius ad historiæ complementum meminisse non fuit alienum. Mistura cum Amaracino eadem erat, sed Resina exuperabat, excellebatq. Quare leuiter emolliebat. Resina unguentis, neq. tutelæ, neq. uoluptatis gratia adijciebatur, sed coloris crassamenti q. causa. Ea tantisper coquebatur, dum desineret olere. Cuius coquendæ ratio declarabitur, dum de Resina differemus.

MEGALINUM **B A R B A R I C O R O L L.** Megalium propter gloriam appellatum ferunt, q. excusserit Telinum, ante se cantatissimū. Alij, ut a Megalio inuentore, qui Siculus, siue Atheniensis fuerit, existimant. In qua sententia & Aristophanes, & Pherecrates, & Stratis, comici Poetæ sunt. Huic nonnulli & Casiam asciscabant. Huius proprietates, ut uentiletur in coquendo, donec olere desinat. Rursus refrigeratum, odorem suū capit. Iulius Pollux & Metallicon, a Metallo Siculo inuentore celebrat. Nisi quis mendose, pro Megalio, scriptum Metallicon existimet.

EX M. VERG. COMM.

AB honore, qui unguento huic ob feliciorē eius usum a ueteribus datus est, **μεγαλινον** græci uocauerunt. Nec aliud Plinius indicauit dicēs, propter gloriam sic appellatum fuisse. Idem. Excepta, inquit, resina, Amaracino erat quondam primæ bonitatis æstimatum, mox damnatum, meliorem, & aptiorem Amaracini confectioe inuenta, qualem hic paulo ante duobus capitibus tractauit.

De Hedychroo. CAP. LXIX.

Quod Hedychroon uocāt, in Co fieri solet, eisdem præditum uiribus & misturis, quibus Amaracinum, sed suauius spirat. **ἡδύχρον**

B A R B A R I C O R O L L.

Hedychrum, & Hedychroon, a coloris hilaritate dictum, ut præfati sumus. Idem uidetur esse cum Amaracino, nisi q. nomen hoc proprie habet in Co, ubi nobilissimum. Hinc, pro uerbio locus. Nihil cum Amaracino sui, ut est apud Gelium. Inuenio & in Theriacen, requiri Hedychroon: quanquam diuersa eius compositio probatur. Andaracoron, peruerse appellant Arabes. Ingrediuntur in Hedychrum, ut græcos sequamur, asarū, amaracus, aspalathus, carium semē, calamus odoratus, iunci flos, xylobalsamum, opobalsamum, phu ponticum, cinamomum, costum, myrrha troglodytica, feniculum, spica nardi, amomum, mastiche, uinū uetus odoratum.

EX M. VERG. COMM.

Nobilissimum in Co unguentum hoc quondam fiebat. Incertum tamen, quam nam hic **εἰς**

D I O S C O R I D I S

Co dicat, an Hypocratis patriā, & Cariā quondā, autore Stephano appellatam: an in AEgypto ciuitatem eodem nomine, cuius idem meminit autor, et quam antiquiores aliquot greci, maluisse uidentur. in quibus adhuc legitur, *σκινδύμενον δὲ ἢ καὶ ἰν αἰγύπτῳ*. Quod sequentis capitis principium quadam tenus confirmare etiam uidetur, in quo uelut in continua rerū historia hic ait, *σκινδύεται δὲ καὶ ἰν αἰγύπτῳ*. quod est, conficitur in Aegypto etiam: cum tamen nec superiore capite, nec ab eo altero Aegypti Dioscorides meminerit.

Capite de oculorum medicamentis.

A coloris nitore & hilaritate Hedychroon factum huic unguento nomen est, neque in ratione nominis dubitandum. Illud potius querendum, an sic uocaretur, quia haberet ipsum, an magis, quia in alijs coloris eam hilaritatem faceret. Si cōfectio eius, & quæ id aromata, semina, multa; alia ingrediebantur a grecis tradita, diligētius expendatur, nihil erit quod ab egregia coloris bonitate laudari possit, mistisq; tam multis colore dissimilibus, gratum oculis & hilare expectari possit. Inclinat ob eam causam animus, quoniam his, qui eo inungerentur, coloris bonitatem & nitorem adderet, sic quondam ueteres id nominasse, rarumq; aut nullū eius in medicina usum fuisse, historiæ breuitas, & capitis decurratio ostendit. Nec facilis nūc coniectura est, docuerit ne tam breuiter de eo Dioscorides, an posteriores medici, quia sanādis morbis exiguas haberēt uires, quotidianosq; alios usus, ad eam breuitatem contraxerint. Galenus certe his uerbis rem absoluit in sua Isagogē. Quæcūq; autem ad meliorem uultus speciem inunguntur, qualia sunt quæ Sandiæ, & Hedychroo constāt, non medicinæ, sed fucatoriæ, & magonici lenocinii propria sunt. Quibus manifeste ostenditur, facere in homine, non habere in se coloris hilaritatem Hedychroon.

De Metopio. CAP. LXX.

μετόπιον

FIt in AEgypto unguetum, quod Metopion patrio nomine appellatur, propter Galbani mistionem. Nam lignum in quo Galbanū enascitur, Metopion uocant. Cōstat amaris nucibus, Omphacino oleo, Cardamomo, odorato Iunco, Calamo, melle, uino, Myrrha, Balsami semine, Galbano & Resina. Probatur pingue, graui odore, quod magis Cardamomum & Myrrham quā Galbanum respiciat. Calfacit uehementer, & adurit, atq; extrahit. Ora uenarum aperit. Ulcera purgat. Ad præcisos nervos, & lacertos, ad hernias putri humore contractas, efficax est. Caratis & malagmatis inseritur. Rigoribus, conuulsisq; præsertim quibus ceruix in scapulas deiecta, & retorsum cōtracta est, utile habetur. Sudores ciet. Vuluæ spiracula laxat, & eiusdem duricias discutit. In summa, molliendī naturam habet.

BARBARI COROLL.

Metopium in AEgypto, præferebatur quondam Cyprino. abstulit deinde gloriam Phœnice, hoc e uilissimis erat.

EX. M. VERG. COMM.

Non ferulam in Syria nascentem, ex qua Galbanum stillēt, Metopium in historia eius hic ait appellari, sed liquorem, siue lachrymam eius. Credimusq; ideo, non *φύλον* hoc loco, quod lignum, & materiam, uerū *ῥοήν*, quod liquorem significat, legendum esse. Nisi forte in historia, non hic uitium sit.

Sequitur mox, quod in cūstis grecis legitur, ex amaris Amygdalis, confici unguentum hoc. Quod non sic intelligendum est, ut Amygdalarum carnem credat aliquis illi misceri, uerum oleo ex illis expresso, confici hunc docere. Indicatque id, quod hic idem, in Amygdalino oleo dixit Metopium dici, quoniam scilicet priuatim in hoc unguento usus eius esset, eamque ob causam, nos certius rem indicantes, ex nucibus illis expresso oleo fieri diximus. Itēq; acerbo oleo, ut alterutrum eligi oporteat.

Non uidetur nobis deinde integer locus, ubi diximus, Emplastris additum, quas greci ab exedendo,

exedendo, septas uocant. Nec uolumus id pro certo legentibus accipi. neque enim sequax rei & sermonis ductus est. Nec accipiendi sunt hoc capite rigores in scapulas, ut non alijs etiam rigoribus hoc ipsum remedium utile sit; alijs enim rigoribus pariter proderit. Nos autem quod in Dioscoride legitur, qua debemus fide reddidimus.

¶ De MENDESIO. CAP. LXXI.
Mendesium cōstat Balanino oleo, Myrrha, Casia, & Resina. Alii μυρδίνιον
 qui tamen post singulorum pondera, Cinamomi exiguum addunt, nullo compendio. Nam quæ simul contrita non fuere, uim nullam exhibent. Similem Metopio uim obtinet, sed inferiorem multo.

BARBARI COROLL.
Mendesio colos niger: a loco ubi Mendes, hoc est, caper colitur. Veteribus inter laudatissima, & post Deliacum in Aegypto, prælatum quandoque uel Cyprino. Celebratur & Mendesium uinum ex Aegypto. Item Mendæuum, ex Thracia Hippocrati, contrâ renum uicia.

EX M. VERG. COMM.
In Aegypto fieri cōsueuisse Mendesium unguentum, & in ea Aegypti parte in qua Caper, qui Mendesios genti illi appellatur, coleretur, nomen indicat. Eiusq; rei testis Plurarchus est in libro quem scripsit, quod bruta ratione utuntur. Plinius Metopium & Mendesium, propria fuisse Aegyptiorum unguenta ostendit.

Nobis in hoc capite suspectum est, quod hic ait *μὲν τὸν κατασθμισμὸν*, significat enim singulorum per sua pondera adiectionem: cum tamen hic mox dicat, non communicare uires, quæ non fuerint simul decocta. Quibus colligere ratiocinariq; facile est, de coctura aromatiz in oleo, aliquid egisse Dioscoridem, & quod ponderis illic significationem habet, cocturæ naturam & rationem habiturum fuisse.

¶ De STACTE. CAP. LXXII.
Stacte, uocatur pinguitudo recentis Myrrhæ cum exiguâ aqua tuse, στακτὴ
 & organo expressæ. Ea perquam odorata, ac præciosa est. atque unguentum per se facit, Stacte nominatum. Maxime probatur, quæ nullam olei mistionem admisit, cuius minima portio compos est uirium plurimarum. Vim Myrrhæ calidis unguentis correspondentem habet.

BARBARI COROLL.
Stacte dictum, quoniam e stillaticia dūtaxat Myrrha fiat: colore pallido, suauitate mira, sed amaritudine præcipua. Constabat & Myrrha unguentum regibus Persicis dicatum, quod illi capite, cetera diadematis uice impositum gestabant. Sed addebatur Myrrhæ, Labyzos appellata, quam multo præciosiorem, q̃ Myrrham esse, Dinon scribit. Appellatione unguenti Aegyptij, Stacten uenire, autor est Athenæus. Hippocrates, pro eo, q̃ ex Acanthes uocatæ floribus conficitur, & Pæderos ab alijs uocatur. Olei uero Aegyptij uocabulo, idem Hippocrates Cinum significat. Vbi uero adijcitur, candidum Aegyptium, pro Libino capitur, ut Galeo placet.

EX M. VERG. COMM.
Non uidetur Theophrasto, Theophrastumq; secuti scriptoribus, & Dioscoridi huic nostro, eadē Stacte esse, nisi forte, quod in Theophrasto legitur *τὴν στακτὴν δὲ μὴν στακτὴν δὲ πλεονάζει*, non ad genera eius, sed ad partes & usus referendum sit: diuiseritq; Theophrastus, nō Myrrhæ genera, sed docuerit in expressa Myrrha primam destillationem, ad unguentum Stacten, reliquam uero Plasten, quasi ficticiam, eo q̃ conformaretur, appellari. Hic enim, & hoc capite, & mox in Myrrhæ historia, Stacten indicat, primam cum exprimitur, Myrrhæ destillationē esse, significareque hanc uocem, simplex ex ea factum, qua ratione præmonstratum est unguentum. Neque enim aliter intelligi potest eo loco, qua expressa Stacte excipitur, & mox, quæ etiā multam Stacten dat: omnia, si diligentius res expendatur, non ad Myrrham simpliciter, sed ad bonitatem, usumque eius pertinentia.

A destillando, quod græci *στακτὴν* dicunt, Stacte dicta est, significariq; ea uoce non simpliciter Myrrham, uerū ex expressa Myrrha pinguissonā eius destillationē indicat Lucretius, dicēs,

D I O S C O R I D I S

C Aut Amaracini blandū Staſteq; liquorem. Odoramento, & unguento eam coniungens. Meminit Columella etiā in carmine ſuo, cum cecinit. Et melior Staſte, ponatur Achaica Myrrha.

Quin etiā antiquorum græcorum lexica, non Myrrham, ſed τὸ ἀπὸ τῆς σμύρκης γινόμενον μύρον, Staſten diffiniunt. Ob quæ inclinatur animus, & in hoc, & alijs ſcriptoribus non Myrrhæ aliquod genus, ſed quod optimū et pinguiſſimū ex ea deſillet primum, hanc Staſten eſſe, quæ per ſe nullo alio aromate adieſto, unguentum fit. Neq; obſtat quod Plinius ait. Sudat autem ſponte prius, quam incidantur Staſten dictam. Et paulo poſt, Precia ex occaſione ementiū uaria. Staſte a ſex ad quinquaginta. Potuit enim Myrrhæ genus unū, eadem hac uoce a deſtillado facto ſignificari. Quemadmodū idem Plinius lib. 17. cap. 11. de Reſina agens ait. Hanc mares dumtaxat ferunt, & eam græci Staſten uocant, odoris grauiffimi. Ex quo facilis cōiectura eſt, non Myrrhæ tantum propriam uocem Staſten eſſe, ſed aliorū etiā liquorū lachrymarumq; ex arborum truncis deſtillatium. Quæ autem dicta a nobis hoc capite ſunt, ad unguentum, non ad Myrrhæ genus; ut certius adhuc in Myrrha oſtendimus.

De CINNAMOMINO. CAP. LXXIII.

κινναμόμινον

Cinnamominum e Balanino oleo, & Xylobalfami, Calami, Iunci odorati ſpiſſamentis, atq; Cinnamomi, & ſeminis Balfamini ſua uitate, quadruplaq; Myrrhæ ad Cinnamomum portione cōſtat. Mel ad cogēda omnia adiicitur. Laudatur acre, molli odore, plane Myrrham reſdolens, craſſum, odoratum, guſtu perquam amaro. Id non a Reſina, ſed myrrha craſſitudinem obtinuit. Reſina enim neq; amaritudinem præbet, neq; ullam odoris gratiam adiicit. Vim habet admodum acrem, amarā, & calfacientem. Itaq; ora uenarum aperit. Calfacit, diſcutit, diſſipat. Humores & ſpiritus attrahit. Caput aggrauat. Contra uulua uitiā cum duplo oleo, cæra, & medulla efficax eſt. Ita enim fere acrimonia exoleſcit, & quædam emolliendi uis contrahitur. Alioqui adurit, & præ cæteris unguentis indurat. Facit mirum in modum ad fiſtulas, & ulcera quæ putredinis uitium ſenſerunt. Item ad hernias humidiores, carbunculos, febriliū rigores, tremores, gangrænaſq; cum Cardamomo. Aduerſus ſerpentium morſus, illinitur. Scorpionum & phalangiorum icūbus cum triūs groſſis imponitur.

Plin. lib. 17. capi. 11.

Cinnamominū, quod mel accipit, odoratum ſit, a nōnullis quæritur. Precia eius prodigioſa a denarijs. 35. ad. 310.

EXMVERG. COMM.

Caret certo intellectu, quod in omnibus græcis legitur hoc capite, δόναμον δι' ἡμισφύδα ἀγρίαν ἢ ἀγρίαν ἢ ἀγρίαν, a nobis contra communem τοῦ πικροῦ. i. amari ſignificationē his uerbis. Acerrimas habet uires, calefacit, maturatq; Nec abſurdo, ut nos credimus, in mutatione eius uocis conſilio, & rei ſenſu. Paulo enim ante de amaritudine eius hic egerat. Incontinuumq; eſt, ſi quis dicat, amaras alicuius rei uires eſſe, præſertim, cū de calore, acrimonia, aperiendi diſcutiendiq; ui, & poteſtate agitur, quæ in diuerſo penitus genere a ſaporibus ſunt.

Eam ob cauſam, ex hiſtoria Cinnamomi πικτικὸν δόναμον. i. maturādi uim, pro illo πικρὸν, id eſt, amaram, in hoc caput tranſtulimus: quod q̄ bene, et ex re factum ſit, aliorum cenſuræ reſequimur, quibus licebit ſemper cum libuerit ad amaritudinem redire.

νάρδιον

De Nardini unguento. CAP. LXXIII

Ratio Nardini faciendi euariat. Nam aut Malabathrino folio, aut ſine eo fit. Complurimum autem Balanino oleo, aut Omphacino.

phacino. Iuncus odoratus spissamenti gratia adijcitur, sicuti propter odoris suauitatem Costus, Amomum, Nardum, Myrrha. Balsamū. Laudatur tenue, non acre, Nardi aut Amomi odorē referens. Vis ei extenuans, acris. Expurgat. Excalfacit. Humorem extenuat. Hoc liquidum est, nec habet strigmenti crassitudinem, nisi Resinam recipiat. Fit etiam simplex ex Omphacino oleo, Iunco, Calamo, Costo, & Nardo.

NARDINUM, Galenus spicatum Romæ dici solitum, & foeminis, præcipue diuitibus familliarum, prodidit. Nardus uero Psittica, siue unguentum, de quo mentionem literæ sacræ faciūt, probam & fidelem, & quæ adulterata nō sit, Nardum significat Hieronymo. Quidam a loco, nomen id fuisse putant Nardinum e Tarso Ciliciæ commendatissimum. Unguenti nomen est & Nardus Cyzicena, in quod tamen Nardum quandoq; non quæritur, nisi Gallicum. Ingreditur & Arnabo, Iulius Pollux, & Babylonicum Nardum, pro unguento uidetur accepisse.

Galen. lib. ij. cap. ii.

EX M. VERG. COMM.

Probatur in Nardini unguenti confectione - &c. Græce, ὡς ἀλχηρὴν ἢ λιντὴν. In foeminino genere rem indicauit, quæ ad unguentum, nulla ratione referri potest: oportetq; ad aliquid referri, quod foeminino genere non longe inueniatur. Nihil autem aptius nobis uisum est, q̃ ad Nardum, quæ nomen unguento dedit, referre: monuitq; in eo nos omniū probatissimus mihi codex, in quo non λιντὴ, sed λιντὴ legitur, quasi ignaua, & uulgaris Nardus, in unguenti confectione probetur. Quam certius adhuc describēs, acrimoniā illi abstulit, & siccæ Nardi, & ob id minus olētis, aut Amomi odore pbauit. Qualia autē hęc fuisse quondā cōiūcinus, talia etiā docemus, qd̃ sepe alias testati sumus, liberā legētib; pbādi, & impbādi nostra hęc relinquētes.

Quod autem Dioscorides ait, uariam Nardini unguenti confectionem esse, eo pertinet, ut ostendat Nardinum ideo dici, quod non uera Nardo tantū conficeretur, sed alijs etiā, quæ odore Nardo similia essent: quale Malobathrum est, quod Folium quondam dictū fuisse testati sumus: ideoq; factū fuisse, ut Nardinum aliquādo Foliatum diceretur. credereturq; a multis idē esse: cū tamen diuersa materia confectum, alterum ab altero manifesta uarietate differat.

Quod etiā in Euangelio legitur Spicatū, eandē causam habet, ut ex spica Nardi confectū, ab alijs discerneretur. Indicauitq; id Pau. Aegineta, quō loco de aurū uicij & remedijs agit, inter quæ foliatum & spicatum diuersa numerat unguenta: uerisimileq; est, ex omnibus quæ odore Nardi essent potuisse fieri, ideoq; hunc dixisse, multifariam confici Nardinū unguentū.

B

De Malabathrino.

CAP. LXXV

MAlabathrinum spissamenta Nardini habet. Insuper Myrrha additur, qua de causā calfacit, Crocino, aut Amaracino, uiribus correspondens.

μαλαβάρθρινον

MAlabathrinum succo folij eius, nullo præterea coniecto, nobile unguentum, precium in libras. 60. Foliatum quoq; appellari diximus. Quamquam dicat aliquis, Nardinum quoq; Foliatum uocari posse: quia folium Malabathri quandoq; accipiat, quod & Dioscorides in Nardino meminit, Paulus quandoq; Foliatum, pro Foliato appellat. Idem Foliatum, Spicatū, Moschaleon, & Commagenum, foeminis ad odorem tantum quæri affirmat.

Plin. lib. ij. cap. 4.

EX M. VERG. COMM.

Foliatum proprie unguentum hoc dicitur. Succo enim folij, quod idem Malobathro est, conficitur. Cætera eadem illi, & Nardino sunt.

De Iasmino.

CAP. LXXVI

Apud Persas fit, quod Iasminum cognominatur, ex albis floribus Violæ, quorum sextans, in italicum sextariū Sesamini olei demittitur, Violis ut in Lilino diximus, uicissim permutatis. Apud Persas in-

ιδρυται

D I O S C O R I D I S

Cter epulandum usurpatur odoris causa. Nam toti corpori conuenit, præsertim cum in balneas descensum est. Sed his opitulatur corporibus quæ calfactionem, laxationemq; desyderant. Grauius enim spirat, q̃ ut libenter a plæriscq; recipiatur.

B A R B A R I C O R O L L.

IAsine si quis interpretetur, Violaceū significat; quanquā Violaceum illud quod triuale est Iaron potius appellant græci. Theophrastus Leucoion. ut ipsam quoq; Violam. Aliud hoc q̃ quod Regale nominatur, a Persis conditum atq; Parthis. ij̃ forētis animæ uirus, multitudine ciborum & ebrietate natum, accersita odorum commendatione summuēt. Vnguentū hoc & Iasiminum, & Iasimeleon, & Iasine dicitur. Quæ uox admonet me, ut ex ea fere Viola cōpositum intelligam, quæ uulgo Iesiminum uocatur, distinctiones & harundineos parietes in hortis opere topiario cōuestiens, flore candido, præcipuæ suauitatis, folium in uiridi nigricās, ob longum, fastigiatum, mucrone languido, magnitudine Rosæ, sed angustum. Hoc Violæ genus Persicum, & Particum, & omnino peregrinum uocauerim, ab alba Viola, nostrate longo intervallo distās, ueteribus (ut arbitror) incognitū, saltē Italiæ. Recentiores tria Iasmes siue Iesimini genera cōstituunt, albam colore, ceruleam, & in Aegypto luteam, qualem & in Venetiā nasci modo cernimus.

E X M. V E R G. C O M M.

Florem quem omnes Iesiminum dicimus, colore candido, Violis figura non dissimilem, Violam antiqui uocabant, ignotum diu Italiæ, ut uidetur, nunc autem plæbis hortos etiā gratō odore commendantem, tam notum omnibus, ut nulla descriptione nostra indigeat. Cre-
Ddimusq; nos de eo egisse hunc scriptorem, cum cōmunis Violarū historia tertio uolumine ab eo tractatur. Numeratis enim albis, luteis, seu purpureis Violis, quæ cōmunes & notæ omnibus sunt, quartū genus colore ceruleo addidit, quæ nullæ in Violarum genere nūc cognoscūtur, necesseq; est ad Iesimini huius florem referri ceruleum colorem illum. Posteriores enim & inter eos Serapion, tria Iesimini, ex colore discrimina, & genera fecerunt, Cādidum, Luteū, quem ille Citrinum, & Ceruleum, quem celestis coloris uocat, omnes quōdam peregrinos, & Italiæ ignotos, nunc omnibus cōmunes: uidetq; Italia & habetiam non candidos tantum, sed luteos etiā Iesiminos. Nec in alio Violarum genere Iasine hæc, & Iasiminū unguentum intelligēdum est. Nam quod Palladius Violaceum docet, a græcis *ἰασμιν* dictum, ex Violis proprie nunc dictis, conficiebatur. Violasq; nos græcorum more dicimus eas, quæ primæ uer nūciantes, plures uno ramulo florent, paucis & exiguis folijs, colore triplici, candido, luteo, & purpureo, præcipui in medicina usus. Quam enim Theophrastus nigram dicit, in alio genere ab antiquis numerata est, de qua suo loco dicemus. Videntur postremo nobis male sibi inuicem respōdere, in Iesimini huius cōfectione, olei sextarium, & flores uncia duæ. Credimusq; in florum pondere uitium esse, nec tam exiguo flore, tantā olei mensuram satis posse odorari.

De M Y R R H A. C A P. LXXVII.

MYrrha lachryma est arboris, quæ in Arabia gignitur, Aegyptiæ spinæ nō dissimilis. cuius uulnere defluit lachryma in subiectas tegetes. Aliā circum caudicem concreuit. Dicitur ex his aliqua Pe-
παιδεύουσιν
γαστέρα
dialimos, præpinguis, qua expressa Staete emittitur. Aliā Gabirea, pin-
ἐργασίμη
guissima, læto & pingui solo nascens: ea copiosam sudat Staeten. Omni-
um prima est, quæ Troglodytica appellatur, accepto cognomine ab tractu, in quo prouenit, splendens, subuiridis, ac mordens. Quinetiam legitur tenuis quædam, quæ Troglodyticæ secunda est, Bdelij modo mollis, uerum odore grauiuscula, apricis nascens. Aliā Caucalis cognominatur, scabra præter modum, nigra, & retorrída. Omnium deterri-
ma, quæ Ergasima dicitur, pingui carens, cano situ obducta, acris, ad gummi

gummi imaginem uergens, & uiribus eius proxima. Improbatur Am^A minea cognomine. Ex his pastilli fiunt, sed e pinguibus pingues, & odorati, e siccioribus haud quaquam pingues, & inodorati. Minus uiribus pollet, quæ oleum non admittit, cum in pastillos digerebatur. Adulteratur macerato gummi aqua, in qua Myrrha maduerit. Eligenda est recēs, squallore obsita, leuis, undiq; concolor, quæ contracta internatos quasi ungues, cādidos & leues ostendat, minutis glebis, amara, acris, odorata, calfaciens. Superuacua & inutilis est grauis, coloris Picei. Calfacit, cohibet. Soporem gignit. Siccat, astringit. Vuluam emollit, & præclufam laxat. Menses & partus celeriter extrahit, cum Absinthio, Lupinorū cremore, uel succo Rutæ admota. Tuberculo fabæ deuorat in uetere tussis, orthopncea, in laterū pectorisq; doloribus, in alui profluuiio, & dysenteria. Rigores discutit, duabus horis ante febrium accessiones, fabæ magnitudine pota cū pipere & aqua. Subdita linguæ, liquataq; scabriciem arteriæ expolit. Et densam uocem expedit. Ventris tineas enecat. Contra grauem oris halitū manditur. Et aduersus alarum tædia cum liquido alumine illinitur. Gingiuas & dentes stabilis, colluto cum uino & oleo ore. Vulnere capitis illitu glutinat. Medetur fractis auribus, ac ossibus nudatis, peruncta cum cochleæ carnibus. Item purulentis auribus, inflammationisq; cū meconio, castorio, & glaucio. Ad uaros autem cum casia & mele illinit. Impetigines ex aceto purgat. Defluētes capillos cum Laudano, B & uino myrteo illita, firmat. Diuturnas distillationes lenit, illitis pinna naribus. Oculorum ulcera complet. Albugines tollit. Caliginem discutit. Scabriciem leuigat. Fit e Myrrha perinde atque Thure fuligo, & ut postea ostendemus, ad eadem conueniens.

M BARBARI COROLL.

Myrrha græce *μύρρα* dicitur, & Zmyrna: ob id & notis duabus, z, scribi solet a Medicis. Hanc & Myram uocat Hippocrates. Minor altitudine, sed fruticosior est Thure. Ad. v. tamen cubita crescere arborem Plinius meminit, caudice duro, intortoq; & crassiore q; hominis fura, & ab radice etiam q; reliqua sui parte, corticem leuem, proximumque Vnedoni, Andrachnæue. Folium Olusatri, quidam Oliuæ tradunt, uerum crispus, aculeatum, extremitate ut Iligneū, Theophrastus Vlmeo simile. Nisi quod suspicor, librariorum menda sit, pteleas, pro aleas contrarie scribentium. Scabrum alij, spinosumq; dixere, cætera similem Terebintho, aut Iunipero, etiā gustatu. Folium etiamnum rotundius. Veteris odorator lachryma est, ut in Vite. Prima eius partitio, ut aliam Stactem, hoc est, stillaticiam, aliam Plasten, hoc est, ficticiam a Theophrasto nominatā sciamus. Permixtam arboribus Thuris nasci tradit. Alij separatim. Sed & alijs Arabiæ locis proueniunt. E siluis quoq; laudata, quam a Troglodytis Sabæi transitu maris petunt. Satiua siluestri præfertur. Gaudet rastris & ablaqueationibus. Melior, radice nuda, refrigerataq; Falsum est, e Thuris arbore utraq; gigni. Inciditur bis, q; dēq; cū Thure tēporibus, sed a radice usq; ad ramos, qualescūt. Sudat spōte antequā incidat, Stactē uocat: cui nulla præfertur. Post hanc satiua, & in siluestri quoq; melior astitua. Regi Gebēnitarū quartas partes Myrrhē pendent. Deo nō dant, quia & apud alios nascatur. Coemptā passim, ac pluribus locis in folles confarciunt, ipsiq; unguētarij probitates digerūt odoris & pinguiudinis argumētis. Aliter nomina generū tradidit Plinius q; Dioscorides, hoc ordine. Prima Stactē, cui precium a. 1. ad. 50. Secunda satiua, cui precium summum ad. 2. Tertia siluestris. Siluestrium genera complura. Primusque inter eas locus Troglodyticæ: cuius nucleo precium ad. 15.

Plin. lib. 12. ca.
pice. 15.
Theophrast.
lib. 9. cap. 3.

C probatur pinguedine, aspectu aridiusculo, sordida, et plane barbara, acrior cæteris. Proximus Erythræ, quam intelligi Arabicam uolunt, Mineam uocant alij, preciumq; eius ad. 16. Huius species quatuor. Staëta, Atramitica, Gebeñitica, Ausiritis. In quibusdam exemplaribus non habetur Staëta, Tertius Dianitidi. Quartus Collaticæ. Quintus Sembracenæ, a ciuitate regni Sabæorum, mari proximæ. Hæc hilaritate insignis est, sed uiribus infirma. Sextus Drusitidi. Est & candida uno tantum loco: quæ in Messalum oppidum confertur. Diuersa sita prædictis, Odoraria cognomine atq; Sea, quoniã pleriq; sextam in Plinio, nō Seam legunt, haud constat: cui precium redditur ad. 14. In plenum probatio Myrrhæ, glebis exilibus, nec rorundis in concretu, albicantis succi, & tabescentis. Secunda bonitas, intus uaria. Pessima, quæ in tus nigra. Peius, si sit etiam foris. Adulteratur Lentisci glebis, & Cucumeris succo, amaritudinis causa, sicut ponderis, Spuma argenti. Reliqua uitia deprehenduntur, sapore gummi den te lentescens. Fallacissime autem Indica Myrrha, quæ ibidem quadam & spina colligitur, multo deterior: atq; hoc solum peius affert India. Nascitur & in Gedrosia, ut inquit Strabo. Argilosa uero terra, crustosaq; puenit in Arabia. Describitur a Dioscoride, & uocata Cauialis, colore atro, retorrída, *ὑπέρωρον*, conuerti, maturitate insignis. Quemadmodū & exoleta dicimus, quæ græci *ἔστωρος*, & *ἔστωρα*. Quidam corruptum locum putant & *ὑπέρωρον* legendum arbitrantur, hoc est, prædurum atq; scabrum: quod & barbara illa Mauritanij Serapionis interpretatio secuta est. Quanquã & *τὸ ὑπέρωρον*, etiam hilaris, speciosaq; transferri potest: qualem Sembracenam fuisse diximus ex Plinij sententia. Hæc inquit, ante alias hilaris est, sed uiribus tenuis. Seorsum indicabitur & herbæ genus apud nos Myrrhis & Myrrha nominatū. Itemq; apud græcos. Quanquam pro aromate illi quidem proprie non Myrrham, sed Smyrnā uocant.

E X M. V E R G. C O M M.

Diximus non multo ante, cum de Staëte unguento ageremus, uideri nobis Staëtem, pinguiorem, melioremq; expressæ Myrrhæ partem, huic scriptori esse, cum tamē Plinius Staëtem, Myrrhæ genus manifeste faciat. Et Theophrastus libro. 9. idem testari credatur: quod tam certum hoc capite nobis sit, ut nō aliter intelligi a quoquam, Staëte in medicina possit, q̃ expressæ Myrrhæ prima distillatio, et quasi pinguis flos. Aliter enim, alijsq; appellationibus a Plinio hic Myrrhæ genera numerat, numeratūq; duobus, Peliasina scilicet, & Gabirea, quas pinguis appellat, ex utraq; expressa, copiosam reddi Staëtem dicit. Quo ductu sermonis, quarumq; uocum significatione, nihil certius audiri potest. Nec aliud colligi, quam esse huic Staëtem pinguis, & primam expressæ Myrrhæ distillationem, cuius in unguentis & medicina, præcipuus & laudatissimus esset usus. Nec obstat quod Plinius ait, Sudat autem sponte, priusquam incidatur, Staëtem dictam. Id enim plenius, ut in Resina lib. 7. forte appellauit, a distillando facta appellatione, & quoniam intelligeret, ut in expressa Myrrha Staëte reliquis partibus antefertur. Sic in fluxu eius ex arbore, probari magis sponte sua, q̃ inciso arboris corrice distillantem. In multis enim naturæ hic ordo, & quasi lex est, ut quæ prima, & sponte sua fluxerit, meliora & minus sæculenta excipiantur. Quodq; & Theophrastus ait. *τὸ δὲ σμύρνον ἢ μὲν σικκὴ ἢ δὲ πλάστῃ*, id est, in Myrrha alia Staëte, id est, stillatitia, alia Plaste. i. ficticia, non satis pro comperto nobis est, ad genera ne eius, an ad artificiosam expressionem referendum sit. *πλάστῃ* enim, artificium & opus humanum habet. Siue enim fingere, siue conformare dicas, utrumq; hominis est. Confirmareq; hoc uidetur non multo post Dioscorides cum ait, fieri ex Myrrha expressiones, ex pingui odoratas & pingues. Mox ignauā, & inefficacem esse expressam, quia oleum eius *τὴν ἀνάπλεσιν*, id est, in confirmationem nō admiserit. Eodem uerbo usus, quo et Theophrastus in diuisione illa usus est. Quæ omnia longius a nobis dicta fuerūt, ut qd' Dioscoridi & Plinio idem non est, certius a legentibus agnosceretur: scirentq; omnes, huic scriptori, Staëtem primam expressæ Myrrhæ distillationem tantum esse, neq; in medicina uoce illa aliud significari.

Non sunt præterea Plinio & huic eadem generū nomina. Hic in primo ordine Pediasmon, id est, campestrem numerat, Theophrastum ut uidetur, secutus, qui de Thure & Myrrha longiorem historiam sic incipit.

Nascuntur autem Thuris & Myrrhæ arbores, aliæ in monte, aliæ ad radices montis, in priuatis agris. Ideoq; aliæ coluntur, aliæ cultura carent. Feruntq; montis excelsam altitudinem esse, siluestrem habitum, & niuib; conspergi, ex quo in planiciem profluunt flumina, quæ quoniam a græcis *πλάστῃ* dicitur, hic Pediasmon, quasi in campestri solo natam Myrrham appellauit, ut ea appellatione, a montana distingueretur.

Cæterę generū in Dioscoride appellationes, quæadmodū & suæ, Plinio incertæ nūc sunt.

Interpres

Irrepsit inter hæc genera uitium etiã. Nam quod hic ait, συλλήγεται δὲ τις καὶ λεπτή μετὰ τὴν γρωθολυτικὴν ἀριθμημένοι. &c. non λεπτή, idest, tenuis, uerum, λευκή, idest, candido colore legendum est. Sic quoque nos reddidimus, Plinio & alijs autoribus accedentes, qui inter alia candidum numerant; idque palam testatus est dicens. Est & candido uno tantum loco. Nec nos in eo tantum ueterum autoritas mouit, quam quod tenuitas, parum Myrrhæ competere uidebatur, quæ glebosa, & in offas conuoluta, longe ab ea forma abest: & quod frequentissimus toto hoc opere hic error est, ut ubi λευκόν, quod candidum est legi oporteat, illic λεπτόν, quod tenue legatur.

Quod deinde ὑπέρωρον, & nos uertimus, eorum modo quæ exoleuerunt arefcens. Non a deo difficilem habet intellectum, ut dubitandum tãtopere, in Corollario suo, de uocis eius significatione Hermolao fuerit, qui maturitate insignem conuerrens, parum proprie rem significauit. Inter cætera enim, quæ græcis ὤρα significat, & speciosus habitus est, & quasi ἀκμή dicitur ὥραϊα, quæ nec citius, nec serius in usum ueniunt. Sic Plinius Horem mel uocauit, alterum eius genus, quod præcipua tẽpestate conficeretur.

Variant antiquiores græci in ea quam erga simon dicunt, quam alij gummi, uiribus & aspectu, alij uiribus & odore referre testantur. Nos quod in pluribus legebatur, illud reddidimus.

Coniungitur huic parti statim quod omnino uitiosum est, & in quo male sequax & incertus sensus occurrit, a neutro in comune genus traictus. Idque huiusmodi est, καὶ πύσματα δὲ ἔξ αὐτῶν γίνονται ἀπὸ μὲν τῶν λιπαρῶν ὑπόδι καὶ λιπαρά, ἀπὸ δὲ τῶν ξηρῶν ἀλιπῆ καὶ οὐκ ὑπόδι. Quod totum a nobis sic redditum est. Exprimuntur omnes, quodque ex pinguibus expressum fuerit, odoratum pingueque est, quod uero ex squalenibus & aridis, nec pingue, nec odoratum. His tam aperte & tam certo sensu dispositis, nulla foeminini generis intercedente uoce, succedunt hæc statim, ἄτονον δὲ καὶ μὴ προσελθόντα ἴλαιον ἵερ τὴν ἀνάπασιν. Quod si uelit aliquis, ut res habet, latinum facere, non aliud aptius, quam si a masculino, uel foeminino nomine incipiens (comune enim illic genus est) dicat.

Infirmam, quod oleum in conformatione non acceperit. &c. Quæ uoces superioribus coniungitur, nullum indicat legitimum sensum. Nec suspicari, sed pro comperto habere uitium illic esse, oportet. Videtur autem nobis, potuisse quondam hic sensus & rei series esse, ut quoniam in Myrrha sint crassiores aliquæ parteis, doceret hoc loco Dioscorides, faciendã ex omni Myrrha Staeten, idest, exprimendã, adfusa aqua, myrrham, ut in Staete unguento præmonstratum est, seruandumque, & in pastillos conformandum quod expressum destillasset: & quoniam in Myrrha bonitas odoris, & ad sanitatem in morbis uires essent, sic expressam Myrrham alteram odoris, scilicet commendationem & usum amittere, fierique ἄτονον, infirmam & ignauam, non in uiribus ad sanitatem, sed in odore ad uoluptates, & delicias uitæ. Indicatque id, quæ subiecta statim causã est, quod oleo careat, quo, experiẽtia docuit, diutissime seruari odores, & facile citissime perituros, nisi unguine & humore eius contineantur. Testantur id Plinius, Plutarchus, mille alij, ne longiores simus. Ex hac itaque causã, facilis coniectura fuit, de infirmitate odoris agere illic Dioscoridem, neque ἄτονον forte antiquam, ueram fuisse lectionem, ἄτομον, idest, sine odore legendum esse, ut una uoce infirmitatem & rem indicaret. Conijcimus tamen hoc, non decernimus.

Quo loco deinde legitur, contra alarum dolores, cum liquido alumine pari utiliter inungitur, iniectus mihi scrupulus, non dolores forte, sed uirosus & hircinus odorem illum qui ea parte sentitur, legendum esse. Suspitioni huic nostræ causã dedit, quod hic ipse in metallis, de omni alumine agens contra ingratos alarum, & uirosos odores inungi eo præcepit, quoniam illi astringendi, & repurgandi uis sit: nunc autem Myrrha illi adiecta, non tantum uidetur ea præcipere, ut absit malus odor, quam simul etiam nouo & meliore odore qualis in Myrrha est, retum & hircinum ille delere.

B De Bœotica Myrrha. CAP. LXXVIII.
Bœotica Myrrha, dissecta radix est arboris cuiusdam in Bœotia nascens. Melior est quæ Myrrham odore representat. Vis ei calfactoria inest. Emollit, discutitque. Suffimentis commodissime inseritur.

Βοιωτικὴ μύρρα

S De Styrace. CAP. LXXIX.
Tyrax lachryma est arboris malo Cotoneæ similis. Præfertur fordescens, flauus, resinofus, albicantibus grumis, quamplurimum in

στυράξ

D I O S C O R I D I S

C sua odoris gratia permanens. qui dum mollitur, melleum liquorem reddit: qualis e Castabala urbe, Pissidia, & Cilicia deuehitur. Deterior niger, surculosus, canoq; situ obductus. Caterū lachryma inuenitur gummiū similitudine, perlucida, & Myrrhæ æmula. Verum per pauca manat. Adulteratur ligni Scobe, quam uermiculi erodentes excusserunt, melle, & Iridis crassamento, & quibusdam alijs. Alij cæram, aut adipem odoribus imbutum, flagrantissimis solibus cum Styrace subigunt, & per laxa cribri foramina in frigida aqua uermiculos exprimunt, uenundantque. Styracem hunc, quoniam in uermiculorum speciem contrahatur, Scoleciten cognominant, quem tanquam syncerum imperiti approbāt: non animaduertentes ad præcipuam odoris fragrantiam. Siquidem acer admodum est, qui adulterationis uitio caret. Styrax calfacit, emollit, & concoquit. Medetur tussi, destillationibus, raucedini, grauedini, & retusæ uoci. Vuluæ præclusæ, duriciæ laboranti conuenit. Cit mentes potu, apposituque. Aluum leuiter mollit, si exiguum cum Resina terebinthina bibatur. Miscetur utiliter discutientibus malagmatis, acopisque. Adoletur autem & igni torretur, ut fiat ex eo ueluti ex thure fuligo, ad eadem conueniens ad quæ thuris fuligo. Ex eo etiam in Syria Styracinum oleum componitur: quod calfacit uehementer, & emollit. Verum caput dolore afficit, adgrauatq; & soporem adfert.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 12. capi.
17. 25. libro. 24.
capite. 6.

S Tyracem Syria supra Phœnicem gignit, ad Gabala, siue ut Dioscorides scribit, Carabala & Maratbunta, & Cassium Seleuciæ Pieriæ cognominatæ montem. Arbor & lachryma eodem nomine est. Hæc illi ex austero iucundior. Intus arbori similitudo harundinis, succo prægnas. In eam sere per Canis ortum aduolant pennati uermiculi erodentes, ob id in Scobe fordescit. Laudatur & e Sidone, Cypro, e Creta uero minime. Ex Amano Syriæ medicis, sed unguenta rijs magis. Placet maxime purus. Improbatur colos cano situ obductus. Adulteratur Cedri Resina, uel gummi, aut amygdalis amaris: omniaq; ea gustu coarguuntur. Exit & in Pamphilia, aut Pissidia prope Selgani Lacedæmoniorum in eo tractu coloniam. Sed acrior, minusque succosus, ut Helianus autor est post Strabonem. Ibi siluam eius ligni fertilem fuisse tradunt, e quo missilia corneis similia conficerentur. Vnde ortum, ut Tonsillæ præpilatæ, quas greci alio nomine Vroscos uocāt, Styraces appellari consueuerint. Ibi caudicem uermiculus, rametq; congerit ad radicem, deinde fluit humor, & scobi se ad radicem collectæ miscent. Pars quæ nō leprosa modo, sed terrosa quoq; est, odoratio, ut inquit Strabo, est. In Aethiopia quoq; Styracem provenire scribunt. Precium optimo. 19. Qualitatem eius non unam esse, argumentum sunt cognomina in compositione medicinarum frequentia. Chrymatias. Calamitis. Aspros, hoc est (ut puto) candicans. Chrymatiam Arabes interpretantur eum, qui rarus inuentu, & gummi similis describitur. Iidem Calamitin, quanquam harundine sua mixtus, ipso nomine significatur. Pro liquido tamen accipiūt, & fastigia Styracis duo faciunt, siccum, & liquidum, confusione magna: q; aliquando liquidum Styracem pro Myrrha statim sumunt: aliquando ex eadem arbore colligi utrunq; putant, liquidum, atq; siccum. Aiunt Arabes Styracem e Syria petentes, in pellibus hircinis urere, ut odorem suorum Thuris & Myrrhæ satietatem acrimonia peregrini ligni redimant. Iidem petunt Elimæos arborē brutam Cupressu Susæ similē, ex albidis ramis, iucundi odoris accensam, & miraculo, ut inquit Plinius, historijs Claudij Celsi celebratā, cuius Parthi folia potionibus inspergant, odore Cedri. Fumum eius contra ligna alia remedio esse prædicant. Nascentur ultra Phasim, Tigrimq; in s;ibus oppidi Scinæ, in monte Scanthro. Sunt autem Elymaei Assyria gens, Susianæ Persiæ cōtermina. Petunt & in Carmanos arborem Strobū, quam uino Palmeo perfusam urunt, suffiuntq; tecta. Nidor alacut naribus

naribus ad solū iocundus reciprocatur, q̄ citra dolorē caput aggrauet, & somnū aegris cōciliet.

E X M. V E R G. C O M M.

Bonitate in eo excellit, qui rufus & pinguis. &c. Non ut in impresso sic in cæteris *ῥυπαρόν*, quod pingue significat, quod sordidum est legitur, sed una tantū & altera mutatis literis.

¶ De Bdellio. CAP. LXXX.

Bdellium, alij Bolchon appellant, alij Madelcon. Lachryma est saracenice arboris. Probatur gustu amarum, translucentum taurini glutinis in morem, intus pingue, liquefcens facile, ligni ac fordīs expers, suffitu odoratum, ungui simile. Est etiamnum Bdellij genus sordidum, nigrum, in offas conuolutum, Aspalathi odore, ex India aduectum. Desfertur etiam a petra oppido siccum, resinofum, liuefcens, sed facultate secundum. Adulteratur gummi: sed ita uitiatum non perinde gustui amaritudinem representat, nec usqueadeo suffitionibus odoratum. Calfacit & emollit. Duricias, & turgentia guttura, humidaſq; hernias discutit, cū ieiuna salua impositum. Vuluæ spiracula laxat appofitu & suffitu. Et partus, humiditateſq; omnes extrahit. Calculos potu comminuit. Vriſnam mouet. Tuffientibus, a serpente percuffis utiliffime datur. Valet adrupta, uulſa, intentas laterum membranas, & discurfantes spiritus. Malagmatis inseritur, quæ contra duricias & neruorum nodos profunt. Conuſum reſoluitur affuſo uino, aut aqua calida.

B A R B A R I C O R O L L.

Bdellium, in nomine est, ut Galenus inquit, Scythicum & Arabicum. Scythicum nigrius, resinofiusq; Arabicum translucentius et ſiccus. Vbi nos Sambracenice cōuertimus, in Dioscoride, saracenice legebatur. Sed nos Plinium ſecuti ſumus: quanquam de Myrrha commentantem. Cæterum opinionem do, utrū probent, qui hæc cognoscunt: ut obiter criticos effugiā.

E X M. V E R G. C O M M.

Antiquæ & communes Plinio Bdellij appellationes, omnes hæc ſunt, barbaræ tamen, ideo q̄ nec græcis, nec latinis, ex ui noninis certum aliquid indicantes. Solum adrobolum, a glebarum craſſitudine, nominis certam habet in græcis rationem, idemq; est, quod Plinius ait, in offas conuolutum.

Non est deinde ſcriptori huic legitima uox, Saracenice arboris lachrymam Bdellium eſſe. Quo enim tempore, hæc ille commentabatur, nullum erat Saracenorum nomen, nec niſi poſt multum tempus, mutata appellatione, Lybes ad Aethiopiam Saraceni dicti ſunt.

Non placet item, quod Barbarus mutauit Sembracenice. Licet enim inter Myrrhæ genera Sembracenam Plinius numerauit, non ideo tamen ſola nominis uicinitate mutanda uox erat, ſed numerantibus laudantibusq; Scythicum & Arabicum Bdellium Galeno & Paulo Aegineſta, ex altera duarum regionum, gentile inſtaurandum illic nomen fuerat, Scythiceque, aut Arabicæ arboris lachrymam dicendum. Quod nos tamen facere auſi non ſumus, cōtenti hætenus, legentes monuiſſe. Inclinat enim animus, utraq; legi oportere, fuiſſeq; antiquam lectionem, *σαυθικὸν καὶ ἀραβικόν*, coaluiſſeq; ſimul librariorum uitio, & medicorum negligentia, ut toto hoc opere multa alia, duarum gentium nomina. Vtorq; ad eam opinionem argumentum, quod hic in medicina utriuſq; uires, nullo gentium discrimine numerat, quod alij. Aegineſtaq; in primis poſt egerunt. Cuius lib. 6. de Bdellio hæc uerba ſunt. Mollendi utres, quæ durata fuerint, habet Scythicum & Arabicum Bdellion, præcipueq; recens, Arabicum hoc amplius, ut urinam pellat, calculos frangat, & concoctiones adiuuet, quorum priora illa duo, ab hoc ſcriptore pariter docentur.

Quod etiam non multo poſt corrupte legebatur, *παλαῖον*, antiquo latino Dioscoride monente, in quo ueræ lectionis aliqua ueſtigia nonnunquam deprehenduntur, confidentius mutauimus, diximusque, Aspalathi odore, *ἀσπαραγῶδης*. Sed hoc mihi cum alijs commune ſit, tam facile inuentu fuit.

A

Adhuc

B

Pli. li. ii. ca. 9.

f ij

D I O S C O R I D I S

De Thure. CAP. LVIII.

THus in ea gignitur Arabia, quæ thurifera cognominatur. Primum tenet in eo genere masculinum, Stagonias appellatum, suapte natura rotundum. Tale autem indiuiduum est, candidum, cum frangitur intus pingue, in suffitu statim ardens. Indicum uero fuluescit, & colore liuet. Sed rotundum industria facit. Nam in quadrangulares formas dissectum dolijs uersant, donec rotunditatem contrahat. Verum huiusmodi thus tempore flauescit, quod Atomum, aut Syagrum appellant. Secundum locum habet Arabicum, & in Smylo nascens, quod aliqui Copiscum uocant, minus multo & fuluius. Est & genus aliud cui Amymitæ cognomen est, alioqui candidum, quod dum mollietur, Mastiches more digitis cedit. Adulteratur Pini resina & gummi, quod facile deprehendi potest, siquidem suffitum gummi flammam non eiacularur, & resina in fumum euanescit, Thus uero statim ardet. Idem maleficium odor prodit. Ad calfaciendum & astringendum pollet. Oculorum caliginem discutit. Caua ulcera complet. Et ad cicatricem perducit. Cruenta uulnera glutinat. Infrinatque sanguinis eruptiones, etiam si cerebri membranis effluat. Vlcerum quæ Cacæthe uocantur, & sedis, & reliquarum partium permulcet, tritum cum eo & lacte linamentum. Formicantes uerrucas inter initia, impetigenesque, ex aceto & pice illitum tollit. Ambusta igni, pernionesque cum suillo adipe, aut anserino, & ulcera in capite manantia cum Nitro, si infricetur, sanat. Paronychijs cum melle, auribus fractis cum pice, medetur. Ad reliquos aurium dolores cum dulci uino infunditur. Inflammata a partu mammae cum Cimolia, & Rosaceo magna utilitate perunguntur. Additur ad arteriae, uiscerumque medicamenta. Prodest sanguinis excreationi potum. Sed in secunda ualitudine haustum insaniam mouet, & largius cum uino potum interficit. In fictili mūdo Thus crematur flagrante glebula succensum a lucerna, donec exuratur. Post perfectam uestionem operire oportet, usque dum restinguitur: sic enim in cineres redigitur. Aliqui ollulam æneo uase cauo circa medium perforato cingunt ad excipiendam fuliginem: ut in eius mentione mox ostendemus. Alij crudo fictili luto oblito, & in furnum indito, cremant. Fictili etiam nouo uiuacibus prunis torretur, dum non amplius bullet, aut uaporem emittat. facile enim comminuitur, quod perustum non est.

Pli. li. 12. ca. 34.

B A R B A R I C O R O L L.

THuris arboris altitudo, ad quina fere cubita, ramis frequentibus, folio Piri, sed multo minore, coloris herbacei, modo Rute, leui cortice, ut Lauro. Alij foliū Lauri, leueque piderunt. Alij Lēisco similē, etiā fructu, folio subrutilo. Nonnulli proximam Terebintho faciunt. Alij Terebinthū esse. Et hoc uisum Antigono regi, allato frutice. Sūt qui ex eadē arbore Thus, & Myrrhā manare putēt. Diodorus paruā, Aegyptiæ spinæ albæ, similē folio Salicis, flore aureo. Placet Theophrasto & Plinio sententia eorū, qui Lauro similē tradūt, quā talis arbor fuerit Sardibus studio, Regum Asiæ delubro quodā fata, Iuba Rex contorti esse caudicis, siue ut placet Sō

lino, uiminis scribit, ramis Aceris, maxime Ponti: succum Amygdalæ modo emittere, talesq; in Carmania apparere, atq; Aegypto, cura Ptolomeorum regnantium confitas. E uirgis certe ad nos commẽtibus, credi potest, matrẽ quoq; teretem, & enodi fructicare trũco. Thus col- lectum, & Myrrha quoq; Sabotam camelis conuehitur, porta una ad id patente, in delubrum Solis, quẽ Sabin uocant, armatis ibi custodibus, tabella sup̄ struem posita, descripto, quemad- modum attulerint, quantq; indicent: mercatores tabellis perlectis, precium Thure sublato, de- ponunt: idq; absentibus dominis fit. Sacerdotes partem pecuniæ tertiam Deo reponunt, reli- quum dominis redeuntibus numerat: autore Theophrasto. Thus Spontinum præter Arabiã, nullis, ac ne Arabiæ quidem uniuersæ, Commendatissimum, quod spectat ad Persas, ut Stra- boni placet. Quæterum in medio fere eius Atramyte sunt pago Sabæorum, qui caput regni est. In Sabota mõe arduo, ab hoc mansionibus octo distat regio eorum thurifera, Sabaq; appella- tur. Solum id rubrum, e lacteo traditur. Siluarum longitudo passus. C. millia, siue ut aliq; pas- sus. V. & L. millia. Terra ibi argillosa, crustacea, raris fontibus ac nitrosis, p̄ Mimeo, pro- ximum pagum euehitur, tramite uel singulis angusto. Hinc & Thus Minieum uocatur, ius in Thura, 300. esse familiarum dicunt: quæ ob id sacre dicuntur: & cum arborem uulnerant, nec foeminarum congressu, nec funerum pollui. Quidam promiscuum ius his populis esse perhi- bent in siluis. Alij per uices annorum diuidi. Duplex eius uindemia. Prior canis ortu cortice, qui pregnans & tenuissimus tenditur. Laxato, plaga non adempto, quod hæsit in arbore ferro depectitur. Ideo Corticosum. Tãra inter barbaros fides. Saucias arbores nemo custodit. Con- tra Alexandriæ, ubi Thus rude interpolatur, renouaturq; nihil tutum a fure. Autumno legi- tur, ex partu æstiuo. Hoc purissimum, & candidum, Carphiatum uocant. Sequens uindemia uerna, incisis per hyemen arboribus, Ruffum hoc exit, nec comparandum priori, Dathlathum appellant. Nouellæ arboris candidius, ueteris odoratius. In insulis melius, in Arabia suauius: quanq; in insulis nasci, negatur a Iuba Rege. Masculum Thus a specie testium uocari, sunt qui credat. Præcipua gratia mamoso, cum hærente lachryma priore consecuta. Alia miscuit se. Sin- gula hæc manum implebant, cum tardius depecteretur. Hoc modo Stagoniam, & Atomum Thus uocabat. Minores guttas Orobiã appellat. Inueniuntur tamen etiamnum guttæ quæ denariorum. 33. p̄odus equent. Conuehentibus Thura, capitale est digredi uia. Decimas Deo mensura, non pondere sacerdotes Solis accipiunt: nec ante mercari licet. Inde impẽsæ publicæ tolerantur. Nam et benigne certo dierum numero, Deus hospites pascit. Euehi nõ potest, nisi per Gebanitas. Horum Regi penditur uectigal. Caput eorum Thomã, abest a Gaza, nostri lit- toris Iudææ oppido. 30. 38. millia passu, quod diuiditur in māsiones Camelorum. 62. Thure q conuehant commutant. Si quid in itinere opus est, queri in singulos camelos sumptus. Denari- um. 633. ad nostrum litus colligit: precium optimi, siclorum. 6. secundo. 12. tertio. 14. Refina Picæ, nõ quacunq; adulteratur. Sed gemma ea quæ interuenit ei, tam similis Thuris, ut mixta uisu discerni non queat, & inde fraus. Laudatur in Thure candor, amplitudo, fragilitas. neu dentem recipiat, potiusq; in micis frangatur. Omnia hæc cum Theophrasti, tum Plinij tem- poribus. Thus aut a uerbo græco, deos, aut sacrificiũ significante, flectitur: aut certe a tussis gle- bis, ut tunc latine scribi debeat. Porro cum dicat in fastis Ouidius, Thura nec Euphrates, nec miserat India Costum, uideri potest aliunde, q̄ ex Arabia in urbem comportari solitum. forte quoniam in Carmania quoq; nascebatur, unde ad nos inuehi non poterat: nisi transmissio amne illo: aut certe quia Chara oppidum Arabiæ nundinarium, haud procul Euphrate situm erat sinu Persico.

E X. M. V E R G. C O M M.

N Villas, qd̄ huiusmodi est sectiones habet. Græce, ἡ δὲ τοιοῦτος ἄσμος, manifesta signi- ficatione uocis eius, in cunctis quæ secari nequeat, aut nunq; secta fuerint. Estq; Dioscoridi sen- sus. Thus, qd̄ natiuam habet guttæ rotunditatem, carere sectionibus. Diciq; ob id atomum, et testiculorum figura masculum appellari, primèq; bonitatis esse, qm̄ qd̄ uoluntate, aut, ut Theophrastus ait, sectione in rotunditatem conformatum fuerit, in tãto bonitatis honore nõ fit, & alijs ab illo differat notis. Prima em̄ Thuris laus est in eo, qd̄ sponte sua, rupro arboris cortice fluxit, & stillicidij rotunda forma, in arbore pependit. Quapropter & Stagonias. i. stillicidiare dictũ est, ὀσάνας enim græci aquarum stillicidia dicunt. Eoq; tota res pertinet, ut osten- dat Dioscorides, quod huiusmodi fuerit Thus, nullo artificio hominis, sed spõte sua ea for- ma factum uideri. Quod etiam tale non erit, adulterinum habendum.

Vocantq; id Stageron, aut Entomon. &c. ἄσμος ἢ σίκερος καλούμενος. Apertum uitium est. Qui em̄ potest hoc loco atomum Thus dici, qd̄ in alio genere paulo ante decretũ est. Aut quã

A

Theoph. lib. 9. cap. 4.

B

D I O S C O R I D I S

C sectionibus conformatum non dicitur: quod hic testatur in quadrangula figura secari, coniectumque in fictile, usque dum rotundetur, uolutari. Videor igitur constitui posse, non ἀτμος, sed contraria significatione ἰντομον legendum esse, ut rei conueniat nomen.

Et quoniam hic ait, in quadrangula fragmenta secari, sectionis etiam in nomine significatio sit. Indicaui id nobis Theophrastus, qui de hac ipsa re agens, eadem uoce usus est, dicens, ὅτι αὐτὸν ἂν βούληται ποιεῖν ἰντομόν.

Varie præterea legitur, quæ in græcis aliquot huic coniuncta uox est. σάκρον, in alijs, hisque melioribus, stageros inuenta, habetque prima illa a Syagro Arabie promontorio, secunda a destillando rationem. Nobis in ancipiti, potior uisa quæ a destillando facta est. Videtur enim hic duo Thuris genera contrarijs appellationibus, aut diuersis saltem inter se discreuisse, cum prius illud Stagoniam & Atomum, secundum uero hoc, Entomum & Stageron uocari dixit. Differt autem Atomon, & Entomon, manifesta contrarij habitus significatione. Stagonia uero, a Stagero, quo a stillatio stillicidium. Optionem tamen in Stagero legentibus relinquitur, hoc ne malint, an ab Arabia promontorio Syagron, ita tamen, ut non Syagron, sed Syagrium gentilis nominis adiectiua forma legendum esse id sciant.

Quod sequitur deinde, in secundo bonitatis ordine. Orobias dictum, a quantitate nomen inuenit, & quod minoribus guttis concreascit erui, semen non excedentibus, sic appellatum est.

Quod autem illi constitutum est, καὶ ὁ ἴν σμίλω, ut fere in omnibus, siue ut in melioribus, καὶ ὁ μιλω legatur, diuersam coloris, aut loci in quo nascitur rationem habet. Nobis inclinatum animus, ut a colore sic dictum fuisse putemus: quando hic statim subiicit, quantitate minimum esse hoc Thus, & κισσέτιον, idest, ruffo colore, quarum uocum altera Orobias, altera melino, idest, luteo colori respondere uidetur, cui idem esse credimus, quod hic melioron.

Quid Copiscus significet, incertum nobis est. Nisi adulterinum ea uoce indicauerit Dioscorides, κοπίς enim græcis ψεύδεται, idest, mentiri significat.

Contra incipientes formicas, & impetigines cum aceto & pici inungitur, &c. In plerisque græcorum cum Rosaceo inuenitur, triaque deinceps numerata sunt, acetum, rosaceum, & pix. Et si Paulus ægineta capite de formicis, his aceto tantum utatur.

D Coacti sumus non multo post, negationem illic restituere, ubi de cremando Thure hic ait. In quo nunquam satis admirari alios interpretes possum, qui non senserint, cum præcipiat Dioscorides, incensum & ardens operculari, usque dum extingatur, ideo id iubere, ne cineriat Thus, sed crematum integrum permaneat: ut in carbonibus ad ignem seruandis, quotidie fieri uidemus, qui igniti terra operiuntur, non enim cinerem, sed crematum Thus querit hic scriptor, cuius consumpta pinguitudine, reliquum medicinæ usus seruiat. Eum etiam sensum probatissimus mihi codex habet, ὅτι γὰρ οὐκ ἐκτεφρεύται, quod est, sic enim non cinerit.

Credimus etiam in extremo capite male legi, ὁρμήται δὲ ἰν χιρᾶρ μὴ κατακεκαυμένον. rei enim non responderet sensus. Non enim facile ob lentorem, & pinguitudinem suam, friatur non crematum Thus, ut indicant uoces illæ, sed quod igne omne id unguen amiserit, & coactura ardius factum fuerit, id facillime friatur, & perfectam coacturam Dioscorides hic ostendere uoluit.

ἡλικὸν λιβάων

De Cortice Thuris.

C A P.

LXXXII.

P Ræfertur Thuris Cortex crassus, pinguis, odoratus, recens, leuis, minime scaber, sine membranis. Adulteratur admisto Pini, aut nucis eius cortice: sed horum index ignis est. Siquidem reliqui cortices suffiti nequaquam inceduntur, sed sine odore fumum eructant. Thuris uero cortex ardet, & cum odoris fragrantia uaporem eiacularur. Thuris modo uritur. Et uis eadem quæ Thuri, sed ualidior, astringentiorque. Quare cruentis excreationibus, uuluis fluctione laborantibus, in pefso confert. Ad caua oculorum ulcera, cicatrices, sordescque efficax est. Tostus scabris lippitudinibus auxiliatur.

B A R B A R I C O R O L L.

Cortex Thuris. Plinius medicinas, nec Thuris, nec Myrrhæ priuatim exegit: cum tamen Syracis & peregrinarum rerum multarum describat. Credo, quod usus horum uagus & amplior esse uidebat, quæ ut loco uno includi posset. Arbor porro ipsa Libanos, & Dendrolibanos, lachryma uero Libanotos a Galeno dicitur. Interim, confundi usum eum cõperias. Sophocles, ut Galenus,

nus, Euripides cōtra Libanū pro lachryma, Libanaton p arbore Thuris accipit, a fūuene Assyrio, cui nomē esset Libanos, in hūc fructū cōuerso, dictā grēci fabulant, quē, Deos studiōssimē colētē, inuidi occiderit, hinc nihil esse Dīs Thure grātius. In Sabāis, & Larimnū odoris, ut inq̃t Strabo, prēstātissimī genus oritur: nec quale id sit demonstrat: quemadmodū, nec herbā illam in ora littoralī eiusdem tractus nascentem, suauissimī odoris, sed qui celerrimē uānescat.

EX M. V E R G. C O M M.

Non male Thuris Corticem, corticosum Thus, dixerit aliquis. Quod enim in eo laudat, & medicinā insēruit Thus est, quo nisi turgeat cortex, inutilis erit: non ideo tamen sic intelligēda res, ut ex quacumq; parte arboris corticem hic laudet, sed ex ea tantum, in quam interiōris lachrymæ impetus ingruerit, ruptoq; cortice destillauerit: quo loco omne quod in arbore hēsit, ferramentoq; auulsum, corticis aliquam crustam secum detulit, thuris Cortex dictus est, qui multo humore, a Thure non magnopere differt, ideoq; medicinā utilis est. Ea crusta lachrymæ coniuncta, simulq; allata a medicis, in proprios quos hic docet usus, a Thure separabatur, priuatimq; aliquid magis, minusue poterat, quemadmodum eiusdem Thuris manna.

Tria enim hęc simul plarumq; in officinis & earum acerris inueniuntur, Thus, Cortex, & concussu elisā Thuris micā, quas latini uetēres aliquando Manna, aliquando Pollinem thuris dixerunt: substantia idem, aut non penitus diuersum, aspectu autem, & rei euentu diuersa.

De Manna Thuris. C A P. LXXXIII.

Manna Thuris probatur candore, micarum frequentia, & puritate. Vim habet eandem quam & Thus, sed in ualidiusculam. Sunt qui cribrata Pini refina, ac Polline, aut cortice Thuris contusi adulterant: sed hęc igne deprehenduntur. Neque enim æque suffitu aërium uaporem, sed fuliginosum & impurum expuit, & permixtum suaue olentia odoris uirus habet.

B A R B A R I C O R O L L.

Manna Thuris, est Hypossima: quod Plinius, micas concussu elisas interpretatus est. Vbi deprauata dictione, Mammās, non Manna uulgo legitur. Id autem fit, gestarum atterentibus se glebis, ut inquit Aelius. Differt a Thure Manna, q̃ plus astringit, propter corticis fragmenta quæ remanent. Nam quod Thuris Chondros a grēcis dicitur, nos Thuris granum interpretamur, secuti Plautum in Penulo, Qui nullum inquit Thuris granum sacrificant. Est & genus Mannæ recentioribus dictum, & a sacris quoq; literis acceptum. De quo superius in Elæontē lite, Manes certe, uasis nomen est, & in Cortabo pars extantior ac prominula: quam Sophocles athenum caput uocauit. Erat autem Cortabus, siue Cortabis uasarium, iocularis in conuiuio iactus conceptaculum, propositis uictori præmīs, quæ Cortabica uocabant: id quod eiaculabantur, liquida erat materia, hoc est, id quod in poculo reliquum obmanserat, Latagæ, itemq; Latax appellatum. In eo uase pars, quæ sonitum reddebat percussa casu Lataginis, Platinæ nominabatur. Sinistro cubito innixos, dextra molliter, & per gyrum iacere legitimum erat. Cortabi mentionem in Plauto quoq; habes, Medici, Cortabum ex imperitia uocabuli, ut Athenus inquit, potionem a balneis, siue ut Phocion, uomitionem ante balneas uocabant, nō pridem inuentam, & sanitatis usu detestabilem, & ab Erasistrato uehemēter damnatam.

EX M. V E R G. C O M M.

Diximus superiore capite, omnem Thuris substantiam, in antiqua medicina trifariam diuidi, in Thus, Corticem Thuris, & eiusdem Māna. Nec aliud est, quod nunc dicimus, quā hoc hac in Thuris puluere tantum ueteres usos fuisse. Satis rem Plinius indicauit, cum ait, esse concussu elisas Thuris micas, quæ attritu glebarum, in acerris subsiderent. A concussu etiam grēci ὑπόσιμα dixerūt, nihilq; illi simile cōmuneue est cū aërio melle. Quod posteriores a sacris Hebræorū literis accepta similitudine, Mannam dicūt, in alio genere, & diuersa potestate rem. Illi enim soluēdi, huic adstringēdi uis est. In quo cauendum, ne similitudine nominis decipiat aliquis, in antiquis, quibus in Thure semper, in aërio autē melle nunquā usus eius uocis fuit.

De Fuligine Thuris. C A P. LXXXIII.

Fuliginem Thuris sic facito. Forcipiculā, lucernis accensas singulatim Thuris glebas, in nouam fictilem ollam concauam imposito.

D I O S C O R I D I S

C & æreo uase in medio perforato, deterfa diligenter forde, obtegito. Aliã admoüeto, in altero aut utroq; labro, subiectus quaternũ digitorum altitu dine lapillis, quo facilius perfpici queat, si urantur. Et qua locus capax fu erit, glebulas alias fupponito. & antea quam prorfus prior gleba reftrin guatur, aliam imponito. donec fufficientem fuliginem uidearis aggregaf fe. Continuo tamen externæ æramenũ partes fpongia aqua frigida made facta, abftergantur. Ita enim temperato æris feruore, fuligo omnis inhæ rebit. Quæ alioqui per leuitatem decidua, Thuris cineribus admifcetur. Derafa itaq; fuligine, cinis cremati Thuris feorfum fubftrahendus eft. Idem opus quoad fatiffactum tibi uidebitur, obeundum. Oculorum in flam mationes mitigat. Fluftiones fufpedit. Vlcerata purgat. Caua explet. Carcinomata fiftit.

B A R B A R I C O R O L L.

Fvlgo Thuris græce Lignys, & Aethalon, & Ethal nominata. Nam Lychnis herbæ coro namentariæ genus eft, ut liquebit. Et alio modo fcribitur dici Aetalida. Et Rubiginem fatoriũ lego, & Achymiftis quoq; uideo Aethalen uocari diuinum laticem, unde philofophicũ illud pharmacũ, fiue lapis cõfiftat: a quibufdã Etefios, & Androdamas quoq; dictos, & aurũ potu lentũ, & alijs nominibus innumeris, ut Mazys, & p diminutionẽ Mazygion, & Chalcyriõ. Ali oq; Maza ex ipm Iudeis fignificat. Iidẽ fuligines Hemifomata, hoc eft, femi corpora appellat.

E X M. V E R G. C O M M.

Plutibus, ut obferuaffe facile fuit, fumos & hæretes ex eo parietibus & tectis fuligines græ ci appellationibus difcreuerũt. καπνὸν ἐκθάλλει λιγνὸν καὶ ἀσκόλλει dicentes. Nos fumũ, & fuliginis tantum appellationibus, omnia indicamus, eamq; ob caufam non licuit alia, quam fuliginis uoce Dioscoridis ἐκθάλλει uertere. Quæ eo differt ἀπὸ τοῦ καπνοῦ, i. fumo, quod fumus crallior nigriorque, & ex materia nondum fulgente flamma, aut ea deficiente furgit: ἐκθάλλει uero hæc tenuior, leuiorq; nihil aliud eft, quam ignis & flammæ impetus, qui quoniã fumi modo ni gra, contactu fuo reddit quæcunq; lambit, fumus etiam afcitur, eodem modo & fuligo a no bis dicitur. Tam quæ a græcis ἀσκόλλει a fumo facta eft, quã quæ λιγνὸς a flamma alicubi concre fcens eo colore materia aliqua. Ideo in græcis etiam, quorũ eft ditior lingua, promifcue p fu mo, fuligineq; omni, uoces illæ in ufu funt. Apollonius in Argonauticis fuis, appellauit καπνὸν fumum, qui ex attritu lignorum inter fe fieret.

De Fuliginis compofitione. CAP. LXXXV.

Simili modo e Myrrha, Refina, Styrace, reliquifq; lachrymis fuligo excipit, ad eadem conueniens.

B A R B A R I C O R O L L.

Fvlgo Myrrhæ, Styrcis, Refinæ lachrymarum omnium.

De Pinu & Picea. CAP. LXXXVI.

πίτυς πίτκη

Pinus & Picea generi eidem afcribuntur, fed quandam flagitat fpe cierum diftinctionem. Arborea uulgo cognitæ. Quarum cortex astringit. Prodeft tritus et illitus intertrigini, ulceribus summũ corpus oc cupantibus, ambuftifq; cũ fpuma argenti, & mãna. Vlcerata delicatolorũ acri moniã recusantiũ cærato myrtino exceptus, ad cicatricem perducit. Tri tus cũ futorio atramento, ferpentia cohibet. Suffitu partus & fecũdas ei cit. Potus aluũ fiftit. Vrinam mouet. Folia eorũ trita & illita inflammatio nes leniunt. Vulneta ab inflammatione uindicant. Trita autem & decocta in aceto, feruenti collutione, dentium dolores mulcent. Hepaticis utilia

utilia sunt, drachmę pōdere in aqua, aut mulsā pota. Pineæ nucis cortex, & folia potu eadem præstant. Teda particulatim secta, si in aceto coquat, & decocto dens colluatur, dolores leuat. Ex his etiā fit Spatha acoporum, pessorumq; compositionibus idonea. Quinetiam earum crematarum fuligo, ad librarij atramenti confectionem excipitur. Ea circumlitionibus efficacissime imponitur, quibus palpebras ornāt, coloremq; mentiantur, calliblephara græci uocant. Arrofis oculorum angulis, callosis glabrisq; genis, & collachrymationibus opitulatur. Pityides appellantur Pinorum, Piceæq; fructus, qui in conis inueniuntur. Vim astrictoriā habent, & aliquantum exalfacientem. Tussi, & pectoris uitij auxiliantur, per se, aut ex melle sumpti.

BARBARI COROLL.

Picea ueteribus est, quam græci *πίρρι* fere uocant. Huius speciem Theophrastus. & Plinius Phthiropocōn, hoc est, pediferam, tineosamq; appellant, quia totis paniculis, nōn prima tantum in parte, ut abietes, nucleos & minores & nigros habeat, sed ipsas quoq; paniculas minores gracilioresq;. Sunt autem Paniculæ, nucamenta quædam, quæ e ramis arborum, Resinam fundentium, callo squammatim compactili dependent in Larice. Negant aliqui florere Piceam, sed uice floris esse nucamenta illa, quæ *κίτλας* græci uocant, grossis præciduis, fici portione respondentia. Hæc compressiora maribus sunt, ac minus Resina madet, q; fœminis. Præuenit germinatio huius, florem Abietis. quia paulo ante solsticiū erumpit, diebus fere 11. & ad proportionem fructificat post uergilias. Differt a Pinu Picea, q; pinguior ac tenuior folio est, q; minus alta, minusq; recta, q; Pinus assurgit. Præterea, contū minorē, & magis algentē, nucleos quoq; Resina p̄fufos, obtinet. Vtriq; foliū capillamenti modo, prætenue, ac breuifera uillosum. Vtraq; crassior, duraq; ceu Cupressus. Materies cādida, et Abietis similior. Pinus uistis radicibus, nō repullulat, Picea repullulat, ut in Lesbo accidisse, Theophr. scribit, incēso Pyrræi mōtis nemore, qd' Piceis scatebat. In quo scire oportet, Pliniū Larici tribuere, quod Theophrastus de *πίρρι*, hoc est, de Pinu prodit. Decacuminatio, quā græci *ἐκακμήνη* appellant, Piceæ, Pino, Abietis, Palmæ, aliqui addūt & Cupressō, & Cedro, perniciem asferre phibetur. Picea nauigij expetitur. In Cypro præstantior etiā, q; Pinus. Eadem & ad fabricas ceteras, malleos grandiores, scādulas, cupas, & alia secamēta utilis: celerius tamē q; Abies, corrumpitur. Vfus & in carbone metallis argenti. Montes amat & frigora. Feralis arbor, & funebri indicio, ad fores posita, ac rogis uirēs. Iam tamē & in domos recepta, tonsili facilitate, rami pene statim ab radice modici, uelut brachia lateribus inhærent. Hæc plurimā Resinam fundit, interueniēte cādida gēma, tam simili Thuri, ut discerni uisu nequeat: & inde Seplasiariorū adulteria, ut in Thure diximus. In Hispania & Piceastri sunt, ex qbus Resinā, unde Pix coquat, colligunt. Pinus procera est. Hæc uectē sollicitatā, octo cubitis lōgiore effici, Theophr. affirmavit, at ne sic qdem solida radice, sed abrupta. Germinatio coepta in Pinu, sicut in robore, Abieteq; intermittitur: ideoq; turget ter, & terna edit germina: quod genus arbores *πριολίπρον* appellantur, qui ter inchoatum opus intermissumq; repetāt. Theodorus gaza, ter squamosas, interpretatus est. Credo eum *πριολίπρον*, non *πριολίπρον* legisse. Germinatio prima Februario iteunte: q; in mōte Ida serius, ac fere idibus. Secūda, mēse Martio, qua & omnis Galla gignitur. Aprili tertia, paucioribus interiectis diebus q; inter primam secūdāq; fuerant. q; tempora hæc ad rationē latinam translata nō cōgruunt, ut in Galla de robore disputauimus. Ceditur uere: ubi cortex tantum detrahēdus est, ad operū rotūda. Nā ad quadrata, ubi germinatio defierit, & si ualidior quærat, etiā ubi fructum excoxerit. Sed tū uermiculi quidā sub cortice nascuntur, q; summorenus caudicem nō erodāt, sed uelut inscribāt, unde quibusdam sigilla. Hoc nō in Pino, uel Larice tantum euenit, sed in omnibus, quæ post fructus maturitatem cēdūt. Et illa cōmunis omnibus quæ cēduntur in arte, fabricæ distinctio, ut aliæ quadrifidos uenarū cursus habeāt, bipartitos aliæ, uel omnino simplices, hoc est, ut Theophrastus inquit *τετραδον*, quæ Gaza mēus quadruiuas, & biniuiuas, & uniuiuas conuertit. errore manifesto, q; *τετραδον* *δισωον* *μονωον* legisset. Nos in ea re Plinium, & Victruium autores habuimus. Ex Pino nauigiorum rotunda fiunt, & onerarij carinæ: quanquam nec ex quercu negligunt.

A

καλλιόφρα

Plin. lib. 16. ca
pice. 10.
Theophr. li.
bro. 5. cap. 10.

Theophr. lib.
5. cap. 2. & lib.
9. cap. 1. 2.

B

*

D I O S C O R I D I S

C Sed illa triremibus idonea magis est, ut diximus. Aescullos carbonem Pini querno praeferrunt: non quia uiribus parem, sed quod ad flatum commodius respondeat, nec ut quernus marcescat. Resina huius a germinatu tollitur, detracta prius teda. Ex omnibus resinas ferentibus, scadam las e Pino firmissimas esse constat, ex ceteris faciles omnino, sed imbecilles. Folium Pino, Pinaestroque aculeatum mucrone, praelongum, exile. Pinus fert minimam Resinam, interdum ex ipsis nucibus, uix ut ascribatur generi. Pinaester nihil aliud est quam Pinus siluestris, mira altitudine, & a medio ramosa, sicut Pinus in uertice. Copiosiore dat haec Resinam. Gignitur et in planis eodem modo, Peuce dicta. Easdem arbores alio nomine esse per oram Italiam, quas Stibulos uocari Plinius existimat. Ego Strobilos legendum arbitror, e natalium cognatio ne ita dictas: sed graciles, subcinctioresque, & enodes. Liburnicarum ad usus pene, sine Resina, cura degenerant. Florem Abietis, Taxique praueeniunt diebus circiter .15. ab occasu uergiliarum. Eadem proportionem fructus suos afferunt. Aliqui genera duo faciunt. In Troade montanum siue Idaeum, recta, cella, crassa materie, nucibus oblongis, uiridibus, sero dehiscens, utpote siluestrior, pice copiosa. Maritimum folio tenuiore, infirmioreque, cortice leuiore, & corijs utiliore quam Idaei. Nuce rotunda, breuique aperienda, ualida, & robusta materie. Alij, ut Macedones, marem intelligunt sterilem, breuiorem, folio duriore. Foeminam proceram, & folijs pinguius mollioribus, & simplicibus, atque non rigentibus. Lignum maribus retorridum, praecinctum medulla, durum, & ad fabrorum opera contortum. Nigrior radix foeminae, mollius, & omnino tractabile securibus. Pinus foeminam habet, quam graeci uocant agida, mellei coloris, pictorum tabellis immortalis, nullisque fissilem rimis, proximam medullam, cor Pinus a Theophrasto nominatum; quae in Abiete Luffon appellatur. Nascentur haec in foemina ductat, ut quae minus tedacea sit quam mas, leuior quoque, ac prior cursu meatuum. Ficium uocant Idaei tedarum, cum graduum arborum medullam securis adigitur. Quibus prostratis partes candidae ambientemque computruerint, colore uehementer abiecto, et neruo pretenui. Nam id quod in Pinu rubidius Peda nascitur, mares potius habet quam foeminae: hoc maribus tantum accidit, & odore grauissimo est: neque tedam redolens, nec ardens, sed ab igni resiliens, Syce, non Statete dicta, ut in Plinio correximus. Pini morbus est, ut teda fiat, tam parte caudicis externa, quam corde, id quod abundantia succi, & ubertate larga luxuriantis naturae puenit. Mares hanc tantum ferunt. In quo noscendum, superiora, quae de Pino Theophrastum secuti diximus, omnia fere ascripta esse Larici a Plinio, ut premonuimus. Nec mirum, quando & perpetua fronde uirent omnes, & in Macedonia, & Arcadia. Circa Elin permutat nomina: nec constat autoribus, quod cuique generi attribuatur. Larici ergo situs idem qui Piceae in montibus, eademque facies. Mareria praestantior longe, incorrupta uis, emori contumax, rubens, odore acrior: nec ardet, nec carbonem facit, nec alio modo ignis ui consumitur quam lapides: cum caetera quae pice & resina fundunt, immodice accensa, carbonem expuant, cum eruptionis crepitu, et aculanturque longe. Plurimum huic melleo colore, atque lentiore nunquam durascentis. Teda uero proprie dicta & a graecis *δαρ* uel *δαδίων* uocata. Sed & sui generis arbor in Illyrico est, redudantior humore quam reliqua, parior, liquidiorque, quam Picea, flammis, & lumini sacrorum quoque grata. Improprie uero, tedas appellamus, tum clia quoque ligna, quae flamma olei uel picis illitu concepta, faculae modo luceant, tum piceae satuae partes imas, qualem in Nucleorum pincorum capite monstrauimus. Ex his quae dicta sunt, constat in Europa sex haberi genera cognatarum arborum, quae resinam ferant, Pinum, Pinaestrum, Piceam, Abietem, Laricem. Tedam. Addi potest & septimum, Piceaster in Hispania. Pinum uoco, piceas nuces ferentem: quam graeci *χάρον* appellant. Pinaestrum & Laricem, quam *πευκήν*, in Troade uisenda, magnitudine .14. pedum ambitu, altitudine duorum iugerum, praetereaque cubitorum quindecim. Piceam, quam *πίτυν*, & poetae blotrem, ut quidam rentur. Tedam porro, quam *δαρ* & *δαδίων*. Atque omnia haec Plinium sequentibus. Nam Theophrasto, Pinus atque Larix idem, quemadmodum saepissime testati sumus. In Palladio corrupte legitur Tinus, pro Pinu. Idem autor Lignum gallicum uocando, aut Laricem, aut ei simile quid significat, ut multi sentiunt.

Theophr. li. 9.
capite. 1.2.

Pityda fructum Piceae, Dioscorides uocari scribit, itemque Pini: sed improprie, ut Galenus inquit. Plinius e Pinaestro nuces ita nominat. Hippocrates Pityda, pro resina e Pinu, siue Picea potius intelligit, ut eidem Galeno placuit.

E X M. V E R G. C O M M.

Arborum quae mastichem, resinamque, & pices destillant, tanta est in destillando similitudo, & tam multa in natalibus, earumque appellatiombus mixtura, ut nihil in Theophrasto, Plinioque, et alijs incertius legatur, alijs temporibus eiusdem rei, non eiusdem appellationibus utentibus, & inuicem eas commutantibus. Nos diligenti obseruatione eorum, quae Theophrastus, & post eum Plinius, amboque pluribus locis tradiderunt, graecam Pityn tuto, & communi omnium in ea uoce consensu. Piceam

ceam uertimus, & πέννην tedam: eo, præter multa alia argumento usi, quod hic ipse scriptor, A non multo post hæc de liquida pice dixerit, συνάγεται μὲν ἐκ τῶν λιπαρωτάτων ξύλων πίονος καὶ πί-
 τυος, quod est, collige præcipue picem, ex pinguiissimis lignis peuces & picyos. Quod totum Plinius pariter indicauit, copiosiotem resinam, & liquidam Picem fieri ex teda & picea testa-
 rus. Poterat & multis alijs argumentis idẽ confirmari, sed nos his quæ in Theophrasto, Plinioq; & gicis, latinisq; alijs legi possunt, Cõmentationes has nostras, impudenti alienarũ opum co-
 aceruatiõne augere nolumus. Poterunt uolentes lib. 16. cap. 11. Plinium, & Theophrastũ, omni-
 bus fere libris, de Plantarum historia uisere, omniaq; cognatarum arborũ discrimina, in tam grauib; scriptoribus certius cognoscere, & cognita grauius censere.

Quod deinde Dioscorides ait, Picæ Tedæq; corticem, in teneris corporibus ulcera ad ci-
 catricem perducere, τριφύλλου χρώτων, non ad genus uitæ tantum, ut Ruellius uertit, sed ad illud
 & sexum & ætatem referendum etiam est, pueros inquam, & in delicijs et umbra agẽtes, qua-
 les foemine sunt, eorumq; corpora. Sic enim antiquiores grecorũ medici usi ea uoce sunt, ἀπα-
 γὰ σαρκὸς καὶ ἐκκληρόσαρκα, id est, teneræ & duræ carnis, ex ætate sexuq; & delicijs appellantes. Sic
 Paulus Aegineta capite, de uulneratis neruis; uocibus illis usus est.

Diu post hæc nos torfit, qđ in grecis omnibus legitur, σάβη δὲ ἐξ αὐτῶν γίνεται εἰς ἀκόπων
 συνασίας καὶ πικρῶν ἱππικῶν. Et nos uertimus. Quinetiam densandis in cõfectione acopis, pel-
 fulisq; eadem omnia materia apte utuntur, concinniorẽ sensu, qđ si rude, quæ ad subigendum
 liquida, notissimum instrumentum est, ex his arboribus facta, subigi in cõfectione ea dixisse-
 mus: pro quo sensu, non σάβη foeminino genere, sed neutro σάβημα legendum illic erit. Est au-
 tem σάβημα, ut grecorum lexica indicant, πύκνωμα, id est, dẽsatio: factaq; ea uox est, quod quæ
 telarum modo texuntur cultellata, huiuscemodi spathe percutiuntur, percussaq; densantur. ex
 qua similitudine hic ait, harum arborum materia densari acopa & pessulos. Non tamen dāna-
 mus aliam illam lẽctionem. Potuit enim antiquitas, in his quæ ad acopa & pessulos coqueren-
 tur, rude ex his arboribus facta, uti: sed illa aptior uisa sententia est.

De Pineis nucibus.

CAP. LXXXVII.

N Vces Pineæ cum repurgatæ manduntur, aut cum passo, aut Cui B
 cumeris semine bibuntur, urinam ciẽt. Acrimonias in renibus,
 aut uesica hebetant. Stomachi rosiones leniunt, datæ cum Portulacæ suc-
 co. Virium infirmitatem roborant. Corruptorum quoque humorum la-
 bẽm obtundunt. Pineæ nuces recenter arboribus decerptę, in passo fran-
 guntur, & decoctæ, uetustæ tussis ac tabitudinĩ conferũt, si quotidie ex eo
 liquore terni cyathi bibantur.

BARBARI C O R O L L.

N Vlei Pinei, græce Strobili dicuntur. Quāquam Strobilos, & tripudhẽ genus est, siue sal-
 rationis, apud Iulium pollucem. Galenus etiam Coccalos uocat, nucleos eos in Hippocrate.
 Sunt qui Coccalos, non pro nucleis Pineis, ut cæteri, sed pro Cocco gnidio accipiat, ut idẽ
 Galenus ex alterius Dioscoridis sententia testatur. Arbor ipsa Conos &, quandoq; Strobilos.
 Cũ decocti melle sunt in taurinis, Aquiceli nominantur. Dulciarij quoq; genus quoddam ex
 uua passa, Nucleus pineus, ex amygdalis uia tostis, Conos, appellatur apud eundẽ Iulium
 Pollucem. Nuces ergo Pineæ, grandissimæ, altissimæq; a terra suspensæ. Intus exiles nucleos,
 lacunatis toris, ferruginea tunica uestitos, contegunt. Nuclei Pineę quaternaria genera. Durum,
 qđ & uulgare. Tenerũ, & putamine digitis fragile. Ideoq; auibus expostũ, Tarentinam uoca-
 bant. Tertiũ e Picea satiuā, nucleorũ cute mollissimum, adeo ut simul mādatur: qđ attore Plī-
 nio Sapiũ uocetur, & Nucleis. quanq; uerbũ Nucleis in eo melius fortasse pro nucibus Sapi-
 neis, qđ pro arbore ipsa capitur. 16. uolumine. Pliniani cerrẽ codices, libro quinto decimo, non
 Sapium, sed Apinum habet. Nos Apium, & Indicis, & inscriptionis, & exemplariũ, quæ ma-
 nu scripta sunt argumento, legimus, & Columellę, apud quem nux Sapinea legitur. Quidam
 Apinas, a uilitate dictas arbitrates, literam, S, dictioni ueræ detrahũt. Imas arboris huius par-
 tes, ut idẽ inq; Plinius, tedas appellamus. Omninoq; nihil aliud, qđ Picea est, feritate paulũ mi-
 tigata satiu. Nā Sapius, siue Sapinea, Fusternæ pars est Abietis inferior: nō ut Seruius scribit,
 species Abietis apta nauibus. Nā supna eius arboris, a duricia nodorũ, Fusternę simpliciter ap-

Theophr. lib.
 3. cap. 10.
 Plī. li. 23. ca. 9.
 et lib. 16. ca. 26

D I O S C O R I D I S

C pellatur. Vtriusque meminerunt, & Plin. & ceteri. Mouit hominem gramaticum, Varronis credo autoritas parum intellecta: qui dixerit in montanis, plixiores uenire Abietes, et Sapinos, firmioresque propter frigus. Quartum Pityides: quas proxime descripsimus. E nucibus quoque Pineis non nihil Resinae colligitur.

De LENTISCO. CAP. LXXXVIII.
Lentiscus nota arbor est, cui uis inest astringendi. Semini enim, folio, ramo, cortici, radicibusque cognatae insunt uires. Liquamentum autem ita fieri solet. Folia, cortex, & radix in aqua coquuntur, & ubi abunde cocta sunt, folia abijciuntur. Aqua denuo coquitur, donec mellis habeat crassitudinem. Lentiscus sua astringendi dote, ualet aduersus sanguinis reiectiones, alui profluvia, & dysenterias in potu. Item contra eruptionem sanguinis e uulua, & eiusdem, aut sedis procidentia. In totum acacie & hypocyttidis uice representat. Idem facit succus e tritis folijs. Decoctum fotu caua explet. Et fracta ossa ferruminat. Vuluae fluctiones sistit. Non mas arcet. Urinam pellit. Motus dentium collutione stabilis. Virentes furculi calamulorum uice dentibus repurgandis affricantur. Fit e semine oleum, quod prodest cum quid astringi opus est.

Theophrasti, li-
bro. 9. cap. 1. 2
Pli. li. 15. ca. 24

B A R B A R I C O R O L L.
Lentiscus, *σχίνος* a grecis uocata, Resinam ubique sudat. Mastiche uero dicta in Chio tantum insula. Lentisci fructum, Hippocrates Schinida nominauit etiam, si tamen (librariorum culpa) non Schinides, sed Schoenides legendum esse, sicut & Cechrides pro Cedrides. Lentisci folia, quibus modo pelles excoriarij conficiuntur apud nos, iudaico lunco, plurima ex Illyrio conuecta, & uulgo Folia dicuntur. Plinius Lentiscum Italicam dicendo, uidetur praeter Chiam alia quoque genera nouisse. Fructus initio rubet, post nigrescit: qui & Sabuci specie, in racemis depedit, folio Pistacij, sed minore, per extremitatem rubente. In summo siliquae Pisorum, sed corniculi modo intortae: in quibus Resina odoris iucundi continetur. Romae demonstratur in ruderibus. monumentisque Lentiscus, folliculis inanibus & deformibus. His contractis, culices euolant frequentes.

E X M. V E R G. C O M M.
Potior quam nunc sit, quondam Lentiscus fuit. Et si, testante id Plinio, Ciceroni credendum est, rustici plebi necessaria, quae coeli, et in eo syderum imperita, arandi suorum operum auspicia ex propinqua arbore certius cognoscere posset, nihil enim nobis occultum natura, in discipula ruris esse uoluit. Ciceronis uersiculi hii sunt.
Iam uero semper uiridi, semperque grauata
Lentiscus, triplici solita est grandescere saetu,
Ter fruges fundens, tria tempora monstrat arandi.

Exprimitur succus e radice &c. Non in omnibus legitur refrigeratis, sed obiectis tantum. Nos autem illud adiecimus, in probatissimo omnium codice inuentum, in quo legebatur. *μετὰ τὸ ἰσχυρῶς καὶ φησὶν αὐτὴν πολλὰν ῥιπτομένην.*

μαστική ρητίνα
σχίνιν

De Resina Lentiscina. CAP. LXXXIX.
Lentiscus resinam gignit, quae Lentiscina cognominatur, & ab aliteri. Stomacho auxiliatur, sed ructum mouet. Additur in dentifricia, & illitiones faciei, ad nitorem cutis conciliandum. Palpebras oculis incommodas replicat. Manducata halitum oris commendat. Gingiuas contrahit. Optima & copiosissima in insula Chio prouenit. Praefertur Nitedulae modo resplendescens, & candore Tyrrhennicae Ceræ similis, adulta, friabilis,

bilis, odorata, stridorem edens. Viridis autem inferior est. Adulteratur A
Thuris, Resinæq; mistura.

BARBARI COROLL.

Resina Lentiscina, in Chio Mastiche est. Importatur & ex India, quadā e spina Mastiche. Pli. li. ii. ca. 17.
Item ex Arabia, Lamā uocat. Sed ex Asia et Græcia ueræ q̄ simillima Exixme herbā: quā The
odorus gaza Chamæleontem album intelligit, & Cardium Pineam appellat: id autem q̄ re
ste, diximus inter herbās. Ex Lentisco Chia, gummi modo nascitur, nigra, & candida. Preciū
candidæ in libras. 10. nigræ. 12. Ex Ponto quoq; uenit mastiche, bitumini similior atq; nigra, ui
no cōdendo. Cæterum laudatissima inter omnes, Chia, candida. Adulteratur ut thura, resina,
ut Plinius ait. Sed ut Dioscorides, Thure et Resina. Galenus in duo genera colligit. Nigram, et
Candidam. Nigram Aegyptiā, Candidam Chiam, uocari prodens. Ex Aegyptia unguentū
aut oleum fieri solere negat. Non arbitror quenq; monendum, q̄ longe a uero sint, qui Masti
chem & Silphio non separant.

EX M. VERG. COMM.

Cassa, friabilis & odorata. Græce sic, ἀσπρά, καὶ πυρά, καὶ ὑσπύχης, καὶ ὑσάδης. Vitiosum no
bis uidetur, credimusq; secundam illam uocem πυρά, aut aliam quandam fuisse. Aduersatur
enim superioribus, nec potest aliquid simul candidum, quo colore hic Mastichem, & alij oēs
laudauerūt, & πυράν, id est, rufum, coloreq; ignis esse. Quam ob causam nos eā expunximus,
non inuenientes, quam similem illi aliam uocem substitueremus: ibidemq; monstrante id re
ipsa, in fraude & adulterio Mastiches, resinā Pineam adiecimus, sic in melioribus græcis legen
tes, disiunximusq; Thus, & Pineam resinam, eadem ueterum codicum fide admoniti. quoniā
alterū satis esset, nec omnis resina id præstare possit, sed Pineam tantum, quæ colore candido in
concolore Mastiche facilius falleret.

Quam diximus præterea acum harundineam, nihil intelleximus aliud, quam in purgan
dis a cibo dentibus, acuminatam harundinis festucam, pro qua ex Lentisco facta, usi ueteres
sunt, & nostra ætate adhuc elegantioris uitæ homines utuntur. Nam καλαϊδάς græci, proprie
dixerunt acus ex harundine factas, quibus mulieres cincinnos & uelamenta capitis firmarēt,
quod nunc æreis, aut argenteis fit.

De Terebintho. CAP. XC.

Terebinthus cognita arbor est, cuius folia et semen & cortex astrin
gunt, & ad eadem ad quæ Lentiscus conueniūt, simili parata mo
do, sumptaq;. Fructus esui aptus est, sed stomacho aduersatur. Excalfa
cit. Vrinam mouet. Venerem excitat. Contra phalāgiorum morsus con
uenienter in uino bibitur. Resina eius ex Petra Arabiæ oppido deferatur.
Prouenit etiā in Iudæa, Syria, Cipro, Aphrica, et Cycladibus insulis. Sed
præualeat candida, perlucida, uitreo colore. & in cæruleum uergente, odo
rata, Terebinthum olens. Terebinthina resinas omneis antecedit. pro
xima Lentiscina, & e Pinu, & Abiete. Has sequitur e Picea & Pineis nu
cibus resina. Natura omnibus calfacere, mollire, discutere, expurgare.
Tussi ac tabi conueniunt per se, aut in eclegmate ex melle. Vitia pectoris
expurgant. Vrinam cient. Cruda concoquunt. Ventrem emolliunt. Pal
pebras commodissime replicant. Lepras tollunt, cum erugine ac sutorio
atramento, nitroq;. Auribus saniem emanantibus, item in pruritu geni
tium utiles. Malagmatis, acopisq; ammiscentur. Laterum doloribus il
litu, aut appositu auxilio sunt.

BARBARI COROLL.

Terebinthus, τριμύθος græce dicta. Messibus tritici, aut Paulo serius fructificat. Mas sterlis.
Femine distinguuntur. Aliæ fructum protinus rubentem, magnitudine Lentis edunt: qui con
coqui non potest. Aliæ uiridem, pallidumue primo, demum rubentem, nouissime cum uua

D I O S C O R I D I S

C maturefcentem & nigrefcentem, qui & odore iucundior, amplitudine fabæ. Interim maiorem, & refinofum tactu, fulphurofumq;. In Troade, circa Idam, et Macedonia, brevis, et fruticofa, & contorta. Damafco Syriæ insignis, copiofa, decore afpectu, ubi mons Terebintho, nec alia filua fcataens. Materies admodum lenta, radicibus ualidis, adifq; in profundum, fidelis ad uetuftatem. Flos racemofus, oliuæ modo, fed rubens. Folium numeroſum, ab eodem pediculo. Figura Lauri, digefio in uerſus, ut Sorbo. Vnicum ad cacumen exit, & numerum parem cõ-
turbat; minus tamẽ angulata ſunt q̃ Sorbo, & ſimiliora per ambitũ Laurinis uidentur. Oleo
ſa quoq; ut fructus. Fert & nucumenta quædam caua, ceu folliculos; Vlmi exemplo. In qui-
bus animalia quaſi culices erũpunt. Et refinofus lentor, qualis e ligno, unde fit refina. Fructus
q̃diu maturus non eſt, in aqua fere ſupernatat. Niger ſidit. Vulneribus pfundis, ut Abies, &
quæ refinã tedamq; ingerunt. Fecundior efficitur contra quam cæteræ arbores. Materia uehe-
menter nigra, ſpiſſa, ſplendida. Præcipue in Syria tantum, ut Hebenum quoq; prouocet. Cul-
tellis ex ea capulos, & calices Thericleos detornant, tam feliciter, ut a Figlinis internofci ne-
queant. Thericlei porro calices Athenis clari habebantur. Nomen ab inuentore datum, qui
Ariſtophanis ætate fuerit; ſue, ut alij putant, a detornatis in eo beluarum pellibus, ſacrũ Bac-
cho poculum facere. Cæterum falſo quidam extimauerunt idem eſſe quod Carcheſtum, cum
hoc conſtet antiquiſſimum pateræ genus fuiſſe. Nam poculum, quod Alcmenæ Iupiter, in ſa-
ciem uerſus Amphitrionis eius coniugis dono dediſſe fertur, Carcheſtum uocatum perhibet,
multis poſt ſeculis Lacedæmone ſeruatum. Terebinthus ad refinam tollendam poſtq; germi-
nauerit, inciditur: id quod in omnibus refinam fundentibus cuſtodiendum eſt.

E X. M. V E R G. C O M M.

Quia extremæ iniuſticiæ eſt, ſua gloria aliquem defraudare, nec magis in homine lau-
dandum conſtantia animi, & reddendi unicuique quod ſuum eſt, non pigebit, The-
ophraſti manibus & nomini hanc gratiam habentes, ex quo cunã diuerſis locis de Terebin-
tho ab eo tradita, præterito eius nomine, Barbarus pro ſuis in Corollarij commentationibus
edidit, græcam eius ſcriptoris de Terebintho, mox latinam omnem hiftoriam huic capiti adij-
cere; ut poſſint uolẽtes (quod reſati paulo ante ſumus) aperte cognofcere, obiterq; intelligere
græcarum literarum peritiõres, in uertendis græcis, hominis neſcio celeritatem, an negligentia
potius dicam, qui Plinium & Theophraſtum ſimul miſcens, *ῥωδιστῶν*, ex Plinio iucundi-
orem, ex Theophraſto, ſulphuroſum uertit, non animaduertens ab utroq; idem dici.

In quo parum caute egit, ratus *ῥῶν*, quod græcis ſulphur ſignificat, idem eſſe quod *ῥωδ*, &
ῥωδῶν græci idem dixerunt, quæcunq; ſ. in ſacrificijs et aris ad ſuffitus & uapores incenderent.
Quod tam manifeſte patet, ut probari non oporteat, uideturq; Gazam, Theophraſti inter
pretem, in ea re ſecutum eſſe.

Idem etiam, quod erat *ῥππτον*, uertit, qui concoqui non poſſit, cum tamẽ de coctura ci-
bi quæ in ſtomacho fit, Theophraſtus eo loco non agat, ſed de maturitate quæ calore fit, & ſi
milis cocturæ ſtomachi eſt: parum memor, *ππτον* utrunq; ſignificare, & Theophraſto in hijs
quæ maturantur peculiarem hanc uocem eſſe. Nam & in medicina *ππτιν* etiam dicuntur,
quæ abſceſſus, & collectiones maturant.

Poſſemus & multa alia hijs adijcere, ſed hæc ſatis nobis eſſe uolumus: ut hoc quaſi guſtu
meminerint legentes, & ubiq; ſciant, nihil non alienũ in eo eſſe. Nec morte præuentum potuiſ-
ſe extremam & ſalutarem illam manum his quæ conceperat appoſuiſſe, oportereq; eos, qui in-
tegram rem nouiſſe uelint, primos eius autores conſulere, nec nouis ſcriptoribus tm defer-
re, ut ueterum obliiti, quemadmodum in cantu & muſica fieri Homerus dixit, nouiſſe quæ tan-
tum amemus & admiremur.

Terebinthum poſteriores grani uiridis arborem dixerunt, factõ illi nomine ab eo eius ge-
nere, quod fructus ſuos in uiridi pallidos fert: quod Theophraſtus *χλωρὸν* dixit, quaſi herba-
ceum. Ex ea Terebinthina deſtillat refina, omnibus notiſſima, in quotidiano medicinæ uſu, de
qua cum ſemel agere Dioſcorides cepiſſet, de reliquis etiam egit, cognata congeneribus ſuis
coniungens. Noſq; ut in melioribus græcis adhuc legitur, continuata hiftoria, uno tm titulo et
capite omnia complexi ſumus Refinæ genera, inter quæ Larignam ex Larice collectam hic nu-
merat, a Viſtruuiõ præcipue in architectura, & medicina laudata. Qui libro. ii. de materia a-
gens, Laricem his uerbis commendauit.

Larix uero, qui non eſt notus, niſi in his municipalibus, qui ſunt ad ripam fluminis Padi,
& littora maris Adriatici, folijs eſt Pini ſimilibus, habetq; refinam liquidam mellis Attici colo-
re, quæ etiam philiſcis medetur. Credimusq; nos, eam nunc eſſe, quam Venetijs deſlexa a La-

D Nos breuitati
cõſulẽtes, da-
ra opa eũ locũ
abbreviaui-
mus: ne & in
imẽſũ creſce-
ret cõmentari-
us, & q̃ ne ad
eruditionem
quoq; nobis
aliquid facere
uidebatur.

rice appellatione, Larga, officinae & uulgus appellant. Si quis autem uelit totam Laricis historiam naturamque nosse, Viétruium libro illo, & Plinium pluribus locis lib. 16. & 24. Palladiumque in Nouembri mense legat. Sunt enim scriptoribus his, & huic, omnia fere communia.

Quod in coctura Picis passim legitur, *ἀπο δὲ χύας ὁμορίας ὑδατος ἑμβαλόντες ἵσιν ἐγγύειν*, ex meliorum codicum lectione, *ἵσιν χαλκίειν*, idest, ahenum uertimus, praefertim ostendente id Plinio, qui libro. 16. hoc modo coqui praecipit. Verba eius sunt. Alij utilius putant, sine aqua coque-
re lento igne tota die, utriusque uale aeris albi.

De liquida Resina e Pinu & Picea. CAP. XCI.

Liquida Resina e Pinu & Picea, a Gallia & Hettruria conuehi solet, atque olim a Colophone petebatur, hinc Colophoniae sibi cognomentum uendicauit. A Galatia quoque Alpibus contermina, quam uernaculo nomine Laricem appellant incolae. Ea in linctu magnopere praestest tussi ueteri. Colore inter se distant. Siquidem alia candida est, alia oleosa, alia mellei liquoris similitudine, ut Larigna. Cupressus etiam liquidam fundit resinam, quae ad eadem pollet. Quae uero spissarum generi ascribuntur, quaedam ex Pineis nucibus, aliae Abiete, aliae Picea & Pinu exierunt. Eligi debet longe omnium odoratissima, translucēs, non ruffa, nec humida, quandam cerae faciem praebens, & friabilis. E Picea et Abiete resinae, caeteras antecedunt, odoratae enim sunt, atque Thus odore imitantur. Praestantiores a Pyriusa insula deferuntur, quae secundum Hispaniam sita est. Sed quae e Picea, nucibus Pineis & Cupresso manarunt, nihil ad illas, nec tantis uiribus potiuntur. Verumtamen eorundem gratia ut illae sumi solent. Lentiscina Terebinthinae correspondet. Vritur Resina omnis liquida in uase quadruplae capacitatis ad humorem, qui in funditur. Itaque Resinae congruis, in duobus aquae pluuiae coquitur, subiectis leuibus prunis, Resina assidue mouetur, donec omnis odor aboleatur, & friabilis & stridula reddatur, ac digitis cedat. Caeterum ubi refrigit, in fictile non picatum, quod Aconitum uocant, idest, non illitum, recoditur. Fiet etiam eximij candoris, si Resina omnis eliquata praeoletur, quo facta culēta sordes excernatur. Vruntur quoque sine aqua, primum lento igne, & ubi coire coeperunt, maior carbonum strues supponitur, & triduo citra intermissionem discoquuntur, usque dum suum odoris uirus exuerint, mox ut dictum est, reponuntur. Spissam unius dici spacio decoxisse satis est. Vnde odoratis malagmatibus, & acopis, & unguentorum colorationibus magnopere utiles sunt. E Resina perinde atque Thure fuligo excipitur, ad circumlitiones idonea, quibus palpebras fucant, & colore mētiuntur. Prodest glabris genis, collachrymationibus, crosisque oculorum angulis. Ex ea fit atramentum scriptorium.

BARBARI COROLL.

Resinae, multis arboribus leguntur, omnibus incisis a germinatu. Sed uarie. De Pinu, tecta demum detracta, de Abiete, ac Picea, ligno prae gustato: de Terebintho, radicibus, ramis & caudice uulneratis. Sed melior, quae defluxit in caudice. Optima Terebinthina est spissitudine, leuitate, odore. Secunda bonitas Abietinae, ac Piceae. Copiosissima, ponderosissima, Picique proxima, e Pinu est. Portatur utribus liquida. Tum sponte crescit, autore Theophrasto. Nam Plinius.

C nius, minimum Resinæ de Pinu colligi scribit. Credo, quia Pinus Theophrasto Larix est, ut diximus. Resinam piceam, quæ sicca sit, aridissimam inter omnes prædicat Aetius: eamq; Pitynon Physema, priuatim dici meminit.

Resinam greci *πίτυν*, *πινύνη* quandoq; Paulus uocauit. Hanc ex Pinu & Picea siccam esse, Plinius intelligit. Dioscorides ex hisdem arboribus alias esse siccas, alias haberi liquidas uult. Item, liquidas e Terebintho, Larice, Lentisco, Cupresso. Nam & ex ferunt in Asia, Syria q;. Falluntur uero, qui eandem esse putant, e Picea atq; Larice. Picea pinguem, & Thuris modo succosam fundit, Larix gracilem, colore mellis Attici, ac mellei etiam liquoris uirus redolentem. Illud notauimus, tam arborem ipsam, q; eius Resinam uocari Laricem. Potest & Larigna ut Illigna dici: nam & castellum in fluminis Padi ripa ex eo ligno conditum, Vistruuius Larignum appellauit. Oribasius, atq; Paulus Resinæ genus Italiæ tm nascentis, *ξύλα δ' αλν*, hoc est, lignosam commendat in Dropacem. Fortasse hanc intelligentes quæ Dioscorides Tyrreniæ, siue Gallicam uocauit, uel Corticatam Columella. Resina laudatur, nationum Cypria, Syriaca. Vtraq; mellis Attici colore. Sed Cypria carnosior sicciorq; antecedens omnes. In sicco genere candida. In omni montana & capestri, præfertur Aquilonia. Terebinthi tenuissima est. Cupressi acerrima sapore, crassior Cedri, & faciendis picibus idonea. Arabica alba est, acri odore, difficilis coquenti. Iudaica collosior. In Asia, quæ fiat ex Picea, admodum, ut Plinius inquit, candida Sphagos, siue ut legi maluimus, Epargos, a candore dicitur. Liquida, raro utuntur medici, et in ouo fere. Nec Pineæ magnopere in usu. Cæteris, non nisi decoctis. Resina oleo dissoluitur: utiq; ad malagmata, uisq; uulnerum. Quidam & creta figlinarum hoc fieri arbitrantur, in potiones amaris amygdalis. Colophonia, præter cæteras fulua. Si teratur, alba fit, grauior odore: & ob id ab unguentarijs neglecta. Abieti resina, ut Larici teda, uisum est. Exiguam Abies sudat, aliquid quando contactu solis. Inuenio & Acernam resinam, hoc est, Zygian, in compositione, cui nomen est Baion. Est enim Zygia tertium genus Aceris, rubens, ligno fissili, cortice liuido et scabro: quod alij Carpinum uocare maluerunt, ut Vistruuius, a iugis, quæ huius ex hac arbore fieri solent.

D Resina Picea, si cum aqua leuius decoquatur, coleturq; lentescit, colore ruffo, Stillaticiaq; dicitur. Eliguntur autem in id fere uitia resinæ, corticesq; Picea uase æris albi. Terebinthina in fartagine reseruenti coquitur. Est & illa temperies ad crapulam. Flos crudus Resinæ cum multa assula tenui, breuiq; auulsus conciditur ad cribrum minutum. Deinde feruenti aqua, donec coquatur, perfunditur. Huius expressum pingue præcipua Resina fit atq; rara: nec nisi paucis in locis subalpina Italiæ, conueniens medicis Resina: quæ coquenda sit candidissima, requiritur. Porro sciendum est, aliud esse resinam comburi, aliud coqui. Si, proprie loquaris, uritur ad fuliginem: coquitur uero, quæ crudæ usus in medicina fere nullus, nec extra quæ in ouo, teste Plinio.

De Piceliquida.

C A P. XCII.

πίττα, αλν

P ix liquida, quam alij Conum uocant, e pinguiissimis Pini Piceæq; lignis congregatur. Optima est splendens, sincera, leuis. Contra uenena, phthisin, purulentam excreationem tussim, suspiria, et pectoris humores qui difficile extussuntur, efficax est, eclegmate cyathi mensura cum melle dato. Tonsillarum, & uuarum inflammationes, anginaq; utiliter perunguntur. Purulentis auribus infunditur cum Rosaceo. Et illinitur cum trito sale serpentium moribus. Adiecta uero pari cara, scabros ungues extricat. Tubercula uuluarum, & duricias sedis, discutit. Cum farinæq; hordeacea, & pueri impubis urina decocta, strumas rumpit. Cohibet ulcera quæ serpunt, cum pineo cortice, aut sulphure, aut furfuribus illita. Cæterum cum thuris manna & cærato subductos ulcerum sinus conglutinat. Rimis sedis & pedum, magno auxilio illinitur. Vlceres replet, & cum melle purgat. Quin & cum uua passa & melle carbunculos, & putrida ulcera emarginant. Erodentibus medicamentis, quas Septas uocant, probe immiscetur.

B A R B.

BARBARI COROLL.

Pix, nihil aliud est q̄ fluxus combustæ in teda sua Resinæ. De Pinu fere omnis, ut Theophrastus inquit. Quamquam in Syria Terebinthi quoq; picem ferunt: quia desint ibi Pinus. E Picea quoque, Cedro, Palma colligitur. Pix hyeme frigida, dererior, minus copiosa, decolor. Vbiq; optima, ex apricis Aquilonis situ. Ex opacis horridior; uiriusque preferens. Ex Idæa & montana Pinu largior, coloratior, dulcior, odore gravior, utiq; cruda: quoniam decocta multum deperdit; propter serum, quod in ea continetur abundanter. E Paralia, hoc est, maritima, flauentior & crassior, q̄diu Resina est, uidelicet q̄diu cruda: sed decoctio ex ea, prius absumit. Idæa Tedosior, e pari modo tedæ. Imbribus admissis, q̄ squaloribus, pix abundantior & liqui dior excipit. Hæc Idæi, priora Macedones. In Ida Pinus aperiuntur parte solari, ablato p uulnus cortice, binis, ternisue a terra cubitis, cum plurimum, singulis cum minimum. Postea confluit e tota pix, in ulcus, non sine teda, cum manare humor desit. Simili modo ex alia parte cedit, ac deinde alia & sequenti semper anno teda locum implet. Extenuata per hæc arbor, facillime subuertitur uento: quod cū sit, tota succiditur: & cor. Id est, medulla eius, urit. In qua, & in radice plurimum tedæ semper est. Expletur uero in Pinu caua uulnerum, non cortice, nec cicatrice, quæ in hac arbore non coit, sed resina, seu pice, anno maxime ab incisu proximo, si pinus frugi sit: aut secundo aut tertio, si pessima. Probæ uices multas perferunt. Vitiosæ, nisi q̄s modice inaniat, prouentumq; dispenset, detractio nem quartam non tolerant. Pinus nouellæ, fructificant. Veteres teda, nō fructu sunt fertiles. Plinius hæc de Pinu a Theophrasto dicta, transtulit ad Laricē, partim ad Piceā, cuius assulas terræ p̄ximas laudat. Altiores amaritudinē asferre scribit. In Syria Terebintho quoq; ad picē, detrahunt cortices, e ramisq; etiānum, ac radice uindemiantur, cum resina tñ damnetur n̄s partibus. In Hispania e Piceastro quoq; sit, minime laudata, qm̄ resina eius arida, uirosa, & amara sentiat. Pix conficitur hoc modo. Pauitur area canali præparato, per quem humor in medium confluat. Tum lignū in hastulas cōcisum, locatur struis congerie, uelut in carbonis usu: mox igni succenditur, terra undiq; circumdata: ne flamma erumpat, perit enim pix, si hoc eueniat. Quod si fumus se parte aliqua extulerit, scailis p̄tinus ad motis, locum terra sep̄iunt, lutoq; obstruunt, ne euolet. Canalis subiectus Picē fluentem corriuat in scrobes,

*

Strues ipsa sexagenis, aut

*

quingenis cubitis, centenis & octuagenis alta patet p̄ ambitū. Sunt q̄ per utrunq; mēsu, cubitos centenos agant. Humor qui fluit, obiter frigescit contactu. Vritur fere biduum. Op̄is p̄fecti signum, si rogi decumbat, subsidatq; & quasi latus det. Summa hoc illi diligentia, & religione peragunt, ceu feriantes, & cum appreciatione præsentiu solenni, ut Pix ea tum copiosa, tum p̄ba euadat. Ac primus quidē sudor, q̄ aquæ modo fluxit in canali, Cedriū uocat, utiq; in Syria: ubi Pinus non sunt: quo in Aegypto corpora defunctorum perfusa custodiunt. Sequēs liquor, Picem fundit, quæ in cortinas æreas cōiecta, aceto spissatur, & coagulata, Bruticū cognomen accipit, dolis dumtaxat uilis, lentore ab alia pice differens, item colore rutilate, et q̄d pinus grior est. Autore Plinio, Brutiam a brutijs dici constat, ubi nascitur, ad oppidum Mamertium feraci nemore, ut Strabo inquit. Nec Brutianam silam, quamobrem uocari eam Picem dicat

*

comperi. Non enim silatum uinum, pro picato significari crediderim, etiam si Plinius quodam loco spissarum utilissimam medicinæ Brutiam, & ad uasa quoq; in Italia condendo uino, tradidit, quoniam pinguis & resinosisima utraq; præberet utilitatem. Hinc ex mascula arbore meliorem esse adijciunt. Id quod intelligi non posse, Plinius existimat. Theophrastus certe, uri Pinum in Macedonia, non omnem, sed marem scripsit, Pice gratia. Nec femina tamen radices negligi, q̄ ea tantum pars in femina tedam habeat, ex qua omnia illa fiunt. In Asia Syri non detrahunt tedam, sed machinamento quodam in arbore ipsa Picem urunt. Fit Pix e resina quoq; sola pice feruentibus cocta lapidibus in alueis ualidi roboris: aut si aluei non sint, congesta strue, ut in carbonis faciendi ratione. Hæc in uinum additur, farinæ modo tusa, colore nigrior, ut ait Plinius. Vicia Pice acor, aut odor fumidus, aut Pice adustio. Expimētum, si fragmenta subluceant, ac sub dente lentescat, acore iucundo. Asia picem Indicam maxime probat. Græcia e Macedonia Piericam, Virgilius Narintiam, condiendis uinis. Columella et Nemeturicā commendat: quæ in Liguria conficitur. Et Allobrogicam, quæ corticata dicitur. Siccata hæc uetustate in puluerē resoluitur, cribraturque. Idem autor Pice quoddam genus crudæ, Tasm uocari tradit, in defrutum Neapolitanum addi solitam. Sunt qui Rheeticam, Palladius Coracinam picem nominat, contra formicas arborum. Sed mendosa lectio est, & Coracinum picem legendum: id quod ex græcis rei rusticæ scriptoribus elicias.

g ij

A

Theoph. li. 9.
capite. 1. 2.
Pli. lib. 14. ca.
20. Item li. 26.
capite. 12.

B

D I O S C O R I D I S

C R E X M. V E R G. C O M M.

Resinis coniunxit natura Pices, ideoq; legitimo historiarum ordine, post eas Dioscorides de omni Pice docuit. Quod enim ex uiuentibus plantis resinæ nomine destillat, id incensa in furnis eadem materia, appellatione Picis, fuit, simplex a principio, & liquida tantum, mox ea de cocta, sicca etiam, non dissimili penitus potestate: & hoc tantum diuersæ, ut testatur est Paulus Aegineta, quod sicca in secundo ordine, desiccet, minusq; quam liquida calefacit: contra uero liquida. Habentq; ambæ, quod purget, maturet, discutiat, & acre sit. Ad omnia tamen liquida efficacior, sicca uero glutinandis uulneribus aptior. Ob quas uires, hic mox dicet, uulnerum remedijs utiliter siccam misceri.

Conon a quibusdam uocari liquidam Picem hic Dioscorides ait, quæ uox, & rei in ea estimatio, q; uetusta, & uera sit, non ausim ego affirmare. Id certe pro comperto est, græcis κωνον dici Pineam nucem, & ab ea forma mathematicis, terræ umbram, Conum dici, & Coni forma describi, & ab eo fructu, Pinum arborem, etiam Conum dictam posterioribus græcis fuisse, posseq; hoc loco, quoniam ex cognatis Pino arboribus Pix fiat eius appellatione censer: alioqui nihil habet ea uox quod ad picem referri possit. Dubitamusque nos, non κωνον prima producta, sed κωνον prima correpta, legi quodam potuisse, & ex usu Pici id nomē accreuisse, quæ scilicet in uindemia, dolia, & in alijs uitæ nostræ usibus fictilia pice ex interiore parte linirent, ideoq; picata passim dicerentur, & non picata. Qua uoce hic sepius utitur, ut in superiore capite cum ait, in uase non picato seruandam Resinam, &c. Quod totum græci κωνον uocant, qd est, illinire: licetq; κωνον proprie puluerem græci dixerint, nihilominus cinerem, calcem, & quæcunq; alia dicebant, quibus leuigari asperitas, & obstrui raritas posset, quod in dolijs uini, fictilibusq; alijs, quondam passim fiebat, & nunc uitro etiam fit: ideoq; græci κωνον, calce, glutinoq; & maltha aliqua illinire adhuc dicunt, & aconita fictilia cuncta illa, quæ picata non fuerint, & aliquo huiusmodi obstruata leuigataq; Nec nos mouet, q; in hac significatione prima producta κωνον aliquando, & κωνον inuenitur, facilis enim eiusdem soni litera, ad uitium in scribendo lapsus est.

D Quod deinde impresso codici deerat post λεπρὸς ὄνυχας, id est, scabros ungues, instaurauimus, καὶ λευχῖνας, id est, impetigines.

Nec multo post dubitauimus qd legitur, φύματα τε ὑστράς καὶ σκληρίας δακτύλις διαθορεῖ, quæ uoces si sic legantur, significant, uulnæ abscessus, & sedis duricies discutit, non sic forte legendum esse, sed mutatis locis, aut malis uulnæ duricies, & sedis abscessus legi potius oportere, quando communius malum sedis abscessus quam duricies fit, Non tamen mutare rem ausi sumus, satisq; fore credidimus, signasse locum.

De Picino oleo. C A P. XCIII.

πιρρῆλαιον

Pice fit quod Pisselæon appellant, separato liquore aquoso, qui supernatat Pici, sicut serum lacti. Nam expansa quamdiu Pix coquitur supra cortinam uellera madescunt, acceptoq; halitu eius exprimuntur in uas. Quas Pix liquida, præbet utilitates. Alopecias capillo replet, cum farina hordeacea illitum, quibus & liquida Pix medetur. Iumentorum ulcera, scabiemq; emendat.

Pli. li. 23. ca. 4.

Oleum picinum, græci πιρρῆλαιον uocant. Probatur maxime e Brutia, ut quæ resinosisima, & pinguißima sit. Color oleo fuluus.

C O N F U N D I T I N T E L L E C T U M. E X M. V E R G. C O M M.

Confundit intellectum, quod ultimū feminini generis participium, in græcis claudit hoc caput, contra quadrupedum ulcera, & scabiem utiliter inuncta. Non enim certum est, Picem ne, an Picinum oleum præstare id Dioscorides decernat: nec nos audemus de ea re censere, cū Picino oleo id Plinius tribuat lib. 23. capite. 4. dicens Picino oleo usum passim esse ad quadrupedum scabiem. Et Columella lib. 3. cap. 5. idem testatur, quo loco liquamen Picis oleum hoc nominat. Maro autem Pici id adsignat, cum in Georgicis suis cecinit, Idæasq; Pices, &c. Et Columella lib. 8. cap. 30. etiam confirmet, bitumen, sulphur, & plæraq; alia, liquidæ Pici in hunc usum miscenda præcipiens. Nos communem, & fere omnium lectionem secuti, Pici id tribuimus nihil, quod eiusdem uices Pix, & Picis oleum habent, in ea re periculi timentes: potuitq;

Dioscorides

Dioscorides forte, quod in Pice a se relictum fuerat, hoc loco restituere uoluisset.

¶ De Fuligineliquida Picis. CAP. XCIII.

Flt hoc modo eliquida Pice fuligo. In lucerna noua quæ ellychni-
um habeat, nonnihil Picis incendio, lucernamque fictili uase in
clibani speciem conformato, superius in angustum fornicato, inferius
perforato ut clibani esse solent, operito, & adoleri finito, consumptoque
liquore nouum infundito, quoad sufficentem usui fuliginem collegeris.
Vis ei astringens, acrisq;. Vtui est ad pigmenta, quibus palpebras linunt
& uenustant, & ad circumlitiones, item ubi glabris genis pilos restitui o-
portet, ad imbecilles, lachrymososq; oculos. Insuper ad eorundem ulce-
ra non inutilis est.

BARBARI COROLL.
Fuligo Picis, cremata Pice fit; quod quidem aliud est, q̃ Picecocta, ut in fuliginē refinum
diximus.

EX M. VERG. COMM.
Facile est, græci clibani, quem nos furnum uertimus, ex descriptione, picturaq; hac Diosco-
ridis formam non dissimilem his intelligere, quas nostra ætas Campanas dicit, & quibus offi-
cinæ passim utuntur, ex floribus, herbisq; subiecto igne, exsudatum humorem colligentes.

¶ De sicca Pice. CAP. XCV.

Liquida Pix decocta in spissam coit, quam uocant aliqui Palimpis-
sam, quo in genere quædam uisci modo lentescit. Boscas cogno-
minata. Altera sicca est. Probat purior, pinguis, odorata, subruffa, resi-
nosa. Calfactoriam uim habet. Dura emollit. Pus mouet. Tubercula, pa-
nosq; discutit. Vlcera replet. Vulnerarijs medicaminibus comode per-
miscetur.

BARBARI COROLL.
Palimpissa, nihil aliud est, q̃ cocta bis Refina. Nam prima decoctione Pix fit. secunda bis
pix, hoc est, παλμπισσα.

EX M. VERG. COMM.

Quod moneamus hoc capite unum tantum est, adiecisse nos illi scilicet, & instaurasse amif-
sas, incuria librariorum uoces illas. Talis Lycia est, & Brutia, cōiuncta simul picis et resi-
næ naturā, quæ in aliquot melioribus græcis his uerbis adhuc leguntur, *πικρὴ δὲ
ἔστιν ἢ λυκακίη καὶ βρυτινὰ διὰ φύσιν ἔχοντα πύσσα ἅμα καὶ ῥητινὰ*. Accessitq; nostro huic consilio
& Plinius libro. 24. capite. 7. dicens. Spissarum utilissima medicina est Brutia, quoniam pin-
guissima, & resiniosissima, utraq; præbet utilitates. Idem fere Dioscorides testatur.

¶ De ZOPISSA. CAP. XCVI

ZOpissam aliqui aiunt derafam nauibus resinam cum cera, quam
alii Apochyma appellant. Ea dissipandi naturam habet, quoniā
marino sale macerata fit. Alij Pineam resinam hoc nomine uocauerunt.

BARBARI COROLL.
ZOpissa, efficacior omni Refina & Pice traditur. Ad omnia; quibus illæ, profunt, uidelicet
adiecto salis e mari callo. Optima hæc, a tyrocinio nauium.

EX MAR. VERG. COMM.

Quod Zopissæ adiicit nomen, Apochyma, a Paulo Aegineta Hypochyma aptiore nomi-
nis cōpositione dicitur; nulla tamen nobis in ea uoce certa rei significatio est.

g iiij

A

λυχνὸς τῆς
ὑγρᾶς πύσσας

παλμπισσα καὶ
ξηρὰ πύσσα καὶ
βουκάς

B

ζόπισσα
ἀπόχυμα

Plin. lib. 16.
cap. 12.

C

ἄσφαλτος

¶ De Bitumine.

CAP. XCVII.

Bitumen Iudaicum cæteris anteponitur. Cuius probatio est, ut purpuræ modo splendeat, sitque graue, ac ualidum odorem uibret. Nigrum autem & sordidum, uitiosum est. Adulteratur Pice. Gignitur in Phœnice, Babylone, Zacyntho, & Sydone. Liquidum inuenitur in Agrigentino Siciliæ, fontibus innatans, quo utuntur ad lucernarum lumina olei uice. Hallucinantur qui id Sicilicum oleum nominant. Namque liquidi Bituminis genus esse constat.

Pli. li. 35. ca. 17.

Herodotus
lib. 1.

Iustinus lib. 1.

B A R B A R I C O R O L L.

Bitumen, græci ἄσφαλτος dicunt. Vnde lacus Iudææ, ubi nascitur, Asphaltites uocatus, quo Iordanis amnis, & Tiberiadē lacu altero profectus, influit lacum Asphaltitem. Galenus in Syria Cœle, salsum, & propterea Mare mortuum uocari prodidit. Viſtruius sub Babylone (inquit) lacus amplissima magnitudine, Asphaltides appellatur. Habet supranatans bitumen liquidum, quo Semyramis sit usa, cum Babylonem circumdedit muro. Itē Ioppe. In Syria, Arabiaque lacus, inquit, sunt, immensi magnitudine, qui emittunt Bituminis maximas moles. Ex Iudæa bitumen oritur, certo anni tempore supernatans, nec potest ibi tunc euelli, ad omnem contactum sequax atque lentum, præterquam filo, quod menstruum mulieris infecerit. Bitumen, alibi limus, ut in Iudæa, alibi terra est, ut in Syria, circa Sidonem oppidum marinum. Spissantur hæc, addensanturq;. Liquida sunt Zacynthinum & Babyloniu; cui detractō, subest sal: & ad lucernas utuntur. Babylone nigrum & candidum gignitur: ubi & sicum fonte quodam, ut inquit Eratoſthenes, Euphrati proximo. Liquidum est, & in Apolloniatarum agro inuentum: etiam si coire in glebas a Dioscoride dicatur. Fortasse defertur hoc a montibus liquidum: post concreuit. Siculum ex Agrigentino lacu pingue, liquorisque oleacei est. Incolæ harundinum paniculis id colligunt, ocylime ita adhærescens. Bitumen illitur æramētis, munīq; ea contra uim ignis. Statuas ex eo inungi solitas ferunt. Placet in ferarū fabrorum officinis, tingendo ferro, clauorumque capitibus. Nam calcis usu, cōstructos eo Babylonios muros, nouimus. Bitumen ex fulmine oriri dicitur. Vnde iuxta Babylonem redundant eo lacus, q; frequentia ibi cadant fulmina, ut Seruius grammaticus existimauit. Haud procul, Sufis puteum haberi scribit Herodotus, unde Bitumē, sal, & oleum extrahitur: id oleum Persas appellare, Rhadinacem.

Herodotus li
bro. 6. Erato,

D

E X M. V E R G. C O M M.

Vistruius libro octauo architecturæ suæ, cum de medicamentosis aquis agit, ait, bituminosas aquas interioris corporis uitia potionibus purgādo sanare. Licetq; uitiorū certum genus ille non dixerit, ex uiribus tamen & potestate bituminis, cōiiciendum id est, Iudaicumq; hoc Bitumen ideo a Dioscoride omnibus alijs præferri.

πιτῆς ἄσφαλτος, id
est, Picis bitu
men.

¶ De Pissasphalto.

CAP. XCVIII.

Nascitur in Apolloniatarum agro circa Epidamnum, quæ Pissasphaltos appellatur. Ea Ceraunijs montibus deuoluta, impetu fluminis rapitur, æstuque in littus expuitur, illic coacta in glebas. Mixtam bitumini picem redolet.

B A R B A R I C O R O L L.

Pissasphalton, aliud naturale, ut Apolloniaticum, Babylonium, Zacynthium e quodam lacu: Nam græci omnia ea modo Asphalton, modo Pissasphalton nominant, quandoq; resinam. Naturale optimum. Ex eo, quod cum feruet, innatat. Aliud factitium, mixta Pice bitumini. Hoc genus bituminis in Apolloniatarum agro inuentū, picem fossilem a Theopompo dictam auguror.

E X M. V E R G. C O M M.

Plinius Picis bitumen hoc, aliquādo Fossilem picem appellat, parum certa rei indicatione, & in qua sibi ipsi parum conuenit. neq; enim potest simul aliqd fossile, & liquidū esse. Quod enim liquidū ex terra in lucem protrahitur, hauriē. Testantur autē, Paulus Aegineta, Epyriq; incolæ omnes, & res ipsa, concreta substantia picis bitumen hoc esse, quod nostra ætate adhuc

picandis

picandis nauigijs, illic in usu est, ex quo uestigial ea gens non negligendum sibi fecerit. Nascitur autem ad Apolloniam antiquam ciuitatem, quam Strabo Epyroticam nominauit. Stephanus Ἰλλυρία dixit esse, κατὰ Ἰπιδάμωνα, ut ab alijs, quæ quondam eodem nomine, uigintiquatuor diuersis locis fuerunt, ea regionis nota distingueret. Fuit autem mos antiquis scriptoribus, homonyma locorum, regionis adiectione certius indicare. Quo fit, ut passim legitur, ἢ ἐν Ἀπιδωνίᾳ ἢ ἐν Ἰπιδάμωνα, non sic, sed aut, ἢ ἐν Ἰπιδῶν, legendū sit, ut Strabo ait: aut quod Paulus Aegineta, ἢ πρὸς Ἰπιδάμωνα, aut quod Stephanus τὴν κατὰ Ἰπιδάμωνα, id est, in Apollonia, quæ est apud Epidamnū, eiusdem Epyri aut Illyrii significatione, in qua & Epidānus ciuitas antiquissima fuit, de qua Thucydides, Paulus, pluresq; alij longius tradiderunt.

A
Strabo. lib. 16:

De Naphtha.

CAP. XCIX.

NAphtham uocant Babylonij, bituminis colamen, colore candidum. Inuenitur etiam nigrum. Vis ei ignium rapax, ita ut ex spacio protinus in eam transiliant. Ad suffusiones oculorum, & albugines utilis. Bitumen omne discutit, glutinat, emollit. Ab inflammatione tuetur. Vuluarum procidentias, strangulationesque, olfactu, suffitu impositu, emendat. Comittales morbos suffitu deprehendit, Gagatis lapidis more. Purgationes mulierum cum uino & Castorio potum elicit. Tussum uetere, & anhelitum adiuuat. Serpentium morsibus, coxædicum, laterumq; doloribus auxiliatur. Datur coeliaci in cataportio deuorandū. Cum aceto potum discutit sanguinem concretum. Dysentericis cum pitana liquatum infunditur. Distillationibus suffitione medetur. Mitigat dentium dolores oblitum. Cæterum pilos incommodos siccum replicat. specillo impositum. Concoctum autem & cum farina hordeacea nitro & cæra illitum, podagris, articulorū doloribus, lethargicisq; prodest. Pissasphaltos eadem quæ Pix & Bitumen, si misceantur, potest.

deph

B

BARBARI CÖROLL

NAphthen, Erathosthenes generi Bituminis liquidū ascribit. Sed ardēs eius uis, ignitū natura cognata. Procul abest ab omni usu. Ita appellatur circa Babyloniam & Susidem & in Austagis Parthiæ, profluens Bituminis modo liquor. Crematam ea, pellicem Creontis filiam a Medea ferunt, ad axas accedentem, corona igne correpta. Etiam si radicis cuiusdam uis, a Circe doctam, incendium id creasse Diodorus meminerit. Similis est naturæ limus, in Commagene urbe Samosata, stagno emergens, Maltham uocant. Flagra ea protinus, & cum quid attin git solidi, adhæret, & sequitur fugientes. Ita defendere muros suos municipes, oppugnare Lucullo, flagrabat miles armis suis. Aqua magis accenditur, utique nō admodum copiosa: pulueris tantum, & luti iactu refingitur. Itemq; aceto, uisco, sulphure. Possidonius in Babylone fontes Naphthe geminos esse tradit. Alterū candidi, quod & liquidū sulphur sit, ignes in se cōtrahens. Alterum nigri, quod liquidum sit Bitumen, & olei uice ad lucernas utile. In Mutinen si certe agro Italiæ similis Bituminis, seu Naphthæ potius liquor. Nascitur, & candidus, & rufus: quē circulatores ad præstigias suas utilem circūferunt. In terra Moena Pannoniæ iūcta, inquit Solinus, parte qua pontum attingit, herba nascitur, qua cum inficitur oleum, quod uocant medicum: diræ naturæ, aqua enim exardescere, terra extinguī.

Plinius lib. 2.
cap. 105. & lib.
37. cap. 15.
Idem, lib. 2. ca
pit. 104.
Plutar, in uita
Alexandri.

Solinus de mi
rabilib. mūdi.

De CVPRESSO.

CAP. C.

CVpressus refrigerat & astringit. Cuius folia ex Passō & exigua Myrrha uesciæ rheumatismis, & urinæ difficultati auxiliantur. Pilulæ autem ex uino tusæ in dysenteria, alui fluctione, tussi, & orto

καπρίσσο

D I O S C O R I D I S

C pncea, aut si reijciatur sanguis, conuenientissime bibuntur. Earum decoctum eisdem præbet effectus. Tusæ cum Fico duricias omolliunt. Nariumque polypo medentur. In aceto coctæ, & cum lupinis detritæ, scabros ungues eijciunt. Hernias intestinorum prolapsu erumpentes illitu reprimunt. Folia eadem præstant. Pilulæ cum arboris coma suffitæ, culices abigere existimantur. Folia trita, & imposita, uulnera conglutinant. Sanguinem supprimunt. Capillum ex aceto tingunt. Illinuntur per se, aut cum polenta ignibus sacris, ulceribus quæ serpunt, carbunculis, & oculorum inflammationibus. Admota cum cærato, stomachum corroborant.

Plin. libro. 16.
cap. 33.

C B A R B A R I C O R O L L.
Vpressus, longa, subrecta caudice attollitur, cætero quidem orbe, sat, hoc est, semine suo nascitur. In Creta etiam trunco, præsertim in montuosis Tirasensium, ubi cædua est, & cæsa regerminat: modo ab terra, modo a parte media, modo summa, raro ab radicibus. Semē ei perexiguū. Non enim galbuli, qui nascuntur, ut Theophrastus refert & Varro mutuatur, tanquam pilæ paræ, cortice cupressini, dictæ Coni, sed ijs intus primigenia semina dedit natura, Laricis proxima, perquam minuta. Hæc pilula dehiscente, illa cum maturefcit, diffantur & euolant. Neque facillime colliguntur, præterquam a peritis. Aduena Italiæ quondam, & natu morosa, baccis torua, folio amara, odore uiolento, materie rara, ac pene frusticuli generis. Diti sacra, funeribus indicandis, ante domos poni solita. Sterilis fœmina diu, sed metæ aspectu, quæ in fastigio ei conuoluta est, grata, distinguendis Pinorum ordinibus, facilem se consili cultura præbens, historiales picturas, tenui folio, breuiq; & uirente superuefcienti. Contra mas, spargit extra se ramos, deputaturque, & accipit uitē. Vterque sexus, in periculis, asseresq; admittitur, amputationē ramorum: qui tertio decimo anno, singulis denarijs ueneunt. Proinde filiarum dotem Plantaria, ueteres appellauerunt. Tarentinam Caro nominat, quoniam, ut Plinius arbitratur, primum e Creta uenerit Tarentum Cupressus. In AEnaria quoque succisa regerminat. In Creta quocunque loco quis mouerit solum, nisi seratur alta, hæc sponte gignitur. In Idæis albisque montibus etiam non appellata ea, profilit, ibiq; summis iugis, ubi niues nunquam absunt, plurima. Alibi non nisi in tēpore prouenit, magno altricis fastidio ac labore. Commendari maxime Cupressum Melisiam inuenio. Fructum Cupressi, Galbulos, & Nuces Cupressi recte uocaueris. Nam Galbæ, ut ait Suetonius, animalia sunt exilia, quæ in æsculis nascuntur. Cupressos a partu ramulorum parilium uocatas græci uolunt ἀπὸ τοῦ παρίσου τοῦ ἀκρίμανα. Easde & Charites appellari solitas, Eteoclis fuisse filias adnarrant: quæ dum tripudio Dearum subsiliunt, in puteum ceciderint.

Sueton. lib. 7.
in Galba.

E X M. V E R G. C O M M.
Q Væ in Cupressu pilulæ, autore Plinio, dictæ a nobis fuerunt, Galbuli, nuces, & consi, eiusdem rei appellatione, ab alijs etiam dici poterunt, omnibus in ea arbore notissimæ, in quibus exigua semina sunt, dehiscuntibus ijs euolantia magis, q̃ decidencia. His, folijs q̃ cæteri omnes in medicina addiderunt βλαστοί, id est, summa germina, & summos coliculos. Nescimusq; nos, an desyderari hoc in Dioscoride debeat. Paulus certe AEgineta, huius arboris coma in aliquibus utitur, hic tantum in fugandis cūlicibus usus est, licetque in uniuersum de totis folijs hoc loco agatur, possunt tamen summæ illæ parteis, teneritudine sua diuersa a folijs natura esse: quæ omnia peritioribus censenda relinquimus, ut interim quod commentationis huius nostræ cursum in foribus ipsis remoratum est, breuiter signemus. Decernit hic pota in passo, adjecta exigua Myrrha Cupressi folia succurrere, κύσι συνματιζομένη καὶ διωρεσία, si uerbum de uerbo uertatur, in uescam destillationibus, & urinæ angustijs: quorum ultimū hoc manifestam habet significationem, prius illud ex ui græci uerbi, quod est συνματιζεσθαι, fluxum mali & noxi alicuius humoris in eam partem significat: quemadmodū in podagris fit, in qbus græci dicūt, articulos συνματιζεσθαι. i. fluxu humoris in eā partē tentari. Quibus sic se habebitibus, dubitatū a nobis, ex uiribus Cupressi, q̃ adstringere, & refrigerare hic tm̃. Gale. autē & Pau. præter hæc siccare etiā dixerūt, si in uescā destillationib. siccādo adstringendoue cōferūt, quomodo

quomodo urinæ angustijs, quibus contraria ratione succurrendum est, conferre poterunt.

Accedit suspicioni huic nostræ, etiā quod Plini. lib. 24. cap. 5. de his agens ait. Cupressi radicem & folia, uesicæ & stranguriæ pota mederi: quasi, quod hic in uesicæ destillationes dixit, id Plinius ad urinæ stillicidium transtulerit. Non tamen in medicinæ decretis, Plinium anti quis græcorū medicis comparamus, sed in re parū certa, suspicioni nostræ, ex eo authore fidē aliquam adijcere uoluimus.

Aut igitur constituendum, in uesicam destillationes illas, pro uesicæ & urinæ stillicidio intelligendas esse, ut cognata simul urinæ duo mala, hic coniunxerit, stillicidiū scilicet, & difficultatem. Quod nos non probamus. quoniam quod paulo ante diximus, significat græcis *πυκνότης*, aut angustias illas urinæ, i. *δυσουρία*, nō pro his quæ uere & ex difficili urina urinæ angustia sunt, sed pro labe, & noxa aliqua alia, quæ ex destillatione humoris in eam partē urinæ accedat. Quod ex aliorū sententiā erit. Nam & Serapion sic uertit, & Cupressi uiribus magis conuenit, quæ ut diximus, in siccando, adstringendo, refrigerandoque sunt.

Quo loco etiā legitur, tritas Cupressi pilulas cum uino potas. & c. in antiquioribus græcis, non pilulæ tantū sunt, sed folia etiā, legiturque pilulæ & folia, & si Plinius pilulis tantum id tribuat. Nos græcos secuti utrunque diximus.

Dubitauimus præterea non procul a totius capitis sine, coniungendū ne in denigrando capillo, an in sistendo sanguine acetū Cupressi folijs esset, alijs græcorū codicibus id, alijs aliud indicantibus. Neque ab re penitus, quoniam sistendo sanguini acetū in usu est. In ambiguo tamē, accedente Plinio, qui eodem libro & capite ait, capillum denigrant ex aceto, ad capilli denigrationem & nos contraximus.

De Iunipero parua.

CAP. CI.

Iuniperum paruam græci, Arceuthyda, aliqui Mnesitheū, alij Acatidem, Aegyptij Libium, Galli lupicellum, Romani Iuniperū uocant. Eius duo genera. Altera maior, altera minor. Vtraque acris est. Excal facit, & urinam mouet. Accēsa serpētes fugat. Baccarū nonnullæ, nucis iuglandis magnitudine nonnūquam grādescere, aliæ nucem ponticā æquare inueniuntur, rotundæ, odoratæ, in mandendo dulces, subamaræ, quæ Archeutidis etiā nomē, id est, Iuniperi retinuerunt. Modice calfaciunt & astringunt, stomacho utiles. Contra pectoris uitia, tussim, inflationes, tormina & serpentium ictus efficacissime bibuntur. Urinam cient. Vnde ruptis, conuulsis, & uulua strangulatu subueniunt. Folia acrimoniam habent. Ideo tam ipsa, quæ eorum succum ex uino contra uiperarum morsus illini, aut bibi prodest. Corticis cinis cum aqua illitus, lepras eximit. Ramenta ligni deuorata, interficiunt.

BARBARI COROLL.

Iuniperi, duo genera quidem constituunt, Vnum, quod floreat. nec fructificet. Alterum quod fructificet, nec floreat. Solam fere arborum, prorogare fructus suos in biennium, qui ne maturiscescant quidem, sed decerpantur, & aliquandiu conditi seruentur. Et si in arbore relinquatur, marcescant. Materia fabricis conueniens, tam futuris sub dio, quæ terra obruendis. Plinius hac descriptione Cedrum maiorem, non Iuniperum demonstrauit, ut indicabimus in Cedro.

EX M. VERG. COMM.

Non leuiter in instaurando hoc capite laboratū nobis est, tam uarie corrupteq; in antiquioribus græcis totum hoc caput legebatur, alijs in prima parte statim maioris, minorisque Iuniperi diuisionē & appellationes describentibus, alijs alterā ab altero separantibus, & quæ ad minorem pertineret in principio, quæ uero ad maiorem in extremo calce docētibus, cunctis uero in reliquo capite parū sibi ipsis cōuenientibus. Sed nos meliorem ordinē, latinorumque autoritatē & fidē secuti, quā nunc legi formā instaurauimus, ita tñ, ut nihil additū, subtractūue a nobis fuerit, nihil ab impresso mutatū, quod non in reliquis omnibus, aut in pluribus saltē legeret.

A

B

ἀρχεὺθιδος ἰουνίπερου
μνησθεῖος
ἀκατὶδὸς
λὺπικελῶ

Plin. lib. 16. capite. 25.

D I O S C O R I D I S

C Credimusq; in Gallia minoris Iuniperi appellatione, ex obsoletis incertisq; notis, & uestigijs quibusdam, quæ in antiqua lectione adhuc apparent, non Iucipellus, quod caret sensu, sed Iuniperellus legendum esse. Nōtamen hoc multifaciendum.

Illud in Iuniperi fructus historia grauius & diligentius curandum, quod in antiquis ab impresso codice: diuerse legitur. Hic enim ait, alterius fructum nucis magnitudine provenire, nullo nucis genere adiecto, quod merito desiderandū est: alterius nucis Ponticæ, i. auellanae quantitate. At in antiquioribus, hisq; melioribus, in primo nucis Ponticæ legitur, in secundo fabæ: quā lectionem etiam Serapion secutus est. Quo fit, monente id re ipsa, ut etiam primo Ponticæ nucis magnitudinem, secundo fabæ adsignauerimus. Lapsus hic librarij fuit in exscribendo, in ter κύαμον & κερύον errantis.

Pli. li. 24. ca. 8.

Susplicamur & illic uitium esse, quo loco hic ait, Urinā idem etiam trahit, quapropter conuulsis, ruptis, &c. Non enim uidemus, cur hic inferat, ex eo quod ciende urinæ proffit Iuniperi fructus, ob eam causam conuulsis ruptisq; prodesse debeat. potest quidem omnia illa, autore Plinio, qui hoc ipsum agens, ait urinam ciere, illiniri & oculis in epiphoris, & dari conuulsis, ruptis, uuluis, &c. Verum nos id non damnamus, sed suspectam nobis sermonis seriem dici mus esse, desideramusq; illic aliquid, a quo certius fieret illud.

Quæ deinde in morbis & medicina pectoris uitia dicta a nobis sunt, a Plinio, Serapioneq; ad dolores eius partis contrahuntur.

ἰνιπερί μεγάλη
μυκίστη
ἀκατήρα

De Iunipero magna. CAP. CII.

Iuniperus magna, quam aliqui siluestrem Cupressum appellāt, alij Mnesitheum, alij Acateram, Romani Iuniperū, uulgo cognita est. Cupresso assimilis. Asperis, maritimisq; locis plæruncq; nascitur, eadem quas supradicta uires habens.

BARBARI COROLL.

Iunipero uirtute similem, Capidam a Catone dictam inuenio, ad lotium mouendum: nec quid sit, dicere coniectura possum.

D
ἰνιπερί
ἰνιπερί
ἰνιπερί

De hærba Sabina. CAP. CIII.

Græcis Brathy, alijs Baryton, alijs Baron, Romanis hærba Sabina appellatur. Duorum generum est. Vna folijs Cupresso similis, spinis horridior, grauiter olens, acris & feruens. Arbor est coactæ breuitatis, quæ sese magis in latitudinem fundit. Huius folijs nonnulli pro fuffitu utuntur. Altera Tamaricæ folio similis est. Vtriusq; folia nomas sistunt. Collectiones illitu mitigant. Et cū melle nigricias sordescq; repurgant. Carbunculos cum uino pota rumpunt. Sanguinem per urinam eliciunt. Partus apposita extrahunt. Et fuffitu idem præstant. Vnguētis calfacientibus immiscentur, & priuatim gleucino.

Pli. lib. 17. capi
te. 13. & lib. 24.
cap. 11.

BARBARI COROLL.

Herbæ Sabinae, aut etiam Sauinae genus id, quod simile Cupressi folio est, Cupressum Creticam nonnulli uocauere. Notum est contra gallinacei generis pituitas remedium, ut cubet in fimo qui ex herba Sabina fiat. Dioscorides hoc loco Baryton uocari eam tradit a nonnullis. Ut fortasse de hac intelligant scriptores, præfertimq; Diodorus, cum in Arabia nasci dicunt, Boraton, Iuniperū, Cedrumq; quasi Boraton p Baryto, uel cōtra exemplariorū uitio legatur.

EX M. V E R G. C O M M.

Non est, quod in Sabinae herbæ, tam græcis q̃ latinis appellationibus legentes monemus, nisi forte, quod a Diodoro in Arabia nasci dicitur Borathon. Sabina herba est, quā hic Barython, & Barathon uocari a quibusdam dixerit. Quod suspicari penitus ab re non est. cognatæ enim plantæ, & ab hoc deinceps descriptæ Iuniperus & Cedrus illi coniunguntur. Sed non omnino literis Diodoro, & huic scribuntur: hic Barython, ille Barathon uocant.

Sic

Sic dicta est a regione qua multa nascitur. Et herba dicitur, quoniam non arborescit, sed in latera caulium modo se explicat.

In curandis morbis, non bene in græcis legi suspicamur, καὶ ἀνθρακας περιρρέπτεσθαι οἶνον πο-
νέτω καὶ αἷμα διόσκειον ἔχει, quod paucis mutatis uersum a nobis est, carbunculorum crustas ex uino imposita exterunt, & cum urina sanguinem ducunt. ad exterendas enim carbunculorum crustas, foris magis quam intus remedia aliterunt, & ad duceudum cum urina sanguinem, apertus aliquid bibitur.

De Cedro. CAP. CIII.

Cedrus arbor magna est, ex qua Picem colligunt, quæ Cedria uocatur, Iuniperi modo baccas parit, baccarum Myrti magnitudi-
ne, rotundas.

BARBARI COROLL.

DE Cedro autores uariant, Theophrastus alteram Phœniciam, alteram Lyciam appellat, similes Iunipero, nisi quod folium Cedro acutum, spinosum & durum, Iunipero simplicius ac mollius. Excelsior & hæc quam Cedrus. Alij utranque Cedrum, inquit, nominant, sed quæ proprie sit Cedrus, acutum Cedrum uocare malunt, id est, Oxycedrum. Nodosæ ambæ, alis frequentibus, ligno contorto. Sed in Iunipero, spissiore, putrescenteque, Cedro æterna materies. Vtri quæ medulla rubens. Sed odorata in Cedro, sicut & fructus: qui & flauus, & magnitudine baccarum Myrti cernitur, esculentus, hilaris. Iunipero niger, acerbus, ingustabilis, durans ænum, prius non decidens quæ subnascatur alius. Arcades fructus in ea ternos eodem haberi tempore confirmant. Satyrus utranque sibi allatam sine flore, Cupressò similes, scabriore tantum cortice. Radices solutæ summa cute ambabus hærent. Saxosa loca & algentia sequuntur. Plinius longe aliter: quippe qui notas Iuniperi, Cedrique confundat. Fortasse uerius, quæ priores. Cedri summa genera duo facit, maius, & minus. Maioris iterum duo: quæ floret, fructum non fert: quæ fructifera est, non floret, & in ea antecedentem fructum occupat nouus. Semen eius Cupressò simile, Quidam Cedrelaten uocant. Ex hac resina laudatissima. Minoris quoque species binæ. Lycia, & Phœnicia, Iuniperi similitudine. Differunt folio. Nam quæ acutum, durum, spinosumque habet, Oxicedros (inquit) appellatur, ramosa, & nodis infesta. Altera odore præstat. Fructum ex ferunt, Myrti amplitudine, dulcem sapore. Dioscorides fructus Myrti similitudine Cedro maiori, ex qua pix fiat, non minori tribuit. Crassiuscula Cedri resina est: & ad faciendas pices commodissima. E Cedro simulacra, Dijs præcipue, sicut in Cupressò, Loto, Buxo, atque etiam oleaginis radicibus minora. Optima nauigijs, Syriæ, Pyœniciæque. Nam Syriacæ, in montibus natæ, tanta crassitudo ferit, ut homines terni caudicem amplecti nequeant. Solent Cedri humore quendam reddere, ut simulacra etiam Deorum quandoque sudent. Similis in Arcadia est arbor, Cedris nomine. Frutex in Phrygia pusillus, frondis æternæ, arborescensque nunquam, a Theodoro Gaza uocatus Cedrula. Hæc & Cedria a Theophrasto dici puto, quatenus arbor est, non quatenus frutex, tunc enim Cedris sit, non Cedria. Cedria Theophrastus inquit, differt a Cedro. Arbor folio pungente mucronibus perinde ut Cedrus. Hippocrates Cedrin ceticam, & Hederam ceticam foeminarum incommodis auxiliari scribit in uino lacteo, id est, repido. sic enim διονυλλία interpretantur nonnulli.

EX M. VERG. COMM.

Excelso quædam Iuniperus, Cedrus est: ob quam causam, alternatis quondam nominibus descriptæ ab aliquibus sunt.

Omitteremus libenter, quæ Plinius diuersis locis miscuit, quæ Iunipero debebatur Cedro, & quæ Cedro Iunipero tribuens. Omitteremus & quæ ab Theophrasto dicuntur lib. 6. quæ si quis diligentius expendat, facile intelliget causam, quare olim confusæ, mixtæque fuerint hæ plantæ.

De Cedria. CAP. CV.

Cedria optima est crassa, perlucida, ualidi odoris, quæ dum effunditur, guttatim, non dissipata coit. Cui ea uis ineest, ut defuncta corpora cõseruet, & uiuentia corrumpat. Qua ex causa, mortuorum uitam

A

κιδρὸς κιδρία

De arboribus
odoriferis,
Theophrast.
lib. 4. cap. 6.
& de Cedro
amplius ca. 12
& lib. 5. ca. 9.

Pli. li. 13. ca. 19.

B

Theoph. li. 3.

κιδρία

D I O S C O R I D I S

C aliqui appellauere. Vestimenta quoque & pelles, eximia calfaciendi & siccandi dote, corrumpit. Magni ad ocularia medicamenta usus. Quippe illita oculis claritatem affert. Albugines, cicatricesque detergit. Instillata autem cum aceto, uermes aurium necat. Cum Hyssopi decocto infusa, sonitus, sibilosque sedat. Cauis dentium indita, eos frangit, & dolores leuat. Quapropter cum aceto colluere eosdem prodest. Peruncto ante coitum genitali, abortiuum fieri constat. Anginae ea perunguntur. Tonsillarum inflammationibus auxilio est. Lendes, pediculosque illitu enecat. Cerastræ moribus cum sale imposita subuenit. Contra hausta leporis marini uenena, in passo sumpta auxiliatur. In elephantia, aut linctu, aut peruncti one proficit. Pulmonum ulcera purgat, & si cyathus eius sorbeatur, persanat. Tineas, & cætera uentris animalia necat. Infusa partus extrahit. Fit & oleum, a Cedria separatum dum coquitur, uelleribus supra halitum eius expassis, ut in Pice. Eiusdem ad omnia usus. Priuatim uehementer perunctum, scabiem quadrupedum, canum. boumque persanat. Inhaerentes ricinos enecat. Ulcera quæ ex tonsura accæperunt, ad cicatrices perducit.

Pli. li. 16. ca. 11.

B A R B A R I C O R O L L.

D Edria modo Cedri Pix, modo Cedri Resina uocatur, e Cedro magna, quæ Cedrelate dicitur, nihilque aliud est, si proprie loquendum sit, quæ cruda Cedri lachryma. Cedrium uero, succus Cedri est, e teda eius, concisa furnis, quæ primus aquæ modo fluxerit in canali. Nā sequens liquor, Pix iam, non Cedrium est. Sed confundunt autores, nunc per Resina, nunc per sudore redactū, nunc per Pice, Cedriā & Cedriū uocantes. Interim per oleo cedrino, quod Cedrelcon, ex malis Cedri, ut ait Plinius, appellat, omnibus enim istis, quancumque diuersis, eadē tamen natura inest. Columella, cedrinū liquore uocauit. Libri Cedrio inuncti, a tinea et carie uindicantur. Damnat usum Plinius, propter ancipitem eius proprietatem, uiuentia perimendi, perempta custodiendi. Cuius tamen ratio præclare a Galeno redditur: quia tamen si adurat, ita ut ordine quarto calfacientium censeretur meruerit, inter omnia tamen erodentia medicamenta, quæ græci Septica, & Septas cognominant, infirmissimum esse cõstet. Proinde uiuentibus appositum, uitali calore adiuncto sumit uires, & quasi accendit, atque ita iugulat. Sed defunctis additū, putredinem tamen & uitiosos humores exterit & absumit: quibus detractis, incorrupta seruatur. Galenus & Paulus non cedriā, sed Cedream uocabant.

indigitor

De Cedride. C A P. C V I.

Cedrides Cedri fructus uocantur. Calfactoriam uim habent. Stomacho aduersantur. Auxilio sunt tussi, conuulsis, ruptis, stranguariae. Menses ciunt, ex polline Piperis poti. Contra haustum leporem marinum in uino sumuntur. Serpentes fugantur, peruncto ex adipe ceruino, aut medulla, corpore. In antidota adduntur. Fuliginem quo modo ex Pice, congeri oportet, quæ eandem quam Picea fuligo uim præbet.

B A R B A R I C O R O L L.

Cedrides fructus Cedri sunt: ut Daphnides Lauri. Minus urunt, quæ Cedrus gustantis os: ut mandi quoque possint. Soporifera tamen ui. Si copiosius edantur: caput tentant, inflantque. Interanea quoque torquent, Galenus autor.

adqrit

De Lauro. C A P. C V I I.

Laurus quædam tenui folio constat. Altera latiore. Vtraque ex calfactoriam naturam habet, & emollientem. Vnde decoctum earum

in muliebres inſeſſus additum, uuluae & ueſicae uitijſ conuenit. Virentia A ſolia ſenſim ſubſtringunt. Illita quoq; ueſparum, apiumq; icribus opitu-
lantur. Eadem cum polenta, ut pane illita, inflammationem omnem miti-
gant. Sed pota ſtomachum effundunt, & uomitiones mouent.

B A R B A R I C O R O L L.

Laurus, cortice tenui deſcribit. Degenerat ut Quercus & Myrtus pertinaciter, adeo, ut in Antandro, fruſtus e rubro niger eueniat: quod & in Myrto ibi accidit. Fert & uuam ſuam Lau-
rus, tam ſocunda q; ſterilis: nec tamen ſocunda omnis. Copioſius ſterilis, quam marem apel-
lamus. Genera Lauri præter ea quæ in ratione Daphnoidis & Alexandrinæ monſtrabimus, Delphica, ex albo uiridior, maximis baccis, atq; e uiridi rubentibus. Diſta, q; uiſtores Delphis coronarentur ea, ut triumphantes Romæ: unde & triumphalem uocabant, ad Cæſaris Augu-
ſti tēpora, ut mox dicemus. Delphicā, Helianus e Theſſalia tranſlatā Delphos, ab ipſis Tempe ſcribit: tum cum Pythius Apollo, draconē ſagittis interfecit. Hanc Lactantius gramaticus etiā Tripodem uocari dicit, quoniam radices, inquit, ternas habeat. Apollini dicata, ppter uim tri-
plicē diuinationis, pteritorum, futurorū, præſentium. Cypria folio breui, nigro, per margines imbricato, criſpa: quam Laurum ſilueſtrē aliqui intelligunt. Nonnulli ſui generis arborem, q; bacca ei cerulea ſit, Muſtax, folio maximo, albicāte, flaccido appellata, q; Muſtaceis ſubijcere. Muſtacea quid ſint, & qua ratione ſiāt, Catonem conſule. Diximus & in Amylo, Regia, quæ & Auguſta dici cœperit, ampliſſima folio, baccis, arbore, guſtatu quoq; nō aſpo. Aliq ab Augu-
ſta Regiā diſpescunt, longioribus folijs, latioribusq; q; anguſta. Baccaliam uero dicunt hanc, quæ uulgaſſima eſt, bacciq; fertiliffima. Sterilē earū triumphalē, q; ea putant triumphantes uſos a Cæſare Auguſto, reieſta Delphica. Sterilem & Laurū eam eſſe phibēt, quæ miſſa ſit e cœlo eidē Cæſari, altitudine minima, folio criſpo ac breui, rara inuentu. Eſt & quæ Taxa dicit, To-
piarij generis, excreſcente in medio folio, paruula uelut lacinia folij. Habet & Spadonia opa-
citatis patientiſſima. Itaq; quantalibet ſub umbra ſolum implet. Extra Herculis columnas, in mari naſci fruſtex, folio Laureæ: q; eieſtus, in pumicē tranſfiguratur, in Heroo ſinu pare aquis
extante lapidea eſt, ſimilis tū uirenti. Magnitudo fructu bipedalis. In mari quoq; Rubro uiuere aſſerunt eā, ſed ſimilē Ariæ. Aria ſilueſtris arbor eſt, hyemis initio fruſtificans, materie durif-
ſima, ut neceſſe ſit, anteq; terebretur, macerari eā prius aqua. Quod & in Robore, Carpinoq; ſeruati. Honos ei ad carbonē argentiſ officinis, ut Robori, Vne doni, Piceq; utiq; ad coctio-
nem primā, Eſt & Aria, ſiue Agria, quā p Illice aquifolia Dores habēt, ut in Fago diximus. Ex ea Lauro quæ in mari rubro naſci, inſtrumentū muſicū Pandura factum a Troglodytis legi-
mus. In Corſica Laurus diu nulla fuit, nunc ibi ſatu prouenit. Ramo Laurum ſeri poſſe, con-
ſtat, quod ueteres dubitauerunt. Manu ſatarum receptarumq; in domos, fulmine ſola nō icitur. Ignes abdicat, ſalis modo, crepitu. Interaneorum etiam uitia, & neruorum, ligno torquente. Folium eius Lauream uocamus, et Cato Loream. Vna arborum, latina lingua nomen impo-
niſ uiris. Nam Tullius Ciceronis libertus Laureā nominabatur: qui Ciceronianas aquas epi-
grammate celebrauit. Laureolos quoſdā ueteribus dictos, Iuuenalis & Martialis poetæ ſatis in dicant. Sunt qui Lora hinc dicta exiſtiment, quæ antiqui Laura nuncupabāt, a Laureā triūpho-
rum: ſub qua ſolerent captiuos uincire, ducendos in pompam. Vri lignum eius pphanis uſi-
bus: ſed ne aras quoq; ipſas accendi eo ſas erat: ut quidam mirētur. Vnde Horatius, et Papini-
us Laurum ipſam, non ſolum Imperatoribus, ſed Vatribus dicatā cecinerint. Cum Hedera Po-
etarū, Laurus Ducum fuiſſe legeretur. Quidam ſeniles baculos, e Lauro quoq; faciūt. Cæſarū Pontificumq; domos, militum arma, faſces Imperatorum ornare quōdam ſolita. Pacis ut Olea, ſic uiſtoriarum Laurus ſemp index. In lauro uetere Spartani libi et bellaria iacentes rodebant poſt coenā, ob id ſolia eius, Camaridas ἀνὸ τοῦ κάπτου, quod eſt, rodere uocabant, & placentas ipſas Camara, ſiue Pſeſta, hoc eſt, polentā, oleo conſperſam: quarū loco nobilioribus, Epſela, ſiue quod idem eſt, Matrye dabant, ceu ſportulæ quedā maiores precioſioresq; ut turdi, palumbi, merulæ, turtures, et anſeres, & alia hſ ſimilia. Poſt obtinuit, ut omne paulo ſuauius atq; lau-
tius edulium, Matrya diceretur: ſiue ab eo uerbo, qd pinſere, unde Magides, & Maze quoque ſint appellatæ: ſiue ab eo, qd mandere ſignificat, unde Maſtiche dicat. Hæ quia in poſtremo cæ-
narum dabantur, ab alijs Epidorpiſmata, & Epidiphnides appellari ſolent. Hinc iuris cuiuſdā p-
cioſi genera Magis et Capis appellant, in Plauti poetæ Pſeudulo. Nam & uafis genus eſt Ma-
gis, quod tamen Varro a magnitudine deducit, ut Capis quoq; nō captis legi poſſit. Fuit em̄

Plin. li. 15. ca. 30. & alibi paſ-
ſim.
Theoph. li. 3.
capite. 12.

B

h ij

D I O S C O R I D I S

C hoc moris ueteribus, Iurulēta ipsa nominibus uasorū appellare: ut Paropsidē, et Tribliō. Sed & Tragematis uice Laurum in secundas mensas inferri solitā, Callias & Diocles, ut Athenus ingt, autores sunt. Ramus Lauri, aut etiam Oliuæ, a quibusdam uocatur Arfacus. Quancq; & aucula Erythacus, hoc ipso nomine appellari solet. Est aut Erythacus, a Theodoro dictus, Tubecula. Est & Tubetra quēdam uolucris ab eodem, confictio nomine, quam Aristoteles Batia uocauit.

Vide Cēlium
lib. 3. cap. 7.

EX M. VERG. COMM.

Primū id legentes monemus, nescire nos, quanta sit eius loci integritas, & fides, ubi in omnibus græcis pariter legitur, πολὺν δὲ πρᾶνεν τὸν σῶμαχον καὶ ἰμῖτος κινεῖ, quarum uocum manifestus est sensus. Non tamen antiquiores latini, Serapion scilicet, & antiquus interpres, quicunq; ille fuerit, sic quōdam legebant. In omnibus enim est, Stomachum subuertunt, & nauseas, uel uouitiones faciunt, non diuerso tamen, sed contrario penitus sensu. Ex quo oborta nobis suspicio est, potuisse quōdam illic πρᾶνεν legi, quod lenire et mitigare est. Non em̄ quod lenit uouitiones facit, sed aliud similiter desinens, aut non ideo dissimile uerbum, qualia sunt ἱπράχνει, παχύνει, aut ἀνακύνει, uel his simile aliquod aliud, quod subuertendi, miscendi, & exasperandi uim haberet.

Illud etiam ex melioribus uetustioribusq; græcis instaurauimus, quod in impresso multisq; alijs deerat, ob id ex melle, passo uel concisæ, &c. Deest enim in pluribus λῆται, quod est concisæ, & cum melle aut passo subactæ.

Eadem fide etiam aurium duobus malis grauitati scilicet, & dolori tertium addidimus, qd incertos uocum sonos, indiscreta significatione ad aures peruenientes pertinet. ἀπελπίται enim est, καὶ ἀνοκίται, καὶ ἡχύνει quos ueteres incertos, & indiscreta significatione sonos inter aurium uitia dixerunt, de quibus alibi certius dicemus.

D
δαφνιδες

De Baccis Lauri. CAP. CVIII.

LAuri Baccæ magis q̄ folia calfaciunt. Ergo in eclegmate cum melle, uel passo profunt tibi, ortopnceæ, & omnibus thoracis rheumatismis. Contra scorpionum ictus ex uino bibuntur. Vitiliginēs emaculant. Succus Baccarum utilissime aurium dolori & grauitati instillatur, cum uino uetere & Rosaceo. In medicamenta autem adijciuntur quę neruorum lassitudines reficiunt, acopa uocant, & ad unguenta quæ calfaciunt & discutiunt. Cortex radices calculos rumpit. Partus necat. Hepaticis prodest, tribus obolis in uino odorato potus.

DAPHNIDES, & DAPHNOCOCCI, Baccæ Lauri sunt, Daphnoides uero frutex.

πλάτανος

De Platano. CAP. CIX.

TENERRIMA Platani folia in uino decocta, mox illita, oculorum fluxiones sistunt. Tumores & inflammationes leuant. Decoctus cortex in aceto, dentes in dolore colluit. Virides pilulæ in uino potæ, serpentium moribus auxiliantur. Exceptæ aut adipe igni ambusta sanant. Incidens foliorum pilularumq; lanugo, oculos & aures defendit.

Theoph. lib.
4. capite. 7.
Pli. li. 12. ca. 2.
Herodo. li. 7.

PLATANO in quantam uis altitudinem radicandi se natura, modo nihil obstat, & aquæ superat. Qualis in Lycio Athenis fuisse traditur: quæ iuxta aquæductum, nouella adhuc, in drantes fere centum progressa est. In Creta insula, ad Cortyniam, Platanus sterisse dicitur, ad fontem quendam, quæ folia hyeme non amitteret, sub qua Ioui compressam Europen indigenæ fabulantur. Itemque in Cypro una, simili esse natura, uisam aliquando. Platanum in æreo tripode nasci credit Theophrastus. Vna hac maxime tolerat securim, & subuersa flatu ab radicibus, reponi potest: ut Salix & Populus alba. Ideoq; actionem dabat Labeo arborum furum cæsarum, contra eos, qui prostratas uel subcidissent, uel asportassent, quoniam nomine arborum

arborum continerentur quæ possent resurgere. Hæc Italiæ aduena, diuq; in ea, Theophrasto etiamnum prodente, rarissima: per mare Ionium, in Diomedis insulam primum inuecta. Communicata quoq; barbaris occidentis, & ad Morinos usq; imperij Romani terminos perducta. In Lycia unius specu, Plinij ætate, octuaginta, atq; unius pedum cauo, prædicata. Huius umbra delectatum Xerxem, in terra Lydia reperi, qui diem integrum cum exercitu consumpsit sub ea; atq; ut capti amore solent, multis donauit arborem muneribus: quodq; ridiculo proximum est, custodem ei tanq; pellici, Meledonium quendam reliquit, autor Helianus. Nutritur mero Platanus infuso radicibus. Commendatio eius summa. Solem æstatibus arcere, per hyemes admittere. Platani satæ, ut Plinius inquit, regenerauere uitium. Sunt & Platani pumilæ, Chamae Platani uocatæ. Id & genere ferendi & recidendi fit. Ratione inuenta, sub Augusto Cæsare, quemadmodum nemora ronderetur. A Platani foliorum amplitudine Platanistos græci uocant, loca spaciofa, lateq; parentia, ut Photioni credamus. Platanionem uero Hippocrates saxum mari extans leuigatumq;. At Platanos uasis genus est, e quo popana fingeant. Platanum Italia modò rarain habet, Romæ uisam, & in Venetia, puincia Bassiano agro, in uiculo cui Sogia nomen sit. Theophrastus e Platano Aegyptia unguentum fieri solitum scribit commendatum uestibus, non per se, sed additum in alia, presertimq; Irinum.

EX M. VERG. COMM.

A Mabilis & expetita omnibus quondam hæc arbor fuit. Peregrina primum Italiæ, mox omnibus in ea locis, & hortis uiuens. Iterum neglecta, paulominus q; ad antiquam gratiam ætate nostra restituta est, uiretq; & in delicijs in Aetduria etiã habetur, magno ipsorum & hominum argumento, quibus uoluptas & uitæ oia, aut contra sollicitudo, & utilitas in precio & honore fuerint. De ea qui plura nosse uelit, Plinium consulat lib. 24. cap. 8. nos ea, breuitati consulentes, relinquimus.

De Fraxino. CAP. CX.

F Raxinus arbor nota est, cuius folia cum succo peruncta, aut ex uino pota, uiperarum ictibus auxiliantur. Corticis cinis ex aqua illitus lepras eximit. Ramenta scobemq; potu, perniciem afferre traduntur.

BARBARI COROLL.

F Raxinum, Mileam, & Meliam quoq; græci uocant: Trinodemque cognominant, hoc est, Triozon, quia ramos habeat prægrandes, ordinatos, paresq; numero: quod genus arborum, græci ἀφροδισιάκων, hoc est, ut quidam interpretantur, egregias appellant, copiosissima, proceræ, teres. Fructificat æstare. Quancq; in duo genera diducitur. Excelsum, procerumq; ligno candido, molliore, crispiore, neruoso, enodi. Alterum humilius, scabriore, duriore, fusciore, sed folio Laurus, Launfoliæ acutiore, leuiterq; per ambitione ferrato, et ut Theodorus inquit, subsidenti, quia legisset ἐπικαυθίζοντι, nos ἐπικαυθίζοντι, hoc est, non sine quodam marginis, uel cacuminis aculeo. Ramulum totum, ceu folio singulari credas consistere. quoniam ab pediculo uno, folia simul cuncta erumpunt, & per ampla uersum interualla, tanq; per genicula continenter, ordineq; pendeant, perinde ut in Sorbo, unde Pennata dicitur a Plinio. Internodia latiora candida, coniugationesq; plures, & folia longiuscula. & magis angusta, coloris herbaei. Cortex leuis, spissus & tenuis, rubro colore. Radices crebræ, sublimes & crassæ. Carere hanc flore ac fructu, in Troadis Ida, credunt falso. Etenim fructum fert minutum in filiquis, nutosum, qualem Amygdalæ, gustu subfalsum. Fert & Lauri modo Fraxinus muscæ, & alia quædam astrictiora gustu, circinnataq; ut pilulæ Platani. Hæc partim cum fructu emergunt, partim multo post nascuntur ei, et quæ Plesta, hoc est, plicamæta, siue, inuolucra dicuntur. Leuis exire amat cauis, madentibusq; locis, scabra sitiētibus & saxosis. In Macedonia Bumeliām appellant, raro corpore, minusq; crispo, amplissimam & lentissimā. Fraxinus, Pirus, Pirafter solæ in planis, & materia & fructu commendantur. Oportuna cedi autumnus est. Materies ad plurima utilis. In Ida Troadis, intantū similis Cedro, cortice ablato, ut Plinius, Taxo, Theophrasto ementes uti fallat. Quidam situ diuifere Fraxinum. Campestem crispam, Montanā spissam. Folia earum iumentis mortifera. Cæteris ruminantium innocua, idque in Græcia. Nihil iumentis nocent in Italia. Et hoc de Taxo, Theophrastus interpretatur, nō de Fraxino. Fortasse nominum uicinitas sefellit prodentes, Græcis Fraxinum Mileam, Taxum Milon uocantibus. Matutinas occidentesque umbras eius, quibus sint longissimæ, nulla serpens attingit. Expertum se Plinius dicit, Si fronde ea, gyro claudat ignis, et serpens, in igne potius, q; in Fraxino.

A

Meminit &
Celsus lib. 13.
cap. 31.

μυρία

B

Plin. li. 16. ca.
13. lib. 24. ca. 8.

h ij

C xinum fugere serpentem. Fraxinus, anteq̃ serpentes prodeant, florer, nec ante conditas folia dimitit. A Fraxini foliorū similitudine, Fraxinula, siue Fraxinago herba dicit̃, ueteribus nūquam dicta, quod equidem sciam. Mauritania, uel hanc, uel similem Fraxinulę, Secaculim appellat: in compositiones ad uenerem excitandam quęstas, adhibitam, radice candida, & nodosa, flore uiolaceo, fere inter candidum & ceruleum, semine rotundo, ut Iuniperi. Folio inter Pisum, atq; Fraxinum. Non desunt tamen qui Secaculim, ex India tantum inuehi putent, notis quas modo exposui, quandoquidem Fraxinago hæc, quę in nostris habetur manibus, inefficax & infirma sentiatur ad medicinam.

¶ De Populo alba. CAP. CXI.

P otus albę Populi cortex uncia unius pondere, ischiadicis ac urinae stillicidio prodest. Abortiuum fieri tradunt, si cum mulino rene bibatur. Folia quoque cum uino post purgationes pota, idem præstare produntur. Tepens foliorum succus utiliter aurium dolori instillatur. Pilulę quę primo foliorum partu exiliunt, illitę cum melle, oculorum hebetudini medentur. Memoriae prodiderunt, corticem albę Populi particulatim cęsum, & fulcis stercoreatis mandatum, omni tempore anni edules fungos proferre.

Pli. li. 24. ca. 9.
Theoph. lib.
2. cap. 14.
Columel. lib.
5. cap. 5.

¶ B A R B A R I C O R O L L.

P opulus duplex, alba, & nigra. Alba λευκή, nigra, ἄγριος gręcis appellata. Vtriusq; folia ut Crotonis, in iuuenta circinata rotunditatis sunt, uetustiora in angulos exeunt. Ecōtrario, Hęderę angulosa rotundantur. Propterea meminit Theophrastus, putare quosdam, mutari candidam, ut Croton & Helix, in Hęderam uerustate, quemadmodum & Pirus in Pirastrum. Habet candida cum quibusdam perpaucis proprietatem illam, ut ab æstiuo solstitio circumagatur, hoc est, partes supinas foliorum conuertat, sicut Olea, Salix, Vlmus, & Tilia, quod quidem sideris confecti, rusticis argumentum est. Vtrunq; genus erectum, sed nigra procerior & leuior. Folium simile ligno. Intus utriq; par candor. Neutra uidetur florere. Populorum folijs grandissima lanugo, gręci χροὺν appellāt. Euolat candida, ut Iulus. Nostri tria genera Populi fecerūt. Albę: quę uuas, Bryon uocatas, ferat unguentis, folio numerosiore, bicolore, superne candido, inferiore parte uiridi. Nigrę: quam Arcades sterilem putauere. Sed in Creta fructificat in ipso Idę specus aditu, & ad fontem quoq; Sauri, duodecim ab eo loco stadijs. In Cindrio quoq; proximo ab Ida monte, & circa Tirasiam, parte montuosa. Tertium genus Libyę, folio minimo ac nigerrimę, fungisq; enascētib; laudatissimę. Populi ferunt in folijs guttam, ex qua apes ppolim suam faciunt. Inter nigras efficacissima Populus est, quę in Creta nascit̃. Aristoteles autor est, Acheroīn uocari nigram Populum. Pausanias, candidam ita nominatam, q̃ Hercules in descensu ab inferis, apud Acherontem uidisset eam, ramumq; extulisset. Proindeq; non alio ligno, cremari uictimas in Elide, Ioui olympio. Aristoteles omne satum siluofum, arborosumq; Acherusion dici, prodidit. Ad quod forte alludens poeta festiuissimus, Vlmorum Acheruntem dixerit in Amphitrione. Resina Populo exigua est, humor e cauis huius effluit, medicinę utilis. Oleum fit & e Populo nigra, semine. Populeū uulgo, AEgironon, a gręcis appellatum. Verno id conficitur, cum plurimum grauis est, prægnansq; resina. Nam unguentum Populeum ex uua Populi, quę Bryon est, conficitur.

¶ E X M. V E R G. C O M M.

Exposita omnibus in Theophrasto, Plinioq; & plarissq; alijs, utriusq; Populi albę scilicet, & nigrę, de qua mox dicemus, omnis hystoria est. Poteruntq; uolentes ab illis certiora & plura audire, q̃ excerpta ex eis, et exscripta ab aliquibus nostra fuerint.

¶ De Macere. CAP. CXII.

M acer ex Barbaria aduehitur, cortex flauescens, crassus, gustu perq̃ astringens: qui contra cruentas excreationes, dysenterias, & alui fluxiones bibitur.

M A B R B A R I C O R O L L .
 Macir, græce Macer, & Xylomacer, cortex est rubēs, radicis magnę, nomine arboris suę. Conuehitur ex India. Gustu acerbo, & cum quadam acrimonia, iocūde odorato, ut Galenus inquit. Qualis ea sit, incertum habet Plinius. Recentiores, non radicis, sed nucis odoratę corticem, ac folliculum esse affirmant: idq; uero propius est, & plane ita modo cernitur. Hanc nucem græci modo Carion myristicon appellant, hoc est, nucem unguentariam: quę sane diuersa est a glande unguentaria, ut post constabit.

E X M A R . V E R G . C O M M .

Multa sunt, quę inuentum hoc loco Macer, peregrinitatis in hoc scriptore, & alienę elocutionis arguant. Siquidem, quod in aromatum cęsu, & ordine est, nasciturq; in India procul a nostro orbe, inter uiliores, & nostrę orbis arbores, tractari non debuit, nec certam habet generis historiam, si quod in India nascitur, apud Barbaros nasci dicatur. Græcis enim Germani etiam Barbari sunt, quibus in frigido cœlo nihil huiusmodi nascitur. Neq; Dioscoridis etate consueuerant ad orientem, & meridiei mundi partēs Barbariam nominare. Quo fit, ut credamus, a proprijs sedibus, quę illi inter aromata erant, in alienum locum temere translātū fuisse Macer hoc, & quod legitur *in rō capēpē, in rō iudicē* legendum, aut intelligendū saltem esse. De ligni cortice Galenus multa, & post eum Paulus Aegineta, pluresq; alij.

Nostra ætas ex India aduētū aromatis appellatione nouit, non ligni corticem, sed odoratę nucis, corticosum operimentū, et quasi uillosum folliculū, qualis in Ponticis nondū penitus maturis nucibus uidetur. Qui si idē cū hoc, & eo quod Galenus Xylomacer uocat, sit, peritiōrū iudicio relinquimus. Nobis, ut a primo diximus, in scriptore hoc, suspecta omnia facit, loci breuitas, incōcinna elocutiō, & quod in pbatissimo mihi codice, nusquā Macer hoc legitur. Ceteri tamen omnes de eo tradiderunt. Nosq; eorū fidē & autoritatē secuti, hætenus de eo egimus.

De VLMO. CAP. CXIII.

Vlmi & folia, & cortex, & rami uim habent spissandi. Folia trita ex aceto ad lepras efficaciter illinūtur. Vulnēra glutināt, sed multo magis corticis Tilia, si fascię loco intorqueat. Nam lorī more flecti potest. Crassior cortex in uino aut aqua unciatim potus, pituitas trahit. Fracta ossa celerius solidescūt, si decocto foliorū corticis aut radicis foueātur. Humor in folliculis enascēs prima germinis eruptiōe, cuti illitus nitōrē inducit, faciēq; splēdidiorē prestat. Qui dū siccat, in animalia abit, quę culi cū formā gerūt. Folia cū tenerescūt, olerū more ad obsonia usurpantur.

V B A R B A R I C O R O L L .
 Vlmm *πύλας* græci uocant, utiq; campestem, quę & fruticosior. Alterū genus montanę, Oripteleam nominant. Folium indiuisum, leuiter per oram ferratum, oblongius q̃ Piro, scabrum. Arbor grandis & celsa, irriguis amica, ligno flauo, neruoso, robusto, ut quę tota cor sit. Vtūtur eo ad fores lautiores, ad cardines, assamenta portarum, & torcularia, fontium caueas, & ad carpentarium quandoquē opus. Viridis facile ceditur, sicca difficile. Sterilis habetur arbor. Cratę Vlmo, ut Fico, Robori, Platanoque gignuntur. Vuam fert, & in petiolis lachrymę modo gummi, & bestiolas culicibus caprifici similes, in folliculis & autumno Cachryēs uocatas, cōplures, minutas, atq; nigras, ut Theophr. scribit. Italix quatuor Vlmi sunt genera. Nostrates densiore folio, & ab eodem pediculo numerosiore. Gallicū. Siluestre. Quartum Attinias uocant. Excelsissimas, & in ijs Sicanas illis præferūt: quę nō sunt riguę. Steriles Attinix. Ideo plantis seruntur, autumno uiribus, & Maritas appellamus. Reliquę proueniūt. Samara, siue Amara, ut Columellę placet (ita nominat Vlmi semen) colligitur circa martias Kalendas, cū flauescere incipit, priusq; folio uestiantur Vlmi. Columella Vlmoū duo tantum genera putauit. Gallicū, & Vernaculū: illud Attiniam, hoc Nostratem uocari: qui & Tremellium scropham reprehēdit, q̃ Attiniam Vlmm nō ferētē Amaram falso sit opinatus: Nam rariorem, inquit, sine dubio creat: & idcirco plarisque sterilis uidetur, seminibus inter frondem primę germinationis latētibus. Itaq; nemo inserit ex Amara, sed ex sobolibus. Est au

h iij

A
 Plin. lib. 11. capite. 8.
 Galen. lib. 7. simpliciū far. capite. 89.

πύλας

B

*

Theophr. lib. 3. cap. 14.
 Plin. lib. 24. cap. 11.
 Columella libro. 5. cap. 5.

D I O S C O R I D I S

Crem Attinia lōge leior & procerior nostrate, frōdemq; iucūdiorē bubus prābet. Amara, ut dixi, dicit semē eius latina uoce. Nā grāce, *κμέρα* nō hoc significat, sed riulū & incile rīgan- dis hortis. ita dictū, quia marcescere phibeat: sed & aurū cauernā, dicuntur a grācis Amara.

T E X M. V E R G. C O M M.

Heophrastus & Plinius longissime de hac arbore tractauerūt, ideoq; nec a nobis desyde- randa. Illud tātum monemus, uoluisse nos Tiliam corticis illīc dicere, quo loco legitur, Cor- tex pro uinculo & fasciola uulneri. &c. Qua rei descriptione Plinius antea usus fuerat, ne Ti- liā arborem Vlmo miscuisse nos aliquis dubi- ret. Scimus enim & nos, a Tilia arbore, cuius materia lenta & tractabilis est, quōdam Lēiscos, fasciolasq; in coronis ex ea arbore pendētes.

Non omitemus prāterea, in deicienda aluo, Plinium frigida aqua tantū uti, nec pituitā so- lum, sed etiā aquā deicere: quā nescio an Dioscoridi deesse possint, & abundare uinū, quo hic in eadem purgatione utitur.

Et cum nihil osseum in Dioscoride illīc legeretur, ubi dictum a nobis est, solidescunt celerri- me ossea succedente cicatrice. &c. non sine causā ad fracta ossa contrahendā esse rem cogita- uimus: cum illīc *πρωί* uerbum esset, quod id tantum significat, ut paulo ante testati sumus, & prāterid *καταγμα*, quod in fractis tantum ossibus, ab antiquis medicis receptum est.

Quas deinde bestiolas culicibus similes in Vlmi folliculis nasci Dioscorides ait, a Theo- phrasto Cnipes dicūtur, quēadmodum ex Caprificis euolātes. Similes his, aliq; bestiae Psenes ab eodem uocantur.

De Lignorum marcore,

C A P. CXIII.

ἀπό τῶν παλαι-
ῶν καὶ πρῶτων
σαπρία.

Incidens caudicibus lignisque ueteribus caries congeritur, quā fari- nā modo illita, ulcera purgat, & ad cicatricem perducit. Serpētia co- hibet, si cum pari aniso & uino subacta, linteisque imposita, illinatur.

B A R B A R I C O R O L L.

Cariam lignorum, *καπρόντα* grāci uocant, & Embion poeta.

T E X M. V E R G. C O M M.

DRedidissē ego facile, de Vlmi carie tantū a Dioscoride agi hoc loco, nisi Paulus AEgi- neta his uerbis subscripsisset. Lignorum caries, eorūq; prācipue, quā mediocrem adstringen- di uim habent, qualis Vlmius est, humentia purgat ulcerā, & explet.

De Populo nigra.

C A P. CXV

ἀγρίος

Populi nigræ folia cum aceto illita, magna utilitate podagricis do- loribus illinūtur. Resinam Populus fundit, quā in malagmata ad- ditur. Semen potum ex aceto comitialibus utile est. Lachrymam comme- morant, quā in Padum amnem defluat, durari, ac coire in succinū, quod Electrum uocant, aliq; Chrysophoron. Id attritu iucundum odorem spi- rat, & aurum colore imitatur. Tritum, potumq; stomachi uentrisque flu- ctiones sistit.

B A R B A R I C O R O L L.

Theophr. li-
bro. 3. cap. 14.

POpulus nigra, qualis ea sit, indicatum est in candida. De ipso autem Electro, sunt qui tria eius genera constituent. Ex arborum succo primum, quod inde Succinum dicatur: ut non hoc sit quod Homerus nouerit. Secundum naturale, quinta parte argenti, ut in canaliensi au- ro. Tertium cura fit, ex tribus auri partibus, & una argenti: quanquam quod quintam par- tem argenti excedit, incudibus non resistat. Errare Plinius existimat, qui melius esse putant naturale. Cuius probatio, ut ueneno accepto, & stridorem emittat, & uarios quasi arcus cœ- lestis in dissimilitudinem reddat colores. Narratur & hæc ad lucernarum lumina clarius ar- gento splendere. Electrum inquit Strabo, purgamentum ipsum auri est, coctura prima qd' ex sulphurosa cuiusdā cretæ comitatu fit. Argentū aurūq; in se cōplexū, chymistæ Phaetontem uocant. Diuersum ab hoc uidet genus esse qd' Ambra, siue Ampar caninū dicit. Aetius Am- bar, nos Succinum oriētale primi nominauit: incōpeatum ueteribus ut arbitror, multis lo- cis scaturiens, bituminis & sulphuris modo. Discrimen eius triplex, Ruffum, & pingue præe- runt.

runt. Selachiticū, a municipiō quodam Indiæ uocatum, ubi nascitur. Subalbidū ex Arabia felici. Minus probatur e maritimo quodā oppido, cui Sechra nomen est. Deterrimū nigrescit, quod pisces deuorauere. De hoc tamen aliq̃ aliter. Nos græcam fidem sequimur.

VERISIMILE est, debuisse in scriptore hoc etiam coniungi Populū albam, & nigram, & neutram absq̃ altera tractari. Nos tamē, quoniā locis omnibus in antiquissimis græcis reperiuntur, eas relinq̃mus, nō ausi mutare, qd̃ antiquorū omniū codicū fide immutabile esse debuit.

De Succinō, quod Electrū ueteres, nostri Ambram dicunt, qui nosse uelit plura, apud Plinium legat libro ultimo, cap. 3. & 4.

Nos etiā illud adiicimus, credere nos, nō ex utraq̃ Populo succinū fluere, sed ex nigra tantum: ideoq̃ non iſ̃ ἀντὶς numero multitudinis, sed iſ̃ ἀντὶς numero singulari legēdum esse locum. Nihil tamē testantibus omnibus græcis, mutatū a nobis est, cognoscendumq̃ id diligentioribus relinq̃mus.

De Harundine.

CAP. CXVI.

IN Harundinum genere quædam Nastos uocatur, ex qua sagittæ fabricari solent. Alia foemina, qua tibiærum ligulas efficiūt. Alia quod fistulis addicta sit, Syringias, cui multum inest carnis, crebris cincta geniculis, ad librorum conscriptionem accommodata. Alia crassa, concaua, apud amnes nascens, quæ a quibusdam Cypria, ab alijs Donax appellatur. Alia Phragmites, seu Valltoria, gracilis, candicans, uulgo cognita: cuius trita radix per se, aut cum bulbis suis illita, spicula aculeosq̃ corpore extrahit. Luxata, lumborumq̃ dolores, cum aceto mulcet. Virentia folia tusa, & imposita ignibus sacris medetur, & ceteris inflammationibus. Corticis cinere peruncte cū aceto alopecie sanant. Paniculæ lanugo si aures intrauerit, exsurdet. Eundē effectū implet Harundo quæ Cypria dicitur.

BARBARI COROLL.

HARUNDO καλαμος a græcis dicitur, a Phœnicibus Gingros, ob Adonin, quem Gingrem uocant, & lugent. Radices eius uiuaces, geniculatæ, ac fere insolæ, similes iſ̃ partibus, quæ supra terrā eminet. Huius duo summa genera. Tibiariū. i. Auleticon. Vulgare posterius. Hoc in Characiam, hoc est, Vallarem, crassam & ualidā, quæ Græcanica quoq̃ uulgo dicitur, & a Vitruuio Cerdone græca. Et in Plotiā, siue Plocimon, diducitur, hoc est, flutam, uel nexilem, graciliore & imbecilliore priore, utraq̃ Orchomeniū circa lacū. Superior, in ripis expansiōis stagni, et in Comitibus (sic enim Harundinetū prædensus & factū appellat) sequens subtilis, in insulis fluitantibus, quas græci Ploadas uocāt, in immensum prælatis iſ̃, quos Cephissus amnis abluisset, ut cecinit Pindarus. Interim cū Auletico nascitur Characias, sed longior cæteris, & uermibus obnoxia. Tibialem hyeme legūt, uere tunicas eximūt, æstate per internodia cecidunt. Optima fieri armamēta e medio geniculo, mollissima e superioribus, durissima ex imis asserunt. Persuasum erat, & ligulā ex sua quanc̃ tantū harūdinis parte cōgruere: & eam: quæ radicem antecesserit, leuō Tibiariū lateri cōuenire, quæ cacumē, dextero cæterū internodio, in duas partes dissecto, utriusq̃ ligulæ os incisuræ cōmittebat: alias negatur congruere: Theophrastus autor. Plinius magno nominū ambitu, Calamos numerat: Aegyptios chartis seruatos: probatiores tamen Gnidios: & qui in Asia circa Aneticū amnē nascantur. Nostratibus fungosior natura, bibulos, cauo intus corpore, tenui superne ligno fissiles, præacuta semper acie geniculatos. Gracilitas nodis distincta, leui fastigio tenuat in cacumina, crassiore paniculæ coma, qua pro pluma implentur frata cauponarum. Et hæc ad nauum commissuras in Belgis, glutino quocunque si delior rimis explendis. Bōnonienses e Rheno amne, quibus plurima inest medulla, pondusque uolucris. Contra flatus quoque peruiacax libra, ut nullus sagittis aptior sit calamus. Post hos Cretici & Belgici laudantur. Creticus carnosissimus, lōgissimus internodij, lentissimus si calsiat, Toxicus, id est, sagittarius, ob excellentem eius usum, a Theophr. dictus. Nunc scriptorius, ex ea insula præcipuus, nec aliūde fere expetit. Omnibus præferitur Indi, ut g hastarū quoq̃ uicē præparati, hoc ē, cuspidibus additis, præbeāt, lis amplitudo arborea est: nec dubitat.

Theophrast.

lib. 4. cap. 11.

Plin. lib. 16. ca.

pi. 36. Lib. 24.

ca. 11. lib. 17. ca.

pite. 10. & 28.

D I O S C O R I D I S

Vide Cēliū li
bro. 7. cap. 26.

C E quarū radicibus, ut Solino placet, succus exprimitur ad suauitatem mellis, quasi Saccarum interpretari possis. Longitudo subreptarū, 30. fere passus, humi uero serpentiū, 50. crassitudo cubito rū ternū, interim senū; quæ tamē Strabo nō credidit. Diodorus in australi quadā insula, ægno etiali plaga scribit harū dines haberi plurimas, fructū candidum, Eruo similē ferētes, e quo sua uissimus panis cōficiū. AEquē fabulosum atq; illud, q; in eadē insula, duas nasci tradit herbas, supra quas iacētes, placidissimo somno moriant. In Aethiopia certe populi, radicibus Harundinum in farina tritis, uiscitant, & ob id Rhizophagi nominantur. Spissius mari corpus Indī tradūt. Fœminæ capaciū. Nauigiorū etiā loco, singulis eorū internodijs circa Acetinum maxime amnem, ternos homines capiēte alueo. Syringias, totus concauus, ita dictus, quia fistulis utilissimus, quoniam nihil sit ei cartilaginis atq; carnis, ut Plinius existimat. Dioscorides crassa eum carne descripsit. Tibialis, Orchomenius, idēq; Auleticus, cōtinuo foramine paruius est. Fruticosissimus Donax, nō nisi in aquaticis natus, latine Canna. q̄q; Canna apud nos, ut inqt Columella, gracilē & degenerē significat harundinē. Apud gr̄cos fiscellē genus Cāna dicit, ut est apud Pollucē. Præferē aquaticis, siccus. Laconicis foliū uariū, & ab ima parte densius, tunicis longioribus; quales circa stagna, dissimiles amnicis. Est & obliqua Harido, nō excelsa, sed iuxta terrā fructis modo se spargēs. Suauissima in teneritate, pecori. Ab aliq;bus uocatur Elegia. Zeugitar, calami dicunt, Armamentarios Theodorus interpretatur, cū in amplitudinē aucupatoriā adolecūt. Auletics, lacu Orchomenio, influente Cephiso amne, pmanenteq; anno, celerius autē recedēte. Graciliores, Bombycinæ appellabantur. Horū generū fœminæ, Spadones et Eunuchiae uocari solitē, folio latiore, candidiore, nulla, uel modica lanugine. hinc erāt armamēta ad cātus inclusos, quē gr̄ci Iugamēta, siue Paria, hoc ē Zeuge, ad dexterā & sinistrā tibiā uocabāt; qd̄ ita essent cōiuncta, ut altera eiusdē carminis incutia, altera succētua foret, ad Baſteriā a Theoph. (nisi fallor) appellatos. De Baſteria meminit & Plutar. & Pollux, gestamēq; id theatraliū psonarū demōstrant esse, ut Scipionē Plautus, rectū insignibus, curuū ignobilibus. In sacris certe literis Baſteria dicitur inuocatio ea, quæ post præceptio nem addi solet. Quid si q; in Theophrasto, nō ad βακτηριαν, sed ιμακτηρία legendū putet. Erat autem hoc & loci nomē, ut inqt Pollux, & theatralis cuiusdā operē cationisue genus, statariū, & citra saltationē, ac tripudiū: quo Lacedæmonios & Arcades uti solitos incinēte modulos & frequentamēta quadā simplicia tibicine Atheneus cōmemorat: qd̄ & Enoplion uocauerint; etiā Embasim, hoc est, ingressiōē incessionēq; ut ē apud Gellīū. Ob id inclusos cātus a Plinio dictos inrelligo, qbus antiquitas in theatro cōtēta erat, simplici adhuc musica, hoc est, ut Theophrastus inqt, Aplasto, cōprimētibus se tibiārū ligulis, quia tempestiue cæderētur, ideoq; ad uarietates, flexusq; sonorū inutilibus. ad hoc exēpli, πάλιν ιμακτηριον uocabāt; cuius inuētor Aristonicus fuisse dicitur, ut Atheneus meminit. Illos autē, quibus operosa ratio canēdi placuit, Camptaulos, a uocū inflexione appellauerūt: quod nomē in Carini Cæsaris uita deprauatum, correximus. Correxerit hoc luxuria, & per sollicitia cēdi placuit, ut in trimatu demū utiles fierēt apertioribus earū ligulis, ad flexēdos sonos. Armamēta sane, Plinio est, ubi p Iugamētis uine arū, Pedamētisue accepit. Tibicines gr̄ci, et Monaulos, & Calamaulas, et Rhaphaulas quoq; dicūt. Habēt & illa distinctio. Tibiārū aliæ uirginales & puellares. Aliæ uiriles: quas & pfectas & plusq; pfectas cognomināt. Sūt & citharisticæ quadā Tibiæ: item quē Daſtilicę uocātur, & quē Lyliodicę, & Tragicę. Lyliodi uero dicebātur, q mimos qsdā sub psonis muliebribus agebant, ut uirilibus Magodi. Nā Elimi tibiæ apud Sophoclē in Niobe, nihil aliud uident esse, q Phrygię: quas & Scytaleas, ob crassitudinē appellāt, et obliquas, ut inqt Varro, siue impares, quēadmodū Serranas, quæ pares essent & æqualibus cauernis. cū in Phrygijs dextera unū haberet foramē, sinistra duo: quarū inuētor Midas. Nominant & Diopi, hoc est, biforæ, qbus & nos utimur, sed e buxo, aliæ materia. hæ corniculorū tubarūq; sunt, & semp fuere comites. Hebebātur olim & Hemioipi, hoc est, semiforæ: quas & minores, & impfectas, & puellares uocabant, atq; terrenas, hoc est Moluculas, epulis adhiberi solitas. Vt hoc uideat Plautus intellexisse, cū semifonarios artifices quosdā nominat. Itē Mesocope, & Hypotretæ, qd̄ alterē in medio forat, alterē ad imū ptusæ forēt. Tityrina quoq; tibia eadē est quē harūdinea. Nā Magadis & Palæomagadis ea est, quē acutū grauēq; sonū reddit, genus citharisticæ tibiæ: q̄q; Magadis & Psalteriū nomē est idē cū Sābucā & Pecūde, ut multis placet, nec tñ omnibus. Alias quoq; Tibias in arbore Loto diximus. Singularē tibiā Monocalamō, & Monaulū uocāt: sicut multi plicē Polycalamō. Priorē Marſias Celēnis, aut Mercurius inuenit. Alij Seuthen, & Rhonacen Medos homines inuenisse quidē, sed Marſiā uinxisse cera putāt. Alteas Silenus, siue Marſias, quorū Poetę gr̄ci, tibiā plærūq; Lebyn uocāt, ab inuētoris patria, ut Duris scriptū reliqt. Varro Præcentuas

ro Præcētias & Succētias cōnumerat: quarū sit usus ad puluinaria præcinendi subcēdīq; a quo & Præcentores & Subcētores appellant. Item Vascas, foraminibus q̄ præcētias pluri bus. Lydias porro, easdemq; Turarias uocabant, q̄ inter Tura adhiberentur. Gingrinæ, tenui orem sonū edebāt, q̄ Vascæ. Clarissimū Aegyptiæ, Garrulū Arabicæ. Ob id græci nugacem hominem, Arabicū tonariū, pro uerbo facto nomināt. Acutissimæ Gingrinæ habebantur & Corinthiæ, ut inquit Solinus. Gingrinas, ab anserina uoce dictas putāt. Nam & græci, *χινδύων* pro eo quod est, tibia sonare, dicunt. Ego a Ginge, qui sit Adonis, ut huius capitis initio mon strauimus. Erant & suæ funerū tibiæ, siue tubæ, ut inquit Gellius, quarū peritōs, Sitticinas uocabāt, non quasi siccinistas, a genere tripudi, sed q̄ ad sitos, hoc est, uita functos, & terra cōdi tos sonarent. Erant & Tonaria, quibus uti Gracchus solebat, ad cōponendā in cōcione uocē eburneis. Nota est historia. Est & in Italiā nascēs, ex quā sit Adarcha nomine, de quā post dice mus. Aucupatoria sane harundo, a Panormo laudatissima legi, & Panorito, Piscatoria abari tana ex Africa. Mulicæ harūdines, ex insula Siciliæ, Thermitano agro sita laudātur, ut Solinus ait. Sunt & aliæ sine nominibus harūdines, proceritate, breuitate, crassitudine, exilitate simili busq; distinctæ: adeo, ut. 29. earū genera demonstrasse Plinius se dixerit. Harūdo omnis, ex unā stirpe numerosa, atq; etiā recisa, deusta q̄ foecūdiōr. Folia Indicis tantū breuia. Omnibus a nō do cōplexus initū est membranīs per ambitum tenuibus, raroq; non a medio genu procum bentibus. Latera in rotunditatem bina, sup nodos alterno semper inguine, hoc a dextra, illo ab leua, superiore per uices. Inde exeunt aliquādo rami, qui sunt calami tenues. Mira huius & Filicis discordia. Vtriusq; radix cōtrita & imposita, stipem alterius ejcit infixū corpori. Ad hūc usum, ex Harundinis radice medicamentū Hippocrates, Epipsastron Orchomeniū, uidet qui buldā appellasse. Magna cū altero genere concordia, siquidē ut Cato præcipit, optime corru da feritur, ubi sint harūdines. Harūdini bus septentrio, domos suas operit: duratq; ita in altitu dine regulū earum. In reliquo orbe cameras leuissime suspendunt. Harundinis Italiæ usus ad uīneas quoq; ut Arpino agro. Paniculæ florē illū, auribus infestū, Anthelem græci appellāt.

E X M. V E R G. C O M M.

Quos cum radice Harūdinis bulbos diximus, oculos eius intelligimus, quo nomine etiā ueteres in radice Harūdinis eā partē dixerūt, unde noua eius soboles quotānis nascit.

De P A P Y R O.

C A P. CXVII.

Papyrus, qua chartæ fiunt, nullis non cognita, præcipue in medici na utilitatis ad laxandas fistulas. Madefacta lino inuoluitur usque dum inaruerit. Constricta enim atque immissa in hiatum completur, & intumescendo fistulas aperit. Habet nescio quid alimenti radix. Itaque Aegyptij eam mandunt, succum tantum deuorantes, & mansam expu unt. Iplis radicibus pro ligno utuntur. Cremata Papyri cinis depascen tia ulcera cum omnium partium, tum oris maxime cohibent. Verum me lius id combusta Charta præstat.

B A R B A R I C O R O L L.

Papyrus, et Papyrū, latine dicit. In palustribus Aegypti, aut q̄escentibus Nili aquis nascit; quæ regio, Delta, & inferior pars uocat. Item Syriæ, circa quæ odoratus ille Calamus lacti nasci tur, & in Euphrate circa Babylonē. In Aegypto, nō excedēte bina cubita gurgitū altitudine, uolari hominis robusti, brachialiq; radicis crassitudine. Obliqua hæc, atq; densa, nō amplius q̄ cubitorū decē longitudinis. Triagulis Papyrorū lateribus, qui a terra multis partibus tollun tur, pedibus, ut inquit Strabo, decem, uel ut aliq; cubitis quaternis. In gracilitate fastigiati, susti nentes comata, ac Thyrsi modo cacumē includentes exile. Ad nihil utile, præterea nullo sem i ne, aut usu eius alio, q̄ floris ad Deos coronados. Radicibus incolē utunt, nec ignis tm gratia, sed ad alia quoq; utēilia uasorū: ut q̄ p̄ba & alta materie sint. Ex ipso quidē Papyro nauigia te xunt. E libro uela, tegetesq; necnō & uestis genus, & stragula & funes. Mādunt crudū elixī, succo deuorato, corpus expuentes. Scitur & usus ex eo ad chartas ueteribus. Nūc alia earum officinis inuēta ratio est. Habēt & in Aethiopia & Italia Papyrus uel p̄miscue, Ciminio lacu plurimum, sed alterius forte generis, nec ad chartas utile. quandoquidem Aegypto propria tribuitur, & Biblos appellatur. Alioquin Strabo, in India quoque nasci Biblum fertbit. Idem autor, in parte Nili, quæ dicitur inferior, abundare tradit eam: quoniam ibi præcipue colatur.

A

Arabicus to narius. Pro uerbum. Gell. li. 20. ca pite. 2.

B

π ά π υ ρ ο

Plinius. lib. 17. cap. 11. 12.

D I O S C O R I D I S

C & duorum esse generum: deteriolem, & meliorem: quæ Hieratica dicatur: unde & nomē Char-
tæ Plinio, Herodotus ueteri consuetudine pelles quoque hircinas, & ouillas, Biblos uocari tra-
dit, quæ in penuria chartarum uteretur uice.

μυρίκη

De MYRYCA. CAP. CXVIII.
MYrica, seu Tamarix arbor, uulgo cognita est, cum apud pigras
& stagnantes aquas enascatur, fructum quasi florem ferens com-
page muscosum. Aegyptus, Syriaque alteram gignunt mitiorem, silue-
stri cætera similem. Fructum parit Gallæ proximum, inæqualiter, aspe-
rum gustu, quo conuenienter utimur uice Gallæ in medicaminibus ocu-
lorum orisque. Datur cruentæ excreationi in potu, & coeliacis, & con-
tra profluuiâ foeminarum, regium morbum, & phalangiorum morsus.
Illitus tumores inhibet, Cortex in eisdem usus adhibetur. Decoctum fo-
liorum cum uino potum, lienem absumit. Ad dolorem dentium in collu-
tionibus salutare, & mulieribus fluctioni uulua oportuni in deflectioni-
bus. Phthiriasi, lendibusque circumfusus prodest. Abundantiam foe-
minarum sistit impositus arboris cinis. Potorios calices e caudice lienosis
moliuntur, quo datus in his potus proficiat.

Plin. lib. 13.
cap. 11.

BARBARI COROLL.
MYricen, Tamaricem uocant Corinthi. Et in Achaia quoque est, & Bria dicitur: & cum
plus iusto adoleuit, Promala utique poetis, siluestris, & sterilis forte, quia fructus ei bryodes,
hoc est, muscosus. Nam satiuæ similis Gallæ prouenit: quæ in Syria, & in Aegypto copiosa
etiam est. Hanc & Amaricem nonnulli appellant: similem scopis amerinis prodentes. Neque ta-
men omnibus eandem esse Tamaricem & Amaricem placet. Myrices certe infelicia ligna uul-
go nominantur: quoniam nihil ferat præter flosculum, de quo diximus, muscosum: nec seriatim
unquam. Huius cum uno uiscerum liene tanta dissidentia est, ut affirmet, a Democrito lumen
res, si ex ea alueis canalibusue factis bibant sues, sine liene inueniri. Et ideo homini splenetico,
cibum potumque dant in uasis ex ea fabricatis. Illud obiter indicandum est Columellæ studiosis,
ut locum in octauo eius libro corrigant, ita scriptum. Succurritur, inquit, si fabricentur Cana-
les Tamaricis & Rusco. Legendum est, Tamaricis e trunco, author Dioscorides. Nec illud non
docendum, qui uitro soluendo firmandoque accurat, ex hac arbore potissimum igni suo escam
ministrat. Cuius radicem officinæ Casiam uocare solent: & quæ palam imperitia medicorum est,
pro Casia odorata utuntur. Folium Miricæ sunt qui Sabinæ herbæ non nihil simile prædicant.

EX M. VERG. COMM.
QUam cæteri, græcorum appellatione Myricen, potius quæ Tamaricem dixerunt, nos autho-
re Columella, plantarum & Romani sermonis grauissimo teste, Tamaricem libere &
intrepide diximus. Is enim de suillo pecore, eiusque morbis lib. octauo agens, Solere ait sues ui-
tiosi splenis dolore infestari, accidereque id malum magnis siccitatibus, quo tempore stratis pas-
sim sub arbore pomis, sues dulcedine pabuli cōfectantes, splenis incremento laborant: succurritque
huic malo dixit, si e trunco Tamaricis fabricentur canales, impleanturque aqua, deinde sitientibus
admoventur. Quippe ligni succus medicabilis eporus, intestinum lienis tumorem com-
pescit. Quo uno testimonio satis fore nobis credidimus, ut quæ græcis μυρίκη est, latinis Tama-
rix quondam fuerit, & adhuc sit, eodem in duobus autoribus eiusdem mali conueniente reme-
dio. Sterilem Tamaricem in Theriacis suis Nicander esse testatus est, speciosumque eius fruticem
ideo μάντιν, i. uatem uocari, quoniam iussit Apollo uates Tamaricis ramulum, manutenen-
tes uaticinari. Verficuli eius sunt.

καὶ μυρίκη λάξιν νόν πανακέρπια θάμνον,
μάντιν ἐνὶ ζώοισιν χερσὶ μέν ἢ ἐν ἀπόλλων,
μαγτοσύνας κορυφαίος ἰθὺκατο καίθιμιν ἀνδρῶν.

Quæ sic facile uertat aliquis. Sumito præterea Myrices fruticem, uatem inter uiuentes ho-
noratum, In qua Apollo Corypæus uaticinia posuit, & iura mortalium, Ob quam causam,
ex historia

ut ex historia collegimus, Magi & Scythæ ad uaticinia sua Myrice utebantur. Quod genus diuinationis ab alijs gentibus etiam seruatum est. Herodotus siquidem sepè in diuersis gentibus Myriceis ramulis uaticinia fieri testatur. Ob quam causam & Apollo Myriceus quondam dictus est. Quoniam ex eadem arbore in pompa Iouis coronari solitos in Aegypto sacerdotes, & in Media Magos, ex antiquioribus scriptoribus plures retulerunt.

De Erica. CAP. CXIX.

Erica fruticosa arbor Myricæ similis, longè minor, cuius florè apes reprobum mel efficiunt. Tam flos, quam coma serpentium ictibus illitu medetur.

B A R B A R I C O R O L L.

Ericem, colore tradunt Roris marini, ac pene folio. Propterea Theophrastus uberrimam Libanotide Ericem nasci refert. Mel quod è flore huius, apes faciunt, Ericum uocatur, simile arenoso, siluestre, improbumq;. Conuehitur post primos autumnii imbres, cum Erica. Sola floret in siluis. Asie, Græciæque fruticibus ascribitur. Athenienses hanc, ut ait Plinius, Tetradicem, Eubœa Sisarum, siue ut Varro Sisaram, unde liquidum mel fiat, purantque apibus esse gratissimam. Fortassis, quia tunc nulla alia sit copia. Theophrastus, Tetralicem, non Tetradicem, nisi mendosus codex est, appellat, in genere fruticum aculeatam, & germinantem æstate. De hac Ericem intelligat, nec ne, haud scio. Quia tamen bis anno floret Erica, prima uidelicet & ultima siluestrium, nec inter aculeatas ponitur, fieri potest, ut alia sit Tetralix sua Theophrasto, alia quæ pro Ericè Athenis capitur: nisi quis hanc Tetradicem, illam Tetralicem uocari malit. Meminit & Tetragoniam uocatæ Theophrastus, sed inter arbores quæ tardissime germinant, ut Thyia, Taxusq;. Theodorus Quadratoriam interpretatus est, melius si Quadrangulam. Columella Ericem intelligit, cum amaricum, siue amaricem, & amaricinòs flores commemorat. Quancq; & ibi lectio corrupta in eo fertur. Nam & amaranthini, pro amaricinis, & tamaricem pro amarice, scriptum fere inuenias. Cum sit Tamarice, hō Erica, sed Myrica. Confundit hoc Palladius: qui tertiam mellationem, Tamarisci floribus (ita enim uocat ipse Tamaricem) cōstituit: cū Ericem, idest, Amaricis eā, non Tamaricis pabulo fiat, autore Plinio. Nisi quis Tamaricis appellatione, ueteres & Ericem, & Myricem significare uoluisset dixerit. Plinius Ericem Illici similem descripsit. Credo Myricem, non Illicem legendum, cum Dioscoridis auctoritate, tum quod ita modo cernitur in Patauinis montibus: non quidem folio, quod ei Roris marini simile tribuitur, sed musco, quem floris uice habet, ut Myrica. Quod autem Ericem uideatur etiā uocata Siderites, libro Plinij undecimo, nos cum locum in castigatione Pliniana, deprauatum ostendimus.

E X M. V E R G. C O M M.

Vitilibus plerisque. Qualis Salices, Vitex & Genistæ sunt: ueluti congenerem illis plantam libro uicesimo quarto Plinius Ericem adnumerat. Omnes Tamarici similem tradiderunt, floreque eius, qui solus extremo autumnio ab apibus inueniatur, ultimam mellis uindemiam fieri.

Theophrastus Libanotidi, quam Rosmarinū Romani dicunt, similem fecisse uidetur. Ex quibus omnibus, non fuerit difficile notas has omnes diligenter obseruantibus, quæ nam ea nunc sit ostendere. Nobis inclinatur animus, in Genistarum genere, siluestrem a nobis dictam Ericem hanc esse. Vidimus enim aliquando septembri & octobri mense, utriusque Genistæ flores. Non tamen quotannis, & ubiq; apud nos eo tempore florent. Quod cœli maiore beneficio alijs potest competere locis.

Ericem in Aegypto quondam fuit, grata Isidi arbor, quæ tempestate eiectum Osyridem excerpisset, subitoque in crementum intra se clausum operuisse. testis et autor Plutarchus libro de Iside et Osyride. Paulus Aegineta dicit discutiendi uires sine erosione habere, foliaque & flores in usu præcipue esse.

De Acacalide. CAP. CXX.

Acacalis fructus est nascentis in Aegypto fruticis, seminis Myricæ quadā tenuis similis, cuius aqua in qua maduerit ad collyria ad-

D I O S C O R I D I S

C datur, quæ ad excitandam oculorum aciem conueniunt.

A B A R B A R I C O R O L L.

Acacalī, Paulus Atallida nominat. Galenus ubi meminerit, nondum comperi. Nomen fructū, a nymp̄ha datum crediderim Acacali, quæ ab Apolline compressa, Phylacidē & Phylandrum ediderit in Creta, miraculo ab Elyreis insulæ populis confectio: nutritos a capra eos fuisse: cuius rei monumentum in Apollinis quoque delphici delubro monstrabatur. autor Pausanias. Apollonius poeta, in Argonautico, Acacalī Minois regis filiam, ab Apolline quidem uitiam cecinit: sed quæ in Aphricam relegata, filium ediderit nomine Amphithoon, qui & Garamas quoque uocaretur, Nasamonis & Caphauri pater, ex nymp̄ha Tritonide.

ῥαμνον

R De Rhamno. CAP. CXXI.

Rhamnum alij Persephonion uocant, alij Leucacantham, Romani Spinam albam, aut Cerualem, Aphri Atadim. Rhamnus fruticat in sepibus, ramos ferens rectos, & aculeos in acutæ spinæ modū, folijs paruis, oblongis, suppinguibus, teneris. Alterum ei genus candidius. Tertium nigrioribus, latioribusque folijs constat, & quadam tenuis rubentibus, cuius rami quinum cubitorum longitudinem implent, infirmioribus horrentes spinis, innocentioribusque. Fructum ædit latum, candidum, tenuem ueluti folliculum, Hastulæ regiæ similem. Omnium folia igni sacro, & serpentibus ulceribus efficaciter illinuntur. Fama est, ramos huius ualuīs, fenestrisue impositos, ueneficia depellere.

Pli. li. 24. ca. 4.
Theoph. lib.
6. cap. 17.

D B A R B A R I C O R O L L.

Rhamnum, igniarijs utilem ferunt, presertim conceptaculo et craticulæ. In duo genera diuiditur, nigrum, & candidum. Vtriq; fructus parentum colore. Nigrum folliculos fert, siluestreque habetur. Huius radice decocta in aqua, fit medicamentū, quod uocatur Lycium. Rhānos inter Ruborum genera describitur. Hæc Theophrastum Pliniumque secuti, diximus. Aliter a Dioscoride monstratur. Photion Rhamnum, a quibusdam Agnon, a uirtutis similitudine uocatam scribit, quæ uenerem coerceat, ut Vitis. Rhamnum Dioscorides, a nostris Spinam cerualē dicit appellari. Quo argumento uideri potest, haud dissimile huic genus esse quod hodieque uulgo Spinam ceruinam uocamus, fructu Myrti, foris nigro, intus uiridi, ob id uel ad colorem eum pingentibus idoneo. Cortex arbori subniger, & nitidus, quasi Ceraso, intus uires, post luteus, lignum extra candidum, interior medulla rubet.

E X M. V E R G. C O M M.

Spinam antiquiores græci Rhamnum, posteriores alterius spinæ nomine, ob candoris similitudinem, Leucacantham, Romani modo hac, modo illa appellatione indicant, quæ alteri us erant, alteri etiam tribuentes. Quod Plinius, ut nobis uideatur, fecit: qui amuletum contra ueneficia Rhamno fuit a græcis adsignatum, Aquifoliæ spinosæ pariter arbori adsignauit, libro suæ historiæ. 24. testatus, Aquifoliam arborem in domo, aut uilla satam, ueneficia arcere. Nisi forte eadem uis Aquifoliæ quondam inesse etiam credita fuerit. Naso certo in Fastis suis, græcam fidem secutus, spinam albam Rhamnum dixit: ex re ipsa, & altera in græcis Rubi huius appellatione rem ostendens. Locus non longe a principio sexti libri est.

ἁλῖμος

H De Halimo. CAP. CXXII.

Halimum alij Damasonium uocant, alij Erymon, alij Brettanicam, alij Rhabdion, alij Basilion, Magi Mercurij basim, aut Osyridis diadema, alij Elystephanon, aut sacrum caulē, Pythagoras Anthenoron, Aegyptij Afontiri, alij Asphen, alij Asealuri, alij Asariphen, Latini Albutium, aut Ampeluciam. Halimus frutex est sepimentis idoneus, similis Rhamno, sine spinis, folijs Oleæ, sed latioribus. Nascitur in sepibus & maritimis. Folia decoquuntur ciborum gratia. Radix con-

uulsa, rupta, torminaque mitigat, drachmæ pōdere in aqua mulsa pota. A
Eadem lactis ubertatem facit.

B A R B A R I C O R O L L.

Halimon, nostri, ut ait Plinius, Aureonem uocāt. Conuoluit se ut Hedera. Locis salis nascitur, falsilaginemq̃ præfert. Sit hæc, de qua Dioscorides, & Plinius, a quibusdam Asphodelon, siue Albucum existimatum perhibent, an alia, mihi parum constat. Reperio autem in autoribus, modo afflatā, modo nude scriptam primam literam. Placet aspiratio, quoniam maritimum olus credatur, & Almytis etiam a falsilagine dicatur ab Aetio. Asphodelon appellari Halimon ab Hesiodo, quidam falso interpretantur: qui tamen error a græcis ortus, peruenit & ad latinos. De Halimo discrepant sententiæ. Alij fruticem esse uolunt, densum, candidū, sine spina, folijs Oleæ mollioribus, latioribus, quæ cibo coquantur. Addunt in maritimis natum. Alij separant, maritimum olus dicentes Halimon, & falsum: unde nomen folijs, in rotunditatem longis, quod & mandatur, condiaturq̃. Duorum præterea generum, siluestre, & mirius. Folium siluestri tenuius, maioris effectus. Crataeis tertium genus facit, longioribus folijs, & pilosioribus, odore Cupressi, nascens sub Hedera. Galenus Halimum in Cilicia prouenire copiosam, ibique folia recentis in cibos recipi, & in usum condita seruari, scribit. Solinus Alimon in Creta nasci tradit, mirabili, si credamus, effectū: quod aduersa ea, fames interdum nulla sentiat. ut nomen inde impositum ei sit, quasi famem arceat, proptereaq̃ nec aspirationem prima litera recipiat.

Pli. li. 22. ca. 22

E X M. V E R G. C O M M.

Nasci maritimis locis Halimū, quem Plinius Aureonem nominat, hic ipse testatur. Salso autem sapore esse, & inter olera quōdam in usu fuisse, præter Dioscoridem idem Plinius indicauit, falsum olus a quibusdam dici affirmans, & Plinio, Dioscoridique subscribens Paulus Aegineta libro primo. Theophrastus libro quarto de historia, & libro quinto de causis, encandipinquis, & adnatas plantas uim illi adsignauit: quales multæ in natura sunt, quæ sub tracto alimento, alias perimant arbores. quales Hedera, & Cytisus est.

B

Fecit in sanitatis usu, & medicina Halimi quōdam usus, ut in multo ambitu nominum et appellationū, antiquis græcis fuerit hæc planta: quæ omnes appellationes, aut superstitiones, aut ab illis excogitatæ sunt, aut a similibus factæ.

Credimus nos (quod Plinius, 22. ait) existimasse quosdam Asphodelon ab Hesiodo Halimon uocari: ideo factum esse, quod in sepibus nasceretur: et Hesiodus in cibis etiam Asphodelum laudauerit, cum ait, nescire iniuste agētes, quanta in Asphodelo & Malua utilitas sit. Quæ opinione semel illata, facile factum est, ut Halimus non aliter, q̃ Asphodelus Albucus diceretur. Albucum enim, si Plinio credimus, antiqui Asphodeli radicem dixerunt.

Quod deinde passim & in cunctis Ampeluciā dici etiam Halimon, ab alba uite, quam græci in sepibus nascentem uitam albam nominant, factum fuisse credimus. Quæ tamen omnia coniecturam, non decreta uolumus esse.

DE PALIVRO. CAP. CXXIII.

Paliurus frutex cognoscitur aculeatus, durus, cuius semen pingue & fuliginosum inuenitur. Quod potum tussi opitulatur. Vesicæ calculos comminuit. Serpentiū ictibus aduersatur. Folia & radix astrictoriam uim habent. Quorum decoctum potu aluum sistit. Vrinam trahit. Contra uenena & serpentiū morsus auxiliatur. Radix recentia tubercula, tumoresq̃ omnes discutit, trita & imposita.

πάλιουρος

B A R B A R I C O R O L L.

Paliurus, ut in fruticum genere collocetur, in magnitudinem arboris assurgit. Ab occasu uergiliarum fructificat. Fert in siliquis terna & quaterna femina, lentorem quendam pinguem emittentia, ut lini semen confusa. Amat nasci aridis, quemadmodum & Rubi, nec minus dilutis. Folium exciduum sicut Rhamno. Cyrenis laudatissima: ubi Lo to quoq̃ præferunt, eodem folio, sed fructu diuerso, ut qui non latus, sed rotundus, ruberque sit nucleo, qui non simul mādatur, ut in Punicis. Magnitudo ei quæ fructibus Cedri, pauloue amplior. Nominatur ab Afris Zura, iocundus per se, atq̃ suauior etiā uino affusus: contra quoq̃ uina succo suo com-

Pli. li. 24. ca. 14
Theoph. libro. 3. cap. 17.
& lib. 4. ca. 4.

D I O S C O R I D I S

C mendans. Paliurus, spinosa ramis, ut Rubus. Agathocles Paliurum ab Alexandrinis Connarum uocari tradit, enatam scribens isto fulmine sepulchro. Vlmi atq; Pinus amplitudine, ramis frequentibus, prylongis, subaculeatis. Folio uiridi, rotundo, molli. Biferam. Nam & uere & autumnno fructum parit Oliuæ, Phauliæ uocatæ magnitudine: cui & nucleo & carne similis est, sapore uincens. Crudus uirensq; manditur. Vbi exoleuit, farinam ex eo fieri, atq; ita essitari, nec subactam, nec conspersam aqua. Ichthyophagi, piscium carnes semine Paliuri conditas inueterant. Troglodytæ, succo Paliuri pro uino utunt uulgo. Nam procere florem quandam exprimunt, cuius liquor nostrati Musto similis aspicitur.

E X M. V E R G. C O M M.

P Aliuro nulla certa est nota, propter multiplicem eius crescentiam. Nam in aliquibus locis arborefcit, in aliquibus fruticis naturam non excedit. Ideo diuersa eius historia legitur. Numerassem et ego aliquas eius notas, nisi copiose ab alijs de eo collecta et tradita omnia fuissent. Illud tantum adijcimus, nostratem Paliurum, non ideo dissimilem Canis sentibus esse, quos greci Cynosbatos dicunt, cognatasq; et ueluti congeneres plantas esse Rhamnum, Paliurum, Oxyacanthum, & Canis sentem: ideoq; a Dioscoride deinceps tractatas, aculeatas omnes & muniendis sepibus aptas, & ob id tantum priuatim descriptas. quoniam proprie singularum notæ aliquæ essent: quod in Oxycantho mox etiam dicemus.

δένδρον
πυρίαν
πυρίαν

De Acuta spina. CAP. CXXIII.

A Cuta spina, quam Pyrinam, aut Pityanthen aliqui uocant, arbor est Piraastro similis, spinosa, & minor. Baccas profert Myrti, plenas, rubras, fragiles, & intus nucleum. Radicem multifidam, alte descendentem. Huius baccæ potu, aut cibo, alui profluuium, & abundantiam fecminarum sistunt. Radix illita, aculeos & spicula extrahit. Abortum fieri tradunt, si terradice uenter, aut sensim feriat, aut perungatur.

D De spinarū generibus plura Theophrast. lib. 4. cap. 1.

BARBARI COROLL.

O Xycanthos quæ sit, in Plinio non comperi. Medicinas certe, quas Dioscorides ei tribuit, Paliuro Plinius dicauit. Dicitur hæc et Oxyacantha, Olympo mote plurima, siluestrium arborum, frondis æternæ, ab occasu uergiliarum, fructifera, flore coronario, fructu Cedri atq; Myrti. Rura modo hanc Crispinam, quasi acrem spinam uocant, ut multis placet: ex cuius acinis uinum etiam conficitur, Crispinum uocatum, eodem fere usu quo uinum ex malo Punico. Singulares in acinis quibusq; nuclei sunt. Acini oblongi, & racemosi, congesti, folia quoq; oblonga. Diuersum genus est quod uuam fert, Crispinam uulgo dictam, ueteribus præterita, acinis candidis, & in maturitate dulcibus, aculeato frutice, folio apij fere, in hortis frequens. Habetur & alter frutex, æque spinis horridus, sed topiarius magis, & uitis pusillæ, folio rubentis uuæ fertilis: nec in Italia modo, sed in Germania quoq; mihi uisus.

E X M. V E R G. C O M M.

F acilis cognita & inuentu Oxyacantha hæc, tam certæ eius notæ sunt, & tam multis locis nascitur. Ab agrefu Piro diminuta appellatione rura uostra eam uocant. Florem fert muscosum, & post florem racemosum fructum, nō dissimilem Ligustro. Non fuit latinis cura, quod hæcenus inuenerim, illi nomen dare, nec Plinius, quod meminerim, sub hac uoce eius meminisse. Græci a spinarum acuminatis cuspidibus, Oxyacantham dixerunt: meminisse quoque eius pluribus locis Theophrastus, aculeatis spinis infestam, & post uergiliarum occasum, hyme fructus suos maturantem.

Quæ mox adiectæ illi sunt appellationes Pyrine, & Pyrianthe, a græca, aut a latina appellatione fieri potuerunt. Si a latina, a Piro id erit: ut quemadmodum nos Pirastrum agrestem Pirum dicimus aliquando, sic græci etiam latinam uocem more suo diminuentes, πυρίαν dixerint. Si a græca, tunc a nucleis, quos plures intra se fructus claudit, nominis ratio erit. In Pomis enim græci πυρίαν dixerunt nucleos omnes, quibus exterior et ambiens caro substinetur: ut in Cerasis, & Prunis.

Quod legebatur deinde in impresso, pluribusq; alijs, γὰρ ἀναβάλλει ἄμα, ex melioribus mutatum a nobis est, in ἀναβάλλει ἄρα. Neq; ab re, quando hic ait, agresti Piro similem Oxyacantham, minorem tantum & spinolioram.

Quo loco etiam in græcis legitur, *Ἀκκρίαν ἰσθαι καὶ ποὺν γυναικίον*, in aliquibus, non tamen melioribus hoc amplius inueniebatur, *ὅσα τὰ ἄλλα καὶ θανάσιμα καὶ θυροδύκτια* Canis, idest, uenam etiam trahit, uenenisq; & uenenatorum moribus succurrit; ea nos facile negleximus, ad stringendi uires *Ὀxyacantham* habere inuenientes. Et quod Paulus ægineta agresti similem, si gura & uiribus exequauit, quam nihil eorum posse, neq; ille, neq; hic testati sunt.

De Rubo canis. CAP. CXXV.

Rutex est arboris instar, Rubo longè maior. Folia fert multo latiora Myrto. firmis circa ramos spinis, flore candido, fructu oblongo, nucleo Oliuæ simili, qui per maturitatem fuluescit, & flocculos intus continet. Fructus exemptis interioribus floccis arefactus, aluum sistit. Feruesacti enim ij in uino, mox poti, arteriam infestant.

BARBARI COROLL.

Cynosbatos, Caninus uulgo rubus. A Theodoro, Canirubus. Columella Sētem canis. fructu malo granato simili, subrubido, media inter arborē, fruticemq; natura, & proxima Punice. Folium Salicis amerinæ, Theophrasto Agni. Quancūq; legendum puto in *ἰνῷ*, hoc est, ut uestigio humano simile dicatur, qd Plinius ira uerterit. Et sanè uisam a se Rubum, quidam testantur, in siluis, hac specie, ut quasi solea esse uideretur. Flatu auerso fructum huius legēdum præcipiunt, alioquin periclitantur oculi. Plinius hanc ab alijs Cynosbaston, ab alijs Neurospatum uocari scribit. Vuam fert nigram; in cuius acino neruus sit; unde Neruus passus, dicat. Idem sit hoc, nec ne cum eo quod Dioscorides, itemq; Theophrastus deliniant, considerandū peritioribus existimo. Rubus certe, qui similitudinem Rosæ fert, et Castanæ similem pilulam, Cynosbatos a Plinio dicta est. Alia uidetur esse Cynorhodon, de qua diximus inter Rosas. Nec illud constat, nunquid Rubi huius sit Rosa, quæ Coroneola uocatur, raius autumnī, odore iucundo, sed exili, an potius Cynorhodī appellatæ. Nec illud omittere constitui, Cynorhodon a Cynosbato, non flore roseo, quem fert utrumq; sed spongiolis distingui, quas Cynorhodon habent, Cynosbatos non habent. Parit & uuam nigram Cynosbatos, ut prædiximus ex Plinij sententia. Quod quidem nemo, præter eum (qd sciam) confirmat. Hoc si error est, fortasse natus inde sit, quoniam Hedera Cilicia, hoc est, Similax aspera, Labruscæ modo ferēs uuas, Cynosbatos a quibusdam uocari soleat, ut Dioscorides testatur.

EX M. VERG. COMM.

Satis docuit Columella libro duodecimo, qualis Cynosbatos hic esset uastissimis spinis, Pauiro, Rubisque eam coniungens, cum in conferenda sepe præciperet, semina uastissimarum spinarum solo credenda esse; cuius generis etiam sunt Cynosbatū, quos sua ætas Sētem canis appellauit.

Idem Cynorhoda, idest, Canis rosa quondam dictus est. quoniam flos eius roseus sit, & rabidi canis moribus medeatur, si Plinio credimus, quod sua ætate admonente Deo inuentum sit. Rura nostra passim eum nouerūt, maximum inter Rubos omnes, & qualem in cunctis hic descripsit.

De Ligustro. CAP. CXXVI.

Ligustrum arbor est Oliuæ, folijs circum ramos latioribus, mollioribus, & uiuentioribus. Flore candido, muscoso, odorato, semine Sambuci, nigro. Optimū nascitur in Canope et Ascalone. Folia astrictioriam uim habent. Quare commanducata ulceribus oris medentur. Illita feruidis inflammationibus, carbunculisq; profunt. Decocto eorundem igni ambusta fouentur. Capillum ruffant uita folia, quæ in radiculæ succo maduerint. Flos ex aceto fronti illitus, capitis dolorem sedat. Cyprinū oleum, quod ex eo fit, exalfacit, emollitque neruos: quoniam mista quæ feruenti natura prædita sint, assumat.

BARBARI COROLL.

CYprum, quidam, ut Plinius inquit, esse dicunt arborē, quæ in Italia Ligustrū uocat, semina ij

A

κνινος

Pli. li. ii. ca. 23.
Theoph. lib. 3.
ca. 17. & 18.

*

*

B

κνινος

Cne Coriandri, folio Ziziphi. Prefertur Canopica, post Ascalonica, ultimus locus Cypriae. Seruius grammaticus, Ligustrum florem scribit esse candidissimum, ac uilissimum. Fortasse hunc intelligens, qui e Conuoluolo herba nascitur, nam & hic barbare, ac uulgo dicitur Ligustrum, ut in Clematide secunda monui. Cyprus & Hemicypus, uasis & mensurae genus est, coquis, ut placet Iulio Polluci, cognitum.

E X M. V E R G. C O M M.

Quos Maro cecinit, a pastoribus negligi, & inutiliter perire Ligustri flores, medicinae, & tinguentiarum officinae libenter exceperunt: quamquam tamen nostra aetate, nulla eius, aut exigua ratio est, cum alioqui uulgaris, & ubique paratus frutex hic sit. Notum omnibus Ligustrum. Cisalpina Gallia omnis adhuc sic uocat. Aethruria autem corrupta, deflexaque penitus ab antiqua appellatione Ruuisticum dicit, sine labore cognoscendum in sepibus maio mense, cum floret, autumno autem, cum maturis baccis nigrescit. Paulus Aegineta, ultra ea quae a Plinio traduntur, dicit etiam lieni plurimum conferre.

D E T I L I A. C A P. C X X V I I.

912 lupia

Tilia arbor est Ligustri magnitudine. Folijs Oleae, nigrioribus & latioribus. Fructu Lentisci, nigro, subdulci, racematim cohaerente. Asperis nascitur. Huius folia astringunt. Ad eadem utilia ad quae Oleaster, cum astrictione est opus: maxime ad infantium ulcera in ore, comamanducata, aut si decocto colluantur. Pota urinam ac menses cient.

B A R B A R I C O R O L L.

Plin. lib. 15. 29.
lib. 16. ca. 14.
lib. 21. cap. 8.
Theoph. li. 3.
cap. 4.

Tiliam, graeci Phelyream, nostri quoque Phelyream, & Philyram. Sed tunicas ex ea tenuissimas appellant. coronarum lemniscis celebres ueteribus, inter corticem & lignum membra-na multiplici contentas, e quibus uincula Tiliæ uocantur. Materies mari senticosa, dura, nodosa, ruffior & odorator. Cortex crassior, ac detractus statim inflexibilis, sine semine, sine flore. Crassior foeminae arbor, & materies candida est, atque precellens, e qua Tiliæ, Philyraeque utiles: quas diximus. Arbor haec ferotina, folijs dulcibus, esculentisque pecori, sed fructu animalibus omnibus ingustabili. Teredinem non sentit, proceritate perquam modica, uerum utilis, & operibus intestinis uel obedientissima: etiam si Abies, ut Theophrastus inquit, pulcherrima defenditur. E cortice, foeminarum & cunae fiunt, atque cistae, nauium longarum alseres, & arculae, mensurarumque nonnulla genera e ligno. Probatum & igniarijs. Medulla exigua est, nec magnopere cetero corpore mollior. Est enim materia eius tota mollis, ut inter carnosas mollissima, calidissimaque dicatur, quoniam citissime retundat ascias, tineturam earum, caloris sui uel resoluens. Cæditur autumno. Cinefias poeta flagitiosissimus, in quem Lyfiae oratoris plena conuictorum & stomachi legitur oratio, tam gracilis fuisse dicitur, ut Tinaceis asseribus corpori circumdatis, imbecillitatem suam fulciret, ut Philetas alter poeta, plumbeis orbiculis circum pedes adalligatis, ne uento subuerteret, Theophrastus quandoque nominat & Philycam. Siluestris, inquit, arbor est Philyca, fronde perpetua, Olympo monte, fructum suum ab occasu uergiliarum edit, Celastri modo candida, Theodorus Philycam hanc a Tilia, siue Philyra differre censuit. Vtranque tamen & candidam, & alendo pecori utilem demonstratam. Legebat & ferotinam. Celester porro siluestris arbor perpetuo uiuens. Fructum sero perficit, atque hyemis superuentu perdit, ut quidam putant. Cacuminibus montium gelidissimis nascitur: cura deterior efficitur. Vfus ad baculos senibus, Plinius odoratiorem Tiliæ mari corticem quam foeminam, Theophrastus contra, foeminam quam mari tribuit. Flos caliculaceus, pediculo quisque suo annexus, uiridi, quædiu Alabastro includitur. Dehiscentes non flauescunt. Flores pariter cum mitibus & urbanis. Fructus oblongus, & ad fabae magnitudinem rotundus, similis acino Hederæ, maiusculus, angulis quinis, ceu neruis quibusdam in acutum depressis extuberat. Partitionem hanc exiliorem indigesta: & omnino confusioiem habet, maior si scabatur. Semina emittit pusilla & pretenuia, ut uideri possint Atriplicis. Folium Hederæ, nisi quod se in acutiorem angulum rotundat, incuruum. Qua pediculo innectitur e medio sui prodit in acumen, crispum per orbem molliter ac serratum. Laurentius Valla in Herodoto, conuertit Tiliam falso, quod autor ille Iream uocauit, quæ Salix est, non Tilia.

E X M. V E R G. C O M M.

Quæ in Corollario Barbari Tiliæ adijciuntur, ex Plinio, Theophrastoque huiusdem uerbis

exscripta, nihil præter compendium laboris habent. multa sane, sed tam noua, & affectata elocutione a græcis uersa, ut græcarum literarum imperiti non facile intelligant, quid sibi tinctura ferri eo loco sit: quasi Plinius, quem ille tantum amauit, ut totum iterum in Corollario suo exscripserit, non temperaturam ut celaturam dixerit, & quia græci βαφύν dicant, ideo tincturā dicere nos oporteat, plurisq; faciendum sit quomodo aliquid fiat, quā quod & quale fuerit factum dixisse. Illud ego magis ostendi operosum, sit ne nostrati Tiliæ, antiqua illa eadem. Dico autem nostratam, quæ in Aethuria nunc ab omnibus Tilia nominatur, ex qua secādis coriis eius paratam ubiq; tabulam habent, in nullam partem rectis pectinibus, sed quacūq; parte ferramentum agatur, sequacem & cedētem. Ideoq; Tiliam, ut credimus, dictam, q̄ quæ proprie quondam Tilia dicebatur, per longitudinē rectis pectinibus, tractabilis & fissilis sit, & ob id, ut inquit Theophrastus, texendis cistis & corbibus idonea. Plura Theophrastus lib. 1.

DE CISTO. CAP. CXXVIII

Cistus, quem aliqui Citharon, aut Cissaron uocāt, ramosus frutex est, sed improcerus, foliosus, saxosis locis nascens. Folij rotundis, acerbis, hirsutis. Flos masculo ut mali punici, fœminæ albet. Vis astringens. Vnde flores in uino austero bis in die poti, profunt dysentericis. Et nomas illiū cohibent. Vetus tati ulcerum, & igni ambustis cum cerato medentur.

BARBARI COROLL.

Cistos, & Cissaros, a Cisso differt, q̄ Cissus Hædera tantum est, Cistos sui generis frutex. Quæ uicinitas, nisi quis aduertat, facile confunderet intellectum. Describitur maior Thymo, folijs Ocimi. Et sane inter Hederas mentio eius a Plinio habita est. Præterea Hæderæ speciem uidentur auctores existimasse, qui Ladanum capris depecti tradant; quæ florem Hæderæ paucunt: cum constet ex Dioscoride fruticem, unde id fiat, Ciston uocari, speciem alteram Cisti huius, de quo nūc agimus, ut in cōmentatione post Hypocistidem proxima explicabitur.

EX M. VERG. COMM.

Certatū olim doctis, uiri Nicolaus Leoniceus, & Herm. Barb. de Cisto, qd̄ cādē esset. Verū extat de ea re inscriptū de erroribus medicorū opusculū, unde nos plura dicere omitimus.

Quod uero in textu legitur, sed in fœminino, colore cādido, hoc membrum sequaci sermo nis serie certo carebit sensu. Nisi intelligatur, Ciston diuississe antea Dioscoridem in marem & fœminam, marisq; alium, fœminæ uero aliū adsignasse floris colorem, desiderariq; in omnibus græcis, totam eā diuisionē, cuius ultima tantū pars seruata sit, quod iam necessario, ex his quæ sequuntur, constituendum legentibus est: ut tantū non ego eam restituerim diuisionem. præsertim indicat Plinio lib. 24. cap. 10. Cuius hæc uerba sunt. Ciston appellāt fruticem maiore Thymo, folijs. Ocimi. Duo eius genera, flos masculo rosaceus, fœminæ albet. Quasi ex hoc scriptore uertit, ἡ δὲ τοῦ θύλλου λευκὴ, quod debuerant alij interpretes, hiatu saltem aliquo illic relicto legentibus indicare, ne credētes integrū esse locū, inutiliter in eo laborarent.

DE Hypocistide. CAP. CXXIX.

Hypocistis Robethron, aut Cytinus a nonnullis cognominata, iuxta Cisti radices nascitur, floris Punici similitudine. Quædam flaua. Altera uirens. Tertia candida. Liguatur Acaciæ modo. Aliqui tamen exiccant, fractamque macerant, & incoquunt, reliquaq; ut in Lycio prosequuntur. Vires Acaciæ habet. Verum aliquanto magis siccat, & astringit. Prodest dysentericis, coeliacis, sanguinem excreantibus. Fœminarum profluuiū & pota & indita.

BARBARI COROLL.

Hypocistis, & Hypocisto, triplex huius ratio a Dioscoride proditur. Alij ruffa & candida sunt contenti, ut Plinius. In montibus Parauinis Hypocistin uidere licet, et Ciston, sub qua nascitur Ocimi folio, ut prædiximus. Flore candido quasi Rosæ siluestris. Radice lignosa & prædura: cuius fere medio Hypocistis uelut infixæ pullulat.

A

κίσος
κίσσος
κίσσος

Plin. lib. 24. cap.
pite. 10.

B

ὑποκυσίς
ὑποκίστος
κύντιος

D I O S C O R I D I S

E X M A R. V E R G. C O M M.

C Quid Cisto adnascitur Cytnos, aut ueluti Cytnos, Paulus ægineta appellauit, Hypocistidem uero ex his expressum succum. Hic contra Hypocistidem, quod adnascitur, et Cytnos etiam uocari dixit. Hic natuam rem, ille humano opere ex eadem expressum in medicinæ usum remedium appellans: non multifacienda diuersitate, si quis utriusque consilium et propositum diligentius animaduertat. Quid autem græcis, & in natura Cytini sint, in Punica certius cognoscetur.

Non prætereundum & hoc, quod dicit hic eius genera esse, rufum, uiride, & candidum, Plinius uero rufum, & candidum colorem illi tantum tribuit. Quo fit, ut aut in alijs uiridis ille color desit, aut in hoc abundet: & quam Orobethrum hic ait appellari, nescimus nos, an corrupta uox sit, & Erythranum, ut in Plinio legitur, uocari eam oporteat.

De L A D A N O.

C A P. C X X X

284

E St & alterum Cisti genus, Ledo a nonnullis appellatum, frutex si emili modo nascens, longioribus folijs & nigrioribus: quæ uerno tempore quiddam contrahunt pingue. Foliorum uis astringens, atque effectus Cisti præbens. Fit ex eo quod Ladanum dicitur. Siquidem cum Cisti frondes pascuntur capræ, hircique, pinguitudinem conspiciue barba carpunt, & suo lentore uillo sis cruribus adhærescentem reportant: quæ depectentes incolæ, colantesque, cogunt in offas, & ita recondunt. Alij uero attractis funiculis, insidentem fruticibus lentorem abstergunt, conglomerantque in Ladanum. Maxime probatur odoratum, subuiride, facile mollescens, pingue, quod arenas non collegit, nec squallore obsitum est, resinosum: quale in Cypro gignit, Arabicum uero, Lybicumque uilius. Natura ei spissandi, calfaciendi, molliendi. Laxat ora uenarum. Capillum fluentem continet, addito uino myrrha, aut myrteo oleo. Cicatricibus decorem reddit cum uino illitum. Medetur aurium doloribus cum hydromelite, aut rosaceo infusum. Suffitu secundas eijcit. Pessimi mistum, uulua duriciem sanat. In medicamenta quæ dolorem tussimque finiunt et malagmata utiliter inseritur. Aluum sistit cum uino uetere potum. Et urinam ciet.

Pli. li. 12. cap. 17.
& lib. 16. ca. 9.

B A R B A R I C O R O L L.

C isthos, siue Ledon, & Lada, sed Ladanum in Arabia Nabathæis tantum nascitur, qui sunt contermini Syriæ. Iniuria illa qua diximus caprarum: sed non e Lada herba, uerum ex omni silua. Hoc genus Strobon uocari placuit. Est & genus aliud in Syria & Africa, Toxicon dictum: quia neruos in arcu lana circumdatos trahunt per siluas, adhærescente roscida lanugine. Sed uerum Ladanum Cypri in insula fit, quod Celyphum, hircorum in pascendo genus atque barbis hæsit, hæderæ, ut Plinius inquit, flore derafo, pastibus matutinis cum est rorulæta Cyprus, siue funibus tractis, quo dictum est modo. Non omittendum, Hederam quidem putari Cisthon a Plinio, de cuius flore colligatur Ladanum. Non quod Cisthos aliud non sit quæ Hederæ, quæ Cissos a græcis appellata, sed quod species eius una etiam sit, a nostrate multum diuersa. Quandoquidem & Paulus Aegineta scribit Ladanum ex Hædera Ladone cognominata fieri. Et Dioscorides Cisthon a quibusdam, Cissaron quoque dici tradit: quasi Hederaculæ interpreteris, aut Hederaginæ. In Carmania & super Aegyptum fruticem esse narrant, per Prolomeos translatis platis, ex quibus Ladanum fiat. Sunt qui Ladanum gummi modo ex arbore laxati corticis uulnere, ut Tura colligi, & caprinis pellibus excipi commemorant. Adulteratur Myrru Baccis, & animalium sordibus. Sinceri odor debet esse ferus, & solitudinem redolens, ipsum accensum fulgere, odoremque iuctum reddere. Myrtata in igne crepitant. Placet, cui e rupibus calculi potius, quam puluis inhæreat. Precia laudatissimo in libras, asses. 40. Aetius Cisthon, e qua Ladanum fit, eandem esse cum Cistho nostrate, sub qua Hypocisthis nascitur, affirmat: sed calidioris naturæ, ob qualitatem foli.

E X M.

TOtam colligendi Ladani historiam, omnesque eius in medicina vires, breuissime complexus est Paulus Aegineta, testatus ex Cistho Cyprio frutice fieri, quem Ladona dicit, quem caprae pascentes, barbis femoribusque suis, quod pingue & lentori simile in eo est, secum auferunt, idque collectum Ladanum esse.

Neque, ut in Corollario suo Barbarus retulit, ex Hedera Ladone Ladanum fieri is dixit, sed ex Cistho Cyprio frutice, qui Ladon uocetur. Verba eius libro sexto hec sunt, *λάδωνος ἀπὸ κισθοῦ λάδωνος λεγομένη γίνεται ἐν δὲ ἐν κύπρῳ*. Quod nescio ego, an Plinio fauēs, sic uertere magis ille amauerit, an quae Plinium Hederam & Cisthum simul miscere coegerat uocum similitudo in eo, quoniam ille Aeginetam forte habuit, pro Cistho Cisson fecerit. Lubrico ab altera in alteram uocem lapsu, praesertim in imperitis & parum diligentibus librariis, qui incognitam, neque ubique nascentem Cisthum, una tantum mutata litera ad Hederam transfulerint, quae Cisson graeci passim dicunt. Nec esse Cisthon Hederam notae, omnisque eius historia satis ostendunt. Cypriamque hanc a priore illa diuersam Dioscorides descripsit foliorum longitudine, nigredine, & pingui lentore: quoniam folia eius priuatim sibi inhaerent, ad Ladani confirmationem per uer ostendant. Fecitque coloris nigredo, quae folijs huius a Dioscoride tribuitur, ut in priore illa, quod erat *σπορὰν μέλανα* dixerimus, testantibus id aliquot ex antiquioribus graecis, in quibus *μέλανα*, i. nigra, non *σπορὰν*, i. acerbi saporis adhuc legitur. Et quod hic ait, in altera hac Cistho, longiora, & nigriora folia esse: quam comparandi uim & rationem si quis diligentius animaduuerit, facile intelliget, cōgenera esse oportere, quae inuicē cōparant nigro colore folia esse.

Addidimus praeterea, mellis modo per colum liquant. Sic in antiquioribus graecis legētes, *ἐν ἀραιούντις ἢ σπορὰν μέλανα*, non ob aliam ut nos credimus causam, nisi ut qui caprarum & hircorum pili in Ladano erant fecernerentur.

Quomodo autem per se Saligneum qualum castratis alueis liqueatur, purgeturque mel, undecimo libro satis Columella ostendit, & ab eo liquandi purgandique Ladani similis ratio poterit cognosci. Quam deinde adstringendi uim, Ladano Dioscorides tribuit, Paulus Aegineta ad capilli defluuia tantum contrahit.

De Hebeno.

CAP. CXXXI.

HEbenus optima habetur Ethiopica, & nigra, nullos habens uenarum discursus, factitij Cornus leuitate. Cum frangitur, densa apparet, mordens gustu, atque astringens. Suffitur iucundo odore supra carbores sine fumi tedio. Recens autem ad ignem prolata ob pinguitudinem accenditur, & trita ad cotem flauescit. Altera est Indica internatiis seugmentis candicantibus, & modice fuluis, item frequentibus maculis. Caeterum prior, bonitate antecedit. Apud quosdam sesamina, aut spinea ligna Hebeni uice ueneunt: quod discernitur ex eo, quod fungosa sunt, & in purpureas assulas resoluuntur, nihil mordacitatis in gustu, nec redolentiae in suffitu praefereant. Caliginem oculorum abstergit. Ad ueteres distillationes, pustulasque mirum in modum pollet. Si quisquam facta ex eo coticula collyrijs utatur, melius proficiet. Ad oculorum medicamenta efficax est, si scobes, ramentaue uino Chio die noctuque macerata, in collyria digerantur. Nonnulli praetrita ramenta excolant, reliquaue eundem in modum peragunt. Alij pro uino aqua utuntur. Vritur in fictili nouo, donec in carbones redigatur. Lauatur plumbi modo, & ita siccis lippitudinibus conducit.

BARBARI

COROLL.

Ebenus, siue Ebenum, spissitudine ligni & pondere, in aqua non innatat, sed mergitur tantum, non tota ut Buxus, cui similis esse dicit, sed pars eius medullacea. Decorticato summa nā

D I O S C O R I D I S

C grices. Ebenus cēsa durefcit in lapidē, ut iam uideat hodie quoq; partī faxū, partī lignū, ceu inchoato opere, non perfectō. Duo genera eius. Rarū id, quod melius, arboreum, trunco eno di. Alterum fruticosum, Cytisi modo, tota India disperfum. Ebenus Ethiopica, nō alia, q̃ Pal marum generis esse traditur. Lignū Ebeni, Galenus, si quis aqua infusa terat, in succū inquit re soluitur, ut nonnulli quoq; lapides. Magnus Pompeius in triūphum Mithridatico bello duxit Ebenum. Pausanias a Cyprio quodam medico accepisse tradit, Ebenū radicem tantum esse ter ra conditam, nec folia, nec fructus ullos edere, propterea nec omnibus inuentu facilem, sed in Ethiopia quosdam esse huius operis artifices, hoc est, Ebeni scrutandi gnaros.

M E X M A R. V E R G. C O M M.

Maro Indiam tantum ferre eā arborē cecinuit. Vnus Pausanias in Atticis nec folia, nec fru ctus ferre prodidit, neq; a sole conspici, sed sub terra tantum radices esse, quas fodiant Ethio pes, sintq; in ea gente eruscandæ Ebeni peritissimi aliqui.

Hanc Theophrastus, arborem cortice Buxō similem testatus est, decorticatā deinde nigro colore fieri.

Interim legentes monebimus, suspicari nos, nec leui argumento in cunctis græcis uitū illic, ubi nos uertimus, pro Ebena uendi a quibusdam, Spinæ Indicæ, & mori materiam. Quo loco, Spinæ Indicæ addidimus, & pro Sesamino ligno, mori mutauimus. Spinæ enim nihil ad iectum legebatur, nec legentibus licebat ex tam multis spinis, quæ diuersæ toto orbe nascunt, quam hic diceret intelligere. Idq; autore Plinio fecimus lib. 11. dicente ibi. Et Spinæ similis est, sed deprehensa uel lucernis igne protinus transiliente, quod uera Ebena fieri hic apte testat.

Præterea quod erat, *σνδάμιν*, a Sesamo in frugum genera adiecti uo nomine *συνδάμιν* legen dum esse arbitrati, mori materiā uertimus. Quid em̃ frugi simile cū arbore, aut qd potest Sesa mum lignū intelligi? Fuit autē facilis in tanta uocū similitudine ab altera in alterum lapsus.

De ROSA. CAP. CXXXII.

Rosa refrigerat & astringit, sed sicca multo magis. Succus recenti bus folijs exprimitur, defectis forfice unguibus, sic appellantur **D** cādidæ foliorum partes, reliquum in pila premi & teri debet in umbra, donec cogatur, & ita ad oculorum circumliciones recondi. Siccantur eti amnum folia Rosarum, continuo uersata, ne muceant, ueue situs in ijs in fideat, Aridis Rosis & in uino decoctis, expressus liquor, facit ad dolores capitis, auriū, oculorum, gingiuarum, sedis, recti intestini, ac uulua, pīna illitus, aut infusus. Eadem sine expressione tusa, præcordiorum inflam mationibus, humidis stomachi uitijis, igni sacro illini prodest. Siccis ac tri tis femina asperguntur. Misceri solent uulnerarijs antidotis, atq; compo sitionibus quas Antheras uocant. Folia uruntur in calliblephara. Flos qui in medijs Rosis inuenitur, siccatus, gingiuarum fluctuationibus efficaci ter inspergitur. Capita pota citam aluū, & cruentas reiectiones sistunt.

R O S A R B A R I C O R O L L.

Rosam, græci Rhodon, & Poetæ Brhodon, sed plantam eius Rhodoniā, ut nos Rosariū appellant. Est & condimēti preciosi genus Rhodonia, quam & Rhodontiam Patellam uocāt, ex cerebellis auiū & porcorū, in multa Rosa coctis, insulo garo, oleo, uino, pipere, ouorum lu teis. Differt a Patella Rhodontia, quæ Rhodiaca olla dicitur. Figline genus hoc. Permixtis, ut ingt Aristot, myrha, iunci flore, croco, balsamo, cinamomo, amomo, coquit ad arcendā ebrie ratem, si ex calfactis ijs uinum infundatur. Origo huius e Copto prima, ut inquit Athenes us; unde Coptica fidelia. Sed redeo ad propositum. Rosam, Timachidas, qui de cœnis scri pfit, in Arcadia Eumphalon, ab odoris præstantia uocari tradidit. Ergo Rosam aculeatam ra mos nemo ignorat. Folia interna, quæ admodum exigua sunt. Item ex maioribus, externa minus odorata. Inter amplas odore præstant, quibus ima pars scabra & corticia est. Vsta re cisa, translata sit melior. Siluestres ex toto asperiores, odore, colore, magnitudine superan tur. Rosa ut nouissima erumpit inter omnes flores, ita prima desinit. Satiua excepta, Rosæ uita

Plin. li. 11. ca-
pite. 4.
Theophr. lib.
6. cap. 6. & 7.

uita quinquenniū, non incisæ, nec adustæ. Illo enim modo iuuenescit. Flos senescētis deterior. **A** Capita foliorum eius, partesq; candidæ, Ungues uocant. In flore aliud Semē, aliud Capillus. In capite, aliud Cortex, aliud Calix. Coronas e Rosa, quæ pacilibus & sutilibus successerūt, Rosalia dixerē ueteres. Nec erat ijs gratia, nisi folio solo nexis. Recens a longinquo olet. Sicca propius. Serenis diebus lecta odoratio. Itē siccis, ruderatis, gracilibus. Omnis Rosa germinat granoso primū in clusa cortice; quo mox intumescēte, & in uirides alabaistros figurato, sensim adrubescit & panditur. In medio calicis lutea stamina, sub quibus semen insidet. quæ proprie flores dicuntur. Desitum est feri semine, cum alioquin p̄silit, quoniam sero ita nascatur. Genera eius propē nimia. Celeberrimum Prænestinæ, quæ nouissime deficit. Campanæ, quæ præquox est. Milēsia, cuius color ardentissimus. Serotinæ, duodecim folia nō excedentis. Proximam fecere Trachiniam minus rubentem. Mox Alabandicam uiliore, albicantibus folijs. Vtilissimam pluribus, sed minutissimis, Spermoniam. Malo Pliniū sic legi, q̄ spinolam, aut spinosam. Ita enim, siue q̄ minutissimo folio, siue q̄ uilissima sit omniū, rectissime uidet appellata. Sunt qui Sycioniam legendū putent. Nulli folia quinque pauciora. Campaniæ Cētifolia tribuitur. Et Philippis in græcia, a Pangeo monte uicino translatia, numerosis folijs ac paruis. Nec tamen talis odoratissima, nec cui latissimū, maximūq; folium. Ideo nec coronas intrat Centifolia, nisi extremos uelut ad margines. De Lichny Quinquefolia, quæ inter Rosas quoq; numerari solet, & græca, seu græcula uocatis, suo loco dicit Quinquefolia. Est & alia Græcula appellata, conuolutis foliorū paniculis, nec dehiscens, nisi manu coacta, semperq; nascenti similis, latissimo folio. Alia funditur e caule Maluaceo, folia oleacea habens, Musceton (est ubi acetone legatur, & Mosceuton, a propagine, Viuiradiceue, quā græci Mosceum dicūt) uocata. At que inter has media magnitudine, autūnalis Rosa, quā Coroneolam uocamus, in Rubo natā, quæ iocundi odoris, sed angustū, ut in Cynosbato monstrauimus. Reliquæ sine odore, hoc est, Maluacea, et duæ græculæ. Semen Rosæ in ipso cortice est sub florē, optum lanugine. Precox Rosa emergit, si pedali serobe ab radice facta, calidam infuderis, germinare incipiente calice. In Hispania Chartagini, præcox Rosa, hyeme tota uisitur. Vnū genus inferitur pallidæ, spinosæ, longifimis furculis Quinquefolia, quæ Græcula altera est. Nisi quis hoc quoq; loco, Spermonie, nō spinosæ legerit in Plinio. Satis ambigo, Coroneola sit Cynosbati, an Cynorhodi flos. Quamquam Cynosbati magis puto. Cynorhoda porro, siluestres Rosæ sunt, spongiolis penicillisue inter medias eius spinas nascentibus, unico aduersus expauescentes aquā, a morfu cantū, remedio, nec fere ante Plinium comperto; unde nouatū ei nomen crediderim. Quamquā Aristoteles hanc uidetur appellasse Cynacanthē, hoc est, Caninam senticem, Cantaridū seracē, ut dicitur secundo libro, in mentione Cantaridum. Est & Cynorhodos alia, sed Liliū, ut monstrauimus. Nihil dubito, Cynorhodon aliud esse, q̄ Rhododaphnē. Esse aliquos flores, Rosas colore similes, arboribus in externo mari natis, autor est Theophr. Columella punicā Rosam uocando, aut rubentē, aut ex Africa translatā significat. Rosam triplex comitatur fabula. Nō nisi candidā per initia fuisse. Mox uulnerato Veneris pede, dū Adonidē, quē Mars zelotypus, interfecerat, opē latura, p̄cipiti cursu per dumeta rapit, adrubuisse. Alij sanguine Cupidinis, ut Aufonius, alij nectare affuso, ala Cupidinis, in Deorū conuiuito lasciuientis, illisa poculis.

EX M. VERG. COMM.

GENERA Rosarū multa Theophrasto primū, mox Plinio fuerūt, ex foliorū numero p̄cipue discreta. Post quæ nō male alijs forte credat, alia etiā extitisse, et nostra ætate adhuc quoq; essetantopere diuersis locis per se, & humano ope coacta, uariat natura suas opes.

In cūctis fere græcis a principio statim deerat, ῥόδα ψυχῇ καὶ σφύ. τὰ δὲ ῥοὰ μᾶλλον σφύ, cū tñ ex melioribus legi oporteret, ῥοὰ ψυχῇ καὶ σφύ. ut sit sensus. In rosis refrigerare, & adstringere recētes: siccas uero amissa refrigerandi potestate solū & efficacius adstringere. Indicat id, præ antiquorū fidē, res ipsa, & sermonis ordo, in q̄ altera pars p̄ contrariā diuisionē illata, cōtrariā sibi alterā exigit: cūq; in posteriore de siccis ageret, oportebat in priore de recētibus actū fuisse.

Sequitur deinde non multo post, quod penitus corruptum sit, facilem cōiecturam habet. Docet enim Dioscorides, de secētis foliorum Rosæ unguibus, terendum in mortario reliquum corpus, exprimendumque, & in umbra habendum succum donec densetur. Sed non potest, ex his quæ nunc leguntur hic sensus colligi. Nos quoniā illic, mortarium, & umbra est, & do nec densetur, eo sensu qui legitur, Serapionis ope reddidimus. Quod donec certius aliquid ab alijs inueniatur, a legentibus accipi uolumus.

Quod deinde erat, ῥοὰ δὲ λεία παρὰ μέρους προσάγεται, nullo sensu ex antiquorum & meliorum codicum fide instauratum est, παρὰ τὴν μέρους, id est, femorū intertriginibus.

De Rhoeis

D I O S C O R I D I S

C De Roseis pastillis. CAP. CXXXIII.

Pastilli quos Rhodides uocāt, hac ratioē cōficiūtur. Rosarū uiridiū, quę nullo antea humore madefactę exaruerūt, drachmę. xxx. Indicę Nardi drachmę. x. Myrrhę drachmę. vi. tritę digerūt in pastillos, q̄ obolorū pondus æquent. Siccantę in umbra, in fictili non picato, atq; obturato reconduntur. Alij adijciunt Costi drachmās duas, Iridis illyricę totidem, & uinum Chium cum melle miscent. Mulieribus monilium loco usui sunt, ad retundendum graue sudoris uirus. Tritis etiam utuntur ad illitiones, & diapasmata quę fiunt ad sudores coercendos, ita ut a balneis inarescant corpora, dein frigida aqua abluantur.

E X M. V E R G. C O M M.

Similem, non tamē eandē Dioscoridi Rhodiorū confectiōē Pau. Aegin. lib. 6. docet, neq; eodē genere eā appellat: hic fœminino Rhodias, ille neutro *ῥοδιῶν* uocat, iubetque recētibus Rosis et eodē pōdere ipse etiā cōfici. Latini, qđ eodē inuenerim, de his nihil tradiderūt, Romana grauitate blāditias amorum, & uoluptatū illecebras docuisse, indignum existimantes.

De LYCIO. CAP. CXXXIII.

Lycium, quod aliqui Pyxacanthan uocant, arbor est spinosa, ramis trium cubitorum, aut longioribus, folijs Buxi, densis, fructu Piperis, nigro, leui, amaro, densoq; cortice pallido, non dissimili Lycio madefacto, radicibus multis, obliquis, lignosis. Nascit plurimum in Capadocia, Lycia, & plerisque alijs locis. Aspera loca amat. Coquuntur rami cum radiculis tusi, & ante per aliquot dies macerati, tū abiectis lignis denuo liquor coquitur, donec mellis crassitudo fiat. Adulteratur id Lycium adiecta decoctioni Amurca, aut Absinthij succo, aut felle bubulo. In natans spuma inter coquendum exempta, oculorum medicamētis additur. Reliquo ad alia utitur. Simili modo fit Lycium, semine expresso & insolato. Optimum quod uri potest, restinctumque rubentem spumam ostendit, glebis extrinsecus nigris, intus cum freris ruffis, ingustabile, cum amaritudine astringens, crocino colore, cuiusmodi Indicum est, cæteris præstantius. Lycium astringit. Caliginem oculorum discutit. Genarum scabiem, pruritus, ueteresq; fluctiones sanat. Facit ad purulentas aureis, exulceratas gingiuas, tonsillas, labiorum fissuras, sedis rimas, attritusque illitum. Coeliacis, dysentericis, potum inditumq; conuenit. Datur sanguinem excreantibus, & tussi ex aqua. Contra rabiosi canis morsus in catapotio deuoratur, aut in aqua bibitur. Flauos facit pilos. Paronychijs, ulceribus quę serpunt aut putrent, medetur. Fœminarum profluuiā appositum sistit. Rabiosorum ictibus ex melle potum, aut uice catapotij deuoratum, auxiliatur. Tradunt Indicum fieri Lycium, ex fructu *Λόχίτιδε* appellato. Ea spinarum generi ascribitur, ramos rectos habens, ternum cubitorum longitudine, maioresue, Rubo crassiores, a radice numerosos. Fructus cortex rubescit. Folia Oleæ similia. Herba in aceto decocta proditur lienis inflammationibus, & regio morbo mederi. Et fœminarum

foeminarum purgationes elicere. Aſſeuerant etiam crydam in potu, eoſdem effectus præſtare. Semen cyatho dimidio potum, pituitam expurgare. Venenis quoque auxilio eſſe.

B A R B A R I C O R O L L.

Lycij, tum ſpina ipſa, tum ſuccus ex ea, dicitur Pyxacanthos. Chironias in Græcia uocatur. Frutex, unde Lycium fit, adulteratur alſphodeli radice. Item ſpina, in Pelio monte nata. Medicinæ aptiſſimum intelligitur, quod eſt ſpumofum. Indi Camelorum, aut Rhinocerotum (hi boues Aegyptij ſunt) ut Feſtus inquit, utribus condunt. Lycium foris nigrum, intus ruſſum, cito nigreſcens cum frigeris, optimum ex indico frutice. Aliter Dioſcoridis Lycium, ex radicibus quoque ſylueſtris Rhamni coctis conficitur. Nomen Lycio inuentum puto, quoniam e Lycia inuheretur, præcipuum urbe Patara, quanquam Indicum omnibus præfertur.

Plini. lib. 24.
capi. 14.

E X M. V E R G. C O M M.

Quæ a Plinio lib. 12. & 24. longius dicta ſunt, parata & expoſita omnibus relinquimus. Lycium ideo dictum eſt, quod probatiſſimum, & quotidie ex Lycia ad alios importaretur. Quod in impreſſo legebatur, *ῥίζας δὲ πολλὰς πλαγίας*, radices numeroſas & obliquas, una tantum mutata litera, *πλατείας*, id eſt, latas uertimus.

Expunximus deinde aliqua. bis enim idem importune repetebatur, in quo iterum contra rabidi canis morſus ſum Lycium Dioſcorides iubet. Et quoniam in uetuſtioribus aliquibus, pro melle eo loco lac legebatur. Ex Plinio remedium aliud illic inſtaurauiſmus, dicentes ſiſtere Lycium foeminarum profluuium appoſitum, aut cum lacte potum. Locus eſt libro uiceſimo quarto, cap. 14.

Suſpicamur præterea ab eo loco quo ait, fertur Indicum fieri Lycium, ſequentia parum eſſe legitima, qui cum ſemel in India naſci buxeam ſpinam dixiſſet, idque pro comperto docuiſſet, ad famam & aliorum fidem transferre rem non debuerat, nec quod ſemel a ſe decretum fuerat, ex aliorum dictis infringere. Suſpicionem noſtram auget, quod plures illic uoces ſunt parum proprie, & huic ſcriptori inſolite, potuitque ab antiquiore aliquo medico ex alicuius hiſtoria, omnis ea pars Dioſcoridi acceuiſſe, et paulatim in unum corpus coaluiſſe.

De Acacia.

CAP. CXXXV.

Acaria in Aegypto naſcitur inſtar arboris, frutice ſpinoſo, non ſe in rectum attollente. Florem habet candidum, & ſemen Lupino ſimile in folliculis, ex quo ſuccus expreſſus ſiccatur in umbra, niger ex maturo ſemine, ſubruffus ex uiridi. Eligatur modice ruſſus & odoratus. Aliqui folia cum ſemine exprimunt. Manat & gummi ex ea ſpina. Viſei ad ſpiſſandum, refrigerandumque efficax. Succus oculorum medicamentis utilis. Valet ad ignem ſacrum, ulcera quæ ſerpunt, perniones, pterygia, et oris ulcera. Procidentes oculos reprimi. Menſium abundantiam liſtit. Prociduam uuluam cohibet. Citam aluum ſupprimi, aut potus, aut inditus. Capillos denigrat. Lauatur oculorum medicamentis, trito in aqua, mox effuſo quod concreuerat, donec pura extet aqua. Et ita cogitur in paſtillos. Vritur etiam in fictili nouo fornacibus, torreturque in carbonum halitu perflata. Spinæ decoctum ſolutos artus ſotu committit. Præfertur eius ſpinæ gummi, quod in uermiculorum ſpeciem contrahatur, & uiri modo perluceat, ligni expers. Proximum eſt candidum. Sordidum uero ac reſinoſum inutile. Cutis meatus obſtruit. Et medicamentoꝝ rum quibus ammiſcetur, acrimoniam hebetat. Ambuſtis ex ouo illitum puſtulas non patitur erumpere.

B
ἁκανία

k

D I O S C O R I D I S

B A R B A R I C O R O L L .

Pli. li. 24. ca. 12

C Acacia fundentem, idem uideo accepisse autores, cum spina ægyptia. Testis Oribasius, & Aetius. Nisi quod acacia, etiam aliubi quæ in Aegypto nascitur. Hæc & syria quoque spina dicitur. In Aegypto, alba, nigra, & uiridi arbore conspicitur. Arbor tota horret aculeis, excepto caudice. Preterdit eos & germinibus & folijs, ligno in duodena sæpe cubita procero. Cedit testis & nigra, nauium costis, incorrupta, etiam in aquis ui. Candida facile putrescit. Semen in Siliquis ad coria perficienda, Gallæ usu. Flos & coronis addi blandus, & medicamentis petitus. Manat & gummi ex ea, cum sponte, tum plaga, non e cortice, sed e uase. Præcipua utilitas, quod cæsa, anno tertio resurgit. Numerosa omnino arbor: ingenti sylua eius Thebaica præfectura: ubi & olea, & quercus, & textilis persica. Prouenit & in Galatia, teneritudinis summæ, spinosior arbore. Colligitur autumno semen: quoniam collectum maturius, nimis uehemens. Spissatur succus ex folliculis, aqua pluuiæ, maceratis mox in pila tuis exprimitur. Tum densatur in sole mortarijs in pastillos. Acacia uocatur, arboris uidelicet suæ nomine. Fit & e folijs per se, minus efficax. Galaticæ Acaciæ nigerrimus improbatur. Itæ qui ualde rufus. Placet purpura, aut leucophea, & quæ facillime diluitur. Nunc Acacia ex syluestri Pruno colligit officinarum desideria. Illud meminerimus, semine ægyptiæ, a Dioscoride lupino simile reddi ponticæ, seu quod idem puto, galaticæ lenticulæ. Plinius nihil distinguit, sed utrumque semen, lenticulæ par existimatur, minore tantum grano & folliculo. Demetrius adserit in Aegypto spinam, quæ sit arbor, ramos coronarum specie natua effundere, in quibus semen rotundum sit, flore subobscurum. Ex hac Tindicæ, & Abylæ coronas in ægypto fieri, docuimus in Myrto. Spinam porro ægyptiam, sunt qui & arabicam uocant, ut Dioscorides & Galenus. Non est superfluum, ut spinarum hoc loco genera subiiciam, quæ nominis comunione greci, legentibus dubitationem afferunt. Acanthos, siue quod idem est, spina uulgaris, ut quidam coniectantur, acantha, pyxantha, oxyacanthos, leucacanthos, acanthaleuce, tragacantha, acantha arabica, uel ægyptia, acantha indica, acantha ariana, acantha babylonia siue regia. Adduntur a latinis, spina sitiens, spina pennata in ægypto, spina appendix, spina bunia. Diuersa omnia, decem & septem numero. Accedat istis Galatica, siue Pontica, siue Cappadocica: de qua proximo capite disseritur. nam syluestris quæcunque spina, Calabrix uidetur esse nominata.

E X M. V E R G. C O M M.

D Oniunximus in Acacia, ueterum grecorum fidem secuti, quæ male in duas secesserant partes, unoque capite, ut res ipsa etiam exigebat, fecimus de omni Acacia a Dioscoride doceri. De qua non eodem modo, Oribasius, Aetius, Pliniusque & alij docuerunt, sed non facilis nostra ætate commentatio est.

De Acacia altera. C A P. CXXXVI.

A Alterum Acaciæ genus in Cappadocia, Pontoque prouenit, ægyptiæ spinæ similitudine, longe minor, tenerior, humilis. Aculeorum uallo munitur, folia habens Rutæ. Semen lenticula minus fert autumno, in loculis ternum quaternumque seminum capacibus. Succus eius adstringit, uiribus inferior. & ocularibus medicamentis inutilis.

B A R B A R I C O R O L L .

Pli. li. 24. ca. 12

A C A C I A hæc, a Plinio Galatiæ tribuitur.

De Amurca. C A P. CXXXVII.

ἡμύρα

A Murca expressæ Oliuæ recrementum est. Decocta in cupreo uase ad crassitudinem mellis, adstringit, cæteros præbens Lycij effectus. Insuper dentium dolori, & uulneribus, cum aceto, uino aut mulso, commode illinitur. Additur in medicamenta ocularia, & meatus obstruentia. Vetustate meliorem fieri constat. Utiliter infunditur sedis, genitalium, & uulvæ exulcerationi. Si uero cum omphacio recoquatur ad mellis crassitudinem, cariosos dentes extrahit. Lumentorum scabiem citè decocto lupini & chameleonte illita sanat. Cruda & recenti amurca po-

dagras, articulariosq; dolores foueri utilissimum. Peruncta in uillosa pel
le, & hydropicis imposita, tumoris molem reprimat. A

B A R B A R I C O R O L L.

I Nter inumeras Amurcae laudes, agricolarum usibus a Catone praedicatas, illa maxime me
morabilis, q; ligna macerata liquore eo, nullius fumi tedio ardent. Graeci ἀμόργην uocant, etiā
fecem quādoq; uini. Item genus herbe purpuree, qua uestes tingantur, Amörging a graecis ap
pellata. Sed & tenuissima pars harundineae paniculae, dicitur Amorgis; autorem habeo Pho
nionem grammaticum.

Pli. li. 15. ca. 8.

E X M. V E R G. C O M M.

C O C Turam Amurcae, certius primo rusticarum rerum libro docuit Mar. Varro, quam
condi in domesticos usus iussit. Si quis praeterea Amurcae laudes alias, & multiplices usus no
uisse uelit, poterit auctoribus Mar. Catone, & Plinio diuersis locis quod cupit inuenisse: eritq;
illud homini saltem laboris huius opere precium, ut naturam discat, nihil tam sordidum esse,
& ingratum genuisse, quod in hominis usum beneficio aliquo non instruxerit.

De Vitice. C A P. C X X X V I I I.

A Gnon aliqui Agynon, alij Lygon uocant, alij Amictomiænon,
alij Tridactylon, magi Semnon, alij Hæma ideos. Aegyptij Sū,
Romani Salicem marinam, alij Piper agreste, alij Lecristicū. Vitex, seu
castus frutex est, in arborem assurgens. Nascitur in fluminum ripis, aspe
risq; locis, ac torrentium alueis. Ramos gerit praelongos, fractu peruica
ces, folia Oliuae, sed molliora. Duo genera eius. Vna harum album florē
mittit cum purpureo, altera tantum purpureum, et semen ut piper. Excal
factorias uires habet, & astrictorias. Semen eius potū, uenenatis ictibus.
aquae quae cutē subijt, lienosisq; auxiliatur. Lac euocat. Menses ciet, dra
chma pondere in uino potum, Genituram exoluit. Caput tentat, & so
porem affert. Decoctū herbae & seminis in defensione, mulieribus uul
uae malo opportunis opitulatur. Item inflammationibus. Purgationes mo
uet semen cum Pulegio potum, etiam suffitu, uel appositu. Capitis dolo
rem dissoluit illitum. Instillatur cū aceto & oleo capiti in letargo & phre
nitide. Folia suffitu, aut substratu fugant uenenata. Illita quoq; serpen
tium moribus auxiliatur. Testium duricias cum butyro et folijs uitium
emolliunt. Rimas sedis semen cum aqua illitum mitigat, & cum folijs me
de luxatis, uulneribusq;. Virgā qui manu teneat dū iter facit, negat inter
triginē sentire. Agnū, quasi dicas purū, uocāt Graeci. qm matronae in thes
mophorijs Atheniensium castitatem custodientes, folijs cubitus sibi ster
nunt: et Lygon, quasi uimen, propter inuictā fere ramorum flexilitatem.

ἀγνος ἄγνος
λύγος
ἀμικτομίανος
τριδάκτυλος
εὐμνός
ἡμα ἰδωθ

B

B A R B A R I C O R O L L.

A Gnos, siue ut Hippocrates appellat, Agne, dicitur latine Vitex. Non habeo tñ plane cō
pertū, an salix amerina, idem qd Agnos Vitexq; sit, & si Dioscorides hoc affirmat. Et ipse ita
censo. Vitex, non multum a Salice uulgarī distat, usu uinculorum, foliorum q; aspectu, ni
si odore gravior esset. Semen potum, uini quenda saporē habet. Duo genera eius. Maior in ar
borē Salicis mō assurgit, flore candido, unde Candida quoq; dicitur. Minor ramosa, folijs al
bioribus, lanuginosis, purpureo flore, Nigra nuncupata. Nascuntur in palustribus cāpis. Se
men uiticis, Galenus mandi cum bellarijs solere scribit, usu tragematis. Ita em minus officere
capiti. Lygon, Lygeanq; graeci uocāt & arborem, & quoddam herbe genus, qd, ut inquit A
theneus, in nidos suos parituri cygni ferant. Nec tñ satis habeo compertū, hanc, quam cygni
petant herbam, aliud genus oportere intelligi q; uiticem, Inuenio & scopas amerinas, spartis

k ij

D I O S C O R I D I S

C similes describi, folio tamen minore, sed lenticia uirgularum maiore, quas, sunt qui genistillā amerinam uocent, hoc tempore. Corolla e Lygo usos esse ueteres, Anacreonti poetę credimus: cuius originem Samij, Carelq; dederint, diuersis causis. Nam & Lacedęmones arundine certis sacris, ut autor est Sosibius, coronabantur. Aristophanes quoq; autor est, coronas ex arundine facitari solitas Athenis: quas & dioscuris, hoc est, Castori et Polluci dicatas fuisse cōstat, ut frugales atq; simplices. Lygō & Aegylin qñq; dici lego. Itē Mosyn, & Oesyan, et Oesō, et Oesocarpon, ut Polluci & Photioni uidet. Vñ Gerra oesyma, hoc est, quadrata quēdā tugu-riola ex huius salicis uiminibus: quę Ligella qñ nominant a Plauto in Aulularia, forte a Lygo, i. uitice, aut a ligādo. Adjiciendū illud uidet, q; hic a Dioscoride scriptū ē, Viticē a qbusdā Lecristicum uocari, putare me in eo uerbo mendā esse. Nec lecristicū, sed a similitudine saporis & acrimonię Ligusticū legendum. Nam & piper agreste dici uiticem, idem autor affirmat.

V Ocatur Agonos, non alia ratione, quam quod semen genitale diminuit.

In Amictomixi uoce, & si non sint integra omnia, antiqua tamen integritatis, et significationis aliqua adhuc supersunt uestigia, ex quibus facile coniectura est, fuisse eius uocis compositionem, quę ad uenerem misceri cum mare prohiberet.

λγος quoq; i. flexilis, *από τοῦ λυγίσιν*. A rubore uirgarū sanguis dictus est. Itē Semnos, idest, uenerandus, qd incontinentiā arcer. Ligusticum, a similitudine saporis. Piper agreste, qd piperis naturam explet.

Amerinam salicem a Romanis gręcorum Agnum dici, aperte Dioscorides testat. Sed uerum id sit, in Plinij & Columellę lectione diligentiores facile cognoscent. Nobis inclinat animus, ut negemus gręcorum *ἄγνον*, Romanorum salicem esse, suspicamurq; adiectam ab imperitis latinorum rerum gręcorum medicis eam Dioscoridi appellationem accreuisse. Tam enī Viticis, quam Amerinę salicis uocem nouisse quōdam Dioscoridem, uerisimile est: & ex quo Plinius aperte docet, Viticem latinis esse, quę gręcis Lygos & Agnos, nec multum a salice uiriliū usu distare, non credendum, in ea appellatione deceptum diligentissimum alioquin & ex professo hęc agentem hominem.

Theophrastus, quod Oleę folia habet, composito nomine *ὀλεάγρον* uocauit.

¶ De Salice. CAP. CXXXIX.

D **S** Alix uulgo nota est, cuius semē, folia, cortex, & succus spissandi uim habent. Trita folia cum exiguo Pipere & uino pota, ileosis subueniunt. Sumpta cum aqua, præstant mulieribus ne concipiant. Salignum semen, in potu sanguinem expuentibus prodest. Cortex eosdē præbet effectus. Corticis cinis admisto aceto illitus, clauos & callos tollit. Ex folijs & cortice succus, cum rosaceo in calice punici calfactus, auritū dolorib; auxiliat. Decocto eorū podagras foueri utilissimum. Furfures purgat in corpore. Excipit succus q; manat ex ea cū floret, exciso cortice. In plaga enim cōcretus humor inuenit, q; ad purgāda quę obstat oculis, suā uim præbet.

Pli. li. 24. ca. 9.
li. 17. ca. 20. li.
16. cap. 37.

B **A** **R** **B** **A** **R** **I** **C** **O** **R** **O** **L** **L**.
Reuifere & cōorto caudice arbor, & ut nouimus, aquatica, *ιρίκν* gręci uocāt, Asia tribus generibus hęc diuidit. Prima nigro cortice, aut puniceo, nigra nominatur. Secunda candido, candida uocata. Tertiam coactę breuitatis, & sponte naturę, pumilā, foecundo, ut qdā putāt fructu, Helicē appellāt Arcades. Virgas ad nexus, e nigra cōmodiores & pulchriores, e cādida spissiores, & agricolarū utēlibus aptiores esse. Plinius apud nos quoq; tria Salicis esse nomina commemorat. Viminalē, eandēq; purpureā. Vitellinā, a colore luteo, graciliorē priore. Gallicā, quę sit tenuissima. L. Columella Gręcā, Gallicā, Sabināq; reddit: gręcā flauī coloris: gallicā obsoleti, purpurei, tenuissimiq; uiminis: sabinā gracilibus uirgis atq; rutilis, quā plurimī uocāt, inqt, amerinā. Plinius gręcā rubentē, amerinā candidiorem asserit. Porro quam dixi Vitellinā, in exemplaribus nicellinā, & itellinā corrupte legimus. Inuenit & alia distinctio. Proce-
* re, uineis iugadis pticales uocat, balteo corticis uincula pñentes. Alię pñentes, a uiminibus, appellatę uiminiales. Alię uirgas, sequacis ad uinctum lenticie ferētes. Alię corbibus et supellectili uillicę firmiores cādidioreq; detracto cortice, leuiq; tractatu; mollioribus inde uasis, q;

e corio & cathedrarum delictijs aptissima. Fructum Salix fert, abeuntem in araneam, anteq̃ o-
mnino maturitatem sentiat. Ob id, ante maturitatem colligitur, dicta Homero ὀλισίκαρος,
hoc est, frugi perda. Vna tm̃ prodiit, ad maturitatem proferre solita, in Creta insula, ipso de-
scensu Iouis speluncę, toruum ligneumq̃, magnitudine ciceris. Succus Salici triplex. Vnum
arbor ipsa, gummi modo sudat. Alter cortice triū digitorū magnitudine ablato manat. Tertius
detruncatiōe ramorū, a falce distillans. Salix fertilior & densior recisione fit, ac tonsura ex bre-
ui pugno, uerius q̃ ramo, puentu ceruissimo. Tertium locum in æstimatione ruris, Cato ei tri-
buit. Salictum non hoc tantum. Seruio grammatico significat qd̃ oliuetum, arbutum, uine-
tum, sed & uirgulti quoddam genus, dictum ita, q̃ saliat surgatq̃ cito: ut Lupum fortasse sali-
ctarium intelligat, de quo suis locis egimus.

EX M. VERG. COMM.

GRAuissima huic arbori inuidia Homerus, p̃p̃modū fecit, qd̃ ὀλισίκαρον hęc uocauit, frugi
perdam. De hac, omniq̃ eius medicinię usu aliter magis q̃ alia Plin. lib. 24. pleraq̃ tradit, quę
in medio posita omnibus relinquimus.

De Syluestri Olea. CAP. CXL.

Syluestris Olea, quam aliqui Oleastrum appellāt, alij æthiopicani. ἄγριος
Oliuam. Folia adstringūt. Trita autē & imposita ignem sacrum, ul-
cera quę serpunt, epinyctidas, carbunculos, paronychia, nomasq̃ cohi-
bent. Crustas emarginant cū melle illita. Quinetiā sordida repurgant. In-
flamnationes, panosq̃, cū melle imposita discutunt. Cutē a capite uulsam
conglutinant. Oris ulceribus cōmanducata medentur. Succus & de-
coctum, eosdem habent effectus. Sanguinis eruptiones, ac muliebre pro-
fluuium, admotus succus inhibet. Vuę oculorum, pustulisque pro-
dest. Vlcerā, & ueteres defluctiones sistit. Quapropter in collyria addit,
ad genarū erosiones perq̃ utilis. Exprimitur succus tuis folijs, affuso ui-
no ex aqua, siccatusq̃ sole in pastillos digeritur. Sed longe ualidior ad re-
condendū succus habetur, qui cum uino q̃ cum aqua expressus est. Au-
ribus subuenit, siue ulcerentur, siue pus effluat. Folia conuenienter coeli-
acis cum farina hordeacea illinuntur. Vruntur cum floribus folia, ut spo-
dij uicem cinis præstet. In cruda olla oblito ore luto, usq̃ dum figlinum
percoquatur, restinctaq̃ uino, & rursus subacta, eodem modo uruntur.
Postremo cerusę modo elota coguntur in pastillos. Huiuscemodi cine-
rem in medicamentis oculorum constat spodio non cedere. Sed eisdem
uiribus præditum esse putandum est. Foliorum satiuę oleę eadem uis
intelligitur, sed aliquanto inferior. Vnde ocularibus medicamentis ob-
suam mitiorem uim conuenientior est. Sudor ligno uirenti accenso ma-
nans, illitu sanat lichenas, furfures, & scabiem. Oleaginum semen illitum
medetur furfuribus, & ulceribus quę depascunt uorantque. Quod autē
intra nucleum est ex adipe & farina, scabros ungues excutit.

BARBARI COROLL.

Oleaster, gręce ὀλισίκαρος appellatur. Syluestris Olea fecundior satiuę, q̃ fere syluestres ha-
bent, ceu cura fertilitatē minuere. Mansuescere hanc tractatu, decisit circa taleis, aut omnino
translatione mitem fieri, uix potest adduci Theophrastus, ut credat. Sola hęc arbor cū Olea,
teredinem sentire nō dicit. Ex Oleastro marculos breuiore, & terebris uaginas, sicut ex buxo,
ulmo, fraxino, aquifolia, factitatas produnt. Est & in Appennino frutex, uocatus Corti-
nos, ad liniamenta modo conchilij colore insignis. Sed hoc ego nō Oleastrū esse puto, sed Ole-

k ij

A
ἀλυσ. κ. μακρῆ
τ' ἀγριοί κρη
ἰταὶ ὀλισί-
καροι.

ἀγριος

B

Plin. li. 9. ca.
12. Lib. 13. ca.
17. Li. 15. cap. 1

D I O S C O R I D I S

Castellum, & Oleam cilibracam, a Columella nominatam: cuius & ipse Dioscorides in Chamaelea meminit. Phorion, Oleastrum quandoq; dici Phauliam existimat. Certe Phaulia Oliuæ genus est Columellæ, Plinio, grecis omnibus.

Plin. li. 15. ca.

2. 3. 4. 5.

Oleæ medulla tam incerta, ut non in medio haberi, sed per totum lignum sparsa uideat, radiis parua, uelut lacinia ex medio tendente, cæteris grandibus & cancrorū similitudine contortis. Proprium ei malum Congros, etiam si deriuatur in alias quoq; id nomen. Sunt q; affectum rû Premnō, Crotonē aliq; cognominent. Supina foliorum huius contra q; ceterarum, candicant magis q; prona, minusq; sunt leuia: qd & cum hedera cōmune est oleæ. In Syria, & aliubi, congestum quasi tuæ modo fructum ferunt, ubertate soli. Oleam utiliter & probe defloruisse dicimus, cum flores eius caduci, uelut perforati reperiuntur. Nascitur modis omnibus extra, q; surculo. Ex huius nucleis, quos Sansas uocamus, syluestrem oleam prouenire Theophrastus scriptum reliquit. Sansam, sunt qui & Naucum dici uelint. Vnde uerbum nauci facere. Quandoquidem & fullones, ob utilitatem artis, Nacæ dicebantur, ut nunc mestas et proxenetas, sansarios & ossarios uocamus. Quidam pro nugis, naucum. Alij omnia fere opera ex lana, græce νάυα dici uolunt. Ipsum quoq; nucis, sed & omnium rerum putamē. Alij nucleum malunt iuglandis. Alij mediū illud uelut dissepimentū. Glossematorū scriptores fabæ granī, q; hæretī sabulo. Quidā ex græco leuē hominē in eō uerbo significare putauere. In mari rubro uisit Olea, quæ uocatur arabica, bacis fere nostratibus, fungos, cum largi ceciderunt, imbres educans, qui tacti sole in pumicem durant. Ex qua manat lachryma, inhibendo uulnere san guini expetita medicis. In sinu heroo lapidis specie, ut thynum & laurus, cubitorū trium magnitudine. Ignē olea, quamuis optime subditum excipiat, q; spissa & pingui natura sit, igniari is tū ineptissima est. Vna maxime omnium Olea regerminat in opere. Vitam oleæ Theophrast. 200. a. nōs longissimā esse tradidit. Si olea consitū in confinio quercetū habuerit, nō solū nō feret, sed etiam fugiet, introrsumq; se in fundum abijcet. Ut cradē fico, ita thalea tribuuntur huic arbori, utiq; apud nos. Græci, utinq; Pollux, Thalos non oleagineos solum, sed utigineos quoq; ramos nominat interdum. Præcidunt, Varro inqt, eam de tenero ramo æquabiliter, ex utraq; parte circiter pedalem. Sunt qui sclauolas nominent. Eresionē porro Athenis, siue Iresionem uocabant, plantam oleaginē, uelleribus & corollis inuolutā. Vnde & nomen cōtra pestilentiam foribus imponi solitum, ut est apud Aristophanē. Hanc & Corythalion dicebant. Etiam si pro laureo quidā ramo capiunt, in eundem lustrationis usum. Credo huius quoq; ritus apud Romanos uestigium fuisse, cum ita legamus apud Festum. Planta oleaginea uirga, in quibus redimiti sacerdotes expiabant domos. Quod deinde nomen ad oīa purgamina translatum est. Autor Ouidius. Morbus & ille proprius, præter uermiculationem, Elos uocatus, hoc est, clauus. Ab alijs Mices, atq; Lopas, hoc est, fungus & patella: ceu quedam solis inusio. Quanc; Patella in sicu morbum significat, qui nimios propter imbres radici contrahitur in olea. Et Arachnion uocatur affectio, hoc est, aranea, fructus absumentis uermis: sub corio prouentū admittit, in uicemq; adiuuat, si nascatur ad nucleum. Nulla post ficum arbor uredini magis obnoxia est. Carpæ appellant in oleis uermiculi, statib. austrinis creati, ut in uitis. Est et impetigo, peculiaris ei morbus, ut scabies fico, & uitis. fluor. Olea græci, ἰλαίαν uocāt: nostri quic; Termitē. Quāq; ita & ligni uermes dñr. Optia erat Olea ueterib. licinia, siue liciniana. Pausanias. oleo. Escq; orchas. Varro, grādis inqt, Olea uocat orchitis, a similitudine, ut credo, testiu: antiquus archemora. Minus ijs gratæ sunt regie, et radij uocare. Sūt et alia earū gñā, quæ ambid. osti sit, pseq; cū et. 6. uolumine Colum. et Plin. 15. naturalis historie, nihil fere indistinctū relinquāt. Hæc arborē nonnulli existimāt ultra. 60. a mari, aut nō uiuere, aut nō esse feracē. Sed in quibsdā locis recte puenit. Olea Mineræ sacrā, ut Aristoph. & Iulius Pollux inqt, græci Moriā uocabāt, in academia satā, ut in Olympia nascētē Oleastrū calistephanō: q; olympie uictores ea coronarent, ut ait Pausanias. Nā Secos, fructiferā oleā in poetis significat Phorion. Dicit & Callie lēa, quā nos satiuā, ut ab oleastro differat, quā uocat Agrielē. Celebrat & cognominata Strepte, ab intorta specie. Sed ea loci nōmē ē, circa Epidaurū, adiecta fabula, euenisse ita ei circū actū manus, Hercule illac meante. Nā & clauā eius ex oleastro uolūt reuerso ex Hypboreis fuisse, ignoto prius græci: quæ mox spōte refluuit apud Troezenios, aut certe ad Alpheū amnē: si Pausaniæ credendū est, hōi qdē satis docto, sed supersticioso, diui Adriani & Antonini, utri usq; tēpibus. In eadē gēte Streptos, Rhachos uocāt, locū oleastris frequentē, uersus mare: q; eorum consuetudine, quicquid ex olea relinquitur inutile, Rhachos appellabatur. In Arcadia spectari solitam, Pausanias affirmat arborem, e cuius radice una, Ilex & Olea nasceretur in

quodam fano. Syraculis, ut Diodorus auctor est, in frondibus olearum scriptis optimatum nominibus, discessione facta, irrogabatur quinquennale ciuibus exilium; de quo argumento, genus id multæ, Petalifmus appellabatur, ut Athenis Ostracifmus.

E X M. V E R G. C O M M.
F Vituniuersæ Græciæ quondam in maiore honore Oleaster quam Olea. Hanc ipsam arborē Cotinon Dioscorides uocari ait, communi & recepto ab omnibus græcis nomine. Oleaster enim græci Cotini appellatiōis intelligunt, & ex similitudine æthiopica Oleam, quæ propriæ generis in ea regione arbor, nullum inuenit ob similitudinem aptius cui compararetur, in Græcia nomen & genus. Maro noster folijs amaris Oleastrum esse dixit. Nec falso, si sensui & uiribus ejus in medicina credendum sit.

De Colymbadibus Oliu. CAP. CXL.
Colymbades trita, & ambustis illita, pustulas gigni prohibent. Sordida ulcera purgant. Muriæ succus collutas gingiuas contrahit. Et motus dentium firmat. Oliua flaua & recens, stomacho utilior est, uentri difficilis. Nigra autem & matura, corruptioni oportuna est, stomacho aduersatur. Oculis non conuenit. Capitis dolorem mouet. Arefacta illitu depascentia ulcera fistit. Et carbunculos emarginat.

BARBARI COROLL.
Oliuæ, Colymbades ideo uocantur, quoniam oleo suo puræ, hoc est, sine accersita cōmendatione innatant, & quasi urinabundæ fluitant. Halmades autem dicuntur, quæ muriæ feruntur, etiam si quidam Græci confundere nomina. Sunt & Netrides appellatæ, quia natent, apud tullum Pollucem. Idem auctor & Cotinadas nominat, quas & Phaulias, & Trambelos dici tradit, Medicinæ, quæ a Dioscoride subruissis redduntur, tribuat candidis a Plinio uidentur. Castigandi sunt in auctoribus loci, Columbares, pro eo, quod Colymbades, imperitia liberiorum scribentes. Genus alterum oliuæ cibariæ, Græci Thlastas, & Pyrenas, & Pityrum, siue Pityridas, hoc est, nucleos, & fursuraceas appellant. In hunc usum stringuntur ante quæ prematuræ sint. Epityra falso dicta, cum sit Epityrum, ut Varro inquit, siculum edulium: de quo dictum est alibi plenissime.

Vit quondam multiplex Oliuarum conditura, accersitaque aliorum saporum cōmendatione placebat, quod aliqui ingrati habuissent in cibis usum. Inter eas Colymbades a Græcis dictæ fuerunt, quæ cōmuniore & certiore uocabulo Halmades iridem dicebantur. Hæ nomen a sale inuenerant, Hal- enim Græci, sale dicunt. Illæ ab eo, quod in conditura sua natarent sic appellatæ fuerunt: *κολυμβαν* enim urinare est. Dico autem urinare, in natando sub aqua esse. Si quis rem uelit exactius nosse, facile illi erit ex Plinio lib. 15. cap. 3. Palladio lib. 13. cap. 20. Columella, præterea lib. 13. cap. 47. infinitas pene Oliuarum discere condituras.

De Oleo syluestris Oliuæ. CAP. CXLII.
Oleum syluestris oliuæ humidis gingiuarum uitij colluitur. Dentium mobilitates stabilis. Calfacti fatus, gingiuis fluctatione laborantibus utilis est. Lanam enim specillo circumligatam oleo madefacere oportet, & gingiuis admouere, donec albæ spectentur.

BARBARI COROLL.
De oleo syluestris oleæ dictum est superius.

E X M. V E R G. C O M M.
Paulus affirmat spissandi simul & adstringendi uim habere, aridiusque & squallidius omni alio oleo esse. Locus est eo capite, in quo de erosionibus gingiuarum, earumque excrescentijs & pladis agit. Sic enim ille uocat, quæ hic *ὄλα πλάσντα* dicit. Quod uitium facile, & quale sit intelligitur, si nouerimus quid in alijs *πλάσντον* græcis significet, non humens simpliciter, sed quod cum humore flaccidit: quale erit, quod natura sua durans rigensque admissio humore laxuit, & paulominus quam dilabitur, oportetque in *τὸ πλάσντον* duo hæc intelligere, humorem, & ex humore infirmitatem, idque est, quod hic ait, gingiuas *πλάσντον*, & nos uertimus flaccidas, & cum infirmitate humentes.

C De Lachryma Aethiopicæ Oleæ. CAP. CXLIII.

Αδρυον τὸ αἰ-
θιοπικὸν ὀλίαν

Lachryma, quam Aethiopica Olea stillat, Scamoniæ similis est, fulua, stillis exilibus constans, mordax. Quæ autem ammoniaci, aut gummi similitudinem refert, colore nigricans, nec gustu mordens, superuacua est. Nostrates Oleæ, Oleastricq; similem lachrymam sudant, quæ cōmode ad oculorum habetudines illinitur. Cicatrices, albuginesq; illitu emendat. Vrinam & menses ciet. Causis dentium impressa, ad dolores efficax est. Inter uenena scribitur. Partus pellit. Lepras & impetiginis sanat. Appellatur autem Aethiopica & agrestis Olea.

B A R B A R I C O R O L L.

Oleæ Aethiopicæ lachryma in precio est. Sit hæc Arabica, quæ & ipsa doratur lachryma, nondum constat mihi. Quancq; puto eandem esse, quoniā in Arabici sinus desertis, tribus insulis, ut inquit Strabo, nascitur. Vt cumq; in Arabia stillat eam olea, qua medicamentū conficitur, Enhæmon appellatū, singulari effectū contrahendis uulnerum cicatricibus. Sunt qui hoc esse putent gummi genus, illud quod recentiores Elemi, quasi Enhæmi appellant, ad ossa etiā fracta caluæ conglutinanda cantatissimum. Porro uerbum Enhæmon, non huic modo rationi conuenit, sed emplastris omnibus, quæ cruentis protinus injiciuntur uulneribus, ad reprimendas inflammationes, & inhibendum sanguinem: quod genus & Alipenon, & Catagmaticon, & Collecticon uocatur. quoniā medicamentis minime pinguibus constat. Oleæ autē hæc in Arabia nascuntur, in maritimis, & fluctibus, æstuq; operiuntur rubro mari, ut in olea demonstratum est. Nec bæcæ nocetur, cum constet & in solis salem relinquī. Oleastrum quoq; ipm, ueteres Oleam uocabant Aethiopicam, testis est Dioscorides.

E X M. V E R G. C O M M.

EX Aethiopia usq; ut Comicus ait, Aethiopicæ oleæ lachryma quondam Græciæ importabatur. Neq; a nobis igitur desyderabit quispiam, quæ in tam longinquo, & inaccesso orbe nascencia cognosci ætate nostra non possunt.

D

Αἰν

C De Quercu.

CAP. CXLIIII.

Omnis Quercus adstrictoriam uim habet, præsertim liber, qui cortici, & ligno intercedit. Quinetiā tunica putamini glâdis subiecta. Decoctū ex ijs datur dysentericis, cæliacis, sanguinē excreantibus. Trita in pello, fœminis fluctione uulua laborantibus subiicitur.

B A R B A R I C O R O L L.

De glâdiferis
arboribus &
glandibus, &
gallis, uide Plin-
ium lib. 16.
ca. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Plinius glandiferas arbores, una uoce comprehendī posse negat latino sermone, quemadmodum græco potest Αἰνός, & antiqua uoce Saronos, a qua Saroniacus sinus, & Saron, in Arcadia nemus, trans Ladonem fluuium. Quibusdam, ut Theodoro gazæ, Roboris appellacione cōtineri posse omnia ea genera uidentur. Sane Græci Dryos uocabulo, etiā omne lignum significant. Vnde Gerandryon, pro ueteri & ambusta quacūq; arbore accipitur, quasi uetus ramale, Persius. Ergo roboris quaterna genera, Quercus, Robur, Aesculus, Cerrus: quæ Græcis illis respondent: Hemeridi, Aegylopi, Haliphloe, Platyphyllo; ut sit quercus Hemeris, Platyphyllos Aesculus, Aegylops Cerrus. Sed nunquid Haliphloeos robur significet, non habeo compertū. Theophrastus certe Agriamdryn appellat, quā nostri robur interpretantur, ut in Galla disseruimus. Nec minor hic, q̄ in pinu difficultas, quæ quibus græcis latina congruāt. Nos utroq; loco tantū laborauimus, quātū uix ipsi qui p̄didere. Quidā quatuor su prædictis duas addidere spēs, Phagū, & Illicē. Sed toto gñe distāt, ut cognatæ potius, q̄ congeneres hñdæ sint. Hemeris, sane Homero, non quercū, sed uitē significat, ut Photion testatū esse uoluit. Sibari, qui nūc Sibari thurū dicunt, quercus fuisse tradit, in oppidi cōspectu, fronde perpetua, Varrōis & Theophrasti testimonio, q̄ nec germinare cū alijs, sed ab ortu caniculæ solita sit. Rarū est, qn fata quercus deterior eueniat. Dulcissima glās Hemeridi post Phagū. In orbem hæc comat, torqueturq; in alas, crebro ramorum sinu caua, mareries ualida, Macedones, quæ glandem dulcem perducāt, ἱτυμίδιον, hoc est, quasi uerū quercum appellant. Nasci Quer-

cus in rubro mari glandiferas tradit. Nasci & in nostro, propiores terræ, super lapides atq; te-
stas, sine radicibus, sed parellarū modo adhærescentes, folio carnosio, crasso, atq; oblongo, my-
rica simili, accedētis ad purpurā coloris. Magnitudo arboris tota, paulo amplior sesquipede.
Hac tingi mulieribus lanas. Ramis earū adhærent cōnchæ quædam, & caulibus parte ima, ubi
& bestiolæ populantur. Naufragis & urinātib; comperta hæc. In Lusitania profundo mari
Quercus glandiferas innasci, unde Thūni uescātur, auctor est Polybius. Ob id Thūnos, qui di-
cat marinos esse porcos, minime discesserit à uero: ut inquit Athenæus. Carinas nauibus quer-
nas subijci præcipiūt, maxime triremibus. Abieti, aut pino larici uocatæ, ferruminari quercus
nō potest. Infociabili natura, q̃ hæc spissa corpore sit, illæ textu raro. In septentrione haud pcul
Caucis, circa duos p̃cipue lacus, littora ipsa obtinēt quercus, tāta magnitudine, ut suffossæ flu-
ētibus, aut flatibus propulsæ, uastitas cōplexu radicū insulas afferat. Itaq; libramēto eo stantes,
nauigāt. Ramorum ingentiū armamētis sæpe territa Romanorū classe, noctu & prælio contra
arborea quoq; inito. De Herciniæ syluæ miraculis, nihil attinet dicere, nisi q̃ magnitudine infi-
gni robora ibi crescere concupiūt. E glandiferis ciuicas coronas necti mos erat: quæ omnibus
anteferrentur. Ciuica iligna primo fuit. Postea placuit ex æsculo Ioui sacra. Variatūq; & hoc
cum quercu est, ac data quæ ubiq; fuerat. Non puto prætereundū Alexandri Macedonis inuē-
tū, seruandæ niuis, in scrobes ubi ea sit, coniectis e quercu ramis. Saronicus in Peloponeso, Plī-
nius inquit, sinus est, olim quernio nemore redimitus: unde ei nomē, ita Græcia antiqua appel-
lante quercū. Pausanias ab Sarone, qui post Althipū regnauit, sinū eūm dici uoluit.

EX M. VERG. COMM.

Coniunximus, unoq; eodē clausimus capite, quæ natura primū in eodem genere, mox
in historia hic scriptor, postremo meliores græcorū codices coniuncta esse uoluerunt.

Emēdauius præterea, addidimusq; pauciora quædam, quæ græca cum nostris conferen-
tibus nouisse facile erit, præsertim in communi & nota omnibus re. Nullibi enim non nascitur
Quercus aliqua, Fagus, Ilex, Castaneaq; quam hic Sardoniam glandem, a Sardibus appellat:
quemadmodū a Castano Magnesiæ oppido, uel ut Stephanus docuit, in Apulia non procul
a Tarētō, Castaneam Latini & Græci appellauerunt, glandiū generi ab hoc scriptore, & ab alijs
adsignatā, & Iouis glandē dictam. Et si posteriores regijs nucibus eum honore tribuerint.

Eandem legimus in ueterum Græcorum lexicis Lopimam, & Euboicam dictam fuisse;
hanc a regione, illam a cortice, quod λινος Græci dicunt, & λινον decorticare.

Laudauit contra uenena quædam præcipue Nicander, Castaneam, Nucemq; ut postea
Maro fecit, appellauit. Versiculus eius est. κατανύ καρύν παχυφύλλοιο κάλυμμα. Et populo post,
Μελιπύλος καρύν το κατανύ τριφύλον έλα. Quod non parū miretur aliquis, cum manifeste inter glan-
des, potius q̃ inter nuces, Castanea numeranda sit. Magnis autoribus defendi utrunq; potest,
nec nos aliud in ea re monemus, quam fuisse quondam in ea glandis & nucis nomen, latiusq;
glandis, quam nucis claruisse.

De Glandē.

CAP. CXLV.

Glandes eodē effectus exhibent. Vrinam ciunt. Capitis dolo-
rem, & flatus in cibum sumptæ pariunt. Resistant esitatae uene-
natorum ictibus. Decoctum corticis, cum lacte uaccino potum, proudest
contra toxica. Intrita crudæ, inflammationes illitu leniunt. Ad duricias,
quas cacoethæ uocant, & malefica ulcera cum salsa axungia conueniunt.
Iligneæ glandes uiribus quernas præstant.

BARBARI COROLL.

GLans græce βάλανος, ut Varroni placet. Præfertur omnibus Hiberica, fago dulcissima.
post Hemeridi. Tum Platyphylo, deinde Haliphloeō. πλατύφυλλος, hoc est, latifolia, post cer-
rum excelssissima & rectissima. Sed post haliphloeon, usu ædificiorū deterrima, nec utilis car-
bone. Macedones latifoliam intelligunt amaræ glandis: quam Aesculum quidā interpretan-
tur. Aesculū porro ab esu dictā miremur, cum diphthongum æ requirat. In qua uermiculi na-
scentes, priuatim albæ nominantur. Ab æsculo æsculetum, ut a quercu querquetū. Vtrunq;
locus Romæ fuit. Vnde Querquetulana quoq; porta, q̃ a uiminali, & cauilaria nō discrepat.
Etia si ab auib; Querquedulis, quas M. Varro & Columella, Cercidas uocari græce dicitur,

D I O S C O R I D I S

C uideri potest appellata. Haliphloeos falsicortex a Theodoro dicta. Potest & recticortex, quia nonnulli apud Græcos, euthyphloeon eā uocent. Crassissimus huic codex, & plerūq; fungosus & cauus. Pessima carboni, & materię. Nec putrescit alia etiā cum uiuit. Quin & fulmine igitur sēpissime, tametsi altitudine nō excellat. Ideo lignū eius, ne ad sacrificia quidē uri fas erat apud Aeoles. Sphagnon, siue Splachnon, siue Phascon appellant, itemq; Bryon, pannū quendam mucosum, pendente ex ea quasi uillos, ut in Cerro, sed nigriorē breuioremq;. Vtūtur arbore Macedones, ad axes, & id genus utensilia. Glans eius rara & ingustabilis animalibus, præterq; suillo generi, ut Plinius existimat, ac ne sui quidē, si pabulū aliud habuerit. Quod quidē Theophrastus Aspridi, hoc est, Macedonicæ cerro tribuit. Est autē Aspris, rara & improba glande sterilis, quæ caput tentet mandentiu, ut iligna. Cerrus, ἀγίλωι a Græcis uocat, glande omnium amarissima. Rarissime nascitur in cultis. Pannū quem dixi phascon, longitudine cubitali, brachiarū similitudine, mucosum, uillosumq; ferens. Nascitur e cortice, non e furculo, unde glās. nec ex gēma, sed e supernis nodorū si a latere. Lignum rectissimū, excellissimum, leuissimum, per longitudinemq; robustissimū. Aedificijs ineptū aspridis, si dedoletur. Ideoq; rudi duntaxat utuntur. Damnatum & carbone, quoniā exiliat, scintillasq; edat. Aerariorum tantū officii nis compendiu; quia flatu desinente, protinus emoriens, sæpenumero uratur.

De Fago & Illice.

CAP. CXLVI.

φκγδς κχθ πρίνεδ

F agus & Ilex, quercus generi assignantur, & consimile munus ob eunt. Lignæ radice cortex cum aqua coctus, dum eliquefcat, & tota nocte illitus, denigrat capillos, prius cimolia terra purgatos. Folia oīum tusa et trita, tumoribus p̄sunt. Et imbecillas mēbrorū partes corroborat.

B A R B A R I C O R O L L.

Plini. lib. 16.
cap. 6. tit. 19.
lib. 24. cap. 5.
Theophrast.
lib. 3. cap. 9.

D

F agus ea, ut quidam scripserunt, quæ in tenuissimas secatur laminas, glandifera non est. Ideoq; duo genera, siue nomina Fagi sunt glandem ferentis. Materie scabra, quam Græci φκγδς appellant, ut fructū quoq; Hippocrates. Et alterius quam Græci Oxyam, Lydi, Myson, Olym- po eorum monte copiosam. Vnde Mysi populi, ut Strabo inquit, & Eustathius. Nostri Scissimam appellant, scissilem in laminas, similemq; abiecti. Syluestrem, nunq; ut Macedones arbitrantur, florentem, erectam, leuem, enodem, ligno colorato, robusto, nervoso, folio crasso, bifido, longiore q; piri, extremitate aculeato, radicibus nec multis, nec altis. Fructus glandis effigie leuis. Includit cauliculo echinato quidē, sed blādo, nec hispido, ut in castanea, cui tñ similis est dulcedine ac succo. Nascitur eadē candida, sed in montibus. Vtilis ad carpenta, lectos, sub sellia, mensas, nauigia. Campestris nigra, & ad hęc minus petita. Fructus utriq; similis. In aqua durat æuis, ut robur, atq; ita firmior quoq; redditur. Humidissima hæc, & fraxinus. Quāobrem e duabus his lectuli, qui fierent, incuruant cedentes ponderi. Minoribus Scissima nauibus cōmenda ad carinas. Itē ad testudinem plaustrorū quoq; uectabulorūq; uilem fabricā, specie uisenda prouenire in agro latino solita, auctor est Theophrastus, tanta longitudine, ut nauibus Ethruscis, pro carina satiffaceret. Sunt qui Oxyam interpretant Ornū. Ilex uero, Prinos græce dicta, post occasum uergiliarū fructificat, & anno proficit, ut putat Arcades. Simul em̄ antecedente fructum, nouus occupat, proptereaq; a nonnullis inter biseras descripta. Simul em̄ anteplex, & ut syluestri altissima, folio roboris minore, aculeato, leuiore cortice. Arbor de amplissimis, ut robur, materie spissa & robusta, sed quæ frangat ac dissiliat sponte sua. Ob id Pericles Beocios Ilicibus dixit esse similes, ut est apud Aristotelē, qm̄ ipsi se conficerēt intestinis discordijs. Glās exigua, & pter glandē puniceum granū sunt hæc. Hyphear, & uiscū in ramis, ut alie na sustinet, a septētrione uiscū, a meridie hyphear. Hanc & Aquifoliā, uel Aquifoliū uocari putro, siue paulo ab ea differentē. Theodorus Aquifoliā appellat, quā Theophrastus Ariā, siue Agriā, siue Narycan syluestre, & cui folia nunq; decidat. Ita em̄ Dore uocat, ingt, quā Arcades Phellodryn, sempiternæ frondis arborē, mediāq; inter Robur & Ilicē. Sunt qui Phellodryn aliud negent esse q; Ilicem fœminā: ut Ilex ubi delit, utant hac in carpentarijs præcipue fabricis, quod & Lacedæmone faciūt & Elide. Lignū intusq; Ilici candidius, sed fuluius q; robori. Materia quoq; durior, sed q; Ilici solutior in opere: foliū simile, sed iligno maius, & querno minus. Speciosior medulla q; Ilicis: fructus minimis glandibus. Aequalis Acylon uocatur, quēadmodum & iligneus. Nam Balanos, siue glans robori propria tribuit. Acylon certe Lydi genitale ipm̄ uocant: quēadmodū & Balanos, pro glande Colis dicitur: Plinius contra q; Theophrastus, Phellodryn uidetur eadē existimasse cum subere, quod & Phellos dicatur, in fœminarū

calciatus utilem hyberno tempore, ob id mulieres, facete a græcis, arborum cortices uocari. Est autem Suber, arbor procera, line multis ramis, ligno robusto, cortice præcrasso & aspero in se-
nectute, qui ut in Picea rūpatur, sed maioribus fragmentis, folio Fraxini crassiore longioreq;
ac perpetuo. Glans Aquifolia. Corticem derahere oportet, ne deterior fiat arbor: qui trienio
post subnascti. Simulachra e Subere dijs factitata. Sed successit in eius locū palma. Hæc Theo-
phrastus. At Plinius hæc, Suber inquit est arbor, glans pessima, rara, cortex tantū in fructu præ-
crassus, ac renascēs, atq; etiam in denos pedes undiq; explanatus. Vfus eius anchoralibus ma-
xime nauū piscantiumq; tragulis, & cadorū obturamentis. Familiaris hæc arbor Theophrasti
temporibus Pyrenicæ. Nec in Italia tota nascitur, aut in Gallia omnino. Sed & illinc nascitur
confusio, q̃ Smilacē uocari legimus, quē dicatur Ilex in Italia, & in prouincijs Aquifolia: cum
Smilacem Sestius eadē esse eum Taxo prodiderit. Recentiores sunt qui Smilacem cum Phel-
lodrye faciunt eandem; haud ferendo errore: etiam si Smilax Ilici describitur a Theophrasto si-
milis. Dictū est de Aquifolia & in Cræcogono. Vt cumq; sit, Ilicis inquit Plinius, duo genera
ex ijs in Italia folio non multū ab oleis distantes, a quibusdam græcis Smilaces dicūtur, in pro-
uincijs Aquifolia: masculas Ilices negāt ferre. Ilici honos, ad axes in plaustris simplicibus, hoc
est, monostrophis. Item ad iuga lyrarum, psalteriorumq;. Igniaria quoq;. Ciuiam ex Ilice pri-
mam fuisse diximus: cui ex æsculo successerit, dicata Ioui. Lignum ex Aquifolia contractum
ac discissum, Tedæ modo uritur, & a græcis in hoc usu Garbion uocari solet. Hoc & e quercu
fit, & alio nomine Panos & Phanos appellatur, uulgo quoq;, quemadmodum e uirgineo li-
bro, factæ lampades, Lophiæ dicuntur, & ex arundinibus Elanæ.

De Castaneis.

CAP. CXLVII.

Sardianæ glandes, quas aliqui Castaneas, aut Lopima, aut Glandes
Iouis appellant, adstringunt, simileq; effectus præbent. Præfertur
tunica, quæ carnem & corticem media intercurfat, Caro his qui epheme-
rum biberunt conueniens est.

BARBARI COROLL.

Castanea, uergiliarū obitu fructificat, græce *λίος βάλανος*, hoc est, Iouis glans, uocat. Cum
ramen Iuglandis appellatio, nucibus tantū Regijs dicata sit a nostris. Nuces uocamus & Ca-
staneas, quanq; propiores glandium generi. Ideo apud Græcos appellantur balani sardianæ:
quoniam sardibus prouenire primū. Euboidas quoq; a Græcis dici, quas nos Castaneas uo-
camus, lego. Sed & Castaneas primo dictas scribit Phocion, q̃ ab oppido Magnesiæ, quod
Castanon dicitur, aduectæ sint. Vt forte Diodorus, nukes Castanaicas inde nominarit. Quid
si a castitate, cum Plinius ieiunij fere dicatas eas innuat: Ex ijs, Græci Pogonias appellāt, quæ
barbulas quasdam habent; nisi quis lanatas earum intelligat. Sunt enim aliquæ pilis hirsutæ.
Tiberius Cæsar, balanum nomen imposuit satiuis, cura multo excellentioribus. Plura earum
genera, Tarentinæ faciles, nec operoso cibo, figura planæ. Balanitides rotundiores, purgabiles
maxime, ac sponte profilientes. Salarianæ, puræ ac planæ. Nam Tarentinæ, minus ijs trastiabi-
les sunt, & Corellianæ laudatioris, & Meteranæ ex Corellianis factæ, rubenti cortice. Trian-
gulæ, & populares nigræ: quæ uocantur coctiue, minima laude, patriæ commēdatissimæ Ta-
rentum, & in Campania Neapolis. Cæteræ suum pabulo nascuntur, scrupulosæ corticis. In-
tra nucleos quoq; ruminatiore. Armatum Castaneis echinato calice munimentum, quod in-
choatum glandibus, trini quibusdam partus ex uno calice. Cortex lentus. Proxima corpori
membrana, & in ijs, & in nucibus, saporem, ni derahatur, infestat. Torrere has in cibis grati-
us. Molitura etiam præstant, ieiunio foeminarum, ut ait Plinius, quandam imaginem panis, &
ubicunq; fruges aliæ deficiunt, ut in Bergomatis, Agri montanis.

De Galla.

CAP. CXLVIII.

Galla fructus est Quercus. Aliqua Omphacitis appellatur, par-
ua quidem, sed torosa, solida, nullo foramine peruiā. Altera
plana leuis, perforata. Eligi debet Omphacitis, quæ efficacior est. V-
triusq; uis uehementer adstringere. Tritæ ex crescentia in carne, fluctio-
nes gingiuarum & uuæ, atq; oris ulcerationem cohibent. Nucleus, den-

A

σαρδιανὰ
βάλανος
λόπιμα ἢ
κάστανος
λίος βάλανος

B.

Plin. lib. 17.
cap. 20. & lib.
15. cap. 23.

ὀμφακίτις

D I O S C O R I D I S

C tium cauernis inditus dolorem sedat. Crematae carbonibus, donec igne flagrent & uino aut aceto, aut acida muria extinctae, sanguinem supprimunt. Decoctum quibus insidere expedit efficax est. Et contra uulvas procidentes, fluctionesq;. Capillos denigrant aceto, aut aqua maceratae, Dysentericis coeliacisq; cum uino aut aqua tritae, conuenienter illinuntur, aut bibuntur. Obsonijs addi debent, aut integrae in aqua praecoqui, in qua non nihil excoquendum est, quod ipsis conferat. In summa, his utendum ad adstringenda quae opus sunt.

Plini. libro 16.
capi. 7. Theophrast. lib. 3.
cap. 6. §. 9.

GALLAE, a graecis *καυδαι* dicuntur, ad coria utiles. Hemeridis, Cerri, Platyphyllisq;, hoc est, latifoliae, nullius fere usus. Quamquam similes hemeridi, tantum leuiore. Genera faciunt, medicinae utilia, solidam, perforatam, albam, nigram, maiorem, minorem. Galenus Onocidas, hoc est, quasi asininas, a rusticis uocari Gallas eas scribit: quae fungosae, flauae, atq; magne sint, minus efficaces. Vis omnium similis. Optima comagena. Nascitur autem Galla, sole de geminis exeunte, erumpens noctu super uniuersa. Crescit uno die candidior, & si excepta est aestu. arefcit protinus: neq; ad iustum modum grandescit, hoc est, ut nucleo magnitudinem fabae impleat. Nigra, eademq; resinacea, diutius uiuet, interdum mali amplitudine. Deterrima ex robore. Signum eius, qd cauernae translucent. Galla nigra, sine oleo flagrat. Robur Gallam fert minorem: & alteram, ut dixi, resinofam atq; nigram. Quae glandem ferunt, omnes & Gallae. Hemeris, id est, quercus, optimae, & corijs, ut dixi, perficiendis aptissimam. Fert & nigram, tingendis utiliore. De Robore, quae Theophrastus, agriamdryn appellat, discrepant sententiae, Alijs semine, Alijs etiam radice, quamq; sero, Alijs trunco nasci contententibus. Item alij florere eam putant, alij negant, sed muscum floris loco edi credunt. Fructificat post Autumnum, circa occidentes uergilias. Ramos habet inconditos, crassum corticem, atq; scabrum, in senecta maxime. Ac reliquae quidem arbores, ut capere, continenter germinant, solae Robur, Abies atq; Larix, germinatione terna parturiunt, corticemq; inter squamas spargunt, ac deinde rumpunt. Ob id Trislepri, siue Trilipi uocatae, ut in Pinu diximus, hoc est, intermillariae, aut trisquamis. Robori & Cachrys dicta, quam nonnulli Amentum appellant, innascitur, durans hyeme, de qua in Abiete monstrauius. Tardissime Robur caeditur, hyeme ineunte. Ante computrescit. Tempestiue caesum, durat eius spissatum, ut cornu. Non desunt tamen, qui tempestiuum putent uere, cum amentum, hoc est, cachryn suam gerit. Medullam huius inter spissa commemorant, Melandryon uocatam. Aeterna in aquis materia, sed dulcibus. Mari putrescit: contraq; magna pars arborum. Hoc tamen & mari utile. Sed nauibus & aedificijs quoq; ceteris, quae terra obruantur. Carbores e robore annofo & nouello damnant. Media aetas in precio est, quamq; utcunq; anteferantur, ex aria, arbuto, picea, praesertim metallis argenti.

D

Primus lib. 3. de plantis Theophrastus multa eius genera tradidit, quem secutus Plinius eisdem uerbis omnia latinis reddidit, Quae omnia ad duo tantum genera a Dioscoride contracta sunt. Credimusq; nos, quam hic *καυδαι* uocat, & nos articulorum in digitis magnitudine uertimus, eam esse, quam ille dixit magnitudinem fabae habere, quoniam ad iustam magnitudinem non creuisset.

Dicendum breuiter, hoc loco etiam, quam nos diminuta a columna uoce oris Columellam diximus, eam, quam graeci *καυδαι* etiam, latini uero uuam dixerunt, ea crassior facta & in flammata remedijs huiusmodi indiget.

Quam deinde nos exhalmeni diximus, Plinius aliquando, ut credimus falsum acetum dixit. Sed maluimus nunc graeca uoce uti: quoniam de ea Plinius cum de exhalme ex professo egit, usus est. Interim satis sit ex nominis compositione, quoniam aceto & muria constaret, sic graecis dictam intellexisse.

ῥῶν ἰσχυρῶν

Rhus, quae obsonijs aspergitur, ab aliquibus Erythros appellata, semen est coriarij fruticis. Ita uocari solet, quoniam coriorum in

De Rhoe.

C A P. CXLIX.

fectores ea utantur ad inspissandas pelles. Arbuscula in petris nascens, binum cubitorum altitudine, folijs oblongis, rubicantibus, in ambitu ferratis, acinio uuarum gracilium, denso, magnitudine Therebinthi, quadamtenus lato. Cuius corticosa tunica per se utilis est. Folia uim habet adstringendi, & Acaciae effectus praebent. Decoctum capillos denigrat. Dysentericis infunditur, & in potus eorum infususque adhibetur. Instillatur auribus purulentis. Gangraenas & pterygia cohibent folia ex aceto, aut melle illita. Liquefactum fit ex aridis folijs, ad crassitudinem mellis in aqua decoctis, ad eadem ut Lycium conueniens. Semine eisdem effectus exhibet. Coeliacorum, dysentericorumque obsonijs inspergitur. Fracta, desquamata, liuidaque illitum ex aqua, ab inflammatione uindicant. Linguae asperitates cum melle abstergit. Candida sceminarum profluuia sistit. Haemorrhoidas sanat, cum quærno carbone intrito admotum. Latex in quo semen maduit decoctus, cogitur, coitque, efficacior ipso semine. Gummi defert quod dentium cauis imprimitur, ad dolores finiendos.

BARBARI COROLLE.

RHUS, siue ut Hippocrates, Roon, a Theodoro, fluida uocatur. Sterilis foemina est. Mas fructificat. Virgas, ut inquit Theophrastus atque Plinius, fundit Rhus, breues & graciles, folio Vlmi, longiore paulo, subhirsutoque, disposito per uersus, ita, ut in nouellis ramorum, contrarijs in se pediculis, germina respondeant. Iis candidas pelles conficiunt. Flos in racemis albus, a quo semine collectum, lentis & errebinthi similitudine, rubescens, cum uua, quod uocatur Rhus: medicamenti necessarium, in coque osseum. Radix simplex pro summa cespitum coherens, ut facile possit uniuersa flecti. Nascitur ubique, sed argillosis potissimum, utique in Syria. quancumque habeo unde mihi hoc Rhus syriacum, siue ut Columella & Palladius appellant Ros Syriacus, parum distare uideatur ab hoc nostrate, qui frutex coriarius, & rhus erythros, a colore subrutilo uocatur, Dioscoridi & Plinio: quem Columella rorem futorium semel dixerit, quoniam Rhus scyrodepiscos & brisodepiscos dicitur, cuius aridis folijs pelles, ut malicorio perficiantur, crassitudine digitali, altitudine bicubitali. Quancumque Plinius, nisi librariorum ea sit incuria, cubitali, prodidit. Duo faciunt omnino graeci genera. Magiricon, quod additur in obsonia, idest, cum Syriaco, ut opinor. Alterum quod *βυροδυσκινόν*, idest, excoriarium. quandoquidem utrumque in pastillum, ex carnibus ceruinis compositum, & in pantolmium quoque dictum requirunt, diuersis ponderibus; contra dysentericos & cruenta reiicientes. Habetur & syluestris herba, folijs myrti, colliculis breuibus: quae tincas & uenena pellit, Rhus uocata, porro specie, quam Theophrastus supra reddidit. Contemplati sumus Rhum ex Umbria perlatum.

EX M. VERG. COMM.

Fuit quondam huic frutici in Graecia duplex honor, & quod coquinae, conficiendisque pellibus inserviret. Duplex etiam nominis indicatio. Latini, qui sale potius in obsonijs quam semine eius uti uoluerunt, ab altera utilitate nomen illi tantum fecerunt, futorium Rhum dicentes.

Posterior medicina, quae barbaris uocibus plerumque utitur, Sumach appellat, quae uox contrarijs communis etiam in aliquibus locis est, non aliunde, ut credimus, quam quia folijs fruticis huius confecta fuerint, uocantque ea passim coriario rum officinae Sumachi. Theophrastus in fruticoso genere, et a spina alba paliuroque & rubo statim eam descripsit.

De Palma. CAP. CL

PALMA in Aegypto gignitur. Ea medio autumnus uigore decerpitur, pi solet, arabici Myrobalani similis, Pomatis cognominis, colore uiridi, & odore mali cotonei: quod si ematurescens sole percoquatur, Phoenicobalanus fiet. Palma acerbata est, & adstringens. Contra alui foeminarumque profluuia, in uino austero bibitur. Haemorrhoidas sistit. Vulnere-

A

Theoph. li. 3.
Col. li. 10. ca.
13. Pl. li. 13.
ca. 6. li. 24. ca.
pire. 11.

B

ῥοίνις πῶμα
ῥοίνικαβάλανος.

D I O S C O R I D I S

C glutinat illitu. Phoenico balani plus siccis adstringunt. Capitis dolorem afferunt. Copiosiores in cibo inebriant. Sicciores sanguinem excreantibus, stomachicis, & dysentericis utiles in cibo. Illinuntur cum cotoneo & cærato cenanthino uesciæ uitijis. Carioræ præsertim faucium asperitati essu medentur.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 22. ca. 5.
Lib. 13. cap. 4.
Theoph. li. 1.
ca. 2. li. 3. ca. 5.

Palmæ teneritas, processu lignescit. Vita in sicco æque ut in humore. Sabulosis falsisque gaudet, adeo ut in Syria Cœle, tribus dumtaxat locis, ubi arenæ sint, pueniat. Alibi computrescit, etiam si recentes earum palmulæ suaves gustu sint, nouellæ fructu nullo intus ligno edunt postea cum ligno. Paucos fere Palma ramos habet, scabro cortice, præcipue cum senescit. Medulla omnino nulla. Mari tantum flores, feminis statim fructus. E semine suo nascitur, ut coniferæ omnes, præterquam Babylone, ubi & uirga feritur. Tanto ibi unius eius usu, ut extare carmina scribant, quæ utilitates ex ipsa numero dierum anni pares esse prædicant. Simulacra ex hac fieri solita ueteribus, sed prius tamen e subere, ut diximus aliubi. Palma uictoriæ symbolum est, quod ut Aristoteles & Plutarchus inquirunt, non cedit oneri quolibet ingenti. Nec intra flectit panditur, sed cõtra pòdus resurgit. Ideoque in coronarijs certaminibus fere aliud præmium quam Palma non dabatur, ut inquit Pausanias. Etiam si Græcia quatuor tantum locis, oleastro, pinu, lauro, & apio coronare uictores mallet. Palma fumo infestat cremata, de quo & Cheremonis poetæ uersum Theophrastus prætexuit. Parit arborum sola fructum ceu in spica: quod ei siccitatis causa, & proprietate quadam naturæ contingit. Fit & in alto Palma, fructum generis, fronde corrossa, breui caudice, uirgis rectis: parte ima non in orbem, sed in latitudinem sigillatim ambientibus, cõtinenti serie aliquā tñ interrupta. Color toti plantæ puniceus. Surculis eius natura foliorum acanthinorum, qualia soncus, & cetera id genus. Sed recti tñ sunt hi, nõ ut illis recurui. Palma porro ægyptia, quam Dioscorides hic describit, Myrobalanon appellatā fert, nullo intus ligno: quæ & Adipfos, & Poma nominat. Phœnicobalanus niger est, quia maturefcere permittitur Myrobalanus uiridis. Habetur & Myrobalanus unguentaria cognominata, sed generis alterius, suo loco indicanda. Quid autem sit Chrysobalanus apud Asclepiadem, ad ardores stomachi singultusque adhibita, non comperi. Aegyptia uero, ut Solinus inquit, sitim sedat, utique ante maturitatē decerpta. Matura sensum, gressum, linguam retardat & inebriat, Phœnix appellatæ græce Palma, unde fructus dependent Spathæ. Palmulas e mari Plenes, e femina Balanos appellat, ut Iulius Pollux tradit: qui sumpsit ab Herodoto. Est & Phœnix herba, ut post Deliaea palma cubiti eius facti fuerint. Ipsos palmarum cum fructu termites, Baia & Spadices græci, præsertim Dorici, appellat: a quo & color equo generi, spadix, aut spadiceus & phœniceus, hoc est, palmeus: unde uulgo quoque Baius, alioque Phœniceus, proprie is est, qui uermiculus et puniceus uocatur, ab Eusebio siue Hieronymo in chronicis: nomen hæc a Phœnice illo, qui literas inuenerit. Reperio & Parium & Balium colores equis attributos. Sed pro uario apud Euripidem, est Balus. Scio & Achillis equum Baliam uocatum, & equos Balias, pro celeribus quoque acceptos a Poetis. Nam murinus color, a mure dictus in equino genere, is est quem græci psaron, quasi a sturno appellat. Cerebrum palmæ Galenus Encephalō, Dioscorides Encardiō, hoc est, medullam uocant, quod & esculentum est. Palmarum plantam Cephalonem uocari, Palladius autor est.

Lib. 13. cap. 4.

P A L M V L A E Caryotæ, celebrantur cibo. Sed & succus earum uberrimus est, ex quibus præcipua Orienti uina, capiti iniqua, unde Pomo nomen. Ex his & acetum & mella fiunt, & farina Babylone. Nuclei pro carbone sunt. Et pabulo quoque iumentorum aqua macerati. Laudatissimæ in Iudæa: nec tota, sed Iericunte maxime. Quanquam & Archelaidæ in precio & Phaselidæ, & Lybiadæ, gentis eiusdem conuallibus. Dos his præcipua, succo pingui lactentibus: quodamque uini gustu, in melle prædulcibus. Tria Caryotidum, siue Caryotarum genera. Nicolai, sicciores, amplitudinis uasæ, ut quæ cubitorum quaternum longitudinem compleant: ab Augusto ita primo nominatæ, in honorem Nicolai peripatetici Philosophi, crebro eas ad se militantis, ut inquit Arhængus. Alterum genus minus speciosæ, sed sapore Caryotarum proximo sorores, unde nomen. Tertium genus nimio liquore madidum, rumpente se pomo in parente ipsa quoque calcato simile, ob id Pateton appellatum. Aristoteles in libro de stirpibus, Eunuchos appellari scribit, quoddam genus Palmulæ, quod alij Enorchos uocent, quasi testiculares ac spadonias.

EX M. VERG. COMM.

E *ἢ ἀφελθὼν πιπαινόμενος*. &c. nullo sensu, si sic legatur apparebit. Neq; em̄ de coctura Palmę hoc loco agitur, sed quod Plinius uertit, Quod relinquitur Phœnicobalanus uocatur: ideo q; nos diximus, eadē si usq; ad maturitatem in arbore relicta fuerit, mutato colore & nomine Phœnicobalanus dicit̄, &c. quasi non *ἀφελθὼν*, sed *ἀφελθὼν* legendum sit. sensus enim est, Aegyptiā palmulam ante totam maturitatem lectā, uiridi colore esse, & appellari *πῶμα*. Si uero in arbore relicta, penitus maturuerit, tunc mutato colore Phœnicobalanum, idest, puniceam palmulam dici, monet res ipsa: quia nullus erat sensus, si *ἀφελθὼν*, idest, decocta fuerit, legeretur.

De Thebaicis Palmis.

CAP. CLI

T Hebaicarum decoctum potu, aestuationem sedat. Vires recreat cum hydromelite ueteri sumptum. Cibo idem faciunt. Fit ex eis uinum ad eadem conueniēs. Decoctum potu & gargarisatione magno pere adstringit, & cohibet. Nuclei Palmarum cæterorum more cremati in crudo fictili, et uino restincti, cinere loto, spodij uicem efficiunt. Misceturq; in calliblephara. Quod si non iustam uestionem accæperint, denuo cremandi. Vim adstringendi habent, & spiracula cutis obstruunt. Contra oculorum uuam, & pustulas, palpebrarum defluuia, cum Nardo effectum præbent. Corporis excrescentias reprimunt. Vlcera ad cicatricem perducunt. Sed inter primas utiles ex Palmis humilibus ægyptiæ.

BARBARI COROLL.

P Almulæ thebaides, in totum arentes sunt, quemadmodum & arabicę, macro corpore, exiles & torridę, crusta obductę uerius q; cute, iudaicis, ut inquit Strabo, suauiores, etiam si dures, nec alio tractu Aegypto tota nobiles. In ipsa quidem Aethiopia friatur hæc, tanta est siccitas, & farinę modo spissatur in panem. Gignitur autem in frutice, ramis cubitalibus, folio latiore, pomō rotundo, sed maiore q; mali amplitudine, Cyces uocant. Triennio maturescunt. Semperq; frutici pomum adest, subnascente alio. Hanc palmam Chamezelon uocatam a Dioscoride, quam nos pumilam interpretati sumus. Aliud ab ea genus est, quam Theophrastus Chæriphem appellat, hoc est, abiectam & repentem humi palmam, folio latiore atq; molli, ad uicilia utilissimo, de qua in Taxo dictum est, copiosam in Creta, sed magis in Sicilia. Thebaidis fructus extemplo in cados conditur: ni ita fiat exanimatur, marcescitq; non retrostus fur-nis. Ebenus Aethiopica palmarum generibus fere ascribitur, ut diximus. Sylvestris Palmę fructus existimantur a recentioribus, quos officinæ Tamārindos modo nominant: & qdam a fa-poris acrimonia, Oxyphœnicas, argenti naturę contra bilem flauam pollentis. Sunt qui folia ei salicis describant similia. Non inuenio e ueteribus, qui de hoc genere quicq; prodiderit.

Pli. li. ij. ca. 4.

B

De Palma Elate.

CAP. CLII.

P Alma, quam aliqui Elaten, aut Sparham appellant, fructus Palmarum adhuc florentium, tegumētum est, calyxq; quo in spissamenta unguentarij utuntur. Optima habetur odorata, adstringens, grauis, præclusa, intus pinguis. Vis ei adstrictoria. Sistit ulcera quæ depascunt. Laxatos artus committit. Trita miscetur cataplasmatibus & malagma-tis. Prodest præcordijs, imbecilli stomacho, & iocineri affecto, mista cōferentibus cataplasmatibus. Eius decoctum subinde detersum, capillos denigrat. Datur bibendum congrue renum uesicę, & uiscerum uitij. Vuluæ ac uentris fluctiones sistit. Scabiem cum resina & cæra sanat, si uiginti diebus recens apponatur. Fructus quem suo amplexu fouet, Elate etiam uocari solet, & ab aliquibus Borassus. Adstringit, & Spathæ effectus præ-

Pli. li. ij. ca. 4.

B

D I O S C O R I D I S

C stat, non sic unguentis expetitus. Alba medulla caudicis recens in cibo, aut decocta eadem facit.

Pli. li. 12. ca. 28

B A R B A R I C O R O L L.

PALMA Elate laudatur, Hammoniaca maxime. Tum Aegyptia, demum Syriaca, dumtaxat in locis siccentibus, odorata, pingui lachryma: quæ in unguenta additur. Elatem, Galenus tenellum palmæ germen intelligit. Dioscorides ipsum fructus integumentum. Alibi genus est, ut in unguento Elatino diximus. Non ignorauit hoc Secundus noster, cum inquit, palmam Elatem conferre medicinæ, germina, folia, corticem. Cato Palmam hanc intelligere mihi uisus est, cum dixit, odoratum uinum fieri e Palma: quam habent Vnguentarij. Abies ergo duplex est. Vnguentaria, & materiaria, uulgo nota: unde abiegnæ trabes dicuntur, & Abietarij negociatores, atq; fabri, pro eo qd est lignarij. Abies quia in cœlum abeat, a proceritate uidetur appellata.

V E X M. V E R G. C O M M.

Videtur Plinius lib. 23. cap. 6. Elatem, siue Spathem hanc, de qua Dioscorides hoc loco ait, in censu, & historia Palmarum, proprium habere genus credidisse, quæ medicinæ conferret, germina, folia, & corticem: cum tamen ceteri omnes non palmam, sed palmæ partem indicent, & multifariam appellent. Verum de hoc alias.

De Malo punico. C A P. CLIII

Malum punicum omne boni succi est, stomacho utile, nullum sufficiens alimentum. Dulcia stomacho utiliora habentur. Sed aliquantulum in eo calorem gignunt. Inflationes pariunt. Vnde in febri abdicanitur. Acida adstringunt. Aestuantis stomacho auxiliantur. Et multo magis contrahunt, ac urinam cient. Ora, gingiuasq; lædunt. Vinosa uero mediam sortiuntur naturam. Nuclei acinorum acidi punici in sole ficcati, & obsonijs insparsi, concoctiue, fluentem aluum stomachumq; sistunt. Cœlesti aqua madescunt, bibunturq; comode sanguinem excreantibus. Ad defensus dysentericorum, foeminarumq; fluctione uulug laborantium utiles sunt. Expressus nuclei succus coquitur cum melle ad oris, uirilitalis, & sedis ulcera, nomas, reduuias, & ea quæ in corpore exuberant, aurium dolores, & narium uitia, præsertim acidi.

Pli. li. 12. ca. 19.
lib. 17. cap. 17.

B A R B A R I C O R O L L.

PVNICA, contorto & breui trunco, flore contra qd reliquis arborum puniceo. Excipiunt amygdalarum quoddam genus, quæ subrubicundum florem sustineat. De acidæ planta uel semine, uinolenta dulcisq; in Aegypto exit in Cilicia, circa Solos, ad Pinarum amnem, ubi contra Darium pugnatum est, ut Theophrastus inquit. Omnes sine nucleo proueniunt. Sola hæc, & Vitis, & Ficus, & Malus, caudice fisso non emoritur. Aculeos gerit in ramis, ut Paliurus & Rubi. Punicum malum Chartagine laudatissimum, indeq; cognomen, Malum punicum. Et Romæ locus erat in regione sexta, ut inquit Suetonius, quæ alta quoq; semita dicebatur, ut est apud Martialem poetam, ubi hunc uidelicet Dioclitiani thermæ sunt. Genera summa duo: Alteri nucleus adest lignosus, Sclerococcon ob id uocatum. Alteri non adest, aut certe minimus, quod ex argumento Apyrenon dicitur, penultima producta, licet correpta Martiali. Archestratus certe anguillam, ut spinis & ossibus caret, solam piscium Apyrenon esse cecinit hoc uersu.

ἡ χελύς ἢ φῶς ἐκ τῶν ἀπύρηνων μόνος ἰχθύς

Quæ autem sit Paulo æginetæ radix Apyrani, ex qua recentis discussorum cataplasma diapyrani, contra collectiones fingitur, ignoro. Natura sunt candidiore Apyrena, & blandioribus acinis, qui minus amari sint, distinctiq; membranis. Est & alia structura eorum communis, tanq; in fauo nucleos habentium, quinque species, dulcia, acida, mixta, acida, uinosa. Samia & ægyptia. Distinguunt erythromis, & leucomis. Ita nouæ genera colligunt omnium. Dulcia sæpe intelliguntur, cum apyrena dicimus. Vinolenta nucleum fere paruum habet. Vnam in his, ænemustum quidem, sed uinum protinus aperuit natura, Apyrenis & uinosis, cortex asperi-

or. Ex acerbo sit medicamentum Stomatice uocatum. Sicut ex Mori quoque succo, Panchristos cognominata. Acinos, granatis totidem esse numero in singulis affirmant, etiam si magnitudo uariet, modo ex eadem arbore legantur. Satam primum in Cypro Malum punicam a Venere, testantur fabule grecorum. Benerij, malum punicam ibidem, ut est apud Callimachum, & Sidem Hippocrates, alia grecia Rhoan & Rhoean, pomum quoque Rhoas & Rhodia & Rhodia uocare solent. Inuenio & Rhoadrion uocari a Paulo in quodam cataplasmate, cui nomen Aphroditario est. In quod & rus, & amyllum, & squama æris, & cerussa queritur. Nam Aloida rion ex aloe medicina est. Sidem porro & Boetia terra dicitur: a qua et arbori nomen datum. Quo argumento Athenienses ab Epaminunda in Side regionis questione uicti memorantur. Legitur & Theophrasto Side frutex quidam, ut Athenæus interpretatur, punice malo similis, Orchomeno lacu nascentis. Theodorus gaza non punice, sed papaueris similitudine describit, quia Rhoas, & punicam, & papaueris genus unum significet. Quanquam discrimen illud, quod pro arbore primæ declinationis nomen est, & rhoea, non rhoas dicitur, pro papauere in tertiam refertur, Rhoas, Rhoadis. Theophrastus certe non Rhoadi similem, sed Rhoæ dixit. Vt ut sit de Sida, Theodorus ex Theophrasto ita scribit. Sida papaueris, inquit, habet similitudinem, capite ad portionem maiorem, ut quid magnitudinem mali referat, nec nudum id est, sed membranisque candidis obducitur, superque eas folia rosæ cum suis continentur calliculis quaterna herbacea, de hiscens uero grana rubra, exigua, orbiculata ostendit: nec magnopere maiora quam miliu, sapore tritici diluto, crassescit æstate paruo pediculo: flos callicibus rosarum similis, quamque duplo fere grandior: hunc & folium super aquas manere, sed ubi defloruit, inclinari magis in uadum: donec attingat terram, atque ita fructum fundere: folia pecudibus, germina uulgo generi, semen hominibus mandis. Cognominem huic haberij & in Nilo scribit idem Theophrastus herbam, sed radicibus carentem. In tumulo Menœci, Creontis filij, ad Boetias Thebas punica nasci traditur Pausania, cuius poma intus sanguineum colorem præferant.

N O T I O R Q V A M V E R G . C O M M .

corum omnium historia & usus est. Illud tantum animaduertendum, quod uno excepto, in cunctis legitur grecis, τὸ δὲ ὄξυς ὁ πυρὴν παραχθὴν ἐν ἰνδία, &c. & a nobis contra communem significationem conuersum est: Acidorum uero acini in sole siccari. πυρῆας enim greci nucleos pomorum, quales in cerasis, prunis, & uuis sunt appellant, κοκκοὺς uero acinos: nihilominus tamen πυρῆας acinos, non nucleos uertimus. Primum, quod in probatiss, non πυρὴν erat, sed ὄξυς, quod liquorem significat, quasi ad cohibendam aluum, & in stomachum destillationes, non acinis, nec nucleis hic uti iuberet, sed ex acinis expresso liquore, eoque in sole siccato. Quod sensus forte absimilis uero non est.

Certius quod sequitur idem ostendit, ὡς χρυσὸν δὲ τὸ ἀποδιδύμα τῶν πυρῆων, quod est utilissimum, & quod ex nucleis expressum fuerit, decoctum & melle mixtum.

Quod enim exprimitur, uuida acinorum caro est, non duri & arentes nuclei: idque Plinius libro. 14. cap. 7. quoque confirmat.

H V I V S F L O R E S C Y T I N I uocantur, qui adstringunt, sic

leant, cohibent. Sanguinolenta glutinant. Quas Punctum præstant utilitates. Humida gingiuarum uitia, mobilesq; dentes decocto coluntur. Herniam pro lapsu intestini erumpentem cataplasmate repellunt. Memorie tradunt, qui tres æminimos Cytnos deuorauerit, nullam eo anno lippitudinem passurum. Eliquatur hypocistidis exemplo.

B A R B A R I C O R O L L .

CYtinus aliter ab alijs exponitur. Dioscorides & Galenus florem satiuę punice ita uocant, Balauftium syluestris. Plinius pomum ipsum immaturum, & primum partum eius florere incipientis, Cytnum appellat. Flores ipsi Balauftia, in ipso erumpentes Cytno uestibus tingendis: quarum color nomen inde acceperit. Cytnum Dioscorides cognominat ipsum quoque Apollinaris herbe florem. Ceterum non proprie, sed per translationem. At Cicum, M. Varro dicit membrana prætenuis, in malo punico discrimen. Vnde Cicures animantes, quæ non sunt feræ, atque agresles. A quo Veturij quoque nobiles cognominati Cicurij, Etenim Siser

D I O S C O R I D I S

Cna Terabitē, p syluestri arbusto posuit. Partim inqt Terabite, partim Lauro atq; Pinu abundat.
¶ De Malicorio. CAP. CLV.

Μπὴ τῆς ῥίζης

Malicorium asperum est, mali Punici putamen, quod aliqui Sidi-
 on appellant. Id spissandi uim habet, & quos Cytini, præbet u-
 sus. Decoctum radiceis potu latus uentris tinea pellit. Et easdem euocat.

BARBARI COROLL.

Malicorium, græci Sidion appellant, ex acerbis prælatum, ad perficienda coria. Nam &
 arbor ipsa, ut prædixi, a Boetis Sida uocabatur.

Βαλαύστιον

¶ De Balauftio. CAP. CLVI.

Balauftium syluestris Punici flos est, Cytino similis. Cuius com-
 plura genera reperiuntur, candidum, fuluum, rosaceum. Ligua-
 mentum ex eo fit, hypocistidis modo. Cui adstrictoria uis inest, eadem
 faciens hypocistis & cytinus.

BARBARI COROLL.

Pli, li, 19, ca, 19.

Balauftium, græce quid esset, dictum est in Cytino. Quidam caducum appellare modo uo-
 lunt, a græco detorquentes. Mihi appellatio antiqua perplacet, Nec tantum græca fastidio, ut
 latina deteriora probem. Ausonius Baulauftum, siue Balauftum, non Balauftium in carmi-
 ne pronunciat. Item Columella. **E X M. V E R G. C O M M.**

De Balauftiorū nominis causa & origine, nihil pro cōperto nobis est. De uiribus hoc bre-
 uissime Aegineta tradit, efficacissima in adstringēdo esse, sicca frigidaq; naturā habere.

μυρτίνα

¶ De Myrto. CAP. CLVII.

D

Myrus satia, nigra, utilior est medicinq; q̃ cādida. Sed hac mul-
 to magis mōtana. Semen tñ imbecillius parit. Vis & Myrti & se-
 minis adstringit. Semen uiride aut aridum in cibo datur sanguinē excreā-
 tibus, & uesciq; erosiōib. Succus uirentibus baccis exp̃ssus, eosdē effectus
 exhibet. Stomacho utilis. Urinā cit. Prodest cōtra phalāgij morsum, &
 scorpionis ictus in mero. Seminis decoctū capillū tingit. Ius decocti in ui-
 no ulcera ī extremitatib. sanat. Oculorū inflammatiōes illitū cū polline po-
 lētē, lenit. Cōtra agilopas illinit. Crapulā arcet p̃sumptū uinū, qd feruefa-
 cto semine exprimatur; alias enim acorem contraheret. Præstat uinū semi-
 nis effectus. Vtile procidentia uuluarum in deflacionibus, sedis uitijs, &
 fœminis fluctione uulue laborantibus. Purgat furfures, ulcera capitis ma-
 nantia, atq; eruptiones papularum. Fluentes capillos continet. Additur
 quoq; in medicamento qd liparas uocant, uti oleū qd ex folijs eius factū
 est. Decoctū foliorū ad deflaciones balnearū cōuenit. Et cōtra laxatos ar-
 tus, & male solidescētes. Eo fracta ferruminatiōi repugnātia utilissime fo-
 uentur. Vitiliginē emēdat. Purulētis auribus infundit. Et capillos deni-
 grat. Succus eadē efficit. Trita folia, & ex aqua illita humidis ulcerib. &
 mēbris omnib. fluctiōe laborātib. coeliacisq; p̃sūt. Et admisto omphaci-
 no oleo, aut exiguo rosaceo cū uino ad ulcera serpētia, ignē sacrū, testū in-
 flammatiōes, epinyctidas, & cōdylomata. Arētū foliorū farina utilitē inspar-
 git paronychijs, pterygijs, & cōtra alarū feminūq; p̃fusiōes. Cardiacorū
 sudores cohibet. Folia cruda seu cremata cū cgrato, ābustis, paronichijs,

pterygijsq; medent. Exprimi folijs succus adfuso uetere uino aut aqua
coelesti, cuius recetis usus ē. Nā exiccatus planē cariē sētit, & uires amittit.

Myrus, græce *μύρις* dicitur. Item Myrsinos, & Myrsine. Item Phibaleos, ab Antipha-
ne. Sed & Myrton, ab Archilochō. Degenerat in fruticē, nisi crebro repurget. Vita ei ut
quibusdā animalibus ambigua, hoc est, terra & aqua. Præcipuus odor Myrtis Aegypti: ubi cæ-
tera omnia hebesunt. Semen apud Menandrum Synaristulū manditur. Myrtum & Myrta di-
citur a Catone, masculino & foeminino sexu, græcorū (ut arbitror) imitatione. Item Murta
Varroni, unde Murtaui, siue Murtaulū, genus farciminis, q̄ ea large farciret intestinū crassius.
Vlus hæc æ antiquis p libro fuit, ante q̄ piper habere. Gnosum inde obsoniū, cognomine Myr-
taui. Cōmendant Myrtis & iura, psertim aprorū. Peregrina Italiæ arbor, atq; etiā Europæ quon-
dam. Pacifera Romę habita, uice cuius uerbenā nūc, laurus & olea præendi inter armatos ho-
stes quietis indicium fuerit. Purificatōibus quoq; suffimētisq; adhibita. Ob id & in coronis ute-
bant ea thesmothetæ Athenis. Præest Venus arbori, quippe q̄ litoribus maxime pueniat: Ve-
nus autē mari dicē orta. Hinc & arbor sacra coniugio. Græci arborē Mineruæ, ut Oleā dicant;
cōmenti fabulā, q̄ Myrsine Atheniensis puella fuerit, pulchritudine ac roborē insignis, amica
Palladi, quā ituenis, ab ea cursu & palæstra superatus, intēmerit. Catonis fastigia sunt candi-
di, nigri, coniuguli. Alia distinctio est, sariuæ, ac syluestris: & in utraq; latifolia. De syluestri age-
tur in Oxymyrlīne. Satiuarū gñā topiarij faciunt. Tarentinā, folio minuto: nostratē, patulo:
forensē, hoc est, exotici, pdenso, uersibus foliorū senis. Hæc non est in usu. Vtraq; alia ramo-
sa. Coniugulā, quæ & Coniugalis uocat, nostratē dici existimāt. Ouantes myrtē corona usos
quādoq; tradunt, ut triūphantes Lauro. Celebris est Hippolyti & Phædræ amoribus Troeze-
niā, cuius folia, ut ingit Pausanias, prope Veneris delubriū satæ pforata nascebatur, iniuriā ui-
delicet ferentia scuiēntis unguibus, & calamistris scemitiæ. Myrtæ sunt, ipsæ Myrti bacculæ.
Controuersum fuit apud Græcos, quod nam coronæ genus esset Anacreonti, Naucratis ap-
pellata. Et pluribus uisum est, non aliud esse, q̄ ex Myrto, rosis comitantibus. Alij papyrū co-
ronariā: quam Aegypti Biblon stephanotrida cognomināt, interpretantur Alij e sampsocho
fertum, q̄ in Aegypto copiosissima sit sampsochus.

Quia porro de coronis incidit sermo, inutile nō arbitror quædā huc transferre, q̄ alio a no-
bis opere dicenda seruabatur. Ergo Lesbij, ut ingit Athenæus, Myrti ramulos Hypothymidas
uocat. Iis se coronāt implexis floribus. Alij pectorales coronas: quibus & ceruices quoq; redi-
mibāt, Hypothymidas, Hypothymidasq; dicebāt. Habeēt & Hypoglotis, ex Hypoglossos her-
ba, quæ post diceēt. Item Isthimion, quā plariq; Isthimiācā appellant. Pyleones uero ferta sunt,
quæ Iunoni circumdabatur, utiq; apud Spartanos. Sicyonij celebrāt Iachachas, ex Iachā flore
quodā odoris cōmendatissimi. E Myrto constat & Hællotides uocatæ ambitus ingentis, cubi-
torū uicentū: ab Europa dictæ, quā Ellotida Corinthij appellāt, q̄ eius ossa in Myrto condita fe-
ratur. Quidā Elotida & Minēruā dictā uolunt. E Palma Psilimi sunt, quas Lacedæmonij Thy-
reaticos uocat, a loco ubi castra hostiū cœpere. E ferta Campanica Melilotini, quanc̄ ex omni
gñe coronamēta muliebria in eo uocabulo Græci fere intelligūt. E Loto Aegyptia fit Antinoi-
os, utiq; nō omni, sed ex ea quæ colore rose nascit. Ex ea uero quæ ceruleū eum habet, Loti-
nos tantū dicūt. E rosa cylistos maxie, quas & Eccylistas cognomināt. E Struthio Struthiū. E
Potho, Pothos. Est autē Pothos duplex. Alterū genus Hyacinthi flore. Alterū sine colore can-
didū, quo sepulchra coronabāt, a quo & nomē quasi desyderatis esset dicatū. Theodorus desy-
deriū cōuertit. Floret æstare. Diurnius est candidū. Habeēt & Aegydiōn coronę genus Eubu-
lo, aut ex Anagallide, ut arbitror, quā nōnulli Aegylin uocabāt. Aut e Lygō. nā Lygos Aegy-
lis a quibusdā uocat. E Lygo aut coronas fieri solitas antiquis, in Vitice docuimus. Aut grami-
ne, quippe q̄d ab aliquibus Aegriōn uocet. Nam Fauni arundine ferulaq; uinciebatur. A tiliā
Phyllirinos, Synthemáticos, Aristophanes cū dixit, coronas uidet promptuarias & parabiles
intellexisse, nō multū a triuialibus & promiscuis diuersas, quæ a Græcis Chydeæ, quasi confu-
sanæ uocatur. Choronos, Appion grāmaticus, apud Phileram, a choro dictos putauit. Vnde
apud nos coronæ sint uocat. Sūt & Acini, corollæ genus ex Acide, ita dicūt flos & satū quod
dam, ut Athenæus & Plinius scribunt. Sunt & Elicti ex Helice, familiares Alexandriæ, nec
non alijs quoque floribus plicatiles. Nam Tindiai, Abydæi, ab oppidis Aegypti, ex spina
sunt Aegyptia, nemore ibi sacro Apollini semper florente, multis comitate fabulis, quas re-
ferre, ut non piget, ita certe parū interest. De ijs & in Aegyp̄tia spina diximus, ex Demetrii sen-
tentia. Coronamēti nomen uidet, & cuius mentionē fecit Cratinus, Cosmofandallos uocatū.

A

B A R B:

Plin. 15. ca. 29.
lib. 23. cap. 9.Coronarum
genera.

B

Ceuius inuentores Lacedæmonios fuisse Clearchus auctor est. Ariadnes coronā e flore Theſe-
diſto perhibent fuiſſe. Id ſatū radice diſcribit amara, ut Theophraſto placet, de quo Timachi-
das poëta græcus cecinit. Inuenias & Apragmoſyn uocatū, coronariū quoddā ſatum, apud
Ariſtophanem poëtā, ut grāmaticus Ariſtophanes interpretat, Athenis in academia naſci ſo-
litū. Anethinis quoq; ſertis uſos ueteres, & Alcæus, & Sappho teſtes ſunt. Coronas in Græcia
facilitas, a Stephano primo dicunt, ob id & nomen ſertis datū, ut Stephani uocarentur. Au-
ctorem & inuentorem coronæ Ianum biſormem fuiſſe græci affirmant. Hybernas corollas no-
ſtri Corneas uocabant, q̃ e cornu fierent, in florū defectu. Sicut ex omni florum genere, Pan-
capias. Dictum eſt & in Vitice de coronis alijs. Itemq; in Elichryſo.

EX M. VERG. COMM.

MYrtus differt a Ruſco, quod mitior & quod Græci dicunt *ῥύσπος*. Ruſcus uero cuſpida-
tis folijs, uulnerās magis quā pungens, aſperior & indomita eſt. Qualis autē ſit Ruſcus, cum de
Nigram Myrtū ueteres dixerunt, quæ can- (Oxymyrſine nobis ager certius patebit;
didæ comparata nigreſceret, & candidam quæ nigræ comparata albeſceret. Præfertur in omni
bus in medicina nigra, teſte Columella lib. 11, cap. 38.

De Myrtidano.

CAP. CLVIII.

Myrtidano

MYrtidanium dicitur incrementum inæquabile, uerrucoſum &
concolor. Quod perinde quaſi manus Myrti caudicem ample-
ctitur. Magis q̃ Myrtus adſtringit. Tuſum addito aſtero uino repo-
nitur, coactumq; in paſtillos ſiccatur in umbra, multo efficacius, & folio
& ſemine, carato, peſſis, inſeſſionibus, cataplaſmatīs admixtum, ubi
adſtringendum aliquid eſt.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 23. ca. 9.

MYrtidanium, a Galeno Myrtada nominatur, uirgultum & ſoboles Myrti: qualis fortasſe
in Ficu quoq; fructicat, exiens ab radice. Myrtidanium certe Plinius pro uino accipit, quod ex
ſylueſtris Myrti baccis ſit conditum, libra in tribus muſti congijſ deferuefacta, donec duo ſu-
perſint. Hippocrates Martidanum uidetur appellasſe hunc fruticem. Myrtidanū uero ipſum
piper, ut poſt dicemus.

De Ceraſijs.

CAP. CLIX.

Ceraſijs

CERAſia uentri utilia ſunt, ſi uiridia ſumantur. Eadem ſiccata aluum
ſiſtunt. Gummi quod Ceraſi reſudarū, cum uino diluto tuſſi ue-
tuſtæ medetur, Colorem commendat. Viſum exacuit. Appetentiam in-
uitat. Idem ex uino potum calculoſis auxilio eſt.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 16. ca. 25;
li. 23. ca. 7. lib.
16. ca. 18. Theo-
phr. li. 3. ca. 17.

CERAſus, in quatuor & uiginti ſæpe cubita erigit, craſſa, dodrantibus quatuor ab radice. Fo-
liū Meſpili durū, & latius corticis leuore, colore, craſſitudine. Similis Tilia, ob id apta ciſtis, ut
Tilia. Hæc meatu flexo, nec girū complente, abducit arbori ab infernis ſurſum uerſus in angu-
ſtias colligendo ſeſe, qualis in fronde ipſa quoq; deſcriptio eſt. In eundem modū, & deſquama-
tio euadit, alioquin præſcindit potius q̃ filo codē auferri poſſit. Per craſſitudinē ſecto tenuitas
folij detrahit, nec arbor emoriſ, q̃ ſi totū deglubas, qui reliquus ſit, tunc humor elabit. Tunica
porro exteriore adempta, nigricat. Interior pituita quadā muccoſa, & uice illius ſecundo anno
tenuior, altera ſubnaſcit. Nerui ligno contorti cōuolutiq; in anfractus, ut cortex uirgis conti-
nuo q̃ naſcunt idem mos: rami dum adoleſcunt, alij ſubinde pereunt, ut qui ab imo ſunt, alij
cōtinue creſcūt, ut ſupni. Proſus arbor de rāoſis nō eſt, minus etiā aliquāto q̃ Populus. Radix
multijuga, & ſumma telluris cute nec craſſa. Contortio eadē radicis & corticis, radice tegētis, flo-
re albo, piri uel meſpili, e racemis ſauaceo. Fructus ruber diospyri figura, magnitudine fabæ.
Q̃z q̃ acinus diospyro p̄durus, ceraſo mollis, ut Theophraſtus inq̃r: apud quē diospyros, hoc
ſignificat, q̃d lithoſpmon Dioſcoridi & Plinio, ut arbitror. Nec Theodorū ſatis p̄bo: q̃ diospy-
ron, Iouis flāmam interpretatus eſt: cū Iouis triticū interpretari debuiffet: quādo & uulgaris quoq;
ſermo granū ſolis appellare conſueuit. Naſcitur Ceraſus ubi amnes & tigna, oīnoq; ubi Tilia.
Italiæ Ceraſum Lucullus intulit. Nūc trās Oceanū, & in Britaniam quoq; uecta. In Aegypto

nulla cura eualuit, ut prouenire posset. Genera nominantur Aproniana, quæ maxime rubeant: Aetia nigerrima, rotunda Ceciliania. Iunianis gratus sapor tantum, sub arbore adeo teneris, ut gestatu marcescant. Principatus Duracinis, quæ Campania Pliniana appellat. In Belgica Lusitanis. In ripis etiam Rheni. Tertius ipsos colos e nigro ac rubenti, uiridique, similisque maturescen-
bus semper. Sunt & laurea Cerasa in Lauro primum insita, non ingrata amaritudinis. Hinc Amarasia dicitur uulgo, quasi amara Cerasia. Et enim pomum ipsum non cerasum, sed Cerasium uocari, Seruius precipit: cuius & illa quoque uerba sunt. Cerasium inquit, & antequam e Ceraso urbe Lucillus adueheret, erat in Italia, sed durum, & cornu appellabatur: quod postea mixto nomine Cornocerasium est uocatum. Sint autem Cornocerasia idem cum Duracinis genus, an uero Seruio credendum, qui Cornum in Italia Cerasium fuisse prodit, cum alia res sit Cornus, alia Cerasus omni-
no, satis ambigimus. Cerasiorum porro discrimen alterum, quod Romæ Visulum appellant, frequen-
tissimum in Germania, & Gallia. Sed in Scythia fere supra modum, ubi & Viscina Barbari cognominant, ut Pomponius Latus, qui ea loca modo inuisit, constanter affirmat. Sunt Macædonica, parua arboris, raroque tria cubita excedentis, Chamæcerasi uocata. Pomum hoc, prima colono fere gratiam uertentis anni refert. Primo candidum, mox rubescit, deinde nigrum septem-
trione frigidisque gaudens, siccatur sole, conditurque ut Oliua cadis. Medium Cerasis genus, inter acinos atque baccas, sine osse. Quemadmodum nascantur, Græci & Latini monstrauere. Fati-
gatur caniculis æstu Cerasus. Defendit hoc incommodum, ut inquit Palladius, herba Symphoniaca, trunco arboris eius circumdata: nec qualis herba ea sit, ostendit. Quemadmodum neque
Græci Polypremnon appellatam, cuius succo ægrotas arbores oblinere præcipiunt. Nisi quis Apuleio credat, Symphoniaca tradenti, eadem esse cum Hyoscyamo. Plinius Symphoniam her-
bam describit alternis uiridibus, roseisque per caulem folijs, in posca sanguine reicientibus me-
deri. Hanc aliqui Cremphenam scribunt, aliqui Symphoniam, alij Comphenam, aut Somphenam. Quod si pro Hyoscyamo sumi posset: non folijs alternis uiridibus, roseisque, sed floribus legen-
dum erit. Quandoquidem Dioscorides ita dicat, παρά δὲ τὸν καύλον ἔφευγαν περικασιὴν ἀνθρώπων ροῖαν. Accedit, quod ad eruptiones sanguinis Hyoscyamus quoque laudatur.

E X M. V E R G. C O M M.

Aliter de Cerasijs docet lib. 6. Paulus Aegineta. Sapor enim tribuit, quod hic ex siccitate, contrarioque habitu eorum decernit. Siquidem monet, quod dulcia sunt, citissime dilabi, austera stoma-
cho utiliora esse, Acida uero, ob incidendi uim, habent pituitosis, & excrementosis stoma-
chu. Seruabitur a nobis id posthac multa fide, ut ubi ὑπόκλιον sit, bonam (chis prodesse.
alium semper, ubi λένει, solutam, ubi μαλάττειν, mollem, ubi ἐπάγειν, deiectam, aut soluere,
mollireue aut deicere dicamus.

De Siliquis.

C A P. CLX.

Siliquæ recentes stomacho aduersantur. Aluum soluunt. Eadem sic-
catae sistunt, stomachoque utiliores fiunt. Vrinam ciunt, sed precipue
quæ uinaceis condiuntur.

B A R B A R I C O R O L L.

Siliqua arborem Ficū Aegyptiā uocari, & in Ionia Ceroniā, Theophrastus auctor est, quæ &
Ceratia dicat. Galenus arborem Ceratoniā, fructum Cratia nominari scribit, a corniculi simi-
litudine. Lucius Columella, Siliquā græcā, credo, ut a foeno græco distingueret, quod absolute
siliquā rustici cognominant. Recentiores Græci Xylocerata. Sed alia est Ficus Aegyptia omni-
no, ut Plinius notauit, & nos paulopost monstrabimus. Quandoquidem in Aegypto nulla nasci-
tur. Sed in Syria, Ioniaque, & circa Gnidum, atque Rhodium, folijs semper comatibus, flore candido,
cum uehementia odoris: pomum siliquæ, & ob id nomen: radice sublimi, sed non multum, plantige-
ra, imis partibus, superficie flauescens inarescensque, succum auferente sobole. Pomo anteceden-
tis anni detracto, post canis ortum, statim concipit, uterique præfert, & mollem quandam uuae mo-
do in formam indiscrataque primo edit: quæ postquam adoleuit, per arcturum & æquinoctium florem
emittit. Hyeme foetus enutritur, qui usque ad canis ortum in parente durat, ut prædiximus. Tum
metuitur. Non puto quenquam nescire, Siliquas prædulces esse, earumque manducae corticem, digito-
rum hominis longitudine, interim falcata pollicari latitudine. Seritur & hæc apud nos semine,
sed parum feliciter. Quandoquidem nec fructum fert, & breui emoriunt. Galenus usum eius cibo dāna-
uit, ut mali succi, & lignosi, nec facile conficiendi. Posteritas commendat ad stomachum fulcien-
dum, utique post cenam, & ad uentris profluuium, si quis præsumpserit. Subter hanc arborem flami-

κράτια

Plin. 15. capit.
29. 28. li. 17. ca.
5. lib. 23. ca. 5.

D I O S C O R I D I S

Gellius lib. 9.
cap. 15.

C

nis Dialis capillū, & ungues p̄fectos terra operiri mos & religio erat, ut est apud Geliū. Quāq̄ non Siliqua, sed silica mendose in eo legit̄. Nisi quis non siliquā, aut ilicem, aut salicem putet legendum. Ego ut ingenuæ ueritatis homo, quid sequendū in eo potissimū iit, non diffitebor ne scire. In mediū, ut plerāq̄ alia relinquo. Est & nomen herbæ Plinio Ceratīa, uno folio, radice nodosa & magna, cœliacis & dysentericis in cibo danti. Idem auctor coniūgit huic Peraticā: septem ei caules reddendo, qui uelut rosæ capita sustineant. Quāq̄ in codicibus quibusdam non Peratica, sed Statica scriptum legas, quoniā sistat aluum.

E X M. V E R G. C O M M.

Adem Græcis & Latinis in hac arbore fructuq̄ eius ratio nominis est. Illi *κισάτιον*, quæ uoce in frugibus & leguminibus aliquot longiores Siliquas dicunt, facto a cornu nomine appellauerunt. Latini cōmuni, & alijs Siliquis appellatione indicauerunt, & ut ab alijs distinguere-
tur, aliquid quod rem ad proprium genus contraheret, adiecerunt, nunc dulcem, nunc græcæ Siliquā appellantes. Nota satis arbor, notus & fructus, felici descriptione a Plinio lib. 15. indicatus. Quorū arborem, paulo a Ceratījs deflexa uoce, Paulus ægineta Ceratoniā uocat. Græci aliquot itidem facto ex lignosa soliditate cornuq̄ longitudine, & flexura nomine, Xylocerata appellauerunt. Damnauit in cibo Siliquæ huius usum Galenus.

Carere quoq̄ intellectu nobis uidetur quod dicit, *μάλιστά δὲ τὰ ἐκ τῶν σιμφύλων συντίθενται*. quæ sic uerbum de uerbo uertat aliquis. Maximeq̄ ea quæ ex uinaceis componuntur. Nulla cum superioribus serie & rei sensu. Quid enim Siliquis his cum uinaceis? Corruptis nobis omnino locus uidetur. Suspiciamurq̄, ex quo *σιμφύλων* duplici λ legitur, contra q̄ id in uinaceis scribatur id nomen, potuisse aliquid de folijs arboris eo loco decerni. Quod uetustissimus, qui apud nos est, Longabardus, literis scriptus latinis Dioscorides indicat, in quo legitur, maxime quæ ex folijs componuntur. Aut si uinaceorū illic futurū nomen est, de conditura aliqua Siliquarū, quæ uuarū modo in uinaceis seruarentur. Sed obstat huic sententiæ præpositio *ικ*. Non enim ex uinaceis, sed in uinaceis seruantur, quemadmodū priori illi *σιμφύλων* uox.

Potuit forte etiā Dioscorides, corticem huius *σιμφύλον* dicere, quemadmodū in uuis Græci appellant, docereq̄ urinam præcipue ciere, quæ ex Siliquarū huiusmodi corticibus confecta essent, confectiois genus aliquod indicans ea ætate notum, sed nobis incognitum.

D

De Malo.

C A P. CLXI.

μυλ

Folia, flores, & germina cum omnis Mali, tum maxime Cotonæ adstringunt. Pomis acerbis adstringendi uis inest. Maturis uero longè secus. Ex ijs uerna bilem gignunt. Neros lædunt. Inflationes pariunt.

Pli. li. 15. ca. 14.
li. 12. ca. 3. lib.
16. cap. 27.

B A R B A R I C O R O L L.

Malus corticis lēuore niter. Peculiares habet nodos, belluata facie, ut Theophrastus scribit, sed prægrandi uno, alijs circa eum pusillis compluribus. Fructificat primis frigoribus. Vrena intelliguntur mala, quæ adulto uere maturescunt. Inter Mala tuberes correpta priore sylaba dicuntur, baccis similiores q̄ Malis. Post Armeniaca, & omnino inter primas florent arbores. Inferi solent Cydonio, piro, pruno, & calabrici, & malis omnibus, ut inquit Palladius. quamq̄ Plinius syluestrem spinam, calabricem uocari dixit. Genera duo Tuberum, candidum, & a colore, Sericum uocant. Papinius Tuberes, & Zizipha, hæc ex Africa, illa e Syria nouissimis Augusti temporibus inuexit, in castris fata, & aggeribus præcipue decora. Græci quemadmodū ipsas Tuberes appellant, haud possum coniungere. Nisi quis Syrica, siue, ut in quibusdā exemplaribus habetur, Serica eas uocare putet, parui succi poma, nec concoctioni, nec stomacho facilia, ut inquiunt Paulus, Oribasius, Aetius. Præferuntur e Ziziphis Aedestina uocata, ut quidam putauere, q̄ grandissima, calore, ac humore tēperata, medicis monstrantibus. Columella duplex Ziziphi genus habet, rutilū, & candidū. Inuenio apud Græcos, qui Dinzipha pro Ziziphis appellent. Pene uero Tuberā peregrina sunt in uno Italiæ agro Vronensi nascentia, quæ peculiari noīe lanata Plinius apparī dicit, obducta lanugine, ut Struthicis & Persicis fere plurimis, nulla tamen alia cōmendatione insignia, ab inuentoribus nuncupantur. Matiana ex uico Aquileiensi sub ipsas Alpes, quibus similitudine respondeant Gangeris Paphlagonæ urbe nascentia, nunc Hispaniæ uernaculo uocabulo Matiana in commune sunt mala oīa. Sunt & a Manlio Manliana, Claudianis color rubens. Appianis odor & magnitu-

do cotoneorū, inſito cotoneo. Sceptiana rotūditate inſignia. Cato addijcit Quiriana, & Con-
ditiua, quæ dolijſ condantur. Et Scantiana, Scandianaq;. In nomine ſunt & Geſtiana, ſiue Se-
xtriana, ſiue, ut Græci ſcribunt, Caſtiana: quoniam & Ceſtomela uocantur ab Aetio. Quan-
q; ridicule a ceſto, id eſt, loro dicta quidam interpretes exiſtimant, cui ſimilia ſunt cortice.
Hæc ipſa & Pezomela uulgo dicunt, & auſtera prædicant. Auſtera eſt dulci ſunt Aphratomela:
odorata hæc, & pulpam habent aſperam, & ſqualentem, ut cidonia. Sunt & parua quædā, ſa-
poris gratiſſimi Petiſia. Habetur & Peluſiana, & Proſiua, & Veriana, ſiue Tiburneriana & Si-
rutia. Sunt & Phaulia, & quæ Delphica Græci uocant, & Platania, & Mordiana orbiculatiſ ſi-
milis, ex Apolloniæ agro, qui Mordius cognominabatur, & Camerina, ſiue ut Columella uo-
luit, Amerina, & Græcula. Itē Gemella, nunq; in ſortu ſingula. Sicut Belgemela, ſiue Melgeme-
la, q; folium unū aliquandō geminū erumpit latere medio. A colore Serica, ut neſciā Tuberum
hæc generis, an diuerſi putē. A gentilitate Melappia, a celeritate miteſcendi Muſtea; de quibus
in Melimellis loco ſuo dicitur. A māmorum eſſigie Orthomaſtica. A conditione caſtrati ſemi-
nis, Spadonia. A corrugationis celeritate Pānucea. Ab importuno & ſtolido timore, Pulmo-
nea. Sunt quibus color ſanguineus, origine ex mori inſitu tracta. Sunt & parua gratiſ ſaporis,
atq; etiā a cūtiōra, odore ſylueſtria peculiari, acerbicatis, improbitatiſq; cōiūctio, de quibus proxi-
me diſſeremus. Itē Dacca, ſerme uiliſſima, Quanq; aduētū prima; decerpitq; properantia, Græci
Corinthiaca, e Sidunte uico celebrāt. Nominatur & Laconica, & Herina, a uere dicta, ſicut a la-
nugine Chnodia, Lanatiſ ſupra dictiſ forte nō plane diſſimilia. Seruant poma tabulatiſ, lo-
co frigido, ſeptētrionalibus fenestris, quæ ſereno die lucē accipiāt patētes. Auſtri ſpecularibus
arcendi, Aquiloniſ aſſatu marceſcunt in rugas. Colligunt poſt æquinoctiū autumnū, nec ante
ſextamdecimā lunam, neq; ante primā lunam. Cadiua ſeparanda. Minimū Melimela durant.
Plurimū Camerina: quæ ut Scantiana quoq; ſerotina ſunt, & gelu matureſcunt, ad hyemē uſq;
pendentia in parente. Vini Malo, pprietas æque ut Piro. Malū a Græciſ Melon, arbor Melea di-
citur. At Pomi nomen generalius eſt, ut cōplectat quicq; apud Græcos Opora continet, in
quo ſignificatu eſt, cum dicitur a medicis, omne Pomū refrigerandi & humificandi uim habe-
re, parū alere, mali ſucci eſſe, autumnū plus officere. Inde Oporotheca, ubi cuſtodiuſ. Pomū
Varro dictū autumnat, quia potu ſiccitatibus indigeat. Diſſert tamen Opora ab iſ, quæ Acro-
drya Græci uocāt. Q; Opora eſt, quicquid nihil habet exterius lignoſum, Acrodrya uero con-
tra, ut malū puticū, piſtacia, caſtanea, nuceſ, ſimiliaq;. Vtrūq; genus Salgami nomine cōple-
ctunt Latini: a quo Salgamanus. Dubitatū eſt, & in iure apud Cefeliū, an nux pinea pomū eſ-
ſet, quia Nuceſ eſſent quicq; foris duro tegitur, Malū quicquid id quod eſus eſt foris habet,
Pomo utruſq; contineretur: quod ſere probamus. Seruio Nuceſ ſunt omnia corio duriore te-
cta, molliore uero Poma. Feruntur & alia Mali genera, ſuiſ mentionibus prodenda. Galenus
omnia inquit Mala breui fugiunt, atq; acceſcunt, utpote frigida, & excrementitio ſucco redun-
dantia: ideoq; niſi melle condita ſeruando, ſeruari non poſſunt. Exciipiuntur Cotonea inquit,
& Struthæa. Malorum enim appellatiōne ueniunt & Coronea, & Granata, & Perſica, & Piri
genus, unum Librale nuncupatū, ab amplitudine ac pondere.

¶ De Coroneo malo. CAP. CLXII.

Cotonea ſtomacho utilia. Vrinam cient. Verum toſta accommo-
diora habentur. Proſunt coeliaciſ, dyſentericiſ, purulenta extuſ-
ſientibus, cholericiſ, præſertim cruda. Maceratorum liquor, cōmōde in
ſtomachi, aut uentriſ fluctiōnibus potui datur. Succuſ crudoruſ aſſum-
ptuſ orthopnoiciſ ſalutaris eſt. Decocto fouentur uulua, & ſedes ſi pro-
cidant. Cotonea quæ melle condiuntur, urinam mouent. Mel autem ſi-
bi conſtringentem illam uim, & inſpiſſantem adſciſcit. Quæ cum melle
coquuntur, ſtomacho atq; ori gratiora ſunt, ſed minus inſpiſſant. Cru-
da cataplaſmatiſ adiſciuntur, ad cōhibendam aluum, aut ſi ſtomachus
æſtuet, aut in uomitiōneſ effundatur, ad mammaruſ inſtammationeſ,
præduroſ lieneſ, & condylomata. Fit uinum ex iſliſ tuſiſ, expreſſiſq;.
Sed quo perduret, quindecim ſextarijſ ſucci unus mellis adiungitur:

D I O S C O R I D I S

E alioquin in acorem degenerat. Prodest ad omnia quæ dicta sunt. Fit & oleum ex ijs, quod Melinum uocauimus, quo utimur quoties adstringenti oleo est opus. Eligi oportet uera, rotunda, parua, & odorata. Quæ uero Struthia dicuntur, magna quidem sunt, sed minus utilia. Flos & uiridis & siccus cataplasmatibus imponitur, ijs conueniens quæ adstrictiorem desiderant. Inflammationibus oculorum, reiectionibusque sanguinis, contra citam aluum, & mensium impetus, in uino bibitur.

Pli. li. 15. ca. 11.
17. li. 23. cap. 6.

C O T O N E I S, ut primus Cato nominauit, amplitudo Pinearum nutum. Interim maioribus incuruatos trahunt ramos, prohibentque parentem crescere. Cydonea Græci appellant, quoniam ex Creta primum illata fuerint. Genera eorum, Chrysomela, hoc est, aurea mala, incisuris distincta, colore ad aurum inclinato. Nostratia candidiora, odoris præstantissimi. Neapolitana ex eodem genere minora, odore uibrantia, prouentu serotino, quæ Struthea nuncupentur, sicut quæ celeriter mitescunt & præcocia sunt Mustea. Aerius Struthea inquit dicuntur, quæ magna sunt, & suauiora, minusque acerba. Cotoneo Strutheis insito, muluiana cognominantur: quæ sola ex ijs, uel cruda uescendo sunt. Habentur & syluestria parua, e Strutheis odoratissima, in sepibus nata: Omniaque iam & uirorum saluatorijs cubilibus inclusa, simulachrisque noctium consocijs imposita, ut Plinius queritur, insigni taxatione seculi muliebriter mollis. Cotoneum, & Coddymalon, siue Cydyomalon uocari quidam scripserunt: uerum Polemon, floris genus esse id existimat. Cotonei genus præter hæc inuenio, Phaulion uocatum. Quod nomine, Mali quoque genus unum dici meminimus.

E X M. V E R G. C O M M.
Q uod in græcis dicitur, *καρπὸς*, quæ uox purulentas excreationes significat, in antiquioribus & melioribus græcis, non *καρπὸς*, uerum *καρπὸς*, id est, sanguinem expuitionibus legitur, diuerso mali genere, & quod in his qui ad tabem feruntur purulentas excreationes antecedit, si Hippocrati credimus. Ideoque nos maluimus dicere, sanguinem expuitionibus, auctore, & confirmante id Plinio lib. 23. cap. 7. de Cotoneis malis, cuius uerba sunt, Maturatione inquit, profunt sanguinem excreantibus, &c.

Non uideo, cur relicta hic uoce græca Barbarus uerterit, aletima, quasi ex hoc nomine priuatim aliquod genus indicaret. Nullibi enim inuentum id a nobis est, nec ipse inuenisse se testatur. Nos uera reddidimus. Nec aliud inter Coronea uera, & Struthia discrimen hic esse ostendit, quam ex forma, magnitudine, & odore.

De Malis dulcibus. CAP. CLXIII.
M Elimela uentrē molliunt, & animalia expellunt. Stomacho negocium exhibent. Aestuosa. Ea a multis, dulcia mala uocantur.

B A R B A R I C O R O L L.
M Elimela dicitur a sapore melleo. Eadem & a celeritate mitescendi, Mustea, ut inquit Vatro, uocabantur. Minimu durat hæc, ut inter Mala diximus. Mustea sane ueteres appellabant id quod nos præcocia. Vnde Cotonea quoque certo genere Mustea dici solita reddidimus. Item Pira, quod recens est, Mustum, & Mustum dici solet. Athenis Melimella nominabatur, malo in syluestrem Pirum, Cydoniumue insito, ut scribit Diophanes.

E X M. V E R G. C O M M.
καρπὸς κατὰ φύσιν, uidetur non carere mendo, tamen & nos quoque reddiderimus, uentris animalia pellit. Dulcia enim hæc mala sunt, mellisque sapore, a quo nomen inuenerunt, non uidentur posse uentris animalia facile pellere: nisi forte deiectam hoc cibo aluum, ea etiam sequuntur, & quæ alioquin hæssissent, impetu excrementorum, quasi in torrente pisces, qui largiore per æstare imbre abundauerit rapiuntur, aut propria naturæ suæ potestate, qualia multa passim uidentur, id ea mala possint. Habere quidem parum certam, non tamē absurdā id rationem.

De Orbiculatis Malis. CAP. CLXIII.
E Pirotica mala, quæ latine Orbiculata dicuntur, stomacho utilia. Stantunt alui. Urinas euocant. Malis tamen Coroneis inualidiora.

Epirotica, ex

BARBARI COROLL.

Epirotica, ex Epiro inuenta primum. Argumento est cognomen. Orbiculata nostri appellant, ex figura orbis in rotunditatem circumacti.

EX M. VERG. COMM.

Facile nobis indicatur, posse hæc mala esse quæ rura nostra a colore rosea appellant, Mala rotunda & orbiculata, quæ toto anno seruari possunt.

De Syluestribus Malis. CAP. CLXV.

Syluestria mala similia sunt uernis, & adstringunt, Sane in hunc αγριομυλα
sum immatura opus sunt.

BARBARI COROLL.

Syluestria, odore acutiora, sed improba & acerba: ob id & conuitio dicata. Iis tanta uis, ut aciem gladium perstringant. Aliud genus sunt, quæ Poma syluestria dicuntur, a rei rusticæ scriptoribus, ut albæ spinæ, græcæ siliquæ, tuniperus, lotos, pampinus, cornus, arbutus, prunus, & paliurus, atq; sacchades piri. Quid porro sit in Columella (sunt enim hæc Columellæ uerba) Pāpinus, & an corrupta sit lectio, pro eo quod est Carpinus, aut Pinus, relinquo discutendum peritis.

EX M. VERG. COMM.

Syluestria sunt, quæ Theocritus in Bucolicis suis *ὀρειμαλάς*, id est, montana appellat. In quibus illud animaduertendum, nō de his tantum præcipere Dioscoridæ, ad adstringendum imaturis opus esse, quod ex Plinio Barbarus uertit, sed in uniuersum omnibus acerbis in adstringendo uti oportere.

Verba eius hæc sunt, *Αἰ δὲ πρὸς τὰ ῥύσιος χρίσονται ἀπορρίπτει πάντας χυρβας*. Id est, Oportet autem ad ea quæ ad adstringenda sunt, intempestiuus, id est, immaturis omnibus uti. Omnibus id tribuitur, non priuatim syluestribus.

De Persicis Malis. CAP. CLXVI.

PERSICA poma matura, tam stomacho, quæ uentri utilia sunt. περσικά
Acerba aluum cohibent, sed sicca uehementius, Decoctum e sic- B
cis, alui stomachiq; fluctiones sistit.

BARBARI COROLL.

Persica, ex Perside aduecta, ut ipso nomine apparet, Theophrasti temporibus in Aegypto tantum, & uicinis locis ferebat. In Rhodō ad florem usq; perueniens: quod primum ab Aegypto uenienti hospitium fuit. Inde Rhodacina fortasse uernaculo græcorum sermone dicta. Nisi quis inuersum nomen putet, quasi Doracina. sic enim Persica ipsa nominantur a græcis recentioribus, Paulo, & Aetio, quasi Duracina: de quibus post agetur. Notant autores, nusquam minus odoris poma, plus succi, qui tñ sitim stimulet. Falsum est, uenenata cū cruciatu in Persis ea nasci, & poenarum causa a Regibus translata in Aegyptū, ubi cælo pprietatem mutaerint. Id em de Persæ diligentiores tradunt. quam nos in suum locum differimus. Persicorum palma Duracinis. Nationum habent nomen Gallica, & Asiatica. Post Autumnum maturescunt, sicut æstate Præcocia: quæ Plinius intra. 10. annos inuenta prodente se testatur, & primo denarijs singula uenundata. Supernatia e Sabinis sunt. Popularia ubiq;. Pomū innocuū uel ægris. Preciū singulis triceniquondā fuere nūmi, nullius maiore quod miremur: qā non aliud fugacius. longissima namq; decerpto bidui mora est, cogitq; se uenundari. Persica in prouentum alium Autumno condiuntur, ut uix cadis. Molluscā nucem sunt qui Persicum interpretati falso fuerint, ut in Iuglande cōmonebimus. Persica sine suis ossibus, & inscripta quem admodum nascantur, docebit Palladius. Idem tria genera enumerat, Armenia, Duracina, Persica. Sinthæc Armenia, quæ Prunorum generis esse quidam uolunt, an diuersa, studiosi salgamorum diiudicent: mihi eadem uideri placet.

EX M. VERG. COMM.

Notum Persicorum genus omne & forma, nondū tñ in antiquioribus satis pater, an huius pomi arbor ea sit, quā paulo post hic, pluresq; alij Persæ dicūt, in Aethiopia letalē, in Aegypto autē salubrē, de qua in Hortulo notissimos uersus cecinit Columella, an quæ malus Persica ubiq; nunc nascitur. Sed eandem esse Persicā malū, & Persæ, ex Nicandri cōmentatore probabimus. Eius uerba sunt eo loci quo de Phalangijs ait. Sciendum est, Socratē in Cōmentario de

D I O S C O R I D I S

C reptilibus & serpentibus, testari Perseam, quam Rhodacineam dicunt. Hac uoce autem græci Persica nunc etiam appellant. Ex Aegypto in Aethiopiā translata fuisse testat, et Rhodus Democritus in cōmentario de his quæ ἀντιπαθῆν, & συμπαθῆν dicuntur, Persas ait lætalem arborem habentes, in Aegyptum misisse, credentes perituros ab ea multos. Sed utilem contrario euentu illis profuisse, protulisseque suauissima poma, qualia nunc uidentur. Et hæc interpres eo loco.

Ex quibus manifeste patet, quam alij περσίαν arborem dicunt poetice, a Nicandro, interpres eius περσίαν uocari. Quod a Barbaro relictum, addere placuit. In hanc enim partem inclinat animus. Et si Plinius id negauerit, & aliorum multorum autoritas obstat.

De Præcociibus.

CAP. CLXVII.

Agrius

A Armeniaca, quæ a latinis Præcocia dicuntur, minora sunt supradictis, & stomacho utiliora.

BARBARI COROLL.

A Armeniaca, siue Armenia, Prunorum generis sunt, peregrina & ipsa, ut ex nomine cognoscitur. Solæ & Prunis odore cōmendantur. Armeniaca uocari desita, & Præcocia, siue præcocia, sed Berioccia fere pronunciant.

medic

De Medico Malo, seu Citreo. CAP. CLXVIII.

M Edica mala, aut Cedromela, quæ latini Citrea uocant, nemini nō cognita. Arbor ipsa omnibus anni temporibus pomifera, alijs deciduis, alijs subnascentibus. Malum oblongum est, rugosum, colore aurum imitans, cum grauitate odoratum. Semen habet Pyri. Id in uino potum uenenis resistit. Aluum mouet. Oris suauitatem commendat, decocto eius colluto, aut succo. Estur in malacia mulieribus. Vestitijs impositum, ab erosionis uitio uestes uindicare existimatur.

D
niray

BARBARI COROLL.

Pli. li. ii. ca. 7.
Theoph. li. 4.
Athen. 3. di-
pno sophistæ.

M Alus medica, flores duobus modis procreat. Alios qui uelut erectam in medio colū habent, fecundiores existimati. Alios qui careant ea, infecundos. Sunt qui & Assyriā, & Persicam malum uocent. Item Citrum, Citream, Græci & Hesperida, & malum eius Hespericum, autore Iuba, qui ab Hercule translatum id in Græciam, & aureum malū uocatum scripsit. ut Virgilius de his intellexisse uideatur, cum dixit, Aurea mala decē. Nuptiale pomū intelligi hoc uolunt, qui æditum a tellure fabulantur, nunciato Iouis & Iunonis cōnubio. Foliū ei Adrachnes, Vnedonilque, spinis intercurrentibus, ut in pyro & oxyacāthā, sed leuibus infestis mucrone, ualidis. Nō mandebat pomum Theophrasti ætate, sed ne Plinii quoque (ut arbitror) magnopere, tū odore cōmendato. Plutarchi certe aurorum memoria, gustabat nemo, ut Athenæus inquit. Nunc a Palladij fere temporibus promiscuum, expetimus cœnis. qui & medullas eius acres, dulcibus mutare docuit. Quamquam Apuleius negauit eandem esse malū assyriam, siue medicā, quæ Citrus: quæ Citrus exiguum esset genus arboris, Medica uero, ut Maro scribit, ingens. Pamphylus Citrum, Critum a Romanis eam dici, parum peritus homo scripsit. Vt tunc arbor hæc scribitur, uere partibus cultissimis semine quarto die aut quinto rigatur. Maiuscula transferretur etiam uere in solum molle, uelut quæ, nec admodum gracile. Arbor ipsa omnibus horis pomifera est, alijs ruentibus, alijs subnascentibus, alijs maturescantibus. Serit & fistilibus, dato radici bus spiramento, per cauernas ut Palmæ: qualiter oīa transitura longius haberi conueniunt. Semen eius solum id quod in colo quadam e medio prorumpit, fecundum existimatur a Theophrasto. Sed hæc olim fuisse. Nunc trallatitia & triualis fere arbor, ut pluribus generibus Citrea Liguriæ, Campaniæ, Benaco lacu, Italiā fere tota germinet feliciter, quamcumque libeat imaginem reddentia. Hæc ex insitione Mali quoties proueniunt, Citromela proprie dicuntur ab aliquibus. Quamquam uero Medica malus dicatur, ipsum tamen pomum Galenus malum medicum uocari negat, sed Citrinum dumtaxat. Theophrastus etiam malum Medicum & Persicū, est ubi apparet, cum huius fere unius mali semen imperispicuum esse dixit, secundo uolumine, de stirpibus, ut Athenæus interpretatur. Diphylus autor est, Citria, quandoque Pruna persica, uocari solita, Aristophanes grammaticus, a Lacædemonijs Oxymala persica nuncupari pro-

didit, quibus & Deos coronent. Menfes illas ueteribus & Plinio decantatas, præsertimq; Cice-
 roniamam, non ex hac fuisse Citro, sed ex alio citri genere conijcio, pluribus argumentis: sed il-
 lo potissimum, q̃ arbores ex quibus fierent, Cupressò fẽmĩ syluestri similes folio, odore, cau-
 dice, a Plinio produntur, Anchorano monte, citeriõs Mauritanie, sed iam tunc exhausti. Itẽ
 Adante, cuius imas radices densis alcisq; repletas syluis, incognito genere arborum Suetoni-
 us Paulinus, a Plinio citatus, asserit spectabili proceritate, enodi nitore, frõdibus Cupressi, p̃-
 terq; grauiatẽ odoris, has tenui lanugine obduci, quibus addita arte possint quales bombice
 uestes confici. Idem autor paulo superius, efficacissima inquit luxuriẽ quã sentitur, cum Ebori
 Cedroq; syluẽ exquirantur. Preterea quis potest negare, arborẽ ex qua tam celebres menfẽ cõ-
 stent, Togem, & Thyan, & Thyon a Theophrasto & Strabone dictam esse? Idẽ Plinius ex-
 ploratissimum nobis fecit: de Thya uero Theophrastus. Perpetuo, inquit, uiuret, arbor proce-
 ra, inter syluestres ferocina, ut nulla fere tardius germinet, algentissimis locis, & cacuminibus
 montium gaudens, circa Hammonis delubrũ præcipua nascens, & in inferiore Cyrenaticẽ par-
 te, atq; ubi ipsa tunc esset, ramis, caudice, frondibus, syluestri Cupressò similis, ex ea ueterum
 temporum contagiones fuisse, immortali post Cupressum in tecta materie. Nihil radice cris-
 pius. nec aliunde preciosora opera. Siccata mari, duricie & maturitate incorrupta spissari tra-
 dunt, nec ullo modo uehementius. Homero quoq; notam fuisse, inter odores uri solitã a Cir-
 ce, magno errore eorum, qui odoramenta in eo uocabulo accipiunt. Cum præsertim eodẽ ue-
 su, Cedrum & Laricem nomen, ut manifestum fit de arboribus tantum loquutum. Nam &
 Calypsius, & Helens thalamos, & Thyia cõditos, idẽ poeta cecinit. Quid habet Citrus nostras
 cõmune cum Cupressò, frõdis Cupressò, Iuniperi sabine, Cedri, Citro, Lauri, Adrachnes,
 Arbuci? Quid tam diuerfum, q̃ Galbulus, & Citreum? Omitto alias notas. Quibus perspicuo
 liquere potest uolentibus, decipi gramãticos, quicunq; menfas citreas ex hac citro, quã nunc
 habetur, facitatas arbitrantur. Dion certe historicus, Neronis uita, non citreas, sed cedrinas
 menfas appellauit, siue cedro potius q̃ citro similes esse uiderentur arbores, siue q̃ in exem-
 pli uitium est. Erit ergo Thyia, siue quod idem est, Trogetes, et Citrus duorum omnino generũ,
 ut constat. Vnum Cedri eius, ex qua menfẽ dolabantur. Alterum Citri eius, ex qua malum
 medicum. Plinius, alia inquit arbor eodem nomine malum ferens execratum, aliquibus o-
 dore & amaritudine, alijs expetium, domos etiam decorans. Quod & sensisse Macrobius ui-
 detur. Hodieq; Mauritani malum medicam, & pomum eius Arrogĩ uocant, a Trogete uoca-
 bulo parum deflexo. Alioquin Trogeten, non quia mandĩ posset, sed caraniphrasin, q̃a man-
 dĩ non possit, appellatam censuerim: quandoquidem, ut dixi, ueteribus esculentũ non erat.
 In summa, non nego Malum quoq; Medicam in Mauritania fuisse, cum plena sint Poetarum
 omnia fere uolumina, sed ex qua menfẽ illẽ celebres existerent, malum medicam fuisse, hoc ne-
 go, & pernego, Nec dissimulandum tamen est, Phaniam Eresũ quinto uolumine de plãtis ce-
 drum appellasse, ac malum cedrium, pro eo quod nõs citrũ & citrium uocamus, & Dioscori
 dem secuti Cedromelon. Varro quoq; libycam Citrum nominat.

E X M. V E R G. C O M M.

DE Medicis, quæ Persica etiam hic uocantur, quoniam nostro orbi, & Græcia diu peregrinæ fuerint, & ex Perside in nostrum orbem transierint, illud primum testabimur, in appellationibus eorum, non Cedromela forte, sed Citromala, quasi Citria mala legendam esse uocem. Nihil enim Citro cum Cedro, & a Romanis Citria hæc uocari iam pridem receptum est. Nihil tamen mutamus, in cunctis enim græcis pariter legitur.

Quæ autem in Barbari Corollario longius narrantur, omnia ex quarto Theophrasti uolu-
mine, & Arsteneſis diſpernoſophiſtæ excerpta ſunt. Qui etiam quod uno aduerbio ab hoc *παρὰ
Μίλων* dictum eſt, pluribus conuertit. Nobis una ſuperſæctationis uoce indicare id placuit.

Sequitur deinde quod conceptus in hoc scriptore sit, quo loco statim a descriptione feminis legitur, *Αἰναιον*. At ἔτι τοῦτο ἐν διῶν ἀντιφωνῶν βασιλίῳ, tribuedū ne id sit femini, an pomo, utriq̃ enim neutri generis. Sed qd ad pomū pertinet lōgus in sermonis texture abest; qđ uero ad semen ppius, et quasi cōtigit. Plinius et femini, et pomo id tribuit. uerba eia hęc sūt. Citra cōtra ue nena in uino bibunt, uel ipsā, uel semē. Ceteri, inē quos Theoph. pomo eā uim tm assignat.

¶ De Pyro. CAP. CLXIX.

Pyrorum multa genera, quæ tamen omnia adstringunt. Adduntur conuenienter in repellentia cataplasmata. Decoctum e siccis.

ᠮ ᠨ

A

Theo.li.4. &
5.cap.5.

*

B

Macrobius li
bro. 3. cap. 19.

C & cruda ipsa aluum sistunt. Ieiunos esitata ledunt.

Pli. li. 15. ca. 15.

B A R B A R I C O R O L L.
Pirum, græci edomitam, siue urbanam Apion & Adiplon appellant, de quorū prouentu, Peloponnesus quoq; ipsa quandoq; dicebatur Apia. Licet quidā ab Apia Phoronei filia, rer-
ram eam ita nominatam putent. Poetæ sunt, qui Pirum Ochnen uocent, syluestrem Achrada,
ut mox dicemus. Apios & Rhaphani genus est. Turbinata Pirus omnibus figura, multis gene-
ribus. Alia parua ocyllimaq; & odoratissima, nominant Superba; in his crustumina, quæ grā-
tissima, & ex parte rubent. Et proxima his Talerna, ceterū largo succo habundantia: hæc Lactea
uocantur. In hisq; alia colore nigro donant Syriæ. Post hæc Decumiana, & ex his tracta origine
Pseudodecumiana. Dolobelliana longitudine pedali. Pomponiana, cognomine mamosa. Li-
ceriana seueriana, & quæ ex his nata sunt, Tyrāniana petioli longitudine distantia. Fauoniana
rubra, paulo Supbis maiora. Lateriana, siue laterisiana, ut Columella uocat et Macrobius. A-
nitiana, & autumnalia accidulo sapore grata, & quæ maxime Tiberio principi placuere Tibe-
riana. Colorantur hæc magis sole, grandescuntq; alioquin eadem essent quæ Liceriana. Acce-
dunt his Neufiana, Turanianaq;. Atq; hæc auctorum suorum nomen habent, præter Supba, &
Phalerna. Patrias nobilitauere quæ sequuntur. Serissima omnium Amerina, Piacetina, Numan-
tina, Alexandrina, Numidiana, Græcula, & his Tarentina. Signina, quæ alij a colore Testacea
appellant: sicut Onychina, ut quoddā pruni genus, Purpurea. Ab odore Myrapia, Nardina,
Laurea, Ordearia, siue ordeacea, a comitatu frugis eius. Acolō Anpullacea & Coroliana, &
brute gentilitatis Cucurbitiana. Acidula a succo, a melle Mulsā. Incertā omnium ratio. Barba-
ricis & Venerijs, quæ colorata nuncupant. Itē Regijs, quæ minimo pediculo quasi sessilia sunt.
Iā patricijs uocanturq; uiridibus & oblongis. Dixit & Volema Virgilius a Carone supra. Vo-
lemiū, uocat Macrobius, qui & ceritium, & ceruisiū, & calculosū, & lollianum, & Lauiniū, &
Milesiū & Myrteum, & Orbiculantū, & Preciantū, & Rubile, Tulianū, Ticianūq;, itē Mespilace-
um, et Valerianū indicauit, Cloatiū secutus. Idē Cāro & Semētina, & Mustea quoq; nominat.
Ampullacea, græca, Laureā, ad hyemē usq; in parente pēdent. Seročina, et gelu maturefcentia.
Nam quæ Aristoteles Apē, Bloadas nominat, insitij generis intelligunt. Vini pprietas & Pi-
ro. Cōdunt hæc totidē qbus uua modis, non aliē, q; in cados. Vīno & aqua coquunt in escā
ægris, dāturq; pulmētarij uice, quod nō alia præterq; Coronea. In conuiuijs græcorū Pira fecit
dis mensis inferebant aqua mersa, ut mitissima, quæq; legi possent. Pira sunt & quæ Libralia uo-
cātur. Sed sola tamen e Piris Mala dici consueuerunt. Liquamen de Piris fieri statum, ad ie-
iunia sceminarum. Inuenio quod Castimoniale dicebatur. Pirorum quæ maturissima sint, car-
nibus integro sale calcatis & resolutis, atq; ita fistilibus picatis cuppis ue conditis.

Macrobius li.
3. cap. 19.

D

VERG.

Pirorum infinita pene genera, quæ ab antiquioribus rei Rusticæ scriptoribus tradita sunt.
Quod solū desiderari in hoc capite poterat, longissime in Corollario suo Barbarus profe-
cutus est: nos ideo nihil ultra de his agemus.

ex pto

De Pyraastro. CAP. CLXX.
Achras Pyrastri genus est, quod tardissime maturefcit. Vim Py-
ro adstringentiorē habet. Et ad eadem conuenit. Stringūt etiā
eius folia. Ligni Pyrorum cinis efficaciter his auxiliatur, quos fungi strā-
gulāt. Aiūt fungos si syluestria Pyra cum eis coquantur, innoxios fieri.

Victus antiq;
rū frugaliss.

B A R B A R I C O R O L L.
Achudō Pirum syluaticam, hoc est, Achrada, & apud quosdā, ut apud nos, et Pirastrū, ser-
tiliorē urbanā predicant, Hyeme fructificat fere, Autumno tū genus eius unū, ut Theophra-
stus inquit, materia ei apprime dura. Ideoque discos, tabellasq; sutorias, e Piro syluestri faci-
unt. qm ut in mollī retundiū, ita in duro ferrū acuitur. Aculeatos hæc habet ramos, ut Punica.
Quid autem Achyrades Heliano sint, quas in cibo primum Tirynthios habuisse memorat,
non comperi: Nisi quis nō Achyradas, sed Achradas, hoc est, Pira syluestria in eo legat. Nam
ut idem autor inq; ante panis usum, Argiuos esitasse Pira meminit, ut Athenienses ficos, Glā-
dem Arcades, Indi Arundinem, Carmani palmulas, Milium Sarmatæ, Terebinthum nasturti-
umq; Perse. Achyra certe paleam significat: nec uideo, q; sit uerisimile paleis quemq; uesci po-
uisse, quasi ueterinum, etiam si Arcadas radicibus herbarum, & arborum folijs recentibus an-
te glandis fagineæ usum a Pelago traditum; uiscitasse creditur.

De Mespilis. CAP. CLXXI.

Mespilus, quæ a nonnullis Aronia uocatur, spinosa arbor est, folio acutæ spinæ. Fert pomum suaue, exiguum, tribus intus offi-
culis. Qua ex causa id nonnulli Tricoccon appellauere. Tarde maturef-
cit. Esu adstringit. Stomacho gratum est. Aluumq; supprimit.

BARBARI COROLL.

Mespilorum tria genera, Setanium, Anthobon & Antehobides, quam et Gallicæ intelli-
gunt. Setanio fructus grandior, candidior, solutior, Acini molliore ligno, reliquis minor, sed
pstantior odore, & astringētiore gustu. Quo fit, ut diutius q; durēt. Lignū his flāmius, & spissi-
us. Flores oibus Amygdalæ, nō tñ rubētes, sed p̄modū herbacei. Arbor int̄ amplissimas, co-
mosa in girū, folio scisso, extremitateq; Apio simili, sed maiorib. diuisuris, p̄misso, rigēti, ner-
uoso, tenuiore & longiore q; Apii, lōgo & gracili pediculo. Radice alta, numerosaq;. Ideo lō-
gua ē arbor, a terraq; inextricabilis. Lignū densū, incorruptū, solidū. Semine et auulsioe serit.
Foliū anteq; decidat, uehementē adrubescit. Infestat et hęc uetmibus in senecta, q; p̄grādes ei di-
uersi q; ceteris cōtingūt. Nō fuit hęc arbor in Italia Catois æuo. Hęc Theoph. & Plin. Verū a-
lia hęc Mespili distinctio ē, q; a Dioscoride rep̄stata ē. Et sane dubitari solet, an Mespilū ueteres
cū Sorbi arbore cōfuderint. Quādoq; dē altissimis cōnumerat, q; certe Sorbo q; Mespilo nūc
uocant, magis cōueniūt. Nisi q; nostratū Mespilū, nō tā Mespilū, q; Chatemespilū appellandā
fortasse cōseat, quæ nascitur, ut inq; Dioscorides, Italiæ uocata Epimelis, de qua sequenti capi-
te differitur. Certe Iulius Pollux, Mespila inquit, & Sorba quoque appellantur.

Quam genere neutro Mespilū arborem fecit, Theophrast. lib. 3. scēminino gñe descripsit.
Longius idem de tota hac arbore pomoz; eius eodem loco egit, quæ omnia a Barbaro
in Corollarium suum translata a nobis relinquuntur.

Illud tñ notādū, ubi de semine huius pomi agit, nō dicere Theophrastū claudere in se hoc
pomū acinos molliore ligno, ut Barbarus uertit, sed πυρῖνασ μαλακτέρον, quod est, nucleos
habere molliores. Toto enim genere differunt inter se acini, & nucleī. Et si in antiquioribus i-
dem utriusq; fuerit nomen, ut in Punica non multo ante dictum est.

Sciendū & illud, quam primū hic describit Mespili arborem peregrinam & incognitam Ita-
liæ nobis uideri, & sui generis arbore spinosam, & ut hic ait, Trigraniā, quæ nostrates Mespili
non habent, quinq; intus nucleis fartæ, & nullis spinis armatæ. Nostratem uero Epimelidem
ideo, ut nō credimus, a græcis dici, quod felicissime in Malo inseritur, & quasi ἐπὶ τῷ μῆλει, idest, in malo
adoptata creuerit, scēminino genere & diuturna forma, ἡπιμυλιδό dicta a græcis est.

Quod aut̄ diximus, esse nostratē Mespilū latiore umbilico, quodq; Barbarus, fundo in lati-
tudinem resimo, nō facile intelliget aliq;: nescio qd in pomis πημὴν .i. si uerbū de uerbo uer-
tas, fundus, significet, qua uoce ueteres græci, qd in sumo pomo umbilici descendit iudicaue-
runt, p̄sertim in malis, piris, sorbis, mespilis, alijsq; pene infinitis, in qbus cauum, & ueluti la-
cuna descendens, lanugines in ea, floccosq;, & floris postquā defloruit inutiles reliqas ostēdit.

Et quoniam descendit, & quasi in doliolo fundum facit, idest, πυθμὶνα, & quod humani um-
bilici modo cauum est ὑμφαλόν etiam græci uocauerunt, nos umbilicum igitur uertimus.

Quod aut̄ a Barbaro dictū est Resimo, in Diosc. nō legit, etsi ea est umbilici i Mespilo figura.

De Setanijs. CAP. CLXXII.

Alterū Mespili genus in Italia nascit̄, qd aliq; Setaniū, aliq; Epimeli-
da uocat. Arbor folijs Mali, sed minoribus. Pomū fert rotundū,
esu aptum, ima parte latius. Quod adstringit, seroz; maturefci.

Mespilum Setaniū a Theophrasto nominatam, Dioscorides Epimelida uocari scribit. Hip-
poc. Amamelida. Galenus Mespilum, cōmuni uocabulo Tricoccon, quasi Triossum, aut
Trigraniū ab aliquibus appellatum meminit: quoniam tria intus grana, siue ligna, fructus
habeat loco seminis. Quid autem sit Epimelis Galeno, differendum putauimus in Arbuto.

De Loto arbore, seu Faba græca. CAP. CLXXIII.

Lotus arbor est uastæ magnitudinis, ferens baccam pipere maio-
rem, dulcem, graui odore, stomacho facilem. Aluum sistit baccis.

A

μίσπιλος

Theo. li. 3. ca.

22. Plin. li. 16.

ca. 20. li. 23. c. 7

VERG.

B

BARB.

λωτός

D I O S C O R I D I S

C Rametorum ligni decoctum, siue potu, siue infusione dysentericis, ac foeminis fluctione uulug laborantibus, auxilio est. Ruffat capillos. Citam aluum cohibet.

Theo. lib. 4.
cap. 10. Plin.
lib. 16. cap. 31.

Homerus Odyss. 1.
Strab. lib. 17.

B A R B A R I C O R O L L.

Lotus arbor (nam & herbae sunt hoc nomine complures) in latino Celtis uocatur, itemque traba graeca. Seruius Fabam Syriacam. Nympha in arborem sui nominis conuersa, quam Priapus fugientem comprimere quaesisset. Anacacabeam uulgo apud graecos dici, autor est Aetius, ut fructum eius Anacacabon, licet quidam peruerse, Alicacabon scripsere graeci, Piri magnitudine, aut paulo infra. Incisura folio crebriores, alioquin llicis uiderentur: spissa, nigra, enodi materie. Differentiae generum plures, earumque maxime fructibus constant. Amplitudo Fabae pomo. Color Croci, sed ante maturitatem ut in uuis alius atque alius. Nascitur in ramis densum myrti modo inter sese aduersum, non ut in Italia Cerasij. Manditur inter Lotophagos in nocua dulcedine, suauitateque: nec uentris sentire morbum ferunt qui uescantur. Iucundus meliusque sine interiore nucleo, qui in alterutro genere osseus uidetur. Vinum exprimitur huic simile mulso: quod ultra denos dies negat durare Polybius. Sunt qui biduo triduoque aclescere id scribant. Baccas eius confusas cum nucleo & callo suo, dolijs ad cibos condunt. Vnde uulgo Romae, puls Tyriaca uocat arbor illa modo. Nam Padi accolae, baccam syriacam appellant. Tanta uero fructus & arboris copia narratur, ut exercitum Ophelli, Carthaginem petentis, in comituum defectu pauperit. Numerosa in Pharide insula Lotophagorum. Plurima et in Aphrica nos spectante. Familiaris & Italiae: sed natura coeli terraeque mutata, & succos oblita priores. Praecipua est circa Syrtes, atque Nasamones. Sunt qui breuem tradant arborem, ut Polybius, qui & uidisse se testatur spinis asperam, folio uirenti, quale rhamno, tantum profundiore latioreque, fructu myrti candida per initia, processu puniceo, magnitudine oliuae, sed rotundo: cum cibo familiae tundi cum nucleo, qui perexiguus ei est, seruari conditum. Eundem nucleum herilibus mensis eximi. Saporem fici & phoenicolobani esse pomo, sed praestare odore. Vinum & acetum inde fieri. Lignum ceram ad tibiarum cantus expetitur, e radice cultellis capillos & subscudes, ac breues alios usus excogitant. Hesperidum Lotos, ab ea quae Lotophagis nascitur distat: ut qua ligni uice utantur ad urendum. Non desunt, qui fructum eius post putamen esse, nec carnosum foris, sed cuticulaceum prodiderint, nec tam cibo dulcem, quam gustu alias iucundum: ut hinc fortasse Dioscorides maiorem Pipere descripserit. Ac fructus quidem lotophagis dulcissimus, sed materia Cyrenaicae praefertur. Radici nigricia maior quam ligno: sed densitas minor, quam in Loto post Buxum & Hebenum summa redditur. Utilitas quoque radicalior. Particularim Lotus fructificat, non ab utroque sui germine: quod & in bulbi & tithymali quodam genere notatum est. Ludicerae Tibiae fieri coepae sunt e Loto, quas Alexandrini Phoringas appellant. Sicut ex asininis quoque ossibus, & argento ebur quoque ceptum peritundi. Vnde Tibiae elephantinae dicantur, reiectis propter nimiam difficultatem harundinibus. Propterea Cenomani, Lotum arborem hodieque appellant Calamum. Spectatur Patavum antiqua Lotos, in quadam Anoniani templi xylo. Est quando Hippocrates Luton pro Luto nominat. Circa Memphim, nemus a Theophrasto describitur, fuisse tam uastis arboribus, ut excederent trium hominum amplexum, utiles operibus, colore densitateque persimiles Loto, nam Fabae, siue arbor pontica, genus diuersum est a Fabae graeca, id est, Loto, magnitudine Fici, fructu fabae, succo uestibus expresso, quem Achy uocant: niger autem crassusque est. Aut per se lugentes, aut mixto lecta uiscitant. Nascitur in Scythia.

E X M. V E R G. C O M M.

VAgum est per herbas & arbores aliquot Loti nomen, ut libro. 4. docebimus: ob eam causam, nos capituli huius titulo arborem adiecinus. Monente id scriptore hoc, qui Loton arborem ait, plantam esse. &c.

Multiplex, longaque est arboris huius in Theophrasto & Plinio historia. Nos eam relinquimus in scriptoribus illis, & Corollario Barbari uolentibus legendam.

ῥαβδίου δὲ καὶ ῥάβδου, ruffat capillum, ut nos reddidimus, cum tamen uetus lectio aliud habeat, si ex eo caput lauetur, capillorum casum prohibere: nec ego detulissim huic lectioni aliquid, nisi Plinius lib. uicesimo quarto, cap. 2. idem his uerbis docuisset, Rameta ligni decocta. &c. cohibent & capillum. Suspiciamus itaque uitium esse in uerbo illo, ῥαβδίου. Communem tamen lectionem secuti, nihil mutauimus.

De Corno. CAP. CLXXIII.

Cornus dura arbor est, baccas ferens oliuæ modo oblongas, quæ primū uirent, dein per maturitatē rubescunt, aut cæra colorē re presentant. In cibo adstringūt. Profluuiū alui, atq; dysenteriaē salutare, si ue in edulio, siue in cibis exhibeantur. Muria ut oliuæ condiunt. Sanies quā uirentia folia torrendo resudarūt, impetigini cōuenienter illinitur.

B A R B A R I C O R O L L.

Cornus Craniās à Theophrasto dicit. Sexus in ea duplex. Fœminā, Græci Thelycranīā uocant. Fructus syluestris maturiores, suauioresq; q̃ urbanæ: quod in hac & Sorbo peculiare ferre est. Cornus altera præcox, solsticio fructificans: altera post autumnū, cui & fructus ingustabilis, lignum infirmū, hiansq; ac fungosum, quæ fœmina intelligitur. Contra masculæ firmissimum. Fœmina uticulas paruas a lateribus emittit, ameyinæ modo Salicis, in totūq; fructiflor est, mollis & medullacea, uenabulis damnata. Materies masculæ robusta, solida, excorsq; tota, hoc est, sine medulla, & cornu instar, prædensa & ossæ. Nodos Cornus ois habet per interualla geminos, & inuicē respondētes, ut in Vitice. Foliū Amygdalæ, sed pinguius & crassius, cortice neruoso ac tenui, caudice nō admodū crasso. Mas duodecim fere cubita excedit: quā altitudinē Sārissæ Macedonū amplissimæ habent. In Ida mas sterilis, fœmina fructifera. Fructū apud Macedones ambæ ferūt, sed fœminæ (ut diximus) qui mandī nō possit. Radices ut Amerina, firmas & contumaces emori. Humidis locis auulsione, semineq; prouenit. Est & in India arbor, ferens fructus similes Cornis, quæ merito Cornus Indica nominari possit.

Diximus fortem & speciosam arborem Cornum esse: sic certius indicantes, quod in græcis ἀδρὸν est, quibus ea uox τὸ ὑπερπλοῖον, id est, pingue & feliciter nutritum, ex eōq; cum decore ualidum & forte, qualis Corni materia, & ob id uenabulis apta.

De Sorbis. CAP. CLXXV.

Sorba colorem malorū referentia, priusq; maturescāt, dissecta, & sole siccata manduntur, ut aluū sistant. Eadem est functio molitorū farinae, si polentæ loco sumatur. Quod & decoctū eorū in potu præstat.

B A R B A R I C O R O L L.

Sorbo syluaticæ, præstator q̃ urbanæ fructus, qd in hac & Corno præcipuū Theophrastus notauit. Arborē Græci Oen, & Oien, fructus Oa & Va uocāt. Fœmina fructificat sola. Discrimen in fructu, q̃ aliæ figura orbis, aliæ oui ferunt. Itē in succo. Aliæ odoratiore dulcioreq; ut orbiculati fere oēs. Aliæ acidū peiusq; olentē, ut ouales. Vtriq; folia pediculo singulari prolixo, neruaceo, condita in uersus, alæ modo a lateribus emicantia, tanq; ex oibus unū fiant, lacinij pennatim, ut in filice, ad neruū usq; diductis, ampliusculoq; diuisis interuallo. Atq; hæc non paulatim ut cæteris, sed uniuersa collabunt. Omnibus ramulis in extremo pediculi foliū prominet, cuius accessione impar numerus efficit. Figura his lauri, tenui folio, præterq; q̃ serrata per ambitū, breuioraq; sunt, neq; cacuminibus mucronatis, sed in rotunditatē reuulsis. Flos racematim coactus ex pluribus candidis ac minutis, petiolo unico dependet. Fructus cum large prueniūt, uix modo, facti congestiq; uisunt, ex uno petiolo faui spēm p̃bentes. Exest eos uermiculus etiānum crudos acerbissimosq;. Ipsa quoq; arbor in senectā uermibus obnoxia, rufis, hirsutis, sui gnis. A trimatu fert. Autūno folijs subinde amillis Cachryn suā fundit, eduratā hyeme: ut in Robore. Aculeos Sorbus non habet, ut mespilus. Nouella, cortice leui, pinguisculo. Flauer e candido, anōsa scabro, atroq;. Arbor ipsa de grandibus & subrectis, comacinnata: & nisi qd impediāt, uerticē nucis Pineæ representās. Materies solida, colorata, firma, cōpactilis: radicibus neq; multis, neq; in altū defixis, ualidis tamen & crassis, auelliq; difficillimis. Nascitur semine, radice, auulsione, solo aliofo, humecto, interimq; montibus. Conduñ sapa Catonis p̃cepto. Nostri differentias in Sorbo quatuor nouere: alijs rotunditatē malī reddūt: alijs turbinē piri, utriq; sapore uini gñouissimū, cui circa pediculos folia: alijs ouata specie, odore acri, nec pinde iuctūda suauitate. Quartū genus Torminale appellāt, ualens cōtra tormina: hoc afflictiū prouentu est, minimūq; p̃pomo, arbore dissimili, folijs fere platani.

Longa est arboris huius & pomi in Theophrasto historia. Nec breuiter Plinius de eadem legit. Res etiam ipsa de quotidiano spectaculo satis nota est.

A
npariaPlin. lib. 15. ca.
26. 28. 48.
Theoph. lib.
2. cap. 12.

V E R G.

B

vix

T

Theophrast.
lib. 1. cap. 12
Plin. lib. 15. ca. 26.

V E R G.

C Quo fit, ut magis Barbarū demiremur, tā incerta de pomo, arboreq; hac in Corollario suo docentē. Optrandū profecto hoc loco erat, græca nouisse oēs, ut collatis cū Theophrasto ab eo dictis, imperfectā hoīs interpretationē cognoscerent: in qua nescio, credendū ne magis sit, qd obiter ea uerterit, an potius, qd morte præuētus, fartā tectāq; rem ostendere nō potuerit.

¶ De Prunis.

C A P. CLXXVI.

περικιμάλει

Prunus arbor est nota, cuius pomum estur. Sed stomachum male habet. Aluum mollit. Syriaca Pruna, & præcipue quæ Damasce gignuntur, exiccata stomacho utilia sunt. Aluum adstringunt. Folia Pruni in uino decocta, gargarizatu uuam, gingiuas, & tonsillas fluctione laborantibus reprimunt. Præstant idem syluestrium Prunorum baccae, post maturitatem exiccatae. Cum sapa uero decocta stomacho utiliores redduntur. Aluumq; magis adstringunt. Gummi Prunorum agglutinat. Potum in uino calculos comminuit. Ex aceto quoq; illitum, impetigines infantium sanat.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 15. ca. 13.
lib. 13. capi. 5.
Theoph. li. 3.
cap. 16.

P R U N U S C O C C O M E L E A C O C O M E L O S

Prunus, Coccomelea, & Cocomelos græce dicta. Pomū ipm neutro gñe. Arborē masculi
no media comœdia pñunciat. Folio Arbui describit̃, si Theodorus audiat̃. Et inter paruas, ut
peculiare in ea Theophrastus reddiderit, fructū in lanuginē solui, quæ dicat̃ Pappus : qđ nulli
aliȝ arbori eueniat. Sed hoc Plinius, Theophrastū secutus, non pruno, sed coggigryæ uocata
tribuit. Decepit hominē uel corrupta lectio, uel nominū affinitas: forte q̃a cocomeliā, non cōe
comelam scribendū erat. nā & Vnedo, cui similis est Coggigrya, nelix nomē apud Theophrā
stū habet. Prunū syluestre Virgilius Spinū uocauit, eo uersu. Spinos ai Pruna ferētes. Genera
Pruni ppe inexplicabilia. Versicoloria, nigra, candida: quæ a cōitatu frugis eius hordeacia di
cātur. Alia codē colore, seriora, maioraq̃. Asinina cognōiata ob uilitatē. Sūt & Onychina Co
lumellæ, nigris laudatoria. Sūt Cerina, siue Cereola, atq̃ Purpurea, necnō Armeniaca, de quī
bus dictū. Habent & insita Nucipruna, q̃ in facie parentis succū adoptionis pferunt, Nucipru
naq̃ uocant̃. Hęc & Cerina & syluestria ubiq̃ nata, ut uuæ autūno cadis usq̃ ad alia nascētia
conduñt. Reliquorū uelocitas transuolat cito marcescentiū. Non pridē, ingt̃ Plinius, in Betica
malina appellari cōperit̃ malis insita, & Amygdalis, intus in ligno nucleum amygdalæ, nec ali
ud pomū ingeniosus germinatū est. Damascena, e Damasco Syriæ, iū pridē ante etatē Pliniȝ, in
Italia nascēbātur, grandiore q̃q̃ ligno, & carnē exiliore: nec unq̃ in rugas siccata, quādo soles
sui desunt. Populares iȝ Myxæ, de gbus in Aegypto & uina sunt. Familiares & ipsæ Italię, uel
Sorbis insitæ. Amariora prunis Myxa, ut similia Paulus existimat. Nā myxa Græci uocāt, nō
myxas. Quibus similis est Perficus ægyptia, nisi q̃ poma ægyptiæ rubescit. Pruna oīa post Co
ronē in Italia cœpisse manifestū est. In syluestribus, satiusq̃: Prunis limus est arborū quē Liche
na Græci uocāt. Est & sua Prunus Aegypto, magnitudine insigni, nō dissimilis Spinę Syriæ, po
mo mespili, ligno intus grādi ac rotūdō, Florere incipit mēse fere Iulio: maturefcit bruma, nec
folia dimittit. Corpus ipsum pomi natura, copiq̃: pro messibus est incolis. Siccātū purgatūq̃
fundit̃, seruātq̃: eius offas qui Thebis habitat̃. Mirat̃ Galenus Dioscoridē, q̃ Pruna Damasce
na sicca aluū sistere p̃diderit, cū perspicuo soluāt. Qzq̃: minus ingt̃, q̃: Hiberica uocata: qm̃ pri
mū ex Hispania uenerūt, ut ingt̃ Aetius, succi dulcioris. Ceterū Damascena intelligit̃, q̃ Theo
critus Brabyla uocauit, quę & Madrya, & Badrya dicunt̃ Athenæo. Prunus syluestris, ut idem
uictor est Galenus, in Alia Prumnon dicitur, & nos ea uulgari uoce Prumnulā uocamus.

E X M. V E R G. C O M M.

Certiora, & ex re magis de Prunorū uiribus post Dioscoridem alij tradiderūt: demiraturq; hunc Galenus lib. 2. de simplici medicīna, dicētem siccatis Damasceñis Prunis compesti aliuū, cū manifeste & hæc desiciant, sed minus q̃ alia. Vnde nō male suspicabitur aliquis, quod in cunctis græcis legitur, τὸ δὲ ἀφ' ἑκκα τῶν φύλλων, &c. quod est, foliorum decoctū potuisse quon- dam aliter legi. Nā præter aliorū decreta, qui fructuū hoc tribuerūt, res ipsa id exigere uidetur. Nihil tamē in cōmuni omnīū cōdicum lectiōe & fide mutatū a nobis est, & quā forte hic locus exigebat castigationē, ad ea q̃ statim sequunt manifeste trāstulimus. Quod em̃ in hoc scriptore passim legiτ τὸ δὲ ἀφ' ἑκκα τῶν φύλλων ἔστιν ἐκκαζόμενον, non ἐκκαζόμενον, i. p̃paratū, q̃d nullā habet

hoc loco significationem, sed διακυσόμενον, quod colluere significat, legendum est: id omnium probatis. mihi codex habet. Et Paulus Aegineta, de his ipsis libro 6. agens, ait, τὸ δὲ ἐμφυμαὶ αὐτοῦ τὰς κατὰ γαργαρίωνα φλεγμονὰς ἰστέαι διακυσόμενον. quod est, Prunorum decocto gutturis inflammationes collui. ut sit in Dioscoride sensus, collui & gargarizari decocto illo fau-
cium mala ab ea multa deinceps numerata.

De Arbuto.

CAP. CLXXVII.

ARbutus, siue Vnedo, arbor est Coroneæ malo non dissimilis, tenui folio. Cuius fructus Pruni magnitudinē implet, nullo intus nucleo. Huic Apomacolæ cognomen est. Maturus aut flauet, aut rubescit, in esu acerosus. Stomacho aduersatur. Capitisq; dolorem mouet.

BARBARI COROLL.

ARbutus græce, Comaros dicta, cortice deciduo, tenui, similitudine tamaricis, folio inter illicem atq; Laurū. Arbor ampla non est. Flores Iulio mense, ab uno pediculo cacuminibus racematim dependent, similes baccis longioribus myrti, neq; foliosi, sed concaui, ceu ouū pertufo uertice. Cum deflorescunt, parte qua sunt annexi perforantur, relabendoq; in pediculū, speciem uerticilli fuso injecti præbent. Fructus anno perficit, cibo idoneus, ut pariter floreat subnascens, & prior coquat. Carbones officinæ argentariæ cōmendant coctione prima, ut ariā. Pomum hoc, & Comaron, & Memecylon Græci fere uocant. Latini pomū & arborem quoq; ipsam Vnedonem, & Arbutū appellant. Sunt qui duo genera constituent, Theophrastū, ut arbitror, secuti. Comaron, id est, Arbutū: & Mimecylon, id est, Vnedonem, a Theophrasto Ne-
lian uocant, defluo & hoc cortice, folijs quoq; sed ima tantū parte deciduis, uirente perpetuo coma. Mas sit, an foemina sterilis, nō constat. Arbor ipsa fruticosa. Pomū inhonorū: ut cui nomen ex argumento sit unū dumtaxat edendi: uel fortasse, quia solū hoc pomorū simile fructui terræ gigni, hoc est, fragis terrestribus e quinque folio frutice nascētib;: quæ & Mora terrestria dicunt a Seruio grāmatico. Nec satis scio, an recte. Ideoq; mōtana Fraga nominant a poetis, ut a terrestribus distinguerent. Galenus & Paulus Arbutū comaron, Synedonē uero, siue ut ipse lego, Vnedonē a rusticis Italiæ uocari scribūt, quā Epimelon, & Epimelida Græci nuncupant. syluestris mali genus, copiosum in Calabria, fructu acerbo, & infesto capiti & stomacho. Sed siue aliud hoc sit ab eo, quod Dioscorides inter mespila connumerat, & Epimelida meminit uocari, siue idem, certe Palladius Epimelides, siue Hypomelides inquit, sunt poma Sorbo similia, mediocri arbore nascentia, flore candidulo, sapore ex acri dulci. Pamphylus Apimelida Piri genus arbitrat, quod alij uocant Amamelida. Quidam Homomelida: frequentē in Ionia, & biseram, fructu Piri, sed sui generis. Omnino, ut Athenæus inquit, prædulci & sine nucleis, ac prælato piris. Alij Omomalidas uocant, ut Asclepiades, non pira, sed mala syluestria & montana: quæ Theocritus Oromalidas appellauerit, cū sicū maturefcentia. Amamelides, inquit Galenus apud Hippocrate, mespili genus est nascentis in Italia. Ex quo facile colligit, Amamelidas ei esse, quæ sunt Epimelides Dioscoridi. Mirū, qd eius usu, mulieribus lac cieri tradidit Hippocrates. Autores sunt, quinquagenū cubitorū altitudine, in Arabia esse Arbutos. Similis Comaro est & Adrachne, quā oēs fere Græci, Portulacæ noīe interpretantur falso: cū illa sit herba, & Adrachne uocet, unius literæ diuersitate. Theodorus, apud nos arbore Portulacā uocauit, ut a Portulaca herba distingueret, eruditius, q; felicius. Ceterū Adrachne est syluestris arbor, neq; in planis nascentis, similis Vnedonī, fructu & folio tantū minore, & nunq; decidēte, præq; ab imo. Cortex exciduius, & scaber quidē, sed qui circumgelatus uideri possit, tā tristis aspectu est. Qzq; in Theophrasto, nō περιπυγνυμένον, hoc est, circumgelatū, sed περιπυγνυμένον, hoc est, rumpentē se per ambitū legat. quod & Theodorus quoq; sequit. Alibi quoq; Theophrastus, φλοπαγία, hoc est, corticis abscessus, Platano & Adrachnæ cōe inquit est. Sed lectionē Plinij uerorem puto: quia corticē excidere huic arbori propriū nō est, sed ad alia quoq; plura pertinet. Liberū tamen sit æstimantibus hæc iudiciū. Corticem quoq; candidū, Theodorus ei reddidit, quia leucon, ut arbitror, legebat. Ego lepron, id est, squarolum, scabrūq; lego, Pliniū secutus. In Helicone arbore hanc Pausanias enascei tradit frequentē. Etiam Andrachnū uocari credit. Magnitudo arbori nō præcipua. Illud cum Subere habet peculiare, detracto in orbē cortice, nō emori: quod ueteres latini, cingere arbore uocabāt: actione instituta cōtra eos, qui ita de glabressent, & balteū exemissent, Arborū furtim cæsarū, eadē causā, qua legis aquilix. Germi-
nare cum Urbana Theophrastus eā scribit: Nec de urbana qualis esset inuenio, nisi quod mi-

A

κόμαρος

Pli. li. 15. ca. 14.

B

C nime uerū puto, herbā intellexit Portulacā. Inter biferas hæc arbor, priorē fructū, incipiente putrescere uua, peragit. Posteriorē, hyemis initio, siue ut Theophrastus inquit, priorem cū dulcescit uua, posteriorem cū floret. Adrachne usus foeminis, ad opus telarū. Similis huic Apharca. Plinius Aparachem uocat, e syluestri gñe arborū, æterna fronde, olympo monte frequens, nec nisi montibus nascens. Habetur & urbana. Vtrūq; genus simul germinat, & ut Adrachne biforum, septis uallisq; utile, sed urendo quoq; predicāt. Differt Connaros a Comaro, ut in Paliuri mentioe diximus. Testandū est & illud, grāmaticos græcos esse, qui fructū Arbuti, Acylon uocari credant falso, cū Memecylon eum dici constet: Acylon uero ligna glans sit.

De Amygdalis.

C A P. CLXXVIII.

αμυγδαλι

A Mygdalæ amaræ radicum decoctū, uitia cutis in facie corrigit. Illitæ nuces idem munus præstant. Menses admotæ ciunt. Capitis dolori auxiliatur, illitæ fronti, aut temporibus cum aceto, uel rosaceo. Epinyctidas sanant ex uino. Item putrescentia ulcera, & quæ serpunt, & morsus canum cum melle. Earum autem esu dolores finiuntur. Aluum emolliunt. Somnum faciunt. Vrinam cient. Contra sanguinis reiectiones cum amylo assumuntur. Renum uitij, et pulmonum inflammationibus ex aqua in potu, aut eclegmate cum resina terebinthina dantur. Calculosis, difficilique urinæ in passo auxiliantur. Et illinctu cum melle & lacte hepaticis, tussi, & inflationibus coli, nucis Auellanae magnitudine. Quinis, septenisue præsumptis, ebrietatem non sentiunt potiores. Vulpes, si cum quauis esca eas uorauerint, emoriuntur. Gummi eius, calfacit et adstringit. Reijcientibus sanguinem, potum auxilio est. Impetigines quæ summum corpus occuparunt, illitum cum aceto tollit. Tussi uetustæ cum diluto uino potum medetur. Calculosis cum passo bibere prodest. E nucibus græcis dulces cibo idoneæ, sed multo minus ualent in remedijs quæ amaræ. Attamen extenuant, Vrinam ciunt. Recentium esu cum suo putamine humida stomachi uitia recreantur.

Pli. lib. 16. ca. 17. li. 17. ca. 18.

B A R B A R I C O R O L L.

A Mygdalæ flos, antequam folia (quod fere soli propriū inter arbores tribuitur) manat e trunculo. Lachryma ad nihil utilis. Proximū corpori operimentū, item summū, simile Iuglandiū, sed tenuius, nucleo dissimili, lato, callosioreq; . Mori uulpes earum pastu ferunt, utiq; si non contingat e uicino aquā lambere. Nihil æquæ degenerat, quæ Amygdalus. Ideoque aut plantā sæpius transferri, aut adultā inseri præcipiunt. In remedio est, & paxillum adigere, & lachrymā defluentem extergere, reliquo cultu omni perinde adhibito. Ex Amygdalo cinerem & lixiuiam probat, ut acerrimā. Ad fornaces, arteq; aliquas non incōmodo quoq; ligno. Amygdalā eandem esse cum græca & Thasia, Cloatius putabat. Alijs græca uidetur esse Iuglans. Columella tria facit genera libro sexto, Græcæ, Iuglandis, Amygdalæ. Amygdalus dulcis, si a pecore sit erosa, dicitur amarescere. Quemadmodū Amygdala nasci scripta possint, rei rusticæ libri docent, origine a Græcis orta: quod & ad alios quoq; fructus feliciter conuersum est.

* Pli. li. 13. ca. 8.

E X M. V E R G. C O M M.

S i huic, & Galeno, quorum decreta pro oraculo antiquis medicis fuerunt, credendum de uiribus Amygdalæ est, primam capitis huius partem, parum feliciter latinis Barbarus reddidit, dicens, amaræ Amygdalæ radicum tritarum decoctum, cutem in facie corrigere. Neque enim hic, si uerba eius omnia diligentius estimantur, illud decernit, sed quod Galenus lib. 6. de simplicis. Si accipiantur Amygdalæ radices, coquanturq; , ephelides foris impositas auferre: iubetq; non decocto Amygdalæ radicum foueri ea labe hominis faciem, sed decoctam radicis materiā ultio illi imponi. Quod primo lib. etiā Paulus Aegineta confirmat.

Alternat præterea, si melioribus græcis habenda est fides, Dioscorides, acetum, & rosa-

ceum, quo loco iubet in dolore capitis utroq; uti, non simul, sed alterutro. ⁷³ enim, quod uel; non ⁷³, quod &, significat intercedit.

Reliquit & Barbarus, quod alioquin Plinius monebat, & post Pliniū Serapion cōtra sanguinis refectionē, ultra amyllum cum mentha sumendas Amygdalas esse. Siquidem Plinius libro 23. cap. 9. his uerbis rem indicat, Et sanguinē sistunt, cum amylo & mentha: fuisseq; hanc lectionē Serapionis ætate cōmentaria eius indicant. Et nos plures ex melioribus Græcis uidimus, in quibus *μετὰ ἀμύλου καὶ κδνόςμον* manifeste adhuc legitur.

De Pistacijs.

CAP. CLXXIX.

Pistacia quæ in Syria gignuntur, Pineis nucibus similia sunt, & stomacho facilia. Trita cum uino contra serpentium ictus profunt, siue edantur, siue bibantur.

BARBARI COROLL.

Pistacea in nucū genere habentur. L. Vitellius, qui censor fuit, & hæc in Italiā primus intulit e Syria, cū legatus in ea provincia fuisset, nouissimis Tiberij Cæsaris tēporibus. Mox & in Hispaniā, qui cū eo militauerat Flaccus Pompeius eques Romanus. Venetijs hæc, Iudaico uico, satū seminis enata uidimus, folio maiore q̃ Lentisci. Marem in hoc genere accipiūt, cui sub corio uelut ossei longi uident latere testiculi. Nicander Colophonius Pistacia uocauit. Et alius Nicander Pistacia. Sunt qui Pistacia, ut Possidonius, Inuenio & Astacia scriptū in poetis. Athenæus auctor est, Terminthos, siue Terebinthos credi solita a nonnullis, quæ nunc Syri Pistacea uulgo appellant, foliorū similitudine, ut arbitror fallente.

EX M. VERG. COMM.

Male in omnibus græcis, præterq̃ in probatis, mihi codice legebatur, *πιστῆα τὰ μὲν γυνόμινε ἢ οὐρία*. Hic enim dicendi modus alterum sibi membrum & Pistaciorum genus exigebat: Quando, ut græcorum grammatici docent, semper τὰ μὲν, reddendum, τὸ δὲ est, non aliter q̃ si in latinis dicas, hic quidem, ille autem, semperq; præposita altera expectanda, & querenda altera pars est, quæ aliud, aut diuersum a priore illa aliquid ostendat: quod nullibi in hoc capite inueniri poterat. Fuitq; ut uideat licuit, uera & antiqua huius capitis lectio *πιστῆα ἢ οὐρία γυνόμινε*, facili in una tantū syllaba ad uirū lapsu. Idq; etiā Plinius lib. 13. indicat.

De Nuce iuglande.

CAP. CLXXX.

Nuces iuglandes sunt difficiles concoctu, stomacho inutiles, bilio sæ, capitis dolorem inferentes, tussientibus inimicæ, & uomitus ris ieiunis in cibo aptæ, Cum Ruta uero, & Ficus præsumptæ, uenenis resistunt. Nec minus si a ueneni haustu comedantur. Largius esitata tinas latas pellunt. Illinuntur mammarū inflammationi, abscessibus, luxatiscq; cum mellis exiguo & ruta. Cum cepa autē, sale & melle, canis, hominiscq; morui proficiunt. Tormina, cum calyce suo perustæ, & umbilico admotæ, sedant. Putamen combustum, tritumq; in oleo & uino, infantiū capite peruncto, nutrit capillum. Alopecias replet. Sistunt menses nucleis usti, si triti ex uino admoucantur. Iidem e ueteribus illiti carbunculis, gangrænis, & ægylopijs medentur. Alopecijs commanducati & impositi præsentī sunt remedio. Nucibus tussis oleum exprimitur. Recentes stomacho innocentiores sunt, & suauiores. Itaq; allio mistæ eximū acrimoniam. Liuios in corpore illitu tollunt.

BARBARI COROLL.

Caryon basilicon, id est, Regia nux uocata, fructificat autumno. Arbor Careæ græce diciatur. Notum in ea est, calliculacea tegumenta totidem, quot flores fuere, contrahi pediculo, singulisq; his singulas includi nuces, duplici munimento protectas, puluinato primū calice, mox ligneo putamine, quot modis & foetus in parente, hoc est, utriculo atq; uentre. Propterea Fescæ

A

πιστῆα

Pli. li. 23. ca. 8.

B

καρύα βασίλειον

Pli. li. 11. ca. 22.
28. Macrobi.
lib. 3. cap. 18.

D I O S C O R I D I S

C ninæ locutionis cōmites, & religiosas nuptijs, uerisimiliusq; hoc, q̄q; cadendo tripudium faci-
ant, elidendo uirginū puellarum clamore. Germinat hæc non cæcumine, ut maxima pars ar-
borum, sed lateribus impulso priore pululō. Quā forma & caudex totus, & prægrandes rami
crescunt. Hoc & Auellanae faciunt, & quibus germina in folium unū procumbunt uidelicet:
quia desit initium unde germen erumpat. Medulla nucis quæ in ligno ipso continetur, Isca di-
citur Aetio. Forte ut alia quoq; multa, deprauate a latinis id acceptum, quasi esca, quoniā pro
igniario & cauterio quoq; sit medicis. Mutari hanc in quercum senio, nōnulli produnt. Trans-
rulare Iuglandem reges e Perside, ob id regiae nuces appellātur. Caryon uero, a capitis graue-
dine, propter olacitatem uocatā, nemo dubitat. Et enim arborū ipsarum, foliorūq; uires, in ce-
rebrū penetrant, hocq; in cibis nuclei earū, minori momēto faciunt. Tinguunt cortice earū lanē,
& capillus ruffatur. Primū prodeuntibus nucleis, id compertū, infectis tractatu manibus, pin-
guescunt uetustate. Sola differentia generū in putamine duro, fragili, tenui, crasso, multiloco
simplici. Solū hoc pomū natura compactili cinxit operimēto. Nāq; sunt bifidæ putaminū ca-
rinæ, nucleorūq; illis quadripartita distinctio, lignea intercurstante mēbrana. Hæc arbor an fue-
rit in Italia Catonis æuo, nō constat: quoniā græcas nominat, quas quidā in genere Iuglandiū
seruāt. Sunt & Galbæ, siue Caluæ. Itē Prænestinae, ab eodē Catone dictæ: quas maxie laudat,
& conditas fistilibus in terra seruari uirides meminit. Postea Thasiæ, & Albenes pbari ceptæ.
Et Tarentinarū duo gñā, fragili putamine, & duro, quæ sunt amplissimæ & minime rotundæ:
quas a frangēdi mora Moracias, & Moracillas sunt qui uocent. Præterea Molluscæ, putamen
rūpētes. Macrobius, qui Persicū uulgo dictū Molluscā nucē esse putat, aperte hallucinatus est,
cū is nō de Persico, sed de nuce regia & Iuglādē q̄ sit e Perside cōuecta primū ad nos, Molluscā
intelligat. Nā a quibusdā Nucē persicā uocari tradit, Sueuī hoīs doctissimi testimonio fretus.
Thasiā quoq; nucē, atq; Græcā, Amygdalarū esse gñis, Cloatius existimat. Prænestinā Macro-
bius eandē esse cū Auellana, Varronis & Neui auctoritate meminit. Iuglans a iuuādo & glan-
de, siue quasi Iouis glans, literis intercisis appellatur: siue quasi diu glans, id est, Dios balanōs
Theophrastū uocasse Cloatius auctor est. Sed certe Dios balanōs Castaneā Dioscoridi signifi-
cat. Proinde nō parcius errauerit Nonius Marcellus, qui Iuglandē pro syluestri nuce interpre-
tatus est. Biferas Iuglādes, Siluaciano patauini agri uiculo prouenire satis constat. Fomites ex
hac nuce Mnecstor optimos fieri cum dixit, de Iuglande uidetur intellexisse.

E X M. V E R G. C O M M.

C Vr Persicas, & Regias Græci, Romani uero Iuglandes in genere nucum eas dixerint, quas
nunc priuatim Etruria gentēq; aliæ multæ nuces nominant, satis Plinius lib. 15, cap. 22, decla-
rauit, quare nos ea de re superfedebimus.

Barbari tamen superstidosam interpretationē nō probamus, qui quod hic *Ανταρτος* dixit,
nihil aliud significās, quā quod ægre in stomacho concoquitur, & quod Plinius difficiles conco-
ctu ait, residēs in corpore, & difficile transire dixerit, longiore q̄ decuit uerborū ductu, nec
satis apto uerborū intellectu. Quando aliud iudicio nostro est, ægre concoqui aliquid, & aliter
dicit residere aliquid in corpore, nec facile transire. Nec obstat, qd & Varro usus hac uoce est,
sed tamē quod aptius & certius in Dioscoride ad medicinā dici debuerat, desideramus.

De Nucibus Auellanis, C A P. CLXXXI.

N Vces Auellanae, quas & Leptocarya uocant, stomacho infe-
stæ sunt. Ipsæ tamen tritæ, & in aqua mulsa potæ, tussi ueteri
medentur. Tostæ, & cum exiguo piperis potæ distillationem conco-
quunt. Crematarum cinis cum axungia, aut adipe ursi perunctus, alo-
pecijs capillum reddit. Aiunt nonnulli, usta earum putamina, & in ci-
neris speciem redacta cum oleo, cæsiōrum oculorum pupillas infanti-
bus denigrare, perfuso sincipite.

B A R B A R I C O R O L.

N Vx Auellana, quā Græci Heracleoticā appellant, nostri Prænestinā, & Abellinā patriæ
uocabulo. In Asiā Græciāq; uenit e Ponto, propterea nunc Ponticæ, nunc Heracleoticæ di-
cūtur. Quo nomine Macrobius, Castaneas intelligi falso putat, Oppiūsecutus. Ponticas, sunt
qui & Alareas nuces cognominent. Inuenio & Alariā uocari, arborem unde iacula & hastæ fa-
ctitari sole-

νάρυα πινυκκ

Pli. lib. 15, ca.
22, Macrobi.
lib. 3, cap. 18.

atari soleant. Auellanae sunt ex arbore, quae Corylus dicitur. Has mollis quidem tegit barba, sed putamini nucleisque solida. Rotunditas contra, quam Iuglandibus. Umbilicus Auellanis, et in uentre medio. Torrentur ex cibus. Corylus neglecta comest in fruticem: quae si quis eam minus subluet, fructum meliorem & copiosorem ferre traditur: ut quae naturae suae proprietate fructuosa sit. Tonderi tamen, reserarique precipiunt: ita fructuosam reddi. Alioquin si arbore scire patiatur aliquis in corpulentiam & magnitudinem, alimentum omne sumptit. Florere negant hanc alique, sed floris uice quosdam in ea uillos erumpere. Huic simul fructus dedit, uue modo callus in nascit, magnitudine uermis grandiusculi pinguis, singulo pediculo copatilis: lulū uocant. Dehiscit uere ac defluit, cum folia emergunt, simili omnino sorte qua Carchrys in robore, abiete, ceterisque amentiferis. Sylvestris prius natura: quam hyemis patetissima, & montibus magna parte prouenit. Nec urbanae fructus magnopere in domibus plantior, folium urbani maius. Seratumque ambitu utique Alno simile, tamen latius. Coryli, alique nucem rotunda, alique oblonga ferunt. Candidiore urbanae, meliorem in aquaticis. Translati mitescunt sylvestres. Cortex sumus, tenuis, pinguis, & maculis albis uariis, materies lenta, praegraciles eius uirgaefequamantur, crassiores derase interpolantur. Medulla tenuis sufflata, quae dematur.

E X M. V E R G. C O M M.

Επερχομιν τοῦ ἐρχοματος, parum recte perfuso capite transtulit Barbarus. Neque enim ἐρχομα caput graecis est, sed anterior tantum capillata pars, si Galeno in anatomia credendum est.

De Moro.

CAP. CLXXXII.

Morus arbor nota est, cuius fructus aluum soluit. Stomacho inutilis est, & facile corruptionem sentit. Hoc idem praestat Mori succus. Decoctus autem aere uale, atque insolatus adstringentior redditur. Facit ad fluxiones, nomas, & tonsillarum inflammationes, addito melis exiguo. Sed inolefcit uis eius adiecto scissili alumine, galla, croco, & myrrha, item myricae semine, iri, & thure. Immaturo Mori poma siccantur, tulaque acinorum rhois uice obsonijs miscentur, ut coeliacos iuuat. Radicis cortex decoctus in aqua, et potus aluum resoluit. Latas uentris tineas excutit. His quoque auxiliatur qui aconitum hauserunt. Folia ex aceto illita, ambustis igni medentur. Tinguntque capillum, uitium & fici nigrae frondibus simul coctis in aqua coelesti. Succus foliorum cyathi mensura potus, contra phalangiorum morsus auxilio est. Feruifacit corticis, & foliorum iure dentes apertissime in dolore colluuntur. Radix circiter messeni incisa, facto in ambitu scrobe, succum emittit, qui postridie concretus inueniri solet. Is in dolore dentium efficax est. Tubercula discutit. Et aluum purgat.

B A R B A R I C O R O L L.

Moro succus in carne uinosus. Trini colores. Candidus, mox rubes, maturo niger. In nouissimis floret. Inter prima maturefcit & transuolat. Tingunt manus succo. Matura eluunt, acerbapiliu corijs folia eius in urina madefacta detrahunt. Minimu in hac arbore ingenia profecerunt, nec nominibus, nec insitionibus, nec alio modo quam pomi magnitudine. Mora differant Hostiensia, & Thufculana Romae. Autores graeci, Moru inserunt castaneae, phago, reebintho, piris syluestribus, malo, ulmo, populo, quae sit alba: unde candida nascant Mora. Nascunt & in rubis, multu differente callo: quae Maratha nominant ab Hippocrate. Quam corrupta fortasse lectio est, nec μαρὰ ἀπὸ βατοῦ, sed μόρα τὰ ἀπὸ βατοῦ scribere oportuit. E pomo arboris Mori Panchrestos stomatice, eade Arteriace appellata, pluribus modis fit. Neque est aliud oris, arteriae, uue, stomachi iucundius remediū. Hoc et uulnera ad cicatrice pducebat. Succus sic cato expellus pomo, multu saporu quae obsonioru cofert, ab Hippoc. Rho quae dictus. Mora germinatione priusquam in folia exeit, sinistra manu decerpi iubet. Futura poma Ricinos, siue ut quida legunt, cytinos graeci uocant. Si terrā si non attingere, sanguine sistunt alligati, quacumque parte fluat.

A

B

Pli. li. 15. ca. 24.
The. li. 4. ca. 2

D I O S C O R I D I S

C Ad hoc seruanti repositi, Materia utilis operibus, quæ flexu cõstet. Ideo furculas ex ea circosq; faciunt, ut ex caprifico q;q;. Itē nauibus tornacula, ut ex fraxino, ulmo, platano. Quanc̃e Plata no celerit putrescunt. Itē auriculas liburnicis, & testudines atq; firmamēta. Mora in Aegypto & Cypro sui generis habent, ut mox dicemus. E ficu Aegyptia et Cypria, Sycaminō gr̃eci pomū ipsum uocant, Sycamineā, & Sycean, & Sycen q;q; ipsam arborē Hippoc. Nā Aegyptia & Cypria Sycomoros, & Sycomorea dici fere solent. Media Comœdia, Sycaminō uocat et pomum & arborem, sed pomū neutro, arborē masculino gñe, ut apud Iuliū Pollucē notatū legi. Hip pocrates Morum arborem, est quando Sycen, & Moreon quoq; dicat: ubi uidelicet radicem Syces, primo de foeminarum incõmodis uolumine requirit, ut Galenus interpretat. Inuenio & Modon scriptum in Hippocrate, pro Moro, nisi fallor, culpa librariorum.

De Sycomoro. C A P. CLXXXIII.

SYcomorum aliqui etiam Sycaminum, idest, Morum uocant, cuius fructus Sycomorum etiam propter inefficacem gustum appellatur. Arbor est magna, fico similis, frondosa, multo lacte abundans, folijs Mori. Pomum ter aut quater in anno fert, non ramis ut ficus, sed caudice ipso, caprifico non dissimile, dulcius grossis, sine granis interioribus. Quod nō maturefcit, nisi ungue, aut ferro scalpatur. Nascitur plurimum in Caria, Rhodo, locisque non multū tritici feracibus, ubi prouentu fecundo iuuamentum adfert, cum annonæ caritas premit. Pomum aluo utile est, sed nullam præbet alimoniam, Stomacho aduersatur. Succus tenera arbore antequam fructum ferat eximitur, lapidis ictu summo cortice desquamato. Si enim alio re plaga uioletur cortex, nihil effluet. Spongia, aut uellere lachryma excipitur, quæ siccata & in pastillos coacta reponitur. Vis succi emollit. Vulnere conglutinat. Discutit collectiones coctioni repugnantes. Bibitur etiam, aut illinitur contra serpentium morsus, duratos lienes, stomachi dolores, & horrores. Celerrime pomum teredinem sentit. Gignitur & in Cypro arbor genere distans, quod Vlmus esse uideatur, folijs Sycomori, fructu Pruni crassitudine, multo dulciore, supradictis cætera similis.

B A R B A R I C O R O L L.

Macrob. li. 3.
ca. 20. Plin. li. 13.
capite. 17.

Humor hu-
morem siccatur

Ficus Aegyptia, siue Morus, quam, ut Celsus ait, & Morosycon appellant. Fructum hanc nō caudice, sed ramis fere qdam falso tradunt: cum ueriores sint, qui utroq; nasci prodant. Magnitudo, aspectusq; pomō fici, succo tñ & sapore caprifici. Sed dulcedo copiosior sine granis interioribus, scalpēdo tñ ferreis unguibus, nec aliē maturefcit. Quod cū factum est, quarto die decerpitur, alio subinde atq; alio subnascēte terno, ita ut etiam septeno numerosa partu p singulas æstates, multo lacte abundante. Subnascit etia si non scalpatur, quater æstate, priore impellendo factū, q sitimaturus. Arbor nostrati Moro similis folio, magnitudine, cõspectu. Materies int̃ pauca utilissima. Cæsa statim uiret. Siccatur mersa incilibus atq; stagnis. Cū fluitare cõperit, tempestiua opibus intelligit, ablato ita pondere, ac soluta. Id probe inueteratē signū habent: uidelicet alienus humor, alium eius omnē rigando suggit. Huic similis est, quæ uocat cypria Ficus, in Creta. Nam & ipsa trunco pomū fert, & ramis, cū in crassitudine adoleuerit. Distat a superiore: quod germīna emittit, sine ullis folijs, radiculę similia, cui fructus quasi cuspidis accessu præpilatur. Caudex magnus, & Populo albę proximus. Folii ulmēi quater germīnat, quater suas ficos maturat. Sed grossus in ea nunq; excoquitur, nisi emissio incifura lacte. Suauitas pomō Fici, sed interna. Similitudinem caprifici habent. Magnitudo Pruni, uel Sorbi.

De Ficu Cypria iam dictum est in Aegypto.

E X M. V E R G. C O M M.

The. li. 4. ca. 2.

Crediderunt Theoph. & Plinius, in Aegypto tñ nasci Sycomorum hanc. Alter em̃ ubiq;

nō eius meminit, q̄ ut dicat, τὴν ἐν αἰγύπτῳ συκαμινόν, αὐτὴν αἰγυπτίαν συκαμινόν. Alter lib. 13. ca. 2. his uerbis de ea tradit. Et in Aegypto multa arborum gēa, quę nō alibi. Ante oīa Ficus ob id Aegyptia cognominata. Arbor Moro similis. Gręci ex utroq̄ Sycomorū, quasi ficū simul & morum, uel Sycaminon, idest, Morum tantum dixerunt. Ab illa nōmen ex pomō, ab hoc & ab alijs ex arborum aspectu nomen factum est. Celsus aliquando Sycaminon; aliquando Sycomorum, interdum etiam Morosycon appellat, nisi uicium etiam in eo sit.

Illud etiā nō immerito querit, cur nā arboris huius pomū ob ignauū & inertē sapore Sycomorū uocat? Sic enī ait, καλεῖται δὲ καὶ ὁ ἀπὸ αὐτῆς καρπὸς συκόμορον, διὰ τὸ ἄτονον τῆς γεύσεως. ex quibus aperte indicatur, non quia similis Moro arbor hęc sit, sed quod lāguīdo & inertī sapore sentiatur. Et si id hoc sensu simpliciter accipiatur, nō ab re suspicari aliquis poterit, non συκόμορον, sed una tñ mutata litera, συκόμορον, quasi fatuā et stolidi arboris ficū appellandū sycomori fructum esse. Id enim prima producta μωρον gręcis significat. Nos tamen id nō probamus, credimusq̄ quod hic ait, διὰ τὸ ἄτονον τῆς γεύσεως, ad proprium eius saporem referendum esse, qui in eo sit, ut ait Plinius p̄dulcis, & sine interioribus frumentis, seu granis.

De Ficis.

CAP. CLXXXIII.

Fici maturę, recentes, stomachum lædunt. Aluum soluunt. Sed facile contracta ab eis fluctio sistitur. Sudorem euocant, papulasq̄. Sitim sedant. Calorem restinguunt. Siccis, natura excalfaciēdi. Vires alunt. Sed sitim magis stimulant. Aluo utiles, Rheumatismis uentris & stomachi contrarię. Gutturi autem, arterię, renibus, uelicię, & ijs quos longa uale tudo decolorauit, anhelatoribus, hydropicis, comitialibus apertissimę. Feruefactę cum hyssopo, & potę, pectus purgant. Tussi ueteri, diuturnisq̄ pulmonum uitijs conueniunt. Aluum molliunt, tussę cū nitro & croco, dein manducata. Decoctum arterię, & tonsillarum inflammationibus gargarizatu prodest. Cum hordeacea farina cataplasma ti miscentur. Et in muliebres foras, cum sceno gręco & ptisana. Ceterum cum ruta coctę, torminibus infunduntur. Coctę, illitęq̄ duricias discutunt. Parotidas, ac panos emolliunt. Furunculos ad maturationem perducunt, maxime nitro, iri, aut calce addita. Crudę si cum antedictis tundantur, eadem efficiunt. Cum malicorio, pterygia purgant. Cum atramento sutorio, deploratis fere tibi arum fluctionibus, & cacœtheticis ulceribus medentur. Quin & cum uīno decoctę, addito absinthio & hordeacea farina, utilissime hydropicis illinuntur. Crematę cum cęrato sanant pernio nes, pruriginēs. Sonitusq̄ si crudę terantur, & synapi liquido exceptę auribus instillantur. Tam syluestri, q̄ satiuę Fici lacteus succus, coagulati modo lac contrahit, concretumq̄ dissoluit ut acetum. Exulcerat corpora. Venarum spiracula laxat. Soluit aluum. Vuluam aperit cum detrita nuce gręca potus. Menstrua ciet cum luteo oui appositus, aut thyrrhenica cęra. Podagricorum cataplasmatibus cum farina fœnogręci & aceto utilis. Lepras, lichenas, uutiliginēs, uitia cutis in facie, psoras, ulcera in capite manantia, cum polenta expurgat. Instillatum plagę percussis a scorpione, uenenatorum ictibus, & rabiosi canis moribus auxiliatur. Prodest dentium dolori lana exceptus, & in cauis eorum additus. Verrucarum infectiones tollit cum adipe, circumlita in ambitu carne. Hoc idem

C præstat succus e teneris ramis syluestris Fici, qui lacte prægnantes, silente adhuc oculo tusi exprimuntur, & siccatus in umbra reponitur. Et lac & succus imponuntur exulceratorijs medicamentis. Decocti cum bulbis carnibus ramuli ficulnei, faciem afferunt decoctionem. Lac efficitur quod magis soluat, si inter coquendum ficulneo furculo spathæ loco moueatur.

The. li. 4. ca. 5.
Pli. li. 13. ca. 7.
li. 12. ca. 5. li. 15.
ca. 28. 18.

Fico circa Elephantium agrum folia non defluunt. Græci pomum Syca, & Palathen quicquid uocant. Arborem uero Sycen, & Sycada. Quanquam Sycada nouellam ficum fere intelligunt, ut Iulius Pollux inquit. Nam Ischades, aride fici sunt, aut caricæ interdum. Inuenias apud Græcos Ischadas, recentes et ueteres quoque dici. Comædia et Iscada, caput pro sicca, uidetur appellasse. Quanquam & Ischada Sophocles, pro anchora est ubi acceperit. Fici pomum Hegeteriam, ab Atheniensibus uocatum, quasi ante alias fruges inuentum, auctor est Athenus, etiam quibusdam festis præferre pompæ solitum in offis. Naxy, ficum ipsam Melichen appellant, a quo & Liberum patrem Melchion, seu inuentore eius uocant. Ut Lacedæmonij Sycitæ. Quidam gigantem nomine Syccam, Ioue persequente, in Ficum a tellure conuersum fabulantur: unde in Cilicia ubi nomen sit inditum Syccæ. Sunt qui Sycen, hoc est, ficum, Oxyli, ex Amadryade filiam, ut alias quoque arbores fuisse memorent. Pausanias in Attica primum editas putari tradit, Cereris munere, in memoriam hospitij Phytalo donatas: quod & in monumento eius testatum est uer sibus hexametris. Ficus omnis, breui fere, nec procero caudice. Quanquam amplissimæ quædam inueniuntur, uel piris æmula magnitudine. Cortex ei leuis, laciniosa folia, & cruciformia, hoc est, ut Theophrastus inquit, *ουλοποδία*, nisi quis *καρπωποδία* magis legendum putet. Nam Hippocrates, uere inquit, folia sunt Fico, pedibus cornicis similia. Ex interiore pomi huius semine, id est, minutis in eo granis, quæ Græci *κρυφαίδια* uocant, etiam caprificus nasci dicitur a Theophrasto. Germinat sub æstuum, post uer: quod tempus conueniens omnibus est, præsertim edomitis, ac præcipue in Fico, uite punica. Ficus in Hircania dulciores multo, fertilioresque, ut modios. 270. singulæ ferant. Externæ sunt in Italia Chalcidicæ: quarum genera plura. Item Lydiæ, quæ sunt purpureæ, & māmillanæ, similitudinem māmaram habent. Calistrutæ, parum sapore præstantiores, sed Græcorum iudicio prælatæ cæteris. Has & Ficus & Passarias uocari, Calpitolinus auctor est in Clodio albino, Ficorum omnium frigidissimæ. Inuenio Psycalia uocari quoddam earum genus, ab algore. Nisi quis malit ab Atticæ regionis insula Psycalia. Sed an Calistrutæ sint, quia frigidissimæ dicantur, mihi parum constat. Nonnulli sunt, qui Psycalia intelligant, quæ recentes non sint quidem, non tamen siccæ. Africanæ ab aliquibus præferuntur, cunctis celebratæ Carthaginis excidio. Et aliæ ab Africanis Libycæ. Habentur & Sulcæ, & Topiæ quæ dicantur. Patriæ nomen obtinent etiam Alexandrinæ, post dicendæ. Candidat Serina, cognomine delicata. Nigra est & Rhodia, & Tiburtina, præcoque. Sunt & Liuianæ, siue ut alij uocant, Liuiæ pompeig, in usus annuos arefactæ solibus, aptissimæ cum mariscis. Et quas harundinei folij macula uariare dicunt, Harundineas ob id uocatas, a quibusdam Alfulas. Est & Herculanea, & Albicerata, & Aratia alba, pediculo minimo latissima. Cloacius & Asinastræ, Atram, Paluscam, Augustam, Biferam, Cucurbitanam, Leptolydiam, Mariscam, Numidicæ, Pullam, Pompeianam adijcit in nomine. Sunt apud Græcos Atticæ, delatoribus inde nuncupatis, præsertim Aegilides. Sunt & Lacônice, item Phrygiæ. Item Phibalex Hippocrati. Androtrion Leuceticeon adiungit, quas nostri Albiceratas uocant, albas Ficos ferentæ. Addit et Oporobasilidas, & Celuron, & Phormynion, & Megaricam. Et alij Toxaliæ sunt, & ex insula Paro Aemoniæ uocant, nihil a Lydijs distantes, colore sanguineo. Sunt & Amadei, et Coracei, & Nicoi, & Basilæ, quas & Basilidas uocant. Hybernas Ficos, Cydoneas Græci appellant. Probabantur & e Zacyntho, quod & Plauti confirmata auctoritas in Mercatore. Item Cimoliæ. Primo autem prouenit Porphiritis, longissimo pediculo. Comitatur eam e minimis & uilissimis appellata Popularis. Contra nouissima sub hyeme maturatur Chelidonia, hæc rubens est e nigro. Quæ porro nigra Ficus est, Barbachytræ dicitur a Græcis. Iulius Pollux, Chelidonia dicendo, Atticas inquit intelligimus, quas Lacedæmone Chelidonia appellabant. Sunt præterea ex æthiopia, & præcoces, bifere, alba & nigra cum messe maturescences, atque uindemia. Seroring, a corio appellatæ duro, hoc est, ut Macrobius, Duricoræ, ex Chalcidicis trifero quædam prouentu. Tarenti tantum prædulces nascuntur, quas uocant Onas. Sunt & Sagun-

ting, Telianæq; Quibusdam prouincijs & Hibernæ, sicuti Moesiæ: non natura, sed ingenio. In Ficorum genere, Caricas peculiari arbore fert Syria, & minores, eius generis quæ Coitana appellant. Habentur & Caunæ ominales, Marco crasso in Parthos mouenti. Caunæ porro sunt, tam ex Cariæ oppidulo, unde nomen Caricis apud nos, ut coniicio, aperte ut multa, q̃ ex Aeolica urbe Cauno cōmendabiles. Antiochenæ uero Caricæ, quas & Triphyllos uocāt, ut inquit Strabo, ab Antiochia Phrygiæ Meandro apposita nomen habent. Omnia hæc L. Vi tellus in Italiam Tiberij principatu transfuit. Ficus unum genus, pomum super folij dorsum ferentis, circa Idam ostenditur, & ob id Opisthocarpion uocatum, Idæi cognomine. Ramosa hæc, neq; celsa, cubitali crassitudine, ligno ualido, cōtorto, lento, sine lacte. Pars quæ a terra est, leuis, enodisq; Superior comoſa in orbem. Colos folio & cortici liuens, ac uiridis. Folium Tiliæ per omnia, sed molle. Flos mespilaceus, & cum Mespilo erumpens. Ficus rubra, magnitudine Oliuæ, rotundior, sapore Mespili. Radice crassa, ut Ficus quoq; cætera. Item lenta materies, incorrupta, corde solido, neq; medullaceo siue molli. Alexandrinam hanc ibi uocant. Nascitur & in mari ficus sine folijs, parua, rubro cortice. Quædam Ficum & Grossos ita ferunt in Cypro, Cilicia Hellade, ut ficum aduerso folio, grossos auerso sustineant: cum reliquæ arbores sub folio pomum, ut protegatur, habeant. Laconicum genus uocatur, præcoces eas habens: quas Athenis Prodromos, hoc est, præcoquas atq; præcurrentes uocant. Eiusdem feracitatis est, & quæ a Theophrasto Leucomphalios nominata est. Idem autor & Charition, & Aration ficum nominat. Ficus maturas græci, Colythra, ut Philemon scribit, uocant. Seleucus Prote-ricen sici genus uocari tradit, primitiuas eas ferentis. Habentur & alia Ficorum nomina, Cirocoelaidæ, Picridiæ, Hiladiæ, Sarcelaphiæ, Lapyriæ, Draconticæ, Leucophiæ, Melanophiæ, Creneæ, Mylææ, Alcaloniæ, Trallianæ, Rhodijs simillimæ, Bringidaridas. Quanc̃q; barbaræ, tū cum Atticis fere certantes. Prosenidas Pamphilus, Tithrasias Theopompus, generosas Plato in legibus, & ficus & uites quastam cōmemorat, quasi nobiles: etiam si nobile a generoso, ut inquit Aristoteles, diuersum est. Fortasse illa genera intelligens, quæ dicuntur Aegilides, interficos, & racemos, Nicostaticos inter uuas: quæ duo Athenis maxime cōmendabantur. Ut racemos Hipponius, in Rhodo insula, Thracelinas, ad Lienam probari, apud Aetium inuenio. Morbus sici peculiaris, uermiculatio. Bestiolas eas uocant cerasas, stridulum animal. Itē patella: sed aliter q̃ in olea: quoniam uidelicet radices imbrum superuentu, quasi deglabrantur. Item crados, scabies, & cocleæ. Crados intelligitur, cum marcescunt ramī, quos priuatim cradas in Ficu uocant. Attici ficum ipsam Cradem nominant. Nam & mæchiua, quæ in comœdia Bellerophonias, & Perseos, & deorum imagines in aere præsentabat, crada appellabatur: quia species ea ficum imitaretur arborem. Inter morbos est & uredo, idest, κλαυθμός, & tabes quæ dicitur ἐν πλεξίῳ, quasi quidam stupor, rigorq; Frigore hic & gelu, aliosis annis contrahitur. Cōmunis hæc & alijs, quemadmodum & radicio syderatioq; ἀστροβόλις uocata. folliculus Fici, ut frumenti, a Varrone gluma dicitur. Ficaria quoq; grana, Plinius frumenta nominat: quas nos a græcis Cenchramydas uocari diximus, succus matureſcentibus lactis, percoctis melle. Tactus omnibus mollis. Maturis frumenta intus. Lacte satiuarum coagulāt lac, syluestrium nequaquam. Aut minus probe fructus, ut in uite alba. Eo melior futurus intelligitur, quo leuius germen antecesserit, contra quam cæteris arboribus. Ficus sola, ex omnibus arboribus non floret. Lactis inquit Macrobius, proprie ficorum dicitur ficus. Tanq̃ non pomum fecerit a pomis apud idoneos autores, Afranium Ciceronemq; reperias. Fico fumus accerrimus, caprifiscoq; Item, cuiuscunq; lacteus cremor redundat, atq; ipsa hæc ramentum fluuiata de tracto cortice, mox siccata, minime omniū tedio illo infestant. Quin & flammam quoq; mollissimam reddunt. Lixiuum quoq; cinere uehementer asperum. Quanc̃q; ex Amygdalis asperum ignem excipere, optimas ficum & olea, contrariæ causæ faciunt. Ficum, lenta fungosaq; materies, oleam pinguis & densa. Senescunt ficus in arbore, anuſq; distillant gummi modo lachrymā, ob id Athenienses, γράσσον uocant earum folliculos, ut nostri glumas, quemadmodū prædiximus. Siccantur, seruantur in capsis. Ebuso insula præstantissimæ amplissimæq; mox in Marrucinis, plurimæ in Asia, Ruspinæq; Africæ urbe. Panis uicem & obſonij habent, siccate, ac recentes quoq; Athletæ hoc cibo uires aluere, priuſq; Pythagoras exercitator eos transferret ad carnes. Sale inueteratis, & casei quoq; loco uesci excogitatum est. Decoctū, inquit Paulus, Ficorum, pleriq; Siræum appellauerunt: quod & defruto quoq; nomen est, Hippocrates Sycon. Stardiosos uocis, abstinere Ficu græci iubent, Aegelsianæ Alexandrini exemplo moti, q̃ is tragædiarum actor optimus euaserit, quia, is. annos a ſiqu temperasset. Produntur & de hac arbore prouerbia, Ficum post piscem. Legumina post carnem. Gallinacæos amantibus, ficum

D I O S C O R I D I S

C ne feritō, Assentari nescio, sicū sicū, panē panē dico. Sacra ficus Athenis uocabat, uia quē dū cit ad Eleusinem. Erat & Sicelensis Romę uia, quę Nomentum ducebat, & Nomētana quoq; dicebatur, ex Viminali porta. Ceterum non a ficu, etiam si Plautus locum innuit, sed a figlinis appellata, quasi figulensis: q; ibi foderetur figlinum, ut ad Auentinum quoq; montem. Ficum atram, infelicem pontifices putabant, felicem albam. Quę autem felicia sint ligna, contraue, Macrobius libri tertij calce docuit, acrifolium inter ea numerans: quod quidem quale genus sit, haud facile reddiderim. Nec enim puto aquifolium posse legi, q; Aquifolium sit flex, quā felicibus annuerant. Recentiores certe, Agrifolium pro Faba gręca, siue quod idem est, pro arbore Loto capiunt. Sed Lotus felix erat arbor, ut idem Macrobius testis est. Scio Peucedanum quoq; Agryophyllon dici a gręcis. Inter arbores infestas, & Alternus, & Sanguis, siue quod idem est, Sanguen, ab eodem autore collocantur.

Pli. li. 13. ca. 274

25. li. 23. cap. 70

Caprificus, Erinos a gręcis uocata, q; in Erineo Thessalię oppido primum apparuerit, ut Photioni placet. Longe ualidior est q; ficus. nullis fere uitij obnoxia, ut etiam fico insita grossos suas tueri credat. Interdū tñ in uadit eam scabies. Frequentissima in ficu, quoties post uergilias admissi sunt imbres, utiq; parui (nam largis causa omnis eluitur) flexilis materia. Nunq; maturefcit in ea pomum. Addit Ficetis, ut culices alimento in ea fraudati, euolantes in ficos ferant: aperiantq; ora earū; atq; ita sole imisso & lacte absumpto, maturitati præparent. Eos culices ficarios, Aristoteles Psenas, ionica uoce appellat. Etia si legat corrupte pferas. Dicunt autē Psenes, quasi galbę. nā & Psenes poetę cū dicunt, caluos & glabros intelligunt, ut est apud poetā Simonidem. Nos tñ Galbas, æsculi uermiculos uocamus, ut prædictū est. Sūt in fico & Centrinæ dicti culices, fucis apum ignauia maliciaq; similes. Interimendo em̄ utiles, & ueros culices utiq; ipsi cōmoriunt. Caprificatio a nostris hoc uocatur, a gręcis erinasinos, & sycasinos. Theophrastus autor est, meliores quodā loco nasci ficos, sine ulla Caprifici ope: quas Anerinasta prædicari uendentium uoce scribat. Caprificus, tauros quamlibet indomitos collo eorū circumdata, cicures & immobiles præstare dicitur. Habetur & Ficus indica, cuius germina per ambitum radicari tradunt, neq; caudicem contingere, arbor magnitudine insigni, ut sub qua tres turmas equitum condi affirmunt. Caudici crassitudo sexaginta passus. Ramorum umbrę bina operiunt. Folijs amazonicę peltę amplitudo, formaq; ut Solinus inquit. In Hirca nia tam sœcunda est Ficus, ut medimnos. co. singulę ferant. Est autem *μυδιμνος* modij sex italici, utiq; atticus. Nam prolemaicus maior est, ut qui sesqui nplus sit attico, sed exiguo pomō. Caprificus in Co insula, non bisera modo, sed trisera quoq; habet. In Gallia transalpina, Strabo similem Fico nasci tradit arborem, fructu capitulum corinthiacę columnę referens: cuius lacte mortifero, sagittas suas illinant, infami alias temperandi uenena, cœlo non pridem aboleri cœpta: eius rei nota Gallijs, ut hoc forte Virgilius intenderet, cum de Cimbri Tullio, qui frateem ueneno sustulit, in senario locutus est, de quo inter odoramenta diximus.

ἀγρία οὐκ

De Grossis.

C A P. CLXXXV.

GR O S S I, quę Erinei nonnullis uocantur, coctę, illitę & strumas nodosq; omneis emolliunt. Crudę, formicantes uerrucas, & thymos nitro farinaq; additis tollunt. Folia eadem possunt. Illita cum sale & aceto, ulcera in capite manantia, epinyctidas, & fufures sanant. Iis ficosę extuberationes, & genarum scabricę perfricantur. Nigrę ficus folijs cauliculisq; candidę uirilignes perunguntur. Faciunt ad canū morsus & ulcera, quę Ceria, idest, fauos uocant. Grossi cum syluestris papaueris folijs, ossa extrahunt. Furunculos cum cœra discutiunt. Contra muris aranei morsus, & scolopendrę uenena, cum eruo & uino illitę auxiliantur. Fit ex cinere ficus tam syluestris q; satiuę lixiuium, crematis ramorum cauliculis, quod subinde macerari opus est & inueterascere. Siquidem inter caustica intelligitur. Gangrænis prodest. namque expurgat & consumit quę excrefcunt. Quo utendū ita est. Spongia assidue hoc

lixiuio imbuta superponitur. Interdum dysentericis, & infuſiones ue-
tuſtas, & ſinus cuniculati exedentes, magnosq; inſtillari conueniet. Et
enim purgat, conglutinat, carne replet, & oras committit, non ſecus atq;
emplaſtra quæ cruentis uulneribus inſciuntur, Enhæma uocant. Bibi-
tur ad diſcutiendum ſanguinem concretū, & contra præcipitationes, ru-
pta, conuulſa, cum cyatho aquæ recenter colatū, addito olei exiguo. Cœ-
liacis, dysentericis per ſe cyathus datus prodeſt. Neruorū uitijſ, conuul-
ſionibus cōmode illinitur ex oleo, ut pote quod ſudores moueat. Aduer-
ſus gypſi potum, & phalangiorum morſus bibitur. Hæc eadem præſtant
reliqua lixiuia, præſertim quernum. Omnia tamen adſtringunt.

BARBARI COROLL.

Groſſulos, atq; Groſſos, Græci Olynthos, & Erineos uocant, de quibus in fico & ca-
priſico abundanter egimus. Sed Groſſi proprie Olynthi ſunt, hoc eſt, primitiua ficus. Apud
Macrobiū, Groſſos legas ficos eſſe, quæ nunq̃ matureſcunt. Alij ſic diſtinguunt, ut ficus
primo ſit Olynthos, deinde Pheix, poſtea Sycon, poſtremo Iſchas. Frōdes ficus, Græci
priuatim uocāt Thuria, Nicander & papaueris folia ſic appellat. Eſt & edulij genus Thron, ut
aliubi notauimus.

Cinere lixiuium, Coniā Græci appellant: de quo dictum in Ficu a nobis eſt, aſperita-
te inſignem, ex eo ligno eſſe, aſperiores ex Amygdalo.

De Perſea.

CAP. CLXXXVI.

Perſea arbor eſt, in Aegypto fructum ferens cibo idoneum, ſtoma-
cho utilem, in quo Phalangia cranocolapta nomine inueniuntur,
præſertim in Thebaide. Arida folia illitu ſanguinis eruptiones ſiſtunt.
Arborem hanc prodiderunt aliqui in Perſide exitioſam eſſe, transla-
tamq; in Aegyptum, mutata natura in cibos receptam.

BARBARI COROLL.

Perſeam arborem, Aethyopia & Aegyptus habent ſolæ. Perſicum Aegypti Plinius, appel-
lare quodā loco maluit, hilarem intuitu, piro ſimilem per omnia. Semper autem folia habet, &
pōma, ſubnaſcentibus alijs. Maturitas per Etheſias. Alio tempore crudiuſcula decerpunt, ac re-
ponunt. Magnitudo longioris piri. Amygdalæ putamine includitur, & corio, coloris herbidū
nucem intus habet, ut prunū, ſed minore multo mollioremq; ſuauiſſimam carni prædulcis, & in-
nocua etiā largiorem manducantibus. Concoctu & deiectu facilis. Radice prægrandi. Materies
longitudine, craſſitudine, & pīa, inter cōmodiſſimas bonitatē, firmitudine. Nigritia quoq; ni-
hil differens a Loto ea, quā ſabam græcā uocamus. Simulacra ex hac, & lectulos, & cubilia fa-
ctitauerē, non tam decoro ligno q̃ ſideli, ut quod magna ex parte ſit contortū. Proindeq; naua
le tantū eſſe cœpit. Hanc aliqui rubefcentibus Myxis fecere ſimilem. Perſeam hanc, non Perſi-
cum, ut diximus, e Perſide in Aegyptum tranſlatā a regibus tradidit, propter ſupplicia: quod
niā uenenata ibi eſſet, quod eruditiores tamen conſtāter negant: ſed a Perſeo Memphi ſatā ſa-
tenſ, & ob id Alexandrū illa coronari uiſtores iſtituiſſe in honore Atæui ſui. Fortaſſe Theophrā-
ſtus hanc intelligit, cum textilem Perſicā in Aegypto plurimā nemore Thebaico fuiſſe ſcribit.
In quo & Aegyptia Spina, & olea, & quercus habeant, ut textilem a coronæ uſu dixerit. Qui
dam pro cucu capiūt Palmæ ſimili, cuius folijs ad nexus & textilia utant, & Perſicā textilem uo-
catā putant: quia Perſis in magno honore fuerit. Aliā a Perſea, de qua Dioſcorides præſenti
mentionem loquitur. De Perſea porro hac Columellæ uerſus illi fortaliſſe fuerint.

Quin etiam eiſdem gentis de nomine dicta,

Exiguo properant miſcere Perſica malo.

Plutarchus auctor grauiſſimus, Perſeam arborem inter omnes Iſidi gratiſſimā, & in Aegypto
maxime celebrari tradit: quia fructum ferat cordi ſimilem, ſolum uero linguæ.

n iij

C De Iberide. **CAP. CLXXXVII.**

Iberis, siue Cardamantica, folia habet Nasturcij, uere uiuentia, caulē cubitalem, aut minorē. In incultis nascitur. Aestate lacteum florem promit, quo tempore efficacior est. Radices duas nasturcio similes habet, calfacientes, & adurentes. Ipsae enim ischiadicis cum salsa axungia emplastro utiles, quaternis horis alligatae, ut dein in balneas descendatur, & postea oleo cum lana locus perungatur.

Pli. lib. 27. ca.
8. 12. & lib. 26.
cap. 9.

B A R B A R I C O R O L L.
Hiberida, siue Hiberiada, & Hiberiden herbam comperit Seruilius Democrates, assignato etiā inuentioni eius senario. Nascitur maxime circa uetera monumenta, parietinasq; & inculta itinerū. Semine tam paruo, ut aspici uix possit. Radici odor nasturtij: de quo Cardamina, & Cardamantice, & Apollonio Cardamen, & Hiberitis appellata est. Vfus aestate melior, & recenti tantū. Tunditur difficulter. Galenus Hiberida eandem esse cum Lepidio uocata conscribit. Carmen quoq; Democratis ipsius praetexuit, ex eius libro qui Clinicus inscribitur. Multa de hac Archigenes, in epistola ad Aristonem, tamq; Lepidion & Agriocardamon, id est, sylue stre Nasturtiū uocauit. Vidimus hanc Venerijs, speciei qua describitur a Dioscoride ac Plinio. Illud adijcimus, folia ei pusilla esse, qualia Nasturtio. Semen quoq; in siliquis admodum pusillis, tam exiguum, ut cernere non liceat. Flos item pusillus, & lactei candoris. Differt Hesperis ab Hiberide. Nomen uero Hesperis inuenit, non ab Hiberia, sed ab re: quoniam ut Theophrastus inquit, nocte plus oleat q̄ interdiu, contra q̄ herbarum plurimae.

D De Halicacabo. **CAP. CLXXXVIII.**

ἡλικάκωσος

Halicacabum aliqui Dircaeon, alij Strychnon, alij quod infanizantur, appellauere, Rhomani Apollinarem minorem, aut Vlticanam herbam. Alij Oplaginem, Daci Cocalidam, Aphri Calicabon. Frutex est multos habens ramos, fractu peruiacces, surculosos. Folia plurima, pingua, Cotoneae malo similia. Florem rubrum. Acinum in foliculis paruis croceum, ciceris magnitudine. Semina quina, senuae Erui modo rotunda. Nascitur in petris non procul a mari. Huius succus cum uino potus drachmae pondere somnum conciliat, ut papaueris opium. Semen urina cit. Dantur hydropicis duodecim corymbi. Plures aut potius mentis alienationem creant. Remedio est aqua multa copiosa potui data. Succus & cortex miscentur pastillis, qui doloris sensum auferunt. Decoctum in uino si in ore contineatur, dentium dolorem mitigat. Radicis succum melle illitus, oculorum hebetudines discutit.

B A R B A R I C O R O L L.
DE Alicacabo una Strychni, hoc est, Solani specie, quarto uolumine differet: ibi quae hic in Dioscoride leguntur repetita sunt ad uerbum fere: q̄q; libro quarto pro secunda Solani specie, primo pro tertia uideretur accepisse: nec Alicacabum ibi hanc appellat, sed quod uerius est, Hypnoticon. Alicacabus enim uera est, quae quarto uolumine describitur.

¶ Finis LIB. Primi.

PEDACII

DIOSCORIDIS

De Medicinali materia. LIB. Secundus.

IO. RVELLIO interprete.



PRIORE, charissime Ari, libro, quem de Medicinali materia condidimus, de aromatibus, oleis, unguētis, arboribus, & nascentibus in eis succis, lachrymis, seminibusq; differuimus. In hoc autē secundo de animantibus, melle, lacte, adipe, frumentis, atq; oleribus explicabimus, subnexus herbaceis quæ acri prædita sunt facultate: ut pote quæ cum ipsis cognatione iuncta sint. Qualia Allium, Cepa, Synapi intelliguntur. Idq; ideo, ne cognatorum uires disiunxisse uideamur.

M De aquatili Echino. CAP. I.
Marinus Echinus stomacho uentriq; utilis est. Vrinam cit. Huius testa recens inassata, commode medicamenti ammiscetur, quæ pforas abstergunt. Crematæ uero cinis, sordida ulcera expurgat. Luxuriantem carnem reprimi.



HERMOLAI BARBARI

Patricij Veneti, & Aquileiensi Patriarchæ
Corollariorum LIB. Secundus.

ERINACEVS marinus, quem Græci Echinos thalassion appellant, alius piscis est ab eo, qui Echnēis, hoc est, Remora, siue Remeligo dicitur, adhærens nauibus, & medio mari cursus earum impediens, palmari crassitudine, pedali, semipedaliue amplitudine, magnæ Limaci similis, Odynolyon appellatus a quibusdam, quia partus grauidis adalligatus, resoluat inueteratus sale. Alij & muricis genus quoddam hoc nomine, potentiâq; accipiunt. At Echino, id est, Erinaceo, spinæ pro pedibus sunt, quibus uoluit in orbem, nec aliter ingredit. Itaq; detritis sæpe aculeis inuentunt. Ex hoc gñe appellamus Echinometras, & Iulius Pollux, Metras; quibus spinæ longissimæ calicesq; minimi. Neq; omnibus idem color uitræus. Circa Toronem candidi capiuntur, spina parua. Oua omniū amara, quina numero, nec nisi per hyemem, atq; plenilunijs. Ora in medio corpore in terrâ uersa. Tradunt sæuitiâ maris prælagire eos, quoties correptis operiuntur lapillis. Echinos aliqui & Patangas nominant. Sed Aristoteles tria ejus genera dinumerat, Ouarios, qui & mandatur, Patangas, & Bryllos. Haberi & fluuiatiles Echinos, Paulus Aegineta prodidit.

Plin. li. 32. ca. 112



MARCELLI VERGILII

in Dioscoride ANNOTATIONES abbreviatæ.

MRIA hæc una Echini appellatione Græci indicauerunt. In mari, & in testaceo genere piscis, cui natura est, spinis quasi pedibus, & earū in orbem uolutatiōe ingredi. Mox in arida, & in quadrupedum genere, quod nouerunt rura omnia, animal aculeato omni corpore, præterq; ore, pedibus, & ex inferiore parte, infestis & ad uulnus semper paratis spinis, quibus salutem uitamq; suam, a canibus & uenatoribus rueri posse se credit: cui natura sit, in periculo in globum circumagi, nec nisi spinas ostendere & porrigere. Quam ob causam Acanthion etiam Græci id uocauerunt. Postremo Castaneorum, a consimili

C spinarum figura & noxa, summum illud operimentum, quod pauloante descripsimus: de quo satis dicta hæc sint. Quod enim ad terrestrem pertinet, a marino statim dicitur: cum pleraque legentes in eo monuerimus, quorum id primum erit. Non probari ab Aristotele libro. 4. de animalium historia, ad sciendam urinam marinos Echinos oēs, sed ex multis quæ ab eo illic numerantur unum tantum genus, quod in exiguo corpore longissimas & durissimas spinas habet, nec nisi in altis gurgitibus inuenitur. Verba eius hæc sunt. *πρὸς δὲ τοῦ τοῖς ἄλλοις μικρὸν ἀκάνθας ἔχον μεγάλας καὶ σκληρὰς γίνεται δὲ ἐν τῷ θαλάτῃ ἐν πολλαῖς ὀρνυαῖς ὧ χρᾶται πρὸς τὰς τραχηλίας τινος.* Estque eorum sensus qui antea dictus a nobis est. Legentes monemus, etiā uideri nobis nō esse integrū, quod in omnibus græcis passim legitur, ὅτι τὸ ὕδρακιον ὁμῶν μίγνυται χρυσίμῳ δὲ πᾶσι θὶν τοῖς περὶ τὰς διώρας σμήμασιν. Si enim quale id membrū est uertatur, non aliud fiet sensus quam crudā marini Echini testā misceri uoliter tosta his, quæ ad extirpandas scabies cōficiunt. At qui possunt, nulla intercedente copula, aut dictiōe aliā, simul præcipi & doceri, cruda, & tosta: Necesse itaque omnino est, aut copulā intermiscere, quod nos fecimus: aut disunctionē, quod forte fuit, aut (quod nos magis credimus) suspicari aliquot deesse illic uoces, quibus in cruda Echini testā uis, usus, aut remediū aliquod doceretur: cui deinde de tosta & cremata subijceretur, quod ad læuigandas cutis asperitates pertineret. Id enim cineres, præsertimque marinarū testarū maxime possunt, ut in Purpuris mox patebit. A qua potestate longius cruda abesse uidentur. Neque in huiusmodi remediōrū rationem facile admittuntur.

De terrestri Herinaceo.

CAP. II.

χερσαίος ἑχίνος

T Errestris Herinacei corium combustum, alopecij cum pice lipotum, renum uitij auxilio est. Item aquæ quæ cutem subijt, conuulsionibus, elephantia, & male habitis, quos cachectos uocant. Viscerum fluxiones exiccat. Eiusdem iecur testa insolata arefactum, ad eosdem usus utilissime reconditur.

καχέκτοις

D

Pli. li. 31. ca. 9.

B A R B A R I C O R O L L.
E Rinaceus terrestris, id est, Echinos chersæos, & Acanthion epigios, uallatus est aculeis extra quam ore, pedibusque, ac parte inferiore, quā rara tantū, & innocua lanugo operit. Vbi uenantem sensere, conuoluuntur in pilā, ne quid apprehendi possit præter aculeos. In desperatione urinam reddunt tabificā, spinis, & tergori propter quod petuntur. Ideoque artis est, uenari eos exinanito prius lotio. Capri, aquæ calidæ aspersu resoluuntur, & suspensi posteriorū pedum altero, enecantur inedia. Hac cute uestes expoliuntur, Cibos sibi præparat in tempus. Etenim uolutatus supra poma iacentia spinis affixa, unū non amplius tenens portat in cauas arbores. Idem mutationes aquilonis in austrū prænunciat, condens se cubili. Echinus, Græcis uas æreum significat, in quod testimonia coniecta signabatur. Sed & fœni partem, & ollæ genus. Item muliebris ornamentū non dissimile omnino brachialibus, & armillis. Pollux auctor. Dicuntur & in casta neis Echini. Eos tamen latine qui Erinaceos uocant, non inuenio.

E X M. V E R G. C O M M.

C Redidit quondam antiquitas, homini ut pleraque alia animalia inuidere etiā terrestrem Erinaceum. Testaturque id Theophrastus est in eo quod reliquit commentariolo de his animalibus quæ homini inuidere dicuntur, quæ ille multa numerauit, Stellionem, Ceruum, Equum, Phocam, Lyncem, & pleraque alia. Quorum Stellio exutam uere tuniculam, anguium modo deuorat, statim comitialibus utilem: cuius rei & Plinius testis est libro trigesimo, capite tertio. In locis fenestrarum, aut sepulchrorum cameris frequens hoc animal inueniri ostendens. Solereque, qui eorum membranas has uenantur, incipiente uere, ex filis harūdinibus textas, illis ueluti casae opponere: quarum angustij id animal gaudet: eoque facilius circumdatū torporem exiit, quo inter harundines eas relicto non possint remeare. Nec ultra Plinius quicquam dixit, quam nullum animal fraudulentiū inuidere traditum esse, cogitandum legentibus quod nos dicimus relinquens. Ceruus dextrum cornu terra obruit, contra rubetarum uenena necessarium. Equus pulli sui hippomanes præcipit, ad amoris ueneficia quæsitum. Phoca coagulum euomit, isdem comitialibus optatum. Et Lynx urinam suam celat, multū in medicina usus, & in delictis uitæ ad anulos expetit. Sed omnia falso inuidere homini creduntur. Nullus enim brutis inuidiæ contra hominem sensus est: metuque perturbata, aut aliter affecta id agunt anima-

lia hæc. Verisimileq; est Phocā, cū capi & teneri se sentiat, metu, doloreq; id pati. Sigdē in eodē affectu, idē aliquando hoīes animo p̄turbati patiunt. Et Stellionē tuniculā suam, & equū pullū hippomanes eodē, aut nō dissimili naturæ affectu deuorare, q̄ canes & sues a partu statim secūdas suas etiā deuorare dicuntur, Lynceſq; & Ceruos ignorā nobis habere eius qd agunt aliquācām. Multa em̄ huiuscemodi bruta agunt, quorū reddi rō a nobis nō potest. Ex hoc animalitū hominī inuidentitū gñe, terreſtris Erinaceus antiq; esse creditus est. Is em̄ teneri se sentiens, metu, affectuue alio p̄turbatus, in globū se circūagīt, circumastuſq; noxiā spinis & cuti suæ urinā remittit; cuius cōtagio corruptæ, nec multo poſt deciduæ spinæ, deſinūt in artibus habere uſū, & in medicina coriū inutile ſit. Eius cinere ad Alopecias nō hīc tm̄, ſed ueteres Gręcorū medici, & Plinius p̄cipue utunt, ob egregiā ſiccādi, diſcutiendiq; uim quā habet. Qua etiā poteſtate in ueterata eius caro hydropi, quē Gręci, Anaſarca, uel Hypoſarca uocāt, mederi a Dioſ. dicta ē.

De Hippocampo.

CAP. III.

Hippocampus marinum animal est, exiguum, cuius cremati cinis cum liquida pice, aut axungia, seu amaracino unguento illitus, alopecias replet.

EX M. VERG. COMM.

Credimus olerū & plantarū erucas, quas Gręci Campas dicunt, marino piſci a ſimilitudine nomen dediſſe. In locuſtarū enim genere Hippocāpus a ueteribus numeratur. Breuem, paruumq; hunc piſcem ſcriptor hic ait eſſe, & nihilominus magnitudinis nota illi coniuncta eſt. Quod enim Gręci hippo, multis in natura adiſciunt, grande ſignificat, ut in Hippoſelino, & Hippomarathro, aut Hippolapatho indicabimus. Sed id ſic intelligendum eſt, ut comparatū hoc animal, olerū, aut arborū erucis, grande ſit; marinis uero beluis & piſcibus, breue & paruum. Nec aliud hic intelligi uoluit dicens, paruum eſſe marinum animal.

De Purpura.

CAP. IIII.

Purpura uſta exiccat. Dentes abſtergit. Excreſcentias in carne cohibet. Vlcerā purgat. Et ad cicatricem perducit.

BARBARI COROLL.

Purpuræ, a Gręcis Porphyre nuncupantur. Hinc ipſas quoq; ueſtes Purpuras uocamus, auctor eſt Theopompus, tūi quondā precij fuiſſe, ut æquall argento penderentur. Nemo ignorat, Oſtreorū quoddā genus eſſe purpurā; idq; ſanies eius, quę teſtis detractis colligereſ, Oſtrū, ut Viſtruius inquit, appellata eſt. Oſtea porro inquit Galenus, penultima correpta, & producta differunt. Producta genus eſt Ariſtotelei, ad oīa teſtacea, ut p̄r diphthongum u ſcribantur ὀστrea uidelicet. Correpta uero ſpecies eſt eius una. Quibus reſpondere apud nos quidā uolunt, conchā, per. x. & Concā per. c. Sed auctores ipſi ſunt, nec præter ipſos alijs. Athenæus, ueteres per u diphthongū proferre ſolitos affirmat, nec aliter locutos Cratinū, & Archilochū, Platonē correpta. Sed placet Galeni ex Ariſtotelis auctoritate diſtinctio. Porphyrides ex auiū ſunt gñe, a Porphyriionibus diuerſæ; ſicut ab utroq; Lathiſporphyrides, ſiue Adiporphyrides, & lathiſporphyre. Illud obiter notauerim, Porphyrones a nobis uiſos eſſe in agro Patauino, allatos ex Hiſpania, quos ibi Telamonēs uocāt; ſiue quia ſtatue uiriles, quibus mutili & coronæ ſuſtinentē, ita nominātur; ſiue quaſi thalamorū & pudicitie cuſtodes. Etenim ſcribit Athenæus, uolucrem hanc ſenſum adulterij habere, ac ſignificare id patriſfamilias, in cuius domo alitur, nō uoce quidem, aut omnino aliter q̄ ſuſpendio. Niſi quis Telamones, quaſi nutriculas eſſe dictos putet. Ita enim Gręci Altrices uocāt. Porphyrioni ſimilis eſt Tetrax appellatus, ut Athenæo placet, Gallōs gallinæos uirtens magnitudine. Vox grauis. Caro ſi mādatur, ſtrutionis ſapore. Pendente ei ex auribus utrinq; cartilagine, atq; criſtæ, ut in Gallo Gallinæo. Epicharmus, & Alexander certe myndius, qui aues ſcripſit, puſillā uolucrem hoc nomine intelligunt. Tetrax inquit auicula eſt, a uoce dicta, quā oua pariens emittit. Plumis color macularum ſorde uarijs, perpetuiſq; lineis. Magnitudine Spernologi eius, quā nos Spicilegam, ſiue Frugilegā uocare poſſumus. Quāq; Frugilega nomen generis eſt; ita uictū quærentis apud Ariſtotelem. Rura ipſum paſſerculi uocant Spicilegā, detrīta modo priore ſyllaba. Ab eodem auctore Scolopax, aragenis colore tradiť, Gallinæo generi perſimilis, quā Theodorus Gallinaginem, uernaculā uocem ſecutus (ita enim uulgo nominatur) interpretatus eſt.

A

ἵπποκαμπος

πορφυρε

B

Pli. li. 9. ca. 16.

171 181 39 40.

C
ἐρύκεται

De Buccinis.

CAP. V.

EAdem præstant concremata Buccina, sed uehementius urunt. Si quis salis plena, fictili crudo adurat, dentificatio conueniunt. Ambustis utiliter illinuntur, quibus solui medicamentum non oportet. Nam posteaq; uulnus cicatricē duxerit, ipsum in testæ modū induratum, sponte sua decidet. Fit etiā calx e Buccinis, ut in eius mentioe demonstrabimus.

Pli. li. 9. ca. 36.

BARBARI COROLL.

Buccina, a Græcis Ceryces dicuntur. Muricū nomen gñalius esse uideo, q̃ Buccini, ut potest quod & Purpurā quoq; cōprehendat. Illud notare libet, Cerycas a nostris uerbū ex uerbo Buccina cōuerso s̃ esse, q̃ Ceryx idē sit quod Præco: q̃q̃ & a cera, quā mucō similē attritu mutuo saluant, cognominari posse uideantur: quod Græci ἐρύκεται dicunt. Muricum generis sunt, inquit Plinius, & quæ uocant Græci Colycia, Alij Corycia, turbinata æque, sed minora multo, efficaciora etiā, & oris halitū custodientia. Athenæus hæc non muricū, sed chamartū generibus contribuit: easq; in Macedonia κερυκός dici, Athenis χρῖα. In cætera Græcia, Tracheas, hoc est, asperas, uōcari prōdit: quod & Plinius fere aliubi secutus uidetur.

E. X. M. VERG. COMM.

Non paruā naturalis historię partem, mare & maritima faciunt, nec parum in homine laudanda eorū cognitio: tam late uis utriusq; rei patet, totq; modis ad uoluptatem, necessitatemq; humanā instruunt uitā: & tanta est in mari nascentiū uarietas, quæ si quis numerare, & ex his lem laborē inierit: qui ex tā multis pisciū, & testarū quæ toto mari nascunt generibus, pauciora quædā ad hominis morbos & medicinæ usum elegit. Poterūt uolentes ex Aristotele, Plinio, & plerisq; alijs reliqua longius & certius cognoscere, & qd ad Purpuratū Buccinorūq; sapes, & in medicinā uires aliquas priuatim ptinet, nō contemnendā ab Athenæo historię, quo loco de Ofreis agit, audire: Nos eā ganeæ multū, medicinæ uero parū necessariā relinquimus.

D

ἰόνια

De Ionijs.

CAP. VI.

Ionia uocantur Purpuratum Buccinorumq; media, qua parte testæ uolumen clauiculatim intorquetur. Crematā simili modo, maiorem Purpuris Buccinisq; facultatem urendi consequuntur, ut pote cum ea parte eorum natura prematur. Buccinorum carnes ori gratæ sunt, & stomacho utiles. Sed aluum non molliunt.

BARBARI COROLL.

Ionia, sunt qui florē esse credāt eum, quē Purpuræ, ut Aristoteles scribit habent, & Buccina, & qui a Democrito Anthos porphyrios dicat. Alia nigrū, alia qd rarius est rubentē, mediū inter Papauerculū & Ceruiculā, ut Athenæus testatur. Est aut Papauerculū in Buccino pars eius ima esculentaq;: q̃q̃ oīs callus pinnæ & conchili interior Papauer quoq; dicit, ut idē auctor scriptū reliquit. Est & in Polypo, qui & Polyps dicitur, & Anosteos suū papauer, ea pars uidelicet, quæ supra uentrē eius folliculi specie conspicit, liquore plenus, non atro ut in sepia, sed rubente. Ego in Dioscoride nō Ionia, sed Cionia, hoc est, uerbū e uerbo, Columellā lego: ita scriptū in exemplaribus aliquot inuenias. Est & uasculi genus Cionion, siue Cion: quo noīe in hoc Vnde apud iuris pītos Colūnariū: q̃q̃ non colūnariū, sed colūbariū sortasse, p̃nunciandū sit. Instrumenti genus ita nominatur Vitruuio, ad aquā hauriendam, per tympana. Etiam si a colluie, Colluuiarium sunt qui legant. In quo illud mihi occurrit, Columbarium non a columbis, sed à græco uerbo, quasi colymbarium uenisse: quando Græci κολυμβῆς, & colymbistas uocant, quod nos urinare, & urinatores dicimus. Urinatorium ergo uas, quo uidelicet aut Viniū prōmitur, aut aqua, Columbarium a ueteribus dictum existimare possumus. Alioquin & columbæ ab hoc ipso uerbi Græci significatu appellantur. Quid si Columnarium apud Iurisperitos pro mensa lapidea, quæ Cartibum, & Cartibulum quoq; dicebatur accipias: De qua M. Varro: Altera inquit, uinaria mensa erat lapidea, quadrata, oblonga una Columella, uocabatur Cartibulum, in qua uasa ponerentur æneā.

De Myacibus.

De Myacibus. CAP. VII

MYaces laudatissimi in Ponto. Cremati eundem Buccinis effectum præbent. Priuatim plumbi more eloti, oculorum medicamentis cum melle utiles habentur. Genarum crassitudines absument. Albugines purgant, & cætera quæ oculis caliginem offundunt. Carnes eorum ad canis morsus utilissime imponuntur.

MYtuli, Græci Myas, & Myacas appellant, Hippocrates Scaphidas. In harenosis sponte natura proueniunt. Quidam prius his genus faciunt eorum, qui proprie Myes dicantur: quorum proprietas sit, congregari muricum modo, & uiuere in algolis. Si mutuo attritu, lentore cuiusdam ceræ, Meliceram uocatum, saluant. Gratissimi autumnis sunt, & ubi multa dulcis aqua miscetur mari. Ob id in Aegypto cõmendatissimi. Procedente hyeme amaritudinem, coloremque rubrũ contrahunt. Degenerant, ut Athenæus & Plinius testantur, in duas species. In Myias, idest, muscas, & Mytulos. Mytuli sale, uirumque recipiunt. Muscæ, siue ut in exemplaribus quibusdã Plinianis legi, Myiscæ, differunt rotunditate, minores aliquanto, atque hirtæ, tenuioribus testis, carne duriores. Laudantur apud Græcos Ephesij. Est & piscis Muscæ, Ponto cõmendatus, ex Athenæo. Plautus in Rudite, nominat quendam Musculos. Captamus inquit Echinos, Lapadas, Ostreas, Balanos, Vriticam marinam, Musculos. De Mytulis intelligat, an de pisce Mure, iudicent legentes. In Aristotele Mytiocetus piscis, a Theodoro Musculus conuertitur.

EX M. VERG. COMM.

Quæ sequuntur Tellinas, non Myacas, Mitulos a Romanis dici testatur Athenæus est. Nos tamen aliorum in ea re obseruationem secuti, Myacas, non Tellinas Mitulos uocauimus. Similitudo, & idem fere eorum natales, nominum uagam & incertam hanc rationem faciunt. Quod in multis fieri quotidie uidemus, deficientibus in tanta rerum naturæ uarietate & copia, proprijs earum appellationibus. Est in Mitulis his, ubi nos legerimus mederi eorum cinerem palpebrarum asperitatem, non crassitudini. Idque Paulus Aegineta lib. 6. etiam cõfirmat, nisi uitium in eo sit. Nos tamen cõmunem lectionem secuti sumus, confirmante eã Plinio, qui lib. 22. cap. 5. de mitulis hæc ait. Lauantur quoque plumbi modo ad genarum crassitudines, & oculorum albugines. Persuasit & illud etiam, nihil in his mutare: quod facillimus lapsus est in græcis ab asperitate, in crassitudinem: siquidem una tantum mutata litera, τρεχι, quod asperum, πρεχι quod crassum est sit: multisque locis occurrit in hoc scriptore huiusmodi uitium. Crassitudo autem genarum, quam nos crassas palpebras uertimus, Galenus in Iliagoge sua fieri dixit, cum inuetera a natiuo habitu palpebræ, duriores, carnosioresque fiunt.

De Tellinis. CAP. VIII.

Recentes Tellinæ alio utiles, sed maxime ius earum. Salitæ uruntur, tritaque in cinerem, & cum cedria instillatæ, auulsos pilos renasci non patiuntur.

BARBARI COROLL.

Qui Tellinas interpretatur in Martiali poeta Mytulos, improprie locutos arbitror. Cui aliud genus esse Mytulos, aliud Tellinas Dioscoridis autoritate cõstet, Athenæus certe Mytulos a romanis uocari, eas uidet existimasse. Suntque Tellinas, & Crenia, idest, Pectunculæ, id est esse iudicent, a celeritate crescendi nominatas, ὅτι τάχιστα γίνονται τέλει, hoc est, ocyssime pasciunt. Quod Aristoteles, in Pectunculis, quæ Purpuris tribuit cõe. Anno enim magnitudinẽ totã implẽt. Plinius certe medicinas quæ hic de Tellinis reddunt, ad uerbũ fere Pectunculis adscripsit. Tellinas ad Canopũ in ægypto frequẽtes esse narrat: quarũ tenuiores, exiliioresque, Basilicas, hoc est, regias appellat: his dulciores esse fluuiatiles. e Nilo. Romæ circũferunt pusillæ quædã cõchulæ, quas quæ uendunt, Tellinas predicat. Hæ uulgaribus conchis minores, & leuiiores sunt, & cãdidæ, nec striatæ: quas Veneri piscatores, a capparis similitudine, Capparoculas appellant.

EX M. VERG. COMM.

Nullibi, quod hætenus legerim, Plinius Tellinas appellauit: et nescio, an cõmune hoc multis in mari nomen sit quæ celerrime in integram ætatem absoluuntur. Nouit nostra ætas Tellinas

A

μύακας

Pli. li. 22. cã. 11.

B

τελλινæ

C in mari ubiq; nascentes, quotidiani in cibus usus. Nihil illis Paulus Aegineta tribuit quod non a Dioscoride illis tributum fuerit, priuatim primo sub Tellinarum titulo, mox iterum ubi de omni esculento iure agit, quo loco Tellinarum aluum maxime deijcere ait.

De Chamis. CAP. IX.

χῆμα

C Hamarum, Conchularumq; in exigua aqua decoctarum ius, aluum ciet. Id cum uino assumitur.

Pli. li. 2. ca. 11.

BARBARI COROLL.

C Hamæ, a Græcis χῆμα, species sunt Cōcharum. Aliud in mari uidetur piscis esse genus Chamæ, quas Hiatus quidam interpretantur, habentes uulvam. sicut & qui Erythini, hoc est, Rubelliones dicuntur. Nisi quis ita distinguendum putet, quod & Aristotelis præferunt codices, ut Chamæ hiatus interpretetur; Chamas autem concharum speciem agnoscas. Chamarum duo redduntur genera. Tracheæ, hoc est, asperæ, mali succi, quas & Ostrea cognominant, & in Macedonia Corycos, & Athenis Crios, ut in Murice diximus. Alterum lques, multo meliores, & crassiores, ob id & Pelorides, & Pelorinæ a quibusdam, & Basilicæ uocantur, & ab Helio spartiano Liofrea. Etiam si lithostrea mendose legeretur. Esset hic de Conchis, siue quod idem est, Ostreis, & Conchylis tractandi locus, sed copia deterreor. Sufficiat primum gulæ huic generi datum esse, adagio inde nato. Conchylia uiduarum cupedia, ut est apud Sophronem mimographum, & Phalerum Demetrium. Nec illud prætermisero, Conchæ genus, ex qua margaritæ, unionesq; uellantur, Berberion, & Berberi ab incolis uocati esse, Ping, aut Pectunculi effigie, nisi q; nec auriculas habet ut Pectunculus, nec operculum exterius, sculpturis ullis asperum, sed lque. Coloris quoq; nomen Conchylum, & chliaro conchylum, & cōcha ægyptia Paralios cognomine, quam & Pninā uocat Democritus. Idem Chrysocōchylū fieri docet, sed fictitium, & metallicum, sicut & Chrysocorallium, quod item & gemmæ est nomen.

EX M. VERG. COMM.

D Longa est in Athenæi ostreis Chamarum historia: q; forte sic dictas quondam fuisse ait, παρὰ τὸ κωνήλαι, id est, q; aperto ore, & hiantes, contra q; alia in hoc genere semper sunt. Ex qua causa latinorum aliqui Hiatus eas appellauerunt, nominis rationem, & animalis naturam secuti. In genere minimorum ostreorum Chamæ sunt, tanta cū alijs affinitate, ut facile in antiquis scriptoribus confundat earū historia. Nihil difficilius in tota huiuscemodi rerū cōmētatione est, q; in appellationibus his concordem ueterū historiā ostendere: ob id nos eam peritioribus relinquimus, contenti ab hoc scriptore didicisse, omnium huiuscemodi conchularum in soluenda aluo eandē uim & naturam esse. Fuisseq; in deijcienda aluo antiquis morem, conchylis his uti, indicauit M. Cato centesimo & quinquagesimo octauo sui de re rustica operis capite, inter cætera Mytilis tribus ad eam rem utens.

De Onyche. CAP. X.

ὄνυξ

O N Y X conchylj tegumentum est, ei simile quo purpura intergitur. Quod in Indiæ nardiferis lacubus inuenitur, suauem ideo spirans odorem, quod Conchylia inibi nardi pabulo uescantur. Coligitur posteaq; stagnantes aquæ æstiuus squalloribus inaruerunt. Laudatissimus qui a rubro mari defertur candicans, pinguis. Babylonicus nigrescit, atq; minor conspicitur. Ambo odoris gratia suffiuntur. Sed aliquatenus castoreū olent. Idem suffitu excitant sceminas uulue stragularu oppressas, comitialesq;. Poti uentrem molliunt. Crematum conchylum eadem efficit quæ Purpura & Buccinum.

Pli. li. 2. ca. 11.

BARBARI COROLL.

O Nyx græce dicitur, quod nos Vnguem odoratum uocamus, Ostracium nonnulli appellant, siue Ostracon. Galenus Poma, hoc est, cauū, siue quod idē est, Opculū, etiā in purpuris. Onycē uero Paulus testam uocari dicit conchylj duntaxat Indici, quod & Cōdyliō appellat. Condylō certe Ostrei genus est, eidem Paulo, ut alios præteream. Vngues uocant & quos Solenas Græci dicunt. Eos deniq; Donacas, & Aulos, Theodorus modo Vngues, mō Digtos ap

pellat, in utroq; Plinium secutus. Hinc & piscatores Ostrearum Solinistæ nominabantur, ut Atheno placuit. Et ampulla unguenti Onyx quandoq; dicitur, Porphyrio grammatico.

EX M. VERG. COMM.

Plinius Ostracum cōmuni omniū testaceorum appellatione uocari Onychem hunc dixit. Posteriores Blattā bizantium dixerūt. Hic Onychem generis nomine etiam appellat: quando ubiq; nascentes testæ, in quibus leuor sit & candor, eodem hoc nomine censentur, quod ab ungue humano factum sit, & ad gemmas marmorisq; certum genus translatur etiam fuerit. Ex eodem enim humano ungue, quem græci ὄνυξ dicunt, Onyx: & Sardonyx gemma, & Onychite marmor ab antiquis dicta sunt. Ex eodē plura alia etiam, quæ in græcis & latinis passim leguntur. Variavit natura omnes has in mari testas, uoluitq; eas coloribus, figuris, & quantitate differre: ut nominibus etiam distinguerentur. Onychesq; priuatim dicti sunt, in quorum testis nulli margines, nullæ rugæ, nullæ concauitates, nullæ asperitates essent, sed toto corpore leuor & candor, quales in humano ungue sunt. Ex hoc genere indicus Onyx est. Dico autem indicum: quoniam ut ab alijs seceratur, gentis nota illa nomini adijcienda est. Sic enim Paulus Aegineta eum appellat. Sic etiam græcorum ueteres aliqui codices adhuc habent. Sentiri in eo Nardi odorem Diosc. ait: q; in palustribus Indiæ Nardum ferētibus inueniatur, uescaturq; ea. Non satis certa re, quo modo in palustribus Nardus uiuat, cui in arida uita est: aut si iuxta paludes illas Nardus nascitur, quō nam modo ostreum, cui natura est scopulis in mari herere, extra aquam uesci in arida possit: Barbarus ut alterum scopulum uitaret, in alterum incidit, adiecitq; quod alioquin in Diosc. non legitur. Neq; eū ille ait, in paludibus Indiæ nasci Onychem, ubi regio eius nardifera est, sed inueniri in Indiæ paludibus Nardum ferentibus: nec alia præter hæc in eo sunt. Credimusq; nos respondere quæ in hoc capite leguntur, his quæ in Malobathro a Dioscoride & a nobis dicta fuerunt, plura. s. odoris similitudine in censum & nomen Nardi uenisse, quæ multa tunc numerata ab hoc fuerunt: & inter ea quod Malobathrum antiquitas uocabat, folium ratum quod in paludibus Indiæ fluitans inueniretur odore Nardi, lectumq; ad multos usus seruaretur. Nec tū inclināt alimus nobis, quas hic modo Indiæ nardiferas paludes dicit, easdem illis esse in quibus Malobathrū inueniri & colligi antea tradidit, sed pro comperto rem habere uidetur. Siq; dem utrobq; ait sicari paludes illas æstate. Cūq; in eis Malobathrum inueniatur, odore Nardi foliū, & ob eum odorem in Nardi nomen a multis adscitū, nihil impedit, ne constituamus hoc loco, ex cōmuni omniū opinione, qui Malobathrū cū Nardo miscerent, Nardiferas hunc dixisse paludes, quæ re uera non Nardum, sed Malobathrum ferrent. Constitutoq; hoc, facile & sequax est quod sequitur, pasci Nardo in paludibus his indicos Onyches, parato & ubiq; exposito sibi cibo, & quem extra aquas contra naturæ suæ leges querere non cogerent. Nunq; enim legisse me memini, in ostreorū genere esse quæ ambigua sint, & quæ, qualia pleraq; alia quotidie uident, in aqua parit & arida agere possint.

De Cochleis. CAP. XI.

TERRESTRES Cochleæ, stomacho utiles sunt, & non facile corrumpuntur. Optimæ Sardonicæ, Aphricanæ, Astypaleicæ, & quæ in Sicilia, Chio, & Liguriæ alpibus gignuntur, Pomatice, idest, operculares cognominatæ. Marina stomacho idonea, & facile aluo excernitur. Fluuiatilis uirus olet. Quæ uero uepribus, frutetisq; glutinata coheret, quam uocant nonnulli Cefilon, uentrem & stomachum turbat, uomitiones excitat. Crematæ omniū testæ, excalfaciendi & urendi naturam sortiuntur. Purgant lepras, uisligines, dentesque. Emendant oculorum cicatrices, & uitia cutis in facie, albugines, ac uisus hebetudines, si ustæ tritæque ex melle illinantur. Crudæ cum regum mentis impositæ, aquæ inter cutem tumores exugunt. Sed non ante soluantur, quam omnis hauriatur humor. Podagricas inflammationes leniunt. Impactos corpori aculeos illitæ euocant. Menses tritæ & admotæ ciunt. Carnes earum cum thure & myrrha illitæ, cum uulnera alia,

D I O S C O R I D I S

Cum maxime quæ nerui acceperunt, conglutinant. Tritæ in aceto, sanguinem naribus erumpentem infruant. Viuæ corpus, & præsertim Aphricanæ cum aceto deuoratum, stomachi dolores mitigat. Trita cum testa, uino & myrrha, si exiguum inde bibatur, coli, uesicæque cruciatus sanat. Terrestris, pilos incommodos replicat, si quis abrafo acu lentore, pilum attingat.

Pli. li. 9. ca. 56.
& 11. li. 32. ca.
11. li. 30. ca. 12.

B A R B A R I C O R O L L.

Cochleam, & Limacem Græci Cochlian, & Cochlion appellant. Nam Cochlos, & Cochlos, marinos calculos significat. Est & Cochlos apud Aristotelem, animal testaceum, & aliud quæ Limacis, a Theodoro dictum Vmbilicus. Hoc & Cochlian est, ubi Aristoteles appellat, sicut Limacem quoque Cochlion. Nobilitas precipua Solitanis. A patria item Balearicis; quas in speculuncis nascetes, Cauaticas nominant. Aphricanis duplex genus. Nudarum, testarumque; quibus magna fecunditas. Sicut Illyricis amplitudo. Nam Siculæ commendantur quæ diu paræ sunt; quia magnitudo duras facit, aufertque succum. Laudantur & Caprearum insulis. Præterea sunt quæ albæ, siue albulæ dicuntur, in Reatino agro. Itemque aceratæ lateque, multifariam nascentes. Itæ minutæ. Iam aliæ in usu sunt, læ cibis damnatæ. Cochlearum uiuaria neportibus præcis fuisse, sapientia, & farre, aliisque rebus alendo eas, tanto successu, ut singularum calix quadrantes. 80. caperet. In Aegypti Nilo grandissimæ feruntur, uocales ululatum expressa similitudine. Saliua Cochlearum, quæ punctis, acu, uel stilo carnibus manat, a Græcis, ut Galenus inquit, Myxa dicitur, hoc est, mucosus lentor, siue mucor, mucifus. Limacem Teucer ad exemplum questionis ludicræ, ita finit, Animal sine pedibus, sine spinis, sine ossibus, crustatum, oculos nunc exerens, nunc retrahens. Cicero, terrigenam, herbigradam, domiportam, sanguine cassam. Inuenio Limacis genus Cocaliam ab Aristotele uocari, & aliud Abrotonem. Quamque sunt qui locustam putent, Item qui apem, Alij qui piratam in eo uocabulo intelligant. Strabo Cocleas prædicat Linusias, ab agro, cui nomen Lino est, iuxta Pityntem, medio Parianâ coloniam, & Priapum spacio.

Libro. 13.

E X M. V E R G. C O M M.

Domiportam Cicero, græcorum more, qui *οπιπορν* inter cetera nomina eam uocant, Cochleam dixit. Nec male una hac ratione laudata est necessario homini exemplo, ut sua omnia secum ipse etiam ferat, & Prienæi sapientis modo eas domi suæ opes coaceruet, quas nec hostis ferat, nec populetur bellum. Idem Sanguine cassam appellauit; propterea, quæ illi salua & mucosus lentor pro sanguine sit, quo in oculorum medicina, ut hic docuit, ueteres utebantur. Quibus, quod hætenus inuenerim, nullus fuit usus exsudati igne ex Cochleis humoris, quo nostræ ætatis medicina, præsentis remedio utitur in his, quorum corpora ad tabem lubrica sunt, & macie cõficiuntur. Silice operimenti cinere, carnibus, & crudis totis Cochleis contra aliquot hominis mala antiquitas tantum usa est.

καρκινος

De Cancris. CAP. XII.

CANCROrum fluuiatilium exustorum cinis, qui duo cochlearia expleat, adiecto consimili radice gentianæ modo, triduo potus cum uino, magnopere prodest canis rabiosi moribus. Rimas pedum, sedisque, perniunculos, & carcinomata, cum decocto melle lenit. Triui crudi, potiusque ex asinino lacte, auxiliantur contra serpentium phalangiorumque morsus, atque scorpionum ictus. Decocti autem, & cum iure elitati, ijs profunt qui tabe conficiuntur, aut leporem marinum hauerunt. Necant scorpiones triti, & cum ocimo admoti. Possunt eadem marini, uerum inefficacius omnia præstant.

Pli. li. 9. ca. 31.

A R R B A R I C O L L.

Cancer græce Carcinus, mirabile contra morsum canis rabidi remedium; præsertim ut Aesculapion parabat, qui popularis, & præceptor Galeno fuit, urens eos astate in patella uiuos sub Canis ortum, cum sol in Leonem transisset, non nisi 18. luna. Pelops medicus, idemque Gale-

ni doctor, qui rerum omnium causas, & effectus scire profitebatur, hanc Cancrorum uim in Canis morfu, qualitati corporis, ac materię, non proprietati naturę tribuebat. Nec fere quisq̃ est, qui eum sequatur.

T De terrestri Scorpione. CAP. XIII.

Terrestis Scorpio tritus & impositus, suę plagę remedium est.

Quin inuenitur assatus ad eadem prodesse.

BARBARI COROLL.

Scorpionum duō summa genera fere traduntur, Terrestres, & Marini. Sed Pausanias uide disse prodit & uolucres, pinnatosq̃, ut locustę sunt, ē Phrygia in Ioniam translatos.

M De marino Scorpione. CAP. XIII.

Marini Scorpionis fel conuenit ad suffusiones oculorum, albugines, & hebetudines.

BARBARI COROLL.

Scorpionum, alij Pelagi sunt, atq̃ alto mari capiuntur; alij Palustres, ac cœnosi potius. Preferuntur sapore pelagij, quos & rufos colore prædicant, cum alteri sint subatri. Aristoteles & Scorpidas nominat. Nec constat, pro diuerso, an pro eodem genere acceperit, Scorpiana certe, ut Athenæo placet, euidenter a Scorpione differt.

D De Dracone marino. CAP. XV.

Dracone marinus replicatus atque impositus, ictus spinę suę qua ferit, medela est.

BARBARI COROLL.

Dictum est huic Draconum generi Marinum, ut a terrestribus Aethiopicę distingueret: qui, ut inquit Aetius, non ueneno, sed dentibus, quos similes aprugnis habent, opprimunt; colore enim uno, sed alij ruffo, alij cinereo, alij nigro. Præterea iubarum umbra tecta, prominentibus e mento barbulis, ore uasto, lingua præpeti.

EX M. VERG. COMM.

Non ab re fuerit quesisse, ut in Scorpione dictum est, an eundem illum Draconem qui uulnerauit, medicinam uulneri a se facto, facere dicat: an ex eodem genere quem potuerit aliquis habere. Nobis in priorem illam partem animus inclinat.

S De Scolopendra. CAP. XVI.

Scolopendra in oleo decocta, si illinat, auellit capillos.

Sed contactu pruritus facit.

BARBARI COROLL.

Scolopendra Marina dicitur, quoniam et terrestis sit, ut post liquebit. Dioscorides Ophioctenam quoq̃ nominat, aut Scolopendram, aut uermē scolopendrę similem accipiens, libro huius opis extremo. Emoris inqt a Scolopēdra, siue Ophioctena, locus ambitu colluiescit.

EX M. VERG. COMM.

Q uales terrę Scolopendrę, siue Centipedes sunt, tales & marinę, longiores, tereti corpore, & infinitis pene pedibus ingredientibus, notissimum omnibus insectum, & ex quo rustici futurę pluuię præfagia aliquando accipiant.

M De Torpedine pisce. CAP. XVII.

Marina Torpedo diuturnis capitis doloribus admota, cruciatus uehementiam mulcet. Eadem apposita, conuersam sedē, prociduamq̃ coerct.

BARBARI COROLL.

Torpedo, a Græcis dicta Nærce, nomen utraq̃ lingua ex argumento inuenit, quod etiā e longinquo, aut si hasta, uirgaue attingatur, quamuis præualidos lacertos torpescere, q̃libet ue loces ad cursum pedes, alligari faciat. Est & Turpæna piscis maritimus, a quo Cerati quoddā getus, ad duricias emolliendas appellatum est a medicis, ut est apud Paulum.

A

σκόρπιος χιρ-
σαϊος

Pli. li. ii. ca. 25.

σκόρπιος θαλάτ-
τιος

Pli. li. 32. ca. 11.

δράκων θαλάτ-
τιος

Pli. li. 8. ca. 13.

B

σκολόπενδρα

Pli. li. 32. ca. 11.

νάρκη θαλάσσια

Pli. li. 32. ca. 1.

3. li. 9. cap. 51.

D I O S C O R I D I S

C A P. V. E X M. V E R G. C O M M.

C **A** B euentu græci suam Narcem, Romani suam Torpedinem dixerunt. Vtrisq; em in sua ap-
pellatione eadē piscis nota & uis indicatur: quæ tanta esse traditur, ut hamo capta, per ferrū, se-
tam, harūdinemq; in piscatorē torporis sui naturā & uim Nærcē trāserat, & limo obruta, ad-
natantes pisciculos eodē torpore imobiles corripit. Ignauī ingenī piscis, & qui, quā alij mānī
festam & generosam uenationem faciunt, clandestinis dolis, & quasi ueneno quodam hęc sibi
acquirat: quasi Maronis illud ad uitam magis laudauerit, Dolus, an utritus quis in hoste requi-
rat: Hanc Paulus Aegineta uiuentem, ad arcendos capitis dolores capiti imponi iussit: idq; eo-
dem illo torpore facere, quo membra omnia hominis contactu eius torpere creduntur. Viuen-
tem præterea in oleo coqui, oleoq; illo utiliter inungi articulorum dolores: & præter hęc, quod
hic de procidente & inuersa sede ait. In cuius mali significatione, non placet quod Barbarus
ait, procidentis interanei, aut euerſi morbum coercet. Latius enim interaneum patet, & hic se-
dem tantum dicit; & inuersam, non euerſam eam partem appellat.

V **De Viperinis carnibus.** C A P. X V I I I.

V Iperinæ carnes si coctæ edantur, claritatem oculis afferunt. Ner-
uorum uitij auxiliantur. Increſcentes ſtrumas reprimunt. De-
tracta autem cute, caput caudaq; quoniam carne uacant, amputari de-
bent. Quippe commenticiū est, quod præcipitur, certam utrinq; men-
suram præcidi oportere. Reliquum uero corpus elotum, dissectumq; dis-
coquitur cum oleo, uino, ſalis exiguo, & anetho. Aiunt ijs qui Viperas
esitent pediculos procreari, quod plane a ueritate abhorret. Adhiciunt alij
qui, longam ſenectutem agere, qui eo cibo ueſcuntur. Sal ex eis ad eadem
D conficitur, ſed inefficacior eſt. Viua autem Viperæ in ſicile nouū demit-
titur: adhiciuntur ſalis, caricarumq; tritarum ſingulorum quinq; ſextarij;
mellis cyathi ſex: mox ſicilis operculum luto oblituitur, & fornacibus
inaſſatur, donec ſal in carbones redigatur: qui poſtea tritus in pulueris
faciem, reconditur. Plarumq; quo ſtomacho grator fiat, immiſcetur
Nardi ſpica, aut folium, aut Malabathri momentum.

V **B A R B A R I C O R O L L.**

Pli. li. 10. ca. 62

V Ipa Echis, & Echidne a Græcis uocata. Sed prior mas, ſequēs ſemina eſt. Hęc colore ſuffla-
uo, multis maculata capillamentis cernit. magnitudine cubitali, aliquē etiā palmorū ternū, utiq;
ſi nō ſit Indica. qppe quā cubitorū .9. & dodrātis a ſe uiſa Nearchus, & Strabo p̄dicāt. Cauda
Viperæ nō paulatim gracileſcente, ſed uniuerſim, & p̄tinus Vip̄a, & ſine carne. Oculi ſubrubeſcunt,
caput latiſculū, cœruix anguſtior. Aluus p̄minula, meatus ad extrema caudē. Inceſſus q̄cti p̄-
ximus, dētes canini quatuor. Cōtra mari, anguſtius caput, cœruix craſſior, corpus uniuerſū te-
nuius & p̄cerius, meat ſupiore uētris p̄te ſeſtinātius. Dētes canini duo, rotidēq; uulnera. Horis
ſeptē, ſumū die. .3. cōficiūt Vip̄e. Sūt q̄ Dipſadas a Vip̄a nō diſtinguāt: niſi q̄ Dipſades ſaſſa lo-
ca incolūt: unde fiat, ut caro earū ſaſſa q̄q; ſentiat, alienaq; ſit medicīne, uehemētīſſimā ſit m̄aſ
ferēs utētib; et inde nomē: quales in Africa plurimę naſcant. Nullę in Italia, p̄pter cœli, ſolique
molliciē. Hoc ſe Gal. Romę ab ijs, q̄ ſerpētes uenant, Marſiq; dicant, accepiſſe ſcribit: nec tñ o-
minino credere. Cubitales eſſe p̄hibent craſſitudine, in gracilitatē ſe minuēte, nigris & ruſſentib;
bus int̄p̄tē maculis, anguſtiorē q̄ Viparū capite. Dioſco. etiā P̄ſterās uocari eas uoluit. So-
linus diſtinguit. Percuſſus inq̄ diſtendit, & corpulētia enormi diſſilit. De Vip̄a, ut cōſtat, The-
riaci paſtilli ſūt, q̄ quēadmodū cōficiāt, alio loco indicabimus. Vip̄erā Italia mō aut nō habet,
aut nō agnoſcit. Quāq; ſūt q̄ Marſos Angues, ut inq̄t Euſtathius, & ut uulgus ipſū mō uocat
Marſos, p̄ Vip̄is accipiāt: ita paſſim uocatib; Hiſpanis, ex q̄bus q̄ ſūt minus atri, Aſpides ru-
ribus dicunt. Aſpidū uero tria ḡna. Chelidonix, ab hirundinū colore, iuxta ripas amniū, ſed
Nili p̄cipue uerſant, paulo cubitalibus maiores. Secūdū genus Cherſea, hoc eſt, treſtre, ſub
uiridi fere, aut cineris colore, cubitorū quinū. Maiores ijs ſunt Pyades, q̄bus idem color, ſed
& auro quoq; proximus. Intra horas oēs cōficiūt; celerius Chelidonix, tardius Pyades. Mas

binos ictus, fœmina quaternos relinquit. Pryadem fuisse, quam Cleopatra sibi admouit, Galenus auctor. Hæc ceruicē exporrigens, metū ex interuallo quē feriat, Solinus Hypnalem dicit appellari, necantē somno, quā uicā sibi Cleopatra inuiderit. Aspidas in Aegypto, Nicaderatē, sunt qui ferūt alias dodrantes, quæ citius interimāt, alias etiā passum iustū longas.

EX M. VERG. COM M.

Negabant quondā Marſi, gens quæ in Italia impune serpentes uenare, & tractaret, Viperas in nostro orbe nasci, ob cœli temperiem, & molliorem solī naturā. Id tamen non credere se Galenus ait. Omnes contra Africæ, peculiare hoc naturæ malū potius, q̃ animal esse testati sunt. Idem non satis certe genus & formā Viperæ descripserunt: alijs Dipsadem: alijs Præsterem, alijs aliud genus & nomen Viperæ assignantibus: alijs hac forma, alijs illa describentibus. Longum sit, si Strabonis, Galeni, eiusdem scriptoris huius, multorumq; aliorum dicta hoc loco congeſſerimus, & præter longitudinē superuacuum etiā: cum ante nos plura ex his Barbaris in Corollario suo retulerit, quæ poterunt uolentes ab eo intelligere. Nos propositū nostrum agentes, ex ueterum Græcorū decretis primū monebimus, calido siccoq; palam temperamento esse Viperinas carnes, totumq; corpus per cutem purgare: ideoq; ab elephantis suis, solo hoc cibo, multos ad sanitatē restitutos fuisse, testatus libro sexto Paulus Aegineta est. Nec minus libro 4. quo loco de mali illius curatione agens, Viperinis carnibus uti iubet: & si sit earū copia, nihil æque in cibo prodesse testatur. Iubet præterea, cōfecto uiperinis carnibus sale illo, de quo paulo ante dictum est, pariter uti, nec minus prodesse. Quem ille Theriacū ideo uocat, q̃ in τῷ θυρίῳ, id est, uenenato, & serpente hoc animali cōfectus fuerit. Idem contra strumas eodem Dioscoridi, aut non dissimili remedio pugnat. Hic Viperæ carnibus strumarum incrementa sisti ait: Ille non uiperam, sed quem Græci ὄφιον uocant, iubet in fictile gypso circūlittum conijci, & in fornace cremari: tum addito sœno græco, melle subigi: eaq; ratione uti. ὄφιον autem intelligere oportet, quē nos Anguem dicimus omnibus notū. Vtitur medicamēto etiā ex aspidibus cōfecto. Ex quibus cogitatū a nobis aliquādo est, nō adeo differre Viperas ab Aspidibus, & nostrates Angues nō dissimiles penitus uires habere posse: quodq; in Africanis laudatur, & alijs antefert siccitate regionis, & cœli temperamēto fieri. Iubet deinde in præparandis ad cocturā Viperis, detractā primū pellem, mox caput & caudā amputari: quia minus, aut nihil carnis hæ partes habent, in qua amputatione dānat, fabulosumq; esse dicit, quod quidā præceperunt, certa aliqua mensura auferendas Viperæ partes illas esse. Quod tamē antiqui oēs testati sunt, eamq; digitorū quatuor fore decreuerūt. Plinius lib. 29. cap. 5. cuius hæc uerba sunt: Quatuor digitorū mensura utriusq; præcisa. Paulus Aegineta primo quarti uoluminis capite in Viperæ coctura, προκοπιπὼν πρότερον τῶντι κεφαλῶν αὐτῶν καὶ τῶν ὀφθαλμῶν οἷον ἀπὸ δακτύλων τῶν εἰρῶν. Quod est, amputatis antea capitibus & caudis quatuor fere digitorū mensura. Id ipsum & pleriq; alij testant. Nec dānat, negatq; Dioscori. earum partiū amputationē, sed quā uulgus amputationis cām opinat, quia, scilicet ueneni sedes in his partibus sit: fabulosamq; huiuscemodi historiā testatur, & q̃ certa mensura amputandæ illæ partes sint. Causa em̃ amputationis est, nulla in his partibus caro, & ob id inutilitas, cōiecturæq; satis ad mensurā est: ideoq; & Paulus Aegineta quatuor fere digitorū dixit, qui per latitudinē, & ut in manu se contingūt intelligendi sunt. Cōiunctū huic est, quod nos uitiosum oīno suspicamur, & ex similitudine uocis alterū ex altero participio factū esse, τὸ δὲ λαπὼν πλύναντας καὶ τιμαχίσαντας, &c. Quod si uerbū de uerbo uertas significat, postremo autē lotā, & in frustra disiectam Viperā, &c. Lauare em̃ πλύνειν est. Et si sic legat, dubitandū non est, quin lauari ante cocturā Viperā oporteat. Ac nō sic in omnibus græcis legi. Vidimus em̃ nec spernendæ fidei codices, in quibus non πλύναντας, id est, cum lauerimus, sed πλατύναντας, id est, cū aperuerimus, & quasi diffisa inferiore parte diuicauerimus, tunc in frustra disiectā coqui oportere: nullo alio sensu, q̃ ut significetur, oportere Viperā euiscerari, detractisq; interaneis omnibus tūc coquendā esse. Persuademurq; in eo facile, q̃ hic sensus a rei necessitate non abhorret, q̃q; integrā adhuc lectio in aliquibus hæc est, & q̃ Plinius eodem loco ait, exemptis interaneis discoqui in aqua, aut oleo, &c. & præter Pliniū Paulus Aegineta eodē loco. Cuius hæc uerba sunt: ἀφαιρῶντων δὲ τῶν ἐντέρων, &c. Quod est, ablatis interaneis, quorū nulla fieri detractio, nisi aperta & dilatata inferiore parte poterat. Ideoq; nos, relictā lotura, exēptis interaneis coqui Viperā diximus. Addiderūt huic cocturæ aliqui, q̃ a Dioscori. non dicunt, rutā, & porrū. Neq; ab re fuerit, suspicari in tot rerū censu, potuisse librarium incuria perire, aut ambo hæc, aut eorū alterū. Dubitandū illic etiā, quo loco Dioscori. ait credi, pediculos gignere qui uiperinis carnibus, aut earū iure uescant, fieri ne id, an cōtra non fieri pediculos Dioscori. dixerit his qui ea uescuntur. Multa enim in utrāq; partem asserri pos-

C sunt. Galenus, Paulusq; Aegineta, quod haecenus legerim, nihil de pediculis his doctuerunt, sed alter quod ad hanc rem faciat tantum dixit, per cutem totum uiperinarum carniū cibo purgari corpus: potuitq; cōmuni purgationis appellatione illa, pediculos etiā intelligere, qui, ut in pediculosis a longa ualitudine fit, pellente corruptos humores natura, toto corpore aliquando gignuntur. Alter certius, longiusq; descripta eadem uiperinarū carniū potestate, ampliore adhuc uoce usus, ait gigni in cute uiperarū carnibus uescentiū cuncta illa, quae corrupti intra hominem humores gignere solent: numerauitq; scabies, lepras, labelsq; alias, in quibus extima uitiatur cutis, nulla pediculorū priuatim habita mentione. Quodq; in his sit propria earum carniū potestate, fieri & in alijs poterit, quae quod crassum terrestreq; in humore nostro est, in exteriorē partem pellunt: in quo genere potuit & pediculorū labe illa etiam censeri. Plinius tantum pediculorum eodem libro his uerbis meminit. Ius, praeter supradicta pediculos e toto corpore expellit. Quo uerbo usus, negare uideretur, quod Dioscorides, & si falsum mox dicit id esse, confirmat: nisi in expulsiōis uerbo, non fuga & euectio intelligenda sit, sed ut in auibus, quae pullos suos post incubitum excludere dicuntur, generatio, & quasi ex occulto & priuatione in lucem & uitam protractio, nec aliud expellere uerbum, q̄ ad generationem excludere Plinio illic significet. Quae omnia longius dicta a nobis sunt: quoniam non defunt in graecis, in quibus contrario sensu μή γινώσκω, quod est, non gignere legat. Nos in ambiguo munem lectionē secuti sumus, praesertim negat id fieri Dioscoride. Variant in extremo capite non multo post antiqui Graecorū codices, suntq; in quibus πρὸς ὑπομαχίαν, id est, ad stomachi utilitatem legatur. Habetq; utraq; lectio quo niti possit. In priore illa, & ratio, & cōmunis lectio est: in posteriore, ratio, & Plinij auctoritas, qui eodem libro & capite ait, Exurit, cum sale in olla, quem lingendo claritatem oculorū consequitur, & stomachi totiusq; corporis festiuitates.

De senecta Anguium.

CAP. XIX.

3988 οφιοσ

Senectus Anguium in uino decocta, dolori aurium infusu, & dentium, collutione auxilio est. Addunt eam in medicamenta oculorum, sed praecipue uiperinam.

Plin. 20. cap.
23. & 20.

B A R B A R I C O R O L L.

Senectus Anguina, graece Geras opheos, a Catone Pellis Anguina dicitur, Coriū anguis a Palladio, Leberis ab Hippocrate. Inuitat me Serpentiū natura, ut praeter supradictas de generibus earū reliquis, quatenus ad Dioscoridis extremū uolumen attinet, breuissime attingam. Haemorrhus, & Haemorrhoidis, a sanguinis effectu nominantur, qui toto corpore percussis effluit. Ille mas, haec foemina est. Vtriq; colos arenaceus. Magnitudo palmorū trium. Crassitudine paulatim, in tenuitatem descendere. Incessu tardo, & directo serpunt, ruffis, ut quidam scribūt, pedibus. Maculae per totas, multae, partim atrae, partim candidae, squamis asperae. Ob id ingredientēs, strepitu sese produnt. Foemina in aluum iacet serpendo, meatumq; uersus caudam inferiore situ continet. Mas autem uersus aluū habet, ceruicemq; serpendo porrigit. Foemina perniciosior, ut ex cuius ictu dentes gingiuae, unguesq; decidant. Colore sabuli uisunt & Hammoditae, maxillis Viperarū latioribus, cui & similis est, nisi q̄ uiperarū color suffuluit. Hos & Cenchrias nominat Aetius, cubitales eos describens, nigris maculis, cauda superiore parte scissa, & praedura: unde nomen inquit, Cenchriae, ut cenchriam potius, q̄ cenchriam putem legendum. Nam Cenchrites, siue Cenchrinus, siue Cancros, aliud serpentis genus est, quod & Acontion, & acontitem, & acontiam aspidem, hoc est, iaculum uocāt aliqui: ut idem uoluit Aetius, longitudine cubitorum binum in exilitatem fastigiatū, uiride praesertim sub aluum, ut milio, cum recens eius seges est, uideatur persimile robustum. Praeterea se iaculi specie praeiiciens, infestumq; saltui. Erasistratus epar, colon, uelicam affici eorum scribit, quos Cenchrinus peremerit. Arenae colore, & cerasae magnitudo, cubiti unius, summūq; duorū, squarrosa cauda, binis in capite corniculis, siue quadragenis, ut Solino placuit, squamis uero in uersum quandam sub aluo conditis: eo fieri, ut crepitum sibilo non dissimilem serpendo edant. Incessu obliquo. Non die interficit. Dryini a quercubus dicitur, q̄ in radicibus earū, ut Galenus inquit, uiuant, in Helleponto copiosi, odore tetro, qui & eos prodit, si quis aggrediatur eos perimere. Olfactu multantur, nec alterius rei odorem praeterea sentire perhibent. Qui uero supergreditur imprudens, crura tumescere, cutem pedibus abscedere, manus quoq; ipsas curantium eodem modo periclitari. Amplitudo bicubitalis, Præpingue corpus, muni-

tum, loricatiq; squamis durissimis, in quibus Aeripennes muscæ latitant, quæ ipsum animal conficiunt. Amphibæna similis est Scytalæ tereti, & æquali corpore, uti ne caput utra parte sit cognosci possit. Amphibæna etiā biceps est, ut inquit Galenus, & utraq; parte ingreditur. Vnde nomen. Cæterū nec Amphibæna, ut Aetius existimat, interficit, nec Scytale, præterq; chalcidica, eandem afferens quam uipera perniciem. Scytale tanta uarietate fulget tergoris, ut notarum gratia moretur obuios. Prima ponit exuias. Hydros, siue Natrix primū in terra uiuit, & Chersydros appellatur. Deinde in aqua. Similis est aspidi pusillæ, præterq; q̄ ceruicem latam non habet ut aspides. Nominatur ab Aetio & Parous, in Syria proueniens, modo æris colore, modo nigricans. Item Spathiuos apud Chalcidem, ex crassitudine in exilitatem procumbens, lato capite. Sed neutrum genus inferre mortem. Ab eodem auctore Pelias, & Elaps produntur, sed quia noti sunt, descriptione, inquit, non indigent. Elaps & a Solino dicitur. Fit & Chamedraconū mentio. Sed omniū sine dubio pestilentissimū est animal, quod a triplici frontis apice, quasi alba mitrula, & plane regio insigni Basiliscus appellatur, palmorū ternum longitudine, fusilauus, exacuto capite, cuius uel sibilum animantes nullæ perferunt, præter Mustellam, a qua uincitur. Auditus, conspectusq; momento perimit. Quicquid morfu eius occidit, ipsum etiam extinctum, iacentemq; nullum attingit animal. Vulnus ab eo factū, ut inquit Erasistratus, aureo colore obducitur. Ex his quas dixi pestibus, alias esse surdas, alias haberi cæcas, quæ propterea Typhlini, hoc est, Cæciliæ uocantur. Prouidentia nature factū esse dicerem, nisi facile responderi posset ab imperitis, melius consulturam fuisse, omnino nō peperisse, q̄ si captas oculis, & auribus peperisset. Ita enī leges nature dicimus eadem facilitate, qua contemnimus. Atq; utinā accusare mala satis esset. Odimus & bona. Vfu certe comperi, haud temere alios naturæ taxatores esse, q̄ quibus uitia ipsa placent, impunita tem conquestione redimentibus. Sed & alterius curæ sunt. Illud obiter admonendi sunt leatores, ea quæ de serpentibus a neotericis dicuntur, præsertimq; Arabibus, & eorum Principe (ita enim modo scholæ uocant, & Galeno quoq; præferunt, si Djs placet) usq; adeo negligenter & sordide mandata esse literis, ita mendacis haberi plena, ut non dico infantissimi, sed plane omni rerum usu uacui fuisse uideantur.

EX M. VERG. COMM.

Quam hic contra dentiū dolores Anguium senectū in uino, Paulus Aegineta in aceto decoquit, & quā hic ^{ixv}, id est, Viperā dicit, ille Dipsaden uocat, non negligendo testi monio uagū quondā in Græcis uiperarū nomen fuisse, unaq; hac appellatione plures huiusce modi species nunc etiā intelligi posse. Nihil senectū anguis, siue anguina uernatio hæc aliud est, q̄ quod hyemalem torporem exuentes, appetente uere Angues, spoliū relinquūt, & quā lubrica serpens exiit in spinis uestem, ut Lucretius cecinit, Græci ^{ῥιπας}, id est, senectutem eam dixerunt, Plinius quod uere id fiat, Vernationem appellauit.

De Lepore marino.

CAP. XX.

Lepus marinus Lolligini parū similis est, qui per sese tritus, aut cum urtica illitus, capillos euellit.

BARBARI COROLL.

Lepus marinus, græce Lagoos thalassios, animal pusillum, odore terro. Inter Lolligines se re uersatur, quibus & similis esse dicitur. Venenū id est, alijs cibo, alijs potu, alijs contuitu. Si quidem grauidæ, si feminæ ex eo genere aspexerint, confestim nausea, & redundatione stomachi uitū fatentur, ac deinde abortum faciunt. Remedio esse mare tradunt, induratū sale, ut in brachialibus eū habeat. Eadē pestis, in alto, uel tactu solo nocet. Vescit eo unū tantū animal, ut nō intreat, Mulus piscis, & tenerescit. Inde ingrator, uiliorq; fit. Hoies qbus in pastu fuerit, pi scē olent, moriūturq; totidē diebus, quot Lepus uixerit. Oīno incerti tēporis ueneficiū id affir māt. In India uiuentē capi negāt, inuicēq; illi hominē pro ueneno esse, ac digito quoq; in marf tactū emori. Eise autē ampliōrē multo, quemadmodū reliqua orbis eius animalia.

EX M. VERG. COMM.

Nouerūt terrestrem Leporem in continenti agentes oēs, Marinū piscatores, & qui ad mare habitant, informē magis offam q̄ piscem: cuius formā ex ueteribus plures descripserunt, inter uenenata ab hoc ipso scriptore in sexto uolumine numeratū, de quo tunc copiosius & certius ex Nicandro & alijs agetur. Hunc non satis certo intellectu, cum urtica simpliciter depilare cæteri interpretes dixerūt, cōm græcorū lectionem secuti, cui deest quod in melioribus adhuc in

A

Basiliscus.

Auticennā, Ra
sis, & Serapi
on taxantur.

B

αγώς θα
λάσσιοςPli. li. 9. ca. 49.
li. 32. ca. 5. & 11.

D I O S C O R I D I S

Cuenit, quodq; a Paulo Aegineta in sexto uolumine tradit, Quorū fidem & auctoritatē nos secuti, quod Dioscoridi deerat adiecimus, cū marina urtica illitū leporem marinū depilare uer-
λαγώς χερσαίος
 tentes. Paulus enī his uerbis rem explet λαγώς θαλάσσιος λίος καταχρίσθαι καθ' αὐτὴν καὶ μετ' ἀκαλῶ
 φησὶ θαλάσσιος τρίχας φίλοι. Quod est, Marinus lepus concisus, inunctusq; per se, & cū marina ur-
 tica pilos aufert. Idipsum & meliores Græci habent. Esse autē in mari urticas, & homini medici
 nā facere, testatus Plinius pluribus locis est, qui lib. 9. cap. 45. totā earum naturā & in medicina
 uires pluribus locis descripsit. Testati & alij sunt, quos huiusmodi causa relinquimus.

De Lepore terrestri. CAP. XXI.

Terrestris Leporis inassatum cerebrum manditur, iuuandis tre-
 moribus, qui uoletudine contracti sunt. Affricū, aut cibo faci-
 lem infantibus dentitionem præstat. Exustum caput, & cum adipe ur-
 sino, aut aceto illitum, alopeciarum inanitatibus medetur. Leporinum
 coagulum, post triduum a concubitu potum, conceptum adimere, par-
 tusq; spem intercipere proditur. Vuluæ & alui fluorem sistit. Comitiales
 iuuat. Contra tienena ex aceto bibitur, præsertim aduersus concretum
 lac, & uiperarum morsus. Sanguis eius si calidus illinatur, uitia cutis in
 facie, uiriliginem, lentiginēq; sanat.

B A R B A R I C O R O L L.

Lepus terrestris, græce Lagos, & Lagoos chersæos, & a stupore atq; metu, Prox, & ab dor-
 miendi habitu Derceumenos, Nicadro, Lagides quoq; Strabo eos uocauit: dictus, ut Varro
 putat, non quasi lenipes, sed q; Eloes Boeth leporem uocarent ita. Genus Leporum triplex.
 Italicum, Gallicum, siue Alpinū: qui toti sunt candidi, niuem elstant algoribus, qua liquecen-
 te, rutilescunt, raroq; Romam perferuntur. Adapis nomine Hispanum, quos, ut Polybius est
 auctor, appellamus Cuniculos. Quorum fortis, uentre exectos, aut ab uberibus ablatos, gra-
 tissimo cibo Lautices appellant. Strabo Leberidas a quibusdam appellari tradit ipsos Cuni-
 culos: qui ab effectu Lepores Gæorychiæ, hoc est, fossiles ab ipso cognominantur. Aristoteles
 & Iulius Pollux Leporem etiam Dasypoden uocari tradunt. Alij distinguūt Dasypoden a Le-
 pore. Inuenio & Chelidoniā cognominatum genus quoddam leporis a Diphilo. Sunt qui
 Plinium accusent, q; Leporem alium a Dasypode uideatur habuisse. Nec intelligunt, genus
 quidem unum ambobus esse, sed discriminis tamen aliquid inter eos notari posse. Nam illud,
 quod a Plinio dictum uidetur esse Lepori coagulum, inutile. Dasypodi præcipuum. Lectio-
 nem arbitror corruptam, ut in Annotationibus libri undecimi docuimus. Nec illud tamen
 inficias eundum est, confundi sæpe nomina, ut & Leporem pro Dasypode, & contra pro
 Lepore Dasypodem Lepores appellasse uideam. Dioscorides certe Leporem, nec aliter uoca-
 re solet, opere toto. Apud nos certe Lepores montani, differunt a campestribus, in Triden-
 tinis & Vicentinis alpibus frequentes, nigritia, magnitudine, ferocia, densiore pilo, a cate-
 ris distincti. De Lepore prouerbiū dictum est, λαγώνος κρεῖν ἡπιθυμῖν, Leporis carnes concu-
 piscis, usurpatum a Terentio in Eunuchō.

De Pastinaca. CAP. XXII.

Marinæ Pastinacæ radius, qui eius cauda enatus aduersis squam-
 mis reflectitur, dentiū dolorē mitigat. Nā eos frangit & euocat.

B A R B A R I C O R O L L.

Plin. 32. cap. 2.
 21. lib. 9. ca. 20.

Pastinaca piscis, græce Trygon, Turturis appellatione dicitur. Hæc quæ momorderit, si
 figatur in arbore, querna maxime, liberari qui sit percussus, arborem siccescere, auctores sunt.
 Vt meminit Aetius. Pastinaca dicitur, & insecti genus, quod ab Aristotele, Staphlinus ap-
 pellatur, uerticilli magnitudine.

E X M. V E R G. C O M M.

Radium, quē nos aculeum in maris Pastinaca diximus, Plinius appellat, nulla rei, sed sola
 nominis diuersitate. Hanc Græci Trygona, Turturiæquiuoca appellatione, uocāt. Nec nobis
 ex antiquo scriptore aliquo causa satis patet, quod sæpe desyderauimus; quemadmodū desy-

derare nunc etiā cogimur, quis nam in sedando dentium dolore usus aculei eius sit: neq; etiā hic docet, inspergendus ne, an imponendus dentibus sit: an percussisse, conuulsisseue eo dentes oporteat. Poterunt diligentiores nouisse id, & nescientes docere.

De Sepia.

CAP. XXIII.

Sepiæ coctæ comesum atramentum ægre concoquitur. Aluum molit. Collyrijs e testa factis conuenienter genarum scabriciæ perfriantur. Vstum in sua testa, donec id quod crustosum est abscedat, postea tritum, expurgat uutiligines, furfures, dentes, & uitia cutis in facie. Elotum in medicamenta oculorum addi solet. Contra albugines, oculis iumentorum efficaciter inspuitur. Pterygia oculorum absorbit, cum sale tritum & iniectum.

BARBARI COROLL.

Sepiæ Græci *σηπία* uocant, & Lolligines Theutidas, de quibus Marro græcus poeta cecinit. Solos pisciū cognoscere, quid atrū, quid album sit. Differunt Lolligines a Sepijs, toto genere, q̄q; & amicitia & similitudine conueniunt. Est & Teuthos, magnitudine insignis, qua sola ferè differt a Teuthide, ut Theuthos Lolligo, Teuthis Lolliguncula dici iure possit. Atramentum Lolligini suppalidum, nigrum Sepiæ. Inuenio & libi genus Teuthida, hoc est, Lolligunculam a Græcis uocatum. Thebani ridentur a Comicis, qui Sepiam opitolicam, gallum galinaceum orthalicon, ficus tyca, hirundines cotiladas nominant.

EX M. VERG. COMM.

In uocibus uitium, & male sequax earum ductus est. Nam quod ad rem pertinet, facile est, quod hic docet intellexisse. Duo enim in Sepia. Primum sunt, quod duriore testa intra eam clauditur: & quæ foris claudit, id testa. Rursus in exteriorē testa duplex rei substantia. Quod intus pumicosum, & tenerius q̄ pumexi: & quod foris silicium, durius, crustaceum, & in quo cum asperitate aliqua læuor est. Ex his in duobus tantū medicas uires aliquas esse Dioscorid. docuit: in eo quod testa clauditur, uentrem mollire: & in eo quod claudit, asperitatem palpebrarum leuigare, uutiliginesq; & alias his similes corporis labe extirpare: non tamen simpliciter, sed cinerem eius. Quam ob causam addidit, crematā in propria testa Sepiæ testam, &c. obscure quidem, sed necessariō rei intellectu, ex eo quod sequitur, donec quod crustaceum in eis est abscesserit. Crustaceum enim hic dicit, extimū illud operimentū, quale nos paulo ante descripsimus. Estq; sensus, crematā Sepiæ testam, donec extima illa pars, quam hic crustaceam dicit, ui ignis coacta, a reliquo pumicoso corpore separata ceciderit: integræ enim cocturæ indicium id erit. Post quā hic iubet, friatā in puluerem corpori inspergi. Nosq; rei necessitatem, & Paulum Aeginetā secuti, ut legitur uertimus: qui de eadem hac re libro primō agens, *κικαμινον σηπίας ὀφθαλμῶν* dixit, id est, crematam Sepiæ testam. Idem etiā nobis auctor fuit, ut in extremo capite salī fossili adijceremus: quod in aliquibus græcorum adhuc legitur, & ab eo in extendendis oculorum unguibus manifeste præcipitur.

De Mulo pisce.

CAP. XXIII.

Mulorum assiduo cibo, aciem oculorum hebetari constat. Is marini Draconis, Aranei, ac Scorpionis moribus medetur, si crudus atq; dissectus admoueatur.

BARBARI COROLL.

Mulum, Græci Tryglen, goneatida, hoc est, barbarum uocant: dictum ita, quoniam ter anno pariat. Præfertur ex Ionia. Est ab hoc diuersus, qui Trigolas appellatur. Item qui Myllos, de quo inter falsamenta, in Omotaricho disserui. Mulum piscem Proserpinæ, item Dianæ sacrum fecere Græci: ut Citharon Apollini, Mercurio Bocas, Libero patrī Citulū, Apuam Veneri, Neptuno Pompilum.

EX M. VERG. COMM.

Nouerūt gulæ proceres, Mullū piscem Græcorum uocabulo, nunc etiā Tryglen ab omnibus dictū, laudioribq; coenis eum seruari, quæ de eo iactatur ubiq; uox indicat, non comedi

A

capit.

Plin. lib. 9. capit. 29. & 51.

B

τρίγλα

Plin. lib. 7. capit. 13. & 51.

Ca piscatore Tryglen. Fuit huic cibo omnibus sæculis gratia, nec uile pretiũ: in quo singulis sex tertijs singulæ rependerent librae, si Iuuenali credimus, dicenti, Mullũ sex millibus emit, æquã-tem sane paribus sextertia libris. Hunc uenenatorũ multorũ moribus non recentẽ, ut Barba-
rus uertit, sed crudũ imponi Dioscori. iubet. ὡμὴ enim in eo est, quæ uox Græcis crudum tan-
tum significat. Nescioq; ego, cur recentẽ potius, q̃ crudũ uertere ille uoluerit, cõmunemq; græ-
carũ uocũ æstimationẽ mutare, non leui sane in medicina periculo, si crudum, & recens promi-
scua significatione misceant. Multa enim in tota natura sunt, quæ cruda uetustatem habent, &
quæ cõcta recentia dici possunt. Libet hoc loco gratias Plinio habere, qui ea quæ angustius a
Dioscoride dicta fuerant, latius explicauit. Hic enim marini Draconis, & simpliciter Scorpij,
Aranearumq; moribus imponi Mullum iubet, nullo inter terrestrem, & marinũ scorpionem,
& araneas, & Phalangia discrimine. Plinius uero libro 32. capite 4. de hoc ipso pisce agens, his
uerbis rem docuit. Item contra Scorpiones terrestres, marinosq;, & Phalangia illitus, &c. Qua
Phalangiorũ uoce in eo remedio usus, aliud & uenenatius araneorum genus q̃ Dioscori. intel-
lexisse uidetur. Hic enim non Phalangium, sed ἀράχνη ait: eam intelligens, quæ in trabibus,
parietibusq; suas telas suspendit. Quod totum peritiorum censuræ relinquimus, cõtentũ qua
debemus & possumus fide scriptoris huius uoces uertisse.

ἄρχισ ἱπποτάμι

H De testibus Hippopotami. CAP. XXV.
I P P O P O T A M I testes exiccati, ac triti, contra serpen-
tium morsus bibuntur.

Plin. lib. 8. ca-
pit. 25. 26.

E B A R B A R I C O R O L L.
Quum fluuiatilem Hippotamon Græci appellant. Sanguine utuntur pictores. Geminus,
ut Crocodilo uictus, super Saiticam præfecturã, in Aegypto plurimus, in India quoq;, ut O-
nesicritus est auctor, amne Indo. Celebratur inuentione sanguinis trahendi.

P E R E G R I N U S
EX M. VERG. COM M.
D Eregrinũ Italiæ fluuiatilis hic equus semper animal fuit, Romanæ tamen urbis & Cæsariũ
fortuna suæ genti sæpe id palã ostendit. Viditq; Ro. Po. in Aegypti Nilo ad Saiticam præfectur-
am genitũ ambiguum, & cui æque in arida ac in flumine uita sit animal, binis & quales in bu-
bus sunt unguibus, dorso, iuba, & hinnitu equi: a quibus & flumine cõposito nomine, fluui-
atilis equus dictus est. Rostro præterea resimo, cauda torta, dentibus aprorũ aduncis, sed minus
noxij. Depasci eum segetes, testis Nicander est, Qui in Theriacis suis de eo sic cecinit.

Ἴππον τὸν νῦλος ὑπὲρ πάντων ἀνθρώπων
Βόσκει, ἀρόνρια δὲ καὶ κύνες ἐπιβάλλονται ἄρῃν.
Ὅς ἡδὲ ἐν ποταμοῖο λιπὼν ἄλκον ἐλνύοντα,
Χιλοὶ ὅτε χλοῶουσιντόν δ' ἀπεχινάτο ποῖνον,
Τόσον ἐπιστῆθων λίπει βύθονόσάτιον περ.
Ἐκ νίμεται γιγύσιν παλίσαντον ὄμιον ἑλάνων.

Quorũ uersiculorũ ea sententiã est. Aut equi quẽ Nilus supra nigricantẽ Saim pascit, aruisq; eũ
noxia immittit falcẽ. Hic ex flumine egressus, relictis cœnosis fluctibus, cũ frumẽta flauent, &
uidentẽ amiserunt frondẽ, quãtũ a flumine ingrediens per arua, pgrèditur, tantũ dentibus de-
pascitur, retrogrado incessu iter faciens. Quod Plinius felicissimè descripsit his uerbis. Depa-
scitur segetes destinatione, ut ferunt, antea determinatas in diem: & ex agro ferentibus uesti-
gijs, ne quæ reuertenti insidiæ comparentur. Plures, nec paruifaciendas in medicina uires ei
Plinius q̃ hic tribuit, quas licebit uolentibus multis locis in eo scriptore inuenisse, præsertimq;
libro 29. capite. 8. Quorum hic unum tantum probauit, quod ille scilicet ait. Testiculi dra-
chma ex aqua, contra serpentes bibitur.

ἡδιστοῦ ἄρχισ

F De Fibrinis testibus. CAP. XXVI.

Iber ancipitis uitæ animal, plæruncq; cum piscibus & cancris ex
aqua uictum capefcit. Huius testes serpentium uenenis aduersan-
tur. Sternutamenta mouent. Et in uniuersum uarios obtinent usus. Si-
quidem menses ac partus ciunt, duabus drachmis cum pulegio poti. Se-
cundas quoq; eijciunt. Contra inflationes, tormina, singultus, uenena,

ixiamq; ex aceto bibuntur. Lethargicos, & utcunq; ueterno obdormi-
scientes excitant infusi. Cum aceto autem & rosaceo, olfactu & odoris suf-
fitu, idem faciunt. Poti & illiti prosunt tremulis, conuulsionibus, et omni-
bus neruorum uitijis. In summa, calfactoriam uim habent. Eligi debent
Testes qui ex uno ortu connexi sunt. Fieri enim non potest, ut gemini
folliculi in una membrana coniuncti reperiuntur. Liquore intus ueluti
mellis cerosi, odoris grauis, gustu acri, mordente, ac friabili, naturalibus
tunicis circumdato. Quem fraude aliqui corrumpunt, coniicientes in fol-
lem gummi, aut ammoniacum cum sanguine & castorio subactum, & ita
exiccantes. Vanum est quod traditur, Testes ab ipsis euelli, et a sese abij-
ci, quum uenatu urgentur. Siquidem tangi nequeunt, ita ut in sue sustri-
cti. Operæ autem precium est, diuisa pelle melleum liquorem cum eue-
stiente tunica assumere, & siccatum potui dare.

BARBARI COROLL.

Fiber, quem Græci Castora uocant, ab extrema ora, ut Varroni placet uocatus, quoniā de-
extra & sinistra fluminis maxime uideri soleat. Et antiqui Fibrum, inquit dicebant, extremum.
Vnde sagis fibræ, & fibræ in auribus & iecore. Differt a Lutra Fiber sola cauda, cætero pilus
utriq; pluma mollior. Dicta uero Lutra est, q; se in aquis luter. Ob id græci eam *λυτρά* uiden-
tur appellasse Theodoro: qui tamen lutrin, non lutram conuertit. Plinius Enhydrinda serpen-
tis nomen esse maluit, ut aquatilis colubri. Varro quoq; non lutram a luendo, sed Lytram tra-
dit: quoniam succidat, disoluatq; in ripis arborum radices. Ceterum testes Lutræ comitialibus
prodesse docet experimenta, ut appareat cum Fibro cōmunem Lutræ proprietatem esse. Plini-
us e genere inquit, Fibrorum Lutris, sed nusq; mari accepimus mergi. Archigenes iustū uolu-
men de Castorū utilitatibus conscripsit. Plurimus hic in Ponto, morsuq; hominē, nō prius di-
mittit, q̄ oīlā fracta cōcrepēt, ut Solinus inqt. Nascunt & in Hispaniæ fluminibus Castores, ut
inqt Strabo, cæterū nō inest uis illa medica, ut in pōticis. Castorē porro dictum, q; sese castrēt,
ea se corporis parte redimentes, ppter quā expetunt: & pondicū esse canem, Seruius honora-
tus p̄didit. Nam qui Canis marinus dicit, piscis est, & longe a Cane Pontico diuersus. Est autē
marinus canis, etiā carmine Homeri celebris: cuius frustra Romę, thuriani pulmentū nomine uē-
debatur tribus obolis in libras, Rutilij Ruffi ætate: qui res gestas populi Romani scripsit. Hoc et
a Plinio, Tomos Thurianus, ut ego quidem primus cōperisse suspicor, appellatus est. forte a
Thurijs oppido Italię, q̄ primū e Sicilia sit cōuectus. Athenus & Thurionē, siue Thurionē
dici obsoniū hoc latina lingua solitū affirmat. Suauissimūq; id ac lautissimū fuisse. Strabo Gale-
orē hūc, & Xiphia uocari tradit, & quemadmodū capiat ostēdit. Dictū & Scyllā, & Lamiā, &
Carchariā quoq; arbitror a nōnullis. Vnde cōiectari liceat, aut eū esse Thurionē, quē nos uul-
go Sturionē appellamus: aut quod uerius existimandū est, ab eo quasi delicato & cupedario
piscē nomē accepisse. Nōtādū, Aristoteli aliud quodāmodo, sed affine tñ genus uideri Scyllā,
& Canē marinū. Nā Scillaros apud eum pro Squilla parua sumitur. Nec illud omittēdū, Pho-
cænā apud eū dici, q; latine Tirsio uerrat a Theodoro gaza, siue Tursio, aut Torsio, ut Plinius.
Delphino similis, paulo tristior, & rostris canicularum similitudine maleficus. Hūc puto esse,
quē ab Athengō mō Thurionē, mō Thurionē, mō Thurianū pulmentū uocari diximus, a
Strabone Gileotem & Xiphiam, ab alijs Canem marinum, aut si nō iidem omnino sunt pis-
ces, quod & ratio nōnulla suadet, certe similes fateri eos necesse est. Sunt qui græce Hyccam, si-
ue Hyccam, hoc est, porculum pro sturione capiant. Mentionem Hyccę penes eundem Athe-
nū legas & Callimachum, qui cum piscem Sacrum uocauit. Aliud uidetur genus esse ab
Hycca, id quod Hyn, id est, suem uocant, qui sit, ut Athengō placet, idem cū apro, siue capro,
ut Archestrato, diuersum, qui suem marinam Psamitin, alij Psammatida cognominant. Nam
oppidulum Sicilię quod Hyccara uocatur, ab Hyccarū multitudine cognominatū putant.
Cyrenæi certe hunc non Hyccam, sed Erythrinum, hoc est, quasi Rubellionem appellabant.
Sunt tamen qui & pisces ludidas uocatos, Hyccas nominent, & Philetæ uersum

Ουδὲν ἰχθὺς ἰχθυος ἰχθυος,

A

Pli. li. 9. ca. 10.

Lib. 30. ca. 3.

B

Strabo lib. 3.

P

D I O S C O R I D I S

C sic interpretentur; quia difficile sit eos capere. Propterea & uermes, quos Intestina terre dici-
mus, & Græci Gefentera, & lulos a nostris, uulgarī uoce Porcelliones appellantur. Numen-
tis & Hyænam piscem cōnumerat, qui an idem sit cum aliquo ex prædictis, in incerto est mihi.
Est & terrestre quadrupes Hyæna, ut constat. Inter pisces & Syagris, a sue dicta potest uideri:
quanq̃ inuenio quandoq̃ scriptum Synagris. Diphilus & Capriscum dici quendam signifi-
cat, qui & Mys uocetur. Nisi quis non Myn, idest murem, sed Hyn, idest, suem legendum po-
tius existimet. Sunt enim & mures in piscibus, quemadmodum & inter ostrea.

E X M. V E R G. C O M M.

Contra multa hominis mala, usa quondam antiquitas est, & nostra ætas adhuc utitur Ca-
storeo, præsertimq̃ contra uenena aliqua. Quæ uerisimile est a Dioscoride illuc numerata fuis-
se: sed ea librariorum incuria excēpto uno perierunt, idq̃ Ixias est, quod Barbarus Viscum, ex
Plinio interpretatur ubiq̃: nō satis certam nunc rem notissima Visci appellatiōe indicans, uo-
cumq̃ similitudine Ixiam, & Ixon simul miscens; cum tamen alterum in ramis arborum inue-
niatur, aucupio inseruiat, & in medicina non penitus inutile sit: alterum ad Chamæleonis acu-
leatq̃ herbę radices nascatur, omni careat usu, & inter uenena ab hoc ipso, & a Paulo Aegineta
numere; quemadmodū in Chamæleone herba, & in uenenis lūgius ab hoc scriptore, et a no-
bis dicef. Nec animus mō nobis est, Pliniū, & Pliniū Necutos inscitū, aut incuriū arguere. Fecit
em̃ ante nos id Leoniceus, oī doctrinarū gñe clarus homo. Sed qđ ad nos p̃tinet, legētes mo-
nemus, qm̃ nihil Visco & Ixię idē sit, nō declinatio, nō genus, nō natales, nō u sus, nō rei substā-
tia, maluisse nos græca uoce in altero q̃ latina uti, & Ixiā uenenū dicere, Viscū uero qđ in ramis
arborū natū, multos habet in re nostra usus: ne uisci audita uoce, crederent le gētes, homini ut
auihus mortem uiscum esse, abstinentesq̃ eo, quas habet utilitates amitterent. Certius de tota
hac re in utroq̃ Chamæleone, & uenenis patebit legentibus, & a nobis dicitur.

γὰρ κατωκίδιο

M De uulgarī Mustella. CAP. XXVII.

D Vstella, quæ in domibus nostris oberrat, ambusta exenteratur,
& inueterata sale in umbra siccatur. Ea binis drachmis cum ui-
no pota, aduersus omnia serpentium uenena præsentaneo est remedio.
Toxico, simili sumpta modo resistit. Eius uentriculus coriandro factus,
inueteratusq̃, percussis a serpente, & comitialibus potu auxiliatur. Cre-
mata in fictili, podragicis cōfert, cinere ex aceto illito. Sanguine perun-
ctæ, strumæ iuuantur. Comitialibus etiā prodest.

Pli. li. 29. ca. 4.

M Vstella uulgaris quam Græci γὰρ κατωκίδιο, Cato Ecidion appellant.

βατραχοί

C De Ranis. CAP. XXVIII.

Contra omnium serpentium uenena pro antidoto sunt Ranæ,
si ex sale & oleo decoctæ edantur, iusque earum itidem sorbea-
tur. Contra inueteratos tendonum rigores pollent. Illitus earum cinis,
profluentis sanguinis impetus sistit. Explendis alopeciarum inanitati-
bus ex liquida pice illinitur. Viridium Ranarum cruor, auulsos genis
pilos renasci prohibet, in uestigia euuōrum instillatus. Decoctæ in a-
ceto & aqua, dentium dolores collutione leniunt.

Pli. li. 9. ca. 42.
51. li. 32. cap. 5.

R ANAM Græci & fluuiatilis, & marinā p̃dicant, etiāmnū, p̃ pisce, Batrachō, & poetica uoce
Batrachon uocāt, ut Iones: qđ & apud Aristophanē & Xenophanē poetas legi, Batrachio &
Chymistæ suū habent, excellentis in auri cōfectione miraculi, ex putrilagine diuini laticis nas-
centem, specie Ranunculi, uenenū p̃sentissimū, qđ uel solo halitu minus prudentes opprimat.
Hoc ab effectu Chrysocolla qđ dicit. Est & morhi genus Batrachos, tumētibus sub lingua ue-
nenis, cui simile fortasse Plinius. 26. uoluminis initio monstraui, rubentis sub lingua duriciæ.
Inter Ranas est & quę Phrynos græce dicit, hoc est Rubeta, q̃a in uepribus uiuat, quāq̃ prius in-

aquis, postea sit terrestris. Perniciosa hæc, ut Chersidros. Grandissima cunctarum. Magnitudo testudinis parvæ, geminis quandoque ueluti corniculis, ut inquit Plinius, dorsum exasperat: in flatu se irata, tam proterue audax, ut insiliat quoque proximum: quam si suspensio se frequenter, quæ morsu uindicans. Bufo inde, ut arbitror, a Virgilio & uulgo dicta, ueneficiorum plena, præcipue ossiculis duobus: quorum in sinistro latere inuentum, Apocynon uocatur, quia Canum impetus cohibeat. Recentiores lapidem in capere huius Ranae haberi tradunt, ad dolores illius gestatu probant, sed qui uia ea sit exemptus: quales uulgo magna etiam copia feruntur anulis: quam si hunc elici potius, quæ eximi uiuentibus constat, puniceo in panno, cuius plurimum colore delectantur, ita dum ipsi feriando relaxant se, capitis onus deponunt: id mox in subiectam cistam e medio foramine collabatur: alioquin ea est illi inuidissima natura, ut lapidem eum, nisi tolleret, resorbeat. Huic aliquando & cauda ab initio est, quam post amittit: ob id in stagnis, cum adhuc pusillæ sunt, Muti ruribus uocantur. Alterum genus, & hoc exitiale, Calamites dicitur, quando arundinetis frutetisque roris linctu uisitans, sine uoce, omniumque minima & uiridissima: quæ si forte a bubus hauriatur, distendit eas. Hanc et Dryopetem uocari credimus a Plinio, quia inter frutices & arbores uisatur. Est & genus uocalis parvæ, scandentis arbores. Inuenio & palustrem mutam inter uenena, hoc est, Eliobatrachon, diuersam a Phryno: quoniam & signa, & medicinæ uariant, præsertim Actio. Aristoteles Ranas cões, Telmatiaeos, aut Lymæos, hoc est, lutarias & lacustres nominat. Varro luridam Ranam dicendo, per Calamite uidetur accepisse: quoniam Philothrui sit, ut Plinius, idemque Varro affirmant, illud efficacissimum: quæque & epitheton Ranarum omnium putant id poetæ. Miror quæ obrem Dioscori Phryno, hoc est, rubetæ lion, quod est leuis, cognominari dixerit. Nisi quæ Rubetæ duo genera constituat. Leuis, & sine cornibus, ex qua delibatur uenenum, sicut ex palustri quoque Muta cõdit: & Aspera cornutaque, quæ proprie sit Bufo: cuius dorsum paulo ante scabrum esse diximus ex Actii sententia. Habetur & Batrachos halica, hoc est, piscatrix rana, sed inter pisces Aristoteli, Ciceroni, Plinio.

E X M. V E R G. C O M M.

Non est Ranis omnibus unum genus, nec idem color, aut similis uita & mores. Nascuntur alie per se, confertis tantum æstiuo imbre, litorum & itinerum puluerulentis harenis: quarum breuis uita, & nullus usus est. Habent alie legitimo naturæ ordine in aquis suos natales, nec mare tantum, sed profluentes omnes & palustres aquas incolunt. Sunt & quæ in sicco agunt: quales Rubetæ, & quæ in harundinetis inueniuntur, Calamitæ ob id appellatæ, inutiles, & ob uenenum suum letales. Sunt & in fluuiatilibus & palustribus, quæ uiridi, & quæ liuido colore sunt: quæ itidem tutius, & quæ non sine periculo comedi possunt. Ex toto hoc genere ferpentibus aduersari intelligendæ sunt, in profluentibus, aut stantibus aquis agentes, & in cibis utiles. Et quas hic uirides, nouum in palpebris pilorum incrementum prohibere dixit, in aquatilium illarum genere eo colore cognoscendæ erunt.

De Fele. CAP. XXIX.

Recens Felis in cibo nutrit, & facilem præbet aluum. Sale uero conditus, non suppeditat alimentum. Arteriam expurgat. Et uocem expedit. Illita saluti caro, aculeos extrahit. Muria eius incipientibus dysenterijs prodest, si in desidentium foras adijciatur. Fluctuones siquidem ad summa cutis elicit. Ischiadicis infusa medetur.

B A R B A R I C O R O L L.

Silurus, piscis est fluuiatilis, quæ & alibi quæ in Nilo nascitur. Aetius, Silluarion, ut puto, uocat hunc, cuius selle suffusos oculos inungi cum attico melle præcipit bobus. Aristoteles uidetur Silurum intelligere Theodoro, cum Glanin piscem nominat.

E X M. V E R G. C O M M.

Thyños præcipue magnitudinis in mari pisces, æquant in fluminibus aliquot nascentes Siluri, priuatimque in Aegypci Nilo. Vnde maxima eis ad ganeam laus in poetis & gloria. Feroces idem uti in piscium genere, & qui non aliter quam hostes in aqua latrocinantur, obuia quæcunque appetentes, & quæ in ferocioribus rarum est, multo prolis amore. Aedita a foeminis oura, mares in hoc genere ne pereant custodiunt, tantopere sibi seruandis, rerum generibus natura consulit. Crediderunt iuniores aliqui, Siluros esse quos nostra ætas Sturiones uocat, sed falso. Thynnus enim similiore Siluri sunt, & eorum magnitudinem æquant.

A

B

ἄλγρον νιάρον

Pli. li. 9. c. 15. 52

D I O S C O R I D I S

C De Cerro pifce. CAP. XXX.

CErri falid caput exuftum, excrefcences ulcerum oras, puluilloſq; reprimi. Nomas cohibet. Thymos, clauoſq; abſumit. Caro nō ſecus atq; falſamentū pdeſt a ſcorpiōe pcuſſis, aut a cane demorſis.

BARBARI COROLL.

VERG. **D**E Smaride, ſiue qd idē eſt, Maride, in ſequenti mentione dicit. Illud in tranſcurſu nō ſlebit, Maruda genus etiā mēſurę dici apud Ariſtote. quę ut ingit Iulius Pollux, heminas. ſ. capit. **M**AE nis cōgeneres, de quibus mox dicit, Smarides ſunt, tā ſimilibus inter ſe notis, tamq; mixtis natalibus, ut mutatis ſampridē appellationibus, nōn facile nūc ſit alterū genus ab altero ſecernere. Id ego non auſim quod alias dixi, procul a mari natus homo. Poteram & ipſe hoc loco quā Plinius, Athenæus, plureſq; ali; de utroq; hoc genere longius tradiderunt, in unum collecta coaceruare, ſed nihilo magis res patuiſſet.

C De Mænis. CAP. XXXI.

MAE narum ex capitibus cinis ſi illinatur, calloſas ſedis rimas abolet. Eius etiam garrum corporis putredines collutione ſedat.

BARBARI COROLL.

Pli. li. 32. ca. 11. **M**AE nas græci Mænidas appellant, laudatiſſimas e Lipara. uulguſ Mænulas. Aleculam quaſi ex Plauto Theodorus interpretatur. Ego Aleculæ uocabulum generale credo, idem apud nos ſignificans quod apud græcos Anthracides, ut in Halme demonſtrabimus. In Paño nia piſciculum quem Menapij & Belge cæteri copioſiſſime uenantur & inueterant, Arengam acas, et Smaridas. Candidiores nepe Mænas. Sunt qui Boacas, ſiue Boecas appellant, hoc eſt, Leucomænidas. Smarides uero, ſiue Marides, ſunt quas nōnulli uocant Cynofeuma, ut ingit Athenæus. Ariſtophanes byzantius, ſolus non Bocas, ſed Boopas uocandos exiſtimabat: quia parui eſſent, & magnos oculos haberent. Miror unde Theodorus Cerros interpretetur, quas græci Smaridas appellant. Sūt quidē Gerres, Plinio, Martiali q; inter uiles, ut illo uerſu, Fuiſſe Gerres, aut inuiles Mænas, Odor impudicus urcei fatebatur. ſed diuerſos a Smaridibus, ut in Caſtigatōe Pliniana diximus. 2. libro.

VERG. **N**On cinere Mænarum in medicina tantum Plinius utitur, ſed carnibus etiam: quibus im-

C De Gobio. CAP. XXXII.

GObius recens in ſuillum uentrem coniectus, ſi contuſa rima in duodecim aquæ ſextarijs, donēc duo ſuperſint decoquatur, & ſub diuo refrigeratus potui dētur, alius ſine moleſtia deiſcitur. Illius cōtra ſerpentium canumq; morſus auxilio eſt.

BARB. **G**Obius, & Gobio uocat & græce Cobios. Plinius quōq; p. c. ſcribit, nō per. g. ſecūdo & ſo-

VERG. **I**N mortario tuſum antea iubet ad deiſciendā aliu Paulus Aeginetā decoqui in aqua Gobiū. Piſcis e uiliſſimis eſt. Ob quam cauſā in Satyra Iuuenalis ait. Nec nullū cupias, cum ſit tibi Gobio tm In loculis. Laudauit contra Martialis in xenijs dicē. In Veneris ſint lauta licet cōui uia terris, Principiū cœnę Gobiſ eſſe ſolet. Plinius paulominus q; in eo genere Gobium nūmerauit, in quo terreni piſces cenſentur: quoniam paluſtris, & quaſi incolā terrę ſit contra aliorum piſcium naturam. Declinauerunt uetēres latini in ſecunda & tertiā declinatione eundem ſignificantes, ut ex paulo ante citatis exemplis aperte patet.

C De Thunno. CAP. XXXIII.

COnditanei Thunni caro, quā Omotharicō uocāt, ſumpra, ijs auxiliant, quos uipa noīe Preſter, momorderit: ſed oportet uinū q; plurimū ſubinde cogantur haurire, ita ut uomitione reddatur. Cōtra

acrimonias esitatorum maxime ualet. Canum mosibus utilissime illiniē. **A**

BARBARI COROLL.

Omotarichos e Thynno, falsa caro dicitur, Thūnina uulgo. Paulus Tarichon, siue Tarichos, hoc est, salsamentum. Differt autem a Salsamēto Salgama, ut ex Columella facile colligitur. Salsamenta Græci duorum generum fecere, Horæa, & Thūnia. In Horæo, quod a tempestiuitate uidetur appellatum, macra pinguius, in altero macris pinguius præferri: quæ Cybia dicuntur. Inter macra sunt, ut inter pingui Cordylæ. Horæa ex Pelamyde, id est, Lutaria minore fieri. Thunnia ex maioribus: quas aliqui Synodontidas appellant. Aliud genus uidetur, q Synodontes uocantur, & a nostris Dentices. Similis est Pelamydibus & qui Triton, siue Chelidonias uocatur, nam Chelidon, aliud genus est, Polypo, ut inquit Diphilus, simile. Adhuc obiter & prouerbium, quod fertur. Salsamentum putre cunilam bubulam desiderat. Item & illud. Salsamenta simul ignem uidere, cocta esse. Crates salsamentum celebrat Elephāthinon a se uocatum: cuius & Aristophanes meminert, sicut Omotarichon Alexis, Inuenio & Hemitarichon: & quod ab hoc plane differt Hemineron. Vtrūq; Salsamēti genus est. Sed Hemineron e Coracino: quem Alexandrini Hemineron appellāt. Dicitur & Pelses, & Saperda Coracinus, & a nonnullis Aeolias Meotide stagno cōmendatissimus: quanq; alius piscis est Aeolias Epicharmo. Nam & Saperdam Photion, p Apua inueterata & arundinibus infixa capit. Item pro Succidia, & Larido, quod Paphlagōes, inquit, Ionden quoq; appellant. Laudantur in salsamētis Delcani, a Delcano amne dicti, quos aliqui Leptinios, & Lebianos cognominant. Item Mylli, quos & Platistacos, & Plastacos nominant, utiq; maiusculos, sed cum parui sunt, Gnotidia, sicut media ætate Myllos. Sunt tamen qui Platistacos, & Plataces eisdem esse cum Coracinis putant. Inter Salsamenta preciosa, est & quod Spondylos uocatur. Athenæus certe id, quod in capite Mugilum Echinata specie conspiciat, Spondylum dici meminit. Item est ubi & ipsum Horæi salsamēti Spondylum cōmendari scribat. Sexitana, siue Gaditana, ex Orcyno, quæ Clides & Clidia, hoc est, ex eo suguli dicuntur. Quemadmodū ex Antaceis uocatis maxillæ, palatæq;. Antaceis nomen uidetur amnis dedisse, in Meotim lacum asiatica parte influens. Magnitudine sunt Delphinis pares, & ipso Cimerij Bosphoro gelu fodiuntur plerūq; nullis ossibus spinisq;, ut Herodoto placet. In Borysthenes copiosi, carne prædulci, ut ait Plinius. Ex Orcyno sunt & Melandryæ. Sed et pubes eius tota salem accipit, admodumq; pinguis est. Pamphilus Melandryn, genus Thynni grandissimū esse statuit. Diphilus pisces quosdā salsamentarios uocauit Costas. Aetate nostra Græci piscem Hyscā, de quo supra dixi, tribus nominibus inueterant. Rhachin partē eius Doruariam & Spinalem uocantes. Quam nostrū uulgus, schinalem corrupte appellat. Pleuram, id est, costas & latera. Hypocœliō, id est, aluam eius atq; pubem. Hunc piscem, ut testatū sumus, Italia Sturionem modo uocat.

EX M. VERG. COMM.

Quem compositū ex crudis Thynorum carnibus et salsura nomine Omotarichō hic nominat, ceteri oēs simplici plerūq; Tarichon dicūt. Salsamentū qd pisciū carnibus & sale constat, non simplex, aut unū, sed quot fere sunt in Thynnis ætates, corporis partes, habitus, loca, & piscationis tempora, tot etiam nominibus ab antiquioribus græcis discretum, nec Thynnorum tantum, sed aliorum etiam pisciū quorundam carnibus confectū. Eius rei longiorem historiam Athenæus libro primo Dipnosophistæ sui prosecutus est, quæ græcarum literarum peritis in eo legenda relinquimus. Eius autem linguæ ignaris in Barbaro, qui licet breuius q̄ oportebat ex scriptore illo pluraq; collegit, plura tamen q̄ in latinis inueniri possint exscripta ab eo in Corollario suo fuerunt.

De Garro. CAP. XXXIII.

Garrū omne quod ex piscibus, carnibusq; sale maceratis liquamen est, illitum, depascencia ulcera sistit. Morbis a cane medetur. Dysentericis, atq; ischiadicis infunditur. Nonnullis ut exulcerata adurat. Alijs autem ad laceffanda, quæ ulcera non senserunt.

BARBARI COROLL.

Garus, & Garrū dicitur, a Garo pisce, ex quo olim conficiebat. Postea ex Scombropisce. Laudatissimum in finibus Carthaginis spartariæ Cartarijs, quod Garrū sociorū appellabat, singulis millibus numum pmutantibus, congios pene binos. Nec liquor fere ullus, præter unguenta, maiore in precio erat, Scombrī quidē Mauritania, Beticaq;, & Carteia ex Oceano in-

γάρρον

Pli. li. 31. ca. 79

p iij

D I O S C O R I D I S

C rantes capiebantur, ad nihil aliud utiles. Græci optimum Gari genus putant, quod Hæmati-
 on, hoc est, Sanguiculum appellat, ex intestinis Thynni, cum brachijs, sanie, ac cruore. Garū,
 & Clazomenem, & Pompeios, & Leptin nobilitauit. Vitium huius est Alex imperfecta, nec
 collata fex, neutro dumtaxat genere, ut Plinius atq; Flaccus, & primus omnium Plautus effe-
 runt. Si quidem & græci liquamen uocant id, quod purissimum ex eo fluxit: id autem quod fe-
 cis instar in cophino (ita enim uocant) obmansit, Alex. Vnde liquimarij dicantur. Quod etiā
 pro liquore accipitur, promiscui gregarijque piscij: ut iam ad Ostrea Echinos, Vrticas, Cāma-
 ros, Mulorum iocinora pertineat. Cāmari sunt, quos græci quoque Cāmāros appellant: itemque
 Astacos. Est ubi Alecem uero Galeculam feminino genere ueteres appellant, minurum, uilem
 que pisciculum, ut est apud Caronem, atque Plautū. Columella ritalem nominat Aleculam, in-
 ter pisciculos, & incrementi parui fluuiorum animalia. De hac uoce quid sentiremus, in Mēna
 & Halme diximus. Cœpit uero Garum & priuatim ex inutili pisciculo, minimoque cōfici. Apu-
 am nostri, Aphyen græci uocant: quia non alio principio fere, quæ ex pluuia nascat, quasi Dysp-
 phy es: ob id Apulas Theodorus, nunc Apuas cōuertit. Eundē Aphritida quoque nominat, & Gonō-
 thalassion: quoniam ex spuma tamen marina coalescat, quanquam Aphyarū multa gēna notant. Sed Aphri-
 tis omnium præstantissima est. Quā & Aphrō, & Aphryan quoque uocat. Quæ uero inter has alba ē, Ci-
 bonis appellat. Meretriculas Athenis fuisse quasdam legimus Aphyas cognominatas, quia gra-
 tiles & cādidę magnos haberēt oculos. Græci Phalericas maxime præbāt Aphyas. Foroiulien-
 ses, ex pisce quē Lupū uocat, ipsi Garū faciūt. Creuerunt deinde ad infinitū gēna. Nā et ad colo-
 rē multi ueteris fiebat, tamen dilute suauitatis, ut bibi posset. Aliud uero, ad castimoniarū substitio-
 nē etiā sacris Iudeis dicatū, ex piscib. squama carētib. Garus latinū nō habet nomē, ut Ausoni-
 us poeta autor ē, quæ & liquorē Sociorū uocauit. Nec serio cū quibuscūque Ausoniū poetā id uelit
 dicere quod nō dicit, quasi sociorū Garū appellauerit antiquas: ut Græcū nomē Garū, latini nomi-
 nis, hoc ē, sociorū accessiōe mollesceret, ita ut quasi græcū uideri desineret. Nō hoc Ausonius
 intelligit, sed illud. Malle se inquit uocare Muria, cū sciētissimi ueterū, & uocabula græca fastidien-
 tes, latinū in Gari appellatiōe nō habeant. Sed quicūque inquit nomine liquor iste sociorū uocetur,
 iam patinas implebo meas, ut parciōr ille Maiorum mensis Apuarum succus inundet,
 Mendosus erat locus. Nam & pro in gari appellatiōe, legebat ignari. Et pro apuarum, apala-
 ria. Vtrūque lectioni uerā legitimeque restitui. Differt porro Garum a Muria, & Alece: quæ Garū
 ex extis Scombrj, & quondam Gari piscis fiebat, Muria ex Thynno fere Antipoli thuriā: in-
 de uero & Dalmatiā nobilitans. Quanquam Muria, siue Muries Catoni, Palladio, Columellæ nō
 liquamē ex piscibus, sed falsilagine facticiam ad caseos cōdiendos, uinaque significat. Erat & sua
 uestigium Muries, ut inquit apud Festū Verrius, certis præscriptisque rebus condita: ut quæ ritua-
 lis esset, & ad religionis quæ sita ceremonias. De Alece supra dictum est. Habetur & Halme di-
 cta, latine Salsugo, & Salsilago, apud Dioscoridem & Plinium. Quanquam in medendi usu Salsu-
 go hæc, a Muria nihil distat. Habetur & Halos achæne, hoc est, ramentum quoddā salis atque spu-
 ræ & sale fiat. Nā Gari genus acidi Oxigarū appellatū, ipso nomine significat. Columella Oxiga-
 rū Moreti genus facit, & Oxiporū quoque dici posse uult: rationē eius cōdendi totius opis sine red-
 dit. Vide id nominis habere, quia cum usus exigit, aceto Garoque diluit. Sunt & sua medicis
 Oxypora, sicut & Hydrogara, & Oenogara, & Eleogara. Alioqui Eleogaron & ferculi genus
 erat delicati, quod Sibariticum, missum in coenis appellabāt: quoniam Sibaritæ quod aīo id ganeæ in-
 uenissent, perissent, autore Spartiano. Inuenio & Oxiliparō genus esse iuris, in quo Raia, ac-
 ceteri eius nature pisces mādī soleāt. Isicia quid sint, nemo ignorat, sed e piscibus inuenisse pri-
 mus traditur Heliogabalus, inter ganeones potius quam Romanos principes dicendus.

E X M. V E R G. C O M M.

Satis in Garo nobis fore credimus, si quæ corrupta in hoc capite sūt, in antiquā & uerā lecti-
 onē instaurata fuerint. Quod fiet, cum breuiter dixerimus, esse Dioscoridi Garū, nō ut alijs, quod
 feculentū carnosūque in eo subsedit, sed quod liquidū, & aquæ mō fluens supnatat: neque in piscibus
 tamen, sed in animalium carnibus Garū etiam dici, quod ex earū salsura exsudatū, siue ut Columella
 ait, exsaniatum fluxerit. Et quoniam liquidum sit, ideo in medicinæ usu, non illitum dicendum, ut
 ceteri interpretes uerterunt, impressi tantum codicis lectionem secuti, in quo καταπαρόμυζα,
 quod illitum significat legitur: sed ut nos diximus, meliorum fidem secuti, si co foueantur, κα-
 τανόμυζον enim, est quod uerbum certam in græcis habet significationem, cum liquore ali-
 quo quidpiam fouemus. Quod totum rei necessitas exigit. Fouemur enim liquidis, & insper-
 gimur, non illinimur. Postquam usus in strumis, & canum moribus rationem aliam docere

aggressus, non *νίστε* aduerbio, quod interim, & aliquando significat Dioscotides ait, intesti-
norū tormina & coxēdices sanari, sed uerbo *νίστε* usus, injici & infundi Garū oportere dixit:
leuis in una tantū literā lapsus, sed qui usum Gari in his malis, & oēm huius scriptoris hac parte
intellectū confundat. Quod aniaduertere alij interpretes debuerāt, nec tam incerto sensu:

De Iure piscium.

CAP. XXXV.

Recentium piscium Ius, modo per se, modo ex uino potum, al-
uum subducit. Priuatim ad hunc usum conficitur e gobijs, &
scorpionibus, & iulide, e percis, & recentibus alijs saxatilibus, nec uirus
recipientibus, simpliciter cum aqua, oleo, & anetho.

BARBARICOROLL.

Saxatiles Græci uocant Petreos, quos saxosum mare nutrit, ut Merule, Turdi, Elephēdēs,
Menaluriæ. Tria enim sunt pisciū marini genera, siue littoralis. Limosa regio planum piscem
educat, ut Soleam, Rumbum, Passerem. Harenosi gurgites pelagium, ut Auratam & Dent-
cem. Saxosum litus, Saxatili. Inter quos principatus gulæ Scaŕo. Deinde Turdo, ac Meru-
læ. Post hos Iulides, Phycides, & Percides, hoc est, Percæ laudantur ab Aetio. Iulidas Theodo-
rus in Aristotele conuertit Iuliam, Diphilus Phycidas, & Phycenas, quasi genera duo, sed utrius-
na tamen inter Saxatiles enumerat. Porro contrarij Saxatilibus uidentur, quos Hippocrates
Planeras, & Cymatophlegas, hoc est, Errones & fluctuagos appellat.

EX M. VERG. COMM.

Saxatiles, qui a Diosco. numerantur hoc capite, cuncti pisces sunt: non ideo tamē, quod Bar-
barus fecit, mutandus capitis titulus erat. Neq; enim de carne eorū agitur hoc loco, sed de escū
lento iure, quod coctis piscibus his fit, quo deniq; posse aluū hic scriptor ait. Sunt autem Aristoteli,
Plinio, multisq; alijs Saxatiles pisces, quos saxosum litus nutrit, in agrotantium cibis a
Paulo Aegineta sæpe laudati. Eorum iure hic deijci aluum iubet, sic tamen, ut simpliciter, id
est, nullo addito condimento, aut sapore alio, in aqua præter ab eo numerata, oleum & ane-
thum coxisse eos oporteat. Nos solum ex ueterum codicum lectione, & Paulo Aegineta adie-
cimus. Quod & antiqua Dioscorid. interpretatio habet. Cuius licuit mihi uidere antiquissi-
mum, & Longobardis literis scriptum codicem, in corruptæ antiquitatis, multa adhuc uesti-
gia seruantem, in quo etiam sal oleo, anethoq; additur.

De Cimicibus lectularijs.

CAP. XXXVI.

Cimices, qui in cubilibus enascuntur, cauis fabarum inclusi, si ante
febriū significationes septeni deuorētur, quartanis auxilio sunt.
Et citra fabas illiti, percussis ab aspide profunt. Vuluarum exanimatiōes
olfactu reuocant. Porri cum uino, aut aceto, adhærentes sanguisugas abi-
gunt. Triti, & urinariæ fistulæ impositi, stranguriam leuant.

BARBARICOROLL.

Cimices lectarijs, græci Cōres Clinicos appellant, ad differentiā syluestriū, in maluaq; na-
scentiū, ut arbitror. Aduersant aspidibus Cimices, adeo, ut gallinās quo dñe hoc animal ederit,
interfici ab illis negent. Contra Cimicibus Scolopendra, ut quæ suffitu necet eos.

EX M. VERG. COMM.

Foedissimum sane animal, dictu quoq; fastidiendum Cimex: ob quem non male descensu-
rus ad inferos Bacchus, in lepidissimo græcorum Comico, iter illud ostendit sibi precabatur,
& eas dari cauponas, in quibus paucissimi Cimices essent. Nihilominus concordia illa re-
rum, & repugnantia, quæ totam duce natura explet medicinam, quod homini prodesset,
aliquid in eis esse uoluit, non omnibus, nam in lectis inueniuntur Cimices: inueniuntur, &
in oleribus aliquot: præsertimq; in Malua; quos Plinius Agrestes nominat. Sed his tantū
qui circa nos nati contra quartanas a Dioscori. numero septem cauis fabarum inclusi deuor-
rari iubentur. Quod remediū genus falsum, nec referendū Plinius dixit, damnauitq; agresti-
bus tantam Cimicibus id tribuens: & præter fabas, ouo, ceraue includi ostendens. Quod mi-
retur aliquis in eo, qui noua, superstitiosaq; hæc in medicina remedia magnopere amaret.
Nos in plæbe & agro uidimus aliquādo id fieri, dantq; in cunctis febribus sorbendos, tripos in-

σομοί τε τῶν ἡδὲ
πῶν ἰχθύων

νόστιμ

Pli. l. 29. ca. 4.

D I O S C O R I D I S

C puluerem Cimices. Contra aspides prodesse eisdem testis itidem Plinius. Sed quod nouisse in Dioscoride oporteat, non καταπασθίντας, id est, illitos, ut fere Græci omnes habent, sed ut in melioribus adhuc legitur, καταποθίντας, quod est, deuoratos.

κεν Capis

¶ De Millepeda. C A P. XXXVII.

Millepedæ, quæ sub aquario uase stabulantur, animalia sunt multis pedibus nitentia, quæ contacta manu, contrahunt in orbem. Hæ ex uino potæ, difficili urinæ, & regio morbo auxiliantur. Millepedas illini anginis utilissimum. Tritæ, & in cortice mali punici calfactæ, doloribus aurium, addito rosaceo, conuenienter instillantur.

Plin. lib. 29. ca. p. 6. li. 30. ca. 5.

BARBARI COROLL.
ONos, latine Millepeda, Centipeda, Multipedaq; dicit; Græci & Oniscon, & Tilon quoq; uocant; Galenus & Cyamon, a fabæ similitudine, fuscum colore. Photion & Iulum dici credit. Sed Iulus Vermis terreus est potius, quem Lumbricū uocamus. Athenæum sequor. Pilosæ hæc, & arcuatim repens. Aliud genus Multipedæ habetur, quæ non arcuatur, Sepe uocata, & Scolopendra minor; quæ perniciofa quoq; est. De hac paulo post tractabitur. Illud meminisse oportet, Onon & Millepedam uocari & quoddam locustæ genus, ut dicitur. Oniscos & piscis est, quem nos Afellū dicimus, duos in capite lapillos, & cor in uentre habens solus omnium; hunc Græci etiam Banchon, & Chellaren, siue Gallarian appellant. Est & Mugilis genus unum cognomento Banchos, id uidelicet, quod ab Aristotele Chelones dicuntur, omnium minimi. Porro non defunt, qui inter pisces Onon ab Onisco dirimant, Onon & Gadon uocantes, Oniscon uero Gallarian, siue Galleridam, atq; Maxinon. Nam Onias Scari genus est. Sunt enim Scari alij Oniæ, alij Aeoli cognominati. Oniscos porro Hippocrati uulnerarium instrumentum est, ad luxata corporum, Aetius Oniscon marinum, ad uitia interaneorū commendat. Piscem intelligat, an uermem, non satis scio.

EX M. VERG. COMM.

Notæ omnibus Multipedæ hæc, nullibi non in humidis & aquosis nascentes; Græci a liuido colore ὄνους, quasi Asinos eas uocauerūt. Antiquiores Romani a numero pedum, nostra ætas & gens a totius corporis specie Porculos uocauit. Eas nos in aquosis & humidis agere potius, q̃ sub stilis diximus, Paulum Aeginetā, & rem ipsam secuti. Frequentiores enim in humidis, q̃ sub aquarijs uasculis inueniuntur; & ille non ὑπὸ τῶς ὑδρίας, quod est, sub hydris, sed ὑπὸ τῶς ὑδρίας, quod est, ubi hauritur & tractatur aqua, inueniri & agere Multipedas hæc dixit. Meminit earum lib. 5. de animalū historia Aristoteles, quo loco de pediculis animalium agit, quos in piscibus similes Multipedis his esse dixit, præterq; in cauda, quā illi latiore habent. Vocauitq; ὄνους πολύποδας, id est, Multipedes asellos, quoniam ὄνους, id est, aselli nomen hoc commune uagumq; per multa animalia in græcis sit; nam & in quadrupedum genere, piscium, & locustarum aselli nomine aliquid indicatur; quam ob causam Multipedes ille adiecit, idq; animaduertentes latini ueteres, a pedum numero Multipedas eas uocauerūt.

σίλφην ἐν τοῖς ἑρτοκοποίοις

¶ De Blatta pistrinaria. C A P. XXXVIII.

Blattæ eius quæ in pistrinis inuenitur, interanea trita, aut cum oleo decocta, aurium dolores instillatu mitigant.

Pli. li. 29. ca. 6.

BARBARI COROLL.
Blattas, Græci dicunt Silphas: ridendo cuiusdā errore, qui Silphiophoron Cyrenis agrū, hoc est, ut Catullus inquit, Laserpitiferū, a Blattis cognominatū, rarus Blattiferū, conuertit in Strabone. In his pinguitudo quædā est, capite auulso, quæ celerrime trāsit in uermiculū. Plura earū genera; Mollitū, & q̃d Mylloxcon appellauere, quoniā circū molas fere uisat, fortasse quā Mylacrada noinat Aristophanes. Tertū genus odoris tēdio inuisū, & exacuta clune fastidiedū.

EX M. VERG. COMM.

Longe breuior, q̃ Plinius in Blattarū remedijs Dioscorides est. Ille longiore historia Blattarum genera omnia, & singulorū priuatim remedium aliquod profecutus est; hic in uno genere unum tantū remedium docuit. Causam peritiores conijciunt. Nobis ad suspicionem inclinatus animus; facitq; in aliorū abundantia tanta capitis huius paupertas & breuitas, ut suspicemur non esse integrum hoc caput, neq; ex antiquioribus, & melioribus Græcis, quæ id ostendant,

coniecturæ defunt. Sed male sola suspitione de re aliqua censetur, ob id consulto eas relinquitur. Est autem in Plinio locus libro vigesimo nono capite quinto.

PODAGRAS, pernionesq; emendat Pulmo marinus recens, tritus & illitus.

De Pulmone marino.

CAP. XXXIX.

Marinus pulmo, Pneumon thalassios a Græcis uocat. Pulmo etiā Pleumon dicitur attice.

BARBARI COROLL.

EX M. VERG. COMM.

Quales in mari Pulmones sunt, nouerūt qui ad mare habitant, fruticum natura magis q̄ pisciū: & in eorū censu & ordine, quæ a ueteribus Græcis ῥωφύρα, mediū inter plantas & animalia habitu dicta sunt. Nomen illis similitudo fecit. Plurimū dierum in pelago hycmē Pulmones marini portendunt: & in sanandis hominū aliquot morbis egregias habent uires.

SVillus, & Agninus, Vrsinusq; pulmo impositu, intertrigines ab a-
quis contractas, ab inflammatione tuetur.

De Suillo pulmone.

CAP. XL.

Pulmo Vulpis si arefactus bibatur, suspiriosos adiuuat. Adeps quoq; liquefactus, infususq; auri dolorem finit.

De Vulpino pulmone.

CAP. XLI.

Pulmones Equini, Suilli, & Vrsini, ceterorūq; animantiū, ex Dioscoridis instituto referēdi erāt. In his quādo nihil erat scitu admodū dignū, ad diuerticula multę lectionis uenimus, q̄ nec inutilia, nec iniucūda futura sint lectoribus. Suem igit Græci Hyem uocat, & Sin, & Hyn. Aliquādo Thytem, q̄ a suillo pecore antiqui principii imolandi sumpserint lactentē porcelum, qui & Subgrumus est: Græci Orthagoriscōi uocat, quia matutinis uenales essent. Sed cōmuniori uoce Galathenon, Agnū Amnon, & Arna, & Arnon, & Rhena Hippocrates. Agnam Amnada, & Amnida, Hircū tragon, & Aegyptia uoce Murem. Vrsūm Arcton, Arcon ue. Arietē Veruecemue Crion & Cilon, præcipue sectariū. Vulpem Lampurim & Alopeca. Est & uolucres animal, & piscis hoc nomine. Græci certe Alopecis uocabulo, in medicina quādoq; intelligūt carunculas musculares eas, quę utrinq; lumbos anialis quasi uestiūt: quas Hippocrates Psyas, Aristoteles pro lūbis ipsis Psoas, & Psoas, Hieronymus Psyas pro renibus accepit. Alij Neuromertras uocat. Earū porro caua, inanitateq; partiū, Cibos nomināt, & Lagonas, nos Illia: unde Lagonoponos, qui sit dolor Illiū, alius q̄ qui laterū dolor appellat, hoc est, Pleuritis. Vulgus eā partē græca uoce, sed luxata inuersaq; significat, non lagonē dicendo, sed Galonē. Dicta uero Illia existimo a tenuitate, q̄ ea pars imbecilla, sublesta, ianis, & flaccida sit. Ob id & Ceneones itē Lagones uocatos, Athenus auctor diligētissimus affirmat. Nam & Lagana, & Artolagana hinc nomē habuere, quasi lagara. Porro Ina, & Ila gracilis est pellicula, ut Festus prodidit: unde Illia crediderim fuisse noīata. Quādoquidē tenuiora quoq; intestina, q̄ in homine, atq; oue Lactes proprie uocant, ut Plinio placet, Illas ueteres appellauere. Theodorus certe Gaza, Lactes interpretat, pro eo quod Græci Mesenterion appellat: nec quē sit auctorem in ea re secutus uideo. Illos certe morbi genus est, ita Græce dictus: nec arbitror, aut Illas, aut Illia hinc esse deriuata. Ina quidem Græcis & neruum, & uim significat. Dicitur Sus a Græcis etiā Choeros, hoc est, porcus. Nam Porceta est, quæ semel peperit, Scrophæ quæ sæpius. Mulieres inquit Varro nostræ, nutrices maxie, naturā qua foeminae sunt, appellant Porcū, & Græci eadē significatione, Choeron, siue ut Athenæus inq̄t, Delphaca: unde qui fratres sunt Adelphi nominant, hoc est, uterini. Porro Delphax porcus est adultus, atq; masculus, ut grāmaticus Aristophanes existimat, Coheros uero dum adhuc tener est. Alij cōtra uolūt. Hippocrates usum carnis & Choero dānat, cum e Sue, hoc est, uis cōmendet. Certe Delphax, & pro foemina Sue capī quādoq; a poētis, sicut & Chioeros quoq; apud Iones. Opimas Sues Græci qui dam sunt qui Petalidas, & Larinas cognominēt. Alterū nomen a uutilis deriuatū est, quos illi Petalos appellat: ubi patula habere cornua cōpere. Alterū a bubus, quos e pastoris nomine Larinos uocabāt, siue a larina Epiri uicūlo, siue a græco uerbo saginā significāre. Dicitur Sus & Verres, & cū exectus est, Malalis: ut in gallis gallinacis Capi, & in equino genere Cantherij: quia seminis usu careant. Nam Canthelios Græci pro segetibus accipiunt atq; tardis: ab

πνύμων θαλάσσιος

χοίριος καὶ ἄρ-
νιος καὶ ἄρκιος
πνύμων

ἀλώπικος πνύ-
μων

BARB.
Aristo. de par-
tib. animalium
lib. 3. cap. 6.

B

D I O S C O R I D I S

C asinorū similitudine, quos Canthonas appellant, a clirellis, quas Cantheleos uocant.

E X M. V E R G. C O M M.

Spirandi officina Pulmo est, attrahens ac reddēs animā, idcirco spongiosus ac fistulis inani-
bus cauus, quibus aperiens se excipiat, contrahens uero aerem reddat: eamq; ob causam ope-
ratione follibus in fabrica, figura autē bubulæ ungulæ similis est, Preciosum uicē instrumentū,
& quod nō ratione hac tantū eam a morte distinguat, sed ex bestijs, quadrupedibusq; aliquot
homini medicinā faciat. Quā nos certius docere cupientes, quod in impresso codice legebatur
ὀλάτων, quod aquarū significat, ὑποδυμάτων, id est, calceorū necessario mutauimus. Obseruau-
mus etiā in Vulpino pulmone monere Paulum Aeginetā, non simpliciter ὑρανθίνα, quod est
siccatum, sed σκελετινθίνα, id est, sale inueteratū suspiriosis prodesse. Quod ad hęc his placu-
it, ut siccandi eius exti certiorē rationē legentes haberent.

ἡ παρ' οὐν

De Asinino iocinere.

C A P. XLII.

A sinis iecur inassatum, esu comitialibus prodest. Verūtamen iec-
uonis edendum præcipitur.

A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 32, ca. 11.

Haberi & piscem ferunt, qui a iecore dicatur Hepar, & Hepatus, qui felle careat, in capite
lapillos duos habēs, ostrei colore, sed rumbi forma. Hinc Eubulus, Rebaris, inquit, carere bili
me, nec mecum aliter q̄ cum Hepato pisce loquebaris. Hunc Phagro, & Rubellioni similem
Speusippus facit. Archestrato, Lebias uocatur. Inter saxatiles a Diole ponitur. Color ei ni-
ger ab Aristotele tribuitur, oculi maiores, q̄ pro corpore, cor triangulum atq; candidum. Et
hæc dixisse in transcurso nihil officit.

E X M. V E R G. C O M M.

Continuata historia in uetustioribus & melioribus græcis de aliquot animalū iecore agi-
tur: neq; ab re. Male enim a toto partes, & a genere species alterius rei intercessione separan-
tur, Eorū nos fidem & rei rationē secuti, de omni in scriptore hoc iecore deinceps egimus: nihil
Dioscoridi nociturā ab impresso codice mutationem hanc nostrā opinati: præsertim ut dixi-
mus, meliorū uetustiorumq; fide & rei necessitate confirmatā, neq; ex his quæ reliqua in anima-
libus mox dicēda erunt quidpiā auferētes. Multū, longeq; plus q̄ cordi, iecori detulerunt anti-
qui aruspices: caput extorū in eo constituentes, & eius notas omnes ad futuram fortunā dili-
gentius obseruantes. Plato etiā, excepta iracūdia, affectionū aliarum omnium nostrarum sede in
eo constituta, multas et graues quæ in exto illo fiunt lates, ut nos credimus. contemplatus est:
pro quarū multiplici curatione, ut aliquā naturæ gratiam idem referret, medicinæ se miscuit, &
ex diuersis animalibus diuersa curauit, & adhuc curat mala.

ἡ δὲ τοῦ ἀφ' ἑνὸς
ἐλάφου

De Genitali Cerui maris.

C A P. XLIII.

Genitale masculi Cerui tritum, & in uino potum, a uiperā demor-
sis auxiliatur.

B A R B A R I C O R O L L.

Genitale Cerui, Aedæon Elaphu, Græci appellant. Lydi genitale ipsum Acylon uocāt, ut
in Fago diximus. Est & piscis nomē Aedæon, qd & nos Genitale nūcupamus marinū, a non
nullis Halefursion græce dictū: q̄q; Halefursion sunt qui pro Callionymo pisce capiant.

E X M. V E R G. C O M M.

Certius libro sexto remedium hoc Paulus Aegineta docuit. siccat enim prius: tum teri,
sicq; cum uino bibi Genitale id Cerui iussit, addiditq; misceri remedijs, quæ ad Viperarum
morsus componuntur.

ὄνυχες ὄνων

De Vngula Asini.

C A P. XLIII.

Vngularum asini cinis, per dies multos binis coclearibus potus,
proditur comitiales adiuuare. Eadem oleo subactæ, strumas dis-
cutiunt. Et illitæ pernionibus medentur.

B A R B A R I C O R O L L.

Vngues Græci Onychas, & Oplas uocant.

Desyderabunt non sine causa, frustra tamen legentes, quo humore dilutus Asininae unguis cinis comitialibus bibendus sit: nihil enim aliud in scriptore hoc legitur, & nos ex alijs scriptoribus nihil habemus, quod in ea re moneamus. Iudicio id medicorum seruabitur, qui malo illi noxios humores omnes uitabunt: quale in primis uinum est.

De Lichenibus equorum. CAP. XLV.

Lichenes sunt in equorum genibus, & super ungulas indurati calli, qui triti & in aceto poti comitialibus mederi traduntur.

BARBARI COROLL.

In equo Lichen, & Hippomanes haberi solent. Lichen os est, dentibus caninis simillimū, in genibus & super ungulas animalis eius agnascens. Hippomani uero tantæ in ueneficia uires sunt, ut affusum æris mixturæ, equæ Olympiæ, ad motos maris equos, ad rabiem coitus insti muler. Est & herbae genus Hippomanes Heliado, quod & Seruius testatur. Nomen hoc & Dioscorides duabus herbis tribuit, ut post constabit. Sunt & Limi arborū Lichenes appellati. Est & herba Lichen uocata. Græci & Imperiginem Lichenas uocant. Hippon Græci equum, Celtæ, qui Breno duce Græciam inuasere, Marcant uocant, auctore Pausania.

EX M. VERG. COMM.

Cvis uitiū & aspredo græcis Lichen est, latini Imperiginem id malū dixerūt. Eius natura est, quoniam ex falsa pituita, flauaq; bile fit, ut quales ex fistilibus crustosæ squamæ decidūt, cum salugo in eis aliquādiu fuerit, sic ex hominis cute squamulæ etiam decidunt. Hæ cum diutius in cute hæserunt callosam contrahūt duriciem, & ab harū similitudine in genibus & ungibus equorū excrecentes callos, Lichenas Græci dixerunt, quibus ad medicinā usa est antiquitas. Meminit earū Plin. li. 29. capite decimo, meminit & Paulus Aegineta: qui præterq; comitialibus omnium uenenatorum moribus mederi etiā ait. Facile est in equis id uitiū obseruare. Plinius adnatū in his equi partibus os esse dixit. Hic non magis os, q̃ quo uoluerit aliquis nomine appellare. Non esse autē os, indicat quod hic ait, ἢ τιτυλωμένον, quod est, in callum duratos: sic riq; κατ' ἐπιγραφὴν, non κατ' ἐπιγραφὴν. Nihil enim hoc significat: illud autem ἀπὸ τοῦ γενεσίου, quod est, flectere in flexu genu, & unguis fieri, & durari ait.

λίχης ἵππων

De qua Plin. lib. 20, cap. 4.

Lichenes
λίχης

De Vngula capræ. CAP. XLVI.

VNGULARVM caprinarum cinere perunctæ ex aceto, alopeciae sanantur.

BARBARI COROLL.

Capra græce uocatur Aex: quarū syluestres, atq; feras in Samothrace nasci Varro scribit, Platerotas uocatas. Quem locū in auctore illo deprauatū omnibus exemplaribus corrigendū monemus. Non em Platerotas, sed latine Rotas legit, ubiq; sæculis cōiuentibus. Capras a carpendo dictas, idē Varro scripsit. Has & Chimaras Græci uocant, & Chimaron, & Enorchā Theocritus, qui sit caper: q̃q̃ idem Varro Caprū dici proprie uult, qui sit excastratus.

De Caprino iocinere. CAP. XLVII.

CApræ inassati iocineris decidua sanie, inungi lusciosos prodest. Et dum coquit, apertos oculos uaporari. Carnes assas uesci per q̃ utile. Tradunt Hircini iocinoris cibo comitiales deprehendi.

De Apri iocinere. CAP. XLVIII.

IEcur Apri recens si arefactum teratur, ex uino potum, contra serpentium, uolucrumq; morsus auxilio est.

BARBARI COROLL.

CAprinū, & Aprugnū latine dici posse uideo. Aprum Græci, Capron uocant & Syagron. Siculi Aschedoron, ut est apud Aeschylum. Poeta item Clunim, ut in Truculento Plauti clunum pecus, legendū censeam, chlunimū. Nam & Aristoteles suem ferum Chlunin uocat. Suillum præfertur omnibus Aetio, si quis, inquit, animal id arida siccā pauerit. Quod genus Græci Sycoton appellant. Vnde ortū puto, ut imperitū uulgus omnia iocinora uocare Ficata cœ-

αἰγῶν οὐχί

ἵππων αἰγῶν

καρπὸν ἵππων

D I O S C O R I D I S

C perit. Sane, ut meminit Aristoteles, suem præcipue alunt, & opimant ficus, & cicer.

¶ De Cane rabioso.

C A P. XLIX.

ἡπαρ κυνὸς
λυσιγύτης

I Ecur Canis qui rabie exagitatur, ab emorsis sumptum, ne tententur metu aquæ tueri creditur. Utuntur autem ad arcendos aquæ pauciores dente eo, qui Caninus dicitur. Hunc a cane qui momordit exemptum, & folliculo inditum, pro a muleto brachio adnectunt.

C A N E M G R A E C I C Y N A U O C A N T . P O E T A E A c a m y t h i o n , r a b i o s u m , L y s i g y t a .

¶ De Soleis ueteramentarijs.

C A P. L.

καπνισμάτων πα-
λαιά λίμματα

V Eteris Soleæ crematæ illitus cinis ambuſta igni, intertrigines, necnon calciamentorum attritus sanat.

C A N E M G R A E C I C Y N A U O C A N T . P O E T A E A c a m y t h i o n , r a b i o s u m , L y s i g y t a .

C O r i u m e c a l c e o , G r æ c i C a t t y m a , & C a s s y m a u o c a n t . N o ſ t r i V e t e r a m e n t ſ u , & V e t e r a m e n t a r i o s a r t i f i c e s a p p e l l a n t , q u o s G r æ c i P a l æ u r g o s . S i c u t V e t e r a m e n t a q u o q ; i p ſ a P a l i m p e g a , & P a l i n d o r i a . H i n c & V e t e r a t o r e s f o r t a ſ ſ e d i c t i , a c o n ſ u e n d i s f r a u d i b u s . N a m & a p u d G r æ c o s C a t t y m a , ſ u t e l a m , d o l u m q ; ſ i g n i f i c a t . N a m A l u t a r i j ſ u n t , q u i e x a l u t a , h o c e ſ t , c o n c i n n a t o c o r i o p e l l i c i u m o p u s f a c i u n t ; u n d e A l u t a m e n t u m , u t V e t e r a m e n t u m . P e l l i o n e s q u o q ; a b i j s d i f f e r u n t . S e d h æ c i n ſ t i t u t i h u i u s n o n ſ u n t . C o r i u m c e r t e p e c u d i s , ſ u g i l l a t a u i p r æ d i c a n t . U t p r o p t e r e a u n i l l i ſ ſ i m ſ i t a d e o s , q u i u i r g i s c æ l i f u e r i n t , P e l l i s c e r t e C a l c e d o n i a , i n H i p p o c r a t e h a b e n a m m o l l e m , C o r n e l i o ſ i g n i f i c a t .

E X M . V E R G . C O M M .

S i c c a t c r e m a t i c o r i j c i n i s , i d e o q ; e x u l c e r a t i o n i b u s m e d e t u r . I n q u e m u ſ u m n o n ſ a t i s i n t e g r o ſ e n ſ u i l l i n i h i c i u b e t . D e ſ y d e r a t u r e n i m , e x q u o l i q u o r e , a u t u n g u i n e i l l i n e n d u s ſ i t . B a r b a r u s e x L i n i o l e o f i e r i i d a i t , c u m t a m e n i n ſ c r i p t o r e h o c , q u o d h a c t e n u s l e g e r i m , n i h i l h u i u s m o d i i n u e n i a t u r . N o s i l l u d m o n e m u s , n o n e ſ ſ e h e r b a r i j , & e i u s q u i m e d i c a m m a t e r i a m t a n t u m d o c e a t , u ſ u m e i u s d o c e r e . P r i u a t i m e n i m a m e d i c i s i n ſ t i t u e n d u s , & t r a c t a n d u s h i c e ſ t ; i d e o q ; n o n e ſ ſ e c e r t a m e i u s r e i d i ſ c i p l i n a m , ſ e d o p o r t e r e m e d i c u m h i s u t i , & i n u ſ u e a a d d e r e , q u æ u t i l i o r a & a p t i o r a f o r e i l l e c o n i e c e r i t .

D

¶ De Mergi iocinere.

C A P. LI.

αἰθία ἡπαρ

S i C a t u m M e r g i i e c u r , & e x H y d r o m e l i t e b i n i s c o c l e a r i b u s p o ſ t u m , ſ e c u n d a s e x p e l l i t .

M E R G U M A e t h y i a m G r æ c i u o c a n t . E r p o æ t a D y p t e n . A l i o q u i n n i h i l a l i u d e ſ t D y p t e s u e r b u m e x u e r b o , q ; M e r g u s . P o æ t a G r æ c i e t i a m P o i g a s , & B u n g a s d i c u n t a u e s e a s . P h o r i o n a u c t o r .

B A R B A R I C O R O L L .

ἀλκυονίδος ἄ-
νασχισθίσαι

¶ De Gallina.

C A P. LII.

D i ſ ſ e c t æ G a l l i n æ , & a d h u c c a l e n t e s a p p o ſ i t æ , ſ e r p e n t i u m m o r ſ i b u s a u x i l i a n t u r . S e d i d e n t i d e m a l i a s ſ u f f i c e r e o p o r t e t .

ἀλκυονίδος ἐγ-
κεφάλου

¶ De Gallinaceo cerebello.

C A P. LIII.

G A l l i n a r u m c e r e b e l l u m i n u i n o b i b e n d u m d a t u r c o n t r a ſ e r p e n t i u m m o r ſ u s . S a n g u i n e m a c e r e b r i m e m b r a n a p r o f l u e n t e m ſ i ſ t i t . S u b d i t a a u t e m u e n t r i c u l o G a l l i m e m b r a n a , c o r n u n o n a b ſ i m i l i t i s , c u i u s p e l l i s i n d e c o c t i o n i b u s d e t r a h i ſ o l e t , ſ i c c a t u r , t r i t a q ; i n u i n o c o n u e n i e n t i ſ ſ i m e ſ t o m a c h i c i s d a t u r i n p o t u . I u s e u e t e r e G a l l i n a c e o , a l u u m ſ o l u i t . A b i e c t i s i t a q ; i n t e r a n e i s , ſ a l e m c o n i j c i o p o r t e t , & c o n ſ u t o u e n t r e , d e c o q u i i n u i g i n t i ſ e x t a r i j s a q u æ , d o n e c a d t r e i s h e m i n a s r e d i g a n t u r . T o t ſ u

id refrigeratum sub diuo, datur. Aliqui incoquunt olus marinū, mercu-
rialem, cnicum, aut filiculam. Crudos humores crassosq; atram bilem &
strigmenta elicit. Prodest longis febribus, suspirijs, articularijs morbis,
& inflationibus stomachi. Eorum uenter sale conditus, & in umbra sic-
catus, cōtra eximias uacuationes medicamentorum trium drachmarum
ponderē, præsenti est auxilio. Quandoquidem protinus deiectiones co-
hibet. Teri autem debet in farinam, & aqua subactus dari.

S A R B A R I C O R O L L.

GAllos gallināceos Alectryonas, & Alecторыs Græci uocāt, quia nos a lecto exuscitēt. Gal-
linas uero Alecторidas, & Ornithas. Aristophanes Alecторыs qui mares sint, Alecтриenas quæ
fœminæ, Alecтро nas utrumq; continere, ludens in comœdia monstrauit. Inuenias et pro mari-
bus Alecторidas acceptos, ut inquit Athenæus, Alexarchus Cassandri Macedonum Regis fra-
ter, is qui Vranopolim condidit, Gallum Gallinaceum Orthoboam uocabat, confictio nomi-
ni: in quo uel ambitiosissimus fuisse dicitur. Athenæus pullos Gallinaceos a Græcis Hippos,
hoc est, quasi equulos uocari scribit: credo, quia pulli proprie sunt equorum. Dicitur & Pulla-
stra. Sed & iubas & capillum Græci Alecторidas appellant. Persæ etiā coruos hoc nomine si-
gnificant. Iure Gallinaceorum perunctos, Pantheræ Leonēsq; non attingunt, præcipue si & al-
lium fuerit incoctum. Si Gallinarum membra auro liquefcenti misceantur, consumunt illud
in se: ita hoc uenenum auri est. Intestina Gallinarum, cum rebus alijs incocta, ueteres Gigleria
uocabant. Gallinarum tria genera, Cortalles & Villaticæ, siue quod idem est, Cortalis: de qui-
bus medicina hoc loco habentur. Item Rusticulæ mansuetæ, ac feræ non dissimiles, Villaticis
aucupio quæsitæ. Varro Africanis similes aspectu, ac facie incontaminata scripsit, a quibus p-
productionem uocabuli Gallinaria insula uocatur, in mari Tusco Ligusticoue, contra Intemi-
lium & Albingaunum. Gallinæ Africanæ sunt grandes, uariæ, gilberæ, Meleagrides appella-
tæ a Græcis, ut Varro putat. Columella Numidicas easdem quibusdam esse cum Africanis
tradidit. Africanas uerō non Meleagrides, sed ijs similes, nisi q; rutilam cristam capite gerunt,
quorum utrumq; sit in Meleagride cœruleum. Clytus Aristotelis discipulus, Meleagridas Gal-
linę describit nostratis magnitudine, paruo capite, ad portionem corporis, & glabro, crista car-
nea, sed rotunda, & prædura, quæ paxilli modo promineat, colore ligni, ab ore ad malas ca-
runculam pro mento esse, sed rubriorem q; Gallinaceo generi. Etenim mentum uocari car-
nem, quam Gallinæ in rostro habeant: hoc Meleagrides carere. Rostrium acutius, & maius q;
Gallinæ, ceruix breuior & crassior, atq; nigra. Corpus uarium, maculis in nigro candidis, fre-
quentibus, per interualla maioribus lenticula, soleæ figura, uel orbiculis ut alæ, serrata specie,
digestis in quendam uersum maculis lucentibus. Crura sine calcaribus, cætero similia Galli-
nacels, Mares a fœminis internosci ægre possunt: tam est in specie germanitas. Pullos suos ue-
lut perose negligunt. Nam Medicæ a Media, quasi Medicæ generi uillatico ascriptæ sunt: pro-
pter magnitudinem in Italiam transire: cuiusmodi Patavinæ modo sunt, Puluerarię cognomi-
natæ, a uico, ubi grandissimæ, ac spectabiles maxime nascuntur. Quas Turcarum Rex is, qui
Constantinopolim ætate nostra cepit, ut muneris magni loco, a senatu missas habuit. Ad Pu-
gillatum atq; prælia Græci e Boetia Tanagricas, itē Rhodias, ut Athenęus & Columella, Mar-
tialisq; apud nos, nec minus Chalcidicas & Melicas probauere. Quidam Alexādrinas ex Ae-
gypto, Pausanias Boeticarum duo genera describit, alterum præliare, alterum Cossyphos, qua-
si Merulas appellans, Magnas inquit, alit Lydia, sed colore coracino, calcaria & apex Anemo-
næ floris macula modo rubent. In rostro summo, & in cauda item summa candidæ. Ex omni-
bus generibus Cortales, fœminæ proprie appellantur Gallinę. Mares Galli seminares, qui Ca-
pi hoc nomine uocantur, cum sunt castrati, Gallinas Græci quandoq; uocant in comœdia My-
lacidras. Quanq; Aristophanes ita appellat bestiolam inter molas nascentem. Adrianas, siue
Adriaticas Gallinas, Chrysippus exiguas intelligit, easq; ab Atheniensibus expertas comme-
morat. Aristoteles quoq; paruo eas corpore, sed feroces, & quæ pullos plerumq; suos oppri-
mūt, Gallinas primi feruntur habuisse Persę, ut Meleagridas Aetoli, & Pauos, siue quod idem
est, Pauones Samos insula: quos Græci quoque Taos, & Taonas bifariam, ut nos appellant.
Et Antiphon orator, aues uariās, Attici Taos, circumflectētes & inspirantes ultimæ pronun-
tiant, ut Athenæo placet.

Pli. li. 37. ca. 10
lib. 11. capit. 74
lib. 29. cap. 46

B

C De Ouorum natura. CAP. LIIII.

ἀνὴρ τῶν ἰατρῶν

OVum molliculum plus alit forbili, & durum plus molli. Luteum oui, contra oculorum dolores utile est. Inassatum, sedis inflammationibus prodest, cum croco & rosaceo. Et condylomatibus cum meliloto. Cum uua autem fruticis eius quem Rhoa dicunt, & Galla in patinis frigitur, ut cibo aluos sistat. Per se etiam offerri solet.

ἀνὴρ τῶν ἰατρῶν

C De Candido oui. CAP. LV.

Candidum Oui crudum, refrigerat. Spiramenta cutis obstruit, inflammationes oculorum infusum lenit. Ambusta si statim eo perungantur, pustulas non sentiunt. Faciem a solis adustione tuetur. Fronti impositum cum thure, fluctiones arcet, auertitque. Inflammationes oculorum lana exceptum, addito rosaceo melle, & uino, mitigat. Utile contra hæmorrhoidum morsus crudum sorbetur. Summe tepidum prodest uesticæ rosionibus, renū exulcerationibus, faucium scabrie, reiectionibus sanguinis, destillationibus, & thoracis reumatismis.

BARBARICOROLL.

OVum græci Oon uocant, cognomentis distinguitur: tenerum, siue liquidum, siue ut Cornelius, molle. Apalon Græci uocant: quod recentiores Elixum, & semicoctum interpretantur. Scleron, hoc est, durum, quod ita sit coctum ut indurescat. Sorbilia dicuntur, id est, Ropheta, quæcunque tantum incaluerunt. Quæ uero plus coquuntur, appellant Ephtha. Sunt & quæ Trometa, hoc est Tremula dicuntur, opime alentia, etiam si facilius transeunt forbilia. Sed hæc alij aliter cognominant. Et quantum conficio, tenera & tremula sunt eadem, sicut & Sclera, & Ephtha. Habentur & quæ Teganista, a patellis, & sartagine dicuntur, succi deterrimi. Mala sunt, & Optrethenta, hoc est, tosta cinere. Ideoque ipsæ anteponuntur quæ Græci Exaphtha, siue Pnietha nominant, hoc est, quæ in aquam calidam mittuntur, immingunturque cum garo, uino, & oleo coquenda lento igni, ac modice coagulanda, ut inquit Paulus. Nam & quoddam obsonandæ carnis genus, Pniethon ipsi uocant: quod equidem haud reor multum distare ab eo, quod Anabrafton appellant. Sunt & quæ uulgo dici solent Ootaricha, id est, oua salia, inueterataque, abdicandi usus. Nunc oua piscium salica in offas, aut in pastillos durata, inclusaque membrantulis, Oua Taricha dicuntur, inter lautissimos recepta cibos. Præferri uolunt omnibus ex gallina, ut Paulus inquit, ac fere Galenus. Item ex Phasianis, Perdibus. Pessima dicunt anserina: quamquam proprietate illa commendantur, quasi promptum ingenium faciant, si quis crebro utatur cum butyro, & melle. Schista quoque oua, Plinius appellat tota lutea, quæ triduo incubata tolluntur. Causa nominis, ut arbitror, quia diuidantur, & discedat uitellus a candido. Firmitas putaminis tanta est ouo, ut recta, nec ui, nec pondere ullo frangatur, nec nisi paululum inflexa rotunditate. Putamen in aceto maceratorum mollior. Candidum ex ipsis, siue ut Columella inquit, albus liquor, siue ut Palladius, albor oui, admixtum calci uiuæ, glutinat utriusque fragmenta. Vis uero tanta est, ut lignum perfusum ouo non ardeat, ac ne uestis quidem coacta aduratur. Luteum & Vitellus oui dicitur, quem Græci modo Lecythion, modo Chryson uocant. Hippocrates etiam Chloron, Oua quæ non sint recentia, ueteres appellabant regeta. Est etiam asculi genus Ouum, ab ouali specie. Sicut & quod Oofcyphion Græci uocant. Sed & ipsum coelum a ueteribus Ouum dici solitum, & hominem quoque ceu quandam cæli paruam imaginem comperias.

VERG.

Monebimus legentes, mollis, forbilis, durique oui discrimina in nutriendo solam facere coctura: quantumque Ouom cocturæ accesserit, tantum in nutriendo uirum illi accrescere. Et hoc est quod hic ait, magis quam forbile nutrire tenerum Ouum: quod nos, excelsio molle uertimus. Rursusque magis quam tenerum, siue molle, quod igne duratum fuerit. Et ut tota res certius pateat, forbile hic Ouum uocat, quod in coctura concepto tantum calore, uix densari incoeperit, & liquidum adhuc caleat, potiusque coctum sit. Tenerum deinde, siue molle, quod ulteriore coctura densatum quidem, non tamen duratum penitus fuerit. Durum postremo, siue igne duratum, quod extrema coctura ad eam duriciem peruenerit, ut commanducari & teri dentibus opus sit. In quo ordine primum

illud & sorbibile, ab usu & sumentis ratione sic appellatum, exiguas, aut mediocres in nutriendo vires habet. Secundum mox quod tenerum, siue molle, duri comparatione, a nobis dictum est, ampliore coctura densatum, maiores in nutriendo vires acquirit. Durum postremo, quod nos igne duratum etiam diximus, maximè in nutriendo potestatis est. Et hic in ouorum usu gratus & quasi census nutriendi ab hoc scriptore traditur: cui addiderunt multa & certiora postiores, medicis notissima, & a nobis ob eam causam relinquenda.

¶ De Cicadis. CAP. LVI.

Cicadæ quæ inassaræ manduntur, uesicæ doloribus profunt.

BARBARI COROLL.

Cicadæ Tétriges a Græcis dicuntur: quo nomine coci quoque & absurdi, & imperiti dicebantur. Sicut elegantes, & urbani Mæsones: a quo facietas & sales, & quæ scommiata græci uocant, Mæsonia cognominantur. De Mæsone Athenæus, Chrysippus iungit, existimasse falso, a uerbo græco deriuari nomen id, manducum & helluonem significante. Cæterum Megarensis homo quidam Mæson fuit, comædiarum actor: qui & seruorum, & cocorum personas, & eam primus comperit quæ Mæson appellatur: a quo dicta inquit falsa Mæsonica uocari consueuerunt. Cicadæ genus quoddam Acanthion, et Acanthia uocant: quod mutum interpretantur nonnulli: quoniam in Acanthio urbe Aetoliæ non canat: ut prouerbij quoque loco sit, *αὐδὸν ἄνθρωπος*.

EX M. VERG. COMM.

Idem uerbis remedium & Paulus Aegineta docuit.

¶ De Locustis. CAP. LVII.

Locustæ odoris suffitu, urinæ difficultates adiuuant, præsertim quæ sceminas male habent. Earum carnes nullo sunt usui. Est & quoddam genus Locustæ quæ Asiracos, aut Onos dicitur, siue pennis, prælongis membris. Exiccata autem si ex uino bibatur, contra scorpionis morsus magnopere proderit. Hac abunde uescuntur Aphri, qui Leptim incolunt.

BARBARI COROLL.

Locustarum, quas Græci nominant Acridas, una species Onos appellatur, & Apteros a Paulo, quia penes caret: quæ & Bruchon uocari putant, rodentem sata, & Attacō in sacris literis appellatur. Licet in Dioscoride Asiracō, siue Asiracō legamus corrupte, ut arbitror. Nicander Mastacē appellat, pro Bruchō. Aristoteles Artelabon. Clitarchus in Ambracia Locustas omnes Mastacas dici uoluit: ut Molurin, quæ frumenta depopulat. Ioniam Locustas a numero penarum Tetrapelyridas nominat. Oeræ Cornopas, alij Parnopas, & Pornopas: unde cognomen Herculi, & Apollini quoque in Aeolia, quæ Locustas abigar. Ridendus uero Strabonis interpres apud nos, quæ culicæ, non locustæ uertit in Parnore, quæ & Millepedæ genus unum est: quod uocat Onos. In sacris certe literis sunt, quibus Locustæ mandis solent, non animal insectum, sed herba hoc nomine significant. In qua sententia magnus autor Chrysostomus, & prior eo Athanasius fuisse credunt: quasi pro animali acceptæ, uescendo non essent. Cum tamen in Africa, ut Dioscorides commemorat, ad Leptin, cibo etiam frequenter commendat: hodie quoque uulgo eas comedunt Aegyptij. Plinius & Indorum gentem quidam, & Aethiopum quoque partem Locustis tamen uiuere, fumo & sale duratis, in annua alimeta, perdidit post Diodorum, Strabonemque: ut ob id Acridophagi nomen habeant. Locustam igitur, siue Pedem Locustæ, pro herba sumptam interpretatur, quæ uulgo Repunculum, siue Napuculum uocamus, folio angusto, desinente in mucronem cauliculis, uertice torulos habentibus, ut in asparago et salicario lupo cernit. Itemque multi lateris. Ex quibus minores alij alterno semper inguine profiliunt. Radicula uel diuicula, lautorumque mensis petita. Rapisti quidem sapore, non tamen ad ructus illiberali, ac fatuus omnino gustus, sed cum aceto, & sale non iniocundus. Semen ei tam exiguum, ut discerni fere aliter non possit, quam grana fabularum. Alij Pedem Locustæ pro Blito, aut ualde simili herba capiunt, in Arabicis scriptoribus. Sunt qui uocabulo Acridis, non herbam unam aliquam, sed summam herbarum omnium, quibus uiscerari homo sanctus in solitudine, accipiant. Quod si esset, perperam uertisset Hieronymus Locustas. Alioquin ceruum est, Locustas Iudæis inter animalia, quæ non sunt interdicta cibo, numerari. Dioscorides certe paniculas aucupæ dependentes, ut in Bromo diximus, Locustas, Plinius Lobas appellauit.

q n

A

71710

Pli. li. ii. ca. 25.

expidit

B

Pli. li. ii. ca. 29.
Aristot. de natura animalium. li. 5. ca. 17.

71711

D I O S C O R I D I S

C V E X M. V E R G. C O M M.

¶ Tplura sunt in natura gñā, sic etiā pene infinita ueterib. earū nomina fuerūt. Nihilq; mō difficilius, q̃ attelabos, parnepas, mastacas, molurides, retrapelyridas, cornopas, & alia in gr̃cis earū nomina digito signari, & dicier, hæc sunt; generatim ex c̃ptra Asiraco, quā et A sellū di cūt. Ob eā, ut nos credimus, causā, Dio. de Locustis egit. Nec priuatim strāgurijs. i. uellieq; sil licio, sed *Αυσούριος*. i. urinq; angustijs mederi ait. Quo magis Barbarum demiror: q̃ ad delectationem certas gr̃æcorum & latinorum in morbis & remedijs uoces tantopere uariauerit.

¶ De Ossifrago. C A P. LVIII.
V Enter eiūs auis quam latini Ossifragum appellant, particulatim potus, calculos cum lotio pellere proditur.

Pli. li. 30. ca. 7. O Ssifragus, siue Phinis, & ut Aristot. appellat *Φινίς*, alienos fœtus cū suis alit: q̃s Agl̃e nu triēdi tedio eiecerint. Quidā nō generare Ossifragū scripsere, ut Aristot. Plinius ex Halicō na- sci Ossifragos, ex Ossifragis Vultures minores, & ex minoribus maiores, q̃ omnino nō gene- rēt. Differt Ossifra gus, ab Ossifraga, etiā si cōfundāt aliq; q̃ Ossifraga septimū est Agl̃e genus, quē Barbata dicit, & Sanqualis. Ossifragus uero qualē indicauit, laudatus ad coli uiciā, qm̃ inte stinū unū habeat, mirabili natura, oīa deuorata cōficiendi. Nescio quāobrē Ambrosius Fulicā accipiat, quā Gr̃eci Phinin uocant; cum sit apud Maronem Fulica, ut q̃busdā placet Hero- dius, ex Arato, quē Poeta noster ea parte uidet imitatus, ubi prognostica tēpestatū carmini suo inseruit. Idē Ambrosius Herodiū, alio loco Sturnū interpretatus est: cū Sturnos gr̃eci Pfaras no minent. Hieronymus Herodiū Gr̃eco nomine appellat. Seruius Herodios accepit, quas nos Diomed̃as aues uocamus. Pausanias Herodiorū genus maximū, & pulcherrimum, & augu- rijs quoq; proditū uocari tradit Oenon. Theodorus Fulicam, quā ab Aristotele Cephros, si- ue Cemphos dicitur, intelligit. Ossifragus parum ualet oculis, nubecula etiamnum suffulsis.

E X M. V E R G. C O M M.

D A Vis postremi in Aglas generis Ossifragus est. Nominis manifesta oībus cā. Longissime in Aglarū c̃su Aristoteles & Plin. de eo egerunt, & qd̃ facile uolētibus inuenisse sit: nihil non ab illis dictū, a Barbaro in Corollario suo repetitū est. Nō parua laboris, & p̃c̃ij mercede que- renda auis hæc erit, si qd̃ de ea ferit, uellieq; calculos per urinā pellit. Sed q̃ uerū id sit, nō est te- status Diosc. *ἰσχυρίσται* qd̃ est, tradi, & ferri id dicēs, sapientē qd̃ & caute, in aliorum fidem & sa- mam reiciens, quā testari ipse non posset. Cuius morē & exemplū nos etiā secuti, nihil ultra ci- traue mensurā & significationem uocū eiūs tradidimus: legentesq; in eo *ἰσχυρίσται*, quod est nar ratur & fertur, ferri & nos uertimus: ne si p̃cipi, ut Barbarus fecit, dixissemus, ueterum p̃re- cepto confirmari & probari crederetur, quod hic non sua, sed aliorū fide credi tantū uoluerit.

¶ De Galerita. C A P. LIX.
G Alerita auicula est parua, apicem in uertice pauonis modo ge- stans, quā assa & in cibo sumpta, cœliacos adiuuat.

B A R B. Pli. li. 10. ca. 49. G Aleritā, siue qd̃ idē est gallica uoce, Alaudā, Gr̃eci Corydon, & Corydalon, & Scordalō appellant. Itē Corydalida. Oēs a Galero, siue Galea. Nā & Epitymbiditō Theocritus, q̃a ceu tymbō, hoc est, sepulchrū patris in capite gerat. Cuzulā gr̃ecū uulgus nominat. Nota est apud Aristophanem comicū poetā fabula, primā uolucrū fuisse Galeritā: priorē q̃q; terra de- functū ei patrē, cū humari non posset, nōdū enata humo cōditum in uertice. Corydalis est & herba Capnos appellata: qm̃ & ipsa doloribus coli medeatur, ut auis ipsa. Galeritā nemo fere ignorat, auem pusillā, & plerumq; ob iter nobis obuiam, ingenio ad cantus docili, Passercu- lis, ut inquit Galenus, qui Pyrgitæ ac Troglytæ nominant, in oppidorū muris, ac turribus fre- quentes ad similem, extra q̃ galero, quo illæ carent. Nam Corydylis, salamentarius piscis est, quem nos Cordyllam uocamus, Gr̃eci etiā Cordylida, & Dorylum. At Cordila tumores in capite significat: & Mitellam quoq; Cyprijs: eam quam Persē Cidarīn, Athenienses Crobylon appellant. Porro similis est Alaudæ, Zerraneola uocata: nisi q̃ apice in terra nidificans: unde nomen. Differt ab Alauda & Parcus, etiam si quī negant. Est autem Parcus auicula Palumbo minor, aliquanto subtus candida, cætero Pauoni similis, & crista quoq;.

E X M. V E R G. C O M M.

V Arian in Alaudē remedijs latini scriptores, & gr̃æci, Paulus Aegineta simpliciter elixam

(dico autem simpliciter, in aqua tantum) sumi diu iubet; hic assam præcipit. Plinius non assam tantum sumi, sed cinerem eius etiam in aqua bibi. Adhuc quod suæ ætatis testimonio & experientia confirmat, idem homini præstare cor eius femini adalligatum, & recens, tepensque ad huc deuoratum: pluraque alia quæ lib. 30. cap. 3. uolentes nouisse in eo poterunt.

¶ De Hirundinibus. CAP. LX.

DISSECTIS crescente luna pullis Hirundinis, qui primo partu exclusi sunt, in uentre eorum lapillos offendes: e quibus duos, unum uersicolore, alterum purum eximes. Si priusquam terram attigerint, in iuuenæ corio, aut ceruina pelle, lacerto, aut collo adalligati, comitialibus proderunt. Et sæpe prorsus eos recreabunt. Hirundines, uti Ficedulæ in cibo, aciei uisus medicamentum præbent. Tam pullorum quæ matrum cinis, cum melle oblitus, oculis claritatem adfert. Anginæ eo commode perunguntur. Vuæ & tonsillarum inflammationibus hoc cinere succurritur. Eripse & pulli exiccati, si drachmæ pondere ex aqua bibantur, hos iuuant qui anginæ morbo conflitantur.

BARBARICOROLL.

Hirundines, græce Chelidones, lapillum dicuntur pullo excluso dare. Tria earum genera. ut Banarum, syluestrium: quæ nidorum figura deprehenduntur. Ripariarum: quæ ita uocantur, quoniam in riparum cauis nidificant. Fit hoc capite Ficedularum quoque mentio, Græci eas modo Sicalidas, modo Ampelidas, modo Ampelionas uocant: autor Pollux, ut ceteros præteream.

EX M. VERG. COMM.

Chelidonio ab Hirundinibus, quas græci Chelidonas dicunt, Plinius lapillos eos appellat, qui in earum uentriculis inueniri seruntur, fabulososque existimat, & magicis artibus in medicinam illatos. Quod magis credendum in eo facit Paulus Aegineta, qui sexto sui operis libro de Simplicibus his agens, crematarum Hirundinum cinere tum in medicina utitur, anginisque, & ad oculorum claritatem ex melle inungi præcipit. Recipit tum antiquitas omnis quæ de eis in scriptore hoc leguntur: eamque ob causam qualia in græcis, latinisque omnibus adhuc leguntur, talia a nobis etiam reddita fuerunt: cetera omnibus eadem sunt.

¶ De Ebone. CAP. LXI.

EBoris scobe illito paronychia sanant. Vi adstringendi ebur obtinet.

BARBARICOROLL.

EBur a Græcis appellatur Elephas, eodem quo animal ipsum nomine. Quamquam animal Elephantus quodque dicitur. Ebur uero alij cornu, alij dentem Elephantis nuncupant. Est & uasis potioris genus Elephas.

Quæ nos Eboris ramenta diximus, Plinius Scobem appellauit eadem significatione: et si Ramentorum amplior quæ Scobis ambitus sit. Rameta enim ueteres latini dixerunt omnia quæ ramentis, secundo, incidendo ex materia aliqua, quasi inutiles reliquæ supersunt: Scobem uero priuati, quæ lima, aut ferra detrita cadunt. Estque Ramentorum uox cunctis his cõis, et quasi generis appellatio: illa autem unius, aut alterius rei tum nota et significatio Dioscori. *ῥίνισμα* dixit scobina, detritum ex Ebone puluerem indicans. Quam rationem secutus Plinius. li. 28. ait, Scobe paronychia tollunt. Nos cõiorem & ampliorem rationem secutus, Rameta diximus, quicquid ferramento detritum ex Ebone puluerem significantes: fecimusque id autoribus alijs græcorum medicis. Paulus Aegineta non ex dentibus tum Elephantis, quod solum Ebur est, sed ex unguium, aliorumque ossium ramentis remedium hoc conficit.

¶ De Suillo talo. CAP. LXII.

SVis talus conurit, dum e nigro albescat: qui tritus & potus, inflammationibus coli, longisque torminibus medetur.

BARBARICOROLL.

Alus Astragalos Græce dicitur in sue: cuius uicem in homine, Malleolus appellatus implet. **E**X M. VERG. COMM.

Non omni malo coli mederi cinerem suilli Tali hic scriptor ait, sed ex tribus eius generibus.

A

Χηλιδών

Pli. li. 10. ca. 33.

B

ἑλέφαντος
ὀδόντος ῥίνισμα
Pli. li. 8. cap. 3.

VERG.

ἀσφράλιος

Cbus illi tantum, quod cessante, nec transeunte crasso, & qualis peditu efflari solet spiritu, in eo intestino sit. Habet enim plures id malum causas. Fitque aliquando, cum inter eius membranas crassius, pituitosusque humor subsederit. Nonnunquam cessante, nec transeunte illi hac spiritu: quale paulo ante descripsimus. Sepe ex eiusdem intestini inflammatione, aut ob acres erodentesque humores dolorem acrimonia erosionemque sua excitantes. Ex his secundum illud genus *ἰμπυρρηκὶ τῶντος*, idest, inflationis uoce indicasse uidetur.

De Ceruino cornu. CAP. LXIII.

ἰλᾶψις κίρας

Ceruini cornu cinis elotus, binis cochlearibus epotus, prodest dysentericis, excreantibus sanguinem, coeliacis, regio morbo, & uentricis doloribus cum tragacantha. Feminis fluctione uuluae laborantibus, cum liquore huic rei accommodato. Cerui cornu cotusum, crudo fistili luto circumlito, & in furnum indito uritur, donec albescat. Id cadmię modo elotum, ulceribus oculorum & defluctionibus salutare est. Infrictum dentes expurgat. Crudi cornu suffiti nidore serpentes fugantur. Feruefactum in aceto, si eo gingiuae colluantur, maxillarum a dentitione dolorem adimit.

BARBARICOROLL.

Ceruum, Graeci Elaphon appellant, ut praediximus, & Bredon poetae. Alij caput ipsum Cerui Bredon uocant. Inulum, siue Inuleum eius, Nebron, et Cemada. Quamquam Cemias nondum pgregit in pascua. Damia uero Graeci Proca dicunt. Aristoteles, et idonei fere omnes, et Dionysius a Ceruo non distinguit. Phileras, primogenios Ceruos Procas dici uoluit. Ab hoc animalis Proconesios appellata est. Nam Ophion, quod Sardinia quondam ferebat, & interisse creditur, Ceruus non erat, sed animal pilo, ac dente simili, Ceruo minus. Genus uero Ceruorum praegrande, Graeci Echæineas, ab oppido uocant, Aristoteles Achænas cognominat. Inulū, Varro & ex equo & asina uocari scribit: quos & Bardones aliqui appellant, sicut ex asino, et equa Mulum: quamquam uetusti codices, tum Varronis, tum Columellae Innum habent, non Inulū, quod ab equo patre nomen traxerit. Sed & Aristoteles quoque Innum graece dicit, quod ex mulo & equa nascitur, ceru paruum mulus. Proinde Nonius marcellus, Hinnas inquit, & Hinnos, sub quo nomine accipere debeamus Varro signat. At enim, ex equis & mulis quod nascantur, Hinnos uocari. Vt errauerit, quod distinctionis studio confinxit, Hinnulos ceruini generis esse pullos, equi uero Inulos uocari. Quin si mutare oportet, uerius sit Inulos per simplex, n, & sine flatu ceruinus pullos accipere: Hinnos autem & Hinnulos per duplex, n, & cum aspiratione, ex asina conceptos equi coitu, sed utique si sint maiores, ut Plinius adiecit: quod Nonius marcellus alit, ut praemonui. Porro Inis, etiam infantem & paruulum Graecis significat. At Ginni per, g, ab Aristotele appellantur equi pumili, non alia ratione quam maris & ueteri uitio, Gygenios a Strabone dictos arbitror, in Liguria montanis, ubi & Mulorum genus uocat hoc nomine. Non placet quorundam distinctio inter Dorcem, & Dorcadem: quasi Dorcas ceruinus pullus sit, Dorx animal diuersum, cum Dorcas Aristoteli non Ceruum, sed Capream significet. Certe Dioscorides in coaguli mentione, Dorcadem a Dorco separauit. An, ut eo distet Dorcus a Dorcade, quo Ceruus ab Inuleo, & in Strabone Dorces, pro eo quod sunt Dorces. Nisi uitium sit in exemplari legas. Ipsum cornu Ceras uocant: quod & poculi genus est. nam cornibus ueteres bibisse, Pindarus, Sophocles, Homerumque testantur: si modo ut fere persuasum est, Rhyton, in Poeta eminentissimo idem sit quod Cornu.

EX M. VERG. COMM.

Non placet quod in extremo capite dictum a nobis, & ab alijs est, collui ceruini Cornu de cocto utiliter molarium dentitione factos dolores. Cur enim molarium magis quam primorum, & caninorum: Omnium enim eadem ex inflammatione doloris causa, et ratio est. Nec sic cantibus, qualis hic cinis est, sed nativo unguine mollientibus remedijs, ad adiuuandas in pueris dentitiones, ut antiquiores preceperunt: qualia sunt gallinaceorum adeps, & leporis cerebrum: at in dentibus *γομφίον* molares tantum graeci appellant. Fatemur id quidem: & ab his *γομφίον* facta uox nihil nisi molarium dentitionem significare potest, concedimus id etiam, sed hac conditione, dum certius aliquid & ad hanc rem aptius inueniatur. Inclinat enim animus, nobis significari ea uoce aliud in cunctis dentibus malum. Nec leuibus argumentis ob-

orta nobis hæc suspitio est, non ob eas quas paulo ante diximus causas, sed quoniam Galenus usum ceruini Cornu esse ait ad reftringendā gingiuam, & confirmandos dentes. Quod & Paulus Aegineta etiā, cum de omni Cornu lib. 6. agit, his uerbis testatus est. τὸ δὲ τῆς ἰατρικῆς καὶ μὲν διονοῦ λαμβάνον, ἢ τὰ περιπλασθέντων ὀδόντων ἵσκει συσπόμενον. Quod est, Cerui autem cornu tritum, uinoq; maceratū, mox circumlitū mobiles fistit dentes. Et paulo ante, οὐλα πλάσσειν, id est, humentes & diffuentes gingiuas compescere idem Cornu dixerat. Plinius etiā lib. 28. ca. 10. dentes mobiles confirmare ceruini Cornu cinerem testatur; doloresq; eorū mitigare, siue infricentur, siue colluantur. Addiditq; statim, arbitrari quosdam ad omnes eosdem usus efficaciorē crudi cornu farinā esse, & dentificia utroq; modo fieri. Quæ omnia eodem pertinent, ut dentibus, non denticionibus mederi ceruinum Cornu uideatur.

De Eruca.

CAP. LXIII.

ERUCIS, quæ in oleribus gignuntur, cum olco peruncti, a uenenatis bestijs feriri negantur.

BARBARI COROLL.

ERUCA, pro animali accepta, a Græcis Campæ nominantur. Hippocrates in herba tidymalo nascentes, aculeatas esse prodit, utiles ad conceptus. Campa dicebatur & genus illud bestiae, quam Liber pater in Libya sustulisse dicitur, ad Zambiram oppidum, tumulo in monumentum eius facti condito. Vt Diodorus meminit.

EX M. VERG. COMM.

HORTORUM, satorumq; omniū pestis calamitasq; Erucæ sunt, dirū animal, lento & humido tempore, auctoribus Theophrasto, & alijs nascens: multiplex hoc malū, & quod in uitis & arboribus natū, frondem oēm & florem erodat, turpiq; facie depastam arborē relinquit. Nihil in carmine suo, & ultimo duodecimi libri capite Columella pro horti, annona diligentius curauit. Si cætera defecerint naturæ & artis auxilia, ad superstitionē translata re, in qua non ueritus est, auctore Demoerito, docerē quæ saluo pudore dici & audiri non possunt, sed ut ille testatur, tam pſenti contra hoc malū remedio, & ope, ut non aliter q̃ cum decussa pluit arbore nimbus, Vel teretis mali, uel testæ cortice glandis, Voluit ad terrā distorto corpore campe. Qualia autē ea sunt, poterunt uolentes ab eo audire. Nobis em̃ in scriptore hoc aliud consiliū est, nec in Erucis eius aliud qd moneamus habemus, q̃ Deo in oleribus nascentes Erucas cum appellasse, ut a piccarū, aliarumq; arborū Erucis, quæ ueni maleficium habent, separaret. Nostra ætas & gens totum hoc genus quacūq; forma sit, & ubicūq; nascatur, una appellatione Brucos nominat; cum tamen Locustarum genus quoddam priuatim Brucum Græci appellent;

De Cantharidibus.

CAP. LXV.

FRVMENtis congestæ Cantharides, ad recondendū idoneæ sunt, quæ fictili uasē, non picato conduntur, & raro linteo obligato ore, & deorsum conuerso, suspenduntur super aceti feruentis q̃ acerrimi halitum, donec æstu examinentur. Postea lino transfixæ reponuntur. Potentissimæ omnes uariæ, luteis lineis, quas in pennis transuersas habent, promissioq; corpore, crassæ, ac blattarum modo præpingues. Sed inertes ac imbecilles, quæ unius sunt coloris.

BARBARI COROLL.

NOMINE Cantharidū e nostris aliqui etiā Scarabeos, maxime pilularios accipiunt; qui & Canthari dicantur. Et ab Hippocrate Copriones. Plinius, est inquit & Cantharis dictus Scarabeus paruus, frutera erodens. Porro Cantharus & nauigij, & pocilli nomen est, & ornamenti quoq; muliebris, ut Athenæo placet. Ipsarum Cantharidum uenenū, in qua parte sit, non conuenit. Alij in pedibus, & capite existimant esse. Alij negant. Inter omnes constat pennas earum auxiliari, in quacūq; parte sit uenenum. Ipsæ nascuntur ex uermiculo in spongia maxime cynorhodi, quæ sit in caule, sed fecundissime in fraxino. Cæteræq; in alba rosa, minus efficaces. Improbantur duo earum genera. Minutæ, latæ, pilosæ. Item macræ, unicolores.

EX M. VERG. COMM.

MULTA sunt, quæ Scarabeis congenere Cantharidas faciunt; sed nihil æque cognationem eorum ostendit, q̃ uaginis clausæ utriusq; animalis pennæ. Ob quam similitudinem, diminui-

A

καμπε

Plin. lib. 19. ca. pit. 6. lib. 11. ca. pi. 23.

B

καnθαρίδες

Pli. li. 11. ca. 29.

D I O S C O R I D I S

Cta a Scarabeo, quem Cantharon Græci nominant appellatione, Cantharida illi simile, sed minore corporis mole animal hoc dixerunt, pueris etiam notissimum; sed quod præfenti, & insaniabili ueneno hominē perimat: quemadmodū inter uenena hic ipse in extremo opere docebit. Habent ueneni par maleficiū Buprestides, & piccarū Erucæ. Hæ cæteris Erucis similes, & congeneres, discrimen ab arbore in qua nascunt nomine ipso ostendūt, Pytiocampæ a Græcis dictæ: Ille boū acerba pestis, in eadē gentē a maleficio suo nome inuenerūt. Descripsit Buprestim Plinius lib. 30. cap. 11. his uerbis. Rarū in Italia animal Buprestis est, longipedi Scarabeo simillimū: Fallit inter herbas bouem maxime, unde & nomen inuenit: deuoratumq; tacto felle ita inflammat, ut rumpat. Nouerunt nunc etiā rura hoc malum. Vidimusq; nos, peremptum aliquādo eo ueneno bouem. Non satis tamen ostendunt rustici eius animalis formam, diuersisq; appellationibus, diuersis locis, & diuersa forma describitur & appellatur. Copiosius inter uenena de his omnibus iterum agetur. Nunc satis sit nominū causam & rationem reddidisse.

De Bupreste.

CAP. LXVI.

βουπρεστις

Simili modo reconduntur Buprestes, genera quædam Cantharidū, & pinorum erucæ, quæ supra cribrum suspensum feruenti cinere paulisper intostæ, reponuntur. Vis omniū communis erodere, ulcerare, calorem elicere. Qua de causâ ammiscentur medicamentis quæ lepras, ferrosq; lichenas, & carcinomata sanant. Menses ciunt pessis emollientibus additæ. Aliqui Cantharidas antidotis impositas, aquæ subter cutem auxiliari prodiderunt. Argumēto, q̄ urinā moueant. Alij pennas, pedesq; contra potarum ueneficia, remedio esse tradiderunt.

BARBARI COROLL.

Pli. li. 30. ca. 4.

Pityocampæ a nostris Erucæ piccarum, aut pinorum uocantur. Buprestis & animal, & herba est. Ex his Erucis uermiculi postea nascuntur, qui acceptis alis euolant: quemadmodum & in ficu, & cynorhodo, siue canina sentice.

D

De Salamandra.

CAP. LXVII.

σαλαμάνδρα

Salamandra lacertæ genus est, iners, uarium, quod frustra creditum est, ignibus non uri. Vim habet erodentem, calfactoriam, exulcerantem. Additur ut Cantaris in medicamenta, quorū uis est exesse, & lepras abolere. Similiq; modo reconditur. Liquefacta in oleo, pilos euellit. Exenterata, detractis pedibus & capite, in melle feruatur ad eundē usum.

BARBARI COROLL.

Pli. li. 10. ca. 67.

*Lacerti sunt frigidi,issimi omnium serpen-
tium, ut Pompo-
nius Sabini inq.*

Salamandra animal lacerti figura, stellatū, nunq̄ nisi magnis imbris proueniens, & secuta ferenitate deficiens. Huic tantus rigor, ut ignē tactū extinguat non alio modo, q̄ glacies. Quod quidā tamen negant. Aetius per ignem inquit, cadentibus flāmis ambulat, eumq; non solum frigoris ui, sed etiā pondere corrumpit, quasi obruens. Theophrastus & frigori & humori tribuit, qui ex ipsa lentus profluat. Si diutius tamen in igni mansit, comburitur. Cassiodorus, Salamandra subtile, & paruū inquit est animal, lumbricis associū, flauo colore uestitum. Salua eius, quæ lactea ore uomitur, quacuncq; parte corporis humani contacta, uel pede imo respersa, toti decidunt pili, & colorem in utiliginē mutat. Si arbori irreperit, omnia poma inficit ueneno. Ita populos sæpe rotos necando frigida ui, nihil aconito distans. Quinimo, si contacto ab ea ligno, uel pede crusta panis incoquatur, idem ueneficiū est, uel si in puteum cadat. Manditur tamē a suis innocenter. Similis Ascalabotæ Salamandra est Aetio. Lacerta uenena, hoc est, Pharmacitide uelocior. Ascalabotem Græci, & Colloton, & Galeorē quandoq; appellant. Nostrī Stellionē. Horum transmarini pleni lentigine, stridoris acerbi, qui & uescuntur, intantū scorpionibus aduersi, ut uis protinus torporē afferat frigidī sudoris. Tales in Italia non sunt. Viuit enim rore, ut chamæleontes, præterea & araneis. Qui aut Stelliones appellantur, ut Marcellinus inquit, in nouis domibus cernunt, forte h̄ quos Romanū uulgus Tarantulas uocat, albas, innocuas, & pusillis lacertis similes. Sunt & Apulorum Tarantulæ in agris,

Phalangiorū fortasse generis, ueneni præsentanei, cōmoto statim eius mente, quē percusserint. Auxiliari cantu eis, & omnino musica ratione, cōsuetudo regionis est. A Stellione fraudulentiſſimo animali, stellionatus crimen, & stellatura. Spartianus in Pefennij Nigri uita, quos ingeſtiterit accepiſſe stellaturā. Et alibi. Tribunos, qui stellaturas inquit militibus tuliffent, capi tali pœna affectos. Inuidentiffimū hoc animal intelligit, quoniā ſeneſtutis ſuæ membranā dea uoret, gnarum propter Comitiales morbos impetī eam. Hinc ſtellare uerbū, pro inuidere. Cubilia ſtellionis, in locis oſtiorum, ſeneſtrarūq; ſunt, aut cameris, ſepulchriſue.

E X M. V E R G. C O M M.

Vnt nobis & alijs de Salamandra eadem fere omnia. Quod inter nos non cōuenit, unum tñ, & illic eſt ubi legitur, *φιδί δι τριχας τανισα μετ' ιδαιον*. Quā lectionem illi ſecuti, liquefactam in oleo Salamandrā depilare dixerunt. Nec male; id enim participiū illud plerūq; ſignificat. Nos autem non liquefactā, ſed crematæ cinerem facere id diximus: in antiquiſſimis, iſdemq; probatiſſimæ fidei græcorū codicibus, non *τανισα*, ſed *καισα*, quod eſt, cremata legentes. Conſirmauitq; nobis eam lectionem Paulus Aegineta, qui crematæ Salamandræ cinere tñ ad hos uſus utitur. Verba eius hæc ſunt, *σαλαμάνδρας δι κανθίσας πλὴν τήφραν ἔνιοι μίγνουν*, &c. quod eſt, crematæ autem Salamandræ cinerem aliqui miſcent.

De Araneo.

C R P. LXVIII.

ARaneus, quem Holcūm, alij Lycium uocant, ſubactus cum ſple-
nio, & linteo illitus, prolatusq; utriſq; temporibus, aut fronti, tertianos circūitus perſanat. Tela eius impoſita ſanguinem ſiſtit. Vulne-
ra quæ ſummā cutem occuparunt, ab inflammationis iniuriā uindicat. Eſt & alterum Aranei genus, qui candidam, tenuē, denſamq; telam ordi-
tur, quem in loculo ligatum, & lacerto appenſum, quartanis circūitibus mederi narrant. Decoctus ex roſaceo, & infuſus, aurium doloribus au-
xiliatur.

ἀράχνη ὀλκύνι
λύκειον

B A R B A R I C O R O L L.

ARaneū Græci Arachnen uocāt, Araneorū, Phalangiorūq; multa gñā. Innoxii lupi nōmi-
ne poſt dicendū. Noxiōrū duæ ſpecies ab Ariſtotele tradunt. Vni corpus exigui, uarium, acu-
minatū, aſulūm ingrediens: ob id Pulex uocatus. Alteri malus & nigricans, prioribus cruri-
bus longiſſimis: tardū hoc & imbelles, nec ſaliens, æque Phalangitū. Præter hæc a Plinio uocaſ
genus Aranei lanuginosum, grandiffimo capite, quo diſſecto, inueniantur intus uermiculi duo,
qui adalligati, ceruina pelle ante ſolis ortū, dicuntur mulieribus pſtare ne cōcipiāt. Vmūq; illā du-
rare anno, unde Atocion q; dicit. Eſt & Rhagion uocatus, q; acino uuæ nigro ſimilis eſt, ore
mimo, ſub aluū pedibus curtiſſimis, & tanq; inchoatis. Dolor a morſu eius, qualis a ſcorpione.
Vrina textis Aranei pſimilis. Quintū genus Aſtorcion, uel Aſtertion, ex manu ſcriptis codici-
bus, aut Aſtorgion, qſi diſcordiale & inamabile ſignificent. Sed in picto Dioſco. *ἀστέριον*. i. aſte-
riū, uirgulis albis, a proximo diſtinguit, cuius icu genua labefactantur. Sextū ceruleus, utroq;
perniciōſior, lanugine nigra, caliginē morſu concitans, & uomitus araneofos. Septimū a cra-
brone penna tantū differens, deterius etiamnum cēruleo: propterea macie quoq; conficit a ſe
percuſſos. Octauū Myrmecion, quia formicæ ſimilis, ſed multo maior, ruſſo capite, aluo & re-
liqua parte corporis nigra, guttis reſperſus albis interſtinguentibus, acerbiorē q; ueſparū do-
lore torquens. Viuit maxime circa furios, & molās. Fuliginosum deſcribitur Aetio, ſtellarū,
præſertimq; dorſo. Nonū Terragnathus, ſed duobus ſtagijs. Alterius mediū caput, linea can-
dida & trāuerſum. Itē altera diſtinguit, qui & peior, tumorēq; oris molitur. Alter cinereus, po-
ſteriori parte candidus inertior. Aetius Terragnathon modice lato, & ſubalbo corpore deſcri-
bit, pedibus aſperis, duabus incifuris in capite, recta una, per obliquū alterā, ut quaternas buc-
cas habere uideat: unde nomen. In Aethiopia tam frequētes, ut regionē In eā quandā prope Sil-
los, Acridophagosq; deſeri cōegerint. Idem auctor & Cranocolaptrē, & Scoleton, & Scleroce-
phalon enumerat. Vt primū genus longis cruribus, ſubuiride, aculeo circa ceruicē infeſto pro-
dat: ita dictū, quia caput maxime percutiat. Secundū ſqualet maculis, præſertim capite, longis
pedibus. Tertio caput duricia ſiliceum. Lineamēta toto corpore ſimilia beſtiolis, quæ lucernas
circūuolant. Hæc fortasse uel eadē ſunt, uel partū diuerſa plinianiſ. Præcipue uero Cranocola-

Pli. li. ii. ca. 24.

Cptes idem genus uidet illud esse, qđ nos Sextū haberi diximus, ceruleū, & caliginē morfu con-
citans, caputq; tentās. Habet & cinerei genus quoddā minime noxiū, telas muscis in parietibus
latissime pandentis: qui & Muscarius uocat, inter lupos, ut arbitror locandus. Comperio &
Araneum candidū, longissimis, tenuissimisque pedibus. Item aliud genus crassissimū, textū con-
dentis in contignationibus: quorū uterq; in dictas, aut dicendas forte species recidit. Est & di-
scrimen Araneorū, quos Aristoteles appellauit Lupos; quorū minimi non texant, maiores in
terra cauernarū uilia, & exigua uestibula præpandant. Mediū genus lautiores, crassioresq; te-
las orditur uel operosissime, ob id Eruditissimū ab eodem Aristotele uocatū, cuius duas quoq;
species reddit. Maiorem subtus pēdere, degrauatū mole corporis. Minorem, in sublime e qui-
busdam telæ suæ latebris obseruantem excubare. Græci qui de uenenatis ictibus scripsere, Lu-
pum uenari muscas demonstrāt rotundū, cælata, sculptraq; ceruicula, tribus in ore, quod ei la-
tiusculum est, lineamentis. Aranei Lacertarum catulos irretiunt, utraq; labia mordicus appre-
hensa, telas suas altius tollendo. Incrementa amniū futura præfagiunt. Sereno non texunt, sed
nubilō. Fœminā textrina, marem uenationi operā dare arbitrantur, idq; sole oriente, occiden-
teq; bestiolis tum maxime infestis. Aranei clunibus in uenere conueniunt. Vermiculos similes
ouis pariunt, in telas expansos: quia saliendo excludūt: Phalangio excepto, qui specu in ipso
cubat, magno numero, triginta fere: sed ubi emerit, matrem consumit sæpius, & patrem. Incu-
bant triduo. Cæteris generibus oua pauciora. Consumant Aranei, quater septenis diebus. Si-
mul porro editi sunt, fila sua mittūt, siue de suo qđ foris habent, ceu uellere corticeo, ut Aristo-
teli uisum est: siue ut Democrito, excrementi cuiusdā modo, uelut corrupta intus alui natura,
statuto tempore: siue ut alij dixere, quia intus sit quædā lanigera fœcunditas, Ouidius.
Cætera sunt uentus, de quo tamen illa remittit
Stamen, & antiquas exercet Aranea telas.

Non habet Creta insula maleficū animal, præter Phalangiiū, alioquin Italiæ ignotū. Hoc cerui
perculsi, cancos edendo sibi medent. Nomina & Mus araneus: de quo priuatim agendū no-
bis est. Araneorū telæ, priuatim Vescæ, hoc est, siccæ, ac tenerę uocari solent. Ipsum anial Ara-
neus uocat, græce Arachnes. Tela uero Aranea, ut græce Arachne. Qzq; interim & pro aniali
poëtæ capiūt Araneū. Phalangia uero, & quod idem est Aristoteli, Phalanges, & Phalangios
arbitror esse dictos: & Phalanx internodiū significat, qualis pars ea digiti, q̄ rigida manet, nec
flectit, ut Aristoteli placet. Omnibus em̄ Phalangis internodia terna in cruribus. Ob id & fu-
stes nodis rigentes, ut Plinius testat, Phalanges uocabāt. Vnde baiulos Viſtruuus, quia Pha-
langis uti soleant, Phalangarios appellat. In Albania Phalangii haberi traditur Straboni, He-
lianoq; a quo siqui feriuntur, aut ridendo, aut flendo moriant̄ desiderio suorū.

E X M. V E R G. C O M M.

Longa est Plinio, Nicandro, Aristoteliq; animalis huius historia: fecitq; id multiplex eius
genus, diuersiq; in tam exiguo corpore ad uitam & mortem hominū euentus, & quæ artificio
se modo exercent, modo insidiosè ubiq; animalia hæc agunt. Prima & maxima omniū, id est,
noxios, & innoxios, diuisio est: hos Græci ἀρᾶνες, nos Araneos, illos ambo Phalangia dixi-
mus. Rursus Phalangiorū plura sunt genera, priuatim ab antiquioribus latinis & græcis suis
nominibus appellata. Araneorū itidem, sed pauciora: quæ Dioscorides hoc capite numerat.
Qui primū Arachnes nomine usus indicauit, non de omni Araneo, sed de innoxio tantū age-
re, qui in parietibus & trabibus telas suas ad aliorum insectorū uenationem suspendit. Notissi-
mus omnibus hic est, in uetustis & rimosis parietibus habitās. Hunc Holcon, & Lycon, id est,
lupum uocari hic ait: facta, ut nos credimus, a uenatione & insidijs eius appellatione: & quo-
niam muscas rapiat, trahat, & enecet, ideo lupum, & Holcon a trahendo dictum fuisse. Lu-
pos Aristoteles totum hoc genus etiā appellauit.

De Lacerta.

C A P. L X I X.

σαύρας ἢ κεφαλὴ

Lacertæ caput intritū, & appositum, aculeos & omnia corpori infi-
xa extrahit. Varos, formicantes uerrucas, & pensiles, quas acro-
chordonas uocant, tollit. Iecur exelis dentibus coniectum dolores finit.
Si diuulsa admoueat, ictis a scorpione leuamentum præstat.

Pli. li. 9. ca. 39.

B A R B A R I C O R O L L.

Lacertam Græci Saurā. Huius una species Chalcidice uocatur, atq; Seps seorsum reddenda,
Lacertum, & Lacertam idem genus esse conspicio, ut est apud Græcos quoq; Sauros, atq;

Saura. Est & piscis hoc nomine. Lacerta uidetur & uasis genus esse apud Iuris peritos. Sicut & apud Græcos Saura, cuius in palma meminit Hippocrates. Est & Herbarum nomen Saura, Plutoni sacra, ut Nicander poeta docuit illi uersu. *σαῦρα*
ἡχθονίου πλάται σίφος ἡγασίλιον.

Fortasseq; in eo uerbo aut Anagallidem intelligit: quippe quam Dioscorides Sauritin a nonnullis dici prodari: & prophetæ Nycteritin, quasi nocturno & subterraneo dicatam numini: aut ipsum Sinapi, quod, ut Plinio placet, ab Atheniēsis Saurion uocatur: aut Nasturtiū, quod ab Hippocrate Sauridion quoq; dicitur. Lacertarū pedes Græci Blafos uocant, hoc est, quorum pars extrorsum, pars introrsum spectet.

EX M. VERG. COMM.

Troq; genere Lacertū, & Lacertā idem hoc animal antiquiores Latini dixerūt, tam certū, tanq; ubiq; nascens, ut nihil dicendū aliud de eo sit. Nec fuisset nobis in cōmentatione eius aliquis labor, nisi quod fere in cunctis legit, pellere, siue malueris dicere, tollere impositū Lacertæ caput *ἰόνθον*, id est, uaros; nō sic, sed *ἰόνθον*, id est, clauos legi oporteret: quod nos antiquissimorū codicum fide instaurauimus: persuasitq; id audere Paulus Aegineta, qui clauos hoc re medio curat: & præter hæc res ipsa etiā, & cōgeneres morbi uerrucæ & formicæ, quibus rectius clauī, q̄ uari contigebant. Quinetiā uerbum *ἄψυ*, quo hic usus est, & tollere significat, clauis aptius q̄ uaris competit, qui extenuantur leuiganturq; potius q̄ tolluntur.

De Sepe.

CAP. LXX.

Seps, quam aliqui Lacertam calchidicam uocarunt, in uīno pota, morfus suos sanat.

BARBARI COROLL.

Seps, nunc Lacertæ genus est, nunc ut diximus Millepedæ. Cum Lacertam significari uolumus, Chalcidicæ cognomento utimur. Sed an idem sit cum ea, quam Aristoteles Chalchida, & Zygnota nuncupat, Theodorus more suo Dignydā conuertit, lacerto paruo similem, æstimabunt legentes. Ipse in diuersam partem moueōr Plinij uerbis, qui quodam loco ait, Peculiariter inquit, a Chalcide Ceraſte differt. Est & tuberculi maioris ac pestilentis nomen Seps apud Hippocratem, ab erodendo impositum. Aetius, Seps inquit, serpens est cubitorum binum, crassitudine in exilitatem, ut alia quoq; genera serpentium, descendente: ingressu tardo, rectoq; lato capite, ore acuto, maculis corpore toto candidis: triduo, uel quadriduo interficit. Pausanias quoq; Aepyrum inquit, Arcadiæ quondam Regem in uenatione occupatum, & imprudentem Seps oppressit. Viperæ similis est inquit, minime, cineris colore, maculis ex interuallo uariis, lato capite, angusta ceruice, aluo maiori, cauda breui, obliquo incessu, quasi cancer: quod & Ceraſtæ inquit, serpenti proprium est. Chalcidicem Helianus, si quis inquit, habeat in tritico, fore ut incorruptum seruetur. De serpente intelligat, an de pisce Chalcidico, qui & Chalcis dicitur, non constat. De Sepe pro Multipeda, Plinius uigesimo uolumine. Multipedem inquit, Sepa Græci uocant, oblongam, pilosis pedibus, pecori præcipue nocuam. Castigatus est in ea parte locus, propterea q̄ non Sepa, sed Ipa legabatur. Nam Ips genus uermis aliud, ut in pumice docebinus.

EX M. VERG. COMM.

Ab exedendo Seps lacerta hæc dicta est. *σῆπι* enim, id est, exest quæ ueneno suo contigit. Lacertæ similem omnes describunt: præsertimq; in Theriacis suis Nicander dicens, *σῆπι* *πιδανόισι* *δρακὸν* *δαίμονα* *δαίμονα*, quod est, Vitabis & Sepa, corpore humilibus lacertis similem. Dico autē humiles, quas ille *πιδανόισι*, id est, per terrā serpentes dixit. Fuit hoc illi ab euentu nomen, quemadmodū a corporis maculosis lineis, quas in tergo habet colore æris: quod Græci Chalcon dicunt. A Chalcis, siue Calcidica dicta eadem est. Nos enim eadem credimus: fuisseq; antiquā & uetā eius appellationem Chalcida, quasi æneā, ob eam quā diximus cauesam: & ex eo deinde nomine, cuius rationem non nouissent omnes, ad adiectiui gentis, & loci nomen translatā eius appellationem fuisse, dictamq; Chalcidicam, quasi in Chalcide Euboicæ plurima inueniretur. Quod falsum est: cum in Libya & Cypro nasci præcipue dicatur, & inter petras illic uiuere. Factū ob id etiā est, ut in antiquis scriptoribus modo Chalcis, modo Chalchidica lacerta inueniatur: eorūq; auctoritate diuersum, non idem creditū hoc animal fuerit. Nobis in hanc partem inclinat animus: habemusq; opinionis huius auctorem antiquissimū Nicandri interpretem, Nec eo secius liberum legentibus arbitrium relinquimus.

C De Scinco. CAP. LXXI.

Pli. li. 2. ca. 8.

Scinus aut Aegypti, aut Indiae, aut rubri maris alumnus: quibus inueniatur in Lydia Mauritaniae. Est autem terrestris Crocodilus sui generis, qui salus affertur in nasturcio. Aiunt carnes quae renes amplectantur, id sibi uirium uendicasse, ut si drachmae pondere bibantur, uenerem accendant. Verum decocto lentis cum melle, aut semine lactucae cum aqua potio, ueneris cupiditates inhihentur. Additur in antidota.

Pli. li. 2. ca. 8.

B A R B A R I C O R O L L.
Scinco a Crocodilo cute distinguitur, candidiore, tenuioreque, sed praecipue seta squamarum, quae a cauda ei ad caput uersa est. Maximus Indicus. Post Arabicus. Afferuntur in ueterari sale. In Nilo natus, Ichneumone minor est, tanto inferior Crocodilo. In Libya duos cubitos excedere, Pausanias existimat. Venales Scincos ex Aegypto licet uidere, lacerti magnitudine. Sunt & Vincentino agro sui quidam Scinci, minores multo ueris, etiam si pro Aegyptiis officinae subiiciunt. In Bithynia Chalcedonis agro fere, Crocodilos minores quodam fonte nasci, qui a Zaritia dicatur, Strabo meminit: fortasseque pro Scincis accipit, quoniam paruos esse tradat. Crocodili Champsae apud Aegyptios uocantur. Iones uero Crocodilos primi uidentur appellasse, ut inquit Herodotus, sumpto nomine ab illo Crocodilorum genere, qui apud ipsos in sepibus, macerisque nascuntur.

Pli. li. 2. ca. 8.

T De Terrenis uermibus. CAP. LXXII.
Terreni uermes impositi, praecisos neruos glutinant. Tertianas discutiunt, decocti cum anserino adipe. Infusi, affectis auribus medentur. Cum oleo autem decocti, si in contrariam aurem instillantur, dentium doloribus praestant auxilium. Poti ex passo, urinam ciunt.

D **B A R B A R I C O R O L L.**
Vermes terrenos, quidam Blininthas, alij Gensentera, hoc est, Lumbricos, & Intestina terrae uocant. Iulos aliqui, ut Dorion. Gaphagae a Syracusanis uocantur, quasi limo & terra uti solent. De ijs non nihil & in Fibro diximus. Est Iulus & Polypus & Cantilenae genus, quae lanifices siue purpurarii utuntur. Hoc nomine uocantur hymni quoque Cereris, ac Proserpinae. Sed & fruges ipsae. Propterea, quod singulares manipulos faris hordeacei, amalas Graeci uocant: ipsas uero metas, & fasciculos, qui ex multis manipulis praeligati sunt, Vlos, & Iulos nominant, ut Athenaeus inquit, meliusque Photion Vlos interpretatus, panes holocleros, hoc est, quibus nihil detractum sit. Nec satis scio, de autopyro pane, an de holopyro Photionis enarratio intelligenda sit: de quorum utroque in tritici mentione disertabitur. Terreni uermes, cum e cauernis suis prodeunt, tempestates, imbresque praenunciant.

M De Mure araneo. CAP. LXXIII.
MVS ARANEVS dissectus & impositus, sui morsus ueneficia luit.

Pli. li. 29. ca. 4.

B A R B A R I C O R O L L O.
Murem araneum Mygalen, & Myogalen Graeci appellant. Negant transiri orbitam ab eo, naturae quodam corpore: & si transierit, moritur. Inde contra morsum eius, terram ex orbita sumendam praecipiunt. In Italia uenenatus eorum ictus. Eosdem ulterior Appennina regio non habet. Monendi sumus in Theodori praefatione de animalium historia, non Mygalen pro mustella, sed Galen scribendum ab impressoribus fuisse. Mus araneus ideo Mygale dicitur a Graecis, ut placuit Aetio, quia muris magnitudine sit, & mustellina specie. Os ei oblongum, cauda gracilis, dentes quadruplici uersu tenues: quod & uulnus indicat. Ex eo purus sitim sanguis effluit, mox saniosus, tum pustulae insurgunt. Sunt quibus caro feculenta. Ipsum animal maxime testiculos aggreditur. Pustulae, si praegnans percussit, nec aliter rumpuntur, ut Dioscorides & Aetius scribere. Plinius, non pustulas, sed ipsum Murem araneum si praegnans ferisset, dissilire protinus existimant.

EX. M. VERG. COMM.

Descripserunt ex ueteribus plures araneū Murem, præsertimq; Aetius: q; ideo a græcis Mygalem, factō ex mure & mustela nomine, appellari ait, qm̄ muris magnitudinē, & eadē illi cauti-
dē gracilitate, et rictus longitudine, reliquo autem corpore mustelina specie sit. Amyntas tñ, an-
tiquissimus græcorū scriptor, ideo Mygalem uocari ait, q; adulterino coitu ex mure & muste-
la nasceretur. Quod nec uerum, nec uerissimile est. Qui enim ad generationem coibunt mus &
mustela: quibus non solum dissimilis penitus natura, sed quales multæ aliæ inter animalia ui-
dent̄ natiuæ & exitiales inimicitia sunt. Meminit aranei Muris Nicander in Theriacis suis, cę-
cumq; appellauit, homini exitialem, in orbitis rotarū pereuntem.

De Muribus. CRP. LXXIII.

MVres, qui in domibus oberrant, concisos, scorpionum plagis
utilissime imponi in confesso est. Si inassatos infantes ederint,
oris saluam exicari promittunt.

BARBARI COROLL.

MVris nomen ut Mustellæ, animalibus multis cōmune. Alpini, quos aliqui Marmoras
uulgo dictos intelligunt, magnis oculis prominētib; media magnitudine, pabulum hyemi
præparant, anteq; condantur. Alterni, ut aiunt, mas, & fœmina, complexo herbarum fasce,
supinos cauda mordicus apprehensa, inuicem detrahunt ad specus, proindeq; tunc temporis
detrito uideri dorso. Pares ijs Aegyptij, similiter residunt in clunem, & in binis pedibus gra-
diuntur, prioribus manuum uice utentes. Sunt & Pontici, unius coloris, & uarij. Ex hoc gñe
creduntur esse pelles, quibus muniri uestes contra frigora cœpere, candidos eorū Armillinos,
fordidum uulgus nominat. Nam uarij, parte tātum prona, candicāt. Venetis in dorso color,
a quo Dissuarie Pelles uocantur: quandoq; ferrugineus, deterior priore. Instruxit & ex Muri-
bus luxuriā suam uita, alios magnis frigoribus, alios medio anni tempore a septentriōibus pe-
tēdo. Armamus corpora, debellamus animos. Condunt mures hyeme dumtaxat albi, quorū
palatum in gustu sagacissimum esse referunt. Murem Græci Myu appellant, Cretenses Smyn-
thion, siue Smynthea, unde Apollini cognomen, ut Phocion uidetur post Strabonem.

EX. M. VERG. COMM.

PLura sunt Murum ueteribus genera. Alpini, Pontici, Glyres. Et in his generibus diuerso
colore & forma, sunt & in domibus nostris latentes: quos adiecta hac nota ad medicinam Dio-
scorides ab alijs secreuit.

De Vsu lactis. CAP. LXXV.

LAc generatim omne boni succi est. Corpus alit. Aluum emollit.
Stomachum & intestina inflatione uexat. Vernum tamē dilutius
æstiuo habetur. E uiridi pabulo aluum magis læuigat. Probatur autem
candidum, æquali crassitudine, quod ungui instillatum cogitur. Aluum
inipus tentat caprinum. Quoniam adstringentibus pabulis, robore, len-
tisco, & oleaginis frondibus, magna ex parte uescuntur. Inde stomacho
accommodatissimum reddi solet. Ouillum autem dulce, asperum, & præ-
pinguē, non usq; adeo utile stomacho. Bubulum tamen, asininum, & eq-
num, uentri magis idonea. Sed ipsum turbant. Quibus in locis pecora
scamoniam, ueratrum, lematipem, aut mercurialem pascuntur, lac omne
uentrem & stomachum subuertit. Quale in Iustinis montibus esse, a no-
bis proditum est. Siquidem capræ, quibus candidum ueratrum pabulo
fuerit, primo foliorum partu euomunt, & eorum lac haustum nauseam
creat, & stomachum in uomitiones effundit. Adstringentiū omne deco-
ctum, præcipueq; candentibus calculis marinis exuctum. In summa, omni-
bus auxiliatur internis exulcerationibus, præsertim faucium, pulmonis,

C interaneorum, uesicæ, & renum. Foris uero contra pruritum cutis, eruptiones papularum, & uitiatos corporis succos. Recens cum melle crudo, addito sale, datur exigua aqua dilutum. Minus inflat quodcunque seru- uerit. Decoctum cum calculis marinis ad dimidias, ulcerosas uentris fluctiones adiuuat.

Pli. li. 29. ca. 9.
Lib. iii. ca. 41.
Aristot. de na-
turis anima-
lium. lib. 7.
cap. 5. u.

B A R B A R I C O R O L L.

Lac Græce Gala. Camelinum, ab hominis lacte, dulcissimum: præcipue si ad unam mensu- ram tres aque addantur. Bos ante partum non lactescit, Asina protinus. Pullo eius ubi pingue pabulum est, biduo a partu maternum lac pressisse mortiferum. Genusque morbi uocatur Co- lostratio, & infantes Colostrati, densato lacte in casei speciem. Ex proximo semper a partu Colostræ fiunt, quæ nisi admisceatur aqua, durecant in pumicem. Est autem Colostra, siue ut Plinius Colostrum, prima a partu spongiosa densitas lactis. Theodorus pro coitu lactis quocunque Colostrum plerumque accipit. Itemque pro eo quod ab Aristotele Trophalides ap- pellatur. De Colostro & Martialis poeta meminit, & Lucilius, & Plautus in Penulo. Mea in- quit Colustra, meum cor, meus molliculus caseus. Inter opera uero ganæ preciosissimum ex lacte Caput uocatur: quod Britanni atque Belgæ Cremorem lactis hodieque nominant, confici- tur & quæ Spuma lactis dicitur. Insubriæ supra memorati, Cremoris amula, quam græci A- phrogala, ut inquit Aetius, appellant. Vtrinque dentatorum lac non coit. Tenuissimum came- lis. Mox equabus, Crassissimum asinæ, ut coaguli uicem impleat. Omne Lac igne spissatur, si- gore ferescit. Spissatum igni, Pyriathes, & Pyriephton uocari a græcis, autor est Aetius. Me- minit & Iulius Pollux, sicut spissatum coagulo Pyctes, quod rustici nostri Lac luncatum, a lun- co & carice, aut quibus alijs seges tribus intoluitur, appellant. Athenæus uero primum lac Py- riephton, & Pyriephton tradit uocari. Photion primum Lac a græcis etiam Pyos, & Pyon dici uoluit. Alioqui Pyos & sanguis concretus est: quod & Pus dicitur. Pulsem ex ouo & la- cte Oogala medici cognominant. Lacticia, qui uocant ex Lacte quoquo modo cibum, etiam si quidam in sacris literis id usurpant, non probo. Lactarium opus dixerim potius, autore Spar- tiano. Cænas inquit Heliogabalum exhibuisse alia die de oleribus, alia de pomis, alia de dul- ciarijs, alia de opere lactario.

D

εἰς γάλακτος

De Sero lactis. CAP. LXXVI.

Lac quodcunque Serum continet implicitum. Quod ubi discessit a lacte, multo potentissimum ad purgationes reddi- tur. Datur quibus sine acrimonia uolumus deiectionem moliri: ut me- lancholicis, comitialibus, lepris, elephantijs, & erumpentibus toto cor- pore papulis.

Surabolib. 3.

B A R B A R I C O R O L L.

Serum iam multo potentissimum quidam ad tertias decoquunt, & sub diuo refrigerant. Græci Orron uocant. Hoc quemadmodum a lacte separetur, Dioscorides mox indicat. In E- rythia iuxta Gades, insula unius stadij, patente freto, lac sine Sero premi tradunt, ut Strabo re- tulit: tanta pinguitudine, ut in caseo conficiendo, aqua diluatur.

χρῆσις

De Schisto, seu scissili lacte. CAP. LXXVII.

Ex omni lacte fit quod Schistum appellant. Lac autem fictili nouo feruet, ramoque ficulneo recenti mouetur, insparsis postquam bis aut ter efferbuerit, totidem acetum mulsi cyathis, quot sunt heminae lactis. Ita enim ferescens, liquidum ab eo diuiditur, quod in caseum concreuit. Sed cum feruet, ne superfundatur, conueniet spongia ex frigida conti- nuo fictilis labrum detergere, seltariumque argentum frigidæ aquæ ple- num demittere. Bibitur heminis per interualla singulis usque ad quinas, ita ut intercedentibus spatijs, potantes ambulent. Lac autem recens efficax

est contra rosiones ustionesq; ab exitiis medicamentis factas, uti a cantharidibus, aut salamandra, bupreste, aut pinorum eruca, hyoscya-
mo, dorycnio, aconito, aut ephemero. Præsertim bubulum ad id eximie
confert. Gargarizatur autem exulceratis faucibus, tonsillisq;. Asininum
peculiariter collutos dentes, gingiuasq; stabilis. Fluctiones alui, si ulcera
sentiantur, tenesmosq; ouillum, bubulum, aut caprinum cum marinis la-
pillis decoctum, sistit. Per se autem, & cum hordeacea ptisana, aut halica-
ceo cremore infusum, magnopere intestinorum rosiones mitigat. Exul-
ceratæ uulvæ immittitur.

BARBARICOROLL.

LAc Schistum uocatur, quasi scissile, ac dimidium, quoties uidelicet concretam eius partem,
quæ Casealis dici potest, ab serosa, ut Galeno placet, separamus. Improprie tamen Schistum in-
quit lac nonnulli appellant, id in quo aut littorales calculi, aut ferrum ardens relictum sit.

De Muliebri lacte. CAP. LXXVIII.

Humanum lac dulcissimum est. Et maxime alit. Mammis autem
lexuctum, prodest tabi, & stomachi rosionibus. Contra haustu-
leporem marinum præsidio est. Oculis cruore ex ictu suffusis, cum thuris
polline instillatur. Podagricis utile est, cum meconio, & cærato illitum.
Lac omne respuendum splenicis, hepaticis, comitialibus, uertiginosis, &
neruorum uitio laborantibus, febriculosis, & capite dolentibus. Nisi si
quis interdum purgationis gratia, ut ostendimus, Schistum præbeat. Pri-
miperæ canis lacte perunctos narrant glabrescere. Potum contra uenena
antidoti uicem obtinet. Abortus mortuos expellit.

γυναικός γάλα

BARBARICOROLL.

LAc mulieris ante septimum mensem inutile, insalubreque. In omni usu præfertur eius, quæ
geminis enixa fuerit, tum eius quæ mærem fere. Inefficax eius quæ sequiorem sexum edidit.
Eius quæ mærem peperit, lacte gustato, Canes rabiosos fieri negant.

Pli. li. 28, ca. 9.

De Caseo. CAP. LXXIX.

Caseus recens, sine sale, sumptus alit. Stomacho utilis est, & facile
in membra delegatur. Corpus auget. Aluum modice emollit. Ali-
us tamen alio præstantior, pro natura lactis a quo conficitur. Decoctus
autem & expressus, deinde inassatus, aluum sistit. Illitus, oculorum infla-
mationibus & sugillatis prodest. Qui uero recens salitus est, minus ali-
menti præbet. Corpus apte minuit. Stomacho aduersatur. Negociū ue-
tri, interaneisq; exhibet. Vetusiore sistitur aliis. Sero quod a caseo ma-
nauit, q̄ optime canes aluntur.

τυρός νιάρω

BARBARICOROLL.

Caseus non fit ex utrinq; dentatis, ut diximus. Bubulum, Caseo fertilius q̄ caprinum, ex
eadē mensura, ut Aristoteles tradit, pene altero tanto. Quæ plures quaternis mammas habent,
Caseo inutilia, & meliora quæ binas. Caseus infumatus laudabatur a ueteribus: nec hodie cō-
temnitur. Omnis porro Caseus, senectute fit falsus: sed in museum redit saporem, aceto e thy-
mo maceratus. Barbaros Caseo non usos tradunt, sed in iocundū tamē acorem solitos lac co-
gere, quod & Oxygala uocatum sit: cuius rationē aliam Columella postremo sui operis libro
tradidit. Casei genus Saptum, quasi putrē dicas. Faciunt utilem coeliaci. In Plinio legendū sit
epityron, an caprarum, in mentione Casei lib. ii. controuersum diu fuit. Ipse nō epityrum, sed

r ij

Caprarum lego, non quia Epityrum oliuæ fractæ genus sit, ut quidam putant: quandoquidem oliuæ genus illud pityrum & pityrida, non epityrum appellari constat: sed illa ratione potius, quod nisi caprarum gregibus sua laus est, in recenti maxime eam augente fumo gratiam, & reliqua legamus, uix stabit sensus, nisi plane quis extorqueat. Præterea, cum de bubulo, & ouillo Caseo disseruisset auior, maxime sequens erat, ut de caprino quoque loqueretur. ne quia sit omnium fere deterrimus, improbati omnino iudicaretur. Adde, quod infumari, non alius magno fere Caseus, quam caprinus assolet. Nec fere placet, nisi musteus, atque recens. Athenæus latinia uoce usus, fumosos Caseos appellat. Laus Caseo Nemaufenfi, Lefuræ, Gabalicique pagis. Alpino duobus generibus. Docleati, ex Dalmatia. Vatisico, ex Ceutronia. Cebano & Liguria & Appennino, maxime lactis ouium. Auximati, ex Umbria. Item Iunenfi magnitudine conspicuo, singulis quoadque milibus pondo. Item Vestino, Crustuminoque, ac Coditio campo. Nam Siculum Iulius Pollux meminit, & Aristoteles, qui & Phrygium quoque nominat: sed Siculum ex ouillo & caprino mixtum lacte, Phrygium ex equino alininoque fieri solitum commemorat. Siculum Athenæus præferri putat omnibus, utique post Achaicum, ex oppido Tromilia, unde Tromilistius dicitur, & a Simonide Stromilium, ex caprino lacte. Epityrum uero caseus non est omnino, sed ut Varro inquit, edulium, Siciliae quam Italiae frequentius: cuius uocis in Plauto mentionem haberi sciunt omnes. Vnum inquit epityrum edam. Pollux uidetur hoc Xeriantyron uocasse, siculum edulium id esse affirmans. Athenæus Hypotyrida placenta genus facit, fortasse idem cum Epityro. Nam Catatyron condimenti nomen est e caseo, apud eundem autorem. Trans maria Bithynius fere in gloria erat, Salonites ab oppido appellatus. Gallicia por medicamenti uim obtinet. Nunc a Cisalpina Gallia commendantur, Placentini maxime. Formaginem Theodorus pro Caseo cur dixerit, aut quem autorem secutus ita uerterit, quod Aristoteles Trophalida scripsit, nisi quod in Columela forte legit, cōcretum lac in fiscellas, aut in calathos, uel formas transferri solitum, non uideo. Aliubi Theodorus idem, Trophalida colostrum interpretatur, ut prædiximus. Neutrum satis probo. Caseum Græci Tyron uocant. Eius discrimina pulcherrime Antiphanes poeta reddidit. Chloron, hoc est, recens atque molle: qualis in fiscella fertur. ob id Fiscellis uocatis: quia inde caseum affiguriunt: Xeron, hoc est, aridum, atque ut Iulius Pollux interpretatur, macilentum. Copton, hoc est, prædurum. Nam & Copta rhodia, & Copta ficus hinc nomen tulere. Xyston, hoc est, consilem atque rasilem. Nam & horum sic dicuntur. Tmeton, hoc est, scissilem. Pecton, hoc est, coagulum, colostrumque: nam est qui acescere incipiat & lacte ficulneo coierit, Opian uocant. In Creta Caseos quibus lata forma est, sed gracilis, Thelias, id est, quasi socinas appellant.

De Hippace. CAP. LXXX.

ἵππας

Quod Hippacen uocant, Caseus est equinus. Ea uirus redolet. Magnopere alit. Bubuloque proportionem correspondet. Nec desunt qui Hippacen, equinum coagulum appellarint.

BARBARI COROLL.

Hippace differt ab Hippice: quod Hippace caseus atque coagulum est, Hippice uero herba, Scythica equestris, a Theodoro dicta. Phrygium caseum, Aristoteles ex equino & asinino lacte confici solitum scribit, ut in caseo notauimus. Hippocrates inuictum scribit Scytharum Hippace. Ex equino lacte, in ligna, inquit caua infundunt id. Deinde obturbant, in natantem spumam, Butyrum uocant: id quod fidat, Hippacem: id quod in medio subsistit, Serum. Vires exiguo cibo sustentat Hippace, quemadmodum & Hippice.

De Butyro, & eius fuligine. CAP. LXXXI.

βούτυρον

Elacte pinguiissimo probatum fit Butyrum, quale bubulū est. Fit & ex caprino, agitato in uasis lacte, donec pingue discedat. Butyrū natura oleosum est, & emolliens. Vnde largius epotum, uentrem resoluit. Prodest, ubi oleum non adfuerit, contra uenena. Cum melle, si infusetur, dentitiones adiuuat. Gingiuarum pruritus, & oris ulcera infantibus emendat. Illitum foris, capaciora alimentorum facit corpora. Et ab albidis pustulis per summa scatentibus asserit. Contra inflammationes, et duris

A cías uulnæ, quod nec uirus respicit, nec uetustatem sentit, Butyrum efficax est. Dysentericis, & colî exulcerationibus infunditur. In medicamēta ad- di solet, quæ pus mouent. Vtile præsertim cum nerui, aut cerebri mem- branæ, uesica, aut ceruix uulnera accæperit. Id autē purgat. Replet. Car- nem creat. Ab aspide percussis utilissime imponitur. Recens obsonijs ad- ditum, olei uicem pensat. & adipis uice fungitur in bellarijs. Colligendæ ex eo Fuliginis ratio hæc est. Butyrum in lucernam nouam ingestum ac- cenditur, fictiliq; operculato, quod superne in siphunculū desinat, & sub pedibus cuniculos clybani modo habeat, crematur. & subinde aliud in absumpti locum sufficitur, dum coaceruetur Fuliginis modus, quem fa- cere institueris. Penna post deraditur ad usus. Eius effectus est in medi- camentis oculorum, exiccare & adstringere. Fluxiones cohibet. Et ulce- ra celeriter ad cicatricem perducit.

BARBARI COROLL.

Butyrum spuma Lactis est, cōcretiusq; q̄ quod Serum uocatur. Hic & Butyrus dicitur, & Butyrum, & ab Hippoc. Picerion. Laudatissimus Barbaris cibus, & q̄ diuites a plæbe distin- guat. Butyrum a boue nominatur, q̄a e bubulo lacte fiat: ut miretur Dioscoridem Galenus, q̄ ex caprino, & ouillo cōfici lacte dixerit. Ex caprino tamē fieri solere, testis est Plinius. Quod quidem cū sit, hyeme calefacto eo, æstate uero dumtaxat expresse utuntur, crebro lactatu, in longis uasis, angusto foramine, additur paulum aquæ, uti acefeat. Quod est maxime coactū, in summo fuit. Id exemptum addito Sale, Oxygala, hoc est, acre Lac appellant. Reliqua deco- quunt in ollis. Ibi quod supernat, Butyrum est. Quod magis uirus respuit, hoc præstantius. Oxygala fit & alio modo, lacte acido in recens addito. Casei genus a Galeno Oxygalactinon uocari Asiæ, Pergameno præsertim agro dicitur.

Pli. li. 25, ca. 9.

EX. M. VERG. COMM.

Ex lacte Butyrū fit, spuma eius dū coquit cōcretior q̄ Serū: & qm plurimū e bubulo fit, a boue nomē inuenit. Alioqn ex omni lacte fieri posse, & hic, & Plinius testati sunt: qd antiquores aliqui negauerunt, nomen magis, q̄ rei naturam contemplati. Oleosum natura Butyrum esse, Diosc. ait, & p̄ter hoc nōn μαλκτικὴ δυνάμεις, quod fere in omnibus græcis legitur, quod molli- endo aptum significat, sed ut in uetustioribus, & ut res ipsa exigit, γαλακτικὴ, i. lactuosæ natu- ræ. Barbarus ex priore illa lectione, molliens id uertit. Nos ex posteriore, oleosum natura Bu- tyrum esse, & lactis naturam sequi diximus: non tam ueterum codicum fide & auctoritate per- suasi, q̄ passui eius uerbi ἰχταί significatione admoniti, quæ apte id indicabat.

B

De medicina Lanarum. CAP. LXXVII.

Succidē Lanæ molles, e collo, feminibusq; laudatissime habent. Sub- ueniūt inē initia uulnerib. percussis, desquamatis, liuidis, ossib. fractis, aceto, oleo aut uino imbutę. Siquidem capaces sunt liquidorum, quibus oblesæ partes fouentur. Et ob pecudum sordem, sic enī Oesypum uo- cant, emolliunt. Capitis, stomachi, aliarumq; partium doloribus, cū ace- to & rosaceo efficaciter imponuntur.

ἱρία οἶσός πικρά
τὰ ἀπαλά

De Lanis ustis. CAP. LXXXIII.

Crematarū Lanarū cinis crustas obducit. Excrescentias in carne cohibet. Et ulcera ad cicatricem perducit. Mundæ autem, & car- pte in fictili crudo cæterorum more uruntur. Nec secus purpurarum to- menta cremari solent. Aliqui cum sordibus Lanæ carpūt, & melle irri- gant, eodemq; modo urunt. Alij in fictili oris patuli, uerucula inter se di-

κεκρυμμένα ἱρία

Cstantia componunt, & conceptas lanas oleo ita suffulas, ut ne stillare quidem possint, assulis tædæ subiectis, & eisdem lanisq; permutatim interstratis, leuiter succendunt, & uistas tollunt. Quod si e tædæ pix, pinguitudine ulla profluxit, collecta reconditur. Lauatur ad oculorum medicamenta. Cinerem in labellis aqua addita manibus confricant, & considerare patiuntur. Idq; sapius, mutantes aquam donec linguam adstringat, nec mordeat.

Pli. li. 8. ca. 48.
Lib. 29. cap. 2.

Supplicium ad
ulteriorum a-
pud Cretenses
olim.

B A R B A R I C O R O L.
LAnam, Græci Erion uocant. Ad medicinam laudatissima est Gaiatica, Tarentina, Attica, Milefia, Lanæ quibusdam locis non tondentur, sed euelluntur. Ob id cum dempta est, atq; cōglobata, quidam Vellera, alij Velumia appellant. Mirum quod tradunt, mederi Lanæ pecori, cibos fastidienti, si cauda q̄ræcissime præligata, indidem uellantur: statim enim uesci pecus incipere, & quod extra nodum sit, præmori. Lanam succidam Græci Rhyparam, Ionia Siny-pen, alij Oesypiram, hoc est, fordidam, & cum Oesypo suo, de quo paulopost dicturi sumus, nominant. Galenus auctor. Succidam, a sudore dictam Varro existimat: quia oues cum inceperint sudare, tondeantur. Nam Succidia, non a sudore, sed a sue nominatur, cuius caro est. Lanarum sunt & a coloribus, quos bibunt, discrimina. Cymatiles a fluctibus, Geranochroes a gruibus. Iam ab Amethylo, ab serenitate, a Croco, a Rosa, a Myrto, a Glandibus, ab Amygdalis. A Cera, a Coruo Coraxicæ, a Purpura Colossinæ. Et hæc partim ex Plauto, partim ex Ouidio in Artibus, & Strabone. Adulteros, ut Aelianus tradit, in Gortyna Cretæ deprehenso, Lana coronabant, mollicia probro: atque ita per ciuitatem, ad Magistratus traducere moris erat.

E X M. V E R G. C O M M.
Quales fuerint ueteribus, & unde nomen inuenerint succidæ Lanæ, satis docuit Varro rerum rusticarum secundi uoluminis ultimo capite, cuius uerba hæc sunt. Tonsuræ tempus inter æquinoctium uernum & solstitium, cum sudare inceperint oues, a quo sudore recens Lana tonsa, succida est appellata. Hic præter tonsuræ tempus, quod succidarum appellatione signatum ab eo est, ex qua etiā pecoris parte tondendæ essent, ad medicinam docuit: ex collo scilicet, & femoribus, unde molliores, & copiosiore sudore sordidiores tondent: quorum alterum molli, alterum adspergines felicius cōbibit. Dicimus autem adspergines quæ Græci *ὑσπερματά*, & *ὑσπερμα* in sua medicina passim dicunt, quæcūq; humida & liquida corpori inspergunt: quæ quoniam cito dilabunt, linteolis, stuppis, alijsq; huiusmodi inspersa imponunt: & in hunc usum aptissimas esse pecoris lanas Diosco. ait Nec aliud in Satyra Aquinas poeta indicauit dicens. Vinū, q̄d succida nollet Lana pati. Eo em, alijsq; humoribus ad medicinam quotidie inspergunt.

οἰσυπμορ

De Oesypo, pecudum forde. C A P. LXXXIII.
Oesypum uocant græci, succidarum lanarum pinguitudinem. Cuius parandi ratio hæc est. Succidæ molles radícula curatæ, calida aqua lauantur, & quibuscūq; sordibus expressis, & in labellum oris amplius coniectis, aqua infunditur, magnoq; impetu cocleari uti respumet agitur, aut lignea rude ualidiuscule cōturbatur, quo largius sordida spuma colligi possit. Deinde marina respergitur. Et confidente pingui quod super natabat, collectoq; in fictili uase, denuo aqua in labellum fusa agitur. Spuma mari perfunditur, & demum eximitur. Hoc tantisper fieri solet, dum consumpta pinguitudine nihil prorsus spumæ extet. Collectum Oesypum manibus emollitur, & si qua insuper spurcitia, cōfestim demitur. Exclusaq; sensim omni aqua, recentique affusa, manibus misceatur, donec admotum linguæ Oesypum, adstringat leuiter, nec mordeat, atque pingue candidūq; spectet. Tū in fictili uase condit. Verū omnia feruido sole fiant. Nonnulli excolatum pingue frigida aqua eluunt, & manibus

non secus atq; cæratum fœminæ, confricant: Ita enim candidius reddi-
tur. Alij clotis lanis, & sordibus quibuscunq; exemptis, ac lento igni in
æneo uase ex aqua decoctis, pingue quod supernatat collectum, aqua ut
diximus lauant, colatumq; in fictilem ollam, quæ calidam aquam con-
tineat, linteo operiunt, atq; soli mandant, donec candidum fiat, & satis
crassum. Alij bidui spacio aquam effundunt, nouamq; adijciunt. Melius
est læue, radícula non curatum, quod succidarum uirus oleat. Et si manu
in concha fricetur cum aqua frigida albescat, nihil in se duri, aut concreti
habens. Veluti quod cærato, aut adipe adulteratur. Oesypum excalfac-
cit, explet ulcera, & emollit, præsertim sedis ac uulvæ, cū meliloto & bu-
tyro. In uellere appositum, menses & partus euocat. Vlcerà non aurium
modo sanat, sed & genitalium cum anserino adipe. Contra erosos angu-
los oculorum, scabiososq; genas quæ occalluerunt, & ciliorum deflu-
uia efficax est. In testa noua torretur, donec redactum in cinerem pingui-
tudinem amittat. Ex eo etiam fuligo colligit, uti demonstrauius. Quæ
in oculorum medicamenta commode addi solet.

BARBARI COROLL.

Oesypum, & Oesypus, utroq; modo effertur, ab eo quod Oes, hoc est, ouis. Græci mascu-
lino fere utuntur, Latini frequentius neutro. Laudatissimum a sudore alarum & feminum, si-
cut in Atticis ouibus genitum; quod & notauerit Ouidius,

Pli. li. 29, ca. 29

Oesypa quid redolent, quibus mittantur Athenis.

Hippocrates, Caprinæ clunibus sordem uocauit Oespen, ouillam Oesypiden: quo quidē no-
mine, Lanam quoq; succidam significat quibusdam. Quidā hoc a Galeno Hysopū dici putāt:
errore uulgi, & quidem a Græcis orto, qui non Oesypum quādoq; sed Hysopum scribant: ut
siue prudentes, siue imprudentes, non Oesypum simpliciter, Hysophon Hygron, & Hysopum
pharmacum sæpissime cognominent: quasi ab Hysopo herba distinguere uoluerint, ut Paulus
in compositione, quam a Ruta *πυραυρα* appellant, utilem pleureticis.

B

De Coagulo.

CAP. LXXXV.

LEporis Coagulum tribus obolis ex uino, uenenatorum morbi-
bus, coeliacis, dysentericis, & fœminis fluctione uulvæ laboran-
tibus, ac reiectionibus a pectore, auxiliatur. Sanguinem concretum di-
scutit. Post menstruas purgationes appositum uulvæ cum butyro, præ-
stat mulieribus ut concipiant. Potū uero partus enecat. Et post excretio-
nes, pariendi spem adimit. Equi Coagulum, quam Hippacen aliqui uo-
cant, priuatim coeliacis, dysentericisq; conuenit. Hædi, agni, hinnuli, ca-
præ, apri, cerui, uituli, bubalicq; Coagula similes naturas fortiuntur. Con-
tra aconiti potū in uino, & concretū lac in aceto, cōuenienter assumuntur.
Hinnuli Coagulum triduo aggregationibus admotum, partus spem in-
tercipit. Vituli, marini Coagulum castorei uires representat. Comitia-
libus, strangulatis uuluis potu conferre existimatur. Sed syncæri hoc
experimentū est. Aqua inspergitur, qua paulisper cum alterius animan-
tis, tū præcipue agni Coagulū, maduerit. Quod si uerū est, statim lique-
r. iij

πυραυρα

D I O S C O R I D I S

C scit in aquam. Sin minus, consimile permanet. Excipitur autem catur-
lis qui nondum natum possunt. In summa, Coagulum omne dissipata
cogit, & coacta dissoluit.

B A R B A R I C O R O L L.
Coagulū Pictya, & Pitya græce dicit, & Tamisos poetis. Plinius ex hædo laudat. Aristote-
les ex Inulo. Præcipuū tamen Dasypodis: quod & profluuiū alui medeat, unius utriusq; denta-
torū. A Pitya Pitynā uulgo dici, concretū igni serum, & quod in cascum coire non potuit existi-
mo. Est & apud Græcos id quod appellant auctores noui, Melcen, imbuto uase aceto, atq; ita
excalfacto, mox lacte infuso, ac nocte tota quiescere citra ignem permisso. Quæq; & alij plariq;
modi sunt. Sed hic & compendarius, & facilis. Sunt quibus Melce uideat esse, quod Oxygala
uocauimus, Tameñ butyrū quoq; rustici non aliter fere appellant, q̃ Melcen.

E X M. V E R G. C O M M.
Nota oibus res Coagulū est. Et nihilominus qui in græcis literis se tantū profecisse iactant,
ut singulis diebus aliqd cōponere se posse dicant, & depromere, quicq; sacrarū literarū antiq̃s in
terptes nouis æditionibus castigare ausi sunt, in Plutarchi cōmentariolo, cuius titulus est, quo
modo quis ab inimicis utilitatē inueniat, pro coagulo lac uerterit: non intelligētes, quantū ab
altero alterū differat, & qd in ea re scriptori illi propositū & consiliū fuerit. Licetq; auctore Ari-
storele lib. 3. de historia animalū, Coagulum lactis substantia sit, non tamē illi idem est: & utre
ipsa differunt, lac, & Coagulū, sic etiā diuersis a græcis & latinis appellationibus indicant. Mul-
ta de animalū Coagulis in utraq; gente uetustissimi scriptores docuerūt. Sed in græcis omniū
copiosissimā historiam eodem libro & loco Aristoteles, & inter latinos Plinius.

De Adipis ratione. CAP. LXXXVI.
ADEPS ANSERINVS, aut gallinaceus, recens, & sine sale
reconditus, ad uulua uitia proficit. Sale inueteratus, & qui tem-
poris spacio acrimoniam concēpit, uulua inimicus est. Recens ex-
emptis membranis in fictilem ollam demissus, quæ altero tantopere ca-
pacior sit, quantus sit modus Adipis quem curare institueris, obstru-
cto diligenter uase, flagrantissimo soli exponitur. Eliquescens inde hu-
mor in fictile alterum excolatur, donec Adeps omnis absumatur: mox
loco uehementer frigido reconditur, & ad usum digeritur. Alij fictile ful-
ciunt super aquam calidam, aut tenuem & elanguidam prunam, quæ
solis uicem penset. Est & alia curandi ratio. Exemptis membranis teri-
tur, coniectusq; in ollam eliquatur, adiectio minuti salis momento. Mox
lineo colo transfusus reponitur. Vtiliter in medicamenta additur, quæ
lassitudines & fatigationes leuant. Suillus adeps, & Vrsinus hoc curan-
tur modo. Recens, præpinguis, renibus potissimum detractus, in lar-
giore aqua coelesti & q̃ frigidissima, exemptis tunicis, diligentissime ma-
nibus confricatur, & exprimendo ferme siccatur, subindeq; noua aqua
abluitur: Cæterum fictili capacitatis duplæ inditus, in aquam demergi-
tur. Et subditis leuibus prunis, spatha mouetur. Eliquatusq; colo trans-
funditur in aquam. Vbi uero refrixit, & guttatim aquam omnem ex-
clufit, in prælotum fictile demittitur. Et infusa aqua leniter eliquari de-
bet, & manu deprimi, quo facilius fæculentum uirus pessum eat. Postea
in pilam spongia madefactam transfunditur. Vbi coire cœpit, residens
in imo sordes eximitur. Tertio citra aquam eliquatur, repurgatusq; ficti-

li bene operculato, perq̃ frigidis locis reponitur. Hircinū seuum, ouillū, **A**
 ceruinūq; ita curato. Elotum ex his quodcūq; tunicis ut in suilli mentio-
 ne dictū est exemptis, pilæ emolliendū tradito, ac manibus fricato, affusa
 paulatim aqua, donec ne amplius quidem cruentū uirus excernatur, aut
 pingue aliquod innatet, sed nitida spectetur. Deinde in ollam conijcito,
 & adiecta aqua ut superemineat, leui pruna liquefacito, atq; in aquam
 colato. Cumq; refrixerit, iterum in loto fictili eliquato. Et quæ ante dixi-
 mus facito. Tertio sine aqua liquefactum, in perfusam liquore pilam co-
 lato. Refrigeratūq; ut in suilli ratione diximus, recondito. Bubulum au-
 tem seuum, renibus maxime detractum, exemptis membranīs, aqua ma-
 rina ex alto petita eluendū est. Mox in pila tundendū diligenter, affusa
 maris aqua. Cum uero dissolutum fuerit, in fictilem ollam conijciendū,
 & marina aqua, quæ non minus dodrante superemineat, proluendū. De-
 coquendum, donec omnis aboleatur odor, additis ad singulas seui attiz-
 cas minas, quaternis tyrrhenicæ cæræ drachmis. Excolatumq; detractis
 quæ pessum ierant sordibus, in nouo fictili reponendum, opertūq; so-
 li interdiu credendum, ut ad candorem reducatur, & uirus euanescat.
 Priuatim taurorū pingua sic curari debent. Renibus euulsum pingue,
 profluente amnis aqua abluito, detractisq; tunicis fictili nouo postq; exi-
 guū salem insperferis, liquefacito. Dein in nitentem aquam excolato: &
B ubi concrefcere cœpit, manibus iterum cōfricando uehementer laua-
 to, aqua sæpius infusa, refusaq; donec q̃optime elotum uideatur. Rur-
 sus in olla cum pari modo uini odorati decoquito. Et cum iterū efferbue-
 rit, dempto ab igni uase, ibidem finito pernoctare. Postridie si grauius
 adhuc oleat, noua olla repetitū, uino odorato perfundatur. Eadem quæ
 prius fiant, dum omne uirus euanescat. Colliquatur, & sine sale, præser-
 tim affectionum earum causa, quibus sal aduersari solet. Sed ita para-
 tum, non magnopere albescit. Eodem modo pardorum, ac leonum
 pingua curari oportet. Taurorum autem & uitulorum pingua, ne non
 ceruorum medullæ, odoramentis imbuuntur hac ratione. Pingue quod
 odoratum reddi debet, demptis quo diximus modo membranīs, elo-
 tum, & uino q̃odoratissimo nulla maris aqua diluto feruefactum, per-
 noctare finitur. Alterum id genus uinum eadem mensura infunditur,
 colliquatur, & exquisite colatur. Nouemq; eius heminis, iunci Arabi-
 ci septem drachmæ adijciuntur. Quod si ipsum odoris fragrantioris fue-
 ri uoles, quadraginta floris eiusdem drachmæ, cum paribus palmæ, ca-
 lami, & casia modis adduntur. Et xylobalsami, aspalathi singulæ drach-
 mæ, cinnamomi, cardamomi, & nardi singulæ uncia. Omnia exactius
 tunduntur, & affuso uino odorato, in uase operto quod supra carbones
 firmiter collocatum sit, ter effervescent, & semoto ab igni uase inibi per-
 noctant. Postridie uinum effunditur. Aliudq; generis eiusdem adijcitur.

D I O S C O R I D I S

C Ter simili modo conferueſcat. Matutinis uinum effundatur. Et abluto uafe, ſi quid imo ſubſidens hæſit, detergatur. Poſtremo eliquatum pingue, & excolatum, ad uſus reconditur. Hoc autem modo odoramētis imbuitor, quod antea curatum eſt. Verum ante dicta prius inſpiffari ſolent, quo facilius ſibi odoramentorum uires adſciſcant. Itaq; aſſumens quod uoles cum uino feruefacito, impoſitis una myrti ramulis, ſerpylo, cypetro, item aſpalatho plenius tuſo. Aliqui tamen pro uſu, uno dumtaxat horum contenti ſunt. Cum autem ter efferbuit, exemptum leniter & linteocolatum, aromatis uti expoſitum eſt imbuitor. Adipibus ſpiffamenta ſic fiunt. Synærus, & ſanguinis expers adeps, reliqua habens quæ ſæpere tulinius, in ollam nouam demittitur, inſuſo uino albo, uetere, odorato, quod ſemipedis altitudinem ſuperet: lento igni ferueſcat, dum uerna- culus odor aboleatur, planeq; uinum redoleat. At ubi depoſito uafe re- frixit, duæ adipis minæ in ollam mittuntur, & duo uini eiufdem ſextarij, & ſeminis loti, eius inquam cuius e ligno ludicræ tibiarum faciuntur, tuſi minæ quatuor adijciuntur. Lento igni ſubinde miſcendo decoquuntur. Cumq; odoris uirus euauerit, excolatusq; adeps refrigerit, una contuſi aſpalathi mina, cum amaracini floris minis quatuor, & uetere uino ſub- igitur. Nocte una hæc odorem rapiunt, combibuntue. Poſtridie in ficti- bus uini, una ferueſcunt, quouſq; & uim & odorem ſpiffamentorum adeps ipſe cootraxerit: qui eliqueſcens colatur, & reponitur. Quod ſi maiorem odoris fragrantiam efflagites, drachmas octo q̄ pinguiſſimæ myrrhæ uino macerata, quod multos in annos aſſeruatum eſt, miſceto. Gallinaceus, an- ſerinusq; ſic odoribus imbui ſolent. Cuiusuis eorum percurati ſextarij duo fictili olla excipiuntur, eryſceptri, xylobaſſami, palmæ elatæ, & calami pia- ne contuſi ſingulorum ſeſcuncia admisceatur. Vini leſbij ueteris cyathus unus adijcitur. Ea ter efferueſcunt prunis. Mox uafe ſublato ab igne, die noctuq; refrigerantur. Poſtridie liquata per linteum mundum in uas ex- colatur. Vbi uero adeps coierit, concha excipitur, fictiliq; nouo denſius operto, perfrigidis locis reponitur. Hyberno tempore id inſtituere oportet. Aeſtate ſiquidem pingua non coguntur. Nec deſunt qui tyrrhenicæ ceræ momentū adijciāt, quo facilius in unum corpus omnia coaleſcant. Eadem ratione ſuillus adeps, & urſinus, cæteriſq; id genus, odoramentis imbuuntur. Verum Sanſuci odorem adeps ipſe repreſentabit hoc modo. Curati q̄ optimi adipis, præſertim taurini mina una, tempeſtuiuq; ſanſu- ci exquiſite confracti ſeſquimina miſcentur, & inſparſo largiore uino di- geruntur in offas, quæ in uafe cooperto nocte quieſcunt. Matutinis in ficti- li olla leuiuſculo igni, aſuſa aqua coquuntur. Dumq; ſuū adeps odorem exuerit, defæcatus, ac bene opertus, nocte tota permanet. Poſtero die de- terſa ſorde quæ peſſum ierat, ſanſuci, ut dictū eſt, contuſi iterum ſeſquimi-

na priori pastillo adijcitur. Eodemq; modo in offas cogitur. Alijs quæ **A**
diximus peractis, decoquitur, & colatur. Quod si qua fundo hæsit spur-
citia, deraditur, & frigido loco reconditur. Si quis tamen incuratum ad-
ipem anserinum, gallinacium, aut uitulinum, a putredine tueri uelit, ita
faciendum est. Quamuis Adipem diligenter elotam, & siccatam in um-
bra, super cribrum per lintea munda manibus uehementer exprimat, li-
noq; confutā umbroso in loco suspendat. Et post multos dies noua char-
ta inuolutam, frigido loco recondat. Pinguia autē, indito melle, uindican-
tur a putredinis uitio. Vis omnium est exalfacere, mollire, odorem ciere.
Taurinus adeps, bubulus, & uitulinus aliquantum adstringunt. Earun-
dem uirium compos leoninus. Nam resistere eum aiunt ijs qui insidias mo-
liuntur. Ceruino, elephantinoq; perunctos, serpentes fugiunt. Adstrin-
gentior est caprinus. Qua ex causa decoctus cum polenta, rhoe & caseo,
dysentericis datur, & cum pisanæ succo infunditur. Ius decocti phthisicis
in sorbitionibus prodest. Datur quoq; utiliter his qui cantharidum uene-
na hauserunt. Hircinus, ut qui ualidissime discutiat, podagricis auxiliatur
cum fimo capræ & croco impositus. Huic proportionē respondet ouil-
lus. Suillus uero contra uulnæ & sedis uitia idoneus est. Ambustis igni
medetur. E sue uetustissimus quisq; sale conditus exalfacit, & emollit.
Elotus uino pleuriticis prodest. Cinere, aut calce exceptus, inflammatio-
nibus, fistulis, ac tumoribus succurrit. Asininum tradunt, cicatrices cor- **B**
pori concolores reddere. Anserinus, gallinaceusq; conueniunt muliebri-
bus malis, & ad labiorum rimas, ad mangonizandam faciem, & contra
aurium dolores. Vrsinum constat raptos uitio alopecie capillos restitue-
re. Pernionibus subuenire. Vulpinus medetur aurium doloribus. Fluuiar-
tilium piscium pinguia perunctis oculis claritatem afferunt, si in sole lique-
scant, & melli ammiscantur. Viperæ adeps contra oculorum hebetudi-
nes, suffusionesq; efficax est, addita cedria, melle attico, & pari oleo uete-
re. Pilos alis euulsos, perunctis radicibus obliterat.

BARBARI COROLL.

Adipem, atq; Seuum, item pingue, medici fere confundunt, cum ueteres, tum noui. Sed diffe-
runt: quia ruminantia Seuum habent, Adipem cætera. Vel ut Aristoteles tradit, cornigera, non
utrinq; dentata, & quorum in pedibus tali sunt. Pinguescunt Seuo bifulca, scissisq; in digitos
in pedibus adipe. Adeps atq; Seuum semper in fine carnis sunt, pingue uero inter carnem, cu-
temq; succo liquidum. Adeps atq; Seuum concreta sunt, ac gelascunt, fragiliaq; si refrixerint,
pingue non gelatur. Atq; hoc Plinius intellexisse mihi uidetur cum dicit, Adeps concretus est,
& cum refrigit fragilis appellatio Adipis, etiam Seuum complexus. Lupino Adipi apud uete-
res palma fuit: adeo, ut nouæ nuptæ intrantes, solene haberent postes eo inungere: ne quid ma-
li medicamenti inferretur. Seuum Græci Stear uocant. Nam Staes massa est farinæ, quæ & Con-
spersionem, & Baltheum, atq; Tractā dicimus, Adipem uero & pingue Pimelē appellat. Item
Pion, atq; Lipos: a quo genus carnis Alipastori uocatur, hoc est, sine pingui, quæ Strabo co-
micus, seruitijs apponit. Dicitur & Grassos Adeps ipse a Græcis, & Grasson, sed ouilis maxie
cum sordibus, & sudore illuies. Dicitur & Demos a poetis ipsum pingue, ut nihil præterisse
uidear. Archigenes sudorem sordesq; corporis, Grassoniā uocauit. Pollux Grasson, & Cinati-
ram. Quædam non pinguescunt, ut lepus, atq; perdix. Steriliora pinguia in utroq; sexu, cele-

Plin., 29, c. 9.

D I O S C O R I D I S

Crius senescunt omnibus animalibus. Est quoddam & in oculis pingue. Adeps sine sensu est ois, nec arterias habens, nec uenas. Pingue animalium, plerisque sine sensu. Quia ob causam sues spirantes, a muribus erosae perhibentur. Adipes homini detrahunt, & uiuit, leuatus onere. Habent & arbores suos Adipes, quos Alburna Plinius appellat: quos amputare, & adimere, Exalburnare dicimus. A colore nomen sumptum: cum ligni pars est deterrima, & teredinem breui sentiens. Vnde robur exalburnatum, quod a Theophrasto Melandryon est dictum: quia sit ei color nigricans. A cuius similitudine falsametri genus quoddam Melandryon fortasse uidetur appellatum. Quid autem sit Aruina, Suetonius in eo libro, qui de uitis corporalibus inscribitur, explicuit, durum esse dicens pingue, quod est inter cutem atque uiscus. Non solum autem pinguitudo, sed etiam pinguedo latine dicitur: quicquid Seruio grammatico uisum fuerit, qui alioqui mihi parum uidetur Plinium multis partibus legisse.

ADEPS SVILLVS, ET AGNINVS.
Adeps Suillus Vnguen, ut inquit Palladius, & Axungia latine dicitur: & Graeci quoque usurpant. Sed Oxyngon fere appellant, tracta origine ab axibus curruum perungendis. Quamquam est, ubi Plinius aceti fecem, Oxyngion interpretatus esse uideatur. Et nos fortasse quibusdam locis, auctoritatem summi uiri nostro iudicio praetulimus. Alioquin Paulus Aegineta Oxyngion pro Axungia clarissime uidetur intellexisse, in emplastro cui Phoenicite nomen est. Laudatissima ex apris: Tanta porro uis, ut genibus etiam adalligata, redeat ad os sapor, eamque expuere uideantur. Neque occulta ratio, quoniam hoc animal radicibus herbarum uescatur, ideoque innumeri e fimo quoque usus. Axungiae nomen ad alia quoque pinguia transferri: sed raro comperi. Laridum uero salita est animalis eius caro, quasi large aridum, ut Macrobio placet. Sunt qui Suillum pingue, Laridum uocatum putent.

Pli. li. 23. ca. 9.
 Aristo. de natura animalium lib. 3. cap. 17.

Gellius lib. 11. cap. 1.

* D

ADEPS BVBVLVS.
Bouem Graeci Boa, & Bun uocant, itemque Taurum, & quandoque Italon, unde dicta sit Italia. Nam steriles uaccas nostri Taurus uocabant: sicut praegnantem Hordas, atque Sordas. Vnde Hordicalia Romae festa, quo die Hordae boues imolabantur. Ephesij pincernas ipsos appellare Tauros solebant. Nam Portis, & Portax pro iuuenta dicitur a Graecis. Item Damale, siue Damalis, ut Dores solent *δάμαλη*, quam nos Iunicem uocamus. Damales uero ipsum iuuentum significat: quem in Alexandri Caesaris uita Lampridius Damalionem uocauit, uterque sexus in Moscho continetur. Photion Damalin uocari omne animal existimat in iuuenta.

Sapientiae .4.

ADIPES ODORATI, E VITVLO, TAVRO, CERVO, ITEM MEDVLLA CERVI.

Vitulū Graeci Moschon, unde Moscheuma in Agriculturae usu dictum existimant. Qui Virgilam in literis sacris interpretati sunt: cum latine dici posset, Viuiradix. Moschos & pediculū significat, quo frondes & fructus ramis annexi pendunt: qui & Peciolus, & a Palladio Tenax uocatur. Viuiradix & Auulsio partium distant, sicut Moscheuma, & Paraspades apud Graecos. Dicitur & Moschos, siue quod idem est Oschos Pampinus, & Capreolus, & Clauicula, quae Graeci Helicas, & Ligna, & Clemata, & Amphidas quoque appellant, ut Galenus inquit.

Plin. 10. ca. 22.

ADIPES GALLINAE, ANSERVM ET ANSERVM.

Anseres, & Ocae siue Aucae, a Graecis Chenes appellantur. Vnde Chenoboscion, locus ubi alunt. Nam chenizin uerbum, ad mulicos pertinet, quasi tibiarum sonum praesentans. Herba in Varone pabulo Anserum feri solitam, non herin, ut habent exemplaria, sed Serin scribendum monemus, auctore Columella. Ferunt eam, cum est aqua tacta, etiam cum est arida, quasi renouellari, uiridemque fieri. Laudant Anseres sicuti, hoc est, altilis ueteribus, & ex his iocinora.

ADIPVM MEDICINAE.

Caprinum Adipem astrictiorem esse quam Suillum, Galenus falso creditum a Dioscoride commouit: nisi quis astrictiorem, pro eo quod est acriorem, accipiendum putet: quandoquidem homo inquit, alias peritus, sed barbarus, proprietatem graecae linguae minus tenuerit.

περί μυελών

De Medullarum ratione. CAP. LXXVIII.
Laudatissima est ceruina. Mox uitulina. Post hanc taurina. Deinde caprina, & ouilla. Colliguntur aestatis exitu, cum appetit autumnus. Quippe cum alijs anni temporibus concrementum sanguinis, & ueluti caro friabilis, in ossibus inueniatur. Nec facile cognosci potest, nisi quis eam

ossibus extrahat, & recondat. Omnes Medullæ molliunt, sedant, rarefaciunt. Ulcera explent. Ceruina perunctos uenenata fugiunt. Curantur recentes aquæ resparfu mollitæ, selectisq; ossibus clotæ, donec aqua synceæ ra emanet, & deterfa forde pinna, si qua innatet, liquatæ per duplicatū lin teum in pilam exprimuntur. Et ubi coiere, omni facie quæ ad ima fidit de rasa, fictili nouo reponuntur. Quod si libet incuratas reponere, facito omnia quæ de anserum & gallinarum adipe demonstraui mus.

BARBARI COROLL.

Medullam, quam Græci Myelon uocant, uitulī, Galenus post ceruinam præfert omnibus: eamq; priuatim a medicis appellari Moschion scripsit. Medulla proprie, inquit, Galenus est, quæ ossibus includitur. Improprie uero etiam e spina dorsi. Notæos, hoc est, dorsago, ut ita dicam, nominata, quæ sit reliqua medulla durior ac siccior. Nam ea quæ spondylis, hoc est, articulis uertebriſq; continetur, spondylionis habet nomen, ut inquit Pollux.

Pli. li. 28. ca. 9.
Gale. lib. 3. de
aliment. & ad
Paternianū. 22

EX M. VERG. COMM.

Adiecerunt posteriores Medullarum disciplinæ ex animalium partibus discrimina aliqua. Tradideruntq; pinguiore, & ad molliendum maiore ui & potestate Medullas esse, quæ ex animalium anteriorū, posteriorumq; crurū ossibus erunt fuissent: squalidiores uero & duriores, quæ ex spina, & dorso: præcipuamq; habere uim contra corporis duricies, quæ græci sciromata uocant, de quibus alibi certius & ex pfecto diceſ. Nunc qd nouisse legētes inutile penitus nō erit, monebimus, qd Barbarus dupodiariū uas appellauit, maluisse nos in re non satis certa, græcorum uoce uti. Credidit em ille ut uidet *διπλωμα* a græcis ideo dictū id uas fuisse, qd duplicē caperet mensurā aliquā, & ex nominis ratione rem auguratus est: cum tū nullam habeat Medullarum curatio mensuræ in uasculo necessitatem. Et Paulus Aegineta libro primo, quo capite de ouis & eorum diuersis cocturis agit, nihil aliud *διπλωμα* esse ostendit, q̄ fictile, aut æneum uas, in quo ad ignem densarentur oua, quæ ille *πικτά*, quod est, præfocata appellat: facilis intellectus res, ignota tamen nostra ætate uasis forma, & nominis ratio.

B

De Felle. CAP. LXXXVIII.

Fel omne curatur hoc modo. Recēs præligato ore folliculi lino, de missum in feruentem aquam, spacio quo quis stadia tria percurſaret: mox exemptum siccatur umbroso loco, asperginem non redolente. Sed quod ad oculorum medicamentā adijci solet, ligatum lino in uitreum uas, quod mel habeat, immittitur, circūuoluto ad os uasis lini principio, & operto uasē reconditur. Est enim uis omnium acris, & excalfaciens. Intensis tamen, & remissis uiribus differunt. Siquidem præstantius in effectu esse uidetur fel marini scorpionis, & piscis qui Callionius appellatur, marinæ testudinis, hyenæq; Item perdicis, aquilæ, gallinæ candidæ, & syluestris capræ. Quod priuatim prodest contra suffusiones incipientes, & oculorum caligines, albuginesq; & genarū scabricias. Ouillo, suillo, hircino, atq; ursino, taurinum multo efficacius. Felle omni perfacilem, præsertim infantibus, deiectionem quis molietur, si intinctum eo tomentum sedi subiiciat. Priuatim taurino angina cum melle perungunt. Sedis ulcera sanat, & ad cicatricem usq; perducit. Idem auribus fractis, & purulentis, cum muliebri lacte, aut caprino instillatum, medetur. Et sibilo earundem ex porri succo. Admisceri insueuit uulnerarijs emplastris, & circumlinationibus quæ contra uenenata parantur. Phagedænicis ulceribus, co

Clis, & scroti doloribus ex melle prodest. Lepras, furfures cū nitro, & terra cimolia q̄ optime purgat. Ouillum et ursinum contra eadem pollut. Verum inefficacius hæc præstant. Ursinum eclegmate comitiales adiuuat. Fel testudinum anginis, & in ore infantium nomis prodest. Naribus inditum comitiales erigit. Syluestrium caprarum Felle peculiariter peruncti, lusciosi sanantur. Hircinum idem obit munus. Thymia abolet. Et luxuriantes elephantorum extuberationes illitu reprimunt. Suillum autē contra aurium ulcera, reliquaq; omnia, magno usu assumitur.

Pli. li. ii. ca. 37.

B A R B A R I C O R O L L

Fel, siue Bilis, Chole a Græcis dicitur. Minorum animalium subtilius. Equinum tantum damnatur, inter uenena. Ideo flammis sacrorum, equum tangere non licebat Romæ: cū tamen publicis quoq; sacris inolaretur equus. Taurino Felle aureus color ducitur, aramentis atque pellibus, qualia Græci cholobaphina cognominant. Bilis duplex, Atra, & Flaua: Sed cū simpliciter pronuntiatur, Flaua inquit Galenus, intelligitur. Flauæ duo fere genera. Luteæ, quam Græci Ochran uocant; & Ruffæ, siue fuluæ, quam Xanthen dicunt, uehementiorem & calidiorē priore. Sūt & alia cholorum discrimina. Virentis, quam Ioden; ceruleæ, quam Cyaneam; & subnigræ, quam Phæon, Isatidis modo fuscæ. Callionymum piscem, cuius mentionem habet hoc loco Dioscorides. Sunt qui Callichthyn, & Anthiam quoq; appellent. Itē Hellopa, hoc est, Accipenser, & Castum, Sacrumq; piscem. Aliqui etiam Lycon. Sed differre in eos inter se, cum ex Aristotele, tum ex alijs autoribus, aperte constat. Sacer certe piscis est proprie, quem Pompilon uocamus. Dixi Hellopa eundem qui Accipenser dicatur. Ceterum Archestratus, eum qui uocetur inquit a Romanis Accipenser, Galeon a Græcis appellari existimauit, perspicuo errore, ut aliubi monstrabitur. Fit & de Perdice sermo hac parte. In quo sciendum, Perdices, & Cacabidas, & Cacabos etiam uocari, a sono quem edunt canentes. Theophrastus autor est, non omnes eum sonum reddere, sed Ditybizin aliquas. Perdicum porro multa genera: sed præstantissimum, cui rostrum purpureum. Nam Italica, inquit Athenæus, præparuæ sunt, nec rostrum rubens habent. Idem autor Phasianum, siue Phasianicum, aliquando Tatyryn, aliquando Terarton, & Tettaron uocatū scribit. His adiecit Attagas, non attagenas dicendo, etiam si Varro, & Gellius ita nominent. Atagenus certe piscis e numero est.

D

De Sanguine. C A P. LXXXIX.

Sanguis anseris, agni, & hædi, utilissime in antidota miscetur. Palum ubi autē, turturis & columbæ, necnon perdicis, oculis cruore suffusis, & recentibus eorum uulneribus, lusciosisq; illinuntur. Peculiariter colubæ sanguis, cruorem membranis cerebri erumpentem inhibet. Hirci, capre, cerui & leporis sanguis patinis inassatus, dysenterias, & celiacorum profluuia sistit. In uino potus contra toxica efficacior est. Leporinus sanguis, ita ut tepet illitus, uitia cutis in facie, lentiginēsque emaculat. Caninus comode ab his bibitur, quos efferata in rabiem bestia momorderit. Contra epotum toxicum auxilio est. Testudinis terrestres sanguinem epotū tradunt prodesse comitalibus. Marinae autem testudinis cum uino & leporis coagulo, cuminoq; contra serpentium morsus, & hausta rubetæ uenena, conuenienter bibitur. Taurinus cum polenta illitus, duricias discutit, emollitq;. Sanguis equarum quæ admissuram expertæ sunt, in medicamenta additur quæ erodunt. Septica uocant. Sanguine chamæleonis genarum palpebras euelli creditum est. Hoc idem uiridium ranarum sanguine præstat, Menstruus sanguis foeminarum, circumlitu conceptio-

nem inhibere existimatur, aut si omnino mulier mēstrua supergrediatur. **A**
Leuat podagras muliebres, & ignem sacrum, illitus.

BARBARICOROLL.

Sanguis Græce uocatur Hæma. Distat a Sanguiculo, q̄ is proprie sanguis ædi est in cibū, igni coctus, Nigrum lus, ut Iulius Pollux arbitratur, uocatus. Hoc a Græcis Hypotrimma, & Aemalea, & Aemation, & specialius Hyposphagma dici putant: sed ex omni tamē quadrupe, adiecto melle, aut sapa, sale, aceto, lacte, caseo, cumino, laserpicio. Inuentum Lacedæmone putant. Vulgo id nos lus Dulce nominamus. De alio Sanguiculi significatu diximus in Gastro. Non dissimile uidetur, quod Græci Creocaccabon appellant, hoc est, carnem minutatim concisam cum sanguine, & adipe, iussulentōq̄, ac dulciario liquore. Nam quod Myma uocat, mihi quædā uidetur miscella Creocaccabi, & Hyposphagmatis fuisse: nisi q̄ paulo plura sunt, quæ in Myma requiruntur a quibusdā, autore Athenæo. Iuris & illa sunt genera, quorum in Pseudulo festiuis poeta meminit, Cicilendrum, Hypolindrum, Cicimandrum, Paropsis, Capris, Mēcis, siue Magis, ut conijcio. Equæ uirginis sanguini uim inesse negant, quæ maribus foeminisq̄, non uirginibus, Taurinum ubiq̄ inter uenena collocant. Excepta Egyra, ubi descēsurā in specum sacerdos uaticinij causa, tauri sanguinem præsumit. Capritum bibentibus, pallor accidit. Hircorum sanguine ferramēta acuiuntur, indurata subtilitate, & scabricia expolita, uehementius etiamnum, q̄ scobina fabri. Adamantis natura inuictissima, & duarum rerum uiolentissimarum, contemprix ignis, & ferri, non alia rumpitur ui, q̄ hircino sanguine macerata recenti, & calido. Etiam si hoc gemmarij nostri falsum & ridiculum existimant. Anatem, de qua mentio hic habetur, Græci Nessas, & Necta uocant. Quanc̄ Necta magis est, ut septa anataria significant, q̄ anates ipsas. Anatem ueteres, & anilem morbum uocabant, Similes Anatribus sunt, sed maiores, quas Glaucia Græci uocant, ab oculorum colore. Sunt & Boscades, et quas ab urinandi uoluptate Colymbos, & Colymbidas nominant. Inter omnes eas minimæ, atrī ac sordidi coloris, acuto rostro. Soli earum spectantur oculi, cætero merguntur. Habentur & Chenalopeces appellatæ, sed anseri contribuntur. Inuenitur & Boscadis unum genus, maius Anate, sed minus Chenalopece. Huc & Phascades pertinent, paulo grandiores quam Colymbi, cætero similes Anatibus. Est & Vria dicta, non multo minor Anate, rostro longiore, ac tenui, colore fido figlinæ. Angustum & Phalaris uocata, rostrum obtinet, caput rotundius, uentrē subcinereo colore, tergus nigricatus. Nominantur hic & Columbæ. Græci eas modo Peristeras, & masculino genere Peristeros, ut Attici, & neutro Peristeria, modo Pelias, et Peliadas uocant, ut Dorici. Quanc̄ Aristoteles distinctum genus facit, qui & alia dinumerat. Quo fit, ut in pocillo Nestoris, pleriq̄ non Columbas, sed Pleiadas cœlestē fidis intelligendas arbitrentur in Homero. Columbæ porro Siculæ præferuntur omnibus. Laudantur & Cypriæ, luteo colore. In India Columbæ esse græci affirmant. Cæterum Columbarum quas diximus Peristeras a Græcis esse dictas, duo genera constituunt, ut Galenus est autor, Caroeidion, hoc est, domesticum, & Nomadicum, hoc est, pascuum & syluestre.

E. X. M. V. E. R. G. C. O. M. M.

Quod ad medicinā pertineat, de Sanguine satis nouisse illud sit, nullū frigere Sanguinē. Omnibus enim ingēnitus & necessarius calor est. Differunt solum, q̄ alter altero minus, magisue calet. Fuitq̄ hic quondā in Sanguinibus uirium & naturæ census, ut suillus humidior, minusq̄ calidus cæteris sit, temperamento suo hominum Sanguini maxime similis. Columbarum uero, palumbis & turturis æquali inter se temperamento, oculorum medicinæ calidus inseruiat: instillatusq̄ crassiori cerebri tuniculæ, in his quorum calua perforata esset, in inflammationes arceat. Noctūq̄ cum uino, aut aqua, contra spiritus angustias utiliter bibatur. Vespertilionum, ranarum, chamæleonis, ricinorumq̄, qui in canibus hærentes inueniuntur, mammarum incrementa in uirginibus compescat, & quæ eo inungantur alia depilet. Negauit tamen, factō periculo, Galenus uera hæc esse. Inuenimus etiam, capritum ob siccitatem suam, contra cutem subeuntes aquas cum melle utiliter bibi, & renum calculos frangere. Agninum comitialibus prodesse. Hædinum nuper coagulum, cum aceto bibi contra cruentas pectoris excreationes. Vrsorum, siluestrium caprarum, hircorum, & taurorum abscessus maturare. Et terrestris crocodili oculorum claritatē facere. Quæ omnia a Galeno, Plinio, Pauloq̄ Aegineta, & ab alijs longius dicta sunt. Poteruntque uolentes plura his etiam in antiquis medicinæ autoribus inuenire, consulto a nobis relicta: satis fore credentibus, si communiora aliqua dicta fuerint.

Pli. ii. 23. ca. 14
& alias sepe.

B

ARmentarij bouis Fimum si recens admouetur, uulnerum in flammationes mitigat. Folij autem inuoluitur, & calfactū cinere feruenti supperponitur. Coxendicis cruciatus tali imposito compescit. Illitum ex aceto duricias, panos, & strumas discutit. Priuatim suffitu Fimi, quod a masculo boue redditum est, procidentes uulua reprimuntur. Accensi nidore culices abiguntur. Fimum caprarum, praesertim quae in montibus errant, potum in uino, regium morbum emendat. Menses cit cum odoramentis haustum. Et partus euocat. Tritum in farinam, & impositum lanis cum thure, sceminarum profluuia sistit. Caeterosque sanguinis impetus ex aceto cohibet. Medetur alopecijs exustum, & cum aceto mulso illitum. Cum axungia uero impositum, his qui podagra tentantur auxilio est. Caprillum in aceto decoctum imponitur serpentium moribus, ulceribus quae serpunt, igni sacro, et parotidibus. Vtilem ischiadici uestionem hunc in modum accipiunt. In interstitio pollicis, qua parte brachio committitur, caua ueluti lacuna subsidet, in qua lana oleo imbuta substernitur; deinde sigillatim feruentes, stercoris caprini pilulae imponuntur, dum uapor per brachium ad coxam sentiatur peruenire, & coxendicis dolore mitigare. Adustio id genus Arabica appellatur. Fimum pecudum ex aceto illitum, sanat epinyctidas, clauos, peniles uerrucas, thynos, & ambustia, igni rosaceo carato exceptum. Fimum suis syluestris aridum, in aqua aut uino potum, reiectiones sanguinis sistit. Vetusum lateris dolorem mulcet. Adrupta & conuulsa ex aceto bibitur. Luxatis cum carato rosaceo medetur. Tam asinorum quam equorum Fimum, siue crudum, siue crematum, addito aceto, sanguinis eruptiones cohibet. Armentarij qui herba pascitur siccum Fimum liquatum in uino, mox potum, contra scorpiionum ictus magnopere auxiliatur. Columbinum uehementius excalefacit, & urit cum hordeacea farina mixtum. Strumas ex aceto discutit. Carbunculos emarginat, tritum cum lini semine & oleo. Ambustis igni medetur. Gallinaceum uero omnia eadem, sed inefficacius praestat. Priuatim tamen contra uenena fungorum, & coli cruciatus ex aceto, aut uino bibitur. Ciconiae Fimum si ex aqua hauriatur, comitialibus prodesset credunt. Vulturini Fimi nidore partus excuti produntur. Murinum detritum cum aceto, & illitum, alopecijs medetur. Cum thure & mulso, calculos expellit. Subditae infantibus muscerdae, alui deiectionem promouent. Caninum quod flagrantissimo canis sydere fuerit exceptum, cum uino, aut aqua potum, sistit aluum. Humanum stercus illitum, uulnera inflammationem minantia intumescere non patitur, Sed ea statim glutinat. Sicco ex melle anginae perungi commodissime traduntur. Terrestris crocodili Fimum Crocodileam uocant, quae mulieribus colorem nutrit in facie, nitoremque seruat. Optima est tenuissima

et friabilis, amyli modo minime ponderosa, in humore statim eliquesces, **A** quæ cum teritur, fermenti acorem quadamtenus refert. Adulterant eam sturnorum fimo, quos captos oryza pascunt: ipsumque non dissimile ueniunt. Alij Amylum, aut Cimoliam miscent, & adscito colore per rarum cribrum paulatim exprimunt, ut se contrahat in uermiculorum speciem. Qui siccati pro Crocodilea uæneunt. Inter omnes conuenire inuenio humanum stercus, caninumque gutturi impositum, anginis auxiliari.

BARBARI COROLL.

Fimum Græci multis nominibus, Apopatema, & Apoparon, & Bolbitō, & Hippomacroboliton, & Scatos, & Apōsceuē, & Aphodon, & Eumarean ionice appellant, & Scor: quæque hominis hoc proprie: ut asini, Onida, & Ondhon: equi, Copron: pecudis, Oespoten, uel Oipoten Aristophani, & Sinypen: Iones suis Hypeleuton: murum Myocopron, & Miscelerdā, nos Muscerdam: ut suillum Sucerdam. Liquidius quod est, nostri Soria cognominant. Vnde Sorioli, quibus solutiuscula est aluus. Et cōsorire uerbum, pro eo quod est inquinare fimo: quod Plautus concacare dixit. Et Sorica locus in publico, ut latrina in priuato. Fimos porro etiam luforias tabellas, hoc est, alueolos dixit Horatius. Asinini certe pulli Fimum, quod primū edidit, Polion uocari tradit Aristoteles. Plinius Polean priuatim & caprinum, Spyrathos, & Spyradas, & Spyrdana, quas Palladius Caprinas baccas uocauit.

Pli. li. 17. ca. 92.

CROCODILEA.

Crocodileam Cerusæ modo elui præcipiunt. Est & Crocodilea, siue Crocodilina, & Crocodilitis uocata questio Sophistarum ludica, ut Prion & Ceratina, sed alienæ omnes ab hoc opere. Crocodileam Plinius etiam intestina ipsa terrestri Crocodili appellat: ob id diligenter exquisita, quoniam iocundissimo nidore fragrant. Viuit enim odoratissimis animal id floribus, simile Crocodilo ei cui uita in terra, aquaque communis, sed multum infra magnitudinem eius, & in terra tantum.

De Vrina. CAP. XCi.

Humanam Vrinam suam cuique bibere, contra uiperæ morsus ac **B** uenena, incipientemque aquam intercutē proderit. Marini scorpionis, uiperæ, draconisque morsus ea conuenientissime fouentur. Canina, ad perfundendos canis morsus idonea est. Pruritus, & lepras nitro addito expurgat. Sed uetus ulcera capitis manantia, furfures, psoras, & feruidas eruptiones, multo magis abstergit. Nomas, & præcipue genitalium cohibet. Auribus infusa manans pus supprimit. Decoctaque in calice mali punici, earum uermiculos abigit. Pueri impubis reforescit urina, orthopnoicis auxiliatur. Decocta in æreo uase cum melle, emendat cicatrices, argema, caliginesque. Ex ea & cupro idoneum auri ferrumen conficiunt. Lutum quod in Vrina subsidit, illitu ignem sacrum mitigat. Feruefactum cum cyprino, inditumque, uulua dolores mulcet. Strangulatus leuat. Genas deterget. Oculorum cicatrices expurgat. Taurina, si cum myrrha instilletur, aurium dolores lenit. Aprina uiribus eisdem prædita est. Priuatim comminuit uesicæ calculos, & potu expellit. Ad aquam quæ cutem subijcit, cum nardi spica cotidie binis cyathis cum aqua bibitur, urinamque per aluum extrahit. Aurium doloribus instillata medetur. Asinina, traditur renum uicijs mederi. Lyncis urinam, quam Lyncurium appellat, simulac excernitur, glaciari, coireue in calculi duriciam, uulgo creditum

s iij

D I O S C O R I D I S

C est. Quare quod de ea proditum est, uanum esse conuincitur. Est enim quod a nonnullis uocatur succinum pterygophorō. Id potum ex aqua, stomacho, aluoq; fluctione laboranti conuenit. Asininæ urinæ potu renum uitia sanari traduntur.

B A R B A R I C O R O L L.

Vrina, siue Lotion, Græce Vron uocatur. Vrina struthionis atramenti lituras abluit. Fuliones pedum uitijis carere affirmant Vrinæ beneficio. Magi præcipiunt, ne quis contra solem, lunam ue nudetur Vrinæ caussa: neue umbram alicuius respingat. Hesiodus contra obstantia reddendam, ne Deorum aliquem nudatio ea offendar. Non desunt qui Amuletum esse dicat, suam cuiq; matutinis omnibus instillatam in pedem.

L Y N C V R I V M.

Pli. li. 9. ca. 32.

DE Lyncurio non constat autoribus, an sit, aut unde sit. Qui electrum id esse negant, gemmam tamen fatentur, ex urina Lyncis omnino, sed quam animal id statim redditam, aggesta pedibus terra obruat inuidia, ceu gnarum peti eam ab homine: celerius ita concrefcere in gemmas similes carbunculis, igneo colore fulgentes, atq; frigidās, quæ & scalpanē. Quancq; distinguunt e maribus, præcipueq; feris & fuluas & igneas, e fœminis, præsertim cicuribus, candidas atq; languidas existere, nec frondes & acus modo rapere, sed æris quoq; ferriq; bracteolas, ut Diocles & Theophrastus referunt. Alij dixere Langurium, & esse in Italia circa Padum Langurias, quæ ab aliquibus Langæ nominentur. Falsa hæc omnia Plinius existimat, nec uisam a uo suo gemmam appellatione tali scribit. De Lyncurio lapide non hoc, sed alio inter fungos, mirum quidem, sed uerum dicturi sumus. Succinum Dioscorides hoc loco Pterygophoron cognominat, q; firamenta, floccos atq; simbras in se trahat: aliubi Chrysophoron, ut Plinius Chryselectron. Lynces clarissime omnium quadrupedum cernunt.

E X M. V E R G. C O M M.

DHabet Vrina in animalibus, quæ per renes, & quos urinæ meatus dicunt, ex sanguine in uellicam non aliter q; per colum fluit, quod cōmune omnibus sit, calorem. s. & acrimoniam. Priuatim omnium aliorum animalium, exceptis eunuchis, humana infirmior est. In nutriendo non paruas habet Vrina uires: ideoq; in fame pota Vrina seruati aliqui sunt. Sanat præter ea quæ a Diosc. dicta sunt, pedum attritus, sed nondum inflammatos, ex calceis factos. Caprarum & Chamælorum urina aluum deijcit: ideoq; contra cutem subeuntes aquas, utiliter bibitur. Ex homine omnium efficacissima impubis pueri est. Auguria ualitudinis ex ea a medicis præcipue accipiuntur. Suntq; tam multi eius colores, tā diuersi habitus & odores, ut nihil æque in medicina difficilius & utilius nouisse sit. Nisi forte aliquis Romani Cæsaris exemplo, ad rigandas, stercorandasq; simul arbores ex ea uetigal in gente sua excogitauerit. Ea pruritui foueri utilissimum Dioscorid. ait: *υνηροδο* græci id malum uocant, in senibus non adeo curabile. In reliquis ætatibus haud difficilis curationis, si deprehensa mali causa fuerit: quæ plerumq; est corruptus, & (ut aptius loquamur) putris, pituitosus, aut biliosus humor. Contra quem Vrinæ acrimonia & calore inter cætera pugnandum est. Exigebat post omnia hic locus, ut de Lyncurio, siue gemmā, siue succinum id sit, aliquid diceremus. Sed tanta est ueterum in historia eius uarietas, ut nihil censere de eo audeamus. Sunt enim qui negent Lyncurion esse. Sunt qui esse quidem dicant, sed unde, aut quid sit, affirmare non audent. Plinius diuersis locis multa, sed quæ omnia de gemma intelligentur. Quæ possunt uolentes facillime ab eo audire.

De Melle. C A P. XCII.

μέλι υμητινόν
σιμητινόν

Pincipem locum obtinet Mel, quod Atticæ regionis est, præcipue ex Hymeto, mox Cycladibus insulis, & e Sicilia, cognomine Simblion. Maxime probatur dulcius, & acre, odoratum, sufflauum, nec humectū, graue, & minime fluxū, qd ob sequacē lenticia nō facile abrumpit, tractūq; resilit in digitos. Mel abstergendi uim habet. Ora uenarū aperit. Humores euocat. Qua ratione in sordida ulcera, sinusq; cōmodissime infunditur. Decoctū, atq; imposuitū, abscedentem carnem glutinat.

A Medetur impetigini coctum cum liquido alumine, & illitum. Item aurium sonitui & dolori, cum fossili sale tepido instillatum. Lendes, & fœda capitis animalia illitum necat. Nudam glandem recutitis operit, præsertim quæ circumcissione aperta non est, si melle coles a balineo triginta diebus emolliatur. Oculorum caliginem discutit. Faucibus, tonsillis, anginae illitum gargarisatumue medetur. Vrinam ciet. Auxiliatur tussi, & a serpente percussis. Contra haustum meconium, cum rosaceo calidum assumitur. Aduersus uenena fungorū, & rabiosi canis morsus linctum, aut potum proficit. Crudum tamen aluum inflat. Tussim laceffit. Et ea de re despumati usus aptior est. Primatum tenet in Mellis genere uernum, deinde æstiuum. Hybernū uero, utpote quod crassius constet, deterrimum reputatur. Siccas eruptiones excitat. Quod in Sardonia gignitur Mel, amarum est. Quoniam apes inibi absinthio uescantur, quō uitia cutis in facie & maculae aptissime perunguntur. Heracliae in Ponto quibusdam anni temporibus, propria quorūdam florum dote Mel conflatur, quod qui edere, mente abalienantur, ac sudore diffluunt. Remedio sunt esitata ruta, & salsamenta, aut epotum mulsū, resumpta quoties uomitione reijciuntur. Acre autem est. Et olfactu sternutamenta mouet. Quod cum costo illitum, foeminarum cutem emendat, & cum sale sugillationes rapit. Est & aliud concreti Mellis genus, quod Saccharon nominatur. In India uero & felici Arabia in arundinibus inuenitur. Salis **B** modo coactū est, dentibus ut sal fragile. Aluo idoneum, & stomacho utile. Si aqua dilutū bibatur, uexatae uelicae, renibusq; auxiliatur. Illitum ea discutit, quæ tenebras oculorum pupillis offundunt.

BARBARI CŌROLL.

MEL a Græcis Meli. Natum in Carina Cretæ monte Mel, muscæ non attingunt, propterea medicamentis eligitur. Varro Siculum præfert omnibus: quod ibi Thymum bonum frequensq; sit, quo ad mellificium nihil est præstantius. Strabo e Cycladibus, & inter Cycladas Calyminum antepōnit omnibus. Natura Mellis ea est, ut uitia coërceat, ne serpere ultra patiat. Quam ob causam, uel exanimū corpus hominis, per annos plurimos innoxium conseruat. Est & suus in Melle, ac mulso flosculus, si recta est apud Columellam, in oliuæ conditura lectio. Sunt enim qui uasculum Mellis, non flosculum ibi legant. Sed certe in omni purissima & tenuissima quæq; pars, floris appellatione demonstratur. Est & in pomis flosculus, qui & Umbilicus dicitur. Nam & in fico pomus fundus, græce Omphalos dicitur, hoc est, extremitas altera, quæ petiolo annectitur. De cœlesti Melle dictum est superius in Elæomele. Hircanum Mel, ex ipsis quoq; fuit arboribus, sine cura mortalium, examinibus inibi se cogentibus atq; mellificantibus, ut inquit Strabo. E petris quoq; ut Diodorus. Sed minores apibus sunt, Arthredones appellatae. Meminit bestiolæ huius & Aristoteles, inter crabrones uidentis. Etiam si corrupte legitur in ipso, Tenthredon, pro Anthredo, nam crabrones Anthredonæ a Græcis dicuntur. Hoc ipsum fere in Media, & Armenia quibusdam locis uisitur. Diodorus, & Quintus Curtius, arbores in Hircania, quarū folia multo Melle tingantur, faciem quæcus habere tradunt; ac nisi solis ortum incolæ præuorterint, fore, ut uel modico tempore is succus extinguatur. Mellis inuentione, Plinius & Diodorus Aristeo Atheniensi, uel Arcadiæ regi, ut Trogus, sicut medicinæ ex eo, Gelius Oceani filio Soli assignat. Trogus colligendi Mellis usum monstraſſe Gargorin scribit, uetustissimū Regem in Hispania Curetum, qui saltus Tharte florum incoluere; in quibus Titanes bellum cum Dijs gessisse perhibentur.

Pli. li. ii. ca.
Aristot. lib.
cap. 22. de animalibus;

D I O S C O R I D I S

M E L S A R D O V M.

C Vm Mel in Sardinia progenitū uirus habeat, mirum est, cur nullum tamen animal homini pestiferū, in insula ea nasci perhibeatur, extra q̄ Solpugam, ut Solinus meminit: de qua in castigatione Pliniana dictum est abunde. Non solū uero Mel Sardoum, sed & Chokichum infame traditur amaritudine. Sunt & alia Mellis fastigia, quæ mox subiunget dissertatio.

M E L P O N T I C V M.

M El Heracleoticū, siue Ponticū, ex herba fieri candida cōmemorat, quæ Ægeolethros uocet: quia uexatio iumentorū sit, præcipue caprarū. Non sentitur aut̄ omnibus annis hoc malū, nec nisi cum flos ille marcescit aquoso uere. Signa uenenatū sunt, nunq̄ densari, color magis rutilus, & q̄d ponderosius est, q̄ probū: qui gustauere abhiciūt se humi, refrigerationē quærentes. Exitū hoc per excrementa, ad canes quoq̄ peruenit, similiterq̄ torquet eos. Mulsū tamen ex hoc Melle inueteratū, desinit esse pnciosum. Aliud genus Mellis in eodē Ponti situ, Manicon, siue Menomenon appellant, ab insania, quā facit, existimatū, rhododendri flore contrahi, quo scatent syluæ. Optima tamen ex hoc uno cera fit. In Perside aut̄, & in Mauritania Cæsariensi, Getuliac̄ Massylis contermina, uenenatū Fauigignunt: quidāq̄ non toti, sed parte, quo nihil fallacius, nec nisi liuore deprehendunt. In Themiscyra Pōii regiōe, mons est Scydissēs, cuius incolunt Byzeres & Heptacomitæ dicti iuga, hi tris cohortes Pompeij, ea cōmeantes interfecerunt, dispositus qua trāseundū erat Mellis infani ualis, quod ibi ex arborū quarundā, ut inquit Strabo ramis, fundit̄. Corruentē enim potu eo militē aggressi, facile confecerunt.

S A C C H A R V M.

Pli. li. 12. ca. 8.

Saccharū laudatius ferebat India: nunc popularis ortus eius est in Aegypto, Cypro, Rhodo, Creta, Italia quoq̄ nascitur. Nullū epulum magnificū iam, ne quotidianus quidem uictus placet, sine Saccharo. Digerit in pastillos, effingit in placentas, a maza & pane, ut putō Mazapanes uocatas. Qz̄q̄ & Marcipanes ab auctore dictos coniectari licet: quandoquidē & Marcia tum unguentū, & Marci pastillos in medicina legimus, ut est apud Aetiū, & priorem eo Paulū. Omnino cōponitur in oēm figurā Saccharum, non aliter q̄ farina, trahiturq̄ etiā in picturas, opere historiali: uenatus, classes, oppida, & quascunq̄ rerū afferri libeat imagines præsentās: a coronatis ministris, cū tibicine introferri solitū conuiuijs, & ad principia eorū, & in secundam quoq̄ mēsam. Vnde natū sit prouerbiū: nullum ferculū corrumpi Saccharo. Amplissimū nuncis auellanae magnitudine, Plinij rēporibus, & medicinæ dūtaxat usu, nunc tam promiscuū, ut desinat prodesse, multis obfit. Pueris certe lūbricos & tineas contrahit. Varronis uersus sunt.

D

Prouerbiū.

Indica non magna nimis arbore crescit arundo,
Illius & lentis premitur radicibus humor,
Dulcia cui nequeant succo contendere mella.
Strabo quoq̄ nō ex ipsis tantū arundinibus, sed & radicibus quoq̄ Mel exprimi cōmemorat in India. Nunc ex Alexandria Aegypti, & Cypro cōmendatissimū. Melius quo uetustius, q̄q̄ calidius, ita & capiti fere nocens. Dilutū aqua, refrigerandū uim concipit: præsertim ter coctū. Primo excoquant arundinē, deinde flaua pars secernit̄: hanc Saccharū existere. Hoc iterum coqui potest, atq̄ ita fit candidius & concretius. Quod si tercio coquat̄, maxima in eo fit & candoris & densitatis accessio. Quartum & quintū quoq̄ solet excoqui, & donec specie aluminis scissilis fere transluceat: q̄d genus alij Candidū, alij Cantū cognomināt. Saccharū Græci Sacchar uocant. Rarū, nec plane cognitū Galenī quoq̄ seculo: tantū abest, ut instrumentum nitidioris uitæ fuerit. Qz̄q̄ non magnopere pridem inuētum puto, ut nucleos pineos, amygdalas, auellanas, pistacea, citreum, cinamomū, coriandrum, anisum, feniculū ductili tunicarum facilitate contegat, circumdatum modo coricis crassitudine, modo cutis tenuitate uestiens. Dulcioria quidē ex nucleis pineis, & amygdalis condebat antiquitas: sed cum melle, ut est apud Paulum. Venale porro Saccharū, in dupondiairos fere panes, metæ effigie diuiditur. Preciū optimi, in libras aurei nummi fere sexcunx. Cyprium non coibat ante: nunc densatur, tanto inuentoris quæstu, ut inde locupletissimus euaserit: neq̄ ratio tamen cōmunicata est, sed archanam habent, ut ad heredes latifundi cuiusdam, aut monopolij uice transeat. Illud monendi sumus, in Pampini sylua quadam illo uersu,
Et quas præcoquit Aebusita Cannas,
Hypasitam, non Aebusitam legendum: ita enim populī uocantur Indiæ a flumio Hypasi, ut est apud Strabonem, Pliniumq̄. Nec audiendi sunt, qui nullo auctore, nullo teste, in Syria locum eum tradant, inter Libanum & Antilibanum, conualle media. Nam ibi arundo quidem prouenit, sed odorata, non saccharea: ut alibi quoq̄ diximus.

De Cera.

CAP. XCIII.

CAera optima est subfulua, odorata, subpinguis, pura, odorisque quadamtenus mellei, natione Pontica, aut Cretica: Secundū locum obtinet candida, & sua præ natura pinguis. Candida fit hoc modo. Ex earadunt album, syncerūq; atq; transfundunt in uas, quod satis habeat marinæ ex alto petite, insparsoq; nitri momento decoquūt. Cumq; iterum, tertio uel inferbuit, separatim uas refrigerant, ac cæræ pastillum eximunt, deterfa sordē, siqua forte adhæsit. Tum denuo indita noua maris aqua feruet, uti retulimus: & uase dempto ex igne, basin ollulæ nouæ aqua frigida madefactam, in cæram summam suspensā manu intingunt, quo celerius concreseat, & q̄ minima portio extrahatur. Suscepto primo cæræ orbiculo, iterum uas in uas aqua refrigeratum, tantisper intinuit debet, dum tota excipiat. Orbiculi lino consuti, ita ut intercedat spaciū, suspenduntur. Et interdū, continuo sub sole, noctu sub luna aspergunt, usq; dum perfecte albescant. Verū si eximius ille candor desideretur, eadem facituri, & identidem recoqui operæ precium est. Nec desunt qui pro marina, in muria q̄ acerrima, semel aut iterū excoquant. Dein laguncula tenui, rotunda, ansam habente, extrahunt. Postea orbiculos, substrato cespite hærboso insolant, donec candorem summū contraxerit. Præcipiunt hoc obeundū munus uere, cum sol remissa uehemētia humorem pariāt, ut nō facile liqueat. Cera omnis mollit, calfacit, modice explet corpora. Datur in sorbitione dysentericis. Ac milij magnitudine decem grana Cæræ hausta, lac in lactantibus nō patiuntur coagulari.

BARBARICOROLLA.

CEra græce uocatur Ceros. Fit expressis fauis, sed ante purificatis aqua, & triduo in tenebris siccatis, quarto die liquatis igni nouo siccili, aqua fauos regente, tum sporta colatis. Rursus in eadem olla coquitur Cera, cum eadem aqua, excipiturq; alia frigida, uasis melle circumlitis. Optima quæ Punica uocatur. Plurimum habet ex Propoli Cretica: ideoq; locum secundum in nationibus obtinuit. Tertium Corsica: quoniam ex buxo constat, & medicaminis uim referat. Fieri candidam Ceram, nihil aliud esse uideo, q̄ Punicam fieri. Hæc medicinis utilissima, uarios in colores pigmentis Cera trahitur: ob id & Tracta dicitur, ut puto etiam a Græcis. Nigrescit, addito chartarum cinere. Anchusa mixta rubet, ad reddendas similitudines, & innumeros uisus, ut taceatur interim pugillariū, parietūq; & armorū tutelæ. Superat niuem candore Cera, quā Pharmacopolæ nostri præparant, nuperrime uel cepta publicis, priuatisq; sacris solēnibus & prophanis usibus. Officina tantū una concinnabatur hæc patris memoria. Nunc urbe tota uenditur, nec alia crematur Cera dumtaxat apud nos, q̄ candida. Primus omnium Cornelius, e Senatu domū rediens, funali Candido usus dicitur, tanta uerecūdia, ut nō prius accendi pateretur, q̄ tota curia & foro decessisset: quia cæteri, aut laterna, aut triviali Cera deducerentur. Exemplum eius deinde sequuti oēs, maiestatiq; hoc illius ordinis amplissimi, nō luxuriæ datū. Itaq; Senatu missō, post occasum solis, tam longus est ordo luminū, ut plane diem reddant. In Cera quī nascitur uermiculus, ab Aristotele uocatur Acār.

EX M. VERG. COMM.

Quod habet in medicina utilissimū Cera, excipiendis, retinendisq; alijs medicamentis materia est, qua omnium generum Cerata quotidie fiunt. Maturandi, abstergendiq; uires aliquas nihilominus habere illam, aliqui ex ueteribus tradiderunt: hic calefacere tantū, molliore, explereq; eam dixit: & omnia mediocriter, quoniam parum efficax uis eius ad omnia fit: præterq; (modo id Cera possit) ad prohibendā in nutritibus lactis in caseum densationē. Quod uitiū ex Dioscoride uerbis descriptū a nobis est, Barbarus id Colostrari dixit.

A

B

Pli. li. ii. ca. 143

C De Propoli.

CAP. XCIII.

πρόπολις

Propolis eligi debet flaua, odorata, styracem referens, in uehementi ariditate mollis, & mastiches more ductilis. Magnopere calfacit & euocat. Aculeos, et oīa infixa corpori extrahit. In uetere tussi suffita proficit. Impetigines admota tollit. Et in alueariū foribus, cerosę naturę iuenit.

B A R B A R I C O R O L L.

E Propoli Apes faciunt ad foramē introitus protectum, æstate maxime, ut inquit Varro. Alia hæc ab Rhitace uocata, qua fauos extremos simul conglutinant. Interdū extra fores alui obdurant omnia, qua uenit inter fauos spiritus. Interpretatur hanc Gaza nosfer & Careum quādoq; . De hac & in Lilij mentione differemus.

VERG.

Quæ in aluearibus apiū uideri etiamnū possunt fundamēta operis, ut diuersos habent in apibus usus, nec eandē ex qua confecta sunt materiā, sic diuersis appellationibus a grecis pariter & latinis discreta sunt. Inter ea post Metyn, & Pissoceron, tertia Propolis est, inter coria & ceras media crassioris materiæ: ueluti gūmi, additis aliquādo etiam floribus: nondū tamen cera, sed fauorū stabilimentū: qua oēs frigoris, aut iniuriæ aditus apes obstruūt, magni ad medicamēta usus. Quorū genera hic breuiter complexus, nihil quod de Propoli ab alijs dictū fuit, non duobus uerbis, & maior ū toridem generibus profecutus est. Eam Plinius ab apibus præcipue fieri dixit, ex gutta quam populi arbores in folijs ferunt.

C De Tritico.

CAP. XCV.

πυρόσ

Prima e Tritici generibus ad secundę ualitudinis usus habetur, quæ recentia, & iam perfecte adulta, colorē mali referūt. Dein sequuntur trimestria, quæ nonnullis Sitania nominant. Itaq; cruda in cibis teretes tineas gignūt. Canū moribus profunt māsā & imposita. Confectus eorū similagine panis, plus alit q̃ cibarius. E trimestriū farina panis leuiorem cibū præbet, & qui facile in mēbra demandet. Farina eorū cum hyoscyami succo illinit, aduersus neruorū fluxiones, quas Græci rheumatismos uocant. Itē contra interaneorū inflationes. Lentigines ex aceto multo tollit. Furfures aut in acri aceto decocti, turgentes māmas sedant. Viperarū ictibus auxiliant. Et torminosi profunt. Farinaceum fermentū calfaciendi extrahendiq; uim habet. Priuatim callos pedū, clauosq; extenuat. Cætera tubercula, furunculosq; ex sale concoquit, & aperit. Sitaniorū farina, contra uenenatos ictus cum aceto, aut uino cōmodissime illinitur. Eadem si decocta in glutini modū delingat, cruentis excreationibus proderit. Contra tussim, & exasperatas fauces, cum menta & butyro decocta efficax est. Tritici pollen si ex aqua mulsa, aut hydræleo decoquatur, oēm dissecuit inflammationem. Panis & crudus & coctus inflammationes omneis illitu mulcet: cum emolliat & quadamtenus refrigeret. Sed hærbis succisue huic rei accommodatis ammisceatur. Vetus panis aridus, adiectis conuenientibus, citam aluum cohibet. Recens muria maceratus illitu, uetustas impetigines sanat. Glutinum ex similagine & polline, quo chariæ glutinantur, sanguinem excreantibus prodest, si liquidius ac tepidum cochlearis mensura detur sorbendum.

B A R B.
Plini. lib. 13.
cap. 7. 10. 11.

Triticum & Satiuū & Syluestre, cultu annorū trium mitescit, in Leontino Siciliæ agro plurimū. Degenerare Triticū in ordeum, ex eodēq; nasci pede, utrūq; fabulosum existimat a Theophrasto. Frumentū omne radicibus multis ac prætenuibus exit, folio uno, germinibus

oīno multis, sed quæ in ramos brachiari non possint: cuius contrariū in oīni legumine cōspicitur, excepta Faba. Frumentū Sitos græce dictū, quicqd ex se aristas mittit: in herba quā Græci Loion uocāt per hycem est. Remollito autē coelo, cauliculus de medio assurgit: cuius tertio aut quarto genu spica geritur, non prius euidens, q̄ folliculo inclusa: qui Gluma dicitur. Consumato eo, flos erumpit: quarto aut quinto post die, ac totidem fere diebus, plurimūq; septem durat. Varro quindecim diebus frumentū in uaginis esse dicit, quindecim florere, quindecim arescere. Post florem crassescit, inquit Theophrastus: maturaturq; intra quadagesimū diem, cū tardissime octauo a satū mense, plurima parte metitur. Aegyptus, ut scribunt, septimo. Folliū harundineum, angustius tamē Tritico q̄ ordeo, caulis quoq; leuior, & lentior, nec perinde fragilis. Triticū multis integitur tunicis, ordeum nullis. Culmus Tritico altior q̄ ordeo, spica quoq; remotior a folio. palea suauior, mollior, succosior. Inconditæ Tritico spicæ, explanatæq; ordeo dispositæ in uersus. Vtriq; culmus spicā sustinet, quæ & Spicus, & Spicum a Cicerone dicitur in Arato. Spica granum & aristam, quæ uti acus eminet e folliculo siue gluma: Sunt autē Aristæ partes in spica primæ, quæ a Græcis Antherices dicuntur, & Atheres. Est autem Ather proprie in ordeo, ut Galenus interpretat, cuspis ipsa spicæ. Nam & medi pars extrema, hoc nomen inquit, habet, cum aristam non habet. Mutica spica dicitur, quasi mutila. Vagina uocant, sub qua latet herba. Stipulæ sunt folia culmū ambientia. Est autē Culmus, idem quod & Calamus, cum spicæ penitus oriūtur in summo spicæ iam maturæ. Quod minus est q̄ granum, uocatur Frit. Quod uero ad culmi cacumina in firma spica geritur, minus item q̄ granum, Vrucus appellatur. In tritico marcescente gurguliones, hoc est, Bias (sed lego Cias, ut in pumice notauī) a Græcis uocatos, innasci ferunt, ut in faba Midæ. Gigni & cantharidem in Tritico (Scampeus is paruus est) ut Phalangion in Eruo constat. Tritici multa discrimina. Sitanias uocat. Genus id est siliginis trimestre, ut Columella uoluit. Frumentago dicta Theodoro, differens crassitudine surculorū, quemadmodū inter ordea Crithanias, Ordeago nominata. In nomine sunt Assyriū, Aegyptium, Ponticū, Thracium, Siculū, Africum, qd facile absoluitur folliculo. Nam Thraciū multas habet tunicas. Habetur & Cachrydias, siue Canchrys, culmo crasso, quod etiā Africo tribuitur. Ponticum leuissimū. Siculum ponderosum. Ponderosius Boetium. Deprederūt hoc Athletæ. Ponticū & Aegyptium sine lolio nascitur. Item Siculū, præcipue Agrigentinū. Q̄q; cum siculo, melapyron nasci perhibent. Sed innocuū, neq; lolij modo graue, caputue tentans. Nominat & Alexandrinū, oblongo semine, quod fortasse idem sit cum Aegyptio, & Calymno. Ex Calydnis insulis, a Ptolomæo Philadelpho in Aegyptū conuecto. Dracontias, & Selenusium, & Stengias, crasso cuncta calamo. Iam aliud trimestre, aliud bimestre. Sitanīū, uideo idem esse cum trimestri. Satinū dorice uocatū, & attice Titinū, quasi purum, ut Photioni placet, de quo & paulo supra dixi. Galenus Sitanium, inquit, est Triticū instantis anni, id quod uere seritur. In Truculento Plauti Etanio, pro Setanio legitur mendose, castigauimus. Non possunt inquit, militares pueri setanio exducier. Euboicū certe intra diem quadagesimū a satū metitur, firmitate ac pondere præcipuū, non ut trimestri leuitas, ob id cibario panī utile: nam & furfuris parū habet, inuentu rarū. Bimestria, in Achaia & Sicilia primū uenere, parum fecunda, sed cibo facilia & iucūda. Olynthi & in Euboea apud Cerinthum genus effoditur terræ, qua Triticum oblinēres diu id seruāt. Trimestria ubiq; sunt, uerū inutilia, & infirma, singulari calamo. In Asia quodā loco trans Bactra frumentum nucleis oliuæ par nasci referunt. In Pissotis, tam firmū, ut multos Macedonum largiore usos, eo saties peremerit. Omni frumēto nocent imbres in flore. Itē iam plane crassato, Triticum plus q̄ ordeum uligine cōmeat in lolium. Camatias in Thessalia Tritici genus est, quod admissio pecore de generat Babylone: propterea nihil patitur, etiā bis derosum. Præter lupinū, nihil æque in spica durat q̄ Triticum. Durat bonitas cibo in petra Cappadociæ, in septuagesimū usq; annū. Vnde de Cappadocio panī summa gratia, qui & Apalos, a teneritudine uocat, & Syrorū lingua Lagman. Addebat in massam lac & oleum, & salis quantum satis esset. Laudabatur & Parthicus: quē alij aquaticum uocabāt, quoniā aqua traheret a tenui & spongiosa inanitate. Triticum ex Assio Troadis, in panē sibi Reges Persarum quærebant. Varro conditū diligenter Triticū, quo uentus non perueniat, mansurū ad annos promittit. Vis Tritico tanta, ut cados plenos siccet. Panificij multa & nomina & genera. Ex his nauticum intelligo, qui uetus atq; siccus a Dioscoride in medicinis dicitur, fortasseq; biscoctus: quē Græci Diephthon appellant. Syncomistos uero, is est quē alio nomine Autopyron uocari Galenus auctor est: quoniā ex omnibus farinæ suæ partibus detractio nulla constet. Inter Pityriā, & Semidalitin, hoc est, furfuraceum, simi lagineumq; medius. Et enim Autopyros, siue quod idem est, Autopyrites, & Xeropyrites, &

A

Theoph. li. 3.
capi. 25. 26. 27.
28. de plantarum
caullis.
Itē li. 4. ca. 17.

B

D I O S C O R I D I S

Genera panis
multa.

Hemiarton, & Placites, & qui Tytontes a caseo nomen habent. Enicridi similis est Physcilus, quo Spartani utebantur in sacris epulis, Rapi effigie. Magnos & sordidos panes Cilicis uocabant, & a colore subnigro Phæos, sicut Agelæos, qui a nostris cibarii & gregarii dicuntur. Ornides ab Oryza, siue ab semine quodam Aethiopico, tam simili sesamo, ut difficile possit internosci. De ficu ægyptia, Sycaminites fit. Collabus, siue quod idem est, Collix, & per diminutionem Colliphion, ut Xyliphion e caseo recenti constat: de quo Iuuenalis, & in Persa Plautus. Hic & Crimmatias, & Chondribos quoque dicitur. Sunt & Maconides uocati. Sunt Chrysocollæ, sed ex lino, ac melle. Aegyptij sunt, & ad sistendam aluum utiles, ut inquit Strabo, Caces appellati. Sunt Colloræ, siue Colliræ: quos Plautus non Colloras modo, sed Colluria uocauit, & Collyria ut existimo in Persa, & Collyridas sacræ literæ. Is olei mistione conspersus intelligitur a Hieronymo. Sunt Obeliæ Baccho sacri: ita dicti, uel quod obolo Alexandrie uenirent, uel quod in ueru torrerentur. Sunt Eunitæ. Aut etiam Enitæ, cognomento Lecythitæ. Sunt Pani: unde apud nos uocabulum. Etenim Mellapios redundantiæ & futuritatem, Paniæ appellasse, restis est Athenæus. Varro tamen Panis uocabulum a pano duci putat, quod figurat in eo faciebant, ut in lana mulieres. Habetur & Cnestos a nidore. Itæ Banchylos, & Thronos, Spodites idem uidetur esse cum Banchylo. Patrias nobilitauere Cyprius, & Cappadox, de quo supra dictum est. Artopiticius uero panis a Clibanite ac Turnaceo differre eo dicitur: quod hic e duriore fermento splendidus conficitur: illi fermentum semper perque tenerrimum desiderant. A boleti forma Boletinus, papauere accepto & fumosi casei colore. Strepticius, siue Streptos, ex lacte, oleo, pipere conficitur: aut olei loco, adipe. Artolagana pusillum uini, lac, piper, oleum, siue adipem olei uice continent. Capyridia sunt, quæ alio nomine Tracta dicimus, ut Athenæo placet. Cuius uocis & apud Catonem metio est, ubi de placenta, & spira, & scriblita loquitur: quo uerbo ipse non Panificium, sed portiones tota materia detractas, & in solum, hoc est, stratum in tabella, siue alueolo diffusas congestasque significat. Proinde in hoc usu Græci sic loquuntur, *ἄκων λάγανα*, pro eo quod est, tracta facere. Hinc et Cera candida, Tractum dici a Græcis quoque: autor est Photion: a quo & uerbum *τραπαισιν*, pro eo quod, perficere, ac subigere, ut alba fiat Cera. Paulus quoque Ceram tractam, ad psoras commendat. Sunt & Cubi, hoc est, quadranguli, aut etiam quadrati, ex oleo, anetho, caseo. Quanquam Athenæus eos qui Romæ quadrati uocarentur, incisuris præinctos, & Bomilios a Græcis appellari prodit. Thargelos, qui & Thacysius: ita dici panem uolunt, quod primus e nouella messe fingit. Est & Samites, & Pyramus: quem nonnulli eundem cum Sefamite putauerunt. Thiagonos Dijs coquitur in Aetolia. Sunt & Dramices, & Araxis. Quanquam Dramin in Macedonia uocari, qui panis in Thessalia dicatur, nonnulli scribunt. Enicitem uocant, qui ex confracto, nec excreto sit tritico. Blemia porro calidus, & egregie subactus, ac Depsitus panis est apud Seleucum: quem nostri forte Depsitum uocent, ut est apud Catonem. Quanquam in Catone sunt qui Speuticium, a festinatione legendum putant: nec ut arbitror male. Brattimes, & Pityrites idem est, qui Furfuraceus, a quibusdam Euconos, & Teuconos appellatus. Nam Spolea, eum panem Græci uocant, quod necessarii duntaxat cognati: uescuntur. Est & Phacinos de lente, popularis Alexandriæ, ut scribit Athenæus. Opis pistori genus est, & quod Buccellatum ab Paulo, & Aetio uocatur. Iustiniani codex, & Marcellinus in militari annona grana connumerant, quæ bis coquat, a buccæa dictum. Est autem Buccæa, ut ex Suetonio colligit, idem fere quod bolus. Sunt qui Buccellatum, fermento putent carere. Plautus Rubidum panem cum nominat, uidet Nauticum accipe: quia sit bis coctus. De Placentis alius mihi locus est: & sane proluxa metio ea foret. In Amylo dicent, ubi & panis quedam grana, sed admodum pauca necessario libabimus. Alioquin & Placenta panis est, ut Athenæus inquit. Illud obiter attasse non fuerit inutile, genus id quod Itricon, & Itrion Græci appellant, a nostris Libum uocari, et neutro et masculino genere, ut Athenæus testatum reliquit. Ego non Libum simpliciter, sed Libum suminale interpretor, ut in Amylo docebimus. Cato Libum ex caseo & ouo condidit: ut autem legumina, ita & triticum si coquatur: appellationem habet nouam. Episo & faba Etnos, ex lente & aphaca Lenticulam, ex tritico Pyanum, & ut recentiores malunt, Holopyron uocamus. Aliqui fruges omnium generum in passo coctas Pyanon appellant. Vt mirer Iulium Pollucem, qui Pyanon quasi Cyamon, pro faba cepit. Chidron uero coctum triticum, ut Athenæus inquit, seu frustum far, ut Hieronymus: quasi molam falsam. Est autem Mola falsa tostum far, sale conspersum: quo uisumæ perfundebantur. Vlochyton græce dicta. Iulius Pollux Chidron sorbitionem ex tritico uirenti factam intelligit: quia uirens triticum Chicria ab Aristophane dicatur. Nam Pelanos apud Aristophanem, a quibusdam accipitur pro specie leguminis. Pausanias placenta genus accipit in Pelano. Euripides pro quacumque re concreta, gelataue.

A

Strabo lib. 17.

B

C^{apitulum} **H**ordeū optimū est candidū, purumq;. Id minus q̄ triticum alit. Pūfana tamen ob cremorem in decoctiōe redditū, plus alimentū prebet, q̄ polēta ex hordeo facta. Cōtra acrimōnias atq; faucū scabrici as, exulceratiōesq; pollet. Quibus etiā triticea pūfana p̄sidio est. Sed plus alit, magisq; urinā mouet. Lac abūde suppeditat, si cū sceniculi semine decocta sorbeat. Hordeū abstergit. Urinā ciet. Inflationē parit. Stomacho aduersat. Tumores cōcoqt. Farina hordeacea decoqnit in mulsa aqua cū fico, ut inflāmatiōes collectionesq; discutiāt. Duricias cū resina et fimo columarū cōcoqt. Cū meliloto aut et papaueris calyce dolores finit q̄ latus ex cruciant. Aduersus intestinorū inflatiōes, cū lini semine, scenogræco, & ruta, illini iuuat. Strumas cū pice liqda, cera, oleo, & impubis pueri urina, ad cōcoctionē perducit. Et cū myrto, uino, malicorio, syluestribus pyris, & rubo, alui pfluuiā sistit. Podagricis inflāmatiōibus, cū cotoneis, aut aceto pdest. Decocta in acri aceto, modo quo hordeaceū cataplasma, & calida imposta, lepris medetur. Liquata eadē cū aqua, atq; cū pice decocta, pus excitat. Cum aceto liquata itidem contra articulorum fluctiōes prodest. Farina ex his aluum cohibet, inflāmatiōesq; mitigat.

BARBARI COROLL.

Pli. eodem ut
supra.

Strabo lib. 10.

D

Ordeum, Chymistæ Lutum Vulcani appellant, in græcis codicibus. De Ordei radice, ortu, herba, flore, spica in tritici mentione diximus. In Aegypto metitur sexto mense: aliubi multo tardius. In Chalcia, Rhodiorum insula, celerrime qdam loco. Itē Messanē in Sicilia, ubi Mylas uocant. In India syluestre nascitur, iocundum in panis esu. Hoc egs appositū Alexandri, necabat eos primo; deinde in palea exhibitū, paulatim desijt esse noxium. Fundit hoc in brachia, quemadmodū & Crithanias, hoc est, ut supius dixi, Ordeago. Ad Cedropolin, in Thracia qd nascitur, iumenta non attingunt: cuius rei causa, ut Theophrasto placet, malus odor, etiā si nō sentit homini. Gna Ordei cōplura. Alijs granū rotundius, & breuius. Alijs maius, oblongius, et rarius. Aliud cādicat. Aliud uergit in purpurā, copiosius farina, ualidiusq; q̄ cādidū. Iā aliud binos spicarū uersus, aliud ternos quaternosq; habet, itē gnōs: nullū tū plures senis, cui spica folio perq; pxima est, amplitudinis & crassitudinis maioris. Hoc Achilleis, & Achilleias ab Hippocrate cognominatur: ob id ppenius obnoxii erugini. Erythē græci uitiū hoc appellāt, plenilunij fere accidens: qd & Rubigo frequētius dicit, ordeo q̄ tritico infestior. Eteocriton genus Ordei est tutū a Rubigine: qm incuruū nascat. Sunt & Leptides, a tenuitate dicta recēti oribus Græcorum. Nam Amphicaustis, in tragœdia Ordeū montanū significat, qd & Eustrō uocat. Differt Polēta a Farina ordeacea, q̄ torret polēta, nō farina. Polētā Græci Alphita, nō ut in Palladio corrupte legas, alphica. Itē Gerania, instrumēti nomine, quo pcutiunt lignos: & E-naulemata, p̄sertim cū uino et oleo. Ordeū Crithē et Cri, et Proconiō poetæ: q̄q; et triticū tostū Proconiō quoq; dicitur, & genus itē suffitus, Photioni. Galenus in Hippoc. Proconiū, polentā ex ordeo recentī, aut etiā ex ordeo nondū tosto, significari tradit. Ordeacei uero panis genus unū Mazā nominant, in ordeaceos panes deterrimum. Acrius polentā ordeacea, quæ sit humido conspersa, Mazā appellari testis est: quæ uidelicet mandat cruda cū defruto, uel melle, uel alio quo huiusmodi. Mazarū uero plura genera, siue nomina. Physten Attici uocant, quæ non multum subacta sit. Est & Anthema, & Ephicois, & Concon, & Tripte, & Cādamale dicta, & Berex, siue Barax. Alij Caryx, etiā Caryce, a nigricia nomen habens, non a nucibus. Distinguit Berex a Caryca Iulio polluci, et Tolypa, et Thridacina, siue Thridactila, et Anemolos. Itē a uino Oenutta, sicut a melle Melirutta. Nam Achilleos uocata, ex ordeo cui Achilleis nomen est, constare creditur. In nomine sunt et Cypria, et Magidis. Hesiodus Amolgeē dictā meminuit, quæ nihil aliud sit q̄ recens. Iis uero quæ in sacrificijs Trophonij degustandæ præbebantur, Melitutte, Arefte, & Hygse nomen erat. In summa, laudatur Lydia, Caryce, Eretria. Præ-

fertur omnibus Conchos. Maza in latino non habet nomen, nisi quis interprete panis offam, ut ipsi quandoque fecimus. Et ante nos Theodorus gaza, Offam, inquit Festus, abscisum globi forma nominabat, ut manu glomeratā pultē. Frumenti genus est quod ueteres Ador, & Edor, & semē Adoreū, & Far uernaculū, aut etiam Vermiculū uideo appellasse: ab edēdo: uel qm̄ adu-
rebat, ut tostū fieret, ex quo mola salta in sacrificijs, & Adorea pro laude. Nam Ordeum eti-
am Sifar quandoque dici solet. Leguminibus ferē ascribitur, quia ex eo pisanā fiat, ut Columel-
la inquit. Inuenio tamē & Sacrum ordeum a Græcis uocari Didalida: quasi eo pro farre ac mo-
la salta ufos existimare liceat, si Photioni credamus: qui & Cāchryn dici frictum Ordeum nota-
uit. Galenus plurali tantum Canchryas pronūciat. Singulari uero non Ordeum fri-
ctum, sed radicem Libanotidos, hoc est, roris marini, ab Hippocrate significari cōmonet. Con-
fractum porro indiligenter Ordeum, Ericidas idem Hippocrates appellat. Seminis porro Ado-
rei quatuor sunt publica discrimina. Far Clusinum candidius, ac nitidum. Far quod uocat Ver-
miculum, rutilo colore. Far Candidum, maioris utriusque ponderis quā Clusinū. Quarto genere se-
men trimēstre Halicastrum uocatum, pondere, bonitateque præcipuum. Ordei uero illæ differen-
tiæ. Cantherinum quidam & Exhastichū appellāt, animalibus quæ ruri sunt pascendis utilius,
& homini quæ melius, quā malum triticū, fragili culmo, & nulla uestigum palea, celeriterque deci-
dens, ac tritu facile. Aliud genus est, quod Distichō, siue Galaticum uocamus, ponderis & can-
doris eximij: quod Oryzā esse quidam interpretantur ætate nostra. Græci, quemadmodū Far
ipsum uocent, nisi Ordei appellatione contineri dicant, haud scio reddere.

De Zytho. CAP. XCVII.

EX hordeo potus fit, cui Zytho nomen est. Is urinam cit. Renes & ueneruos tentat. Membranis, præsertim cerebrū uestientibus officit. Inflationē parit. Vitiosum succum creat. Elephantiasin. Qui eo potus ge-
nere perluitur, agilis, & ad opus obeundum expeditus euadit.

De Courmite. CAP. XCVIII.

Fit & ex hordeo potus quem Courmi nominant. Eoque sepe potu, pro uino utuntur. Verum dolorem capitis mouet. Malum suc-
cum gignit. Neruis nocet. Consimilia etiam potus genera ex tritico fieri
solent in Britania, & quæ occidentem spectat Iberia.

BARBARI COROLL.

Zythus, & Zythum dicitur, & Græce uulgo Phocadion. In Aegypto sitideoque a poetis
quandoque Pelusiacus potus uocatur. Madescunt aqua fruges, donec resoluantur in liquorem
uino similem. Inebriat hoc, & acre gustu est: quoniam ex putrilagine acescente constat. In Me-
diæ montanis, septentrionali situ, gentes uini loco succum e radicibus quibusdam ebibunt.
Curmi porro fortasse hoc sit, quod Cersisiam in Gallia uocant, & Curmi, Curmithos insle-
ditur. Possidonius homo stoicus, non Curmi, sed Corma appellat. Inuenio & Celiā, & Ceriā,
undē Sibera, & Sicerites uinū forte nominet. Quamquam Hieronymus in ea uoce, quā uult Hebrai
cā intelligi, accipiendū esse dicit omne potionis genus, quod inebriare possit bibētes. Id autē pluri-
bus omnino modis ac nominibus, ratione tū una fere ubique. Hispani iam et uetustatem ferre ge-
nera ea docuerunt. Spuma uero dum resoluitur frumentū concreta, utuntur fermenti uice: quā
ob causam leuior illis quā cæteris panis est. Aristoteles Pinū uocari tradit, quod ex ordeo fit uinum.
Hoc qui sunt temulenti, nō in omnē partem cassabundos corruiere, ut cæteri, sed retrorsum dū
taxat, ac supinos. Paulus uinum quod ex sordibus uellerum elutis conficitur, Pinon uocari pu-
tat. Sophocles, Aeschylus uinum ex ordeo Bryton uocant, non Zython, aut Pinum. Est & apud
Theophrastum Bryton. Hellenicus & ex oryza Bryton fieri cōmemorat. Fit & e milio, ut
Athenæus testis est. Nam Cyceon homericus aliud genus erat: id ex mixto farina caseo consta-
bat, in sorbitionis usum. Sunt qui Pinon pro uino capiant, quo lanæ cum sordibus suis lauā-
tur, atque ita siccata reponitur. Illud notatione dignum existimamus, Dioscoridem eburi scri-
bere maceratum Zytho, facile tractari. Plinius non eburi, sed ipsum animal tractabile hoc mo-
do reddi prædicat. Cæterum inquit, Elephantū masticantur ordeis succo.

EX M. VERG. COM M.

Antiquum est, ex frugibus fieri pocula, quorum ad ebrietatem non minor quā uini etiam uis
est.

A

fudo

B

xviii

Pli. li. 22. ca. 25.

D I O S C O R I D I S

C est. Nec nostra ætas eadem sibi parare his locis defuevit, quibus negata uina, ex quo non satis homini aqua est, quod eorum uicem expleret, quærere sibi homines coegerunt. Inter ea Zythus quondam fuit, qui ex hordeacea fruge madida fieret. Meminerunt Zythi Plinius in naturali, Diodorus Siculus in Gætium historia. Meminit & in carmine suo Columella, Aegypti inuentum & usum Zythi ostendens, cum cecinit. Iam Sifer Assyrioque uenit, quæ semine radix. Sed & præbetur madido satiata lupino, Vt Pelusiaci proriter pocula Zythi. Veteres grecorum medici, acrimoniam habere Zythum dixerunt: quoniam ex corruptione factus esset. Frigidum præterea: quoniam acorem haberet: ideoque mali succi esse. Quos autem in medicina usus habet Zythus, & hic, & alij manifeste dixerunt.

Z De Zea, seu Semine. **C A P. XCIX.**
Ea duorum generum est. Vna simplex. Altera in geminis putaminibus grana bina iuncta gerit. Ob id Dicoccos appellatur. Plus quæ hordeum alit. Ori grata. Digerit in panificia, minus quæ triticum ales.

Pli. li. 22. ca. 25.
lib. 13. cap. 8.

Z B A R B A R I C O R O L L.
Eam nostri Semen dicunt. Hæc si seratur pinsita, hoc est, tusa, transit in Triticum, ut Tiphaz idque uon protinus, sed anno demum tertio: nunquam contra. Nihil hac robustius, terramque magis exinaniens, radice alta, multiplici, culmo numeroso, fructu facillimo, cunctis animalibus iucundo, simillima tritico aspectu quemadmodum & Tiphaz. Soli non quædæ, ut Tiphaz, sed lictum, pingueque desiderat. Zea & in Bromo dicta comeat. Dionysius halycarnalleus latine dici Fabulam existimat. In Catode porro Fabulus albus, faba candida ut arbitror significat: quæ bubus cum languent, dari precipit. Vt in Columella deprauate legi putat. Balbulos albos in cura Boti, per Fabulis albis. Dioscorid. certe Papauer albus, a Romanis Fabiolu uocari tradit. De hoc lectore ad fabam mentionem differo. Zea, Zeteis, & Zontio, & Zostiō apud Aristoph. in comœdia. quæ Babilō inscribit, locus uocat, quo seruitia puniendi mittebant. Meminit & Pollux. Ad quod alludit poeta noster comicus in Aſinaria (ni fallor) cum dixit, Qui polentam pransit, & ubi uiuos homines mortui incurſant boues. Gregorius Tifernas in Strabone Zeas interpretatur, rustica potius quæ latina uoce Speltas: credo quæ Rhemiutis Palæmō prior usurpauerit in carmine de poderibus, ac mensuris, quod tamen Prisciano grammatico inscriptum circūferit, Octo inquit speltas pedere scrupulū.

D Nihil difficiliorem medicæ materiæ cognitionem semper fecit, & adhuc facit, quæ quæ non eadem ubique omnia sunt: neque ubi eadem sunt, iisdem nominibus appellantur: & quæ quo communius aliquid humano generi natura fecit, eo facilius neglectum ignoratur. Idque in frugibus animaduertisse licet: in quibus nulla alicui certa huius, aut illius ex antiquis scriptoribus indicatio nunc esse potest, cum tamen nihil in illis frequentius inueniatur. Fecerunt id mutata per tempora earum appellationes: sed multo magis, quod paulo ante diximus, neglecta communia, et quotidiana natura bona: & ut in Zea, de qua nunc agimus, accidit. Eam Plinius, Theophrastusque tritico similem & hordeo dixerunt, ab Homero nullo non fere carmine laudatam. Posteriores non tam nunc frugem, quæ Speltam rura nostra appellant, esse eam existimarunt. Nec huius scriptoris descriptio & historia, ab ea seminis forma penitus distat. Plinius in Italia, præsertimque in Campania feliciter prouenire lib. 13. ca. 8. restatus est: priuatimque semen appellari præclarum, ut ille ait, re. Quam in medicina ueteres grecorum medici, tritico similes habere uires dixerunt, medioque in Plinius restatus est. De qua non multo post dicemus. Esse autem tritico similem Zeam, Theophrastus præcipue, s. de plantarum historia uolumine ostendit.

C De crassiore Farina. **C A P. C.**
Crimnon crassior est ex Zea, triticoque farina, ex qua pultem faciunt. Abunde alit. Facile conficitur. Aluum uehementius adstringit, si Zea ex qua fit, prius torreatur.

C B A R B A R I C O R O L L.
Crimnon fortasse hoc est, quod Cremor latine dicitur, ut succus a cremore differat sola crassitudine. Interim confunditur. Cornelius Celsus cremorem pisanæ pro succo fere accipit. Crimnon & Hordei genus est Phorion, et Cycëonis homerici liquamentum. Hippocrates Crim-

nodeas urinas pro crassis, & ad similitudinem farinæ tritici corpulentis accepit, ut Galeno placet, in Aphorismis, sicut alias eruo, alias frondibus, alias furfuribus haberi similes docemur. Nā Crymodes aliud est. Ita uocatur febris quæ pulmone, sacris ignibus correpto prouenit: sicut Lepyria, quæ stomacho, & Typhodes, quæ iocinere. Pultem Græci Polton, et Poltarion appellat. Plinius, Calidam inquit potionem in pultario poposcit Offilius. Vt Pultarium aut pro uase, aut pro forbitionis genere accepit. Puls certe, ut Aetio placet, omnis forbitio uocatur, quæ aut de leguminibus, aut cerealibus granis coquendo in succum resolutis conficitur.

E. X. M. VERG. COMM.

Artis, non naturæ opus Crimnon quondam fuit, idem Romanæ Pultr, qua quondam Græcia pariter & Italia pro pane usæ est: manifesteque id Plinius lib. 8. cap. 5. testatur, Pultr, non pane longo tempore uixisse Romanos dicens. Translata deinde ad medicinam res est, relictaque uere appellatione, posteriores Græcorum medici, non crimnon, sed πολτόν, aut πολτάριον .i. Pultr, aut Pultriculam appellauerunt. Sic Paulus Aegineta, sic ante eum Galenus aliquando dixerunt. Fieri autem solitam præcipue ex hordeo, nomē testatur, ἀπὸ τῆς κριθῆς enim, id est, ab hordeo, κρίνον dicta est. Vtilior deinde deprehensa fuit quæ ex Zea, & Tritico fieret. Qualis deinde ea esset, satis hic ostendit dicens. Crassiorē quæ farina sit cōfectione, trituraque Crimnon esse. Post hunc Paulus Aegineta lib. 6. de eadem agens, Crimnon, id est, Pultrē appellari ait, quod ex Tritico & Zea crassius esset. Ceteri Græcorum medici eam his uerbis diffinierunt. κρίνον καὶ πολτὸν τὸ παχυμερὲς οὗτος ὀνομάζεται, ἢ τὴν πυρίνου καὶ τοῦ τῶν λίων ἀμύρου. Quod est, Crimnon, siue Puls dicitur, quod in Tritici & Zea farina crassum & crassiorum partium est. Poteritque quanta & qualis hæc crassitudo farinæ in Crimno sit, cupiens nouisse, si quas Hippocrates, & posteriores Græcorum medici κρίνωδους urinas appellant, aliquando uiderit, in quibus corpulentioris farinæ similes nubeculæ apparent: quasque Plinius lib. 23. furfures, & nubeculas appellauit.

De Siligine. CAP. CI.

Et de M generi Siligo adscribitur, sed minus aliquanto nutrit. δλυσ
In panes ut Zea cogitur. Fit quoque Siligine crassior farina, quam B
Græci Crimnon uocitant.

B A R B A R I C O R O L L.

Olyra, Siligo a nostris uocatur, autore Plinio, Catoni quoque genus est tritici. Siligo locis apertis, cellisque ferenda, & ubi sol quædiutissime sit. Vitium est Siligo tritici. nam omne triticum solo ulginofo, post tertiam factionem, conuertitur in Siliginem. Est & Olyra Galliarum propria quæ cognominatur Arinca, uel Italiæ copiosa. Theophrastus Olyram folliculo describit multiplici, ut Tipham, sed Bromo & Zea molliorem, infirmiorēque. Sit autem siligo, quam nunc rustici Secale uocant, ambiguum est quibusdam, non mihi. Plinio certe farraginis & pabuli genus est Secale nominatum, occari tantum desideras. Hoc inquit Taurini sub Alpibus Asiā uocant, deterrimū, & ad arcendā famem utile, foetundā, sed gracili stipula, nigritia triste, sed pondere præcipuum. Admisceatur huic far, ut mitiget amaritudinem eius: & tamen sic quoque ingrassimū uentri est. Nascitur qualicūque solo, cum centesimo grano, ipsumque pro letamine est. Farrago autem ex recrementis farris prædensa feritur, admixta aliquando & uicia. Eadē aliquando Africa fit ex Hordeo, unde hordeacea Farrago dicitur. Hæc esse puto, quam Græci uocant Cratin, ut est apud Aristotelem, siue quod idem est, Graftin. Interpretantur enim Graftin, uires hordeum. Alij Crastin dicunt, & fenum semiaridum intelligunt, utique Pollux, quod & Poam, & Chilon uocant, atque Chontōn. Fit igitur optima Farrago, cum cantherini hordei .10. modijs iugurum obseritur. A farragine Farraginarum deducimus, pro loco ubi Farrago feritur. A Siligine differt radícula: quam pastores Consiliginem uocant, in Maris montibus frequentem, omni pecori maxime salutarem. Corrigendus in Columella est locus, ubi de Consiliginis usu loquitur, circumscribendum esse ita, manante sanguine, tanquam oliuæ reductum appareat. Legendū est, Tanquam, o, literæ ductum appareat. Hoc in transitu monuisse quid officiet?

E. X. M. VERG. COMM.

Congener, & ut Theophrastus ait ὁμοίοντρος, quod est, tritico similis Olyra est. Semen eius antiquiores Græci figura inter triticeū & hordeaceū tradiderunt. Longa est Olyræ in Plinio historia: nec in Theophrasto breuis. Collectaque ex his scriptoribus simul oia, eā indicare frugē uidetur, quā nostra tempora Secalem uocant: non tamen id pro cōperto habemus. Quod certū sit, inter tritici grana, aut tritico similia ab omnibus numeratur, Græciæ magis & Aegypto quam Italiæ pecu-

Cliaris: & ob id in gentibus illis felicioꝛe prouentu, magisq; nota. Siliginis nomen huic aliqui etiam cōmunicauerunt. Sed si Columellæ grauissimo rei rusticæ scriptori credendum est, Siligo secundæ conditionis triticum est. Verba eius sunt. Triticū genera plura cognouimus: uerū ex his maxime serendum est quod Robus dicitur: quoniam pondere & nitore præstat. Secunda conditio est habenda siliginis, cuius species in pane præcipua pondere deficitur. Habent nihilominus qui Olyram siliginem non dixerunt, latinos alios autores, quibus tueri rem suam possunt. Sed nos, qui ex professo hæc docuerunt, libentius sequimur. Vagæ rerum in gētib; ap-
pellationes, nec ubiq; eēdem res, diuersitati, & incertitudini huic causam dederunt.

αθήρα

A De Athera, idest, tenui pulcicula. **C A P. CII.**
Athera ex Zea fit tenuissime molita. Est autem sorbitio, quasi liquida pulcicula infantibus conueniens, & cataplasmatibus efficax.

Plinius lib. 13.

B A R B A R I C O R O L L.
EX Olyra Atheram constare Plinius, Dioscorides e Zea scribit. Aetius etiam ex amylo. Familiaris Aegypto Athera ex Siligine, hoc est, Olyra; quæ ut dixi Arinca dicitur. Iulius Pollux, Atharen uocat pultem e miliacea farina. In Plauto, Atharathrion compositum uidetur ex Athera & Thrio, quod placentæ, aut libi genus est, dictum a folijs fici, quibus circumdatur: aut seorsum utrumq; legant, qui eius poetæ studiosi sunt. Potest & Athara, & Oathrion legi, ut est apud Alexin comœdiarum scriptorem. A quo locus is in Plauto festiuissimus, ex persona cōfici sumitur: qui & Candauli mentionem habet. Erat autem Candaulos, siue Candylos, miscella ex carne cocta, pane, caseo phrygio, ut Athenæus inquit. Vt Photion, ex lacte, ac melle: qui & Amæracem tradit heroicū edulium fuisse. Dicitur & pinnula ea quam sub uentre habent thynnides, Athera, ut inquit Aristoteles, sed ut sit Tribrachys.

B A R B A R I C O R O L L.
D Non uidetur Athera hæc a Pulte, nisi liquidiorē habitu differre. Nec Paulus Aegineta aliter eam sexto uolumine descripsit: pulciculam sorbilem ex tritico, zeauē emollitis confectam esse Atherā dicens. Obseruauimus tamē ex olyra, amylo, & milio factam pultem, Atharam pariter dici. Plinius Aegyptiorum uocem Atharam esse dixit. 2. uoluminis ultimo capite: a græcis tamen recepta, non ad pultem tantū, sed ad tubercula quæ in homine aliquando extolluntur ea uox est: quibus qm̄ subest ueluti tenuis et dilutior pulcicula. Ab Athara hac Atheromata in t̄ abscessio dicemus.

τραγος

T De Trago. **C A P. CIII.**
Tragos quandam Halicę figuram gerit. Multo minus quā Zea nutrit, q̄ multum aceris habeat. Quare agrius conficitur. Aluumq; magis emollit.

Plinius lib. 13.

B A R B A R I C O R O L L.
Tragos cognomine Sitodes, hoc est, Cerealis, ut ab herba Trago distinguat, frumenti genus est. In Hippocrate quid sit Strygis, quod ipse leuius esse tritico, & uentrem magis soluere testatur, non comperi, nisi quis pro Trago Strygite capiat.

E X M. V E R G. C O M M.
Non habet in græcis unam significationem tantum Tragus, sed animal, herbam, frugem, & qui sub alis sentitur uirosū odorem significat. Ideo in frugis significatione, Tragon *αἰσάδα*, id est, Tragum frumentaceū ueteres aliqui frumenti genus hoc appellauerunt, peregrinum Italicę. Cuius breuissime Plinius meminerit, nec ultra: q̄ ut diceret, ex omni eodem genere granī prætulit Oreuntium, & Tragum. &c. locus est libro decimo octauo, capite septimo. Quinetiam capite eiusdem libro decimo. Inter peregrina Italiæ tritici genera Tragus hic numeratur. his uerbis. Adijciunt his genera bromos, siligo exceptitia, & Tragos externa, omnia ab oriente inuecta. Est & ilud ex eodem Plinio intelligendum, non frugem tantum ipsam, & tritici genus, Tragum dici, sed quæ ex semine eius pisanæ similis ad medicinam conficeretur farina. Verba eius eodem capite sunt. Pisanæ conficiendæ uulgata ratio est: simili modo ex tritici semine Tragum fit in Campania tantum, & Aegypto. Hic Tragum figura similem Chondro ait, non

fatū certo intellectu, similem ne frugi dicat, quam græcorum aliqui Chondron, id est, Far nominant, an Alicæ, quæ passim Chondros etiam uocatur. Vtrunq; enim Chondros in græcis significat: si qua hic usus est uoce χῆμα, & eius tota significatio expendatur, ad frugem potius, q̃ ad alicam referenda similitudo uidebitur. Frugis enim figura aptius q̃ alicæ dicitur. Si ea quæ mox hic de Chondro ait, ad alicam magis q̃ ad frugem. Chondron siquidem alicam, non frugem uocat. Nobis inclinatur animus ad frugem magis, q̃ ad alicam referri oportere. Legentibus tamen & hoc liberum relinquatur.

De Bromo.

CAP. CIIII.

BRomus genicula quædam habet. Folio & stipula triticum imitatur. Et in cacuminibus dependentes paruulas ueluti locustas gerit, in quibus semen continetur, utile ad cataplasmata uti hordeum. Pultr huius aluus sistitur. Prodest tussientibus in sorbitione succus.

B A R B A R I C O R O L L.
Bromos correpta prima, semen est spicam ferentis herbæ, de qua & libro quarto seposita mēto est: hic enim de grano ipso potius, quia sit inter fruges, disseritur. Semen hoc natura maxime operuit, ut Theophrastus inquit. Radice copiosa innititur, multiplici culmo sparsa, syluestri fere habitu, quasi ægylops, inter uitia segetis, auenæ modo nascitur, dependentibus, ut Dioscor. inquit, locustis, ut Plinius, lolijs. Poetæ Bormon, & Bormacem quoq; dicunt interim.

EX M. VERG. COMM.

Quis non credat, Hauenā. cūctis notissimā frugem, hoc capite a Dioscoride describitur tam apposite in eo pictura naturæ rīdet. Quis etiā in hoc scriptore adeo incautus fuerit, ut quæ inter Bromon, & Aegyloper, alterā in frugū, alterā in herbarū genere discrimina sunt, non facile sola eius lectione statim intellexerit? Toto em̄ genere, & partiū notarūq; historia differunt. Hæc inter congeneres fruges a Dioscoride numerat, & describit, magno argumēto Bromon Hauenā frugem esse: illa inter herbas. Hæc culmū habere dicit: illa *Bordunor*, id est, Herbula **B** appellat. Hæc in summo dependentes paruulas ueluti locustas, duplici crure diuicatas habet, in quibus semen est: illa in cacumine καρπὸς, id est, q̃d semen continet, duos, tresue colore rubētes habet, ex quibus ariste capilli figura prodeunt. Hæc in medicina ad cataplasmata & tussim utilis: illa ad oculorū ægyloper, & discutiendas duricies uim habet. Et ne longiores simus, quis non credat aliā ab Aegylope Bromon. i. Hauenā esse? si Paulū Aeginetā. s. uolumine legerit seorsum de utraq; agentem: & utriq; quæ sua sunt assignantem. Hanc similes hordeo uires habere, quibus leniter & sine erosione siccet, habere itidem aliquid quod adstringat, eamq; ob causam alui fluores compescere: illam discutiendi tantū habere uim, qua duricies, inflammationesq; & oculorum ægyloper sanat. *Erit quarto uolumine in Aegylope iterum de his dicendum:* quæ nunc causa est, ne in re nota ultra q̃ deceat immoremur. Quodq; nunc dictum est eo pertinet, ne quis ex eo quod Barbarus in Dioscoride ait, Bromon Hauenæ genus esse, & in Corollario de grano tantum Hauenæ dici hoc loco, de herba autem in quarto, eandem Bromon & Aegyloper huic scriptori esse opinetur, & hic de semine, in quarto de planta sub diuersis nominibus actum a Dioscoride fuisse.

De Oryza.

CAP. CV.

ORyza frugum generis est, in palustribus riguisq; nascens. Medicocrem cibum præstat. Sed aluum suppressit.

B A R B A R I C O R O L L.
Oryzam, Theophrastus Oryzon uocauit. Quidam Ordeum galaticum, quia graue sit atq; candidum, appellant. Peregrinum initio semen, ex Indiaq; illatum, simile Zeæ aspectu folij, magna parte in aquis cubitorum quaternum altitudinis: ceterum effundit non spicam, sed mihi modo ac panici iubam. In Bactrianis quoq; ac Babylonia, & Suside, atq; Syria inferiore gignitur. In Italia uero multis locis. Indi hanc Farris, seu Zeæ modo pistam reddunt concoctus faciem. In eadem gente Bosmorus, frumētū religiosi genus traditur, tritico minus. Inter amnes prouenit, excussum areis corretur protinus. Iuramentoq; adiguntur messorēs, non absportaturos id se prius inde, q̃ coxerint: ne semen in alias terras comunicari possit, Strabo auctor. In Diodoro Bosporon, non Bosmoron corruptis exemplaribus intuenias.

D I O S C O R I D I S

E X M. V E R G. C O M M.

C Nota omnibus etiam Oriza, parati & quotidiani in sanitate usus, præsertim quibus locis abundat. Descripsisse eam inutile, & inanis iactantiæ fuerit. Quod veteres Græcorum medici ei tribuerunt, est: ægre concoqui Orizam; exigui nutrimenti esse; & quod hic ait, aluum subprimere.

De Halica.

C A P. C V I.

χώρα

Halica fit ex Zea, quam Dicocon appellauimus. Plus alit quàm Oryza. Aluum magis cohibet. Stomacho longe utilior. Decocta in aceto, illitaque, lepras tollit. Vnguium scabrias extricat. Incipientibus ægylopijs medetur. Decoctum dysentericis, quos excruciat dolor, infusum idoneum est.

B A R B A R I C O R O L L.

Alicam Theodorus hanc interpretatur, quam Græci Chondron uocant; quod & Plinius quandoque facit. Paulus Alicam differre a Chondro putat. Alix inquit, similis Chondro est natura; nisi quod uentrem magis subprimit. Plinius, Alicam inquit, res Romana est; neque Pompeii magni ætate in usu fuisse traditur, pisanaque antefertur sine dubio. Pisana Græcum uerbum est, & Pisana quoque dicitur, & olim græce Besana. Chondros porro, ut Paulus ait, similis est tritico, plus tamē lentoris habet si cōmanducetur. Hippocrates Chondron dicit esse utilissimi cibi forbitionem. Aetius Chondrum Alicæ cum dicit, Pisana ex Alicam significat, hoc est, Alicam faris, modo fream, in forbitionis usum, ut pisana. E Zea pista quemadmodum Chondros fiat, ut ex Olyra quoque generosa Tragos, rei rusticæ scriptores Græci produnt. Inuenio & Hadron dici, quæ sit Chondros. Alix, & Alicion uocatur. Quæ Alix Calliæ, hoc est, Chlamyde accipitur. Thessalico uocabulo Chondros, & cartilaginē significat, & melleum in ture, præsertim ceu quendā callum: quæ & Pyrena Hippocrates appellat. Oino Chondros ea frumenti spēs a Græcis intelligitur, quæ a nostris Far, siue Farrum uulgo nuncupatur. Archigenes Far Chondro potius simile, quod idem uidetur existimasse. Far inquit Romæ, ut Chondros, Græcis conficitur sanitatis usu. Frumentū aqua maceratum nudatur cortice; mox siccatur in sole tunditur, sed leuiter, ita ut singula grana in partes quaternas, quinasue dissiliant. Idem Archigenes (ut meminuit Aetius) pulre ad dysentericos, ex Farre quemadmodū conficiatur docet. Ad eumque usum Far, inquit, clusinum desydere. Ita enim legendum credo, non iliusinum, ut omnes Græci habent codices. De clusino Farre dictum est supra ex Columellæ sententia.

E X M. V E R G. C O M M.

Romana res, inquit Plinius, Alicam est. Nobis eam cognouisse Hippocrates etiam uidetur, multo ante eum medicinæ professus. Plures fuerunt latinis & græcis Alicæ confectiones: quas fere omnes idem scriptor lib. 18. cap. 11. prosecutus est. Quam tamen ille confectionem cui Gypsum adijceretur Africæ assignat, Græci ut suam uendicant: & hoc modo conficiunt. Tunditur Zea; tusaque in calidam conijcitur aquam: statimque exprimitur. Mox tustum in tenuissimum pollinem album, illi gypsum exigua quantitate additur; adpersoque itidem sale sub ardentissimo canis estu, ne acescat, insolatur: & cum insolata fuerit, cribratur, & seruatur. Hæc nos ex græcis collegimus: quibus non dissimilia Plinius antedicto uolumine narrat: quæ relinquimus omnibus parata, & in eo scriptore exposita.

De Milio.

C A P. C V I I.

μύλον

Milium in panes coactum, minus cæteris frugibus alit. Siftit pulre sua aluum. Vrinam cit. Torretur Milium, feruensque in sacco ponitur, ut torminibus, reliquisque doloribus auxilio sit.

B A R B A R I C O R O L L.

Milium intra quadragesimū diem metitur. Caulis ei harundineus. Flos lanugineus, ut frumento, largior aquatio detrahit folia. Plus centū manet annos, si condat quo uenti non perueniant. Nihil leuius, mollius, aut caloris capacius Milio est. Farinā milicæam, seu fractū Milium, sunt qui Scrutū uocari putent in Horatio. Sunt quibus uasis potius appellatio ea uideatur, ex Scroto, id est, corio confuti: quod genus Græci Thylacos, id est, folles, & quasi pasceolos dicunt. In quibus tamen, ut est apud Aristophanē, panis quoque seruabatur: cuiusmodi & Panariū, & Pa

nariolū a nobis cōmode uocari potest, quacūq; constet materia: quæ uox in Varrone, & Papi-
nio poëta, & Martiali, Suetonio, Tranquillo legiū. Nos de Scruto quid sentiamus in Cicere di-
cemus. Nam Miliariū uas a pondere, non a Milio nomen habet. Est autē, in quo excalescunt a-
quæ, ut Athenæo placet: qd e Græcis aliqui appellant Ipnolebeta, id est, caldariū. Porro Miliū
a miliaria summa deriuatū, non a græco, Festus existimat: apud quos Cenchros, & Strabonē
Cenchrys diciū. Hippocrates Paspalem uocauit. Varro Miliū a græco deducit. Nam id Meli-
nem inquit uocant. Dioscoridēs & Theophrastus Melinē, pro Panico intelligiū. A Milio, aues
quædā Miliarie dicunt, ut eidem Varroni placet: quas ego non ausim eas credere, quas a Mi-
lio Græci Cenchridas appellant: q̄ illæ uideantur in latino Tinnunculi uocari.

EX M. VERG. COMM.

Milio posteriores naturam & uires assignarunt, refrigerandi in tertio, siccandi uero in se-
cundo ordine. Habere præterea uires extenuandi aliquas Milium crediderunt, nihilq; ad con-
cipiendum & retinendum calorem aptius eo esse.

De Panico.

CAP. CVIII.

Panicum frumentaceis seminibus annumeratur, milio simile. Eo-
demq; modo in panes subigitur. Eosdem habet usus. Minus ta-
men & nutrit & stringit.

BARBARI COROLL.

Panicum Helymos, etiam Melinos a Theophrasto dicitur. Nelinos porro cantionis græce
nomen est. Item Elynos, siue Linos, lugubris eiulatus, quē nos Lessum dicimus. Tibiæ genus
quoddam apud Sophoclem uocatur Helymos, ut in Harundine docuimus. Quadagesimo
die absolui confectū, ut æstiuā omnia. Calamus harundinis, ut milio. Flos lanuginis. Durantissi-
mum inter frug. panicum. Ideoq; Diocles medicus, Mel frugum merito appellauerit. Seras
uermiculos, & quibus Sericum uellus metitur, Panico ali quadriennio apud Seras populos,
trahit Pausanias: quinto anno Harundine recenti, quam prædulci pastu auidius carpentes dis-
siliant. Alioquin non ultra eum finem uicturi. Ex utero Bombycem eam peñi, multo fertilio-
rem q̄ uiuentium, detractam pedibus, quos araneorum modo sub arbore texentium octonos
habeant. Esse autē corpus ijs amplitudine scarabei maximi. Seras ipsos in Aethiopia sinum ru-
bri maris intimū colere, uel ut alijs inquit, placuit, in Scythia Indis contermina, qua insulæ ia-
cent Seria, & Abasa, & Sacæa, nihil contendo, uerum, falsumue dicat. Scio & ab alijs de hoc ia-
ctata. Illud testari bene est, Seras uermiculos, iam pridē in Italia tam multos ali, Vicentino ma-
xime agro, ut non alia re prouentus quibusdam maiores consent. Sed hos non Panico, non
Harundine, sed Mori folio uesci: ob id, multis locis plantaria sunt eius arboris frequentia. Cir-
ca Mediolanū quoq; Abiterinō agro seritur, alias non magnopere in illis uisa regionibus, nunc
crebra in latifundijs Ludouici Sfortiæ, clari ætate nostra Principis, prædij eius ad Ticinū
amnem, uilla magnificentiſſime substructa.

EX M. VERG. COMM.

Fœminino genere Melinen, & masculinō Melinon, Theophrastus Panicum notissimam o-
mnibus frugem uocat. Romani a paniculīs in quibus semen est, Panicum appellauerūt.

De Sesama.

CAP. CIX.

Sesama stomacho inutilis cibus. Halitus grauitatem facit, quoties in-
ter mandendum commissuris dentium inhæsit. Neruorum crassi-
ciem illitu discuit. Medetur auribus fractis, ambustis, inflammationi-
bus, coli doloribus, & cerastæ morsibus. Capitis dolores, qui æstuatione
ne concitantur, ex rosaceo lenit. Eadem efficit herba decocta in uino. Præ-
sertim inflammationibus oculorum, doloribusq; prodest. Ex ea fit ole-
um quo Aegyptij utuntur.

BARBARI COROLL.

Sesamum, & Sesama uocatur, & Plauto poëtæ Sesuma, caule ferulaceo, flore foliaceo, ut
Irion. Quadagesimo perficitur die. Genus ex eo candidum præfertur dulcedine: quod & in
cæteris leguminibus contingit. Grana eius in siliquis distincta, ut Lupini, sed peculiari quodā-

D I O S C O R I D I S

C modo septa. Viride nullum attingit animal. Nihil ita emacrat solum: ut pote cui crassior & multiplicior harundo sit q̄ Milio, & radix quoq; numerosior. Sefartia, & Sefania quandoq; le gas corrupte in Columella, pro eo quod est Sefama.

E X M. V E R G. C O M M.

D Esit iam pridē feri in Italia Sefamū, neq; inter fruges nostras numeratur, pauloq; minus q̄ peregrinum, & alienum modo nobis est: quondā tam cōmune, tamq; omnibus agris farum, ut æqua esset huius & aliarū frugum cura. Indicantq; id quæ tam multa de semente eius a Co lumella, Plinioq; & ab alijs docentur. Nouerunt tunc omnes Sefamū, nunc cum fruge mul tis locis nomen etiā ignoratur. Et nisi ex Græcia reperatur, & Aegypto, quibus regionibus ad huc feritur & abundat, nulla fere erit quæ ab hoc & alijs Græcorum medicis Sefamini olei ad medicinam utilitas ostenditur. Frugis oēm figuram Plinius lib. 18. capi. 7. aptissime & felici pi ctura descripsit. Ideo nos nihil de ea reperemus: dictis ab eo tantū adijcētes, candido colore semen eius esse, dulce simul & odoratū: quod minores aues, quales fringilla, passerēs, & car dueles sunt, auidius appetunt. Græcia omnis eo ad dulciaria utitur in panificio tritum, reliquo pani compingentes: mox in summa panis cute integrum addito liquore aliquo inspergentes, ut retineatur, & in coctura panis concorporetur, Aegyptus oleum ex eo exprimit, quo in cibo, & omni alio domestico usu utatur, tanta copia, ut amplissima latifundia nulla alia fruge uiuant. Nōstra ætas, ut paulo ante diximus, uix nomen eius audit, & si aliquando utatur.

De Lolio.

C A P. CX.

λίπα ούρα

L Olum quod inter segetes nascitur, molitum, illitu nomas, uetera ulcera, gangrænasq; emarginat. Sanat cum raphanis, sale & ace to feros lichenas. Et ex aceto & sulphure uiuo, lepras. Strumas quoq; dis cutit, cum fimo columbino & lini semine decoctum in uino. Abscessus etiam rumpit, qui acrius ad coctionem perducuntur. Decoctum ex aqua **D** mulsa, utilissime ischiadicis illinitur. Si cum polenta, thure, myrrha, aut croco suffiatur, conceptionem adiuuat.

B A R B A R I C O R O L L.

L Olū e Tritico & Ordeo, corruptis uligine seminibus, e lino quoq; nasci non desunt qui affirmant. Negant uernā esse frugē, sed hyeme statim ineunte proflire terra, folio angusto, hir suto, pingui, non tunicis, ut Avena multis, sed nudū: nec ptunditur. Quidā non ex tritico, aut ordeo, sed inter ea, ut in Sicilia Melampyron puenire putant. Inter Lolia flosculi uisunt, e car ne tantū, non e cortice atq; uena, ut ceteri. Loliū Græci Aerā uocant, etiam si Calimachus pro pila quoq; & globo Aeram accipit. Plinius certe aliud uidē genus existimare Loliū, aliud Ae ram. Vnde farina Aerina dicit, Aeræ inquit granū minishū est, in cortice aculeato. Cum est in pane, tam Aera q̄ Loliū inebriat, celerrimeq; uertigenes facit. Aiunt in Asia & Græcia, balnea tores ad pellendā turbā, solitos Aerā inijcere carbonibus. Triticū hæc circūligando se strangu lat. Plautus quoq; Loliū oculis officere testat in Milite: q̄q; non Lolio, sed Oleo corrupte lege batur hoc modo. Mirus oleo uictitaret, & tam uili tritico. Quid iam? quia lusciosus es. Sed scribendum ita fuit,

Mirust Lolio uictitare te, tam uili tritico.

Et reliqua. Ouidius,

Et careant Lolijs oculos uisitantibus agri.

E X M. V E R G. C O M M.

I nter uitia frugum & noxas Lolium est, omnibus nouissimum, macro solo plæruncq; proue niens, & cum degenerauerunt uitio aliquo frugum semina, inter eas nascens: neq; enim solum in triticea, sed in omni fere alia segete & perse etiam provenit: frugum acerba pestis, ideoq; a Poëta infelix appellatum.

ἀμύλλον

De Amylo.

C A P. CXI.

A Mylum ex eo appellatum est, q̄ sine mola fiat. Optimum ex tri mestri, natione Creticum, aut Aegyptium. Ratio faciundi Amy li hæc est. Purgatum trimestre triticum madescit quinquies in die, & si

fieri potest nocte. Cum emollitum fuerit, effunditur sensim sine agitati-
one aqua, quo minus cremoris dulcedo una excludatur. Vbi molli-
mum esse uidetur, mutata aqua pedibus calcari oportet. Rursus infusa,
teri. Tum demum enatantes ibi furfures incerniculo eximendi. Reli-
quumque quallo, sportisque siccatum tegulis nouis confestim torreatur fla-
grantissimo in sole. Namque si paulisper udum maneat, acorem concipit.
Contra fluxiones oculorum, pustulas, cauaque efficax est. Sanguinis reie-
ctiones potu cohibet. Exasperatas fauces lenit. Lacti atque obsonijs ammi-
scetur. Fit etiam Amylum ex zea, quae maceratur, ac eluitur uno aut al-
tero die, & farinae modo manibus subigitur: pressaque feruentissimo in
sole, ut ante retulimus, exiccatur. Nullius in medicina usus. Ad alia
tamen conueniens.

B A R B A R I C O R O L L.

Amylum ex omni Tritico, ac Siligine, ut Cato uoluit, sed e Sitanio, i. trimestri: quod item Siligi-
nis genus est laudatissimum. Inuentio eius Chio insulae debet, unde commendatissimum Plinium tempori-
bus. Probat leuitate ac leuore: utique recens sit. Quia uero etiam Placentae genus est Amylon, de
Placentis agere tempus est: quod & in Tritico pollicitus sum. Ergo patriae nomen habent Paria, &
Samis, & Rhodia: quae & Coptam, & Coptoplacunta noiant, insignem duricia, ut Martialis pla-
cet. Accipiebat haec & papauer, & mel, cui simile uidetur. In Festo Coctum dici legimus, & aliubi
Coccentum. Alexandrinis Pancapra celebrabat, in modum rotae Papyro inuoluta diuturnitatis gra-
tia. Similis haec res erat, quae Itria dicunt, & a festo Sumenalia, ut consilio, quod fumen *ἴτρον* dicat.
Constabat autem Itrion, sesamo, ac melle. Quae a sesamo & Sesamutes, & Sesamides pilari specie
appellant. In noie sunt & Amelon, quae alij Ametas, & Ametiscos uocant, sunt & Splenia co-
lore candida. Habent & Amphiphontes, sacrum Dianae ferunt, saculis urentibus circumdatis, ut Ba-
syniae, iridi, ex triticea farina cum melle. Celebrant & Thymatides, & Samiae, & Philoxeniae. Sunt
& Coccora, quorum meminit Demosthenes in oratione per Cresiphonte. Sunt & Tageniae, quae & En-
chridas uocat Pollux. Apud Catonem est, quod uocat Enchyton: cuius & Menander meminit. Ali-
ud hoc, an idem sit genus cum eo quod Epichyres dicit, aestimandum relinquo. Phorion nihil distinguit.
Pollux uidetur se iungere. Epichyros certe, atque Anites quoque noiantur, ut Paphilus existimat. Ca-
tonianae sunt & Spira, funi nautico in orbe conuoluto similis. Et Globi, siue Globuli: fortasse res,
quae Syracusani Epicydios uocabant. Nam pastillum in sacris libi genus rotundum erat. Item Erneum,
& Sphaerite, & Scribitae. Item Sauillum: quod Athenaeus Subityllum noiat. Et ex halica quoque fie-
ri monstrauit, Aelius stilio Subuculum uocari scribit. Libi genus ex halica, oleo, atque melle, ut Fe-
stus inquit. Chrysippus multa res genera adiungit. Tarentinum, Crassianum, Siculum, Crustulum, Iulianum,
Apicianum, Canopicum plucidum, Cappadocium, Hedybion, Maryptum, Plicium, Guttatum, Montianum,
Corianum, Tutatum, Tabonianum. Tria haec postrema Crustulacei sunt generis. Iis adiungit Mustacea,
e mulso, quorum hodieque in Iunensi agro usus. Mustacea, Sesamata, Puriu, Gorgloaniu, Paulia-
nu: & haec quoque Crustula. Iam Lucetule, Argyrotryphemata, libi Circi, siue Circuli, ad praeparanda farina,
& aqua, & caseo: quae circumdantur aquabili fundebantur hos quidam, qui magis incedere faciebant: & Lixu-
las, & Semilixulas uocant, ut Varro inquit Sabino uocabulo. Exaphe, Crustoplacites, Oryzite,
Pithoes, Ostracites, & quod Catillus ornatus a Romanis dicitur, lactucas, & piper, & axungia acci-
piens, fit ex siligine. Post haec sunt Creion: quae apud Argiuos sponse ad sponsum ferunt. In car-
bone coquitur. Glycinas ex passo & melle, Cretensis familiaris, eademque fere cum Mustaceo, quod ex
mulso fieri docuimus. Empetras uero triticeus panis est cauius, ut in quae Placentae caseariae, ut
in theca recondi soleant. Encris in oleo primum coquitur, mox accipit mel. Habet & Panis hoc no-
men, ut diximus in Tritico. Cyriban: Lacedaemonis sunt, praeque, in conuiujs foeminarum circumfer-
ri solite, cum uirgo laudanda esset a choro muliebri. Criminites, a Crimno fit, de quo supra dixi-
mus. Stactites ex pingui, melle, caseo, ac sesamo conficitur. Erat & panis nomen Stactites. Charissi-
os Aristophani Placenta est, panis Eubulo. Praemium hoc in pugilijs dabatur. Apud nos hinc for-
tasse Chalifiones, quasi Charifiones appellati ex amygdalis, & saccaro, nec alia fere materia quam
Mazapanes, sed oblongi, fastigati: in medio quasi deliiscentem crusta tumet. Ex eadem miscella
sunt & Fungi, sollicitudine matronali cum feriuntur, praelatis semper quos sanctimoniales ipsae

Pli. li. 19. ca. 78

De Placentis.

B

C finxerint. Epidætrôn sub finem cœnæ mensis apponebatur: unde nomen. Nanos panis uide-
tur placētaceus magis q̄ placenta, constat caseo & oleo. Psorhia, siue ut aliq̄ Psathyria, sunt qui
micas panis, quas & Attaragos uocant, ita nominatas putent. Attaragus porro & pro rimula
in pane ignis ui facta capitur, & oīno pro uilissima & minima quaq̄ re: ut Ecfa apud nos: unde
uerbum Ecfa facio, de quo Festus. Polluci Attaragos est superior in pane crusta, sicut in ima E-
psethia. Sunt qui genus placentæ fecerint. Taganitæ a patellis ac sartagine dicuntur. Elaphos,
a mensis nomine quo fingebat. Sicala est Amorbites. Aliud ab hac genus est Amoras appella-
ta. Oedepæsa Cōi celebrant. Syracusani Myllos, ex sesama, & melle, muliebris pubis specie: q̄s
fœminæ Dearum focis & altaribus circūserant. Nastos e nucibus & intestinis, & fartilibus, ad
iecto melle fit atq̄ lacte. Vnde dicitur Nastos, quasi fartum. Ab Erinaceo nomen Echinus ha-
bet. Ab Hemina Cotyliscus. A tritico Pyramuntes, & ab ijs diuersæ Pyramides, fortasse haud
ijs dissimiles, quas Cato Graneas triticeas appellat. Pyramides porro in peruigilijs dabantur:
quasi præmia ijs, qui nocte tora in somnes excubassent. Quidam tamen & Pyramuntas hoc ge-
nus uocabant. A caseo, & usu cribri Tyroscoscina dicunt. Ab ijs differunt Hypotyrides appella-
tæ: quas e caseo, lacte, ac melle condūt. Nam Pityrides, siue ut aliq̄ quidā legunt, Epityrides, &
Epityra, oliuæ genus est: ut aliubi docuimus. In Crera fit a uentre, Gastris uocata, e nuce, tha-
sia, & auellana, & amygdala, & papauere. Item pomis, & sesamo, & pipere quadrangula figu-
ra. Ab ijs est Poltos dicta: quam nos Pultem uocamus. In Catone quidem punice fit Pulis
mentio inter Placentas: forte non dissimilis a libo eo, quod punicum uocabant, q̄ ex Africa
uenisset, & Probum cognominabatur. A melle Melicerides. A suibus Chœrinæ. Latina sunt,
& sacris dicata libi genera quæ Fertum, & Strues appellātur: unde Strusetani, qui ea ferre con-
sueuissent. Strues uero dicebatur, q̄ erat digitorum coniūctorum similitudine: qui superie-
cta panicula, in transversum continebantur. Item Libum farreum a farre. Libum uero, q̄ pri-
us libaretur q̄ esset coctum, ut Varroni placet, dictum est.

De Fœni græci Farina.

CAP. CXII.

τῆλῆς

D

G Ræci Telin, aliq̄ Carpon, aliq̄ Buceras, aliq̄ Aegoceras, Latini Fœ-
num græcum appellant, Aegyptij Itasin. Vis farinæ est molli-
re, dissipare. In aqua mulsa decocta aduersus tam internas, q̄ externas
inflammationes efficaciter illinitur. Lienem cum aceto & nitro trita ex-
tenuat. Succus decocti eius, fœminarum malis subuenit, & siue tumor,
siue præclusio sit uulue, fouentur, & insident. Decocti cremor, capillos,
furfures, & manantia capitis ulcera purgat. Locos laxat & emollit, si cum
anserino adipe pessi uice subiiciatur. Viride cum aceto utilissimū imbecil-
lis partibus, & ulcera sentientibus. Decoctum eius prodest aduersus tene-
smos, fœtidamq̄ dysentericorū proluuiem. Oleum quod ex eo exprimi-
tur, ex myrto, capillos & genitaliū cicatrices abstergit.

Plin. li. 24. ca. 19.
Columel. li-
bro 2. ca. 11.

B A R B A R I C O R O L L.
F Enum græcū a Theophrasto Buceras uocat. Ab aliquibus Ceraitis, Epiceras Hippocrati,
quonia semen habeat simile corniculis: unde Siliquā nōnulli appellant. Plinius Siliciam, Var-
ro Siliculam. Inuenio & Carpum in nostris, & Græcis auctoribus uocatum: q̄ q̄ & pro balsa-
mi semine Carpum fere accipiunt. Item Carphos pro Fano græco, quasi flocculum, siue aren-
tem furculū. Dioscorides Boron quoq̄ dicit uocatā. Quidam Lobon, hoc est, filiquam legen-
dum, non loton credunt. Ego & lotum dici posse uideo, ut in Anoni diximus.

EX M. VERG. COMM.

F Aenogræci a principio statim numerantur a Dioscoride aliæ appellationes aliquot. Ea-
rum plures a siliquarū figura, quas corniculis similes habet, factæ sunt. Neq̄ hæ quidem noui-
tiæ, posteriorumue temporum, sed uetustissimæ sunt, & a Theophrasti temporibus. Siqui-
dem auctor ille libro quarto de plantarum historia, a bubuli cornu figura Bucceron appella-
uit. Eademq̄ ratione aliq̄ non a bubulo, sed caprino cornu similitudine accepta, Aegoceron
Fænogræcum dixerunt: Aliq̄ a cornu simpliciter Ceratida, ^{siq̄} enim græcis cornu est.

De Lino. CAP. CXIII.

A

LIN V Maliqui Linocalamin uocant, alij Annon, alij Linon agri-
on, Romani Linum, Poeni Zeraphöes. Vulgo notum est. Cu-
ius semen easdem quas foenum græcum uires habet. Discutit, & emol-
lit omnem intus forisq; inflammationem, cum melle, oleo, exiguaque
aqua decoctum, aut melle cocto exceptum. Vitia cutis in facie, uarosq;
crudum tollit. Illitum cum nitro & ficulneo cinere, parotidas, duricia-
que discutit. Vlcera quæ serpunt, fauosque, cum uino decoctum expur-
gat. Vngues scabros eximit, cum pari modo nasturcij & mellis. Vicia
pectoris extrahit, si ex melle in eclegmatis uicem substituatur. Tussim
lenit. Venerem stimulat, si farina piperis & melle exceptum, pro placen-
ta largius adsumatur. Huius decoctum interaneorum, uuluaq; erosio-
nibus immittitur. Alui excrementa euocat. Ad uulua inflammationes
in deflectionibus perquam utile.

BARBARI COROLL.

Linum, a Græco sumitur. Semen eius Linospermon appellatur. Oleo seminibus expresso,
fraces, & retrimenta quoq; ipsa reponuntur, saginando iumentorum generi, præcipue bubus
obestitate sola insignibus futuris. Quales ad nos Mediolano coronati ueniunt, Principibus q̄t-
annis officij gratia donantibus, Visceratione hinc solenni orta, Magistratibus diuisa carne glo-
bulis, quos quia fere pares sunt, Sociolos consuetudo appellat. Quidam nō Sociolos, sed Suc-
cidulos, a suilla uisceratiōe uocari maluit, quæ singulis annis ante Curia uenationis die agit. In-
ter Lini genera est Choleicum: quod tamē Sardonicū uocant Græci. Est & Aegyptium: a quo
Xylina uestes, quas & Gossampinas dixere. Hoc iurisperiti Lanam ligneam appellant. Est aut
em Gossampinus, siue Gossipiō, siue Xylon, fruticulus e superiore parte Aegypti, etiam in Ita-
liam delatus, fructum ferens barbatae nuci similem, plenum lanugine: nec alterum Lini genus
est, quod huic candore, aut mollicia præferri putent, quanq̄ firmitatis in eo parū. Huius pu-
tant esse generis quod uulgo a pocilli credo forma Cothonem uocamus, siue a mali similitudi-
ne coronci, quod in eo gignitur. Id maturitate hialcēs, lanuginis pilas ostendit. Folia huic uitiū
minora. Aliqui Gitonē, a Git, cui similem fere gerit in capite folliculum, appellant, Draconis
acetarij e Lini semine, ut post dicemus, nascentis, folia ipsa testantur originem.

Plin. libro. 19.
in præfatione.

B

De Cicere. CAP. CXIII.

Cicer satium aluo idoneum est. Vrinam ciet. Inflationem pa-
rit. Colorem commendat. Menses ac partus expellit. Lac au-
get. Cum eruo decoctum, illinitur ad inflammationes testium, uerruco-
sas informicationes, ad scabiem, ulcera capitis manantia, impetiginesq;
Contra carcinomata, & ulcera quæ cacœthe uocantur, cum melle &
hordeo prodest. Alterum genus arietinum nominatur. Vtrumq; cit u-
rinas, dato cum rore marino, hydropicis, aut regio morbo laborantibus
eorū decocto. Legunt ea exulceratam uescicam & renes. In uerrucarum
formicantium pensiliumq; genere, prima luna singulis granis singulas
tangunt, eaq; grana lintheolo deligata abijci post se præcipiunt. Ita de-
cidere eas arbitrantur. Syluestre Cicer, folijs Satiuo simile est, odore a-
cri. Sed semine discrepat. Idem quod satium præstat.

BARBARI COROLL.

Cicer Erebinthos a Græcis uocatur, Legumina gallicani, ut Varro ait, nominant Legaria.

ipicindos 'epur

C Dicuntur ita, quoniam uellantur e terra, non subsecuntur ut fruges. Eadem Gelius etiam Legumina nominat. Inter hæc Cicer altissima radice adhæret. Floret diutissime ut Eruum: quadragesimo die uellitur: caulis admodum lignosus. Ciceris aliud Arietinum, Cirsos a Græcis uocatur. Aliud Columbinum, idemque Venereum, Erui similitudine, Orobiaeos ob id dictum, a Columella Punicum. Siliquæ Ciceri rotundæ. Vni leguminum florenti, pluuiæ officium. Erucis nascentibus, eluta falsilagine, nigrum & rufum candido ualidius, herbas omnes enectans, sed tribulum celerrime. Sideratio Radicis & Erucæ, quas aliqui Vricas, & Græce Campas uocant, Ciceri propriæ dicuntur. E Cicere corrupto nullum sit animal, contra quæ in cætero frugum genere. Quamquam hoc & seminibus olerum, & quibusdam alijs commune. Nigrescit hoc cum erumpitur. Durat Erui modo annos. Ciceris generibus syluestre adiicitur, a Dioscoride, Galeano, atque Paulo, cuius uis alia duo excedat. Orobiaeos, siue Orobias, calidior est Arietino, subamarusque ut Eruum: unde nomen. In Columbino, & Orobiaeon, & Syluestre contineri puto. Nasci & in India sum Cicer aiunt, diuersum omnino genere. Cæterum tam simile, ut mensis appositum, dignosci fere non possit. Cicerculam uero Theodorus putat esse, quam Lathyrum Græci uocant, folio non rotundo, ut plurima leguminum, sed oblongo: caulis humiliter serpens, ut pisco: quaterni & inequales grano sunt anguli, ut Plinius inquit. Idem Theodorus, Ochron uocatum, interpretatus est modo Eruiiium, modo Eruiiale, modo Cicerum. Folio ut Cicercula oblongo, uermiculus, ut item Cicercula, obnoxio, secutis post imbres caloribus. **COLVMELLA** A quidem Cicerculam similem pisco tradidit, Ciceram uero non tam leguminibus, quam pabuli generibus annumerat. Nec Cicerum, sed ut dixi Ciceram uocando: quæ Bubus Erui loco detur, fresa in Betica, nec hominibus inutilis: sapore nihil differens a Cicercula, colore tantum discernitur, quo sordet obsolentior uidelicet, et nigro propior. Sunt qui Ochros etiam Phasilos appellari scribant. Habentur & Dolichi uocati: quos Theodorus a Plinio sumptum interpretatur Siliquas, qui & Lobi, siue Lobia nominentur: quod soli fere leguminum, ut inquit Aetius, cum thecis suis mandantur in patinis. Scandunt hi pedamento cui accubant, prælongo affixo: ita enim reddi putant frugi: contrahens eruginem, ni fiat ita. Semen eius æuum non patitur, breuique marcescit ut aphaca. Nec desunt qui Lobos, siue Dolichos a ueteribus, pro Phasiolis dictos existiment: et a recentioribus Pisos. Cæterum Theophrastus, & ante Theophrastum Hippocrates, Pisum a Dolicho manifeste separauerunt. De Phasiolis nusquam meminit. Nisi quis Phasios ab eo significatos Dolichorum appellatione censeat, ut Aetio placere uideo. Sed non semper Paulus Pisos, & Ochros, & Phasios, a Lobis, siue quod idem est, Dolichis manifeste coniunxit. Illud quidam putant Lobos esse, non candidos istos et triuales Phasios, sed rubentes ex melle herba. Alioquin idem Paulus in quadam compositione, Phasios requirit albos: quæ dicitur: cuius Africanum genus unum haberi meminit. Idem ualuulas thecasque Ciceris, Corulas appellat. Quod admonitionis gratia, non imitationis retulimus. Inter legumina & Acanthiferuntur, a duricie uocati, quod eos *κλάυιν*, id est, frangere non sit, lenti similes, ut grammatici Cathyris, hoc est, Cicercula, ut Theodorus uult, similes esse dixit, & usui, & uiribus: duriores tantum, & perfici difficiliore. Aracos inquit Theophrastus, inter aphacas, siue lentem nascitur, res dura & scabra, & proinde uilis. Hippocrates Aracida nominat, ab aliquibus dicta Lecithos. Est & Aracidna, & alia quæ Aracos in Tubere dicenda. Quidam Lecithon per genere accipiunt, ad Pisum, & Aracum. Nec scio, an his assentiam, qui Lecithon ab oui luteo, cui similis colore sit Aracum, deducunt putant: cum scriptura fortasse diuersa sit. Galenus certe Lecithon per lente, cui detracta coriis est. Proinde contrarium ei genus esculetum fortasse fuerit: quod Horatius illo uerbo insinuat, Ut Plautus quoque Scrutea, & Collubia in hunc forte sensum appellauerit in Persa. Ceterum Horatium forte non scruta, sed scuta legas, pro uasculo rustico. Vnde Scutiscum Catonis scipenumero, Matellum, Trullum, Scutiscum unum: Matella, Trulla, Nasiterna unam. Quamquam pro uase sunt quæ coeperint Scruta in Horatio. Ceterum Collubia, & Collubiæ sunt, quæ Tragemata etiam, & Bellaria dicuntur, Ciceris frixi, uuarumque passerum uilia munuscula, ut Hieronymus interpretatur. Vnde Colybitas, pro numularijs mutatum foenus exercentibus, uocari ceptos asserit: quod genus a Polluce nominatur Colybos. De Colybo & ante diximus. Propterea locum in Plauti Persa eum, non scrutea, & colluthea, ut omnes habent codices, sed Scrutea, & Collubia legendum putamus. Fortasse Scrutea sunt, quæ græci Catachysmata, hoc est, missilia uocabant, spargis

lita: siue a uilitate, ut diximus, siue qm̄ e pellicijs folliculis, quos & Pasceolos uocamus, effusi di consueuissent. Quid si Coluthra legamus? cū maturas ficus ita græci uocent, ut inquit Philemoni. Nam strutea pro cidonijs quoq; sumi possunt. Apud Aristophanem & comicos Lecithopolæ mulieres dicuntur, quæ uilia quædam uendunt, quasi Nugiuendulæ. Sidonius Apollinaris in epistolis, nunc inquit quædam friuola, nunc ludo apta uirgineo, Scruta donitabat, hoc est, scutula quædam & quisquiliæ, & nihili munuscula. Meleager Græcus autor, uolumen singulare scripsit, Lecithi & Phaces conparationem continens. Porro legumen omne, ut inquit Athenus, tribus modis manditur. Aut enim ex eo fit quod Etnos dicitur, ut ex faba & piso, quam nos Cōchin uocemus, si placet. Quancq; quid sit Conchis proprie, dictum est aliubi. Aut Lecithos, ut ex araco. Aut Phace. Aut ex aphaca & lente: quod nos Lenticulā. Theophrastus Loti ægyptiæ radicem decoctam Lecithodem fieri cibo gratam scribit, hoc est, araci, uel leguminis alterius in modum. Quancq; Theodorus albumen oui, quemadmodū in ea uoce luteū intellexerit, uehementer miror: cum Lecithos, uitellū oui potius, q̄ candidū significare uideatur. Hoc primi uidimus, seu recte, seu perperam. Certe si errauimus, utilis & eruditus error futurus est. Nec illud tacuerim, Lecytho pro gutto oleario, & ampulla falso a quibusdam coepisse, Lenticulam uocari. Nescio q̄ perite: cum Lenticula uasculum non sit magis, q̄ id qd græci Discū uocant. Defendit eos fortasse Apuleij de strigilecula, quæ lenticulari forma uisebat, autoritas. Satis est locum notasse. In summa, Lecithos, pro legumine, aliquando pro putamine periora scribitur, pro uitello per, y, p ampulla per, u, potius q̄ per, y. Hęc fortasse curiosius q̄ debui, psecutus sum, sed inorandum fuit, quia & Græcis & Latinis multa hinc caligo p̄diu tuit.

¶ De Faba. CAP. CXV.

Faba inflationem excitat. Aegre concoquitur. Tumultuosa somnia facit. Tussi confert. Carnem gignit, media calidi frigidiq; natura. Decocta in posca, & cum suo cortice esitata, dysenterias et coeliacorum profluuia sistit. Contra uomitiones conuenienter manditur. Inflatio leuior contrahitur, si aqua prior inter coquendū abijciatur. Viridis plus neogocij stomacho exhibet, maioremq; statum parit. Lomentum eius & per se, & cum polenta illitum, inflammationes quas uulnus excitauit, mitigat. Cicatrices concolores facit. Turgentes prædurasq; mammas, etiam si inflammatione tententur, adiuuat. Lac restinguit. Furunculos, sugillata, parotidasq; cum scenigræci farina & melle discutit. Cum rosa autem, thure & ouicandido, procidentes oculos, tumores, uuasq; reprimat. Subactum uino, suffulos ictu oculos recreat. Manducata sine cortice Faba, ad auertendas fluxiones, fronti illinitur. Decocta in uino, testium collectiones sanat. Quo tardius pubes erumpat, pueris imo uetri illinitur. Viuliginem purgat. Fabarum cortice illiti capilli, qui post euulsionem renascuntur, gracilescunt, et minus alimentum capescunt. Cum polenta scisso alumine, et uetere oleo impositi cortices, strumas discutunt. Decocto earum lanæ inficiuntur. Faba dempto cortice, in illas partes diuisa, in quas suapte natura scinditur, imponi solet sanguinis defluxionibus ab hirudine concitatis. Namq; eas suppressit, si semisecta apprimatur.

B A R B A R I C O R O L L.

Faba Græce Cyamos, Hellenicos uocatur, ad differentiam Aegyptiæ. Aul. Gelius & Festus Fabam etiam Fabulum appellant. Plautus in Stich. Conuiuium, inquit, hoc satis est pro opibus nostris, satis commodule, nucibus, fabulis, ficulis. De quo & in Zea diximus, Græci Cyamon uocant, & primam in manā concretionem lactis. Eadem parte scapus & radix funditur, idq; in omni leguminum genere. Non diuersa, ut in frumento singularis ei radix, sed capillata fibris, ut cætero legumini. Folij exit multis, ut pisum atq; cicer; non singulis, ut triticum. Dic-

u ij

Pli. li. 18. ca. 12.

C bus quadraginta floret, non uniuersim, ut frumentum, sed particulatim, ut reliqua legumina. Post florem totidem diebus perficitur, quantum legumina nulla. Differunt folio rotundo, ut maxima pars leguminum geniculato & inani caule, lignosissimoque post cicer. Sola fere legumini scapo recto assurgit. Circa Philippos Ateramon uocant, in pingui solo herbam, qua necantur Fabæ. Teramon de qua in Macro. Nonnunquam porro fieri, ut Teramos in Ateramon transeat, cum uapore atque halitu terræ madidam, indigena quidam uentus efflauerit, ut Theophrastum Plinius intelligit. Aliter Theodorus, qui duo illa, Teramon, & Ateramon, siue Ateramnon, pro coctibili & incoctibili, non pro herbis ita nuncupatis accipit. Theophrastus certe alio loco facile significat, ueriores Theodori quam Plinii sensum fuisse. Ateramna uulgo Legumina Græci uocant, inobsequiosa & contumacia. Quod genus seminis etiam Cerasbolon uocatur a Platone, superstitiosa origine, quasi sterilia & irrita proueniant, quæ per bouum cornua ferendo eieciderint in terram. In Macedonia & Thessalia moris est, arua fabis florentibus inuertere: quia legumen id solo proficit, quasi pro stercore. Nascitur in marcescente Faba uermis, quem dixi, Mydas. Siliquæ, Fabarum folliculi sunt. Fabalia uero, purgamēta earum dicuntur, autore Plinio. Arnigrum id, quod in summa ea uisitur, Hilum uocatur: cui respondet in proverbio apud Græcos Gry: etiam si aliud significat, hoc est, unguis fordecular. Legumina Græci Ospria, & Theophrastus Chedropa nominant. Aristophanes Beleeos, ut quidam interpretatur. Fabæ genus quod Marficum uocat, uere feritur. Faba cum suis corticibus elixa, Conchis appellatur, ad discrimen fræ: nam Conchos aliud est eius genus est, ut in Hordeo monuimus. A Fabis, Fabaginem Carō dixit, & Plinius Fabalia. Interdictum esse Pythagoricum, cibo Fabam. Inualuit opinio contra uerum. Sicubi porro detestatos usum eius ueteres inuenias, non Cyamon, id est, Fabam in eo uerbo, sed Venerem intelligi demonstrat oportere Gelius. Tota Insubria & Liguria, recentes Fabæ uenditum uoce nuncupantur Baianæ. In Etruria & Latio, Scaphi. Vtrumque originem habet eruditam. Nam & Baianas Apirius ipse appellat, & Scapos fabarum Plinius decimo octauo libro. Inuentus est inquit Scapus, ceterum Fabis onustus, ut inde uulgo Scaphi, pro Scapis, tenuis in flatilem diuerticulo uocentur.

De Faba ægyptia. CAP. CXVI.

αἰγυπτίαν κῆρυμα

D

Aegyptia Faba, quam aliqui Ponticam uocant, in Aegypto plarumque prouenit. In Asia etiam, Siciliaque lacubus inuenitur. Folia habet ampla, etiam si ad arborum frondes comparentur, caulem cubitalem, digiti crassitudine, florem roseum, dupla papaueris amplitudine. Et ubi flore exuitur, fert folliculos oculis similes, in quibus Faba supra operculum bullæ modo prominet. Ciborion ideo nominant, id est, arculam, quoniam feratur ipsa, humenti glebæ mandata, & ita in aquam demissa. Radice firmatur harundine crassiore, quæ cruda coctæue estur. Eī Colocasīa nomē est. Faba uiuens manditur, & exiccata nigrescit. Græcā magnitudine superat. Adstringendi facultatem obtinet, & stomacho utilem. Dysentericis, celiacisque prodest, in sparso polentæ uice lomēto. Datur quoque in pulte. Cortices in uino mulso decocti, si ternique inde cyathi bibantur, magis proficiunt. Facit ad aurium dolorem, quod in earum medio uiride spectat, gustu amarū, si tritum et cum rosaceo coctum instillet.

BARBARI COROLL.

Theoph. li. 2.
de causis plantarū cap. 19.

Faba Aegyptia, & Colocasīa idem sunt, ut fructus tamen ipse Ciborium dicatur, radix uero Colocasīa, & Mazizanion ab Aetio. Pocilli genus ab hac similitudine, Ciborion uocari scribit Athenæus. Paludibus stagnisque nascitur. Caulis ei longissimus redditur, decem pedum a Strabone: uel ut Theophrastus & Plinius, cubitorum quaternum, digitali crassitudine, mollis & sine geniculis, rimæ intus per totum, ut Lilio. Propter quod & Liliū Aegyptium ab Herodoto uocatur: quemadmodum & Lotus ipsa. Calyx in cacumine rotundus, uespærum fauo similis. Triginta plurimum oculis: qui singulas singuli contineant, non quidem omnino testas, sed paulo extantes. Ipsi quoque calyces aq̃s extant, latissimis circa folijs, quæ singulas Fabas ob-

re uideantur. Magnitudo ipsa, ad similitudinem eorum, quæ ut Plinius inquit, Personata in nostris fluminibus uocatur. Atterenti Fabas, amaritudo uel odore prodit. Radice crassissima, pleniorque Harundinis, rimosa ut Scapus: quæ & Araneosus sentiri dicitur, ubi coctus est, in mādendo, ait Plinius, filis ad morsum ut in lana sequacib. autore poeta Martiali. Thyrsus uero inter folia emicat spectabilis, a Theophrasto, Pilos ut arbitrantur uocatus. Quæque Theodorus Pilulas interpretatus id uidet. Alij calicē rotundū in eo uocabulo significari uoluerūt. Indigenæ implexis Colocasie folijs, in uariā speciem uasorum ponere gratissimū habēt. Nascitur sponne, ac satur, quo modo & in Italia quoque. Non excoquit Syriæ, Ciliciæque, & in Trōne Chalcidis lacu ad maturitatē omnino p̄uenit, sed magnitudine deficitur. In India quoque fluuiū Hydaspē cernit, Alexandro id falso in coniecturam trahente, nauigari posse in Aegyptiū inde. Fructus quidem, ut dictum est, amarus, sed ipsa radix perque lauta cibus. Seritur in limo paleato, ut descēdat, cōprehendaturque: ob id Spirobolos quoque dicitur. Vbi semel coaluit, durat ad infinitum. Refugiūt eā Crocodili spinis horrentem, caule ac radice: oculis timentes, quos hebetiores habēt. Nominatur & Taba quædam Indica, ex arboribus, in filiquis digitorum decem longitudine dependens, mel se plenius, sed quo gustato difficile sit euadere, ut inquit Aristobulus.

EX M. VERG. COMM.

Quod ex Aegyptia faba usum in Aegypto nostra ætate habet, radix sola est: quam coctā, sed in taleolas prius sectam incolæ quonidie comedunt, odore coronei mali, f. lēbi, nobilitatque cōmunem cibum. Nec minus tota Aegypto Colocasia nunc, seruatō antiquo nomine, quæ nobis Rapa nota sunt. Falsum est quod antiquiores omnes de ea tradiderunt, non nisi in aquis nasci: quoniam in arida, sed non procul a mari, & humido harenosoque solo, etiam sata, & per se prouenit. Licetque nunc totos Colocasijs consitos agros, ut ferunt, supra Tripolim urbem ad mare, non in iocundo spectaculo uidere. Latissimis siquidem & numerosissimis folijs uirent, quibus solis æstus in calidissima regione etiam arcent.

De Lente. CAP. CXVII.

LENS S V O cibo aciem oculorum obtundit. Aegre concoquitur. Stomachum male habet: eumque, & intestina inflat. Sed aluum cum cortice cocta sistit. Præstat in cibo, quæ facillime coquitur, nihil atrī in maceratione reddens. Vim habet adstringendi. Qua ex causa aluum cohibet, si detractio antea cortice discoquatur accurate, priusque aqua inter coquendū effundat. Quippe primū id decoctum uentrem resoluit. Somnia tumultuosa excitat. Capiti, neruis, ac pulmōi inutilis. Melius suo fungetur munere contra alui fluctiones, addito cum aceto intybo, aut portulaca, aut beta nigra, aut baccis myrti, aut putamine punici, aut aridis rosis, aut mespilis, sorbisue, pyris thebanis, aut malis cotoneis, aut cichorio, aut plantagine, aut gallis integris, quæ post decoctionem abijciuntur, uel uuarum rhois, quæ obsonijs insparguntur. Verum acetum cum eo diligenter percoqui debet: alias aluum conturbat. Contra subuersionem stomachi, triginta grana lentis delibrata deuorari, proderit. Decocta cum polenta, & illita, podagras lenit. Sinus cum melle glutinat. Crustas rumpit. Vlcera purgat. Decocta in aceto, duricias & strumas discutit. Cum cotoneo, aut meliloto medetur in inflammationibus oculorum, sedisque, addito rosaceo. Sed in amplo sinu, aut inflammationibus sedis, quæ maius remedium exigunt, cum putamine punici, ac siccis rosis, adiecto melle decoquitur. Nominis quæ in gangrænā euaserunt, adiuncta maris aqua, pustulis, & his quæ ferpunt, igni sacro, pernionibusque, ut antea dictum est. Contra turgentē

C mammas, et usq; eo duras ut quandam cartilaginis speciem referant, cocta in aqua maris & illita auxiliatur.

Pli. li. 15. ca. 12.

BARBARI COROLL.

Lens feracissima leguminum, siliquis in latitudinem molliter fufis. Melior quæ costibilibior, & quæ maxime aqua absorbet. Enecat Lentē herba Securidaca, ut Plinius Aparina, siue Lappa, ut Theophrastus. Nascitur & sua Indiæ Lens fenogræco similis, quam circa occasum vergiliarum demetunt. Differt hæc a nostrate omnino. Sed illatam cibo discerni posse negant ab ignaris. Aegyptia Lens a Marone Ouidioq; laudatur. Pelusiaca ob id uocata. Græci Lentē Phacon, Lenticulā Phacen uocant; quo nomine & Vlixis soror fuisse tradit, ab alijs Callisto appellata. A quibusdā non Phace, sed Phaceus: ut Orpheus, & Peleus uocata est Lenticula: sed h̄ per egrinitatis in comœdia coarguitur. Laudes Lenticulæ apud autores Græcos legas, præsertimq; Pythagoristas: utiq; si rationē Zenonis sequare, præcipiētis, ut in eā Coriandrū. 12. parte indat.

ἡ δὲ φακὴν ἡμετέρας ἀσθενέστερον κορίαννον.

Gel. li. 13. ca. 28

Congruūt & cū ea Bulbi. Ob id & Bolbophace dicta est a poeta quodam. Vnde scitū illud ortum uiderur, contra perditos gulones, Lentem laudar, ut apud Phalereum Demetrium est. Notū & prouerbiū apud Varronē in satyra Menippæa, τὸ ἐν τῇ φακῇ μύρον, hoc est, unguentū in Lenticula: ut obiter emaculemus inolitum, atq; adeo receptum in Aulo Gelio multis feculis errorē, ubi τὸν ἐν τῇ φακῇ μύρον, pro eo quod est, ἐν φακῇ μύρον legitur. Et ne librarij mendum fuisse uideretur, Theodorus Gaza locū interpretatus est, fabulam in Lenticula, hoc nos Atheni uiri doctissimi testimonio corrigendū monemus. Hoc adagiū, contra cacozeles, et apirocalos inuētū est: quos, ut est apud Senecam, & eundem Gelium, Infrunītos appellamus, qui nullo discrimine rerum quas agunt, aut dicunt, habito, parī nixu, cuncta moliantur: & eadem ornamenta, si guras, emblemata, conuenire omnibus locis et temporibus existimant, Cuiusmodi et illud est, τὸ ἐν λαγάνοις πίπρι, hoc est, Piper in oleribus.

φασίολος

De Phasiolis. CAP. CXVIII.

Phasioli inflant. Spiritus crient. Aegre coquuntur. Virides cibo aluum emolliunt, ad uomitiones idonei.

BARBARI COROLL.

DE Phasiolo in Cicere differui. Habetur & genus herbæ Phasiolus, ut post constabit. Græci pro legumine Phasiulon, & Phasiolon, & Phasilon quandoq; appellant. Nostri Phascolum, & Phaselum. Columella.

EX M. VERG. COMM.

Dolichum, nescio an Theophrastus aliquando idem legumen hoc appeller. Piso enim magis q̄ Phaseolo congruunt quæ de Dolicho ab eo dicuntur. Verba eius lib. 8. de plantarum historia hæc sunt. ὁ δὲ δόλιχος ἴαν παράκαταπύρη τις ἐστὶν μακρὰ ἀναθαίνει καὶ γίνεται κάρπιμος, καὶ δὲ μετὰ φαύλος καὶ ἰρσοβώδης. Quod est. Dolichus uero, si prope longius lignum defixerit aliquis, ascendit, foecundusq; fit: sin minus, deterior, & rubigine uitiatur. Paulus tamen Aegineta primo uolumine quo capite de leguminibus agit, de Phaseolo his uerbis usus est. ὁ δὲ φασίολος καὶ δόλιχος καλούμενος. quod est, Phaseli uero, qui & Dolichi nominantur. Magna utriusq; auctoritas. Neq; ego ausim pro re, quæ ad utramq; partem trahi potest, inter eos censere. Dolichon enim longū græcis dicitur, quod Phaselorum siliquis msgis competit: & Pisum per se stare nequit ideoq; adiunctis sibi lignis, ut Theophrastus ait, nititur.

έρουον

De Eruo. CAP. CXIX.

ERuum paruus frutex, omnibus cognitus, angusto folio, tenuis, semina in ualuulis habens, e quibus farina fit nomine Eruina, ad multos medendi usus conueniens. Eruum capitū onerosum est. Aluum esu turbat. Sanguinem per urinam extrahit. Elixo boues saginantur. Paranda farina ratio hæc est. Vberiora grana, candidaq; deliguntur, permiscendoq; aqua resperguntur, donec sufficienter cōbibant. Postea torrentur, usq; dū hians cortex disrumpatur. Molitaq; farinario cribro incernuntur. Postremo farina recōnditur. Hæc aluo utilis est. Urinam ciet.

Meliorem colorē efficit. Sanguinē per uescicam, aut aluū cum torminibus **A** elicit, si largius in cibo aut potu assumat. Vlcera cū melle purgat. Lentigines, & uitia cutis in facie, & maculas, totumq; corpus emendat. Nomas, gangrænas, duriciasq; serpere non patiē. Mammārū duricias emollit. Astra ulcera, quæ theriomata uocāt, fauosq; emarginat. Carbunculos rumpit. Cum uino illitū, morfibz uiperarū, canum, hominūq; medetur. Vrinæ difficultates, tenesmosq; ex aceto mitigat. Tabidis, qui alimentū non sentiunt, tostū, & in nucis magnitudinē melle collectū, conuenit. Eius decoctum perniones, & pruritus in toto corpore sanat, fouendo.

B A R B A R I C O R O L L.
ERuū, Herbumue, aliud candidū, aliud ruffum. In siliquis grana sine septo habet, quæ se inuicē quasi tangāt, ut in Pīso. Siliquæ forma teres, & ad rōnē grani Cylindracea, ut itē Pīso. Patientissimū uetustatis est atq; cicer. Genus est & Eruiia leguminis, quā nōnulli falso Durellā uulgo dictū interpretant; propterea, qd hodie quoq; in Vmbria uocant Eruiiā agricolæ, qd in Gallia & Venetia prouincia Dorā, Durellāq; folio crasso & oblongo leontopodij, sed maiore: capitulis semē includētibz minutū, simile nasturdo, tantū exilius flore cādido. Scopas ex ea ruri faciūt. At Eruiia, syluestris herba ē, amaritudinis extimig, colore & folio cicerculæ, qd minore.

Pli. li. 15. ca. 15.

De Lupinis. CAP. CXX.
Satius Lupinus notus est. Cuius farina cū melle delinctu, aut potu, **B** uentris animalia expellit. Ipsi quoq; macerati, & cū sua amaritudine esitati eadē efficiunt. Decoctū eorum idē mūnus pręstat, cū ruta & pipere potū. Quare lienosis prodest. Eodē ulcera tetra, quæ theriomata uocant, gangrænas, incipientē scabiem, eruptiones pustularū, ulcera in capite manātia, uiligines, maculasq; fouere utilissimū. Menses & partus extrahit, cū myrrha & melle subditū in uellere. Forū farina cutē liuoresq; corrigit. Inflammationes cum polēra & aqua mitigat. Tubercula, & coxendicū cruciatus, ex aceto lenit. Strumas in aceto cocta illitaq; dissipat. Carbunculos rumpit. Decocti cœlesti aqua, donec in liquamētū crassiciem redigantur, faciem abstergunt. Medentur pecorū scabiei, cum radice nigri chamæleontis, ita, ut repente decocto abluantur. Cit urinā radix cum aqua cocta. Lupini triti, ubi maceratu dulcescere cœperint, cum aceto poti, fastidium detrahunt, & cibi auiditatē faciunt. Gignunt & syluestres Lupini satius similes, sed omnino minores, qui eadem quæ satui possunt.

θέρμωσ ἰμπερὶ

B

θέρμωσ ἰμπερὶ

B A R B A R I C O R O L L.
LVpino cura officit, quā alte conditū in terra, diducit eam radice, & in summa nititur, atq; ita germinat ceu per uim. Grana eius in siliquis discreta septis. Viride nullum mandit animal. Diuturnius id tradunt Erui, ac Cicere, Sabulum, & arenas, & omnino uitia terræ sequi, horretq; culta ex omnibus quæ eduntur. Sicco nulli minus ponderis, plus utilitatis. Mitescunt cinere, aut aqua calida. Circumagi Lupinum cum sole, tradunt pleriq;.

L V P I N V S S Y L V E S T R I S.
LVpini syluestres per omnia minores inueniuntur satius, præterq; amaritudine.

De Rapo. CAP. CXXI.
DEcocta Rapi radix alit. Inflationem parit. Mollesq; spongiosasq; carnes creat. Venerem stimulat. Decocto podagræ, per-

γούρνα

u iij

D I O S C O R I D I S

Cnionesq; fouentur. Contritoq; Rapo, atq; imposito iuuantur. Si excauata radici rosaceum cæratum adigatur, & feruenti cinere eliquescat, exulceratis pernionibus proficiet. Asparagi eius decocti esu, urinam ciunt. Semen antidotis & theriacis, præsertim quæ sensum doloris auferunt, Anodyna uocant, idoneum est. Potum contra uenena salutare est. Venerem concitat. Muria conditum, minusimenti sufficit. Sed multo magis appetentiam recreat. Syluestre Rapum in aruís nascitur, fruticosum, in cubiti altitudinem assurgens, ramosum, læue. In cacumine folia fert læuia, digitali latitudine, aut maiora, & fructum in siliquis caliculatis. Cumq; pulpæ aperiuntur, alia intus siliqua spectatur, quæ quantam capitis speciem præbet. In qua semina paruula concipiuntur, foris nigra, intus alba. Additur in medicamenta, quibus ad detergendam cutem in facie, totoq; corpore utimur, præsertim quæ ex lupini, aut cruitritici, aut lolij farina fieri solent.

Theophr. lib.
7. cap. 4.
Pli. li. 18. ca. 13.

B A R B A R I C O R O L L.

Rapa, quasi Ruapa, ut inquit Varro, tellure accumulata conditur ab olitoribus, ut insequentem annum regerminet. Semen includitur siliqua. Vtrunq; sexum in hoc quoq; genere intelligunt, ex eodem semine prouenientem, ut scribit Theophrastus. Quæ uideatur Athenæo, marem a Theophrasto nihil aliud intelligi, q̃ Napum Buniada. Effeminari collocatæ rariusedicunt, masculoscere densius compositæ. Laudatur semen eius tenue. Seritur semine, posttransfertur. Dulcescit algoribus; per quos & in radicem, non in folia incrementum capescit. In Italia Nursinæ præferuntur a Columella, Pollux, & Athenæus e Mantinea maxime commendant. Gongylen, & Gongylida Græci uocant, quemadmodum & nostri Rapum, atq; Rapam. Nam Rapina ut Napina, & Cepina dicitur; & Rapitium, ut Auitium, Piscitium. Cato coles Rapitos uocauit alio loco. Rapa biennio sata conuertuntur in Napos, alio Napus Raporum naturam accipit. Gongyliorum uocabulo Hippocrates globos pusillos quasi pilulas, & catapotia significat Galeno: ipsos autem pastillos, siue orbiculos, quibus in medicina utimur, Dactylios appellat: quod & officinæ modo seruant. Rapas Lacedæmonios Gasteras uocare Apollas tradidit. Sed Nicæder colophonius Gasteras a Boëtis Brassicas intelligi: Rapas uero Zacetidas appellari uoluit. Amerias, & Timachides non Rapas, sed cucurbitas ita dici arbitrantur. Sunt e Græcis qui Rhaphyn esse dicant Napum Buniada: licet Glaucus non Rhaphyn, sed Rapyn uoceret: unde apud nos Rapo nomen uideri potest manasse.

Pli. li. 18. ca. 19.

R A P V M S Y L V E S T R E.

Syluestris Rapa longior, in speciemq; Raphani, caule breui, semine intus candido, duplo maiore q̃ papaueris. Has in Dalmatia frequentes sponte nasci, Possidonius est auctor.

E X M. V E R G. C O M M.

Communem latinis græcam Gongylem, non Rapum, sed uocem fecit in carmine suo Columella, cum peractis Vulcanalibus cecinisset: Nube noua feri cœli impendentibus undis Gongylin, illustri mittit quam Nursia campo. Nec peregrinitatem uocis ueritus latinus homo est: tam grata omnibus erant omnia, quæ ab ea gente in doctrinis audirentur. Cumq; in secunda græcorum declinatione, & in quinta nomen id in græcis inueniatur, ex quinta elegit secundam, scilicet hoc quod Dioscorides ait, sunt qui Gongylida, nulla significationis diuersitate. Nisi quis forte diminutiua forma Gongylida, a Gongyle factum id nomen dixerit. Quacumq; autem forma dixerit aliquis eadem significatione, semper indicabit quod rotundum sit: qua figura ubiq; plerunq; nascuntur Rapa. Græcis enim ῥόγυλον ῥόγυλον, id est, rotundum significat. Quod deinde hic ait, minus nutrire in cibo Rapa quæ in muria seruatur, ex antiqua salgammorum consuetudine rationem habet: quorum cum esset quotidianus usus, docere Dioscorides uoluit, mutata aliquantisper natura, minorem ex conditura uim in nutriendo Rapa habere. Quomodo autem condirentur, & condita seruarentur, Columella. 13. uolumine capite quinquagesimo tertio satis docuit. Poterunt uolentes ex eo scriptore omnia facile nouisse, Quos obiter monemus,

D I O S C O R I D I S

C drolachana cognominant, hoc est, ut Theodoro placet Oleriarbores. Die tertio a saturo profilit, radice terra adoperta, Rapi modo. Sequenti anno germinat, tellure abiecta. Semen in siliquis. Genera, Boeotium rotundum & dulce, Liothasion, quod alij Thracium uocant, paten-
tissimum hyemis. Cleonæon, in longitudinem porrigitur. Corinthium, amplissimum detecta
stirpe nascitur. Quo folium leuius, eo suauior atq; mitior est Raphanus. Dulcescit ut Rapum
frigoribus. Traditur genus unum eruce folio. Pulices appellantur bestiolæ Raphanis in na-
scentes. Raphanorum radices lignescere Theophrastus est auctor. Hæc, ut inquit Palladius, for-
minini generis existimantur, quæ minus acres sunt, & habent folia latiora, leuiora, & iocunde
uiuentia. Raphanum, ut brassicam, uitibus inimicū esse constat, ut si circum se feratur, diffu-
giant. Genus ei unum est, quod ab Herodoto uocatur Syrmæa. In Aegypto cum cepis & allio
pyramidibus condendis præberi solitum, Iulius Pollux auctor. Confirmant id & Diodorus,
& Plinius, qui scribunt ad id opus in Raphanum cepas & allium talenta mille octingenta ero-
gata. Ut mirer Laurentium Vallam, apium, uertisse pro Raphano. Sunt e Græcis qui Syrne-
am apud Iones genus oleris apio similis accipiant. Itemq; pro edulio ex adipe, atq; melle. Sed
Syrneam legi malo, q̃ Syrneam. Utq; hinc fortasse ferculum nuptiale uulgi Syrmiam cor-
rupte pro Syrmæa dixerit, ex amygdalis, & pulpa gallinacea, & saccharo. Nam Hippocrates
Surmeam, siue Syrmæam, pro succi quodam genere, seu passum, seu defrutum id sit, intelligi
uolebat, cum præciperet, quid in uino odorato, Syrmæae sumendum esset. In compositio-
nibus quibusdam Pauli & Aetij Bacanum inuenio commemorari. Nec quid ea res sit compe-
rio, præterq; in quodam glossemate, ubi semen, siue nucleum, siue mucronem Raphani Ba-
canum esse legebatur. Bacanum Aetius iocinori prodesse in cibo, utiq; parti eius uisceris
incuræ prædicat.

A G R I O R A P H A N O S.

A grioraphanos, ab Raphano agria differt auctoribus: ut aliud sit syluestris Raphanus, a-
liud Raphanus syluestris: quemadmodum leuca canthe, ab acantha leuce distat, id est, alba spi-
na, a spina alba. In quo tamen honestius puto nominibus Græcis uti, q̃ Latinis. De Agriora-
phano, & hic, & libro quarto paucis immutatis agitur. Apion, & Ischada nominando. Nec
D Theodorum probo, caricam, atq; pirum interpretantem. Falsum est & quod scribit, inter spi-
minem, q̃ auctor ille de Orchi herba scribit, similem ei caulem esse apio, sed spinosum. Proin-
de Plinius, caule inquit spinoso est Orchis. Paulus Chamaraphanon quoq; dici hanc existi-
mat, quæ Apios, siue Agrioraphanos uocetur. Radicem habet cepæ, sed ampliorem, uel ut
Theophrastus inquit, asphodeli, uerum squammofam. Nascitur in montosis & asperis, ali-
quando & herbosis. Effoditur uere.

De Syluestri Raphano.

C A P. CXXIII.

ῥαφανὶς ἀγρία

Syluestris Raphani, quam Romani Armoraciam uocant, folia sa-
turo similia, & quadamtenus Lampsanam imitantur. Radix gra-
cilis, tenera, subacris. Tam folium q̃ radix in olera recipitur. Excalsa-
cit. Urinam concitat, æstuosus.

B A R B A R I C O R O L L.

Raphanos agria, id est, Radicula syluestris, & quæ Cheria, & in Ponto Arinon, & ab aliqui-
bus Leuce, a nostris Armoracia uulgo dicitur, fronde copiosiore q̃ corpore. Laudatissima na-
scitur Arcadiæ. Seritur in Italia, & Armoraciam uocant satiuam, ut inquit Plinius.

De Sisaro.

C A P. CXXV.

σίσαρον

Sisarum uulgo cognitum. Cuius radix decocta ori grata est, & stoma-
cho utilis. Urinam ciet. Et appetentiam inuitat.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli, li. 20. ca. 5.

Sisifer Græci Sisaron appellant. Duorum generum est, Satiuum, & Erraticum. Inest longitu-
dine Sisiferi neruus: ut pastinacæ: qui decoctis extrahitur, magna tamen parte amaritudinis re-
lictæ: quæ multo in cibis temperata, etiam uertitur in gratiam. Nobilitauit hoc princeps Ti-
berius, flagitando a Germania omnibus annis ex Gelduba castello, quod impositum Rheno
est, ubi generositas præcipua: ex quo apparet frigidis locis conuenire. Non prætereundum,
quod tradunt, ideo utilem stomacho uideri cibum, quoniam nemo tres Siseres edendo con-

tinuaret. Sisaram Varro, Plinius Sisarum appellat herbam, cuius flore uescantur apes: ut in Eryce disputatum est.

EX M. VERG. COMM.

Inter olera quorum radix tantum in usu est Siser antiquis fuit, nec quaesitam in eo nisi radice crassitudinem Plinius, & Columella indicauerunt. Siquidem alter. 12. rei rusticae suae libro de satione eius agens, iubet pastinato, stercoreatoque loco, & praerissime ponenda esse pastinacam, Siser, & inulam, ut maiora capiant incrementa: Alter naturalis historiae libro. 19. e Germania maxime laudauit: quoniam egregiae generositatis, & amplissimae magnitudinis, in frigidissima regione nasceretur. Seri hoc non semine, sed bulbis ueteres dixerunt: qui ut in lilio, inula, & aro sit, a reliqua radice auulsi, ad nouam sobolem in hortis disponuntur. Fecerunt in hoc genere ueteres etiam satium, & erraticum: quemadmodum & in pastinaca, cui corigener esse creditur, si cuncta a ueteribus de eo tradita diligentius obseruentur, Poterant dici & alia, sed quae ab alijs tradita sunt, sine desiderio a nobis relinquuntur.

De Lapatho, & Rumice. CAP. CXXVI.

Ex generibus Lapathi, Oxylapathum uocant, quod in acutum tendit, praedura habens extrema, non nisi in palustribus nascens. Aliud est satium, illi dissimile. Tertium syluestre, paruum, plantagini proximum, humile & tenerum. Quartum genus est, quod alij Oxalida, alij Anaxyrida, aut Lapathon uocant, syluestri ac exiguo Rumici simile, caule non magno, semine subacuto, rubente, acri, in caule, & agnatis appendicibus emicante. Omnium decocto olerum aluus emollitur. Crudi illitu, melicerides temporis tractu discutiuntur. Syluestris & Oxilapathi, & eius quam Oxalida nominant, semen ex aqua, aut uino utiliter bibitur, contra dysenterias, & coeliacorum affectus, stomachi fastidia, scorpionum ictus. Quod si quis in potu praesumat, nihil molesti ex ictu patietur. Radices ex aceto coctae, aut illitae crudae, lepras, impetigines, & scabrosos ungues persanant. Sed antea locus aceto & nitro in sole perfricandus est. Pruritus corporis, decoctum earum sedat, si foueatur, aut in solijs balnearum confricetur. Coctae in uino & instillatae, aurium dentiumque dolorem mulcet. Strumas, parotidasque discutiunt. Lienem cum aceto extenuant. Aliqui amoliendis strumis radicum gestamine utuntur, eas collo appendentes. Tritae & inditae, foeminarum profluuia sistunt. Cum uino autem potae, regio morbo medentur. Calculos uesciae comminuunt. Menses cient. Scorpionum ictibus auxiliantur.

BARBARI COROLL.

Lapathum, nostri Rumicem sere appellant. Radice altissima, & inter olera maxime singulari: nec enim lateribus crassiores alias emittit, sed praetenuis. Multicaule hoc olus, ac ramosum, & cum perfecte adoleuit, figura betae proximum, corpus carnosum & madidum: eoque uel exemptum terrae diu recens. Viuacissimum praeteris oleribus est Lapathum, praesertim satium. Differt hoc a syluestri, quod sesquipedalis satiuo radix, breuior syluestri: gustus tamen gratior syluestri, sed acrior, ut omnia syluestria satiuis collata. Syluestre Lapathum, Aetius Centrodies, a pungendo cognominauit, radicem ei sublongam tradens, Raphano paruae similem. Quod si porro Lapathum a nostris Rumex dicitur, proprie tamen Rumex est, quem Oxalida, & Oxylapathum Graeci nominant, satiuo similem, folijs aquosis, colore betae candido, radice minima, Cantherinum Lapathum ab aliquibus uocatum. Quidam Oxylapathon satiuo similis esse, quod Oxalida, siue Rumicem existimant. Lapathos Democritus pro uenaticis serobibus accepisse dicitur. Theocritus Alapathon uocauit, ab effectu, quoniam exinaniat. Etenim Acti ci Alapatha, quae nos inanitiones dicimus, appellant.

A

λάπαθον
ὀξύλάπαθος

ὀξυλάδα
ἀναξυρίδα

B

Pli. li. 20. ca. 21.

D I O S C O R I D I S

E X M. V E R G. C O M M.

C Quæ a principio capitis huius frequens uox auditur, ὀξύ ὑπερ, & quæ ab his composita sunt, ὀξύλαπαθον, & ὀξύλας, in quibus anceps ad acetum, & quæ acuminata sunt significatio est, causam antiquis interpretibus, & latinis medicis dedit, ut omne Rumicis genus uno acetosæ nomine indicarent: quod scilicet ὀξύ Græci acetum dicunt. Cum tamen quartum Rumicis tantum genus acido sapore sit. ideoque ὀξύλας dicta fuerit: qua uoce uinum quod acorem contraxit, & acescentem fecem, Græci etiam appellant. Cætera uero omnia ab acuta foliorum magis minusue cuspidē ὀξύλαπαθον, & ὑποξύλαπαθον dicta fuerint. Quod forte miretur aliquis, si nesciat late in græcis patere significationem τοῦ ὀξυῦ, id est, eius quod illi acutum dicunt: nec tantum indicari ea uoce quæ in cuspidem, aut mucronem desinunt, sed quæ celeri motu etiā transiunt, & subito efficacique sensu sentiuntur: quoniā quemadmodum illa cuspidē mucroneque suo quæ primū penetrant, eodem modo & hæc festinata & efficaci actione potestate suā exercent. Sic Homerus gladium acutum sepe numero dixit. Pindarus uero acutam niuem, non eodem quo gladius modo acutam, sed gelu, sensuque suo in humanum corpus penetralem. Qua uoce Lucretius, & Maro felicissime in frigore uli fuerunt. Eadem ratione Hippocrates etiam καίρον ὀξύ, id est, occasionem non acutam, sed citissime transeuntem, & præcipitem dixit. Ob hanc ipsam causam acetū etiam ὀξύ a Græcis dictum est, quod acore suo altius, efficacissimeque in hominis sensum penetraret, nec sine doloris aliquo sensu sentiatur. Fuit itaque in Rumicum nominibus antiquis græcis hæc ratio, ut una eademque uoce in alijs acidus significaretur sapor, in alijs acuminata foliorum cuspidē. Ideoque nos in quibus acidus sapor sit, ea descriptione uli sumus, quæ id indicaret. In quibus autem acuminata essent folia, aliquid itidem adiecimus, quo ea significaretur species. Quodque hic in quarto genere ait, non oxalida ab acido sapore tantum, sed anaxyrida etiam dici, a foliorum figura acceptum est.

De Hippolapatho.

C A P. CXXVII.

ἵππολάπαθον

Hypolapathon olus est magnum, in paludibus nascens. Eadem habet uires quas supradicta Rumicis genera.

B A R B A R I C O R O L L.

DHypolapathum maius satiuo, candidiusque, ac spissius. Adicere nonnulli Bulapathon, radicis tantum altitudine differens. Sunt qui & Hydrolapathum tradunt, in aqua natum.

De Lampsana.

CXXVIII.

λαμψάνη

Lampsana, quod Romani Napium uocant, syluestre olus est. Plus alit quæ Rumex, & stomacho utilius. Cuius folia caulesque coquantur in cibo.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 20. ca. 9.

Lapsanam Græci uocant Lampanem, Cyma est, siue Brassica syluestris, pedali altitudine, foliorum trium: quæ hirsuta ei sunt, Napo simillima, nisi candidior esset flore. Hinc a latinis uocari Napium existimo: in quo tamen Dioscoridem auctorem solum habeo. Lapsanam diuili carminibus, præcipue iocis militaribus celebratam, ait Plinius. Alternis quippe uersibus exprobrauere, Lapsana se uixisse apud Dyrrachium, præmiorum parsimoniam cauillantes. Asiam puto herbam fuisse, qua cum lacte uictitauit exercitus. Cara nomine, ut alibi notabimus. Nam radice utebantur eius, non folio, ut ait Hirtius.

E X M. V E R G. C O M M.

Hæc est Lapsana illa, qua Plinius ait ad Dyrrachium, uixisse Cæsarianos milites, eamque in triumpho Imperatori suo iocularibus carminibus exprobrasse: Vulgare olus, & in Brassicarum genere. Eam præcepit Columella prope aluearia ferendam esse: quoniam copiosam ex ea ceram apes colligant: Vulgaremque dixit, quoniam ubique fere nascitur, folijs non dissimilibus Brassicæ; & ut nos uidimus, utrinque trinis.

De Bunio, Napi genere.

C A P. CXXIX.

βούνιον ἀντίον
ἀνέμοσφορον
παράλακρυ

Bunio aliqui Aclinam uocant, alij Anemosphoron, magi Paradachry, Aegyptij Erxonem, Romani Scopā regiā, Aphri Zigar, aut Tēpsō. Caulē emittit quadrangulū, & in eo foliosos ramulos, tenues,

preternuibus foliis et flosculis scatentes, longitudine digitali, folia, ppter radicē, Apio similia, sed multo tenuiora, & quæ modo quodam folia tribuli imitentur. Flores anethi, semen odoratū, minus Hyoscyamo. Excalfacit Bunion. Vrinā ciet. Sécūdas detrahit. Lienī, renibus, & uesicæ utile. Eo humēti aridoue utunt, exēpto radice & caulib. succo, ex aqua mulsa.

BARBARI COROLL.

BVnion, hoc est quod nostri Napum uocant, ut in Buniade meminimus. Quancq; Dioscorides Scopam regiam uocari Romæ scribat. Cæterum alia quoq; Scopa regia est, ut in Siderite constabit. De qua porro Scopa regia loquatur Plinius uigesimo primo libro, non leuior inquit odor ei, quam Scopam regiam uocant, quancq; folia eius oleant, non flores, existimandū relinquo. Paulus Aegineta Buniō, a nonnullis Arction appellari scribit. Galenus Arcticonē. De Buniō eadem a Dioscoride libro quarto, quæ hic legebantur detraimus, quia inutiliter repetita esse uidebantur.

De Blito. CAP. CXXX.

Blito Aegyptij Echlotoripā appellāt, alij Riplā. Romani Blitū, βλητον
Daci Bles. Oulus est aluo utile, nullius in medicīna momenti.

BARBARI COROLL.

Blitum, siue Blitus (Græci etiam Bleton) erumpit ocyliū, semen ut Betæ, corticeum, copiosum, racemosumq; ut Atriplici. Radice non una, crassa, in rectum tendente, ut Beta, & Lathos, & maxima pars olerum, sed continuo, multiplici, ac proluxa. Inspidum, & sine acrimonia. Vnde conuiciū foeminis apud Menandrum faciunt mariti. Blitum duplex ostenditur, rubens, & candidum. Apud Aristophanem quoq; Blitomamæ, pro stolidis accipiuntur: quos Plautus noster Bliteos appellat in Truculento.

Blitea inquit, & lutea est meretrix.

Etiamsi corrupte legitur Blittera. Hippocrates Bubleton quoq; nominat herbæ genus: modum in uerbo non sit. Scio enim & Bolbiton pro fimo bubulo, & Bolbiton pro quodam polyporum genere minuto capī ab Hippocrate, ut Galenus testatum reliquit. Sed & Onoboliton herba, linguæ similis, Hippocrati, contra foeminarum profluvia in uellere apponitur.

EX M. VERG. COMM.

Maledicebatur quondā hominū ingnauic ex hoc olerē, & in accusanda ridendaue alicuius focordia & inutilitate, despectiorem Blito uulgus appellabat: tam nullum in morbis, aut sanitate usum habet. Edendo herbam esse Blitum, Paulus Aegineta in sexto ait, humereq; in secundo ordine et frigere. Palladius in Martio mense, his uerbis de natura sationeq; eius tradidit. Hoc mense Blitus seritur, solo qualicumq; sed culto. Oulus hoc neq; runcandum, neq; sarculandum est. Cum semel natum fuerit, ipsum se per multa secula seminis sui deiectione reparabit, ut etiam si uelis uix possit aboleri. Paulus itidem Aegineta, præter paulo ante dicta, in primo inter olera Blitum numerauit, coniunxitq; Atriplici: nec quicq; de utraq; aliud dixit, q̃ humidū esse, uentrem deicere, & parce nutrire.

De Malua. CAP. CXXXI.

MALVAM hortensiam Pythagoras Antema uocauit, μαλὰ χεῖ ἀντιμα
Zoroastres Diadema, Aegyptij Cochortem, Magi Lienem capræ, aut muris Vrinam. Satiua esui longe aprior syluestri. Stomacho aduerfatur. Aluum iuuat, sed multo magis caules. Interaneis & uesicæ utilis. Cruda folia cum salis exiguo manducata, ægylopes ex melle sanant. Verum cum cicatricem trahere ceperint, ea demum citra salem utendum est. Contra aculeatos apium uesparumque ictus, illita efficax est. Eadem cum oleo trita peruncti, non feriuntur. Vlcerā manantia in capite, furefque cum urina sanat. Sacris ignibus, & ambustis decocta folia, tri-

D I O S C O R I D I S

Ctaque, utilissime ex oleo imponuntur. Eius decoctum uulvas in seffione mollit. Prodest erosionibus uesicæ, & intestinorum, uulua, sedisq, clystere infusum. Ius decoctæ cum radice sua, contra omnia uenena auxiliatur, si continuo a bibentibus reuomatur. Contra phalangiorum morbusus remedio est. Lac euocat. Semen in uino potum, addito Loti syluestris semine, uesicæ cruciatus lenit.

Pli. li. 20. ca. 21
Theo. li. 9. c. 19

B A R B A R I C O R O L L.

MAlua culturae opera, intra sextum, septimumq; mensē grandescit in arborem, hastarū, baculorumq; usu in Arabia, Mauritania quoq; Lixi oppido æstuario, ad Hesperidū hortos, & iuxta delubrum Herculis. Duo genera earum summa: quæ amplitudine folij discernuntur. Maiorem Græci Malachen uocant in satuiis. Alteram ab emolliendo uentre dictam putant Malachen e syluestribus, cui grande folium, & radices candidæ, Althæa nōminatur. Est & quæ unicaulis nascitur, Monocaulos ex factō cognominata. Omne solum in quo feruntur Maluæ, pinguius faciunt. De Althæa, quæ item Dendromalache, siue Anadendromalache dicitur, & Ibliscus, uolumine tertio disseritur. Est & Alcea huius fere generis scorum indicanda.

ἄτραπεζιον
ἄτραπεζιον

De Atriplice. C A P. CXXXII.

ATraphaxin aliqui Chrysolachanon uocant, Romani Atriplicē, Aegyptij Ochi. Cognitum olus est. Duo eius genera. Syluestre. & Satium. Coctū estur ut olus. Aluū mollit. Panos discutit, siue crudū, siue coctum illinatur. Semē cū aqua mulsā potum, regium morbū sanat,

Pli. li. 20. ca. 20

B A R B A R I C O R O L L.

ATriplex, octauo die a satū, Octobri mense prouenit. Radix ei una descendit in altitudinē, unde fibræ aliæ promantur, ut in Beta. Foliatum habet semen, & obductum cortice, numerosum, racematimq; singulis ramis insidens. Atriplex & syluestre est, & satium: accusatum a Pythagora, tanq; faceret hydropicos, morbosq; regios, & pallorem. Coquitur difficillime, ac ne in hortis quidem iuxta eum nasci quicq; nisi languidum, culpauit. Addidere alij plurimas ægitudines ex eo gigni, nec nisi aqua sæpius mutata coquēdum. In Italia difficulter id nascebatur. Syluestri capillos tingebant. Atriplex ueteres, nō Atriplicē uocasse perhibent: ab græco nomine potius, q̄ ab atrore, ut arbitor. Hippoc. etiā Adraphaxin appellat: post Atraphaxin dixere Atticis, d, literam in, t, mutare amantibus: ut facit Aristot. qui entelechiam, pro entelechia usurpauit, ut Lucianus autor est. Quibus porro Atriplex idē uidet esse cum eo genere qd̄ Spinacia uulgo dicimus, & Græci recentiores Spanachia, fallunt apertissime. Si quē porro uocabulum id parum delectat, Atriplex Hispaniensis nominetur. Et Hercule fieri potest, ut inde profectum sit ad nos olus, ieiunij aptissimum, nec ueteribus (ut conijcio ac demiror) comperit.

E X. M. V E R G. C O M M.

Iocatus ex hoc olere quondam in fabula quæ Equites inscribitur, græcorum omnium comicorum lepidissimus Aristophanēs, est, falsi Atriplicis olere, ab oratoribus Athenienses impleri in concione dicens: compositioq; ex olere, & mendacio nomine, quæ sita in populo uulgari ratione gratiam, & credulæ plæbis irritam bonorum spem simul deridens: non aliam ob causam, q̄ quia uulgare hoc olus est, nullamq; habet maiorem utilitatem: qualia hominum mendacia sunt, ubiq; omnibus in promptu parataq; & inutiliter plarimq; euadentia: pro quod olus hoc etiam habet in tertio refrigerandi ordine, per alium celerrime descendens. Quæ tota spei fortuna est: siquidem in ancipiti posita, quantumuis leui pulsū & strepitū tota perit & euolat. Sationem Atraphaxis docuit Columella libro. 12. his uerbis. Cherephilum, itemq; olus Atriplicis, quod græci uocant ἄτραπεζιον, circa calendas octobres obrui oportet, non frigidissimo loco. Nam si regio sæuas habet hyemes, post idus februarias semine differenda sunt, suaq; se de partienda. Papauer, & Anethum eandem habent conditionem sationis quam Cherephilum, & Atraphaxis. Cur autem Chrysolachanon etiam, id est, aureum olus quondam dicitur, facilem habet coniecturam: quoniam luthæo flore sit, idēq; ab auro nomen inuenit.

De Brassica. CAP. CXXXIII.

CRamben Romani Brassicam uocant. Ea aluo est idonea, si modo leuiter feruefacta edatur. Nam percocta aluum sistit. Sed multo magis bis cocta, aut quæ in lixiuio coquitur. Stomachum autem male habet. Acrior est æstiuæ. In Aegypto propter amaritudinem non estur. Cæcutientibus, et tremulis esse, prodest. Summo cibo sumpta, crapulam discutit, & uini noxam restinguit. Melior stomacho Cyma, sed acrior, & ad ciendum urinam ualidior. Ea condita, stomacho inimica est. Aluum conturbat. Crudus succus cum nitro & iri deuoratus, aluum emollit. Cum uino quoque epotus, uiperarum morsibus auxiliatur. Cum fecno græci farina, podagris & articularum uitijis illinitur. Prodest & sordidis ulceribus, & uetustis, illitus. Caput purgat naribus infusus. Menfes extrahit cum loliacea farina inditus, Folia per sese, aut cum polenta trita, conferunt inflammationibus, tumoribusque. Epinyctidas, ignem sacrum, leprasque sanant. Carbunculos ex sale rumpunt. Fluentes capillos retinet. Cocta, addito melle, aduersus depascentia ulcera, gangrænasque ualent. Lienosisque, ex aceto cruda profunt. Mansa deuorato succo, retusam uocem instaurant. Decoctum eius potu, aluum & menfes ciet. Flos post conceptionem in pello subditus, partus spem adimit. Semen eius, præsertim quæ in Aegypto nascitur, potum, tineas repellit. In antidota coeliacorum additur. Faciei cutem, lentiginemque expurgat. Virentes cauliculi cum radice cremati, & adipe porci uetusto excepti, diurnos laterum dolores mitigant.

BARBARI COROLL.

BRassicam, antiqua Græcia, non Cramben, sed Raphanon appellabat: quod & Aristoteles, ut Iulius Pollux inquit, et Theophrastus fere sequitur. Crambe quasi Coramble dicta existimatur: quæ pupulas oculorum, quas Græci Coras uocant, hebetet, autore Columella. Sed & ipsi quoque Attici Corambem dicunt eam. Dedit hoc locum prouerbio fortasse, repetita Brassicam, nedum nocere, etiam occidere. Græci tostam carnem Crambaleam uocant, Athenæus autor. Brassica, ut Varro inquit, dicta quasi passica, quæ ex scapo minutatim præficatur, & passica fiat. Die a saturo decimo se ostendit Brassica. Digeritur a Theophrasto in genera maxime tria. Syluestris, cui folium æquabile, paruum, rotundum, multiplex: ramosa, succo aspo, medicato, ad detractiones per aluum præcipuo. Secundum Crispæ: quæ & amplitudine folij, & bonitate succi præfertur omnibus. Tertium Leuis appellatur. Nonnulli addidere Quartum, cui semen deterrimum, aut omnino nullum. Cato quoque tria facit discrimina. Vnam extetis & grandibus folijs, caule magno: propterea Cauloden uocatam, aliquando Septembrinam, ab alijs Eleada. Alteram crispam, folio, Selinada nominatam, a similitudine foliorum Apij: quæ & Apiam cognominant, alij Clituaiculâ. Tertiam proprie appellatam Crambem, minutis caulibus, folijs tenuioribus, & simplicibus, densissimisque, sed amariorem, leuiorem, teneram, quæ ob id & Lenis dicatur. Sed de syluestri Brassica suo loco agemus. Athenæus tria inquit Brassicæ sunt fastigia. Primum Halmyris: quæ & præfertur omnibus, præsertim in Eretria, & Cumis, & Ephesi, & Rhodo, & Gnido genita. Secundum Liophyllos, a foliorum leuore dictum, ubique nascens. Tertium Selenufia, folio crispo, et Apij similitudine, a qua & nomen habet. Hæc naturæ, illa ganeæ distinctio. Tritiana magnitudine ac sapore præcipua, cui pedale aliquando caput. Dein Cumana sessilis folio, capite parula: mox Aricina, altitudine non excelsior, folio numerosior quæ tenuior, cuius sub omnibus pene folijs fit uicat cauliculus peculiaris. Ideoque utilissimum genus existimat. Pompeianam, in oppido Capanig. Pompeijs præceris caulibus, ab radice gracili, intra folia crassescens. Rariora hæc, angustioraque, sed tenera

A

κράμβη

Crambe summa summo cibo, discutit crapulam, & restinguit noxam uini.

B

Theo. li. 7. c. 4.

Pli. li. 20. ca. 9.

Cato de reru

stica. ca. 136. 137

Crambe bis cocta

mors est.

Tria genera Brassicæ.

Syluestris.

Crispa. hæc præfertur alijs.

Lenis.

Cato facit tria discrimina

1. Cauloden uocatam, quæ

Septembrina dicitur

2. Selinada. alij uocant Clituaiculam.

3. Tritiana. quæ proprie appellatur Crambem. quæ etiam Lenis fit.

D I O S C O R I D I S

Ctas in dote, frigora non tolerat. Sabellicę usq; in admirationem crispa sunt folia: quorū crassitudo ipsum caulem extenuat, sed dulcissima perhibentur ex omnibus. Non pridem ante Columellam subiere Lacutres, a loco dicti, quo lacus Turni, siue ut Plinius scribit, lacus Turonis fuerit, conuallē Aricina, capite prægrandes, folio innumero. Alij in orbem porrecti. Alij in latitudinem torosi. Nec plus ullis capitibus post Tritianos, et Cyma nullis ferior. Hoc genus quidā interpretant qd mō Capitios coles, & in Hispania Murtianos uocāt, Brutiani, frigoris us alunt, grandes folijs, caule tenues, sapore acuti. Addunt ijs Silirenses, Tiburtini, Stabiani, Parthenopei, q sunt hirsuti. V esuini, q sunt amari, nō sine suauitate. Marrucini, rubent paucis folijs. Si gnini breuiore, crassiores, sapidiore Cappadoç folijs, caule pene nullo, frequētibz tunicis, & contra frigus muniti, priuq; in florem exeant, ut uix prima folia discernantur hyeme. Cui- cūq; generi pruinę plurimū suauitas conferunt. Suauissima ex omnibus est Cyma. Est autē Cy- ma qdā ipsorū caulium, delicatior teneriorq; cauliculus, quem a prima sectione, proximo uere præstant. Græci Cyema, quasi partū eius uocant. Nos & Cymas, & Cymata uocamus: nec in Brassica mō, sed in Raphano, & alijs cōpluribus: q; absolute Cyma, nō nisi de Brassicę fructu capif. Palladius Quymā uocat, et semel opere in toto Plinius. Post Cymā æstiuū, autumnale- q; cauliculi, mox hyberni, tū deinde iterum Cymę, nullo æque genere multifero, donec sua fer- tilitate cōsumatur. Omnibus oleribus anreponit Cato Brassicā: ppter ea, ut inquit Varro, no- mine oleris Brassica intelligitur. Vites ad Brassicā assitæ diffugiunt, introrsumq; in fundum se declinant: quo argumento usus Androcydes, cōtra ebrietatem ualere Brassicam dixit. Tāta est inter plantas quoq; discordia. Hinc Nestor in eo libro, qui Alexicepos inscribitur, olus hoc ex lachrymis Lycurgi, a Libero patre uitibus adalligatū, natum prodidit. Brassicę decoctę aqua, nihil æque feter humi effusa, crustę si occupent intus uasa calidaria, in tantum, ut non sit eas auellere: si Brassica in ijs decocta fuerit, abscedūt: Coles capitatos, uulgaris sermo, Scapitos ap- pellar, antiqui Lacuturres, et Tritianos, ut conicio. Ex semine uetusto Brassicę nasciunt Ra- pam, & contra ex Raporum Brassicam. Nobilitauit Brassicam Ionīa, per eam iurando, quasi p- aliquem Deorum: ut Zeno Citeius stoicę familię caput, per Capparin, Socratis credo amula- tione deierantis per canem. Ob id & mantin, ceu uatem quandam ab Hipponaſte Brassicam uocari, testis est Athenæus: qui & puerperis in Attica regione amuleti cuiusdam loco Brassicā apponi solitam commemorat. Nomen oleris commune quidem est quibuscumq; Lachanum apud Græcos, priuatim tamen Brassicę tribuitur. Ab olla dictum Olus, testis est Varro: ut eo- uideatur poeta Veronensis alludere cum cecinit, non olera Olla capis. In quo sciamus obiter, non pro uase in eo uersu capi Ollam, sed nomen esse uiri proprium. quod ignorātes fere gram- matici, delyrant: Quemadmodum & in eiusdem poetę uerbo, Mentula.

E X M. V E R G. C O M M.

Autor omnibus, ut credimus, post se Theophrastus fuit, ut Brassicę, quę edendo est, præ- cipuam diuisionem triplicem faceret: nec aliter, si conferantur ueterum latinorum cum eo in hac parte cōmentaria, rem diligenter intuentibus uidebitur. Nihil enim octauo de plantis li- bro, de olerē hoc ab eo dictum, non iisdem uerbis, Romana breuitate a Marco Catone rustica- rum rerum capite centesimo & quinquagesimo septimo redditum est: & post Catonē a Plinio naturalis historię. 19. cap. 7. Quę ideo non repetuntur a nobis: quoniam quę tria a Diosco- ride numerantur hoc loco Brassicę genera, satiuę, agrestis, & marinę, aliam diuisionis rationē habent. Siquidem illę ex ruris, hortorumq; disciplina, & ad usum sanitatis in pascenda familia ab autoribus illis traditę fuerunt: hę diuersis locis nascentes, ad medicinam docentur. Opor- tet itaq; in priore illa Brassica, & quam satiuam hic dixit, tria illa Theophrasti, Catonis, & Pli- nij genera collegisse. Omnium enim pares uires sunt. Tum agrestem, & marinam illis adicere sponte sua, alijsq; locis, & ad medicinam tantum nascentes, & quę non aliunde q; ex similitudi- ne aliqua in familiam & nomen Brassicarum uenerunt: quales plantę alię multę, deficientibus proprijs appellationibus, quibus indicarentur, gentiū adoptione, nomen, & dignitatem inue- nerunt. Vidimus nos marinam Brassicam, nihil præter florem simile satiuę habentē, eadem fi- gura qua a Diosco. describitur, tenuissimis, & in longitudinem porrectis folijs, qualia in Salice sunt, pediculis pendentibus, & in longis ramulis per interualla binis deinceps dispositis. Hanc in antiquissimis gręcorum codicibus a Romanis legimus marinum Codiculum uocari. Agre- stem Plinius Erraticam etiam nominat, cōmuni syluestribus cunctis appellatione. Quę enim gręci ἄγρια dicūt, erraticę plerūq; latini appellauerūt. Non relinquendum illud etiā, qd ad grę- corū in hoc olerē appellationes pertinet: quam posteriores in ea gente Cramben dixerunt, an- tiores Raphanum dixisse. Testatur id Theophrastus libro de plantis octauo, qui non alio q;

*Brassica alia
Satia.
Agrestis.
Marina.*

*Plinius brassicum
agrestem alium no,
minat erraticum.*

Raphani nomine p Crābe utit. Verba eius sunt. τῆς δὲ ραφάνου τριχὴ διακρινόμενος. &c. Nec multo post, ἡ δὲ ῥαφάνος ἔχει. Itemq; lib. 2. de causis plātarū. καθάπερ ἡ ἀμπέλος τῇ τῆς ἀράνης κῆρ τῇ τῆς ραφάνου. Quæ oīa nō de Raphano, quæ Radicula nūc est, sed de Crābe, quā Brassicā nostri nomināt, ab eo dicta fuerunt. Idem, & longe certius Aristoteles lib. 5. de animalū historia, q; loco de erucis in Brassicis nascētibus his agit uerbis. αἱ δὲ γίνονται ἐν τοῦ φύλλων τοῦ χλωρῶν κῆρ, μαλιστα ἐπὶ τῆς ραφάνου ἢν καλοῦσι τινὲς κραιβὴν. Qd' est. Nascunt et aliq; ex uiridibus folijs, p̄sertimq; in Raphano, quā Crambē aliq; i. Brassicā nomināt. Actum de tota hac re lōgius a nobis est, ut intelligerent legentes, quanto periculo huiusmodi docent, nisi res prius q; uoces cognouerit aliq;: & scirent, qui medicinam profitentur, posse aliqñ fieri, ut Raphanū p Brassica in antiquissimis græcorum scriptoribus inueniant, qualis Hippocrates est: oportereq; in ea uoce, non Radiculam quæ nunc græcis & latinis Raphanus dicitur, sed Brassicæ olus intelligi.

De Syluestri Brassica. CAP. CXXXIII.

Syluestris Brassica, quam Romani Rusticā appellant, maritimis præruptisq; locis, magna ex parte gignitur. Satiuæ similis, sed candidior, hispidiorq; amara. Cuius Cyma i lixiuio cocta ori nō insuauis. Folia illitu uulnera conglutinant. Et inflammationes, tumoresq; discutunt.

BARBARI COROLL.

Brassicam syluestrem, Græci medicantes Ceram quoq; nominant: nos Erraticam. Quamq; sciendum, Ceram genus Raphani a Plinio acceptū, non Brassicæ. Hanc alij Petræam uocāt, ini miscillimam uitis. Sunt qui Colem syluaticum appellent. Syluestris laudes imenso plus prædicat Cato q; satiuæ. Folia syluestri leuia, rotunda, parua, & ut Plinius inquit, bina, sed densissima, & plurima, plantis oleris similior. Inter syluestres Brassicas & Lapfana est, ut diximus: itē Sandix, & Isalione, & Enthusifcon, siue ut alij codices, Anthrifcon. De Petræa Theophrastus, si modo hæc est quam supra diximus, circa Psophidem nasci scribit optimā, numerosamq;. Aliubi non Petræam, sed Petræum uocauit. Alioquin & Capparis Petræa quandoq; dicitur. Nā Petrophyes Aizoum est, ut Emperon Saxifraga.

κράμβη ἀγρία
Cyma uitis f. d.

Theo. lib. 7.
capite. 4. 5.

B

De Brassica marina. CAP. CXXXV.

Marina Brassica a satiuā prorsus abhorret, q; folia ferat rotundæ Aristolochiæ, prælonga, tenuia. Singula à ramulis rubentibus exeunt, singulari ut Hædera stilo. Habet lacteum succum, sed paucum, falso gustu, & aliquantum amaro, pingui compage. Hæra in totum stomacho inimica, acris. Vehementissime aluum ciēt, in cibo cocta. Coquitur, propter acrimoniam, cum pingui carne.

BARBARI COROLL.

Brassicæ marinæ cauliculos quidam Halmyrida uocari putant, quoniam nisi in maritimis non proueniat. Nauigatione quoq; longinqua, uiridibus asseruatis ad transferendum. Plinius hanc marinum Olus, est ubi appellat, recentiores græci Thalassocramben.

κράμβη θαλάσσια

De Beta. CAP. CXXXVI.

Beta duorum generum est. E quibus nigra coquitur cum lenticulo, ut uentrem sistat. Quod magis radice eius præstatur. Candida aluo utilis est. Vtræq; tamen propter nitrosum humorem quem habet in se, noxij succi est. Vnde succus earum, cum melle naribus inditus, caput purgat. Aurium doloribus auxiliatur. Decoctum radice & foliorū, furfures, lentescq; deterget. Perniones foru mitigat. Crudis folijs uiliginis nitro antea perfrictas, alopeciarū inanitates, atq; depascentia ulcera, illi ni prodest. Eruptionibus papularū, igni sacro, ambustisq;, cocta medet.

BARBARI COROLL.

Beta culturæ quadam ratione incrementum capescit arboris. Seritur circa mensem maium,

τιτύλον

Pli. li. 19. ca. 9.

x iij

D I O S C O R I D I S

C sicut omnia, quæ græci uocant Epispōra: quod genus etiam sementis primæ nomen habet: etiam si alio quoque sata mense proueniant. Ideoque Beta æstate, sexto die nascitur, hyeme decimo. Peculiare in Beta est, ut non continuo singula semina producat, sed anno interim sequenti, sæpe tertio. Radix Betæ unica, longa, recta, carnosæ, gustu iucunda, & nonnullis grata cibo uel cruda. E lateribus aliæ item crassæ, modo singulæ, modo binæ, ternæque funduntur. E quibus si bræ coherentes alligant. Cortex neque crassus, neque Raphani modo extricabilis, sed Olusatro ad quendam modum similis. Semen integritur cortice. Folio Beta uiret, pede candicat, figurâ, b, literæ cum deprimitur, ab olitoribus refert, unde nomen. Beta hortensiorum leuissima est. Græci præferunt ex Ascre ubique candidam, parcellissimi seminis, appellantes Siculam. Nostri Betæ grana faciunt, uernū, & autumnale: quæque & iunio & ianuario seratur. Medici Betam innocentiorē, quā olus esse indicauere, ut inquit Diphilus. Quamobrem appositas, non nemini degustare etiā religio erat, utque ualidis potius in cibo essent. Gemina huic natura, & oleris, & capite ipso exiliētis bulbi. Neque alij hortensium latitudo tanta, ut in lactucis, cum coeperit colorē trahere, imposito leui pondere, in binos pedes aliquando se pandendo. In Ciceiensis agro amplissime pueniunt. Vini sapor in dolio corrumpitur Brassica, sed odore Betæ folijs demersis restituit. De alia porro Beta, proprie syluestri dicemus in Limonio, Græci Betā modo Scutlos, seu modo Teutlos uocant. Hippocrates Tetylon (ut arbitror) nisi corruptus locus est in eo libro, quod de mulierum natura inscribitur. Aliud uidetur genus esse Teutlis, ut Athenæus inquit, ex Diphili comici sententia. Nam duo fuere Diphili: medicus, qui & Siphnius cognominatur: & comicus. Hic imperitum quendam in comœdia describit, taxans quod Teulon Teutlida nominaret. Eudemus quatuor Betæ facit genera. uulfile, furculosum, populare, candidum. Betam græci, ouillum Corium uocant: unde Bætylus is lapis appellatus est, quem pro Ioue Saturnus uorasse fingitur. Monstratur & saxum hoc nomine, ad Iuliopolin in Syria, proxime Libanum montem. Est & auicuila, quæ uocatur Betylus, olim dicta Detylus.

E X. M. V E R G. C O M M.

Quotquot hætenus de Beta notissimo omnibus olere, aut in historia, aut medicina aliquid tradiderunt, omnes duo genera eius fecerunt, colore alterum ab altero distinguentes. Theophrastus lib. 8. ἐνχυλότερον δὲ καὶ τὸν τυτλὸν τὸ λευκὸν τοῦ μέλανος, καὶ ὀλιγοσπερμότερον ὁ καλοῦσι τινὲς σικελικόν. Quod est. Meliore autem succi copia in Betis candida quæ nigra est: paucior etiam semine, quam Sicelicam aliqui uocant. Plinius. 19. uolumine a Theophrasto accepta eadem, his reddidit uerbis. Eius quoque a colore duo genera græci fecere, nigram, & candidam, quam præferunt, parcellissimi seminis: appellantque Siculam. Paulus Aegineta etiam in sextæ prætulit: quod simul aluum molli, & stomacho accommodata est: quod non facit nigra, quæ adstringendi uim habet. Et ne longiores simus, nullus non de Beta agens, discrimen eius oleris hoc tradidit: & nihilominus præter Theophrastum, nullas discriminis eius alias notas aliquis ostendit, quibus cognita in frequentiore usu esset: & is non quod ad colorem pertineret, sed quod ad vires, bonitatemque succi, & exiguum seminis copiam. Solus Columella, quod hætenus legerim, in carmine suo facilem coloris huius in Beta cognitionem indicauit, dicens. Sic & humo pingui, ferratæ cuspidis ictu. Deprimitur folio uiridis pede candida Beta. pedem candidum, radicem appellans, quæ facilis cognitu, nota omnibus cum feretur & uelletur erit. Quæ enim nigra radice erit, agrestis Beta habebitur: ideoque in uetustioribus & melioribus aliquot græcis, a principio huius capituli legitur, non ut Barbarus uertit τυτλὸν μέλα, quod grande significat, sed una tantum mutata litera, μέλαν καὶ ὄχρειον, quod nigrum indicat & syluestre. Hæc enim candida comparata, agrestis a græcis habebitur: non quam Plinius uicesimo libro cap. 8. Limonion, aut Neuroïdes a quibusdam uocari ait. De qua hic ipse scriptor libro quarto folia Betæ similia habere tantum dicit.

ἀνδράχνη ἀγρία

De Portulaca syluestri. C A P. CXXXVII.

Syluestris Portulaca, quam aliqui Aizoon syluestre uocant, alij Telesphion, Romani Illecebram, aliqui Portulacam, Aphrimœmœon, Daci Lax, Aegyptij Mochmutim. Folijs pusillis, ad satiuam accedentibus, hirsutis, latioribus. Nascitur in petrosis. Nonnunquam in hortis. Folia Oleæ habet, minora multo, plura & tenera, rubentes cauliculos, ex utroque

na radice multos, in terra sessiles, qui manducati bonum succum pari-
unt, uiscosi, & aliquantum salsi. Vis ei excafactoria, acris, exulcerans.
Discutit strumas, cum axungia illita.

B A R B A R I C O R O L L.

ANdrachne sylvestris, de qua hic agit, genus est Aizoi, ut quarto uolumine constabit, ubi
Dioscorides hanc herbam fere iisdem uerbis demonstrat. Nascitur breuiore cacumine, q̄ mi-
nus Aizoum: quod in muris, parietinisq; prouenit: cui & similis ostenditur. Colligi hanc & clā-
bi causā constar. Habentur & alia duo genera sylvestris Andrachnes, hoc est, Portulacæ nomi-
ne, ut in Telephio, & Pepli diximus. Telephion in Theocrito, sunt qui solum papaueris accipi-
ant, ad explorandū amorem crepitu adhiberi solitū, qui lusus fere puellaris erat, ut inquit Pol-
lux, etiam nū ex Lilio. Non desunt qui sui generis herbā intelligant, succo feminis sanguineo,
folijs Loti satius, filiqua Pampini modo intorta. Alij miscellam quandā esse putant Telephion,
quæ corporis partibus imposita, si cutis rubescat, indicium amoris esse, ob id Philtron quoq; di-
ci: sin accendatur, & exulceretur, odij. Ego Telephion Theocriti eādem esse cum ea de qua hic
agitur existimo, quippe cui excafactoria & ulceratoria uis insit.

Pli, li, 25, ca, 15.

De Portulaca.

CAP. CXXXVIII.

Portulacæ uis adstringit. Capitis doloribus, inflammationibus o-
culorum, cæterisq; cum polenta imponitur. Ardoribus stomā-
chi, sacro igni, uesicæ doloribus auxilio est. Commanducata, dentium
stupores sedat. Stomāchi & intestinorū æstuationem, fluctionesq; mul-
cet. Renes & uesicam adiuvat, etiam si erosionem sentiant. Veneris impe-
tus exoluit. Succus epotus simili effectū prodest, in febribus ualens. Con-
tra teretes uentris tinea, cruentam excreationem, dysenteriam, hæmor-
rhoidas, & profluuiā sanguinis, percocta efficax est. Item cōtra sepi mor-
fus. Ocularibus medicamentis utilissime commiscetur. Interaneis flucti-
one laborantibus, atq; uuluarum erosionibus infunditur. Contra dolo-
res, quos æstus excitauit, caput ex rosaceo & oleo fōtetur. Eruptiones
papularum in capite, cum uino emendat. Vulneribus quæ ad syderati-
onem spectant, ex polenta illinitur.

αἰδράχνη

B A R B A R I C O R O L L.

Portulaca exit post Cucurbitam, Ianuario mense, ut Theophrastus inquit, seritur. Hippo-
crates Portulacam fluuiatilem dicendo, uidetur recentem, & non inueteratam intelligere. Flu-
uiatilis inquit Portulaca refrigerat, inueterata excalfacit, atq; purgat.

Theoph, li, 7.

De Asparagis.

CAP. CXXXIX.

AS P A R A G V S, quem aliqui Petreōn, alij Myacantham, alij
Myon uocant, uulgo notus est. Huius cauliculi in cibo, uen-
trem emolliunt. Vrinam cient. Radicis decoctum contra urinæ difficul-
tatem, regium morbum, renum uitia, & coxendicum cruciatus, in potu
proficit. Cum uino autem phalangiorum morsibus auxiliatur. Si deco-
cti succus super dente contineatur, eius dolori medetur. Semen ad eadem
ualet. Canes, ut aiunt, si decoctum bibant, entoritur. Asparagum etiam
nasci prodiderunt, arietis cornibus contusis, atq; defossis. Quod, q̄tum
equidem sentio, plane a ueritate abhorret. Instantien Asparagus multis ra-
mis fructicat, folijs feniculi, numerosis, radice rotunda, grandi, tuber ha-
bente. Huius teneri cauliculi triti in uino albo, renum dolores sedant.

ἀσπαράγος

D I O S C O R I D I S

C Assus autem, coctusue, urinæ stillicidium, difficultatemq; ac dysenterias; mitigat. Radix cum uino, aut aceto cocta, luxatos artus mulcet. Cum ficis, aut ciceribus sumpta, regium morbum sanat. Coxendicis cruciatus, stranguriamq; leuat. Alligata radix, aut haustum eius decoctum, conceptum adimit, & sterilitatem adfert.

Pli. li. 19. ca. 3.

A S P A R A G I C O R O L L.

A Sparagus, uel ab asperitate, ut inquit Varro, uel quoniam ita Græci nominant, Aspharagos a Theophrasto dicitur. Ipsum quoq; guttur a quibusdam Aspharagus uocatur. Ab Appione tamen grammatico, non Aspharagus, sed Spharagus. Corrudam nostrum appellant hanc herbam. Spinoli sunt Asparagi ex toto fere, ut scorpius, unde Scorpiones quoq; a Columella fortasse nominantur: quamq; Asparagus cognomine Scorpius, siue Scorpio aliud genus est, ut in Scorpio de herba disputabitur. Post æquinoctium autumnii flos exit e quodam folliculo secundum aculeos. Asparagum uero Theophrastus pro planta ipsa uidetur accepisse, aut etiam pro loco, ubi satus est Asparagus: eodem etymo fere quo apud nos Cepina, Rapinaq; Theodorus Corrudagine quasi aliud q; Corrudam genus interpretatur. Cato certe ad eundem modum Corrudam, quo Cepinam & Rapinam accipit. In arundinetis inquit Corrudam ferit, unde fiant Asparagi. Exit uere caulis cibo idoneus: tum scabrescit, & processu in florem abit: qui non ex ipso tantum, sed ex prioribus erumpit. Non enim caulem habet annuum. Hæc ueteres, qui Altiles Asparagos non uidentur nouisse. Corrudam Attici, non Horminion (aliud enim est) sed Orminion, & Ormenon potius, aliqui Libycum Asparagum dixere, utiq; syluestrem qui post inuictos Altiles, proprie Corrudam est. Corrudam iterum species duæ, candoris solo discrimine. Candidiorum efficacior uis tribuitur. Iulius Pollux syluestrem Asparagida scribit uocari: satiuum, Ormenon. Serunt spongiis hortenses Asparagi. Ita enim Radicula Altium uocantur. Velluntur præterq; primo anno radicitus, alioquin decerpitis stirpes præfractæ angunt, & quasi excæcāt oculos spongiarum, nec patiuntur Asparagum mitti: spongiæ post quadragesimum diem inter se implicantur, & quasi unitatem faciunt: post annos aliquot transferunt fertilitate in decennium durante. Seruntur poro ipso quo fastigatus est, in thoros struitur. Nullum his gratius solum q; Rauena fuit, quæ gloria in hodiernum quoq; mansit ei terræ. Nomen porro Asparagi generale est: ut Betæ, Blicæ, Lactucæ, Attriplici, Maluæ, Rapo, Sinapi, Radiculæ, Pyrethro, Brassicæ, Nasturtio, Bryoniæ, Lauraginis, ut in omnibus his alia res Asparagus, alia frutex sit. Errant qui Corrudam pro eo capiunt, quæ medicorum officinæ Lupulum cognominant: folijs apertissime reclamantibus, quæ in Corrudam capillamenti modo tenuata, in Lupulo Bryoniæ similia, paulo asperiuscula. Caulis ei spinis horret, cacuminibus tamē, & Corrudam modo in torulos turbinatis. Flores habet folia ceos & candidos, qui fere allium, uinumq; subolent. Hanc Græci uulgo Bryton uocant, a Bryoniæ ut puto similitudine. Brusculam, quasi bryon scanfile, rura dicunt. Aut hæc oino, aut non absimilis huic herba est, qua occidentis populi Ceruissam suam maceratis humore floribus commendant, sapore quodam uini. Habiolam, siue Habillam Gallicæ uocantes, Humulum, & Tholophin Germani. Ego Lupum salictarium a Plinio dictam cenfeo, subit enim, scanditq; salices, & arbuta omnia, circumuoluendo se complectitur. In Flaminia quoq; Lupus reptitius uulgari nomine uocatur hodie. Herbarum inquit sponte nascentium, quibus utimur in cibis, in Italia paucissimas nouimus, Fraga, Tanum, Ruscum, Batin marinam, Batin hortensianam, quam aliqui Asparagum uocant Gallicum: præter has Pastinacam pratensem, Lupum salictarium: eaq; uerius oblectamenta q; cibos. Habetur & aliud quoddam genus, ut idem Plinius testatur, incultius Asparago, mitius Corrudam, passim etiam in montibus nascens, refertis superioris Germaniæ campis. Nam quod in Nefide Campaniæ insula sponte inquit oritur, optimi existimatur.

E X M. V E R G. C O M M.

Vix credat aliquis, q; multa in notissimo olere toto hoc capite mutata, corrupta, & addita fuerint, quæ nouisse legentes inutile penitus non fuerit. Estq; illud ante omnia sciendum, de agrestis Asparago omnia hæc a Dioscoride dici. Ideoq; a principio statim Petreus, id est, in petrosi nascens dictus est: ut ea additione ab Altii, quem in hortis constitum, solæ nouerunt diuitum mensæ, discernetur. Nec tantum Petreus illic legitur, sed in aliquot græcis *ἄγριος*, id est, agrestis etiam inuenitur. Indicantq; id manifeste quæ sequuntur appellationes, Myacantha, & Orminion, quæ omnes in agresti Asparago a Plinio numerantur. Habetq; Myacantha caussam &

originem nominis ex Ruscii appellationibus : ut in eo indicabimus. Ormionem autem a nobis dictum est, quod myon in impressis codicibus legebatur, nulla significatione : instauratusque locus Plinij, & aliorum auctoritate merito a nobis est.

De Plantagine.

CAP. CXL.

ARnoglōsson, alij Arnion uocant, alij Probation, alij Cyniōglōsson, alij Heptapleuron, alij Polyneuron, Magi Burechinemona, Aegyptij Asonth, Romani Plantaginem, Hispani Thesāricam, Poeni Atijrcon. Duo eius genera. Minor, folia habet angustiora, minora, molliora, lauiora, & tenuiora, caule anguloso, in terra sessili, floribus pallidis, semine summis caulibus emicante. Altera maior & uirentior, latis constans folijs, olerum generis. Cuius caulis cubiti altitudinem petit, angulosus, subruber, a medio ad uerticem tenui semine circumdatus. Radicibus nititur teneris, hirsutis, candidis, digitum crassitudine æquantibus. Nascitur in lacunosis, sepibus, & locis humidis. Multo utilior magna est. Vim habent folia exiccatoriam, constringentem. Quare omnibus malignis ulceribus, & fluctioni opportunis, atque elephantice, sordidisque illita profunt. Profluvia sanguinis, ulcera quæ serpunt, epinyctidas, carbunculos, nomasque cohibent. Vetera ulcera, & inæqualia cicatrice obducunt. Chironia sanant. Sinus conglutinant. Morsibus canis, ambustis igni, inflammationibus, partibus, parotidibus, strumis, ægyptijs illita cum sale profunt. Coctum cum aceto & sale olus, dysentericis, coeliacisque sumptum subuenit. Datur & in locum Betæ, cum lenticula coctum. In leucophlecmatia, inter aridas epulas herba decocta datur. Comitialibus, & suspiriosis data proficit. Foliorum succus, colluta subinde oris ulcera, purgat. Cum cimolia, aut cerusa, igni sacro medetur. Fistulis infusus prodest. Lippitudinibus & aurium doloribus idem succus instillatur. Additur quoque in oculorum collyria. Gingiuis cruore suffusis, & sanguinis reiectionibus, potu confert. Clystere dysentericis infunditur. Contra tabem datur in potu. Aduersus strangulationes uulvæ, in uellere subijcitur, etiam si uulua fluctuone laboret. Semen ex uino potum, alui fluctiones & sanguinis excretaiones sistit. Decocta radix, & manducata, & collutione dentium dolores sedat. Eadem cum folijs, ulceribus renum, & uescicæ in passo datur. Ferunt tres radices cum tribus uini cyathis, & pari aquæ modo, tertianis auxiliari, & quatuor quaternis. Sunt qui radice gestamine, discutiendis strumis utantur. Syri ius Plantaginis & calaminthæ, cum melle produnt ijs mederi, quos uires defecerunt, datum die secunda, & quarta, & parasceue, id est, ueneris die. Hoc autem ueluti arcanum accipito, quod ueraci experientia compertum est.

BARBARI COROLL.

Plantago herba, Stelephuros, & Ortyx a Theophrasto dicitur, a Plinio Seläpyros, & Ortygia, Coturnix a Theodoro uertitur, a Dacis Simpeax. Alij Thyeticem, alij Theucaricon

ἀρνόγλωσσον
ἄρνειον
κυνόγλωσσον
πολύνενρον
ἡπτόπλινρον

B

Pl. li. 25. ca. 9.

D I O S C O R I D I S

C appellant, a nostris quandoq; Septineruia. Quamq; Heptaneuron alia uidetur herba q; Plan-
tago, id quod ex emplastro quodam aduersus collectiones, cui nomen est Botanicon, aperte li-
quet: quippe in quod tres quærantur herbæ: Plantago ternis uncis, heptaneuron senis, leoneu-
ron quoq; ternis. Nec quæ sit Leoneuron intelligo, flosculus ei lanugineus, ut frumento: parti-
culatim erumpens, ut aphaca, & intubum. Inter spicatas est Plantago, sed minor, nigrioribus
folijs, & linguæ pecorū simillimis, unde nomen apud Græcos Arnoglossō: maior folijs lateritū
modo includitur: quæ quia septem sunt, Heptapleuron nonnulli uocauere. Caulis angulatus,
& similis Napi, Arnoglossō, & Arnoglossā dicitur, a Græcis Plantago.

E X M. V E R G. C O M M.

Quæ a Dioscoride numerantur tam multæ Plantaginis appellationes, una tantū uoce a
Plinio colliguntur. Siquidem 25. uolumine capite, s. linguæ pecorum similia Plan-
taginis folia esse dicens, Romana breuitate complexus omnia est: quæ in legentium gratiā ex-
plicanda modo a nobis sunt. Arnoglossos itaq; a Græcis Plantago dicta est, q; agnīne linguæ
folia eius speciem habent, ἀρνίον enim agnum, γλώσσαν uero linguam ea gens appellat. Eandem
habet rationem & causam ἀρνίον, quasi adiectiua forma agnīnā herbam dicas, προβάτιον itidem
ab oue, quasi ouillam, πρόβατον enim græcis ouis est, κυνόγλωσσος, id est, canina lingua, non quia
quæ uere Cynoglossa dicitur Plantago sit, sed non dissimili foliorum figura. Videturq; appel-
latione hac minor potius, q; maior Plantago significari, quæ caninæ linguæ similior q; maior
est. Dico autem Caninā linguam herbam sic appellatam, de qua in quarto agendum erit. He-
ptapleuros eadem, & Polyneuros ex eadem causa, iisdem notis dicta est. πλειράς enim Græci
costas dicunt. Et quoniā septem crassioribus fibris, quasi costis in dorso per longitudinem so-
lia eius distincta sint, ideo nomen id inuenit. Nec minus a multitudine earundem fibrarū, quas
neruos etiā uocant, Polyneuron. Factumq; postremū hoc nomen ex eo est, quoniā non semper
septem, sed aliquando quinque tantū his fibris distincta est. Eamq; ob causam, quoniā non semper
per responderet numerus, aliqui incertā relinquentes rem, Polyneuron, quasi multineruū dix-
erunt. Tam enim quinque q; septem multa sunt. Variant autē Plantaginis fibræ pro latitudine fo-
lij: quod enim latissimū fuerit septem, quod angustius, quinque plerunq; habet.

D **¶** De Lauere, seu Sio.

C A P. CXLII.

σίον ἀναγallis
χίονος ἀρωματικῆ

Sion, quod in aquis est, aliqui aquatilem Anagallida, alij Darenion,
alij Lauer, alij Schinon Aromaticum uocant. In aquis inuenitur,
frutice pingui, recto, folijs latis, Holusatro similibus, sed minoribus, &
odoratis. Quæ cruda coctaq; esu calculos rumpunt, atq; excernunt. V-
rinas cient. Menses & partus extrahūt. Dyfentericis in cibo auxiliantur.
De Sio Crateias tradit, hærbam esse fruticis specie, pauca folia ferentem,
rotunda, maiora q; Mentæ, nigra, & ad Erucam accedentia.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 26. ca. 9.

Sium latius Apio est, nigrius, pinguius, copiosum semine. Sion ἡ ὄσσει a Græcis uocatur,
hoc est, Sium in aquis, siue aquaticū. Hoc multi uulgo Cresionē dici rentur falso, promiscuū &
acetariū olus, & refrigerantis naturæ: At Sium calfacientis est, & odoratū. Sunt qui Lauer Plin-
io uocatū, in riuis proueniens, uile torminibus coctum & conditū, & ad calculos uesciæ cru-
dum pro Sio capiant. Nam & Dioscorides hoc loco Sium ait a Romanis Lauer dici, etiā La-
uerde scriptū est. Sunt qui herbā, quæ ab eodem Plinio Silaus dicat, in glareosis & riuis na-
scentē, Apij similitudine, uescis perinde laudat, pro Sio & Cresionibus intelligant. Ego in ca-
stigatione Pliniana uerbū illud Silaus, adulterinū arbitratum sum, nec Silaus, sed Lauer scriben-
dum. Hoc autē Lauer, ipse pro Cresionibus accipio, nō pro Sio, qd odoratū est, ut cōmonui.

E X M. V E R G. C O M M.

Non est ut uidetur dubitandum, quo loco nascatur Sium: quale autem sit, Anagallis indi-
cabit: ob cuius similitudinem aquatica Anagallis a quibusdam dictum est: indicabit ob ean-
dem causam & odoratus Iuncus. De quorū altero actum in primo uolumine est, de altera non
multo post in hoc ipso agetur. Idem hoc Sion a Romanis Lauer dici, hic ipse scriptor testatur.
Meminit autē Laueris Plinius, ut credimus, lib. 26. non tamen idem Laueri in eo Sion est: quo-
niam de Sio. 22. uolumine eiusdem numeri capite longius egerat: dixeratq; latius Apio esse, in
aquis nasci, pluraq; alia, quæ poterunt in eo uolentes certius expendere. Nos illud tantum in eo

A nemus, Lauer dici Sion ob natalium similitudinem, quoniam ambobus uita in aquis sit. Quid autem Lauer Plinio dicatur, non difficile erit rem diligenter in eo contemplantibus intellexisse. Describit enim, in aquis nascentem uulgarem herbam, qua rura fere omnia cum aceto in cibis utantur. Sunt qui credant hanc esse, quam uulgi Cresiones appellat. Quod nos ut non negamus, sic etiam non confirmamus. Quod autem testamur est, non esse Sion quod Lauer. Id enim auctore Dioscoride odoratum est, Lauer nullo odore commendatur. Qualecunque autem Sion sit, non adeo dissimile Apio describitur. Nec est quod miretur aliquis, nostra ætate tantam rerum incertitudinem: cum nec quondam florente Græcorum fortuna, Sium, ut paulo ante monstraui mus; a professoribus cognoscere. Ostendunt nostræ ætatis herbarij, dissimilem huic penitus quam illi Sion uocant, Feniculi folijs, altiore crassioreque caule, grandi in summo umbella: nisi confertior sit feniculo, non dissimili colore, in cunctis albicante.

De Sisymbrio.

CAP. CXLII.

SISYMBRION, alij Serpillum uocant, alij Veneris Coronam, σιςυμβριον
Romani Veneream, aut Eulsteralem. In solo inculto nascitur, Mentæ horrensus similitudine, odoratius, latiore folio. Inferitur coronis. Calfaciendi uim habet. Contra stillicidia urinæ, calculosque semen ex uino bibitur. Tormina & singultus sedat. Folia in capitis dolore, fronti, aut temporibus illinuntur. Item contra uespærum, apiumque ictus. Vomitiones potu cohibet.

B A R B A R I C O R O L L.

Sisymbrium, siue ut recentiores Græci, Cimbium, degenerat in Nepitam aspectu, sed odore in Mentam, ut Theophrastus existimat. Latissimum nascitur circa piscinas, & stagna, & in puteorum parietibus. Folium in siccio nascenti angustius, quod in riguis prouenit: de quo mox agetur. Sisymbrio montes plerique scelerant, sicut Thracia: ubi & Serpillum, aut aquæ defuerunt ex ijs auulsos ramos, feruntque. Item Sycione ex suis montibus, & Athenis Hymetto, Sisymbrium folio tantum coronat.

Theophr. lib.
6. cap. 7.

EX M. VERG. COMM.

Sisymbrium ut odore in Mentam, figura in Nepitam degeneret, præcipuam a cultu negligentia causam habet. Nisi enim assidua cultura coëreatur, & translatione nouos ueluti naturales quot annis accipiat, in varias plantas quæ primum diuersa sui parte degenerat. Testantur id rei rusticæ, & plantarum historiam tradentes scriptores omnes, Theophrastusque præsertim: qui nullibi de naturæ mutationibus his egit, ut non Sisymbrij in Mentam, degenerantis exemplum usus sit: causamque mutationis eius in quinto de plantarum causis longius prosecutus est: docens fieri, ut cum Sisymbrium non excoluerit olitor, nec propriam illi & necessariam culturam reddiderit, altius radices agat, actisque in altum omne illud nutrimentum conuertat, eoque destitutas superiores partes infirmiores fieri, & odoris acrimoniâ amittere: eaque amissa, reliqui corporis odorem infirmum, languidumque, & Mentæ similem fieri. Eamque ob causam, ne id patiat, transferri sæpius Sisymbrium in disciplina ruris & hortorum præcipitur. Serpilli figurâ & speciem aliquam Sisymbrium habet: ideo a quibusdam, ut hic ait, Serpillum etiam uocatum est. Quemadmodum in similibus fieri solet. Plinius Serpillum ait syluestrem Sisymbrium a quibusdam dici. Facit id negligentia, & rerum ignorantia: cogitque, commutatis ob similitudinem inuicem nominibus, diuersarum generum, graui periculo miscere. Veneris coronam, & herbam Veneream, ob odoris suauitatem, uerisimile est dictum quondam fuisse Sisymbrium. Amor enim Dea, amoribus aptas tantum sibi exigit herbas, quibus coronata in comestationibus suis iuuentus, suauiore odoris oblectamento, uoluptates suas commendat & augeat. Et hæc de primi, aridisque & incultis locis nascentis Sisymbrij appellationibus dicta satis sint. Quæ deinde in altero & si modo in aquosis nascente a Dioscoride numerata fuerunt, ab eodem etiam declarantur. Ideo enim Cardamine facta a Nasturcio nomine, dictum quondam Sisymbrium hoc fuit, quod simile Nasturcio in gustu & sapore sit. Tantaque est Sisymbrij huius quod Cardaminæ dicunt, ad Sium similitudo, ut Paulus Aegineta in sexto reuoluerit, dicere quosdam, Cardaminem hanc Sium esse. Nasci hoc ipsam locis quibus & Sium, a Dioscoride tantum dictum, in aquosis, scilicet, idque genus Plinius etiam describit.

B.

D I O S C O R I D I S

C plisse his uerbis uidetur. Lætissimum nascitur in puteorum parietibus, & circa piscinas, & stagna. Cum tamē hic aliter tradiderit, non circa, sed in aquis eodem quo Sium modo nasci. Non possunt abundantibus rebus, deficientibusq; nominibus priuatim, seorsumq; omnia citari. Generatim necesse est uocari, describiq; multa, unamq; hanc ob causam medica ubiq; materia tam parum certa est, tamq; in antiquis etiam scriptoribus multiplex, & uaria. Nos quod possumus præstamus, immensi operis huius aliquam post nos alijs partem relinquentes.

¶ De altero Sisymbrio. CAP. CXLIII.

καρδαμίνη

A lterum Sisymbrij genus, quod aliqui Cardaminam, alijs Sion appellant. Ea herba riguis gaudet, & eisdē in locis quibus Sion prouenit. Quæ ideo nonnullis Cardamina nominatur, q̃ gustu Cardamū, id est, Nasturciū representet. Folia primū rotunda prodeunt, adulta Erucae modo findunt. Id exalfacit. Vrinās mouet. Crudū estur. Purgat lentiginēs, cutisq; uitia in facie, noctibus impositū, matutinisq; detractū.

B A R B A R I C O R O L L.

S i Sybrium syluestre a quibusdam Thymbratum appellatum, pedali, nō amplius altitudine conspicitur. Huic cognomen est Cardamine, ut Galeno placet, atq; Dioscoridi.

¶ De Crithmo. CAP. CXLIIII.

κρίθμον
κρίταμον

C RITHMUM, seu potius ut aliqui Critamon, fruticosa herbula est, cubiti altitudinem petens. Nascitur in maritimis, & petrosiss, folijs pinguibus, numerosis, albicantibus, ueluti Portulacæ, crassioribus, & longioribus, falso gustu. Flores candidi sunt, & semen ceu Rosmarini, odoratum, molle, rotundum, quod siccatum rumpitur. Habitat intus semen rufum, radices digiti crassitudine, tres, aut quatuor, grati odoris & iucundi. Radix, semen, & folia incocta uiuo, potu urinae difficultati, & regio morbo auxiliantur. Menses cient. Estur crudum coctumue in olere. Seruatur etiam in muria.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 21. ca. 27.

C rethmon, Batis latine dicitur: q̃q̃ Batis duplex, marina, & hortensiana: quā aliqui Asparagum uocāt gallicum. Liguria Baticulam hodie quoq; appellat. Caulis ei palmū altus Plinio, cubitalis Dioscoridi. Semen feruens, nucleo interiore, qui ut in Rosmarino Cachrys uocetur. De marina potius q̃ de hortensiana, siue quod idem est, satiuā loquitur Plinius, quotiens Crethmon nominat. Proinde alio loco de Bati medicinis, alio de Crethmo differit. Satiuam Batin, & olus Chordum a Columella dictam inuenio. Hanc quia serotinum sit olus, quo modo & Sed & pecus Chordum, & Chordū suum dicimus, ut Græci Opsigonon. Nam Metachæron apposuisse. Hippocrates Aethiopicā Batin cōmendat. Est & Batis, siue Batos. inter pisces, quē quit. Batin, atq; Baton nostri Raia appellat. Nam quod Græci Rhinam, ipsi Squatinā uocamus, cuius aridā cutem Hippocrates Ichthyen noīat. Quamq; & instrumentū medicinale, quo quādoq; uertit: nisi alterutra lingua librarius errauerit. Batis porro piscis in tria genera dirimitur, Baton, Hobaton, & Asterianbatin; & ex Squatina & Raia, natus Rhinobatos.

E X M. V E R G. C O M M.

Q uam Græci Crithmon, a figura seminis, ut credimus dixerunt, Plinius, & alijs ubiq; Batim, Columella nunc Batim, nunc olus Chordum, q̃ sero & appropinquante uinuestria, & per se nascencia, inuentū: mox in hortis ubiq; ad quotidianos usus confita herbam: quam ditiorū, & plæbis mensæ pariter nouerunt. Eam hic paulominus q̃ cubitali altitudine in

caulem crescere ait: ceteri palmum erigi a terra tantum dixerunt. Quod in Italia, præsertimq; in Hortensi uerius uidetur. Non ideo tamen arguendus Dioscorides. Nulla enim in his certa naturæ lex & mensura est. Refertq; magnopere in huiusmodi rerum historia, quibus locis ali quid cōmetetur aliquis: credimusq; nos quod hic ait, cubitali fere altitudine esse Batim, sic acci piendum esse, ut maxima omnibus locis hæc eius mensura sit, nec altio rem cubito Batim alicur bi inueniri. Estq; legitimus hic, et ob naturæ uarietatem necessariū metiendi omnia modus; ut præfinito altero extremo, nec ultra, nec citra id aliquid fieri intelligatur.

De Coronopo. CAP. CXLV.

Coronopus, aliquibus Ammonos, alijs Alstrion, Pœnis Atir sitte, Romanis Cicatrix, alijs Stilago, alijs Sanguinaria dici tur. Oblonga hærbula est per terram repens, fissis folijs. Coquitur in olere. Radicem habet tenuem, adstringentem, quæ in cibo coeliacis fa cit. Prouenit in semitis, iuxta domicilia, & locis incultis.

BARBARI COROLL.

Coronopus, hoc est, Pes cornicis, inter aculeatas a Theophrasto ponitur, spōteq; nascent. Interim & feritur, medicinae ad usum, Silago, aut Stilago dicitur a nostris, a Græcis etiam Coronopodion, ut Galeno. Sunt Arabes qui hanc Coruinum uocent. Nec prohibeo, dū res constet, quibus cuiq; liber uocibus utat: illud monendi sunt, herbam, quæ mō Pes coruinus ab officinis & herbicidis appellatur, non tam Coronopoda uideri, q̃ Ranunculi genus, q̃d Polyanthemō cognominatur: quandoquidem aculeata & oblonga esse Coronopus herba tradi tur, & aluinis prodesse: Coruinus aut pes, auis eius, & Ranunculi similitudine conspicitur, plu rimis foliorum diuisuris, cuius uel tactu solo pustulæ, ambusti modo corporibus attollunt, flo re aureo, copiosoq; quibus notis, Ranunculum Polyanthemō uocatum coniungunt.

EX M. VERG. COMM.

Scripsit de Coronopode hac iam pridē multa Leoniceus, uir nostra ætate dignus, cui mul tum deferant bonarum literarum cupidi, in cōmentariolo eo quod de Plinij erratibus aliquot edi dit. Conatusque inter cætera est, quam hic romana appellatione Coronopodis Caciatricem esse dicit, ostendere ab Apuleio Galli crus dictam fuisse: & ex Galli crure ab imperitis græcorū librarijs Caciatricem in hoc scriptore factam esse. Quod si confirmare ego ausim, uaticinari ma gis q̃ censere me credam. Nulla enim eius uocis vestigia in hac supersunt. Nec coniectura ali qua in ea se offert, qua quod ignoratur & later in lucem trahi possit. Illud potius admittendū, quoniam græci a Cornicis pede eam uocauerunt, uerisimile esse, latinos a Galli crure congru entibus alijs notis, ob similitudinem, nomen illi fecisse: quemadmodū ab aliquibus etiā, non cornicis, sed Coruinus pes hæc ipsa nominatur. Idem præterea eandem a Plinio ait lib. 24. Gra men aculeatū appellari. De quo dubitandum nulli esset, si hic aut aculeatā dixisset Coronopo dem, aut q̃d aculeos indicaret aliqd illi adiecisset. Quam ob causam, nō sine ratione subsistet in Plinio aliq; audiens in aculeatas lib. 21. & secūdo Coronopoda ab eo numerari. Nec nos Pli nium arguimus, sed uarietate historiæ demiramur: dubitamusq; posse eam notā Diosc. deesse. Theophrastus lib. 8. de ea tradidit humi caulescere, quod hic ait per terram sterni: numeratq; in ter aculeatas, & sponte nascentes. Vulgaris & ubiq; fere nascens herba hæc est.

De Cicerbita, seu Soncho. CAP. CXLVI.

Sonchon asperum, aliqui Cichorium uocant, Romani Cicerbitam asperam. Aphri Gathonem. Huius duo genera. Syluestrior magis spinis horret. Alter teneritate quadam mollescit, cibus expetitus, angulo so caule, interdum rubicāte, folijs in ambitu per interualla dissectis. Vtri usq; uis refrigerat. Modicè adstringit. Vnde æstuantī stomacho, et inflā mationibus illiti profunt. Succus eorū stomachi rosiones forbitione mi tigat. Lac elicit. In uellere appositus, sedis ac uulua collectionibus opitu latur. Tam hærbā q̃ radix illita, uibratis a scorpione ictibus subuenit. Alter Sonchus tenerior, arboris instar, latis constans folijs. Eum qui ra

D I O S C O R I D I S

Cmos habet, folia distinguunt. Sed ad eadem pollet.

BARBARI COROLL.

Sonchos, in candidum, nigrumq; diuiditur. Lactucae similes ambo: nisi spinosi essent, caule cubitali, intus cauo. sed qui fractus copioso lacte manet. Sunt qui nigro uelci prohibeant: quasi faciente morbos. Sonchum Hecale cum Bari supradicta Theseo, apud eundem poetam intulit, non tacendo Euclidis parasiti dicto non infulto, qui Sonchum in coena copiosam apponenti, senarium ex Euripide poeta protulit, ubi Capaneus inquit.

μίσω τραπέζας ὅστις ἔσθῃσι τὰ γὰρ.

Aculeatur postq; tenera esse desit, et adulta facta Sonchos, ut Galenus inqt. Aetius hanc quandoq; Dipsacon uocauit. Dioscorides Cicerbitam a Romanis dici prodidit: quod quidem uocabulum in Ethruria hodieq; durat. Nunc Romanum uulgus Crispinos, Venetia Lactucinos. Folia ex aceto, saleq; manduntur. Esculenta est & radix.

EX M. VERG. COMM.

Estur toto fere anno Sonchos: sed nihil autumno, quo tempore post primas pluuias nouo ortu tenerior frondet. In acetarijs nostris frequētius est. Eam, ut hic etiam testatur, rura nostra, & omnis Ethruria Cicerbitam uocat. Non ideo tamen credimus fuisse hoc eius antiquum nomen. Potuit enim ex non multo tempore Diosco. accreuisse, eo quo a principio diximus modo. Est ubi Crispinus, & ubi Lactucella Sonchos uocetur. Quotq; toto orbe gentes sunt, tot fere huiusmodi herbarum appellatione audiuntur. Nihilq; in medicæ materiæ disciplina periculosis est, q̃ neglectis rebus, nominum tantum sollicitum esse. Nota omnibus Sonchus est. Certas enim habet notas: & si in scriptoris huius historia omissum uideatur quod præcipuum in ea est, cuiusq; meminit Plinius, & unde Lactucella a quibusdam dicta fuit. Id autem est lactis liquor, quo fractus caulis eius manat. Potuit a Dioscoride propterea, q̃ nota uulgo Sonchus sit, ea nota relinqui. Potuit perijisse, ut perierat etiam in caulis descriptione *ὑπόλευρος*, quod est, inanis & uacuus: quæ uox in cōmuni græcorum lectione nulla est, & ex alijs, in quibus erat, restituta a nobis fuit: præsertim monente id Plinio, qui ait, caule cubitali, anguloso, intus cauo, & qui fractus copioso lacte manet: quæ omnia manifeste Sonchus habet. Inter aculeatas herbas, sed non simpliciter a Theophrasto lib. 6, Sonchus numeratur. Aculeatur enim postq; induruit, & arescere cœperit. Fecerunt ceteri omnes Sonchi duo genera: appellaruntq; alij candidam, & nigram: alij asperiores, & mitiores: alij edendo, alij non edendo esse dixerunt, eadem rei diuisione et significatione. Vbiq; em duo illa nascunt gēna, Solus Diosco. tertium genus Sonchi arborefcentis fecit, q̃ caret Italia. Nec nos hæcenus qualis ea sit, & ubi nascat, a q̃q; audiuius.

*σιγίρις
κίχάριον
πικρία*

De Intubo, & Seri. CAP. CXLVII.

Satiuam Serin alij Picrida appellant, Aegyptij Agon, Romani Intubum. Duum generum est. Altera syluestris, quæ Picris, et Cichoriō uocat. Altera latioribus folijs constat. Stomacho q̃ hortēsia utilior. Quæ iterū in duas species digeriū. Vna folio latiore p̃dit, Lactucarū simillima. Altera angustiore ē folio, & gustu amara. Vtraq; refrigerat et adstringit. Stomacho utilissima. Aluū sistit cocta, si cū aceto adsumat. Syluestres stomacho meliores. Quādoquidē æstuantē ipsū, et quē imbecillitas uexat, leniūt. Cardiacis per se, aut cum polenta utiliter illinunt. Podagris, et oculorum inflammationibus auxilio sunt. Hærbæ cum radice illita, percussis a scorpione subuenit. Igni sacro cum polenta medetur. Succus cum ceruifa & aceto ualet ad illitus eorum quæ refrigerationem desyderant.

BARBARI COROLL.

Serin satiuam Dioscorides non describit, sed syluestrem dumtaxat. Summa ergo Intuborum genera, Seris, & Cichorium. Seris Lactucae simillima, Troximion a recentioribus græcis uocatur. Iterum duplex hæc. Satiua, quæ proprie dicitur Seris, minor Cichorio & uenosior. Et Syluestris, melior priore: nigra hæc & æstiuæ, deterior hyberna, & candidior. Cichorium, siue ut Theophrastus inquit, Cichore, nunq; est satiuum. A latinis Ambugia, & Intubus erraticus, in Aegypto Cichorium nomen habet. Duplicis & hoc naturæ. Folio angusto, Chreston, & Pan-

Theophr. lib.
7. cap. 11. & 7.

eration, propter salubritatem uocatū, folio latiore, quod Edypnoida cognominant, & Leonis dens uulgarī uoce dicta creditur. Similitudo Intubis tanta cum Lactucis, ut neq; ex eodem genere dici possint, neque item ex alio. Hyemis quidem impatientiores sunt q̃ Lactucæ, uirula q̃ præferentes, sed caule nō minus grati. De Cichorio Theophrasti uerba subiiciemus in Chondrilla: quando & illa species existimatur Intubi a nonnullis.

EX M. VERG. COMM.

Prima oleris huius, & amplissima diuisio est, in satiuū, & erraticū. Dico autē Erraticum, qđ sponte sua natum, omni humano cultu caruit: qualia in plantis, & disciplina ruris multa fecit natura, feniculū, serpillū, pluraq; alia: a ueteribus latinis sic appellata, q̃ sub nulla olitoris, aut agricolæ lege, libera uagantur & errant. Ideoq; incastigata, satiuus minus speciosa sunt. Quod manifeste in Intyboprehenditur: cuius a principio unum idemq; genus, hac una ratione, in duas statim distrahitur species: quarū diuersæ penitus notæ sunt. Amarescit enī Erraticū, & angustiore folio est. Satiū ori, & in cibo gratius, latioribusq; folijs. Quod autē unū idemq; in am bobus seruiatur, flos est, & q̃ flores ferunt ramuli: quos natura nobis indulgit, ut esset unde satiuum Intybū facere uolētes, Erraticum cognosceremus. Post primā deinde & amplissimā diuisionem illam, alia rursus, accedente maiore, diligentioreq; cultura, & hominis labore, diuisio facta est: discretumq; satiuū Intybū in Lactucę dulcedine, foliorūq; quantitate & figura simile: & qđ minus eo sit, & amarulenti saporis. Et hic census Intyborū nostra ætate etiā est, uocatq; Florentinus ager Erraticū & Amarū primū Intybū illud, qđ græci ab amaritudine Picrida nominant: gentes autē aliq̃ priuatim Cichoriū: a multis quę habet in radice capillamentis, Radiculā. Idemq; huic nomini genus est, quod translatum, terraq; sepius obrutū, candorē teneritudinēq; acquirit, & maiorem amaritudinis partem amittit. Duoq; hæc genera sunt a Diosc. primū numerata, Satiuum deinde illud uno Intybi nomine nunc censetur: etsi corrupta ab Intybo uoce, Ethuria Endiuia passim appellat. In hoc & maius, et minus est, dulcedinisq; et amaritudinis discrimen aliquod: quod ut uidetur ex una diligentia & culturę ratione euenit. Prius illud notissimum uersu in Georgicis suis indicauit Maro, cum dixit, Et amaris Intyba fibris. Intelligens enī Intybū gñis nomē, ut græcis Seris est, latinis esse amaritudinem, ut ad certā contraheret speciem, addidit. Secundum illud Galenus dicens, *μικρόριον ἢ ῥωμαῖσι λεγόμενον ἰντυβόλαχανον*, quod est. Cichorium, quod Romani olus Intybi appellant. Indicauit & Flaccus cum cecinit, me Cichorea, leuesq; Maluæ, & cetera. Est enim Cichorium peregrina græcis etiam uox, quæ omnia hæc Intyborum genera simul indicet. Etsi ab aliquibus ad primum illud & amarum Intybum contrācta fuerit. Nihil, ut uidetur, in antiquis scriptoribus circa congeneris plantæ huius appellatio nes certum est. Theophrastus lib. 8. de plantarum historia, Cichoriō appellat syluestre illud genus, quod eodem autore ab amaritudine nomē inuenit. Agit enī de herbarum caulibus, aitq; *ὁ δὲ τοῦ μικρόριου μέγας καὶ ἀποθύει τῶν πολλὰς, ἔτι δὲ γλῆρος καὶ δυσδιάριτος διὰ τῆς ἀσπιδὸς χρωμάτων*. Quod est, Cichorei autem caulis magnus est, multas habet ueluti brachia agnationes: lentus itidem est, & in frangendo contumax. Quā ob causā, pro uinculis eo utuntur. Qua descriptione, uidetur amarū & agreste illud significare. Idem paulo post Picridem hoc ipsum appellat. Sæpe etiam in describenda in aliquibus latiore foliorum figura, *μικρορίωδης* ea appellat, id est, Cichorio similia, satiuum in dicans: hoc enim latiore & lactucino folio est. Paulus Aegineta Romana appellatione usus in primo, *ἰντυβὰ* totum hoc genus uocauit. In sexto deinde satiuum, agresteq; & amarum uno eodemq; nomine Serim: in secundo postremo Serim satiuū, Intybum agreste. Plinius libro. 15. capite septimo, a Lactuca digressus, satiuum esse Intybum his uerbis declarat. Neq; ex eodem genere possunt dici, neq; ex alio Intybi. Pauloq; post. Est & erraticum Intybum, quod in Aegypto Cichorium uocant. Mox iterum lib. 20. cap. 3. de erratīco & satiuo hæc ait. Intybi quoq; non extra remedia sunt. Erraticum apud nos quidam Am bubeiam appellauere: in Aegypto Cichorium uocat quod syluestre sit: satiuum autem Serim. Columella lib. 2. cap. 18. cum docet, quomodo prata colantur, Primū ne stirpes, aut spinas, &c. atq; alias ante hyemem, alias per autumnum extirpemus, ut rubos, uirgulta, iuncos: alias uel lamus, ut Intyba, ac solstitialis spinas. Qua descriptione, Intyba indicauit, quæ syluestria sunt. Satiua enim in pratis non inueniuntur. Idem postea li. 9. capite. 17. cum de educandis anseribus agit, Serim satiuam appellat his uerbis. Palustris quoq; sed herbidus destinetur ager: atq; alia pabula conferantur: ut uitia, trifolium, scœnū græcum, sed præcipue genus Intybi, quod græci appellant Serim. Postremo Palladius in octobri mense satiuum Intybū uocat. uerba eius sunt. Mense octobri ferenda sunt Intyba, quæ hyemi seruiant, &c. Ex his quæ tam multa & longissime repetita a nobis sunt, colligere facile est, nullam in his, nec græcis, nec latinis certam, per-

Cpetuamq; appellationem esse: sed in græcis Cichorium nunc agreste, nunc satiuum Intybum indicare: Picridem semper agreste, quemadmodum Serim plerumq; satiuum. In latinis Intybum modo satiuum, modo agreste, Ambubeiam autem agreste semper. Nec fore antiquos autores legentibus aliquid utilius, q̃ præcedente rei coniectura, contra q̃ in cæteris fit, non ex uocibus res, sed ex rebus uoces intellexisse. Solus Celsus libro. 2. cap. 29. de uitroq; gñe agens, ad certas uoces in medicina rem contraxisse uidet: satiuumq; Intybū, syluestre Ambubeiā appellasse. Verba eius sunt. Lēticula, cui uel Bera, uel Intubus, uel Ambubeiā, &c. alternitū sumi iubēs, aut satiuū qd Intybū, aut agreste qd Ambubeiā uocat. Censeremq; ego: qm̃ graui periculo in medicina hæc uariant, satiuū in græcis Serim, in latinis Intybū: Agreste in græcis Picrida, aut Cichorium, in latinis Ambubeiā semper appellari: ut certa nominū ratio, certam legentibus rem indicaret: nisi in medicæ materiæ nomenclatura audacior uideri aliquis uideret.

κονδρίλλα

De Condrilla. CAP. CXLVIII.

Condrilla, quam aliqui Cichorion, alij Serin appellant, caulem, flores, & folia habet Cichorio similia. Qua ex causa nonnulli syluestris Intubi speciem esse pronunciarunt. Verum tenuior tota est, in cuius ramulis gummi mastices simillimum, tuberculo fabæ inueniri solet. Quod cum myrrha tritum, & linteo appositum instar oliuæ, sceminarū mēses trahit. Tusa cū radicibus tota, adiecto melle, diuiditur in pastillos, qui nitro ammissi utiligines emaculant. Gummi, inordinatos pilos repli cat. Quod item tenera radix efficit, si intincta succo acus, pilis admouetur. Contra uiperas in uino pota proficit. Succus decoctus in uino, aut per sese potus, aluum sistit. Aliud habetur Condrillæ genus, folium ferens oblongum, circumrosus, humi sparsus, caulem succo madentē lacteo. Radice tenui, rotunda, leui, uegeta, flauescēte, succosa. Cuius & caulis & folia concoquendi uim habent. Succus incommodos palpebrarum pilos reflectit. Nascitur in lætis, & cultis.

The. li. 7. ca. 7.
Pli. li. 21. C. 15. 17

BARBARI COROLL.
Condrilla, siue Chondrillon olus est folio Intubi, & propter amaritudinem ingustabilis. Succus radici lacteus, copiosus, acer. Caulis fere pedalis, succo manans amaro. Radix fabæ similis, aliquando numerosa. Gummi eius proximum terræ funditur. Herbam mures agrestes a serpentibus læsi, mandunt. In Theophrasto Andryala, in Plinio Chondryala, pro Chondryllas. Omnia Intubacea, ut Theophrastus inquit, ineunte uere, caulem, floremq; simul edunt. Cichorium foliatu, & caulibus, & ab radice, unaq; cum emerfu ramusculorum flosculus emicat. In caule per partem, ut Heliotropium usq; in autumnum. Caule magno, surculisq; brachiato pluribus, itemq; ad uinctum quoq; lentis, ut radices: quarum prolixitate contumaciter emoritur. Fert & siliquam, siue folliculū, et in ea semen per extrema caulium. Intubam autem pleriq; falso intelligunt amari iecoris, non herbam, in Virgilij uersu primo Georgicorum, Et amaris Intuba fibris.

Quo doctissimus Poeta, ad genus illud Intubi uidetur alludere, quod Picris appellatur. Acrius Picrida pro Cichorio syluestri, quod & Serin dici uult, accipit. Iulius Pollux autor est, appellatione Cichorij ueteribus syluestria olera uenisse dumtaxat: quæ & gracilia, & tenuia cognominabantur. In Ouidio ad cutem probari Seram legimus illo uersu.

Et simul instantis corpora finge Seræ.

Quod autem id genus sit fruticis, non ausim decernere: nisi q̃s ab eo Serā, pro Seride uocaram credat. Nā & Chondrilla, quæ itē Seris est, ad illū usum, ut Diosc. hac parte docet, adhibebat.

E X. M. V E R G. C O M M.

Intybis congenerem esse Condrillam, argumēto est ueterum omnium de ea historia, q̃ ab Intybis statim de Condrilla agentes, eam illis coniunxerunt: deincepsq; descripserunt quā natura coniunxerat, & simul docendam esse ob similitudinem monuerat. Plura ceteri omnes q̃ hic de

ea docuerunt: caule pedali, & amarissimo totam sapore esse: radicem habere numerosam: gummi illud proximum terræ in ea inueniri, & candidum conspici florem: multaq; alia: quæ quoniam in Corollario suo a Barbaro collecta fuerunt, a nobis relinquuntur. Adiciemus hoc solum: tantam esse illi cum Ambubeia, quam diximus agreste Intybum, similitudinem, ut sæpe legentes in campis fallat. Nascitur, ut hic etiam ait, pingui & lutofo solo: quem habitum una uoce *ῥωδιστὶν χαρίων* felicissime Dioscorides indicauit. *ῥωδιστὶν* enim *χαρίων* in re rustica ueteres dixerunt eas agrorum partes, quæ nullos habent terræ mixtos lapides, sed solam terræ profunditatem: ob quam causam, non dilabentibus per lapidum interualla aquis, lutosus ager & pinguis sit. Idq; una *ῥωδιστὶν* uoce Dioscorides monstrauit. Sit autem hoc, an secus quod Barbarus uertit, nasci in terrosiss, aliorum iudicium sit. Nos rem primum, mox uocis rationem secuti, & pinguibus lutosissq; locis nasci eam diximus.

De Cucurbita. CAP. CXLIX.
Cucurbita esui apta. Cruda illitu tumores & abscessus mitigat. Ramenta eius infantibus contra capitis ardorem, quam syria sin uocant, in sincipite illinuntur. Oculorum inflammationes, podagraeque refrigerant. Succus e ramentis tuis per se, aut cum rosaceo infusus, aurium doloribus auxiliatur. Aduersiones cutis illitu adiuuat. Totius feruescitæ & expressæ succus, cum melle exiguo & nitro potus, aluum leniter resoluit. Vinum in cucurbitam recentem excavatam infusum, si mistum sub diuo teneatur, potu aluum leuigabit.

BARBARI COROLL.
Cucurbitam satiuam Colocynthen greci uocant. Syluestrem, Colocynthida. Erumpit satia, post quintum, sextum, septimumue diem. Cucurbitæ multa genera. Satiuum, & Colocynthidis, ut prædiximus. Tertium Somphos cognominata: quia sit inanis, digitali crassitudine, non nisi in saxosis nascens. Cucurbitam marinam nonnulli putant. Satiuæ fastigia duo. Prima, Camerarium in tecta scandens, leni umbra testudines & pergulas operiens. Plebeium humi reptat flagellis. In priore, mire tenui pediculo libratur pōdus immobile: auræ, Crescit qua cogitur forma in uaginas uittiles coniecta, postq; defloruit: plerumq; & draconis intorti figura: libertate uero pensili concessa, iam uisa est nouem pedum longitudinis. Cortex uiridi tener deditur cibus, quem admodum & primus quoq; caulis. Ipsæ quo longiores tenuioresq; sunt, eo gratiores, & ob id salubriores, quæ pendendo creuere, minimumq; seminis tales habent. Chrysippus unus omnium damnabat eas in cibus, cum tamen adagiū illud celebre iam esset, *κολοκύνθη δὲ σφίγεται*, hoc est, saniores esse q; Cucurbita. Siccantur fumo Cucurbitæ hortensiorum seminibus condendis, rusticæ supellectili, Alexandrinæ maxime. Iam & in balnearum usum uenere, urceorum uice, multo etiam prius cadorum ad uina condenda.

EX M. VERG. COMM.
Quoridianus, sed uulgaris usq; dum lignescat, cibus Cucurbita est, quibus nascitur locis omnibus pariter nota: nihil ideo longius de ea repetendum. Quod in medicina nouisse inutile non sit, ex grecorum placitis, quod infantium Syriasis sit, breuiter dicemus. Cuius mali appellatione Romani caruerunt. Et si Plinius ardores capitis id lib. 20. capite. 7. appellauerit. De Syriasi autem hac grecorum medici, præsertimq; Paulus Aegineta his uerbis docuerunt. Inflammatio partium circa cerebrum, membranasq; eius, in infātib; Syriasis est. Concauum sit in ea sinciput. Concaui itidem cum pallore oculi. Accedit etiam totius corporis siccitas. Succurrit huic malo, impositus sincipiti cum rosaceo uittellus oui: sic tamen, ut continua mutatione renouetur. Oporteret eodem loco etiam imponere herbæ quam Heliotropiū greci, latini Solarem dicunt, folia, cucurbitæ ramenta, cucumeris, quem Peponem uocant, adiacentem carni cutem, aut hortensis solani cum rosaceo succum. Greci dulcem, & quæ edendo est Cucurbitam feminino genere in secunda declinatione *κολοκύνθη* dixerunt: medicam uero & amarā, de qua suo loco longius agetur in quinto, & ab hac diminuta appellatione *κολοκύνθη*. Est & illud animaduertendum, in dulci Cucurbita ex duplici genere duplex etiam nomen esse. Rotundæ, & in globum tumentis, q; Cucumeri similis sit *σικύα*. Tereti & in longitudinem extensæ, *κολοκύνθη*. Latini utramq; eodem Cucurbitæ nomine appellauerunt.

A

κολοκύνθη

The. li. 7. ca. 4.
Pli. li. 19. ca. 5.

B

γ ιη

D I O S C O R I D I S

De Cucumere satiuo.

C A P . C L .

SA T I V V S Cucumis aluo & stomacho perquā utilis habetur. Refrigerat, qui corruptionem non sentit. Vesicæ prodest. Olus factu reuocat, quos animus liquerit. Semen modice urinam mouet. Cum lacte, aut passo, uesicæ exulcerationibus subuenit. Illita cum uino folia, morsus canum sanant, & epinyctidas cum melle.

B A R B A R I C O R O L L .

Pli. li. 19. ca. 5.
libro. 20. ca. 1.
Theophrast.
lib. 7. cap. 4.

Cucumis a curuitate, ut placet Varro, Græce Sicy, & attico more Sicyos uocat, & Sicydiō a Phrynico poeta, & cucumeraria Syclata. Cucumerem Heraclides Tarentinus Hedygeon uocauit. Quinto, sexto, septimoue die emicat, sed omnino celerius q̄ Cucurbita. Radice breui, ut Pepo. Dulciores fiunt, maceratis aqua, lacteue seminibus. Tres satiuī differētiē Theophrasto sunt, Laconici, Scytalij, Boetij. Laconici rigantur; nō gaudent aqua reliqui. Adiecit q̄s Euthydemus quos Dracontias uocauit. Tanta porro naturę cognatiō est inter Cucumeres, Pepones, Melopepones, Cucurbitas, ut spenunero & pprietates & nomina latini, gręciq; cōfundant. Ipsum quoq; instrumentū Cucurbitulā gręci a Cucumere cognomināt, Sicyā uocando. Quanc̄ non desunt q̄ Sicyam hoc intelligant, q̄d uulgo Angurij, et Palestinus Melo dicit. Athenus certe Sicyā ueteres p̄ Cucurbita uocare solitos affirmat. Atq; ita & Nicandrus poeta uti Georgicorū uolumine. 2. Apud Gręcos certe Cucumeris appellatiōe, Pepones q̄q; ueniūt. Demetrius Ixion, Sicyos dici uoluit, ἀπὸ τοῦ εὐνοῦναι καὶ οὐκ, q̄a uenerē cieant: q̄d tñ cōtra multū sentiunt. De Cucumere puerbiū Gręci celebrāt illo uersu, εὐκων τρωγούσα γυνή τὴν χλαῖναν ἔσπειν. ut mulier uidelicet texēdo Cucumerē manducet. Fortasse, qm̄ textrices, ut Aristoteli placet, impudicę sunt magna ex parte. Ceterū cartilaginei oīa ea gñis sunt, crescūt quacūq; libeat effigie. Virides Italię Cucumeres & q̄ minimi sunt, inquit Plinius, prouincijs q̄ maximi. Citrinos, nigrosq; pbant. Copiosissimi Aphricę, ac grandissimi Moesię. Aquas ita diligunt, ut ad eas modice distantes, etiā dissecti arrepant. Oleum odere mīre, ita ut in hamos curuent, ne attingant. Inuenti et sine seminibus sunt, macerato uidelicet semine farina cuiusdā herbe, quam Culicem appellant. Citrinos Cucumeres intelligūt, qui uulgo Citreoli a colore Citri nominant, maiores multo uulgaribus, nec friati, q̄ iam & in Italia passim nascunt. Particulatim flōret Cucumis, si bi ipse superflōrescens, et sicciore locos patit. Candida lanugine obductus, magisq; dū crescit. Seruatur in muria usq; ad alios fere prouentus, & uiridis quoq; in sabulo locis opacis, siccō sicco operiente. Cucumeres in fistula, ut est apud Hippocratem, dimissiflōre, mirā longitudine, quasi anguina specie proueniūt. Quāq; anguinus Cucumis, idem uidetur esse qui Syluestris, multo infra magnitudinē Satiui, Erraticus, & Angueus Columella appellatus, a Satiuō penitus differens, uix, ut solo aspectu gentilis ei appareat. Serotinū æstate germin, & flos, gaudetq; frigidis. Cucumim nasci præcipuum in Arabia, mox Cyrenis tradunt. Alij in Arcadia, similem Heliotropio, cuius inter folia & ramos proueniret semen, magnitudine nucis iuglandis. Esse autem ad speciem Scorpionis, cauda reflexa, candida: propter quod aliqui Cucumim Scorpionū uocant. Decoctionē Syluestris sparsā mures non attingūt, cicimes ea necant. Cucumis syluestris Elaterium quoq; dicitur, quemadmodum ex ipso succus. Vinum & inde fit Phthorium uocatum, ut post liquebit. Herbam Culicem, cuius hoc capite meminimus, a Theophrasto Conopa uocari censeam, nec ne, quoniam & Cynopa scriptum est maiori parte, nō dixerim. Theodorus Canis oculum, & Canuram conuertit, quasi Cynopa, non Canopa probauerit. Olus est hoc Theophrastus inquit, primisq; post æquinoctium imbribus germinat, & inter spicatas herbas ponitur, a Plinio quoque duobus locis dictum, ut in castigatione Pliniana demonstrauimus.

De Pepone.

C A P . C L I .

πίπυν

PEponis caro in cibis, urinam cit. Inflammationes oculorū illita sedat. Ramenta eius contra adustionem infantium, quam Syriasiu uocant, sincipiti imponuntur. Fronti admota, oculorū fluctiōnes auertunt. Succus cum semine, adiecta farina, siccatus in sole cogitur in smegmata, quæ faciem repurgāt, & nitore afferunt. Radix sicca, & ex

hydromelite pota drachmæ pondere, uomitione mouet. Si quisq; mode **A**
rate secundâ cenâ uomere cupiat, geminis obolis sit contētus. Sanat quo
q; illita cū melle, ulcēra concreta in modū faui, quæ Cæriā uocant.

P **B A R B A R I C O R O L L.**
Epo, a Græcis Pepon, a Theophrasto Sicyos, & Persicyos quandoq; dictus, a Polluce
Spermatias. Cucumerum generi contribuitur. Siquidem cum magnitudine excessere, uocan-
tur Pepones. Particulatim florēt, ut Faba. Sunt qui & Melopepones dicuntur, in Campania pri-
mum reperti, effigie mali coronei, a quo & nomen fortuito natum ibi, mox semine ex illo ge-
nus factum. Non pendent hi, sed rotundantur humi, figura & odore præstantissimi, ubi matu-
ruere, Quæ non pendent statim a pediculo recedunt. Lusitani Regis Liburnicæ inter alia me-
ridianæ illius nauigationis miracula, Melones in Aethiopia nobilissimos haberi prædicant, quo-
rum odorem Elephantēs, sagacissimi olfactus animal, de longinquo sentiant, aduolantesq; cu-
cumeraria tota depopulentur ac proterant. Illud propter iactatam a medicis controuersia præ-
terire nolo, Auctores esse Græcos aliquos, qui præcipiant, post Pepones, Melopeponesq; ui-
num bibendum hīs, qui pituitosi fuerint, biliosis uero acida edenda.

De Lactucis.

CAP. CLII.

Lactucæ satiuæ, quibus natura refrigeratrix inest, stomacho gra-
tæ habentur. Somnū conciliant. Aluum emolliunt. Lac euocant.
Verum decoctæ magis alunt. Stomachicis illotas esse prodest. Epotum
semen, assiduas libidinum imaginationes in somno, compescit. Et Ve-
neri refragatur. Frequentiores tamen in cibo, claritati oculorū officiant.
Muria condiuntur. Cum in caulem exierunt, uim quandam nanciscun- **B**
tur, succo, aut lacti syluestris Lactucæ similem.

L **B A R B A R I C O R O L L.**
Lactuca, Lactucula, & Lactecula, sicut apud Græcos Thridax, & Thridacina dicitur, & uul-
go Myrulon, caulem primo blandum, processu spinulis inhorrentem habet: die quarto aut
quinto emergit. Suauior scisso caule regerminat. Semen lanugine occultitur. Ex hīs candida
tenerior & dulcior. Lactucæ Græci tria monstrauere genera. Vnum lati caulis, adeo, ut olito-
ria ex hīs hostiola factitari prodiderint Theophrastus & Plinius. Foliumq; hīs paulo maius her-
baceo, & angustissimum, ut alibi consumpto incremento. Alterum rotundi caulis. Tertium a
gente cognomento Laconicum, sessile, folio Scolymi, rectum, amplumq; nec brachiatum a
caulibus. Alij distinguunt in nigras, rubentes, candidas, ratione satius colores uariante. Pri-
mas Ianuario, secundas Aprili, tertias Martio serentes. Quidam fastigia quinque faciunt. Pur-
pureas & crispas, utranq; Cecilianam uocantes. Tertium Cappadoces. Quartum Græcas.
Longiora his folia, caulesq; lati, præterea longi & angusti, Intubis similes. Quintum genus
Picris, amaritudine insignis. Vnde nomē. Alij Crispā, Fuscā, Cappadocem, Tartesiācam, &
Cypriā, ut Columella. Cappadoci pexum, densum, pallidūq; folium. Tartesiācæ, siue Beticæ,
candidū, crispissimū. Cypriæ, siue Paphiæ rubicundū ex candido, tenerrimū ac leue. Alij distin-
gere Atram, quæ Meconis, & Meconitis dicat, a lacte papaueris simili, maxime soporifero, qd
apud antiquos Italiæ solū genus earū fuit: & ob id Lactucis nomen inditū. Purpuream, siue fu-
scā, maxime radicis, quā uocant Cecilianā, a Cecilio Metello dictam. Rotundā minimā, sed
latis folijs, Artylida nominatā, siue ut Græca fides habet, quæ & a mulieribus ita uocari scri-
bit, Astylida. Et Eunuchion a Pythagora, hoc est, Spadoniā, quia hæc maxime refragetur Ve-
neri. Candorē lacteum contingere putant arte, atq; curā, sed hīs dumtaxat quibus semen album
est. Candida Lactuca maxime hyemem tolerat. Irrepsit & satiuis alia, ut Plinius inquit, admo-
dum probata, quæ Cecilia uocatur, a supradicta Cecilianā, quæ purpurea est differens, folio
Cappadociæ, nisi crispū, latiusq; esset. De Caprina, & alijs agrestibus, in Lactuca dicemus syl-
uestri, & uno eodemq; pede quemadmodū Lactuca, Ocimū, Apium, Eruca, & omnino gene-
ra olerum diuersa proueniant, Græcus auctor Didymus, memoriæ scriptū reliquit, Cyprii La-
tucam Brenthistū uocabant. Sunt & Brenthiæ quædam radiculæ, quibus mulieres genas ru-
bificent, quas nonnulli Fucum, aut Anchusam interpretantur.

Opidag

Theophr. li-
bro 7. cap. 5.
Pli. li. 20. ca. 7.

D I O S C O R I D I S

E X M. V E R G. C O M M.

C NObis in tam noto, tamq; utili olere suspecta capitis huius tanta breuitas est. Inclinatq; animus, desiderari posse in eo multa ex his quæ Plinius, Galenus, Paulus Aegineta, pluresq; alij docuerunt, præsertimq; Serapion; qui in collectis a scriptore hoc, abscissibus, & sacris ignibus mederi hoc olus ait; quæ hominis mala in hoc scriptore modo nulla sunt. Accedunt suspicioni huic nostræ etiam argumenta alia. Primum, qd in seminis medicina nihil hoc loco legitur, prodesse scorpionum ictibus, & Cenchri moribus. Quorum alterum Plinius, alterum hic ipse in extremo opere, capite de Cenchri morfu indicauerunt. Verisimileq; est, ut in cæteris ab eo factum fuit, ad eius periculi remedium ex hoc olere semen etiam accipiendum fuisse. Mox quod plurali numero, non procul a fine legitur, continuū Lactucarum cibum claritati oculorū offitere, deesse aliquid ostendit. quoniā singulari numero semper antea de satiuæ Lactuca egerat: quod inconcinnū simul, & hoc scriptore indignū est: credimusq; nos, nihil dicendum huiusmodi ab eo fuisse, nisi prius aliorum scriptorū exemplo, de tam multis satiuæ Lactucæ generibus egisset. Quo fit, ut suspicemur deesse huic capiti aliquid, præsertimq; Lactucarū censum, & nomenclaturā aliquam: quam negligentes in exscribendo antiqui librarij, mutilum nobis hoc caput reliquerunt. Eamq; ob causam nos locum uitij nota signauimus. Poterit tamen qui plura Lactucæ genera, nomina, & bonitates noscere uoluerit, ex Columella, Plinio, alijsq; multis ea audire, & condituræ earum antiquam rationem intelligere.

¶ De Lactuca syluestri.

C A P. CLIII.

ἀγρία ἐπίδαξ

Syluestris Lactuca, quam Magi sanguinem Titani, Zoroastres Phe-
rombion, Romani Lactucam syluestrem appellant, Satiuæ similis
est, sed longior caulis, & candidiora folia, graciliora, & asperiora. Ama-
ro gustu est, & uiribus aliquantum papaueri similis. Vnde lacteum eius
succum aliqui meconio permiscuerunt. Aquam per alium elicit, potus
D in aceto mulso succus ad duos obolos. Argema, caliginemq; repurgat.
Contra adustiones efficaciter illinitur, cum lacte mulierum. In summa, so-
mnus allicit. Doloris leuamentum præstat. Menses trahit. Contra scor-
pionum & phalangiorum ictus bibitur. Semen non aliter q̃ satiuæ, libi-
dinum imaginationes in somno amolitur, ac Venerem arcet. Succus ad
eandem ualet, sed uiribus infirmior. Reponitur in ficiuli nouo lac eius, an-
tea, ut in alijs liquaminibus moris est, insolatum.

B A R B A R I C O R O L L.

Lactuca syluestris, radice breuior, & multicaulior q̃ satiuæ est, sponte nascens in aruis, folio
pusillo, & ubi consummatum est, aculeato: caule candidiore, a lacte copiosissimo acri medica-
toq; quod carpitur per menses, scapo inciso, præclarum ad multa. Syluestris Lactucæ plura ge-
nera, Esopon, de qua hic agitur. Secundū Caprinæ, qua pisces necantur, Marinam Cornelius
appellat, de qua inter Titymallos sermo est. Tertiū in syluis proueniens, Isatis uocatur. Quod
& duplex est, Satiuum, & Syluaticū, ut suo constabit loco. Quartum Hieracium, rotundo fo-
lio: quemadmodum post liquebit. Communes notæ Syluestrium, candor caulis, interdum cu-
bitali longitudine, Thyrsos & folijs scabricia. Succus omnibus candidus.

¶ De Gingidio.

C A P. CLIIII.

γινγιδιον
λεπιδιον

Gingidiū aliqui Lepidion, Romani Bisacutū, Aegyptij Dorysa-
trū, Syri Adoriū, Aphri Tirieta appellant. In Syria & Cilicia plæ-
rūq; nascit. Hærbula syluestri Pastinacæ similis, tenuior, & amarior, radi-
ce parua, candidate, subamara. Olus hoc crudū, coctū, cōditū ue estur ma-
gna stomachi utilitate. Vrinā cit. Decoctū ex uino potū, uesicæ prodest.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 20. ca. 15.

Gingidium Syria in hortis operosissima. Vnde natum est adagium, Multa Syrorum olera.

Simillimam Staphylino, & Scandici herbam ferit, non differenda recentium medicorum imperitia, Gingidium pro Fumaria, siue Capno accipientium.

EX M. VERG. COMM.

Peregrinū Græciæ & Italiæ, si Plinio, & Dioscoridi credimus, Gingidiū quondā fuit. Ille in Syria, hic in Cilicia & Syria nasci & feri dixerūt, Quo minus miret aliquis, ignorari nostra ætate, quodnā olus Gingidiū sit. Cognouit tamen id utraq; gens: descripsitq; Plinius. 20. uolumine, capite quinto omnē eius figuram & usum. Paulus Aegineta libro. 1. capite de oleribus post Ocimum, Sinapin, Nasturcium, Vriticam, multa; alia quæ acrimoniā habent.

De Scandice.

CAP. CLV.

Scandix, quam Romani hærbam Scanariam, aut Aculam nominant, syluestre olus est, amarum, subacre. Quod crudum, coctum ue manditur. Stomacho & uentri utile. Decoctum in potu, uesicæ renibus & iocineri confert.

BARBARI COROLL.

Scandix olus est syluestre, ut in Brassica notauimus, Plauto quoq; dictum. Hanc Aristophanes Euripidi poëtæ obicit ioculariter, matrē eius ne olus quidem legitimū uenditasse, sed Scandicem. Vnde uerbum *σκανδική*, pro eo, quod est, *ἀνεπιδήσιον* confictum, hoc est, ad imitationem Euripidis aliquid aut dicere, aut facere, Eademq; erat, ut Theophrastus ait, Enthussicon, siue ut Athenæus & Plinius, Anthriscon, si tenuiora folia, odoratioraq; haberet. Et lasione olus est syluestre, repens in terra, cū lacte multo, florem fert candidū. Conciliū uocant, singulari folio, sed ut descriptio tamē, & quasi rudimentū multorū in ipso appareat. Theophrastus auctor. Plinius, Foliū inquit unū habet lasione, sed ita implicatū, ut plura uideant. Huius flos, ut Theophrasti uerbis utar, conceptaculo auersa parte nō indiget, sed postrema eius exeunt in angulos, qualis fere oleagineus aspicit. Stimulat hæc herba coitū, lactis ubertatē præstat, phthisicis, pdest: infantū illita capiti, nutrit capillū. In Plinio tamē pro lasione, Lassina deprauatū erat, duobus locis. Differt Scandix a Sandice: q; Scandix herba est, Sandix metallica. Scandix aliē non describit, q; q; olus est syluestre, gustu acri, subamaroq; folijs Anthrisci, sed maioribus, & minus odoratis. In exemplari græco Dioscoridis, adpicit uidi Scandicem, feniculi folio fere cum corniculis, in summo floribus luteis, siue albis. Hac ipsa specie in syluis quoq; uisit, fruticē odora to, flore candido. Paulus, Aetius, & si recte memini, Galenus, simile Gingidio fecere Scandicē.

EX M. VERG. COMM.

Hæc est Scandix illa quæ toties Athenis in theatro plausum & risum excitauit: cum in Comædia lepidissimi poëtæ, Dixæopolis ex agro in urbem profectus, rudis homo, ab Euripide eam humiliter poëtæ supplicans peteret, *σκανδικήν μοι δὲοι μὴ πόθεν ἀδελφεύω*, Nouerant enim omnes uulgare & uile olus: meminerantq; poëtæ, illius matrem quotidie in urbem uenientem, uendito eo olere, filium in summa paupertatē theatro & spectaculis educasse. Nec antiquæ hominis paupertati illudentes, sed ad uirtutem in angusta re studium & occasionem admirantes, totis subellijs audito uersiculo illo exultabant. Nota tunc omnibus Scandix erat, uulgare & sponte sua nascens, locis plerūq; incultis olus, plæbis cibus, & quotidianum pulmentum & acetariū, quo ad sanitatē magis q; quæstis toto mari & orbe obsonijs proficerent. Vires em̄ illi sunt siccandi in extremo ordine, calefaciendi uero in secundo, aut incipiente tertio. Sed quod utilissimum in ea est, urinam ciere, & renes egregie laxare, testati ueteres Græci sunt: utiturq; ad eas difficultates sèpissime Paulus Aegineta: iubetq; in primo, si non iuste quotidie purgetur aliquis, Scandice, Apio, Asparago, similibusq; alijs sollicitandam esse urinam. Plinius etiā 22. capite eiusdem numeri, multis Scandicem prosequitur laudibus: peculiaremq; illi laudem tribuit, q; uenere fatigato corpori succurrit, marcescentesq; senio iam coitus excitat. Quo magis mirū, in tanta morū ruina & labe, in nullo honore esse herbā, neq; ab Herbarijs nostris cognosci. Græci nunc etiā Scandicem appellāt, nihilq; in eorū gente notius, sed non congruentē antiquorū notis ostendit. Quā em̄ illi Scandicē modo appellāt, latiore, & quasi Betæ folio est. Antiquiores aut, ut in re nota sit, nullas eius certas notas tradiderūt. Verūtamen, ut ex multis conijcere licet, tenui, & q; si capillato folio est. Plinius li. 21. cap. 15. inter sponte nascentes numerauit: conijxitq; illi, ut uerisimile est, cōgeneres plures alias, quæ oēs tenui folio & capillaceo sunt: præsertimq; Caucalim, & Tragopogona: q; a capillamentis; q; pro folijs habet, Coma dicta a Græcis est. Ob quā causam non ab re penitus fuerit, similem in foliorū figura illis credere.

A

ex Arist.

Pli. li. 21. ca. 15.

B

D I O S C O R I D I S

C ^{καυκαλίδης} De Gallinaceo pede, seu Caucalide. C A P. CLVI.
 Aucalis, quam alij Caucum, alij syluestre Daucum, alij Myrtin, Democritus Brion, Romani Pedem gallinaceum, aut Pedem pulli, Aegyptij Sefelin uocant, cauliculo est dodrantali, aut maiore, hirsuto, folijs Apio similibus, feniculi modo per extrema multifidis, hispidisq; candida in cacumine umbella, suauiter olente. Crudum, coctumue olus estur. Vrinam mouet.

C AUCALIS, OLUS EST FLORE CANDIDO. SYLVESTRIS DAUCUS, UT GALENUS INQUIT, A PLURIBUS VOCATA, PROPTER SIMILITUDINEM & GUSTUS & UIRIUM.

G E N U S H E R B A R U M L I B. S. D E P L A N T A R U M H I S T O R I A F A C I T T H E O P H R A S T U S, Q U O D *ἀρωματίζον* uocat, id est, in aruis sponte sua nascens: statimq; in eo Caucalidem hanc numerat, nullis alijs adiectis notis. Nec parum, si quis rem iuste aestimet, fuerit, tam certe, a tam graui auctore, Caucalidis natale solum, & ubi quaerenda sit, audisse. Id enim additū his quae hic scriptor, Galenus, & alij tradiderunt, facillimā eius inuentionē nobis efficiet. Nota eī omnibus Apij folia, quibus similia Caucalis sua habet. Altitudinē deinde, hirsutam lanuginē, in summo incisa folia, & candidi floris umbellā oculis deprehendit: inuenietq; Dauco tam similem herbam, ut aut syluestris Daucus sit, aut rudimentū naturae Daucum facere condiscantis. Qualis autē Daucus uterq; sit, in eo certius cognoscetur. Nullibi non Caucalis nascit: praesertimq; in noualibus, anteq; noua aratione renouent. Galenus Dauco Caucalidem sapore & uiribus similem ait. Hic tamen, ex similitudine figurae, ab aliquibus agrestem Daucum potius appellari ait. Habet em̄ & haec, & Daucus folia incisuris diuisa. Habent ambo etiā candidi floris umbellā. Dico autē umbellam graecorū exemplo, qui *ουιδδιον* ab umbra appellant, in aliquibus plantis floris ueluti pedamentū, in plures diuisum longiores pediculos, qui singuli florem sustinent, & in orbem circumactum. Quae floris figura feniculum, anisum, sambucus, pluraq; alia sunt. Quod quoniā umbellae, qua solem a uultu mulieres arcent, forma est, ob latitudinem circinationeq; suam, ideo Graeci primū eam floris formā *ουιδδιον*, mox Graecos imitati latini, Umbellā dixerūt. Quae uox huic scriptori multum scriptor, in secundo de oleribus, habere Caucalidem in gustu salsuginem aliquā: quod nec sensus, nec ex ueteribus alij indicant. Longe plura q; hic in medicina Plinius Caucalidi tribuit: quae poterunt uolentes in eo legere. 21. uolumine, eiusdem numeri capite.

E ^{ευζωμον} De Eruca. C A P. CLVII.
 Ezomon, Romani Erucam uocant, Aegyptij Ethericem, Pœni Asuric. Cruda Eruca uenerem largiore cibo concitat, Semen eodem effectu prodest. Vrinam cit, Aluo perq; comodata. Semine ad condimenta utuntur, quod uti in longum tempus asseruetur, adiecto lacte, aut aceto, digerunt in pastillos. Gignitur etiamnum syluestris Eruca, maxime in Iberia, quae occidentem spectat. Cuius semine pro Sinapi incolae utuntur. Vrinam uehementius pellit, multo satiuā acrior.

E R U C A, E U Z O M O S G R A E C E D I C T A, Q U O N I A M C O M E N D E T I U R A. C O N C I T A T H A E C M O R A N T E M, U T P O E T A I N Q U I T, V E N E R E M, F R I G O R U M C O N T E M P T R I X. I D C I R C O I U N G I T U R L A C T U C E I N C I B I S, U T C O N T R A R I E D U A R U M N A T U R A E T E M P E R A M E N T U M A F F E R A N T. N E M O I G N O R A T F L O R E M E R U C A E C A N D I D U M, M U L T A S I N F O L I O D I U I S U R A S E S S E.

O ^{ωκίμων} De Ocimo. C A P. CLVIII.
 Cimum uulgo cognitum. Id copiosiore cibo oculorum aciem habet. Aluum mollit. Spiritum mouet. Vrinam pellit. Lac cuo-

cat. Aegre tamen conficitur. Illitum cum polline polentæ, aceto & rosæ. **A**cco, pulmonum inflammationibus auxilio est. Draconis marini, & scorpionis ictibus per se prodest, & cum uino Chio oculorū doloribus. Succus, uisus caliginem abstergit. Destillationes exiccat. Semen potū conuenit insanientibus, difficili urinæ, inflatisq;. Naribus haustum, subinde mouet sternutamenta. Quod idem hærba efficit. Sed oculos premi necessum est, cum sternutantentum urget. Sunt qui in cibis abdicandum censeant. Quandoquidem manducatum, & in sole positum, uermiculos gignat. Aphri autem adiiciunt, si feriantur a scorpione, qui Ocimum ederit, nullo conflictari dolore.

B A R B A R I C O R O L L.

Ocimum prorumpit e terra celerime, floret particulatim, contra quæ olus: cæterum, primo parte inferiore, demum superiore: quo fit ut diutius quoque floreat. Quemadmodum Fabæ, & Heliotropium. Radix una descendit in altitudinem crassa, & admodum lignosa. Cæteræ a lateribus exiles ac prolixæ. Semini cortex obducitur. Vni Ocimo aqua datur meridie: cum cætera matutinis rigentur. Feruenti quoque aqua sparsum, maturius prouenire dicitur. Sub canem exalbescit. Differre uidetur Ocimum ab Ocimo, quod Ocimum pabuli & farraginis quoddam genus est uocatum: ab ocys uerbo, quod ualeat cito, ut Varroni placet: siue ab eo quod citat aluum bubus, & ideo ipsi datur, ut purgentur. Pabularium, & Catoni erat Ocimum, sed sistebat eo bubus aluum. Id erat e segete uiridi defecta antequam gelaret. Quamquam manibus carpendum, non falcula secandum, ut renascatur ocimum, Cato præcipit. Sura Manilius, aliter interpretatur, & tradit Fabæ modios decem, uitæ duos, tantundem & Erui-
Bliæ in iugerum: melius & auena Græca, cui non cadit semen, addita misceri, & autumnio Bo-
um caussa feri solitos, hoc apud antiquos Ocimum uocatum. De Ocimo sunt, qui scribant capras id aspernari, & insaniam facere. Tritum si operiatur lapide, Scorpionem gigni. Manipulo eius cum cancri decem marinis, uel fluuiatilibus trito, conuenire ad eum Scorpiones a proximo omnes. In cibo pediculos facere. Capras id esitare, alij uolunt. Habetur & syluestre Ocimum, quod aliud est quæ Acinos. Quæ Acinos, quemadmodum & Ocimoides a Romanis Ocimaltrum uocari Dioscorides existimat. Illud monendi sumus, de syluestri Ocimo nihil scripsisse Dioscoridem, de Ocimoide nihil Plinium. Martialis de Ocimo scripsisse rem miram dicitur: quod modo purpureos, modo albos, modo roseos flores pariat. & si ex eo semine frequenter satum sit, nunc in Serpyllum, nunc in Sisymbrium abire solitum. Recentiores Græci, qui de Rustica re scripserunt, Basilicon, & Misodulon appellant Ocimum: tantumque cum eo foemine discordiam inesse prædicant, ut si pultario subiectum sit, nec mulier id sciat, futurum, ut nunquam cibo manus admoliat, priusquam subductum fuerit: ut fortasse huc alluserit Persius poeta illo uersu.

Dum ne deterius sapiat Panutia baucis,

Cum bene discincto cantauerit Ocima ueternæ.

Pro, excantauerit, hoc est, cantando excluderit. Nam & Varro, Plautusque, ut ait Nonius, Excantare usurpant pro excludere. Meretriculam quandam Corinthi Ocimum uocatam legimus in comædijs: sicut aliam Abrotonum: quo & Themistodis mater fuit nomine. Quæ sunt qui Euterpem uocatam scribant, & aliam Thryallidem, & aliam Sisymbrium: & aliam Meconidem, & aliam Herpyllidem, & aliam Myrrinem.

E X M. V E R G. C O M M.

Es Ocimo quemadmodum & plerisque alijs, in ruris & hortorum disciplina, eadem quæ uirtutis humanæ fortuna & ratio. Maleficio enim & iniurijs meliorem facit. Vtque illa infortunio aliquo obruta, aut a Principibus neglecta, maleue habita, nihil ex suo censu amittit, sed quod in serro, metallisque alijs sit, longo attritu subinde magis niter, & speciosior plerumque emergit: Sic etiam non dissimili ratione Asparagus lætior in census prouenit. Gaudet calcari, & atteri pede Crocus, pereundoque lætior prouenit. Crispum nunquam in hortis fiet Apium, nisi cum est natum incrementum eius, superuoluto cylindro coerceretur olitor. Rutam dum conferitur, maledictis prosequuntur qui adsunt: nec aliter maiore bonitate nasci id olus antiquitas credidit. Ex hoc genere Ocimum

Pli. li. 10, ca. 12.

D I O S C O R I D I S

Cum est: gaudetq; & ipsum cum obrutū terra sement est, pauicula, uel cylindro diligen ter inculcari. Nam si terrā suspensam reliquerit olitor, facillime totū corrumpitur & perit. Quodq; uix credat aliquis, feruenti aqua conspersum, celerius etiam prouenit.

¶ De Orobanche.

C A P. CLIX.

ερωβανχη

ORobanchen, alij Cynomorion appellant, a similitudine canini genitalis, Cyprij Tyrfinen, communiter Lycon. Cauliculus est sesquipedalis, & interdum maior, subruher, hirsutus, tener, folio pingui, flore luteo, aut candicante, radice digiti crassitudine, & cum ariditate flaccescit caulis, fistulosa. Hanc inter legumina nasci constat, & ea strangulare. Vnde Orobanche sibi cognomentum usurpauit. Estur, ut olus cruda, & in patinis Asparagi modo decocta. Legumentis addita, coctionem accelerare creditur.

B A R B A R I C O R O L L.

ORobanche Cynomorion quoq; appellatur, a similitudine Canini genitalis. Enecat & Cicer, circumuoluendo se ut Eruo. Vnde nomen Orobanche. Dicitur a recenti Græcia & Osprileon, & Leonteos botane, hoc est, Herba leonina.

E X M. V E R G. C O M M.

EX maleficio nomen Orobanche fecit antiquitas. Et quoniam fruges, legumina, Eruiq; præsertim circūligando se enecet, Erui angina dicta est. Id enim Orobanche græcis significat. Qui quoniam ea in uitæ humanæ usum aliquando ueniret, leguminūq; cocturam sæpenumero adiunuat, in damnanda eius fama, hanc saltem illi gratiā habuerunt: ut in cōmuni frugū, leguminūq; omnium iactura solum Erui strangulare crederet. Quod ut Theophrastus ait, cirris quibusdam tantū multas huiuscemodi nocentes alijs plantas: quæ aut adnascentes, aut scandentes, aut circumligantes se, alijs pestem afferunt: cōmunemq; omnibus plantis alias, alias priuatim aliquitamen & maxime Eruo notissimè frugi. Nocendi aut causa, infirmitas Erui est. Nocent & aliæ alijs, quas idem Theophrastus eodem loco numerauit, & nos suis locis dicemus. Hanc ipsam Erui anginā Plinius etiam lib. 22. capite ultimo, ait a similitudine canini genitalis Cynomorion ab aliquibus nominari: non mala, neq; inconcinna similitudine, si plantā contemplerur aliquis: quæ a radice surgens nudo, glabro, singulariq; caule, in summo folia aliquot confecta, & inter ea emergentes habet flores simul & quasi in glomerem collecta omnia: qua forma caninum genitale in summo est crassius, & quasi galeritum. Vidimus nos Erui anginā, nec quicq; inter legetes & legumina per æstatem frequentius inuenitur.

D

¶ De Barbula hirci.

C A P. CLX.

τραγοπωλον

Barbula hirci, quæ ab alijs Come uocatur, breui est caule, folijs Croci, radice longa, dulci, supina, magno super caulem calyce, e cuius summo semen nigrum dependet. Vnde nomen inditum est. Hærbæ esui apta est.

B A R B A R I C O R O L L.

Theophrast.
lib. 7. cap. 7.

TRagopogon, hoc est, hirci Barba, quæ & Scandix a Plinio uocatur, nisi quod suspicor deprauata lectio est. Describitur a Theophrasto in hunc modum. Radix longa, dulcis, folium Croci longius, caule paruo, super quem calix latus, & Barbula, quæ summo uertice in cana & proluxa funditur. Nascitur in asperis, sine usu. Acetarium quidam olus hanc esse falso uolunt, quā uulgo Barbam petræ, & in Gallia Cispadana Barbulam hircinā uocent. Habetur & quæ Gerontopogon, id est, senis, siue præbyteri Barba dicitur, Tragopogoni fere tota similis: nisi qd lacte manat, & radice amara est, non dulci. A Nicandro Geraopogon fortasse nuncupata. Sed & radice dulci carpitur Romæ. Tragopogona uocari & in Trago pisce, inuenio partē sub gula eius nigrantē, ut Athenæus auctor est. Tragos porro piscis, Exocæto, qui & Adonis uocatur, similis describit: præter nigrū id quod sub gula cum habere diximus.

EX M. VERG. COMM.

VNa eademq; causa est, cur Hirci barbam, & Comam Romani, Græciq; Tragopogona quondam appellauerint. Cuius si fuerit aliquis oculatus testis, nihil a ueteribus dicet aptiore imagine descriptū fuisse. Non tñ præterq; in integra ætate has notas in ea deprehendet. Quo tēpore em̄ floret, pauloq; ante descriptū calicē, & ex calice prodeuntē comosam lanuginē, & capillamenta ex se fundit: a qbus Coma, & Hirci barba dicta est. Eā lib. s. de historia plantarū Theophr. aptiore pictura, et his uerbis effigiauit. Quidā uel alia innumerabilia nomināt. Int̄ quē & illa est quā Hirci barbam uocant. Cuius radix longa & dulcis; folia Croco similia, longiora tantum; caulis breuis, in sumo cuius ingens calix est & barba, de sumo uertice cana pendens, proluxa. Nascitur sponte sua in aruīs. Sed crescit etiam altis in hortis, aut pascinato altiusq; subactō solo. Suspensa enim terra, crassiores & altius radices agit. Non fuit hæc quondā in honore hortorū. Nos etiam meminimus in maiore precio q̄ nunc sit aliquando fuisse: tam nec in gustu & ganea nobis ipsis constamus. Ethruria, gensq; omnis nostra, q̄ in asperis & petrosis nascitur, Saxifragam, alieno illi assignato nomine, ubiq; uocat: nihilq; hyeme notius, & ad acetaria paratius, præsertim radice, quē una in hac planta ob dulcedinem suam non ingrātū habet usum. Quod animaduertat aliquis in ea est, dicere Plinium in asperis nasci sine usu. Sed congruentibus alijs notis, non multifacienda est saporū per tempora gratiæ uarietas, & inconstantia.

De Ornithogalo. CAP. CLXI.

ORnithogalum cauliculus est tener, candicans, tenuis, sesquipedalis, tribus aut quatuor in cacumine mollibus agnatis, a quibus flores prodeunt, foris hærbacei, & cum hiantes se pandunt lactei uisuntur. Inter quos dissectum ut milio capitulum emicat. Coquitur cum pane ut Melanthium. Radix bulbosa, cruda & cocta manditur.

BARBARI COROLL.

ORnithogale, siue Ornithogalon, caulem habet semipedalem Plinio, Dioscoridi duū palmorum. Coquitur in pulce.

De Tuberibus. CAP. CLXII.

TVbera rotundæ radices sunt, sine caule, sine folijs, flauescentes. Vere fodiuntur. Cruda & cocta eduntur.

BARBARI COROLL.

TVber Græce Hydnon a Galeno dicitur. Quidā a tumore legunt Oednon. A Theophrasto describitur, carens medulla, neruis, uena, cortice. Hoc & Aschion ab eodem autore nominatur. Sunt & alia sine folio, aut herba, aut caule supra terram pluscula, cibo idonea, in Aegypto maxime, ut Aracidna, & quod Araco simile uocatur a Theophrasto. Plinius Aracos appellat fructum. Duo hæc pariunt sub terra, non minorem superno: cuius pars carnosa radicem mittit altam atq; crassam, simplicem, cæteras uero quibus insidet fructus, graciles atq; multas, & summo cespite coherentes agit: nec folium, nec herba ulla, aut quicq; aliud supra terram cernitur. Loca modice arenosa diligunt. Quia porro geminum et utraq; parte fructū ferunt, Amphicarpa cognominantur.

EX M. VERG. COMM.

Nihil quod medicinā augeat, aut instruat Tuberibus Diosc. tribuit. Terrestris tñ substantia cœrni, & constare ueteres aliqui dixerunt, & extenuandi aliquam habere potestatem. Credidit antiquitas, cognationem illis aliquam cum cœlo esse, nec nisi tonante Ioue nasci. Quod in Satyra Aquinas poeta monuit dicens. Et facient optata tonitrua cœnas Maiores, &c.

De Smilace. CAP. CLXIII.

HOrtenfia Smilax frutex, cuius semen a nonnullis Lobia uocatur. Folia habet Hederg, molliora tamen, tenues caules, & capriolos uicinis fruticibus circumuolutos, qui tantum adolefcunt, ut topiarum quoddam tabernaculum effingere uideantur. Fructum scœni græci profert longiorem, & corpulentum, in quo semina renum simi-

A

ὀρνιθόγαλον

B

ὑδνον

Pli. li. 19. ca. 23.

*

σμίλαξ λόβια

D I O S C O R I D I S

Clia, sed inæquali colore recluduntur, quæ quadam ex parte fuluescunt. Fructus cum semine in oleribus Asparagi modo manditur. Vrinam ci-
et, & tumultuosa somnia facit.

B A R B A R I C O R O L L.

Smilax cepea, idest, hortensiana, non eadem uidetur esse cum ea, quæ lauis a Dioscoride. 4. libro cognominata est. Recentiores cum Actio Phaseolum a Dioscoride hoc loco intelligi scri-
pserunt, utiq; non candidum, sed rubentem, qui & Lobos & Dolichos dicatur, & latine Sili-
qua. Etem duo esse Phaseolori genera, Paulus Aegineta in compositione quadam ad Renum
uitia, quæ *διὰ τὴν ῥίζαν* uocatur, indicat, Phaseolos in eam quærendo candidos: quasi sint etiam
non candidi. Quanq; est ubi Plinius Siliquam syluestrem dicendo, satiuam quoq; fieri posse ali-
quam intelligat, de quo in Smilace tractet latius. Porro Theodorus cognomento Priscianus,
quanq; recentiusculus, Phaseolo inquit uirtutem eam tribuunt, ut & uentrem soluat, & urinā
moueat. Dioscorides Phaseolos aluum, Lobia, siue Smilacem urinas ciere uoluit.

E X M. V E R G. C O M M.

Credidit Barbarus, nominis similitudine persuasus, quoniam Phaseoli alterum genus Lo-
bon græci uocent, & hic Lobia, Smilacem hanc a quibusdam uocari, ait legumen illud hoc
loco indicari: quoniam & id capreolos, seu clauiculas aliquas, quibus nitatur & implicet se, ha-
bet: & in utroq; Phaseolo, renibus similia semina sunt, & in rubente hoc amplius idem color.
Nobis tamē parum uerisimile uidetur, ad eam altitudinem & frondium copiam esse legumen
aliquod augeri, ut scenas & tabernacula uestiens inumbret. Id enim *σκηνοποιεῖσθαι* græcis, et huic
scriptori significat. Sunt autem græcis *σκηναί*, id est, Scenæ quæcunq; in castris, alijsue locis ex
frondibus, culmis, pellibus, tabulisq; temporaria domicilia fiunt: quales ad umbram in hortis
aliquando etiam eriguntur. Antiquiores latini Atteguas uno nomine cuncta hæc dixerunt. Sic
luuenalis, Dirue maiorum atteguas. &c. Quinetiam antiqui hēbrearum literarum interpretes,
eius gentis tabernacula Atteguas interpretati sunt. Barbarus opus topiarium hoc dixit, non sa-
tis, ut nobis uidetur, ad exprimendum uocis illius & uerbi captum.

D

De Medica. C A P. CLXIII.

medicinis

Medica cum recenti prodiit, folijs & caule trifolio præter-
si similis est. Procedens uero folia contrahit, caules edens tri-
folij, in quibus semen lentis magnitudine dependet. Quod in corni-
cula incuruatur. Id siccatum iucundi saporis gratia, conditaneo sali am-
miscetur. Viride semen quibus refrigeratione opus est, illitu suffragat.
Herba tota pro gramine utuntur, qui pecora alunt.

B A R B A R I C O R O L L.

Medica nominatione unde inuenerit, testatur ipso nomine: q; imperitia uulgi Melica uo-
cari cœperit. Theophrastus perire stercoratam putauit, aut minctu pecoris incumbentis resper-
sam. Per bella Persarum, quæ Darius intulit Græciæ, aduecta scribitur. Differt ab ea quæ Me-
dion uocatur, ut suo loco indicabimus. Medica seritur iactato semine, ita ut pabulum, & fru-
mentū, tanta dote, ut uno satū plus triceñis annis durare credat. Similis est Trifolio, caule folijs
q; semper uiuens, ut Dionysius est autor. Item geniculata. Quicquid in caule assurgit, in folia cō-
trahitur. Sexies reflorescit: cum minimum, quater, modo non secetur. Arescit furculosa. Postre-
mo in puluerem inutilem extenuatur. Pabularium omnium cōmendatissima. Hac quondam
plena erat Venetia, sed pridem periit. Nunc in eandem prouinciam reuerti eam, quasi possi-
minio curauimus, ab annis multis fere non uisam in Italia, sed ne intellectam quidem magno-
pere qualis esset, allatam ex Africa in Campaniā. Semen eius, sub dente Phaseoli recentis sapo-
rem præsentat. Propter altitudinem radicum eius reliquæ herbæ intereunt, sine ipsius damno.

De Aphaca. C A P. CLXV.

aphaca

Aphaca in aruis nascitur, altior lenticula, tenuioribus folijs. Sili-
quas maiores fert, in quibus terna quaternauæ semina, lente
minora, continentur. Quæ adstringendi uim habent. Quare torrefacta.

Stomachi aluiq; fluctiones sistunt, si fresca lentis more decoquantur.

BARBARI COROLL.

Aphaca differt ab Aphia, quæ olus item est, ut Aphaca, florem edens cum germine. Differt & ab Apharca, quæ arbor est Vnedoni similis, ut diximus. Aphacam Theophrastus modo leguminum generi, modo inter olera connumerat. Et ut verum fatear, idem, an diuersum genus sit, fere ambigo. Olus inquit est Aphaca, imbribus ab Aequinoctio primis germinans, per partes florendo, amaritudine ingustabili, aculeata herba, uerum ex mitioribus properat flos eius. Sed breui marcescit, & in lanuginem pappum uocatam soluitur: deinde alius subnascitur, atq; iterum alius hyeme tota, & uere usq; in æstatē: qui & luteus fit. Forma siliquis Aphacelatiuscule ut Lenti: celeriter perit, ut Dolichos. Necatur a Securidaca. Semen præter alias differentias madidius est, q̃ Lentis. Inuenio e recentioribus, qui uitiam esse Aphacem existiment.

EX. M. VERG. COMM.

DE Aphace Plinius lib. 27. cap. 5. nihil non ab hoc scriptore dictum, ijdem, totidemq; reddidit uerbis. Aphace tenuia admodū folia habet: pusillo altior Lenticula est. Siliquas maiores fert, in quibus terna, aut quaterna semina sunt, nigriora, & minora Lenticula. Nascitur in aruis. Natura ei ad spissandum efficacior q̃ Lenti. Reliquo usu eodem effectus habet. Stomachi, aluiq; fluctiones sistit semen decoctum. Et hæc Plinius. Barbarus post eū in Corollario suo, quæcunq; in Theophrasto lib. 8. de plantarum historia de Aphace leguntur, totidem uerbis pariter reddidit. Sic nihil fere quod adiiciamus relictum nobis est, nisi quæ diuersis locis ab eodē Theophrasto dicta sunt, breuiter collegerimus: haud sane, quia collectis his digito legentibus Aphacē ostendere cogitemus, sed q̃ coaceruatis in unum tot notis, facilius poterit alicui rei nobis incognite coniectura esse: & quod se nobis non obtulit, alij se offerre. Diximus non multo antequam de agresti Lactuca ageremus, quale herbarū genus esset quod Theophrastus ἀρουραῖον nominauit. Ex eodem genere, eodem autore Aphace est: idq; hic ipse etiam testatur in aruis nasci dicens. Nullam itaq; in ruris, hortorumue cura culturam Aphace habet: quærendaq; in aruis est quo tempore inculta cessant. Retulit idem, non admitti in cibos Aphacem, ob amaritudinem suam, similitiam gregis Cichorio folia habere. Primam appetente uere florere, citissimeq; senescere, florem in lanuginosos pappos resolui, pluraq; alia in ea fieri: quæ omnia a Barbaro collecta, restituta a nobis sunt. Ex quibus non facile ratio cinetur aliquis, uitiam notissimam omnibus frugem esse: & si congener, aut similis illi sit, syluestrem omnino existimandam esse.

De Porro capitato. CAP. CLXVI.

Capitatum Porrum inflationem facit. Noxium succum creat. Turbulentum somnum parit. Urinam ciet. Aluo accommodatur. Extenuat. Oculorum aciem hebetat. Menses pellit. Sed lædit exulceratam uescicam, renescq;. Cum prisana uero coctum, esu pectoris uitia extrahit. Coma eius in aqua maris & aceto cocta, in deflectionibus, ad præclusiones uulue & duricias, utilis habetur. Porrum bis aqua mutata coctum, aut frigida maceratum, dulcescit, et multo minus inflat. Semen acius est, & quandam adstrictoriam uim habet. Quare succus cum aceto, addito thure, aut manna, sanguinis profluvia sistit, maxime si naribus erumpat. Venerem stimulat. Contra omnia thoracis uitia, tabemq; pro delinctu efficax est. Arteriam esu purgat. Sed si assidue estur, uisus obscuritatem inducit. Stomacho aduersatur. Succus ex melle potus, aut illitus, contra bestiarum morsus auxilio est. Cum aceto & thuris polline, lacte, aut rosaceo, utiliter aurium doloribus & sonitui instillatur. Varos tollunt folia, illita cum uua rhois, qua ad obsonia utuntur. Epinyctidi medentur. Crustas ex sale illita rumpunt. Veteres sanguinis reiectiones cohibent, si binis drachmis & æquali baccharum myrti pondere bibantur.

A

Theophrasti
libro 7, cap. 71

B

πρόσον
καλαωτός

D I O S C O R I D I S

Pli. li. 19. ca. 6.

C B A R B A R I C O R O L L.

Porrum, siue Porrus, die a saty decimonono interim uigesimo prorumpit. Biennium per fert: ab eo tempore sementescit, emoriturq; Vermiculi Porros, Brassicam, Lactucasq; infestantes, & alia quædam olerum, Prælocurides uocantur: quasi Porricidæ, aut etiam, ut Palladio uidetur, Herbicidæ: non ut Theodorus, Blattæ alueariorum, apud Aristotelem, q; κνράμων, pro κνράμων legerat, etiam si tinea alueorum in Columella dici legimus, ex stercore papilionum nascetes, et Lucifugas Blattas in Marone. Nascentur et in mari Porru, extra Herculis columnas, ut Theophrastus ingit, sed inter Algaru gna. Capitatum Porrum, Græci Cephaloton appellant, & Gethyllida. Sunt q; Gethyllida, p Gethyo accepserint, qd & Epithyllida uocauerunt. Didy mus uir doctissimus is, qui tria milia et quingenta scripsit uolumina, Gethyū simile facit Ampe Iopraso, mox dicendo. Gethyllides, ut Athenæus ingit. Latonæ sacras esse Græci uolunt: qm o lus id in Malacia pregnans Latona concupisset. Delphis legem esse, ut qui maximam attulisset Gethyllida, sportulam e sacerdotis mensa caperet. Has magnitudine Rapi crescere nonnun q; tradunt. Gethyon inuenio, & Getion sine, y, & aspiratione scribi.

E X M. V E R G. C O M M.

Liberalis cibus Porrum est: non tamen a natura tantope damnatū, ut non medicinam mul tiplici remedio etiam instruat: præsertimq; q; ueteres, qm in caput creuisset, Capitatum dixe runt. Cui maiores q; sectiuo ad omnia effectus antiquitas tribuit. Quapropter & hic de Porro acturus, id genus elegit qd ad medicinā primū haberet bonitatis honorem: eaq; est causa, cur capitati tantum meminerit Dioscorides, ne quis forte adiectum Porro capitati discrimen mīre tur. Vtrumq; enim Porri genus, sectiuum, f. & capitatum, eadem omnia potest, sed capitati effi caciō uis. Et quoniam ubiq; inuenitur utrumq; ideo alterius tantum & efficacioris usum Dio scorides probauit. Nihil in disciplina ruris sectiuo & capitato Porro frequētius in antiquis est. Laudauit Martialis in Xenij suis utrumq; in altero filia, in altero niueum stipitem describens. Neq; ab re: quando discrepent inter se, satio, cultura, & forma.

ἄμπελοπράσον

De Ampelopraso. C A P. CLXVII.

Ampeloprasum stomacho magis aduocatur, plus Porro ex calfacit. Vrinam & menses uehementius. Contra serpen tium morsus esse conuenit.

B A R B A R I C O R O L L.

Ampeloprason dictum est, quoniam in uinetis solo Porri nascitur, ructu graue.

E X M. V E R G. C O M M.

Non fuit Plinio, nec post eum tot alijs cura latinum nomen Ampelopraso dare: græcorūq; appellatione usi omnes, cogitandū legentibus reliquerunt, inter uites nasci hoc Porru. Id enim græcorum uox illa indicat. Nos præter id syluestre Porru etiā Ampeloprason diximus: nec si ne autore. Siquidē Paulus Aegineta lib. 6. sic illud nominauit. ἄμπελοπράσον ὅτι ἐν πρᾶσον ὅτι ἄμπελον. Rursusq; lib. 1. capite de his quæ esculentas habent radices, τὰ δὲ ἄμπελοπράσσα τῶν πρᾶσον ὅτι ἄμπελον. Quod est, Sunt autem Porris sicciora Ampeloprasa ueluti syluestria. Credimus præterea, nec negligendis coniecturis, perisse in hoc capite aliqua. Sigdē q; omniū mihi est uetustissimus & pbatissimus Diosc. codex, plura alia habet ad historiā, diuersasq; appellatiōes Am peloprasī pertinentia. Quæ licet ex Galeno accepta uideant, consiliū tū institutūq; Diosc. in de scriptionibus his habent. Numeratq; esse illi caput Allio simile, folium Titimallo, florem purpureum, caulē Lychnidi herbæ æqualē, et semē Nasturcio simile. Plinius etiā præ ea quæ nūc in Diosco. legunt, ructu graue ait esse: eruptionem sanguinis per genitale cōpescere, & ob eandē causam a partu mulieribus dari: dari & contra canum morsus, nonnullaq; alia. Quæ ignoras se, præsertim tam multa, aut oblitum fuisse diligentem in scribendo hominem, parum uerissimi se est. Quin etiā Paulus Aegineta exulcerare, & incidere addidit.

κρόμμιον

De Cēpa. C A P. CXLIX.

Crommion aliqui Poljdos uocant, Magi Calabotim, Romani Cepam. Cepa longa acrior est q; rotunda, item flaua q; candi da, & sicca q; uiridis, & cruda q; cocta, aut condita. Omnes tamen mor dent. Flatus gignunt, Appetentiam inuitant, Sitim mouent, Et extenuat.

Fastidium pariunt, & expurgant. Aluo utiles sunt. Eæ detractis purgamentis in oleum coniectæ, hæmorrhoidas, reliquosq; excretionum exitus laxant, subditæ pro balanis. Succus cum melle illitus, oculorum hebetudinibus, argemis, nubeculis, & incipientibus suffusionibus auxiliatur. Anginæ eodem perunguntur. Suppressos menses pellit. Caput purgat naribus infusus. Canis morfibis cū aceto, ruta, & melle illinitur. Cū aceto autem perunctas in sole utiligines sanat. Et cum pari spodio, scabras lippitudines sedat. Varos cum sale reprimat. Cōtra calceamentorum attritus, cum gallinaceo adipe utilis est. Citæ aluo prodest. In auribus sonitū ac grauitatem emendat. Ad purulentas aureis, & eliciendā earundē aquā ualeat. Alopecie earum succo perfricantur, qui celeritū q̄ Alcyoniū, pilos euocat. Largiore cibo Cepa capitis dolores ciet. Coctaq; uehementius urinam pellit. Eos lethargicos efficit, qui ualitudinibus aduersis, eā etiā cocta, plus æquo uescantur. Cum passis uiuis, & fico illita, tubercula concoquit, & celerrime rumpit.

BARBARI COROLL.

Cepæ, aut etiam Cepulæ caua sunt folia: quod peculiare cum Gethyo habet, nec nisi oleribus hæc proprietas. Plura earum genera, Sardicæ, Gnidicæ, Samothracicæ, Seranicæ omnium nimis, sed prædulces. Præterea Fissiles, & Ascalonicæ. Fissiles appellant, quia hyeme cum sua coma inertes relinquunt, & folia uere detrahunt: q̄s deniq; diuisuris, alia parte inferiore subnascuntur. Hoc exemplo reliquis etiam generibus uelluntur, ut in caput crescant potius q̄ in seminem, Ascalonicarum propria natura. Etenim uelut steriles sunt ab radice, nec parte illa crassescunt. Maturæ celeriter autescunt. Serii semine præcipiunt: quia deposite caulem, semenq; tantū reddant, deinde inaniant, & euascent. Samo, & Sardibus candidissimæ proueniunt. Iulius Pollux e Samothracia cōmendat. De Creticis dubitat, an eadem sint quæ Ascalonicæ: quia satis capitari soleant, sed distant sapore tantum dulci. Reliqua Ceparum genera, depositu proficiunt. Ascalonium genus optimum Columella prædicat. In nomine est & Pompeia Cepa, & Maritima simplex, quam uocant Vnionem Kithon. Ea est autem quæ nō fructificauit, nec habuit soboles adherentes. Cepa in restitudinem dissecta, nō germinat. Radix non ut Allio nucleis includitur, sed tunicis, ut Bulbus et Scylla. Cepæ syluestres non sunt ullæ: ut q̄ apud Aristophanē poetam Thymum pro Cepa syluestri capiunt, errasse coarguamus obiter. Mentem lædi Cepa quidam scripsere. Hippocrates conspectu potius, q̄ esu cōmendasse dicitur.

EX M. VERG. COMM.

Fuit quidā Aegyptij Porri & Cepe nefas trucidare, & frāgere morsu, damnatq; ab ea genere: alioquin in sanitatis usu, & medicina utiles Cepe fuerunt. Qd̄ contra q̄ in relijs naturę partibus fit, quæ utrūq; Lunę fortunā plerūq; sequuntur: & dū toto orbe ea fulget, subinde augentur: pereire autem illi luce, & ipsæ paulatim minuunt: una hæc in eius sideris morte & tenebris, speciosiore habitu lætiorq; fiat & germinet. Accessit ad eā superstitionē etiā, q̄ inutiles seriatim, in lætitiāq; agentibus, pariter & ieiunio castitatē custodientibus essent: his, q̄ sitim et cibi apperentiam excitarent: illis, q̄ lachrymoso odore quæ habent, opratam per serias lætitiā turbaret: & quas in diuina re Dei munere lachrymas, tristitiāq; animi mortales fugerent, inuiti lachrymoso olerē admittere cogerent. Erant & alię superstitionis Aegyptiæ in hac ipsa re causæ, nō minus ridiculę: quas Plutarchus cōmentariolo illo quod de Iside & Osiride scripsit, longius & diligentius indicauit, a nobis aliud modo agentibus, relinquendæ. Quæ Ceparum ex nationibus discrimina antiquis fuerint, Theophrastus lib. 8. de plantarum historia, & ab eo accepta omnia uicesimo uolumine Plinius, longius docuerunt.

De Allio. CAP. CLXIX.

Allium græci Scorodon, alij Geboscon, alij Elaphoscorodon uocant. Quoddā satiuū atq; hortensium habetur. Quod in Aegy-

Pli. li. 19. ca. 6.

B

*nō p̄cedit

z in

Cpto, singulari ut Porri capite constat, dulce, i purpureū uergēs, parū. Reliqua uero magna & cādida, ex plurib. coaugmētāt nucleis, q̄s Aglithas grēci nomināt. Aliud est syluestre, q̄d Opioſcorodō, i. Anguinū uocant. Vis Allij acris ē. Excalfacit. Morder. Excernit. Aluū turbat. Inflatōes facit. Stomachū exiccat. Sitim gignit. Flatū permouet. Acie oculorū esu hebetat. Eosdē effectus p̄bet Anguinū, q̄d et Elaphoscorodō dicit. Latas uē tris tinea in cibo sumptum abigit. Vrinā detrahīt. Contra uiperarum ius, et priuatim hēmorrhoidum prodest, ita ut non aliud magis, si cū uino iugiter adsumatur, aut tritum in eodem ebibāt. Cōtra rabioſorū morsus, et illitu, et cibo ualeat. Magnē et Allio utilitates cōtra aquarū mutatioes. Vocem clarificat. Veterem tussim crudū, coctum uel lenit. Potum aut cū origani decocto, pediculos et lēdes enecat. Cremati cinis illitus, fugilatiōibus cum melle, et alopecijs cum nardino unguine medet. Eruptiones papularum cū oleo et sale sanat. Vitilignes, lichenas, lētignes, ulcera capitis manantia, lepras, et furfures eximit. Cum thure et tēda decoctum, dentium dolorem leuat, si in ore contineatur. Contra uenenatos muris aranei morsus, cum ficulneis frondibus, & cumino illinitur. Feruēscit comā ius, fēminarum deſeſſionibus additum, menses & secundos partus extrahit. Allium eiusdem gratia sufficit. Factum ex eo & nigra oliuā intritū, esu cit urinā. Laxat uenarū spiracula. Hydropicis utile.

The. li. 7. ca. 4

D **A**llium, siue caput Allij, habet plures uelut coherentes nucleos, siue spicas, quas Grēci Gēges, & Aglithas. Dorice ipsum quoq; Allij Aglidion appellant. q̄nt q̄nt. Discrimen, q̄ aliud prequox est, sexagesimo die maioreſcens. Aliud serotius, in magnitudine diuerſitas. Vlpiciū nominatur pregrande. Grēci Cyprium, & Antikō. Cypriū tūpue celebratum Africae, ob id & Aphroſcorodon, siue a spuma dicitur, a nostris Allium Maritimum uocari conſueuit, sed crudum, inter pulmentaria ruris, quē Myrtotos appellant, Allio trito in oleo & aceto: ut mirari sit, quantū ita increſcat spuma. Myrtotos ab odoris fastidio est diſtus. In hūc & caſeū q̄q; addebat. Alij genus placentē faciūt ex oleribus, ut Phoriō. Nos in Dioscoride q̄d hac parte Myrton legitur, Myrtotō legendū monemus. Est & in nucleis diuortium: quo enī plures fuere, hoc asperius ſentiūt. Genus eſſe Theophrast. ait, sine nucleis. Radix primo extumescit in nucleos: deinde curuatur: ubi accreuit, diducit iterū in nucleos, & ex uno plura ſiūt, p̄ſertim Vlpiciū, ut Cepe: nisi matura prius uellāt. Scordiō a Scorodo, idest, Allio, itē ab Ophioſcorodo, idest, Allio syluestri differt. Quāq; impitua medicorū sit, ut Allij syluestre pro Scordio in paſtillos theriacos ad diſoleat: cū tñ Scordiū folio Trixaginis, nō Allij deſcriptū legant: si mō autores bonos audire ſuſtinent. Sunt in Allio q̄dam capita, sed nō ſolo: nam & in Cepa, & in Porro capitis et capituli nomen legas apud Columellā. Alliorum Manipulum Grēci τριπικλιν appellant, adhiberi ſolitū quibusdam ſacris, ut Phorion inquit: in quibus mos erat, Allium manſitare, ne unguenta redolerent. Comas eius cum capite ſolo Molyzam Hippocrates appellat. Caput ipsum etiam Dactis uocatur. Quāq; Dactis Lampadem quoq; puſillam ſignificat. Galenus autor.

EX M. VERC. COM. M.

Fuit q̄ndam, & adhuc est Allij, ſicubi lōgius ab urbibus iñocētius uiuūt, honeſtū ſimul & gratū ruſtica p̄ſibi obſoniū. Nisi enī id ſit, nō cōtudiſſet meſſoribus ſuis Allia Serpilliq; Maroniana illa Teſtilis, quos uerifimile iuſtūq; erat, laudare epulo p̄ meſſem ſole & ope deſatigatos, a muliere excipi: nec q̄ in comōdia inexpectatā fortunē ſeruius mutationē Theatro ſignificabat, ridicule dixiſſet, tā beate tunc agere omnes, ut q̄ antea calculis ab egeſto ſtatim ſimo ſedē exterere cōſueuiſſet, tūc relatis ad eā partē integris Allijs idē facerēt: quaſi nihil ex antiqua paupertate numerare ſibi liſceret, quo neglecto melioris fortunæ meſuram augere poſſet. Eaſq; ob cauſam, in ruris honore, & hortorum diſciplina nō cōtemnendū locum inuenit Allium.

Docuerūt ueteres longius, quot Alliorū genera, & quo cultu in hortis colenda essent, nō negli-
genda ab his, q̄s aut nūq̄ satis cognita naturæ maiestas delectat, aut ad iustas, piasq; & certas
opes a fœnore & mercatura innocēs augēdæ rei studiū cōuertit. Poterūt nouillē ea oīa cupien-
tes Pliniū, Columellā, Palladiū, mille alios de tota hac re longius agētes cū uoluerint audire.

¶ De Scordopraso.

CAP. CLXX.

Scordoprasum magnitudine Porrum æquat, qualitatum Porri &
Allij particeps. Vnde promiscuas sibi uires ex utroq; uendicauit,
effectus Allij & Porri præbens, inefficacius tamen. Coctum Porri mo-
do dulcescit, & in olerum uicem transit.

σχορδοπρασον

EX M. VERG. COMM.

Quæ hoc simul Allium & Porrum ueteribus fuerit, incertū nobis est. Plinius, quod ha-
tenus legerim, nullibi eius meminit: nec rei rusticæ scriptores alij: solus Paulus Ae-
gineta, breuissimeq; in sexto inter Allia id numerauit. Verba eius sunt. Porri & Allij mixtas ha-
bet qualitates & uires Scordoprasum. Monstrum aliquod naturæ credimus id fuisse, coactis
humano opere coalescere simul, non dissimilibus penitus oleribus duobus: qualia in re rustica
aliquando excogitata in maiore ocio ab aliquibus fuerunt.

¶ De Sinapi.

CAP. CLXXI.

Sinapi hortenarium, aliqui Napi, Romani Sinapi utocant. Eligi debet
maturum, ualde rufum, non magnopere siccum, sed quod fractum
interne uirescat, & quodam succo madeat, cæsum colore. Siquidem re-
cens id genus, adultumq; habetur. Ad calfaciendum, extenuandum, ex-
trahendum efficax est. Ad eliciendam capitis pituitam manditur. Con-
tra præduros tonsillarum tumores, ac ueterem callosamq; arteriæ scabrie-
ciem, succus ex aqua & melle conuenienter gargarizatur. Sternutamen-
ta ciēt, tritum & naribus admotum. Comitialibus quoq; auxiliatur. Fœ-
minas uulua stranguatu oppressas excitat. Lethargicis, derafo capite, il-
linitur cum fici ammissum, donec rubescat locus. Ad coxendiciū cru-
ciatus, lienes, & omne genus dolores confert, cum permutandæ ualētū-
dinis causa, ex alto uicia extrahenda sunt. Alopecijs illitum medetur.
Faciem purgat. Sugillata cum melle, adipe, aut cærato rapit. Feræ im-
petigines, & lepræ, eo cum aceto perunguntur. Contra febrium circum-
itus aridum bibitur, aut potui polentæ modo inspargitur. Extrahenti-
bus emplastris, scabiemq; extenuantibus utiliter ammisceri solet. Graui-
tati aurium & sonitui, cum fico impositum prodest. Succus ad hebetudi-
nes oculorum, & genarum scabrias magna utilitate illinitur. Expressus
recenti semine succus in sole siccatur.

σιναν

B

BARBARI COROLL.

Sinapis, & Sinapi, & Sinape media producta legitur. Græcia & Napy uocat, quā Nāphy,
ut Athenæus interpretatur, quoniam acri, & proinde incommoda natura esse uideatur, addit
& pusillo corpore. Sinapi uero dici putat, quia olfactum luminibus officiat, ut Allium. Athe-
nienſes etiam Thapsi, & Saurion appellant. Quinto die post factum comparet, eoq; semel sato,
uix est liberare locum: quia semen cadens protinus uiret. Tria eius genera. Gracile. Secundum
Rapi folijs, Tertium Eruca. Optimum Aegyptium, præsertim ad Sinapismum: in quo usu &
Syriacum dabatur. Succus tribus modis exprimitur. In fictili, caleſcitq; in eo rhodice ad so-
lem. Exit & cauliculo inciso lacteus, ad dentium dolores cum induruit. Fit & oleum ex semi-
ne, ut docuimus. Pro pulmentario quoq; in patellis decoquitur, citra intellectum acrimoniæ.
Coquuntur & folia, sicut & reliquorum olerum. Pythagoras principatum ei dedit inter ea,

Pli. li. 20. ca. 22.

z iij

D I O S C O R I D I S

C quorum uis in sublime fertur: quia non aliud magis in nares & cerebrum penetret. Sinapisimus a Dropace distinguitur, quod Dropax cum pice fit: eoque Pittorois, & Pittosis quoque dicitur, hoc est, Oppicatio. Sinapisimus e Sinapi conficitur, multoque uehementior est Dropace. Propterea Sinapisimum Dropax uel praecedit, ut praepararet, uel consequitur, ut reliquias ab soluat. Maximelaudatur Dropax, Gallus cognomine.

E X M. V E R G. C O M M.

Fuit Samio sapienti quondam Sinapis in maximo hortensium omnium, quibus tantum cum toto discipulorum grege magister uescebat, honore & precio. Neque ex tam multis, quas habet in sanitate & ualitudine uires & usus Sinapis, aliquid magis priusque admirabatur & amabat Pythagoras, quam in altum sublimeque ferri uim eius, & quasi in calum niteretur, cum per nares in cerebrum penetrasset, purgatoria & ad usum mentis uegetiora illic omnia ab ea fieri. Laudata ab his magnopere etiam, qui medicinam homini in tam multis quotidie morbis facientes, nihil ad calefaciendum, siccandūque aptius & praesentius datum sibi a natura inuenerunt. Recepta eadem in uirae & sanitatis usu iam pridem est: nec hyeme ad intinctus quicquam frequentius ubique cibis intermiscetur, gratissimo obsoniorum condimento, nisi acrimonia feruoreque suo non sternutamenta tantum, sed lachrymas etiam ciet. Quod solum in carmine suo Columella illi obiecit, dicens. Sequi lacessenti solum factura Sinapis: quasi omnium animantium sensu, modoque, & ipsa nocetibus sibi renoceret.

De Nasturcio. C A P. CLXXII.

καρδαμων

Cardamon, alijs Cynocardamon, alijs Iberis, alijs Cardaminae, Aegyptijs Semeth, Romanis Nasturcium dicitur. Optimum constat esse Babylonicum. Omnium semen est acre. Excalfacit, Stomacho aduersatur. Aluum turbat. Tineas excutit. Lienem immittit. Partus exanimat. Vrinam cit. Venerem stimulat. Sinapis & Erucae simile intelligitur. Lepras & impetigines abstergit. Illitum cum melle, lienem extenuat. Fauos expurgat. Pulmonum uitia extrahit, sorbitionibus incoctum. Serpentium uenenis potum resistit, atque eas suffitu fugat. Capillorum defluuia cohibet. Carbunculos ad suppurationem perducit & rumpit. Coxendicibus cum polenta cominade ex aceto illinitur. Turiores collectionesque discutit. Emittere furunculos; illitum cum muria. Haerbae ad omnia eadem effectus, licet minor.

Nasturtium die quinto enascitur: duorum generum, mite, ac syluestre. Prioris quoque ratio duplex, albi, & nigri. Nomen ei a narium tormento, uigoreque, uel pro uerbo significat, iubente Nasturtium mandandum inertibus, quasi torporem excitet, animumque obacuat, contra uenerem inhibeat: quod Dioscorides accendi eam putet. Mira amplitudinis in Arabia dicitur gigni. Nasturtium herbis reliquis succum admittit iuxta satis, quod & apud Aristophanem poetam legitur. Hanc Graeci non modo Cardamum, sed etiam Cardamida uocant, ut Galenus inquit, & Hippocrates Sauridion, a Sinapis, quod & Saurion dicitur, similitudine. Milesium Nasturtium ueteribus laudatissimum fuisse, Iulius Pollux auctor est. Persas id cum sale mensis apponere solitos, celebre est, cum principio frugalitate amplecterentur, mox aucto imperio, in omne genus luxus prolapsi.

E X M. V E R G. C O M M.

Eius plures quondam, ut uidei, appellationes fuerunt: sed omnes ex eodem principio, & ab eadem Cardami appellatione, excepta Hiberide, quae agreste Nasturtium est, ut in. uolumine diximus, in Dioscoridis commentationes has irrepperunt. Cynocardamon enim, et Cardamite solo nomine statim Cardamon indicat. Hiberis uero, ut hic paulo ante dixit, & ut nos auctore Paulo Aegineta tunc confirmauimus, agreste Nasturtium est. Has ipsas uoces omnes Apuleius etiam in Cardamo numerauit: inuicem sibi ideo respondentes, quoniam inter satium & agreste Nasturtium maxia similitudo partium & uirium omnium sit. Ob eamque causam uagis appellationibus inter se utuntur. Notum nunc olus ubique Nasturtium est. Contra uenenata praecipue usus eo Nicader: usus & hic ipse contra Cenchridis uenenum, quemadmodum tunc copiosius docuimus: usus & Paulus Aegineta. Graecorumque medici omnes totiens, & in tam multis, ut non contemnendam medicinam partem solum Nasturtium expleat,

Pli. li. 20. ca. 17.
lib. 19. ca. 8.

¶ De Thlaspe.

CAP. CLXXIII.

A

Θλάσπι

Thlaspi, aliqui Thlaspidion, alij Sinapi persicum, alij Myiten, alij sylvestre Sinapi, alij Dasinophon, alij Myopteron, alij Biron, Aegyptij Sintempsum, Romani Scandulatum, alij Capsellam, aut Pedem gallinaceum uocant. Hærbula angustis folijs, digitali longitudine, in terram uersis, subpinguibus, in cacumine diuisis, selquipedali cauliculo, tenui, non sine adnascantibus ramis, fructu circa ipsum totum, ab extremo in latius se pandente, semine Nasturcij incluso, lenticulae effigie, nisi quod infringitur. Vnde nomen accæpit. Flos albicat. Nascitur in semitis, & sepibus, fossisq;. Semen asperi gustus, excalfaciens. Bilem & pituitam utrinq; extrahit, potum acetabuli mensura. Prodest ischiadicis infusum. Sanguinem potu educit. Internas subpurationes rumpit. Menfes ciet. Sed partus enecat. Alterum Thlaspi tradit Crateias, quod aliqui Persiconapi uocant, laetis folijs, radicibus magnis, utile ischiadicorum infusioni.

B A R B A R I C O R O L L.

Thlaspe, loculos fert peltarum similitudine, in quibus sit semen, folia latitudine digitali, & longitudine. Galenus Thlaspen, Dioscorides Thlaspi neutro genere pronunciat. Thlaspidion, & Thlasposin Hippocrates, Peltam amazonicam Iulius Pollux, hederæ frondibus assimilat.

Pli. li. 27. ca. 131

E X M. V E R G. C O M M.

Galenus genere foeminino Θλάσπιν nominauit: & quod hic ait, potum sanguinem trahere, ille contra coxendicis dolorem clystere infusum ἀμαρτωδὴν κινεῖν, quod est, cruenta euacuare dixit. Adiecit præterea Dioscorides persicum & erraticum Sinape a quibusdam Thlaspi hoc dici, ex similitudine ut credimus uirium. Plinius non hoc, sed alterum illud genus quod auctore herbario Crateia hic ipse in extremo capite testatus est, persicum Sinape uocari: nec aliunde uidetur in primum illud genus, q̄ ex secundo hoc appellatio illa irrepsit. Cæteræ Thlaspis appellationes illæ causam & originem suam nobis non ostendunt; eamq; ob causam sine honore commentationis huius nostræ a nobis relinquuntur.

B

¶ De Arabide.

CAP. CLXXIII.

DRabis hærbula ad cubiti altitudinem affurgit, tenues spargens ramos, & ex utroq; latere folia, ceu Lepidij, sed molliora, & candidiora. In cacumine uero Sambuci umbellam gerit, candidos flores habentem. Hærbula hæc cum pifana coquitur, in Cappadocia maxime. Semen aridum pro pipere obsonijs ammiscetur.

Αραβίς

B A R B A R I C O R O L L.

Legebatur Draba, non Araba. Sed huius secundi calce, ubi caput hoc repetit, Arabis, siue Araba, non Draba scriptum est. Galenus, Paulusq; nullam mentionem huius herbarum faciunt.

¶ De Irione.

CAP. CLXXV.

ERysimon, aliqui Chamæplion, Latini Irionem uocant, Magi Herculis Alphita, Aegyptij Erithmon. Iuxta urbes, domicilia, hortosq; nascitur, folijs Erucae sylvestris, cauliculis in lori modum lentis, floribus luteis, siliquis in cacumine gracilibus, ut scenogræco corniculatis, semine Nasturcij, exiguo, urentis gustus. Contra thoracis fluctiones efficax est, & si purulenta extussuntur. Regio morbo, & laborum uitijs prodest. Contra uenena in delinctu cum melle datur. Illi

Ἐρύσιμον

Χαμαιπλήμων

C nitur ex aqua, aut melle utiliter cæcis, carcinomatibus, parotidibus, duricijis mammarum, & testium inflammationibus. In totum extenuat, & calfacit. Mitius multo ad clysteres fiet, si aqua madefcat, atq; torreatur: uel linteo illigatum, oblito adipe peraffetur.

Pli. li. 15. ca. 10.

B A R B A R I C O R O L L.

Erysimon Galli Velarū, Irionem Romani appellant. Inter fruges annuerat, caule ferulaceo, ut Sesama, flore item ut Sesama foliaceo, amarū, fruticosum, folijs Erucae angustioribus paulo, & sanguineis, omninoq; ut Theophrastus inquit, Sesamæ proximū: nisi esset pinguiusculū. Erysimon nostri herbarij significant, quæ uulgo, nobilis Eruca dicitur, quam & Erucae ueræ præferunt; ut mirū sit, quamobrem inter fruges a Plinio constituta uideatur.

E X M. V E R G. C O M M.

Sisset frugibus, leguminibus, & oleribus idem qui homini sensus: liceretq; illis, ut in republica sæpe aliqui fecerunt, mutata fortuna transfugæ, modo harum, modo illarū partium esse: dicerem ego, græcis Erysimon, latinis uero Irionem Bacchi illius modo, qui ab Aristophane in ranis suis, nunc Deus, nunc homo: iterumq; dominus, mox seruus, uariante fortuna describitur: in alijs scriptoribus inter fruges, in alijs inter olera numerari uoluisse: tam incerta in antiquis scriptoribus historia eius est, tamq; aperte a Theophrasto & Plinio frugum, ab hoc ipso, & Paulo Aegineta olerum generi adscribitur. Nec persuadebitur unq; non esse frugem Erysimon, seu Irionem aliquis, Theophrastum de eo sic docentem audiens, quo loco lib. 9. de plantarum historia, de frugum culmis in uniuersum sic agit. τὰν δὲ διπρὸν κίχρον μὲν καὶ μίλιον καὶ ἀμυδάριον, ἐπὶ αὐτῶν δὲ καὶ ἑρυσίμου νερθεκούδου. Quod est. Aestiuarum autem, Milij scilicet & Panicis, ἑρυσίμου δὲ ἐνδὲν ἰσθμῶν χλωρὸν, ἰσθμῶν μὲν ἑρυσίμου, &c. Ex quibus ratiocinari licet, in censu frugum numeratum Erysimon frugem esse, & ex culmo inter olera censeri non posse. Plinius itidem, Theophrastum secutus, frugibus Irionem ubiq; adnumerat, libro 15. Primum capite. 7. Aestia quæ æstate ante Vergiliarum exortum seruntur, ut milium, panicum, Sesama, Irionem. Mox iterum eodem capite. Sesamo & Irioni sanguinea folia. Nec multo post eodem libro, sed capite. 10. Sesama ab Indis uenit: ex ea & oleum faciunt. Color eius candidus. Huic simile est in Asia, Græciaq; Erysimum: idemq; erat, nisi pinguius esset, quod apud nos Irionem uocant, medicaminibus adnumerandum potius q̃ frugibus. Idem etiam libro. 22. capite ultimo ait. Irionem inter fruges Sesamæ similem esse diximus, & a Græcis Erysimon uocari. Contra hæc olus aperte Dioscorides, non frugem describit, a Nasturtio statim & Thlaspi, folio græco similibus: quodq; frugi nunq; conueniat, inter rudera, & circa hortos nasci. Et præter Dioscoridem Paulus Aegineta libro primo capite de Veneris utilitate & usu: quo loco docens, quibus cibis ad uenerem uti oporteat, inter cetera monet comedenda, καὶ τὰν λαχάνων τὸ ἑρυσίμου καὶ τὸ ἰσθμῶν, &c. manifeste inter olera Erysimum numerans, ut uidetur. Elsetq; latinis Irionem, quod Græcis & huic scriptori Erysimon est. Satis tam multis locis testatur Plinius, præcipueq; libro. 22. capite quo paulo ante diximus, quo loco integrum, & iisdem uerbis totū hoc caput latinis reddidit, quod cognouisse omnibus paratum, & in promptu esset. In tot itaq; tamq; diuersis antiquorum scriptorum auctoritatibus, temere & impudenter fecerit, qui in hoc, aut illo genere Irionem numerabit: præsertim docentibus Theophrasto & Plinio, feri in agris, & inter fruges Irionem: Dioscoride autem & Paulo Aegineta, per se nasci locis incultis: & si feratur, in hortis inter olera quod olus sit ferendum esse. Nobis, ut credamus frugem a multis existimatum Erysimon fuisse, in caussa filiquæ sunt, quas sœnogræco siro olus, folio agresti Eruce, & semen Nasturtio simile. Antiquiores omnes non secus q̃ de quoridiana & uulgari re de eo agunt. Alicubi nunc genus etiam parum cognitum est, ignotæ & appellationes illæ aliæ, ideoq; a nobis relictæ.

C De Pipere.

C A P. CLXXVI.

πίπρι

Piper in India nasci, breui arbore traditur. Quæ inter initia, prælongum fructum, ueluti filiquam promit. Quod longum Piper est. Habet intus aliquid tenui Milio simile, quod tandem in perfectum Piper

per euadit. Id autem suis temporibus adultum, racemos emittit grana fe- **A**
rentes, quæ noscimus. Ea acerba, candidum Piper faciunt, aptum ocu-
laribus remedijs, antidotis, & medicaminibus quæ contra uenenata pa-
rantur, Theriaca uocant. Longum uero uehementius mordet. Et quo-
niam priusq; ematurescat decerptum est, subamarum relinquitur. Anti-
dotis, & theriacis medicaminibus expetitum. Nigrum uero, utpote quod
tempestiua maturitate collectum sit, odoratum esse constat, candido sua-
uius, acrius, & ori gratius, necnon ad condimenta utilius. Sed candi-
dum adhuc in acerbum uergens, prædictis infirmius est. Eligi oportet gra-
uissimum, plenum, nigrum, sine multis rugis, recens, minime furfuro-
sum. Inueniuntur etiamnum in genere nigri semina macie confecta, cas-
sa, & inania, quod uocant Brasma, Indorum lingua, sic significante abor-
tum. Vis omnium excalfacit. Urinam ciet. Concoquit. Extrahit. Discu-
tit. Abstergit caliginem quæ oculis obuersatur. Piper febrium rigori-
bus, siue potu, siue illitu, subuenit. Serpentium moribus auxiliatur.
Partus extrahit. Conceptum adimere creditur, statim ab initu suppositum.
Tussi, omnibusq; pectoris uitijs, siue eclegmate, siue potu, succur-
rit. Anginæ eo & melle conuenienter perunguntur. Potum cum recenti
bus lauri folijs, tormina discutit. Cum uua passa manducatum, pituitam
a capite elicit. Valitudinem tuetur. Dolores finit. Appetentiam mouet. **B**
Concoctionem adiuuat, in embammata additum. Strumas cum pice
discutit. Vitilignes ex nitro emaculat. Fictili nouo, ut aiunt, motum, tor-
retur. Non est huius arboris radix Gingiber, ut aliqui existimauere, si-
cuti paulo post ostendemus. Namq; Piperis radix Costo similis est, gu-
stum calfaciens, cicq; Hygræ cognomentum est. Hæc lienem reprimit,
cum aceto illita aut pota. Caput etiam purgat, manducata cum uua ta-
minia, quam Staphidem agriam uocant.

B A R B A R I C O R O L L.

Piperis genera duo Theophrastus constituit. Rotundi ut Eruū, putamine carneq; subrutila
ceu lauri bacca. Oblongi, nigri semina continētis papaueracea, qd multo ualidius priore iudi-
catur. Passim in India sunt, ut Plinius existimat. Quæ Piper gignunt arbores, Iuniperis nostris
similes, q̄q; in fronte Cauasi, solibus opposita, nasci tantū eas aliqui putauere. Semina a Iuni-
pero distant paruulis folliculis, quales in Phaseolis uidemus. Piper quod intēperie cœli carbu-
culatur, lingua Indorum Bregma dicitur, significans abortū. Hoc & pallidum est & asperimū.
Tria cæteri fecere genera. Nigrū, quod & Cōmune dicitur a medicis, Dioscoride, Paulo, Ae-
tio. Lenius longo & nigro est, Candidum, Piper longū facillime adulterat Alexandrino Sina-
pi. Emitur hoc in libras. 25. album. 17. nigrū. 14. utiq; Plinij tēporibus. Nicæder Colophonius,
uetus statis studiosus, non peperis, sed Peperion appellat. Hippocrates uero medicū Pharmacū.
Aliud genus est apud eūdem Hippocratem Indicū Pharmacū, quo fœminæ, quibus anima
fœtet, ora sibi colluit. Medicamentū id est, cuius compositionē reddit ipse. Cæteriū est ubi Pi-
per semen Indicū dicatur ab Hippocrate: in quo rotundū, quod inest, Myrtidanū uocari pro-
dit. Est etiā ubi rotundū Piper Strongylen Myrtidani scriptum reperias in eodem auctore. Syl-
uestre porro genibus suis est Piper. Piperis arborem iam etiā habuit Italia, maiorem Myrto,
nec absimilem. Amaritudo eadem recenti, & cum lactescit, quæ Piperi. Desyderat tosta illa ma-
turities. Ideoq; & rugarū deest, & coloris similitudo. Huiusmodi est & quod Lusitani regis dili-
gentissimi Liburnicæ, magna parte meridiani situs ambitu Mauritanicæ circūuecta, retulere hoc

Pli. li. 12. ca. 7.
Theophra. li-
bro. 9. cap. 22.

*

Strabo, lib. 17

C anno. Sed abest illa, ut dixi, retorrada rugosaque maturitas. Nam foliis tostum Piper, e candido & leui mutatur in nigrum rugosumque. Adulteratur Iuniperi baccis, mire uim trahentibus, in pondere uero multis modis. In Aegypto granum Piperi simile paulo tantum maius nascitur, Coriophyllon uocatur, ut Straboni placet. Est etiam in India Piperis granis simile, quod uocatur Gario phyllon, grandius, fragiliusque. Traditur in luco Indico id gigni. Aduchebat odoris gratia. Nunc & cibi, ut Piper, Septentrionis maxime populis. Paulus Aegineta Caryophyllon, non Gario phyllon uocandum existimauit, quasi nucifolium: etiam si hanc inquit non habet naturam, quae nomine pretenditur. Sed flores arboris cuiusdam Indicæ festuacaci sunt, & nigri, longitudine pollicari, acres, odorati, subamari. Lignum eius Xylocaryophyllon appellant. Ab huius odore uolarum genus altitium Caryophyllon, uulgo dicitur, ubique modo nascens.

E X M. V E R G. C O M M.

Fruticem, non arborem Piper ferre affirmat, albæ uiti, quæ in sepibus plerumque inuenitur, si milem, propinquas scandentem arbores: quæ racemosum fructum ferat, magnitudine ea qua uidetur, sed uiridem, nec aliter quam in Ligustro coaceruatum, antequam maturitate nigrescat: lectumque ætate, ante integram maturitatem sub sole in palmeis tegetibus expandi, caloreque solis & aestu corrugari, & nigrum fieri. Nec longum, aut album Piper aliquod uidisse illic se dicunt: esse quidem arbores alias, quæ sapore Piperis aliquid ferant, & inter eas, cui conferre in nostro orbe aliquam posse se negant, quæ oblongum ueluti uillum inter folia ferat, ponticæ nucis floribus similem, quod illic longum Piper incolæ appellant. Folium Piperis ipsi uidimus ab eis allatum, colore pallido magis quam herbaceo, longitudine quantum diuiccati pollex & index humani digiti aperiuntur: latitudine qua parte maxime patet, quatuor digitorum: Plantaginis figura, præterquam in summo, cui habet numero pares & figura similes a tergo fibras septem per longitudinem extensas, mediam claudentibus utrinque trinis: non tamen ut in Plantagine, utrinque binæ a media nascuntur, sed inæqualibus interuallis utrinque prodeunt. In summo fastigiatur, & acuminatius quam Plantaginis extremum folium est. Desinitque in mucronem eodem, quo in malo medica modo uidetur: non omni, sed in qua folium acuminatum est: idque in Piperis frutice breui pediculo longius a nobis sunt, non ut antiquorum historias damnemus, sed ut meminerint toto hoc opere legentes, quam difficilis omnibus medicæ materiæ fuerit, & futura semper commentatio sit, præsertimque ubi parum integra ueterum commentaria totam rem miscent.

D

ingiberis

De Gingiberi. CAP. CLXXVII.

Gingiberis sui generis planta est, in Troglodytica Arabia magna ex parte nascens. Qua uirgine, ad multa, perinde ad quam nos Ruta, utuntur. Et primis potibus, & edulijis ammiscunt. Huius radices Cyperi modo parue sunt, candicantes, & odoratæ, atque Piper sapore imitantur. Eligi debent quæ teredines non nouerunt. A multis tamen ob id conduntur, quia celeriter cariem sentiant. Ficilibus in Italiam asportantur. Gingiberis cibo conueniens est. Et cum condimento assumitur. Excalfactoriam uim, & excoquentem habet. Aluum leniter emollit. Stomacho utile est. Efficax aduersus ea quæ oculis caliginem offundunt. In Antidota addi solet. In totum Piperi uiribus non dissimile.

Pli. li. 12. ca. 7.

B A R B A R I C O R O L L.

Zinziber, in Arabia & Troglodytica in uillis nasci dicitur. Parua herba. Precium radicis in libras sex. Quidam hanc & Sinsiberim, & Gingiberim appellant. Facile perit dicitur Zinziber, ob incoctam quandam & excrementitiam corporis uliginem, ut Galenus inquit.

E X M. V E R G. C O M M.

Quide Piperis, ex India ad nos reuersi, quæ superiore capite dicta a nobis sunt, retulerunt, idem Zingiber gramine simile in India nasci dixerunt: geniculatum, nouasque subinde radices agens, longius sub terra augeri, inueniri que ubique non aliter, quam & nostrum gramen: bisque aut ter folia per annum proferre, quæ harundinacea sint, sed non tantæ longitudinis, latitudinisque: nihil eo frequentius tota illa regione & copiosius nasci, ingensque saporis discrimen ex tempore;

quo lectū fuerit sentiri. Quodq; Gal. & post eū Paul. Aegineta dixerūt, ideo terebinib. tentari, sentireq; cariem, & pforari, q̄ crassioris cuiusdā & ineuictæ humiditatis particeps sit, lieri id illi dicunt, cum importune per uer ante maturitatem lectum fuerit: esseq; opportūnū legendi tempus, cum folia illa aruerint: idq; in effodiendo Zingibere ab Indis obseruari.

¶ De Hydropipere. CAP. CLXXVIII.

HYdropiper apud aquas nascitur, quæ stagnant, aut pigro lapsu repunt. Caulem ædit angulosum, prædurum, multis alis concauum, folia menthæ, maiora, molliora, cædidioraq; gustu Piperis acri, citra tñ illam odoris gratiā. Fructum acrem in surculis paruis, prope folia racematim coherentem. Folia cum semine illita, tumores, ueteresq; duricias discutiunt. Sugillata delent. Quæ postq̄ inaruerunt, tusa pro Piperis in obsonijs ammiscuntur. Radix parua, nullius in medicina momenti.

BARBARI COROLL.

HYdropiper, quale sit in Plinio, nondum comperi. Nam Piperitis, quæ & Siliquastrum dicitur, nonnihil ab Hydropipere uidetur differre, non solum medicinae usu, uerumetiam descriptione. Monstratur enim caule rubro, et longo, densis geniculis, folijs Lauri, semine albo, tenui, gustu Piperis, uulgo dicta Costum. Distat porro Siliquastrum a Salicastro, ut in mentione sua docebimus, sicut & a Siliquastris. Etenim Siliquastris herba non est, sed antiq; gn̄is sedile, ut Pōpius inq̄r. Georgius Tiphernas, Siliquā Cerauniam, in Strabone Siliquastrum interpretatus est pessime. Non desunt qui Perficariam mō nominatam Hydropiper esse suspicentur, quanq̄ foliū Perfici huic reddatur, unde nomē, Hydropipi uero Menthæ atq; Lauri. Est & in folio Perficariæ litura, macule modo inscripta: quæ si fuisset in Hydropeperi, fortasse nō omisissent autores. Est ergo Perficaria folio Perfici, flore cædido, spicaceo, gustu acri, semine minuto, caule nodoso, rubenti, longo: quæ sunt oīa & Hydropeperi tributa. Liberū sit æstimanibus iudicium.

EX. M. VERG. COMM.

NVlla Plinio, latinisq; alijs scriptoribus sub Hydropiperis titulo & uoce planta hæc est. Nec qualem hic describit prope aquas nascentem, inuenire adhuc licuit. Vidimus tamen in antiquissimo latino Dioscoride, & qui longobardis literis scriptus, sexcentorum annorum uetustatem refert, Hydropiperis appositam imaginem, diligēti ut erant ea tempora pictura, effigiatam. In qua descriptioni huius scriptoris omnia conueniunt, caulis, geniculi, alarum concauitates, folia, foliorumq; color. Vnum in fructu discrimen tantum est. Quod enim hic ait, in ramulis secundum folia nasci, & acinosum esse: in ea pictura in summis ramulis est uasculi potius q̄ folliculi, aut siliquæ figura: indicatq; in eo claudi semen, quod hic cum fructu miscet, fructum, uasculum, & in eo semen simul appellans. Quod deficientibus coniecturis alijs, non penitus ab re audisse fuerit. Quemadmodum nec inutile etiam, ex aliquarum plantarum natura cognoscere, quæ aliquando nobis in hoc opere Alarum concauitates in plantis sunt. Græci translata ab humano corpore appellatiōe *μαχαλας* dicunt caua, quæ aliquando bina, aliquando singularia, & ex intervallo semper in plantis uidentur, humanis alis similia, in quibus ueluti lacuna est. Sunt autem homini alæ qua parte brachium humero coniungit ex interiore parte, in quibus non aliter q̄ in pectore pubes aliqua nascitur, uirosi plerumq; odoris. Earū similitudine, concauos geniculos, quales in harundinibus, & plerisq; alijs sunt, *μαχαλας* græci, Romani Alas dixerūt. Ab Adnatis eo differētes, q̄ ex alis noua semper germinatio prodit: Adnata uero nullam habent certam partem unde emergant.

¶ De Ptarmica. CAP. CLXXIX.

PTarmica frutex est, surculos habens paruos, multos, & rotundos, Abrotono non dissimiles, & circa eos folia oleæ, longa, & in cacumine capitulum uti Anthemidis, paruum, rotundum. Quod suo acri odore sternutamentum excitat. Vnde nomen accepit. Folia cum floribus illita, sugillationes rapiunt. Flores sternutamēta efficacissime mouent. Nascentur in montibus & petrosis.

D I O S C O R I D I S

C P B A R B A R I C O R O L L.

Parmice, sub falso herba gustu, Diptarmice a quibusdam uocari solita, quoniam sternu-
tamentum iterari faciat.

E X M. V E R G. C O M M.

Ex re nomen habet Parmice; Parmion enim græci sternutamentum uocant. In quo egregi-
am necesse est habere vim: ex quo tam præsentis salutis augurio & honore, dignata eam Græ-
cia est. In nullo, quod hætenus sciam, herbarum censu sub hoc nomine latinis Parmice est:
& si Barbarus in Corollario suo testetur, a quibusdam hanc ipsam Diptarmicem dici. Me-
minerunt eius tamen inter græcos Galenus, & Paulus Aegineta, eadem omnia quæ Dioscorid.
posse eam testari, adijcientes tñ, uiridem sugillata, liuoreq; alios disjungere.

De Radicula, seu lanaria hærbæ. C A P. CLXXX.

στροθιον
στρονικαμνος

STRUTHIVM ab aliquibus Cerdon, ab alijs Catharlis, ab alijs
Struthocamelus, a quibusdam Chamærrhyton, a magis Calyrhy-
ton, a Latinis Lanaria hærbæ, aut Radicula appellatur. Nota est hæ-
rbæ, qua purgandis lanis utuntur, qui eas eluunt. Huius radix est acris.
Vrinam ciet. Prodest tussi, quam iecur excitauit, & orthopnoæ, ex mel-
le sumpta cochlearis mensura. Aluum soluit. Eadem cum Panace &
Capparidis radice, calculos frangit, & cum urina exturbat. Duriciem lie-
nis absomit. Menses imposita trahit. Partus enecat. Cum polenta aut-
em & aceto illita, lepras tollit. Tubercula discutit, cum farina hordea-
cea & uino decocta. Miscetur & malagmatis, & colyrijs, claritatis causa.
Sternutamenta mouet. Per os purgat, trita cum melle & naribus infusa.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 24. ca. 11

D

Struthion, a nostris Radicula uocatur, spinosa herba, non tamē acanaceæ, flos sine odore,
spectabilis æstatibus, caule lanuginoso, Semen nullum, Radix magna quæ conciditur purgan-
dis lanis. Mirum quantum conferens candore, molliciaq; Nascitur Satiua ubiq; sed sponte in
Asia, Syriacq; saxosis & asperis locis præcipua. Trans Euphratem tamen laudatissima, caule se-
rulaceo, tenui, & cibus indigenarum expetita, & tingenti quicquid sit, cum quo decoquatur.
Folium Oleæ, a medicis aureum Poculum uocatur. Hippocrates eömendat nascentem in An-
dro insula littoribus. Ab hac similitudine pororii quoddam uasculum fortasse Struthion ap-
pellatum sit. Smyrnæa mulier Galena, florē hunc non Struthiō, sed Strythion uocauit. Porro
Strutheum latine, ut est apud Festum, a salacitate passeris membrū uirile significat, præcipue in
mimis: ut qui passerem, in Martialis & Catulli uersibus, aliter accipiunt, nihil mihi dixisse ui-
deantur. Ne quis in ea re Politianum, quia sine autore loquitur, somniasse cauilletur.

E X M. V E R G. C O M M.

Plinius. 19. uolumine cap. 3. ad candorem & molliciem lanarum Struthij succo usos fuisse
antiquos ait. Idē mox tñ. 24. cap. 11. quod nos paulo ante diximus, his uerbis testatur. Tingt
bus & radica ramos præparat, quam Struthion uocari diximus a græcis. &c. Diuiditq; in
eodem usu, quod in græcis alioquin unum est: & ramulis Struthij tribuit, qd radicibus illi tri-
buerūt, quæ succo saporeq; aspx, ad imbibēdos colores unguine sordidas præparat lanas. Possūt
qdem qd Plinius ait, purgatas æsypo lanas cādidiores reddere: sed illud obit est. Qd' aut ab in-
sectoribus primū, & ut græci dicunt στροφρον a Struthio quærebat, purgato fordiū & æsypi un-
guine erat. Nescimusq; nos, quosnam Plinius ramulos in Struthio appellauerit. Radicibus em
in tingēdo, ut diximus, utebant: oñditq; latinū nomen, radicū tñ fuisse usum. Neq; em aliā ob
causā radica, qd ex posteriore usu dicta a Romanis est. Quinetiā, nihil fere excepta radice Stru-
thion est, quam per longitudinem, & in latera sub terra, non in altum extendit, proferentibus
se ex interuallo graminis modo & quasi ex geniculis, quinq; in unum collectis plerunq; folijs,
ex quibus coliculi cum floribus prodeunt. Vulgaris, & ubiq; locis incultis nascens herba, fo-
lio ut diximus in cespitem conferto, & per interualla ex eadem radice erumpente. Lauri figu-
ra, uerum maiore. Latini ab usu Lanariæ radicem, & herbam, & ab eius præcipua & utiliore
parte Radiculam dixerunt. Vnde autem græci Struthion nominauerint, nō satis nunc patet.

nisi forte a foliorum positura, quæ auium alas quadamtenus imitantur, nomen illi fecerunt. *σπούδιον* enim, & *σπούδιον* ea gens passerem, & minores alias appellat aues. Quod si in cibis radix hæc transiret, crederemus ob caliditatem, quam in quarto ordine habet, Venerem stimulare, & ob id Struthion dictam. Græci enim *σπούδιον* passerem dicunt: & ab eius auis salacitate *σπούδιον*, quasi passerem ad Venerem procliuiores homines, & ex ea ratione id facientem herbam Struthion etiam dicere potuissent. Sed nihil horum pro comperto est.

¶ De Cyclamino. CAP. CLXXXI.

Cyclaminus a quibusdam Cysanthemon, ab alijs Cysstophyllon, ab alijs Chelonion, alijs Ictyopheron, ab alijs Silene, a Zoroastre Triphalites, ab Osthane Asphe, a Magis Miaspho, Aegyptijs Theſce, a Romanis Rapum terræ, aut terræ Umbilicus uocatur. Folia habet hæderæ, purpurea, uaria, in quibus fusq; decq; albicant maculæ, caule nudo, quaternos digitos æquante, floribus in eo purpureis, rosarum effigie, radice nigra & aliquantum lata, ut Rapum uideri possit. Quæ cum hydromelite pota, pituitam, aquamq; detrahic. Menſes potu appositue citet. Tradunt, si prægnans radicem transgrediatur, abortum fieri. Partum appensa accelerat. Contra uenena, præsertim Ieporis marini, ex uino bibitur. Illita, contra serpentium ictus remedio est. Radix immista uino, inebriat. Regium morbum discutit, tribus drachmis pota, cum passo aut diluto mulso. Sed oportet cum qui ebibit, multis uestibus contentum, loco calido, & perfrictiõibus tuto recumbere, quo facilius exudet. Eiecti autem sudores fellei colore inueniuntur. Succus eius ad purgandum caput, naribus infunditur. Ad deijcienda quoq; alui excrementa, in uelle re sedi subijciunt. Illito umbilico & imo uentre coxarum tenus, alui emollit. Sed abortum efficit. Suffusionibus, & retusæ oculorum aciei, oblitus cum melle succus, prodest. Medicamentis abortum inferentibus, anuſcetur. Succus cum aceto illitus, prociduiam sedem restituit. Exprimitur tusa radice succus, & ad mellis crassitudinem decoquitur. Radix cutem purgat. Eruptiones popularum reprimat. Vulneribus ex aceto, aut melle medetur. Liezem absumit. Vitia cutis in facie, & alopecias emendat. Eius decocto, luxata, podagras, & capitis ulcuscula, pernionesq; foueri congruum est. Ipsaq; in oleo uetere seruefacta, illito oleo, ulcera ad cicatricem perducit. Cauata radix oleo expletur, & cinere feruienti imponitur, adiecto interdum thyrrenicæ ceræ momento, ut stigmati crassitudinē unguentum contrahat, cum primis utile pernionibus. Radix Scyllæ modo concisa reponitur. Narrant ad amatoria assumi contusam, & in pastillos diuisam. Nascitur in umbrosis, maxime sub arboribus.

BARBARI COROLL.

Cyclaminos a nostris Rapum, & Tuber terræ dicitur, ut inquit Plinius, non malum terræ, ut Theodorus putauit. Nam Malum terræ, ut Dioscoridi uidetur, Aristolochia est. Erraticum uero malum a Plinio uocatum, & ad calculos radice commendatum, quale genus sit, nondum comperi: præterq; si quis pro Anthemide accipiat, quando utilem uesicæ uitij eam nouimus. Et Chamæmilon, hoc est, malum terrestre, dicitur a Græcis Cyclaminos. Folia habet minora q̃ Hedera, nigriora, & tenuiora, sine angulis. Flos ei, ut Plinius scribit, colossinus, & in corollis

Α

κυκλαμινος

B

Pli. li. 27. ca. 9.
lib. 25. cap. 9.
lib. 26. cap. 12.

A ij

D I O S C O R I D I S

Cnas admitti solitus. Est autem genus in eo nomine coloris, ut Straboni placet a Colossis urbe Troadis, ubi præcipua lanitij commendatio fuisset: quemadmodum Laodiceæ, Coracinum pecus, a colore item uelleris appellatum. Sed cum duo florum genera Cyclamino reddantur, purpureum, & candidum, uter eorum Colossinus dici possit, extimandum relinquimus. De Coracino Laodicensium uellere, etiam Vitruius. Pernicialia Cyclamino cum oleris sunt. Siquidem aduersam ei Brassicam inarescere affirmant. Sphæritis herba quæ sit Actio, non constat. Quid si Cyclaminon interpretare: cum quæ alopecias emendat, cum quæ Cyclaminos Orbicularia latine dicitur, hoc est, Sphæritis.

E X M. V E R G. C O M M.

Est præter numeratas a Dioscoride Cyclamini appellationes, ubi nostra ætate porcorum, ubi terræ Panis Cyclaminus appelletur. Nullusque non audito alterutro nomine, ubique fere inter sepes & uepres nascentem plantam intelligit, quam subulci pecori suo gratam cognouerunt, et ab eo nomen illi fecerunt, porcinum Panem appellantes. Cæteri antiquum Cyclamini nomen ignorantes, a panis figura sub terra latentem eius radicem, terræ Panem uocauerunt. Nihil in agro agentibus nunc etiam notius, nigro colore: radix in orbem circumacta, non tamen in globum surgens, sed ueluti pressa pondere, in latitudinem se explicans, eadem forma qua nunc in quotidiano usu panes videntur. Qui primi nomen illi fecerunt, circumactam in orbem eius circinationem contemplati, ἀπὸ τοῦ κύκλου, quasi ab orbe Cyclaminon, id est, orbicularem dixerunt. Fuitque hæc prior & antiquior plantæ huius appellatio. Secuta ætas, non radicem, sed folia eius contemplata, quæ hederacea essent, Cissanthemon, et Cissophyllon eandem nominauerunt, uariorum enim græci Hederam dicunt: & si in prima hac Cyclamino longe maiora quæ Hederæ folia sint, solamque Hederæ figuram in folio referat. Non defuerunt quondam etiam, qui a testudinis forma, Cheloniam eandem dicerent: quemadmodum non defuit idem, qui ideo testudinis nomen retulisse dicant, quoniam ea id animal uescatur: quemadmodum contra pisces oderunt, qui non secus quæ ueneno aliquo in aquam coniecta Cyclamino enecantur: ideoque piscium Venatio dicta fuerit. Plinius tertiam Cyclaminum id facere dixit, cuius hic non meminit. Romani scriptoris huius historiam secuti, Rapum terræ, uel Umbilicum, uel Tuber dixerunt: quoniam hic dixerat radicem esse nigram, Rapo similem. Umbilicum autem, quoniam ut in aliquibus circinata forma umbilicus est, sic & Cyclaminus sub terra uideatur. Dico autem umbilicum, non qualis in homine ceterisque animalibus media pars est, sed quales in Epigrammate suo Martialis dixit. Iam peruenimus usque ad umbilicos, extremam uoluminis clausuram, quæ aut nodus, aut fibula opus claudebat. Vidimus nos aliquando Cyclamini radicem, globo & latitudine amplissimi panis: ex qua folia erumpebant: & inter folia flos breui pediculo, potius quæ pediculo surgens, in quo color erat qualem hic describit, Plinius Colossinum uocat. Nec ambigendum de eo colore erit, qui Cyclaminum florentem uiderit. Eundem lib. 25. idem purpureum dicit. Nec uidetur tantus scriptor in his sibi constare. Habet ut uidetur Cyclamini uis numero-
Pfas, & egregias in medendo uires, quas paulo minus quæ omnes nouit & indicauit ante Dioscoridem Theophrastus lib. 9. de plantarum historia, ostendens & ipse, adalligatum Cyclaminum partus adiuuare: prodesse ad amores: subdum mulieribus: purgare caput: ulceribus ex melle merideri: & ne longiores simus, nihil non idem in utroque est. Addidit Theophrastus, tantum cremari radicem Cyclamini, tum uino restingui, cineremque eodem quo sex modo in pastillos conformatum seruari.

De Altera Cyclamino. C A P. CLXXXII.

Est & altera Cyclaminus, quam Cissanthemon, aut Cissophyllon uocant, minoribus quæ Hederæ folijs, geniculatis caulibus, crassisque, circa uicinas arbores capriolorum modo se uoluentibus, flore candido, odorato, acinis Hederæ mollibus, lenti gustus, aliquantulum acris, radice superuacua. Nasquitur in asperis. Huius acini drachmæ unius pondere poti cum uini albi cyathis duobus triginta diebus, lienem per urinam & aluum absumunt. Ad Ortopneam bibitur. Reliquias a partu purgat.

Cyclaminos altera est, cui nomen ab Hederæ floribus impositum Cissanthemos, de qua hic agitur. Plinius & tertiam, Cyclaminon demonstratam sibi prædidit, cognomine Chamæcis.

son, uno omnino folio, Radice ramosa, qua pisces necantur. Ideoq; hanc proprie Ichthyoterā uocari autumo, quanq; nomen hoc a Dioscoride Cyclamino primæ datur.

E X. M. V E R G. C O M M.

Alteram Cyclaminum hanc a supriori illa diuersam faciunt, minus in latitudine exæqua-
ta, & globosior radix: longiores coliculi, quibus in alias arbores uitium modo ascendit: folia
longe q; illius minora, quantitate, incisuris, totoq; habitu hederacea. Ob quā causā Plinius ait,
hanc tantū Cissanthemon dictā fuisse. Flores candidi, odoratiq; qui in illa purpurei sunt, & si-
ne odore. Acinosus fructus, & qualis in Hedera corymbaceus: & qd ad medicinā pertineat, ra-
dix inutilis, quæ sola in altera illa expetitur & usum habet. Hæc aspis locis nascens, illa in ue-
pres & in sepibus. Hanc ipsi non uidimus, nec possumus oculati testes eius legentibus esse.

De Dracunculo. CAP. CLXXXIII.

DRACCVNTIVM magnum aliqui Aron, alij
Isaron, alij Iaron, alij Geracicon, alij Biaron, alij Armiagrion;
alij Cyperida uocant. In umbrosis sepibus gignit. Caulem habet rectū,
laeuem, duum cubitorum, baculi crassitudine, uersicoloribus draconum
maculis, purpureis tamen euidentibus. Folia Rumicis, inflexa. Fructū
summo caule facit racemosum, coloris primum cineracei, mox per ma-
turitatem in crocum & purpuram uergentis, radicem prægrandem, ro-
tundam, candidam, cortice tenui uestitam. Colligitur, & dum matu-
rescit succus exprimitur, sicuturq; in umbra. Radix quoq; messibus ef-
foditur. Elotaq; particulatim conciditur, & funiculo transfixa siccatur
in umbra. Cum diluta potione crudam, coctamue, cum melle delingi
prodest, contra orthopneas, rupta, conuulsa, tussim, & destillationes.
Pota cum uino uenerem stimulat. Vlcerā quæ cacœthe uocantur, at-
que phagedænica expurgat, præsertim cum uite alba. Ex ea & melle col-
lyria ad fistulas, & partus euocandos componuntur. Ad uiliginēs cum
melle efficaciter illinitur. Polipos, & carcinomata absumit. Succus ad o-
culorum medicamenta, item contra nubeculas, caliginem, albugines
que effectum præbet. Herbæ, radicisq; odor, teneros conceptos abortu
uiuat. Item si triginta grana eius in posca bibantur. Sunt qui eius suc-
cum cum oleo, aurium doloribus infudere. Quinetiam folia, utpote
quæ adstringant, uulneribus recentibus imposuere, & cocta in uino
pernionibus. Qui folia manibus affricuerit, aut radicem exemerit, posse
a uipera feriri, inficiantur.

B A R B A R I C O R O L L.

DRacunculus a caule uario draconis more dicitur: siue a cauda, quæ illi subrutula est, &
draconis intortimodo conuoluta. Dissonāt aliquātum in hoc genere scriptores. Alijs Dracun-
culum ab Aro separantibus. Alijs idem existimantibus. Glaucias Dracunculum syluestrem
Aron uocabat. Phenias Aron, & Aroniam. Aliqui radicem Aron appellauere, caulem Dra-
cuntion. Theophrastus Aron putauit genus esse, sub quo species quasi multæ continerentur.
Dioscorides quatuor uidetur fecisse genera, Dracunculum maiorem, Dracunculum minorem,
Aron, & Arisaron, quanq; in describendo Aro, discrepat a Plinio. De Dracunculo quoq; pa-
rum conueniunt inter eos, ut sequenti capite liquebit. Dracunculus hordeo maturecente fodit,
luna crescente, Serpentariam sunt qui uocent. Inuenio apud Hippocratem & Ophin herbam,
semine muliebribus medicinis utilē probari. Nec an eadem sit cum Dracuntio satis constat, eti-
am si a serpente nomen habeat. Idem Hippocrates candidam radicem cum nominat, Dracun-
cij radicem, ut Galenus uult, intelligit.

A

δρακόντιον

B

The. li. 9. ca. 22

A iij

D I O S C O R I D I S

C E X M. V E R G. C O M. M.

Rit legendus & nobis non leue laboris compendium, si antequā de maiore Dracunculo agatur, tota minoris medicina & historia pariter reddita fuerit. Sunt enim utriq; paulo minus q̃ cuncta communia, tamq; in minore incerta, mixtaq; cum maiore multa, ut continuato sermone de utroq; utilius dixisse fuerit. Aequo animo ob eam causam tūc sper dum hoc agimus, differri sibi nostram Dracunculi commentationem legentes patientur.

¶ De Dracunculo paruo. C A P. CLXXXIII.

Dracunculus paruus folio constat hederaceo, magno, candidis notis insigni, caule recto, bicubitali, uersicolore, maculis re-
sperso purpureis, ita ut anguem plane referat, baculi crassitudine. Fru-
ctus summo caule racematim cohæret, colore primum felleo, & cum
ematuruit, croceo, gustu feruens, mordaxque, radice rotunda, bul-
bosa, raphano non absimili, tenui obducta cortice. Nascitur in sepi-
bus umbrosis. Seminis succus cum oleo instillatus, aurium dolorem
mitigat. Naribus etiam ex lana impositus, polipum absumit. Carci-
nomata illitu sistit. Triginta eius grana, si in posca bibantur, abortus
inferunt. Odorem aiunt posteaquam flaccidi flores emarcuerunt, con-
ceptus adhuc teneros enecare. Radix excalfacit. Orthopnoeis, ruptis,
uulsis, tussi, destillationibus auxiliatur. Humores pectoris excreatu fa-
ciles reddit, siue cocta, tostaque cum melle, aut per sese edatur, siue
farina eius ex melle delingatur. Vrinam pellit. Venerem excitat, cū
uino pota. Phagædenas ulcerum, & quæ cacœthe uocantur, trita cū
melle & Brionia alba, expurgat, & ad cicatricem perducit. Collyria ex
ipsa ad fistulas, & eiciendos partus fieri solent. Qui radice suas ma-
nus perfricuerunt, a uiperis feriri negantur. Illita ex aceto uiliginēs
emaculat. Folia recentibus uulneribus, conceptorum lintheolorum ui-
ce, conuenienter imponuntur. Decoctam in uino pernionibus appo-
uisse prodest. Caseus folijs inuolutus, a putredine defenditur. Suc-
cus radicis ad nubeculas, albugines, & oculorum caligines conuenit.
Radix cruda coctaue, ad sanorum usus, pro olere recipitur. In Gym-
netidibus insulis, quæ Calarides uocantur, coctā radicē cū melle multo,
in conuiuijs placentarū loco offerunt. Radix messibus effoditur, lotaq;
frustatim concidit, & lino traiecta siccat in umbra, & ita reconditur.

B A R B.
Pli. li. 24, ca. 16

Dracunculi duo sunt Dioscoridi, maior, & minor, ut prædiximus. Plinio tres. Vnus folijs
Betæ, nō sine thyrsō, flore purpureo, similis Aro. Alter radicē lōga, ueluti signata, articulo
saq; tribus omnino cauliculis. Tertius folio maiore q̃ cornus, radicē arundinea, totidem (ut
aiunt) geniculata nodis, quot habet annos, totidem etiam folijs. Aetius Dracunculi semen oc-
cultari terra, & piperi simile describit. Olitores & Draconem uocatam ferunt, huic toto genere
dissimile, quam mirabili quodam modo nasci prædicant ex lini semine incluso, raphanis, aut
scilla bulbis, atq; in terra obruto. Pusilla herba, nigro ac minuto semine, folio tenui & oblon-
go, acri, & utraq; originē prodente, linguam & folio & radice amburens, & aceti & salis gu-
stu. Pyretrum sunt qui a ueteribus appellatam falso putent hanc, inter olera acetaria gratissimā.
Ita em uocare institui, quicquid crudū manditur ex aceto, sale, oleo. Quanq; hortos suos præci-
pe quos, ut inquit Cicero, quasi alterā succidiā ueteres habuerint. Ab eodē uerbo et Acetabu-
lū deduci, etiāsi Græci Oxybaphō ab intinctu aceti nominant, ita em aceto uas dicatū uocabat.

ut Athenæus testatur. Quæ & mensuræ genus significat, quod & Cochleare dicimus.

EX M. VERG. COMM.

Miscuerunt adeo ueteres cum Aro Dracunculū, totum nunc isdem, nunc diuersis notis descripta Dracunculi genera ab illis fuerunt, ut nihil in re aliogen satis nota, difficilium aut ipsi fecerint, aut per se legentibus ostendat. Quodque anxios diu nos habuit, & adhuc habet, nec aliter in partes trahit uarias, perque omnia uersat, quæ qui in amoribus Medæ ab Apollonio primū descriptus est, solis ex aqua fulgor, summi feriendi laquearia testis, nuncque stabilis, sed continua uersatione in omnes discurrens partes, Dioscorides est: & quæ in cunctis græcis duo maioris, minorisque Dracunculi capita in eo legunt, nullibi quod egregiā diuersitatē faciat, uariata eorum historia, aut medicina, & si alterum Rumicis, alterum Hederæ folia habere hic dixerit. Multiplex enim huic scriptori similitudo est coloris, figuræ, quantitatis, uirium, aliorumque huiusmodi. Fitque ob eam causam sæpenumero, ut quod totum diuersum est, in partibus simile dictum, totam similitudinē referre male credat: & quod undique simile est in partibus, differre dictum totum dissimile falso habeatur. Quod in utroque scriptoris huius Dracunculo fieri facile potuit. In quorum altero folia Rumici in quantitate & figura, in altero Hederæ in colore comparari potuerunt. Nihil enim nobis, excusso diligenter utroque capite, inuentum est adeo dissimile, diuersumque, ut altera oportuerit, præsertim tam longæ rei & medicinæ isdem uerbis historiā conficere. Auxitque suspicionē nostrā, quod nec Galenus, nec post Galenū Paulus Aegineta diligentissimus in græcis medicinæ auctor, & qui scriptoris huius dicta ubique bona fide retulit, alterum hunc, & minorē Dracunculū nouerunt: nec post græcos latini scriptores Apuleius, Ioannes Serapion, & quod multi apud nos est, uetustissimi latini codices, in quibus unius tantum Dracunculi caput, alterius uestigium nullum ostendit. Ex eo factum est, ut crediderim, & adhuc credam, unum tantum a Dioscoride Dracunculū hoc loco describi. Neque enim uerisimile, si alter ille in natura Dracunculus esset, & ab hoc scriptore descriptus fuisset, relinquendū ab illis penitus fuisse. Et nihilominus in cunctis & antiquissimis græcorum codicibus, utrumque hoc caput adhuc legitur. At non est eadē utriusque historia & medicina. Concedimus id quidem: monemus tamen uocem magis quam rerū diuersitatē esse: nec ad constituendū rei genus satis id esse. At minori Dracunculo aliquid tribuit, quod in maiori non legitur: quale est, incorruptū seruari, folijs eius inuolutū caseum. Neque id etiā diuersitatis necessitatē facit. Potuit enim in noua alterius eius capitis descriptione illud addi. Siquidem non Dracunculo Plinius, sed Aro eam uim tribuit: possuntque eandem habere rationem quæcunque alia minori addita magis quam alia inueniuntur.

De Aro. CAP. CLXXXV.

Aron apud Syros Lupha uocitatum, aliqui Alymon, alij Thyamon, alij Dracontiam, Cyprij Collocassion dicunt. Folia emittit Dracunculi, sed longiora, & paucioribus distincta maculis, caulem subpurpureum, dodrantralem, pistilli specie, a quo croceum semen exit. Radice Dracunculi alba, quæ decocta estur, utpote cum minus acris sit. Folia ad esum condiuntur, & arida per se, decocta manduntur. Radix, semen, & folia Dracunculi uires habent. Priuatim radix ex fimo bubulo podagris illinitur, & Dracunculi more reponitur. In totum ob mitiorem eius acrimoniam, in cibum expetitur.

BARBARI COROLL.

Arorum Theophrastus inquit radices, inhibita germinatione fiunt atiles, folijs uidelicet terra obrutis. Prægrandia hæc sunt. Item caua, cucumeracea. Radix nuda cortice, quæ mandipossit. Nam & folia in aceto inquit decocta eduntur, nec insuauis cibis est, caulem ei nullum reddendo. Differt a Dracunculo, si Plinium sequamur: qui radicem habet nigram, in latitudine rotundā, multo maiorem, & qua manus impleatur, Dracunculus subrutilam, & intortam. Semē ei feruēs ac mordax, Aro lenius. Quod & Galenus confirmat. In cibis Aros forma præfertur: quoniā mas sit dulcior, & in coquendo lentior. Folijs Ari, caseum ne computrescat, seruari affirmant: quod quidem a Dioscoride, maiori, aut minori Dracunculo tribuitur.

Confundit Plinius cum Dracunculo Aron lib. 19. cap. 4. Numeratque Aron inter Aegypti Chorēthia, his uerbis. Est inter genera Bulborū, quod in Aegypto Aron uocant, Scyllæ proximū amplitudine, folijs Lapathi, quæ Rumex est: caule recto, duum cubitorū, baculi crassitudine:

A iij

A

B

ἀρον λούφα

Theophr. li. bro. 7. cap. 11. Pl. li. 24. ca. 16.

VERG.

D I O S C O R I D I S

Cradice mollioris naturæ, quæ edatur & cruda, &c. Folia enim Lapathi, caulis rectus, duum cubitorum altitudo, & baculi crassitudo ex maioris Dracunculi historia cuncta sunt; nec Aro congruunt, cuius caulis semipedalis pistilli figura est. Quam formam in nostri orbis Aro quotidie licet uidere. Confundendi quæ simul diuersa genera, nulla maior, ut credimus caussa fuit, quæ similitudo primùm: mox antiquorū historia, in qua totum hoc genus Aron aliquando, nonnunquam priuatim illud Dracunculus, hoc Aron dictum est. Discreuit tamen alterum ab altero natura: & illud procerius, hoc breuius fecit. In illo figura est, qualis superiore capite tradidimus; in hoc ubi quæ cognosci potest. Reliquit in hoc etiam Dioscorides inuolucrum illud, & cucullum, quo inuolutum semen claudit, pallido magis quam herbaceo colore, non ut in Dracunculo purpureum. Numerabatur quondam, ferebaturque inter olera Aron: quod uix credibile sit, tantam habet radix, quæ in ciborum usu erat acrimonia. Cogitandumque alterum est, aut aliunde inuentum mitius fuisse, aut cultura genere aliquo & humano artificio meliorescere nunc etiam posse.

¶ De Arifaro. CAP. CLXXXVI.
Arifarum exigua herbula est, cuius radix oleæ magnitudinem implet, longemaioris quam Aron acrimonia. Vnde illitu nomas sistit. Fiunt collyria ex ea ad fistulas. Illitu radices, genitale animalis cuiuscunque in perniciem agitur.

B A R B A R I C O R O L L.
Arifaros, siue Arifaron, in Aegypto nascitur. Similis Aro herba, minor tamen multo, minoribusque folijs, & utique radice: quæ tamen Oliuæ magnitudinem prægrandis impleat. Alba, geminum, altera unicum emittente caulem. Corrupte nomen huius herbae medici, ut ab ipsis iam non Arifaros, sed detritis duabus literis, Asarus dicat: quod quidem & in Asari mentione testati sumus. Est & Aris herba Hippocrati, nec qualis sit, & an pro Arifaro capienda sit, non constat. Aris & instrumenti quoddam genus est.

E X M. V E R G. C O M M.
DCongeneres, ut uidetur, plantæ tres hæ sunt, Dracunculus, Aron, & Arifaron. Bulbosas enim radices oēs habent: & in reliquis non adeo dissimiles, in medicina conueniunt. Plinius lib. 24. cap. 16. Erin, sed ut credimus, corrupta ex Arifaro uoce appellat. Additque in historia eius, nasci in Aegypto. Et quod hic ait, emplastri modo impositam radicem, omnium quadrupedum genitali genitali cuiuscunque feminini generis, animal in perniciem agi. Hic autem non magis feminini, quam masculini sexus id malum fore ostendit. Signauimus hoc, ut suspicari & querere legentes possint, huic ne capitum aliquid desit, an aliter Plinius rem intellexerit. Dubitauit in Pliniani cascada planta hæc sit: quoniam Arin Hippocrates, herbam sibi tamen ignotam appellauerit: & quæ Arifaron omnia minora quam Aron haberet. Sed uocandam Arifaron esse Paulus Aegineta lib. 6. testatur, dicens multo breuius Aro Arifaron esse, uocatque Arifaron manifeste, non Arin.

¶ De Hastula regia. CAP. CLXXXVII.
Hastulam regiam Græci Asphodelon, alij Narthecion, Romani Albucum uocant, uulgo notum. Folijs est maioris Porri, caule læui, ferente in cacumine florem, quæ Anthericon appellat. Radices subiacent oblongæ, rotundæ, glandibus similes, gustu acres. Quæ ex calfaciunt. Urinas, & menses epotæ cient. Lateris doloribus, ruptis, conuulsis, & tussibus, drachmæ pondere potæ ex uino medentur. Ea uero uomitiones adiuuat, ludicri tali magnitudine comanducata. A serpente demorsus datur aptissime. Verum trium drachmarum pondere, folijs, floribus, & radice ex uino morsus illinire oportet. Item ulcera sordida, & depascencia. Mammarum quoque & testium inflammationes, tubercula, furunculosque, decoctis in facie uini bulbis. Recentibus oculorum inflam-

mationibus ex polenta auxiliatur. Radicis succus adiecto uetere uino dulci, myrrha, & croco decoquitur, fitq; perq; utile oculis medicamentum. Ad purulentas aureis per se, aut cum melle, uino, & myrrha tritus, prodest. In contrariam aurem infusus, dentium dolorem mitigat. Cinis e radice illitus, alopecias ad pilum reducit. Oleum in excauatis radicibus igni decoctum, illitu exulceratis pernionibus, & ambustis igni, conducit. Surditati, instillatus in aurem, auxiliatur. Candidam uiriliginem lintheo antea perfrictam in sole, illita radix emendat. Semen, floresq; in uino potati, scolopendræ, & scorpionum uenenis, mirum in modum resistunt. Aluum purgant. Floret messibus Albucum. Quare æquinoctio uernò, antequam semen adoleuerit, demetendum. Radicem aiunt potam, ueneris cupiditatem inhibere. Quod hærbarius Crataeas asseuerat. Addiditq; sanare podagræ dolores, si drachmæ pondere bibatur.

BARBARI COROLL.

Asphodelus, de clarissimis herbarum Hastula regia uocatur, radice cibus apta, folio Porri syluestris, angusto, prælongo, sublenito, caule præcellenti, qui cubitalis est, & sæpe duum cubitorum, Antheriscos, siue Anthericos a Græcis, Albucus a nostris proprie uocatus. Differt Antheriscus ab Anthriscio, ut ex mentione Scandicis facile colligitur. Asphodelus, & aqua, & sicco uiuit. Lignosum ei semen, copiosum, triquetrum, colore atro. Nascitur in orbiculo subiecto flori, decidens ætate folliculo dehiscente. Particulatim floret Asphodelos, incipiens ab imo. Vermes in eo uolucres, specie flosculorum erosæ, floris incipientis operimento euolant. Proprium huic cauli, qd tametli leuis & angustus, in ramulos tamen fundit superne. Torretur hic in cinere ad esum. Itæ bulbus cum semine, oleo, & sale addito, cum ficiis quoq; tundit, præcipua uoluptate, ut uidetur Hesiodo, in syluis eum nasci prædicante. Mentionem Asphodeli & Homerus fecit, Heroion, siue ut alij codices, Erineon appellatū ab aliquibus uideo. Cochleæ terrestres mire in Campania caulem eius persequuntur, & sugendo arefaciunt. Bulbos eius Napis modicis similes octuaginta sæpe simul aceruatos autumnò colligunt, cum plurimū ualent. His mures necant, & cauerna præclusa immoriuntur. Amuletū esse putant, in domibus ante portas satum. Hellanicus prodit, quosdam esse Nomadas in Libya, qui nihil aliud possideant, qd situlam, gladium, & calicem, & ex Asphodelo casulam, umbræ tantū gratia; quam & circumferant. Eius tamen genera duo faciunt, Albucum intelligentes candidum; cui scapus cubito amplior, purus, leuisq; . Asphodelum uero, siue Hastulam regiam, cui acinosus sit caulis. Dionysius discreuit sexu, marem, & foeminam, pronuntiando in ea.

EX M. VERG. COMM.

Vix credat nostra ætate aliquis, in cibos & sanitatis usum uerisse quondā Asphodelū: tam alienus homini nunc cibus est, tamq; inter medicamenta magis qd olera merito censeat: nisi Hesiodū audierit canentem, nescire homines iniuste rem suam augentes, ὅσων ἐν μαλάχῃ καὶ ἀσφodelῷ, graue poetam, sapientemq; & cuius carmina in priuata uita pro oraculo a professoribus sapientiæ recepta semper fuerint. Et post Hesiodum Pliniū, mandū Asphodelum, semine tosto & bulbo dicentem: & ad temperandā eius acrimoniā ficiis misceri iubentem: Tantā rudi, nouoq; adhuc sæculo, aut indiscreta ciborum frugalitas erat.

De Bulbo uomitorio. CAP. CLXXXVIII.

BVLBVS QVEM uomitorium uocant, folia habet lentiora multo & longiora Bulbo cibario, radicem similem, cortice magno. Ea mansa, aut decoctum eius potum, uesicæ malis medetur. Vomitiones mouet.

BARBARI COROLL.

Bvlbus Vomitorius, a Græcis Eméticos uocatur, folijs nigris.

Pli. li. ii. ca. 17.

B

Bulb.

C De Bulbo cibario. CAP. CLXXXIX.

βουλβοζ ἰσώδης
μυρ

CIBARIUS BVLbus uulgo cognitus, a nobis estur. Stomacho & aluo utilis rufus, & ex Aphrica delatus. Amarum uero, & scylinus, stomacho aptior est, & concoctionem adiuuat. Bulbi omnes acrimoniam habent. Excalfaciunt. Venerem stimulant. Linguam, tonsillasque exasperant. Multum alimenti præbent. Carnes creant. Inflationem pariunt. Luxatis, fractis, articulorum doloribus efficaciter illinuntur. Spicula extrahunt. Gangrænas, & podagras ex melle, aut per sese, hydropicorum tumores, & canum morsus cum melle & piperis polline illiti cohibent. Stomachi dolores mitigant. Furfures & ulcera quæ in capite manant, cum tosto nitro abstergunt. Sugillata, uarosque per se, aut ex ovi luteo, & lentigines cum melle & aceto, emendant. Fractis auriculis, unguibusque, ex polenta medentur. Iidem calidis cineribus torrefacti, tollunt ficus. Item cum cinere e manarum capitibus, impositi. Cremati uero, & cum alcyonio misti, uitia cutis in facie, atrasque cicatrices, in sole illiti emaculant. Faciunt adrupta, si cum aceto cocti edantur. Sed copiosiore eorum cibo abstinendum. Quoniam neruos tentant. Cocti cum polenta, & ex suillo adipe impositi, tumores ac tubercula uelocissime ad suppurationem perducunt, & rumpunt.

Pli, li. 19. ca. 5.

D

BULBI foliū angustum, ut omnibus fere bulbosis. Radice feritur hortensis. Nam semine partim primo, partim sequenti anno prouenit: quod & in Avena, Loto, Betaque conspicitur. In Taurica Chersoneso tam dulces sunt, ut crudi mandant, Laudant ex Alcathe, Pelasga, ut Ouidius ait, urbe candidus, hoc est, ut puto Megaricus, auctore Pausania, sed ad uenerem. Idem auctor. Daunus, an Libycis Bulbus tibi missus ab oris,

An ueniat Megaris, noxius omnis erit.

Est & Bulbi genus circa ripas amniū, cuius interesculentā partem, & summū corticem lanæa contineatur natura: ob id Eriophoros appellatū, ex qua uestes quoque fiant. In Indis Bulbi non lanigeri, sed criniti nascuntur. Bulbis anaritudo in uertice. Habetur & Bulbina, rubicundo radicis bulbo. Item candido, & squamis carente, folijs Paracæ, ut inquit Plinius. Codices antiqui non Paracæ, sed paruis habent. Ego porraceis legendū existimo: quandoquidem ita modo ceritur Bulbina, quam Maurice Buberigi cognominant herbarij, folijs croci, flore uiolæ, purpureo, siue ferrugineo in spicis, nigro semine. Syluestrium Bulborum florem, coronis inferuere ueteres, Anemonem uocantes post Narcissum, ut Theophrastus inquit, exeuntem uere. Conditon Bulbi eum florē Græci appellant: haud scio an hic sit, qui per initia mensis Aprilis Narcisso similis erūpit, maioribus diuisuris, ceu stella quaternis folijs cædidus, cum caocis interioribus, & odoratus, fronde porracea, radice bulbosa, ceu Allium, sine odore glutinosa, Bulbum rufum Græci Bolbon, & Hippocrates Bolbion pyrron uocant. Inuenio apud Hippocratem genus syluestris oleris Omoconitidem, siue Oloconitidem uocari, dulcem, Bulbo simili radice, uerum parua, & Oliuæ magnitudine, ad secundas trahendas utili.

PEREGRINOS Græciæ diu & Italiæ fuisse Bulbos, aut peregrinos quasi ad omnes usus melioribus usas fuisse has gentes, & plura eorum fuisse genera Græcorū antiqui, & probatioris fidei scriptores omnes testantur, Theophrastus primum, s. de plantis uolumine, cuius ea de Bulbis historia est. Bulborū autem plura esse genera, manifestum. Magnitudine siquidem, colore, figura, & sapore differunt. Alicubi enim adeo dulces nascuntur, ut per se sine condimento alio edantur: quales in Taurica Chersoneso sunt. Post Theophrastum deinde Athenæus secundo sui diopnosophistæ libro inter cætera, quæ de Bulborum huiusmodi natura multa dixerat, Regios uocari aliquos ait: quos cunctis alijs prætulit. Post Regios a colore Rufos laudauit. Subijciens

E X M. V E R G. C O M M.

Affatam Candidos, Lybicosq; in genere Scyllarū magis, q; Bulborum esse. Aegyptios omnium deterrimos: quemadmodū contra, auctore Nicandro, cunctisq; alijs, Megarenscs omnium optimos. Quod genus conferi praecepit Cato iussit, & Columella in carmine suo his uerbis instituit. Iam Megaris ueniat genitalia semina Bulbi: Et quae Scylla uenit getulis obruta glebis. Primum illud Ruffum & optimū, mox Candidum, Libycumq;: & Scyllae magis q; Bulbo simile genus describens. Addidit eodem libro Theophrastus, quod & Athenaeus pariter retulit, maximā & huic generi propriā Bulborum differentiā esse, quā ad maris littora aliquibus locis nascentes Bulbi ostendūt. Inueniūt enim littorales, in quibus intra primas tunicas lanæ sint, inter id quod manditur, & extimam tunicam mediā, tam uera & praesenti natura lanæ, ut uestes ex ea texant: uocariq; ob id Lanosum Bulbū: non quemadmodū in India nascentē Capillatum noiant. Hoc genus, q; ad mare, & littora nascit, & cum eo reliquos Bulbos oēs, quoniam congeneres inter se sunt, iuniores aliqui marinā Cepulam dixerūt. Cum tū Lanosum illud genus ad mare nascens, priuatim cognouit illo discerni debuerit. Serebat in hortis diligenter antiquitas hoc olus, eratq; illis in quotidiano usu, irritamentū Veneris potius, q; uitae necessarius cibus. Nihil enim ab antiquis aliud in eo laudat: neq; ex alia naturae uel Columella, quod paulo ante diximus, genitalia semina Bulbi, appellauit. Et Martialis in Xenij suis. Cum sitanus coniux, & sint tibi mortua mēbra, Nil aliud Bulbis q; satur esse potes. Idem tot alijs locis salaces eos uocans, nec aliā uim, nec aliū usum cognouisse in Bulbis uidet. Inducant idē in antiquis Graecorū Comae dijs sales & dicteria in Theatris iactata: quale illud est, *βολέων χύτραν καταφάγει*, qd est, Bulborū pleno fictili satur: contra salacioris dictū. Et contra Veneris impotentes *ὀνδλινὸν ὀνήου βολέον* *μὴ ἀλυσί τ' ἔχει*, id est, nihil pderit Bulbus, nisi farinā habueris. Sesami enim farina, caseo, melle, & aceto ad cibum condebantur Bulbi. Perse enim amari, nec in cibis grati sunt. Numerauitq; Tarentinus Heraclides Bulbum hunc inter ea quae seminis abundantia faciunt: hic inflare dixit, quae ad Venerem non minor q; illa occasio est. Priuatim, ut a principio diximus, totū hoc genus Bulbos antiquitas uocauit. Alioquin commune omnibus his Bulborum nomen est, quorum radices sub terra sic crescunt, ut ad nouam quotannis sobolem decerpi aliqua pars possit: ut in lilio, croco, & plerisq; alijs sit. Non sic tamen certa est nominis huius ratio, ut ad alia genera aliquando etiam non trahatur: a quibus licet non auellatur noua illa soboles sub terra, tamen augentur. Sed illa est totius bulbacei generis propria nota.

De Scilla.

CAP. CXC.

Scilla uim acrem atq; feruentem habet. Assatam multo utiliorem esse constat. Polline, aut luto oblita, in clybanum conijcitur, aut carbobonibus obruitur, donec obducēs farina sufficienter inrosta fuerit. Quae exempta, si non emollescat, altera farina, aut luto circumlinitur, & eadem quae prius fiunt. Nam quae ita non assatur, interaneis maxime noxia est. Torretur item in olla, indito operculo, quae in furnum demittatur. Sumi etiam solet medium, direptis uiuotenus tunicis: quod frustra tim confectum coquitur, mutata saepius aqua, donec ipsa nec amaritudinem, aut acrimoniam habeat: traiectaq; lino frustra siccantur in umbra, ita ut ne ulla quidem parte se contingant. His Scillae segminibus ad oleum, uinum, aut acetum scillinum utimur. Ad rimas pedum, interna pars crudae Scillae in oleo feruefacta, aut cum resina liquefacta, imponitur. Decocta in aceto, demorsis a uipera, cataplasma est. Ad singulas assae parteis, adiectis octonis tosti salis, cochlear unum, aut alterū damus ieiunis, ad emolliendam aluum. In potu autem & odoratis medicaminibus, quibus urinā ciere uolumus, hydropicisq; & stomachicis, quibus innatat cibus, Regio morbo, torminibus, in tussi uetere, suspiriosis & cruenta extussientibus, tres obolos in delinctu ex melle sumpsisse satis est. Coqui

D I O S C O R I D I S

Cur cum melle, & estur eorūdem gratia, maxime ut cōcoctionē adiuuet. Strigmenta per aluū extrahit. Cocta, & simili sumpta modo, eosdem præbet effectus. Sed cauendus Scillæ usus, his qui intestinum sentiunt ulcus. Ad peniles verrucas, & perniones, tosta efficaciter illinitur. Tritum semen, & in carica, aut melle deuoratum, aluum emollit, Scilla in limine ianuæ suspensa, mali medicamenti noxam arcet.

Pli. li. 19. ca. 5.
lib. 20. ca. 9.
Theophr. lib. 7. cap. 11.

B A R B A R I C O R O L L.

Scilla, siue ut Varro appellat, Squilla, Hippocrates uero etiam Scella, & terra & mari alitur. Radix sit Bulbus, an Cyma, siue fructus, a Theophrasto dubitatur. quoniam sunt qui radicem in ea geminā demonstrant. Vt cūq; tenera esu est, non omnis, sed eius quæ ab usu Epimenidia Scilla dicitur, angustiore folio, ac leuiore q̄ reliqua eius genera, quibus omnino lata ea sunt. Germinant celerius quædam intra Scillam confita. Nam & fructus condens, præsertim granata seruat, exempto pediculo prius. Folio caulis, ut in Croco & Narcisso proficit. Florere ter dicitur, singulis floribus singulas semences, quæ ternæ, denunciat. Cum senuerit, folia demū emicant. Scillarū in medicina species duæ, Alba quæ masculus, Nigra, quæ femina. Genus unum Scillæ, aut Bulbum eius omnē Hippocrates Schoenon uocat, ut Galenus inquit q̄q̄ sunt qui Schinon scribant, non Schoenon in Aristophane poëta.

De Pancratio.

C A P. CXCI.

πανκράτιον

Pancratium, quod aliqui Scillam appellant, radice est magni bulbi, ruffo colore, aut subpurpureo, gustu amaro ac feruente. Folijs lilij, sed longioribus. Scillæ uires & præparatiōem habet. Eodemq; pondere in morbis efficaciter assumitur. Cui tamen mitior q̄ Scillæ facultas inest. Radicis succus, cum Erui farina digeritur in pastillos, qui hydropicis, splenicisq; cum hydromelite, commodissime dantur.

D

B A R B A R I C O R O L L.

Pancration, quam & Scillam pusillam uocamus, folijs Lilij albi crassioribus aspicitur.

E X M. V E R G. C O M M.

Eandem penitus, non similem Scyllæ Pancration hoc nostra ætate Herbarij ostendunt, confunduntq; simul, alioquin diuersa genera: tanta nataliū similitudo & mixtura est. Nos utramq; simul uisam, præterq; colore, & id quidē non satis manifeste, diuersam secernere nequimus.

De Cappari.

C A P. CXCI.

καππάριον

Capparin aliqui Cynosbaton, alij Capriam, alij Corui malū, alij Ophioscorodon, alij Phyllostaphylon, quidam Thalliam, aut Petræam, alij Olophyton, alij Ionitem, nonnulli Oligochloron, aut Acontion, aut Hippomanes, alij Trichomanes, Magi Potera, alij Pentheron, aut Cor lupi, alij Alochorodon, Romani Inturim, Aphri Harbiezathon. Capparis aculeatus frutex est, qui in terra stratus, magis in orbem euagat. Spinæ ut rubus habet, in hami modū aduncas. Folia mali Cotoz nei rotunda, fructū oleæ similē: qui cū dehiscens pandit, florem candidū promittit: quo excusso, nō nihil glandis oblongæ figura inuenit: quod apertum, grana acinis puniceorū similia ostendit. Radices lignosas spargit, grædes, numerosasq;. Tenui solo, asperisq; locis, in insulis iuxta domicilia nascitur. Caulis, & fructus cibi gratia condiunt. Aluū turbat. Stomacho aduersatur. Sitim gignit. Cocta tamen, stomacho q̄ cruda utilior est. Fructus drachmis duabus in uino potus, quadraginta dieb. lienē absūmit.

A Et urinam, cruentumque excrementum emittit. Bibitur utilissime in coxarum doloribus, & neruorum resolutione, item ruptis & conuulsis. Menstrues ciet. Caput purgat. Dentium dolorem sedat, semen ex aceto decoctum, colluto inde ore. Aridus radicis cortex ad eadem proficit. Vlcera omnia uetera, & sordida, & quae occalluerunt, expurgat. Lienosis cum farina hordei illinitur. Dente demorsa dolori eius auxiliatur. Cum aceto trita, uitinges albas absterget. Radix, foliaque intrita strumas, ac duricias discutit. Aurium uermiculos infusus succus enecat. Aphrica, & Marmarica Capparis, uehementer inflant. Apula uomitus facit. Libyca, & quae Rubro mari defertur, mirum in modum acris est. Siquidem in ore pustulas excitat, gingiuaque offensus exest: quare in cibis non ab re damnatur.

BARBARI COROLL.

C Apparin, siue ut Palladius Cappar, alij diligentia marcescere affirmant, alij negant. Frutex est firmioris ligni, seminisque & cibi uulgaris, cauleque una plerumque decerpto, aculeatos rose modo ramos habet, folio quoque horridulo ac spinoso, radice una, caule humili. Germen & flos aestate roseus, odoratusque, folium ad uergilias usque uiget, fabulosis macrisque gaudet. Quatuor ei genera. Arabicum, quod & pestilens est, ut Plinius, & Galenus ait. Africum, Marmaricum, Apulum, omnia quondam infesta, nunc mitia undecumque illata. Quidam eum Phyllostaphylon, Ophiocephylon uocant. Innocentius Italicum cibum. Capparisi nisi area defossa, hoc est, circulari scrobe coarceatur, & ripis, undique circumstructis lapide, late serpit, euagaturque per agros, & cogit solum sterile scire.

Pli. li. 13. ca.

EX M. VERG. COMM.

Vlgaris, quotidianique usus cum suo fructu herba Capparisi est: & quod communior cunctis ubique gentibus, & ubique nascens, eo plures appellationes inuenit, singulis eam suo nomine indicantibus. Quo fit, ut exceptis paucis, nullum habeant reliquae intellectum. Cynosbatus tamen, id est, caninus rubus, ob hamatos quos habet tubo illi similes aculeos, dicta Capparisi est. Quemadmodum Phyllostaphylon, quod inter folia fructum quasi uuam fert; & si hic paulopost Oliuae comparauerit. Sic Petraea a natalibus suis, quos inter lapides & rudera inuenit. Cur autem Sinapi persicum a Romanis hic Capparim uocari dixerit, incertum nobis est: quemadmodum contra notum omnibus, Capparim a cunctis rei rusticae scriptoribus appellari. Vsum eius ante alios cibos in sanitate commendauit Paulus Aegineta: iussitque sumi ex aceto mulso, aut ex aceto & oleo. Monuit praeterea, excitare Capparim cibi appetentiam: iecur, lienemque laxare: & pituitam per aluum deijcere; idque est quod hic ait, aluum turbare.

B

De Lepidio. CAP. CXCI.

Lepidium aliqui Gingidium uocant. Herbula uulgo nota. Muria cum lacte seruatur. Vis foliorum acris, et exulcerans. Quapropter ischiadicis illita, praesentissimum est auxilium, si cum helenij radice quarta parte hore illinatur. Lienosis simili modo prodest. Lepras eximit. Raddix appensa collo, dolore dentium liberare existimatur.

Aemidius

BARBARI COROLL.

Lepidium, Aegineta Paulus Hiberida, siue Hiberiada iam uocari ceptum scribit, a Galeni (ut arbitror) temporibus. Lepidium ab eo, quod lepidas & maculas in facie deijciat ac repurget: quas Columella Fucas uocauit, appellatum Graeci putant. Idem autor Columella, duo genera Lepidij esse intelligit, syluestre, & satiuum: ut syluestre quidam accipiant pro Hiberide, satiuum pro Lepidio. Peregrinum inquit Plinius fuit & Lepidium, feritur a fauonio. Dein cum frutificauerit, iuxta terram praeciditur. Tunc runcatur stercoraturque. Per biennium haec, postea ipsa fruticibus utuntur, si non saeuitia hyemis impediatur: quando impatientissimum est algoris. Exit & in cubitalem altitudinem folijs: non ut Hiberis nascuntur, sed laurinis, utique per initia, uerum molibus. Post Gladioli retusi fere speciem accipiunt, usqueque eius propter acrimoniam non sine la-

Pli. li. 19. ca. 82.
lib. 20. cap. 17.**B**

D I O S C O R I D I S

Cste. Herbarij modo hanc, non Lepidium, sed Raphanum appellant, in Pannonia frequentem: ubi ferunt eam non aliter q̃ radicis scobe. Paulus Lepidium inquit, quod apud nos habetur, folio Lauri, sed maiore multo nascitur: quod ei tamen æstate nullum est.

¶ De Ranunculo. CAP. CXCIII.

βατράχιον

RAnunculum, aliqui sylvestre Apium uocant. Complura eius genera. Vis tam omnibus una, acris, & uehementer exulcerans. Nam unum Coriandri folijs cōstat, latioribus, subalbidis, pinguibus, flore luteo, interdum purpureo, caule gracili, cubitum alto, radice alba, exigua, amaracq̃, multis capillamentis hellebori modo fibrata. Nascitur in liminibus humidis. Alterum lanuginosius, longiori caule, pluribus foliorum incisuris, plerumq̃ in Sardinia proueniens, q̃ acerrimum: quod sylvestre Apium appellāt. Tertium minimum, odore graui, flore aureo. Quartum huic simile, flore lacteo. Folia, flores & cauliculi recentes, illiue exulcerant, & crustas nō sine dolore gignunt. Quare ungues scabros ex-
trahant. Scabiem eximūt. Stigmata delēt. Formicantibus uerrucis, & pen-
silibus, alopecijsq̃ paulisper illinuntur. Tepente decocto perniones fo-
uentur. Sicca radix, tritaq̃, sternutamenta ciēt, naribus admota. Dentium
dolorem appensa leuat, ipsos tamen frangit.

Pli. li. 27. ca. 12.

BATRACHION, siue Ranunculus, siue Strumea: quoniam medetur strumis, nam Strumus So-
lani genus est. Dicitur & Apiastrum Ranunculus, hoc est, Apium sylvestre, uenenatū in Sardi-
nia, manifesto Nigidij doctissimi uiri errato: qui Apiastrum pro Mellisophyllo appellat: quā-
q̃ hunc & Varro sequitur et Dioscorides, Opacis gaudet. Primum genus, cui et color liuidus,
ad latitudinem Maluæ accedentibus folijs. Secundo generi, caules ut Plinius inquit alti, ut Dio-
scorides, minores q̃ priori: nisi librariorum culpa fuerit, μικροκαυλότερον pro μακροκαυλότερον scri-
bentium. Genus ab his diuersum in totum uidetur, Batrachion, cognomine Polyanthemus,
caustica ui exulcerans cicatrices, & ad colorem eas reducens, & utilitigines concorporans, neq̃
aliter indicatur a Plinio quale sit: nisi quis & hoc in unam quatuor specierum contribuat, ac re-
ponat: illam uidelicet, quam plurimis foliorum diuisuris & Plinius & Dioscorides deliniant,
uulgo dictam Pes Coruinus, alteram omnino q̃ Coronopus, de qua superius habita mentio
est. De uenenato Salustius, In Sardinia inquit quædā herba nascitur, quæ Sardoia dicitur, Api-
astri similis. Hæc ora hominum & rictus dolore contrahit, & quasi ridentes interimit. In ea in-
sula, ut Pausaniæ ac Solino placet, locis riguis prouenit iusto largior: nec tamen aquas inficit.
Strabo ex hac ipsa herba Hispanos toxici genus conficere ait: quod urgente ui maiore haustū,
citra dolorem humanis rebus exigat. A qua σαρδάνιον uulgo γλωσσε, quod & Dioscorides in ue-
nenis meminit. Homerus Sardanion risum uocauit illo uersu,
μείδων δὲ θυμὸν σαρδάνιον μάλα τοῖον.

Vide Erasmi
Chiliadas.

Meminit & Plato in Repub. Timæus aliā originem prouerbio huic reddidit, aliam Clitarchus,
aliam Sophocles & Simonides poetæ: nos id in annotationes Pliniananas distulimus.

¶ De Fremio. CAP. CXCV.

ἀνέμων

FREMIO, græci Anemonem, alij Agriam, aut Ni-
gram uocant, alij Anemonem phœnicam, alij Euemion, non
nulli Meconion, alij Tragoceros, alij terræ Parinem, aut Barbylam.
Ostanes Berilion, item Ornios Cheranion, Pythagoras Attractilida,
Magi Cnicum agriam, Romani Orci tunicam. Duo Fremij genera. V-
num sylvestre. Alterū in cultis nascens, Cuius multæ species. Vna phœ-

niceum florem profert. Altera candidam, aut lacteum, aut purpureum. **A** Harum folia Coriano similia, tenuioribus prope terram diuisuris: caules lanuginosos, tenues, in quibus flores ut Papaueris, & in medio capitula nigra, aut cærulea. Radix oleæ magnitudine, aut amplius paulo grandescit, fermeq; geniculis quibusdam cingitur. Syluestri amplitudo maior, latiorq; folia, & duriora. Oblongius caput, flore puniceo, multis radicibus capillamentis. Acrior est quæ nigra habet folia. Vis omnium acris. Ea de causa succus naribus infusus, purgat caput. Commanducata radix, pituitam trahit. Decocta in passo, & illita, medetur oculorum inflammationibus. Cicatrices eorumdem, & hebetudines emendat. Sordida ulcera abstergit. Folia & caules, si cum pituita decocti edantur, copiam lactis præbent. Menstrua ciunt, uellere appositi. Illiti quoq; lepras eximunt. Sunt qui errore ducti, Argemonem nominari Eupatorium putent. Quoniam a syluestri Fremio, Argemonem, & Papauer, quod Rhœam appellant, de quo inter Papaueris genera referemus, propter colorum cognitionem in floribus, distinguere non possunt. Verum Papaueris & Argemonæ color, minus puniceus spectatur, & utraq; tardius floret. Quinetiam Argemonæ croceum succum, gustu admodum acrem reddit, Rhœas uero candidiores & acrem. Insuper Fremio & Rhœadi capitula syluestris Papaueris similia insunt, sed in Fremio supne crassiusculū, in Rhœa de angustius, Fremij genera nec succum remittunt, nec caput habent, sed quasi Asparagi cacumen. In aruis illa sæpius nascuntur.

BARBARI COROLL.

A Nemonem quidam Fremium uocari putant, sed scribendum est Phenion, auctore Plinio. Edit florem suum haud multo post germen. Erumpit autumnino post Aphacen a primis imbribus. Inter aculeatas, sed mitioris generis Anemonem collocant. Quatuor sunt nominis huius fastigia. Duo coronis dicata, hoc est, syluestris bulbi florem uocatum Anemonem: et aliam Anemonem, quæ Timonia, siue Limonia potius cognominatur, post Heliochryson florentem, & cum Viola nigra uere. Duo medicinis, syluestrem, & satiuam, de quibus præsens mentio copiosissima omnium est, phœniceum florem habens, inter satiuas. Satiuis omnibus folia Apio similia, nec fere semipedalem excedunt altitudinem, cacumine Asparagi. Flos nunq; se aperit, nisi uento spirante, ob id Anemone dicta. De Othonna syria herba, quam quidam Anemonem existimauere, dicemus in loco. Nicander Anemonem, Anemonida solet appellare, eamq; ex Adonidis cruore natam prodit. Sosibius Anemonas a Spartanis Phœnidas uocari tradidit. Horus Anemonæ flores inquit in Aegypto pingi, quod tres morbos hominum intelligi uoluit.

EX M. VERG. COMM.

V Agum, cōmuneq; plantis aliquot, & si congeneres omnino non sint, earumq; floribus fuisse quondam Anemonas, nomen, testes, & indicio sunt Theophrastus, Plinius, hic ipse, & Bucolicorum insignis poeta Theocritus: modo eius legitimum poema sit, quod passim legitur Adonidis Epitaphium carmen. Nominisq; inconstantiam, & cōmunionem hanc, papauera ceteri præcipue, in cunctis his, floris figura fecisse nobis uidetur. Neq; enim satis constat, tam multum diuersis temporibus prodeuntes flores, Anemonæ omnes dicti quondam fuerint: q̃ non nisi spirante uento dehiscerent, & in folia se explicarent: quod manifeste patitur, quæ priuatim primoq; Anemone dicta ab antiquioribus græcis est: quam uim naturamq; eius ex re factum illi nomen indicat, & Plinius lib. 11. cap. 27. his uerbis testatur. Flos nunq; se aperit, nisi uento spirante: unde & nomen accepit. Potuit quidem in proferendis floribus eadem omnium infirmitas esse: uerum tamen quod obseruasse uolentibus difficile non erit, cur Anemone omnes dicerentur, cōmunis omnibus tota floris figura maxime fecit: pauciora tria, scilicet & ad summam, quæ in

Pli. li. 21. ca. 11
& 23.

B ij

D I O S C O R I D I S

C floribus folia, grandia, eadem, infirma, & quavis iniuria decidua: quodq; non minus obseruandum fuerit in cunctarum medijs floribus, inter folia surgens apex, cacumen, capirulumue, aut papaueraceum uasculum: quæ notæ papaueracei floris omnes sunt. De coloribus nō agimus: quoniā nullibi magis lussile uidetur natura, & in Anemonis his tam uarij & inconstantes sunt, ut nihil quod certum & exactum sit doceri possit. Tamq; late quondam paruit Anemonarum nomē, ut quod posteriores rubrum Papauer dicunt, in triticea & hordeacea segete, Maio men se puniceo colore florens, de quo nunc agitur, Anemonem ueteres etiam dixerint: & si contra credi possit multa indicio sint.

De Argemone. CAP. CXVI.

ἀργεμόνη
δινώνη ἀνθεμίσ
δμόνοια
ἐνθέρ πιδύιον

ARGEMONEA Græcis Oenone uocatur, ab alijs Anthemis, alijs Homonœa, aliquibus Flos campestris, Romanis Concordialis, aut Pergalia. Alijs Lyburnia, Gallis Corona. Syluestri Papaueri similis est. Folia habet Fremij, ditiusa, florem puniceū, caput in cauliculo. Papaueris rhœadidis, oblongius, & summis partibus latum, radicem rotundā. Succum Croci colore acrem dimittit. Argema & nubeculas expurgat. Folia illitu inflammationes compefcunt. Ea, ut harbarius Crateias autor est, contusa cum axungia, strumas discutit. Cribrata eius farina cum nitro & sulphure ignem non experto, contra uiliginēs efficax est. Easq; sicco linteo antea confectas in baln eis sanat. Facit & ad scabiem.

BARBARI COROLL.

Pli. lib. 27. ca. 9

Argemonem, & Argemida puto dictam a Dioscoride, ubi de Anemone loquitur. Folia habet Anemonēs æqualia, et Apij modo secta. Nascitur in aruis apud nos, ut Plinio placet. Genera eius tria faciens, ut id demum probetur, quod radice Tus redoleat. Diuersum uidetur genus esse quod apud Plinium Argemon uocatur. Argemonēs radicem Eupatorium a recentiora, ut aliud tamen intelligatur genus esse quod Eupatorium proprie uocari solet.

EX M. VERG. COMM.

Fvit, & adhuc est magnæ litis cum Eupatorio Argemone, duo simul diuersa genera miscenribus cunctis. Nec satis adhuc constar, nominis ne, an rei controuersia hæc sit. Si quam nostræ ætatis in Ethuria medici Argemonem circūferunt contempletur aliquis, nihil cum uera Eupatorio, descriptaq; hoc loco Argemone cōmune uidebitur habere, si quam iuniores scriptores tradiderunt, & nos in antiquissimis eorum cōmentarijs pictam uidimus Eupatorium, mutato nomine Argemonem appellasse, merito credentur. Eupatorii enī a Dioscoride traditas in quarto uolumine notas omnes, in historia & pictura illi assignant. Nec est qd demiretur aliquis, nos picturarum fide ad hanc rem utentes. Calami enim, & penicilli eadem pene ratio & usus est: nec alter altero minus, incertiusue nostri animi sensus alijs ostendit. Verisimileq; est, relictas ab illis medicæ materiæ picturas, ex his quæ tunc in communi æstimatione erant, relictas fuisse. Quod totum non sine causa a nobis dicitur. Vidimus enim, & nunc in manibus habemus sexcentorum annorum latinum Dioscoridem, regium, ut tunc tempora erant, opus, in quo diligentissima pictura omnes Eupatorii notæ Argemonæ huic adiectæ fuerunt: quæ ex historia huius scriptoris tribuendæ Argemonæ non erant, quam agrestis Papaueri similem dicit, folio Anemonēs incisuris diuiso, flore in caule puniceo, & in flore erratici Papaueris capitulo: quorum nihil in Eupatorio uidetur. Miscuit hæc, & ignorari fecit similitudo: quodq; hic superi ore capite in Anemone ait, nescientes, syluestrem Anemonem ab Argemone hac, ob similitudinem discernere imperiti herbarij, syluestrem Anemonem, et Argemonem hanc unam eandemq; crediderunt, & esse tradiderunt: & né ociosum in incognita re uacaret Argemonēs nomē, adpellauerunt. De Eupatorio copiosius suo loco agetur. In Argemone hac autem satis illud nouisse sit, sui generis esse herbam, syluestri Anemonæ adeo similem, ut discerni nequeat: appellatamq; a ueteribus Argemonem, qd oculorum & lucis uitio, quod græci argema uocant, illita

medeatur. Plinius plures, maioresq; hic & alias illi vires assignat. Videturq; in ampliore, & honestiore medicina & remediorum censu eam constituisse: quo fit ut suspicemur, potuisse eū scriptorem Argemones nomine etiam pro Eupatorio uti. Non tamen hoc constituimus. In Eupatorio enim certius tota hæc agetur res.

A De altera Argemone. CAP. CXCVII.

Alter est Argemone, quam Artemonen aliqui, alij Arselā, aut Sarcocollam uocant, Romani Argemoniam. Ea folijs syluestri Papaueri similis est. Recens trita, intercisiones imposito sanat. Oculorū inflammationes mitigat. Pota cum aqua, dysentericis auxiliatur. Vulnēra conglutinat. Conuulsis, & uellicatibus, imposita medetur. Inflammationibus utilis. Contra serpentium morsus cum uino bibitur.

Serpentibus & uenenis Argemonem aduersari nouimus, & ob id fortasse nomen habet. cū sit Arges Hippocrati nomen anguis, ut Galeno placet.

BARBARICOROLL.

Tria Argemones genera Plinius sua ætate cognosci, & numerari a Romanis tradidit: barbari tamen unum tantum, & id, cuius radix Tus olet. Antiquiores græci, Galenus. f. & Paulus Aegineta, unam tñ Argemonem nouerunt. Hic primam & alterā descripsit, & medicinæ utilitatem tradidit. Dicimus aut in hoc duo eius gñā legi, ut in impressis, & q circumferunt græcis codicibus inueniunt. Nā in uetustissimis nullū est alterius Argemones hoc caput: nec quē nos habemus uetustissimū latinū Dioscoridem, alteram hanc Argemonem ostēdit. Obseruauimusq; nos in multis, parēs uetustate græcū & latinū Dioscoridē, quē tam sæpe citamus, fide parēs etiā esse, nihilq; aut in altero inueniri, aut deesse, qd non in altero pariter inueniat & desit. Quā legi timū itaq; scriptoris huius caput hoc sit, uiderint pitiores. Nobis inclināt animus, ut credamus adulterinū, supposititiumq; esse. Vtimurq; ad hāc suspicionē, nō tam quas pauloatē diximus rōnibus, q; q plerq; sunt in eo alienę huic scriptori elocutionis indicia. Dubitamus preterea, de esse huic Capiti aliquid, quo loco. f. sanare præcisiones Argemone hæc legitur. Desyderatur enim cuius partis præcisiones. Nobis inclināt animus, neruorum intelligi oportere: quoniam hic, & alij græcorū medici *διακοπή*, quæ uox huic scriptori eo loco est, in neruis priuatim plerumq; appellat. Plinius præfectiones eas dixit undecimo uolumine, capite. 37. Eius uerba sunt, Mirumq; uulneratis neruis summus dolor, præfectis nullus.

A De Anagallide. CAP. CXCVIII.

Anagallis purpurea, quibusdam Aëritis, aut Aegitis uocatur, alijs Sauritis, a Magis Oculi sanguis, aut Chelidonium, Romanis Macia, Ethruscis Masytipos, Gallis Sapanā, Dacis Cerceraphron. Anagallis communis, a quibusdam Corchoron, alijs Halicacabō, alijs Zeliaurus, Magis Nycteritis, Aegyptijs Mecij, Romanis Aneciaron, Aphris Asirrisce. Duo eius genera, quæ tantum flore distant. Nam quæ cæruleo flore est, fœmina dicitur: Mas, quæ phcenico. Frutices sunt parui, in terra iacentes. Folijs in quadrāgulo caule pusillis, subrotundis, ad Helxinæ folia accedentibus. Semine rotūdo. Vtraq; mitigandi uim habet. Inflammationem arcer. Adactos corpori aculeos extrahit. Nomas cohibet. Succus caput gargarizatu purgat. Et naribus infusus, dolorem dentium lenit, si in aduersam narem iniiciatur. Argema cum melle attico emendat. Retusæ oculorum aciei auxiliatur. Contra uiperarū morsus, iocineris et renum uitia, ex uino bibere prodest. Tradunt eam quæ cæruleum adit florem, prociduam sedem reprimere. Quæ uero

B iiij

σαρκόλλα
αρτεμώνη

B

ἀναγallis
αἰρίτις αἰγίτις
σαυρίτις

D I O S C O R I D I S

C phoeniceum, illitu euocare.

Pl. li. 26. ca. 7.

B A R B A R I C O R O L L.

Frutice tenero Anagallides, non altiōres Palmo nascuntur in hortis & aquosis. Prior flore cerulea. Mirum q̄ feminam pecora uirant: aut si decepta similitudine (flore enim tātum distāt) degustāre, statim eam quoq̄ (asyla, siue, ut alijs codices scripsere, casyla uocatur, a nostris ferus oculus) in remedio quarunt. Præcipitur effossuris, ante solis ortum, priusq̄ quicq̄ aliud loquantur ter salutare eam, tum sublatam exprimere, ita præcipuas esse uires. Anagallin Dioscorides Sauritin quoq̄ dici perhibet. Sunt exemplaria in quibus Sauritis, non Sauritis legitur. Hippocrates Anagallin dicendo, utilem mordendis & assiccandis ulceribus Anagallidem uidetur intellexisse. Actius Nycterida herbam ad oculorum albugines comprobat, pro Anagallide ut puto accipiendam reliquit, quandoquidem et Nycteritis a Dioscoride uocatur. Errant qui Passerinam uulgo dictam, florem candidum ferentē, Anagallida existimant. Quem admodum & qui Myosotin, idest, muris Auriculam pro Anagallide compictam præferunt. Anagallidem phoeniciam, a colore Paulus Aegineta Corallium quoq̄ dici meminit. De quo & compositioni datum nomen, quod Diacorallin, Quanq̄ & pastillus est hoc cognomine, sed in eum lapis Corallius, non hæc herba sumitur.

E X M. V E R G. C O M M.

Non demirabitur aliquis, in humili & neglecta nunc ab omnibus herba, tam multas appellationes. Plurimum enim sit, ut ubi maior fortunæ & uirtutis gloria splendet, illic etiam numerosus nominum ambitus audiatur. Plinius ex tam multis quæ nunc in scriptore hoc numerantur, unum tantum retulit, Anagallida dicens aliquos Corchoron uocare: quæ uox antiquissimis græcis ad maledictum translata est, contra eos, qui in humili & indigna fortuna, maiores ea honores sibi quærent. Frequensq̄ in græcis dictum est, κόρχος ἢ λαχνοῖς, quod est, Corchorus inter olera. Quoniam hæc necessarium, gratum, & utilem usum habent: ille uero miscet se quidem in horto oleribus, sed ob humilitatem suā sine gratia, aut maioris utilitatis spe. Theophrastus tamen libro. 8. de plantarum historia, in prouerbum & maledictum transisse ob amritudinem testatus est. Verba eius sunt. καὶ ἴτερα δὲ πλείω τούτων ἢ οὗ καὶ παροιμιαζόμενοι καὶ διὰ πικρότητα κόρχος. το φῦλλον ἔχων ἀκινῶδης. &c. Quod est. Et præter hæc plura alia, inter quæ & Corchorus est, ob amaritudinem in prouerbum translatus, folio Ocimi figura. Quod si hæc ratione intelligendum id erit prouerbum, contra eos dicetur, qui paratam homini uoluptatem, & suauiores rei alicuius usum, tristi & amaro aliquo turbabunt. Fuerunt deinde, qui colore floris Anagallidi adijcentes, Puniceam, & qui Aeritum, idest, æriam a cerulco colore nominarent, genera eius potius distinguentes q̄ nouis appellationibus indicantes. Quemadmodum & Augitum a fulgore coloris & luce aeris, quam græci ἀγὴν uocant, alijs pariter indicauerunt. Alacertis deinde notissimo insecto, quas græci σαῖρας dicunt, Sauritis appellata Anagallis fuisse credi potest: quoniam succo eius uiperarum moribus antiquitas mederetur, quæ lacertis quadamtenus similes sunt: uel quod frequens hoc insectum in aruis in ham appellans, contra uenenata utilem. Quam ob causam, mutata tātum nominis forma, hic Sauritum ab aliquibus appellari dixit. Non tamen ex Nicandro colligi, & pro comperto haberi potest, σαῖρην ne ille Anagallidem, an aliam in olerum genere herbam sic uocet. Nosq̄ ad hanc rem coniectura magis q̄ ratione, aut aliorum autoritate usi sumus. Fecit præterea similitudo, ut Hirundinaria, & Alicacabus, alterius generis herbæ, sola appellatione in Anagallidum censum & nomenclaturam uenerint. Et hæc pro tam multis Anagallidum nominibus dicta satis sint. Cætera enim incognita nobis, alijs docenda relinquuntur. Restituimus huic capiti etiam quod in eo perierat, mederi scilicet Anagallides præterquam iocinorosis, cutem subeuntibus aquis. Id enim in exscribendo relictum a librarijs fuerat, nec nisi in antiquissimis græcis & latinis seruabatur.

De Hedera. C A P. C X C I X.

κισσός

Hedera aliquibus Citharon, alijs Cissaron, alijs Chrysocarpus, alijs Poetica, alijs Corymbethra, alijs Cyssion, alijs Dionysia, alijs Ithytherion, alijs Perlis, alijs Cemos, alijs Asplenos, Romanis Syl-

ua mater, alijs Hedera, Gallis Suibites. Hedera differentias multas in specie sortitur, generalissimas autem treis. Nam quædam candida est. Altera nigra. Tertia Helix. Candida fructum fert candidum. Nigra nigrum, aut Croci æmulum, quam uulgus Dionysiam uocat. Helix fructum non gignit, sed tenues habet palmites, & folia parua, angulosa, & rubra. Hedera omnis acris est, & adstringens. Nervos tenet. Flos trium digitorum carptu, facit ad dysentericos, in uino bis die potus. Ambustis cum cærato illinitur. Recentia folia ex aceto cocta, aut cruda cum pane detrita, lienes sanant. Foliorum & corymborum succus, cum irino unguento, mellē aut nitro, naribus infunditur. Et contra ueteres capitis dolores, caput eo cum aceto & rosaceo perfundi utile est. Purulentis auribus, aut dolentibus cum oleo medetur. Nigræ Hederae succus, aut e poti corymbi corpus infirmant. Mentemque turbant largius sumpti. Acini quinque triti, calfactique in punico cortice cum rosaceo, si instillentur a contraria aure, dolorem dentium mitigant. Denigrant capillum illiti corymbi. Folia in uino decocta illi nuntur omnium ulcerum generi, etiam si cacœthe sint. Vitia cutis in facie, & ambusta sanant, uti antea diximus decocta. Mouent menses triti, & subditi corymbi. Iidem poti post purgationes fœminarum, drachmæ pondere, concipiendi spem adimunt. Pediculus foliorum mellē irrigatus, ac uulua inditus, menstrua & partus extrahit. Instillatus succus, putrida tædia narium, graueolentiamque emendat, & sanitati restituit. Lachryma Hederae Psilothrum est. Illitu pediculos enecat. Succus in aceto potus, contra phalangia prodest.

B A R B A R I C O R O L L.

Hedera frutes qdem uendicāt, sed arborū magnitudinē crescendo æquat. folia primo angulosa, processu rotundant. Multa ei gēna. Humi repit Chamæcissos: de qua in loco. Celsarum tria capita. Candidū. Nigrum. Et Helix, id est, Clauicula, siue Pampinus uocata. Candidū aliud fructu solo, aliud fructu & folio. Id qd fructu solo cander, aut crassiusculū, densum, globatumque habet eum, & Corymbias uocat. Athenis uero Acharnicon irriguū, aut minorem acinum, sparsioemque Racemū, & Silenition appellant. Simili modo in nigra, cui & suæ quædam differentia sunt, sed minus perspicua. Alicui em semen nigrū. Alij crocaceum, cuius coronis poctæ utant. folijs minus nigris: quā & Nysiam, & Bacchicā, & Dionysiam uocabāt, maximis inter nigras corymbis. Alij duo genera fecerunt a colore acinorū, Erythronon, & Chrysocarpion. Helix ab Hedera distat apertissimo discrimine. Primū folia huic angulata, concinna, exigua: Hederae simplicia, rotundioraque. Distat & longitudine internodiorū, præcipue tamē sterilitate: quoniam fructum non gignit. Quidā hoc ætatis utiū intelligunt, primoque esse Helicem, & Hedera senectute fieri: qd quidē falsum esse Theophrastus & Plinius contēdunt: cū quia foliū & germen Helicis ab Hedera quilibet annosæ folio plurimū differat: tum quia plures eius differentia nescant. Herbacea, seu uirens, quæ numerosissima est. Altera folio alto. Tertia uersicolore, quæ Thracia uocat. Herbacea duplex genus. In uno tenuiora folia, digestaque per ordinē, longiora densioraque: in altero diuersa oia in minus. In uersicolori quoque alia folio crebriore, tenuiore, ordinato: in altera incondito, nūc maiore, nūc minore, maculosoque. In candido gēne, alia plus, alia minus sunt candida. Crescit in longitudinē potissimū Herbacea. Nunc reuertor ad Hedera. Hedera ubi semētescere occupit, germē sublime, restitūque agit. Radice numerosa, conorta, densa, crassa, lignosa: nec admodū profunda, p̄sertim nigra. Et candidarū quæcūque asper rima imitissimæque est. Hæc & arbores amplexu & fructu stragulat, tanta crassitudine, ut ipsa per

Theophrasti. lib. 6. cap. 2.
Plin. lib. 16. ca. 34.
lib. 24. cap. 10.

Lyrici dixerunt flexipedes
hederas, quid hæc & illæ
inapant. Hederae enim
serpentes uixisse dicuntur
ut apud Virgilium Eclo-
ga quarta uidere est.

B iij

D I O S C O R I D I S

C se arbor fiat. Signa eius, folia maxia & latissima, mamas, hoc est, germina subrigentis, quæ sunt cæteris inflexæ. Racemi stantes atq; recti. Radicosa & robusta. Huic maxime uni brachia. Post ipsam Nigræ: sed propriū Albæ, q̄ inter media folia emittit brachia, qbus arbores cōplectit, & parietibus obrepit. Pluribus hæc locis succisa durat, atq; uiuit, & tondē in ietia radicis habet, q̄ brachia, ob id flexipedē cognomēto apud poetas. In nigra & alba alijs dulcedo Acini: alijs tanta amaritudo, ut aues nō attingat. Est & rigens Hedera, q̄ sine adminiculo stat sola oim generū, ob id uocata Cisso a Theophrasto & Plinio, quasi Columellā in eo uocabulo significent. Sed summa diuisio ipsdē auctoribus, in marē, & fœminā, q̄ altera foliū durius, pinguius, maius habet, & florem ad purpurā accedentē: altera non habeat. Vtriq; tñ flos syluestri rosæ similis, sed minor & inidoneus. Quæ descriptio uidet̄ recetioribus quibusdā non Hedera, sed Cisso cōueniens, cui & sexus & flos punici tribuit̄. Sed Theophrastū sequutus est Plinius li. stirpiū sexto, hæc ipsa non de Cisso, sed de Hedera prodentē. Hedera Theophrasti ætate in Asia nasci nō poterat: nec in India, nisi mōte Mero, unde ortus est Bacchus. Frustra & Harpalū laborasse oimodo tradit̄, ut sereret eam in Medis. Inimica arbor satis oibus, sepulchraq; ac muros rēpens. Serpentū frigori gratissima. Vfos in funes, et armamēta nauū Hedera ueteres, auctor est Athenæus, quā e Rhodano petebāt, ut Canabim, Catonis experimentū, uolenti scire, aqua in uinū addita sit, nec ne: ut uasculū e materia huius faciat, uinū quod erit dilutū, transfluat, aqua manebit, nec em continet uinū inquit uas Hederaceum. Quod poculi genus græci Cissybion, ab Hedera uidelicet appellant, q̄q̄ pro quocūq; ligneo id accipitur. In quo significatu & Cymbiū, & Cypellū quandoq; sit. Alij uetustos calices Cissybion intelligunt, propterea q̄ in Didymei Iouis dedicatione folijs hederaceis libare moris fuisset. Cymbia uero, quæ ansis careant, oblonga & angusta, nauigij spēm præbentia. De Hedera Cilicia, quæ tamē Hedera non est, in Smilace nachea quarto uolumine monstrabit̄. Cisson, hoc est, Hedera pusionē Liberi patris fuisse Græcia confinxit, in nois sui fructū conuersum, dū minister cū eo deo saliens, terræ allisus perijt. Athenienses Citron ipsum Bacchū uocant, & apud se Acharnis uico natā Hedera primo uolunt, ut inquit Pausanias. Syluestre Hedera cerui phalangio percussū mandūit, & liberant̄. Aelianus auctor.

E X M. V E R G. C O M M.

D N Vmerantur a Plinio uiginti Hederarū genera, folijs, corymbis, uiticulis, altitudine, humilitateq; & usu diuersa, oia a Theophrasto diuersis locis accepta. Copiosior q̄ ille generū numerus, quē in ore oim fuisse quondā uerisimile est, occasione ut nos credimus scriptorē hunc exhibentibus attulit, ut a principio statim Hederarū historia rā multis, tamq; diuersis appellationibus, non una noīaretur planta, sed unius plura numerarentur genera.

De Chelidonia.

C A P. CC.

Χηλιδόνιον
παριονία
πρατάνη

C Helidoniā magnam, nonnulli Paoniam uocāt, alijs Cratæam, alijs Aubion, alijs Glauciā, quidam Philomedion, alijs Othonon, Romani Fabium, Galli Thonan, Aegyptij Nothoth, Daci Crustana. Chelidonia maior, caule est cubitali, aut altiore, surculoso. Folijs Ranunculi, multis, mollioribus tamē, & colore cæsijs, flore uiolæ albæ, secundū singula folia prodeunte. In ea succus croci, mordax, acris, & aliquātulum subamarus, grauiter olens. Radix superne singularis in multa crocea capillamenta fibratur. Siliqua ceu corniculati Papaueris, tenuis, longa, in qua semen Papauere maius recluditur. Succus in æreo uase, cū melle prunis decoctus, oculis claritatem adfert. Folijs, caule, radice, succus exprimitur ineunte æstate, & siccatus in umbra digeritur in pastillos Radix cum aniso, & uino albo pota, medetur regio morbo, & ulceribus quæ serpunt. Imposita cum uino, aut manducata, dentium dolorem sedat. Hoc nomen sibi uidetur uendicasse, q̄ aduentu hirundinum exoriatur, & discessu emarcescat. Sunt qui narrant hirundines matres excæcatis pullis adferentes hærbam uisum restituere.

EX M. VERG. COMM.

Chelidonium, siue Chelidonia, siue Chelidonea, hoc est, Harundinaria maior, fruticoso caule, folio Pastinacæ erraticæ ampliore, ipsa altitudine duum cubitorum, flore luteo. Collyria quoq; quibus ex hac utuntur, Chelidonia appellantur.

EX M. VERG. COMM.

Fecit Hirundo, quā Græci Chelidona uocāt, notissima auis, notissima omnibus etiam nūc herbæ nomen. Vtq; id pro cōperto est, sic contra non satis certū, quid sibi & aui tam cōmune sit: quidue inuicem agentes, patientesue cōmunicato nomine inter homines censeantur.

De Chelidonia minore. CAP. CCI.

Chelidonia minor, quam Tyripon syluestre aliqui nuncuparūt, hærubula est stolonibus constans, sine caule, folijs Hederæ, multo rotundioribus, & minoribus, teneris, & subpinguibus. Radices habet complures pusillas, in granorū tritici modum acruatim congestas. Quarum tres aut quatuor in longitudinem exeunt. Iuxta aquas nascitur. Vis ei acris & Fremij modo summā cutem exulcerat. Psoras, & scabros ungues eximit. Succus radicibus expressus, ad purgandum caput, naribus infunditur. Decoctū eius cum melle gargarizatum ualide caput inanit: & omnia pectoris uitia extrahit.

B A R B A R I C O R O L L.

Chelidonia minor, folia Hederæ habet, minus candida.

EX M. VERG. COMM.

Emendauimus ex antiquissimorū græcorum latinorumq; codicum fide, in minore Hirundinaria quod male in impressis uulgatioribusq; πύρινον legebatur; diximusq; agreste triticum, id est, πύρινον uocari minorem hanc Hirundinariam. Nec tantū antiquitatis fide & testimonio id fecimus, q; ex historia scriptoris huius, qui habere eam ait inter cetera, radices tritici modo coæruatas. Satisq; pro ea dicta hæc sint.

De Othonna. CAP. CCII.

Othonnā aliqui maioris Chelidoniæ succum esse aiunt. Alij succum floribus corniculati Papaueris expressum. Alij permistos cæruleæ Anagallidis, Hyoscyamī, & Papaueris succos esse contendūt. Alij Troglodyticæ hærbe succū, quæ Othonna uocatur: nasciq; eam in eo Arabiæ tractu, qui ad Aegyptū spectat. Othonna similis Erucae, perforatis crebro folijs, & ueluti a tineæ derosis, squallore oblitis, paucis. Flore Croci, latifolio. Quare quidā Fremij speciem esse putauerūt. Extra ctus succus oculorū medicamētis adiicitur, ubi expurgare est opus. Mordet enim, & abstergit omniē caliginem, quæ oculis offunditur. Tradunt humorem quendā ex hærba emanare, qui elotus, semotis calculis, in pastillos ad eadem digeritur. Aliqui tamen affirmāt, lapidem esse Aegyptiū, in Thebaide nascentem, exigua magnitudine, candido colore, gustu cum feruore quodam & adstrictione mordaci.

B A R B A R I C O R O L L.

Othonna herba nascitur in Syria, Plinio secundo. Paulus Othonnam uocando in compositionibus plerisq; maius Chelidonium interpretatus est. Sed aliud tamen genus est Othonna, quod hic describitur.

EX M. VERG. COMM.

Quis audeat ætate hac nostra, cui præteritorū seculorum negligentia & temporū iniurijs notissima quæq; adeo perierūt, ut quæ in hortis etiā quodidie per se, aut humano o-

A

Theophr. li.
bro. .cap. 14.
Pli. li. 27. ca. 9.

χελιδόνιον τὸ
μικρόν
τύρινον ἀγρίον

B

Othonna

Pli. li. 27. ca. 12.

C pere nascunt, ex antiquis appellationibus signari & ostendi digito nequeant, qualis, & quæ quidam Othonna fuerit dicere: Scriptori huic, & post eum cunctis alijs non satis cognita, & ex aliorum fama historiae tantum tradita: quodque magis miremur, oēs in diuersis penitus generibus numerata, alijs succum, & hunc multarum simul & per se herbarum, alijs herbam cuius longior sit historia, alijs lapidem in Thebaide Aegypti nascentem eam indicantibus. Quo fit, ut propter ea quæ a posterioribus tradita de ea fuerint, nihil nos dicere, & in tanta tot scriptorum unius rei uarietate censere ualeamus. Plinius lib. 27. cap. 12. herbam tantum credidit. Verba eius sunt. Othonne in Syria nascitur, similis Erucae, perforatis crebro folijs, flore croci: quare quidam Anemonem uocauerunt. Succus eius oculorum medicamentis conuenit. Mordet enim leniter, & calefacit, adstringitque siccando. Purgat cicatrices, & nubesulas, & quicquid obstat. Quidam tradunt lauari, atque ita siccata digerit in passillos. Quæ omnia paulo minus, quam ipsi uerbis ex hoc scriptore accepta sunt. Videturque Plinius, relictis de Othonna opinionibus alijs omnibus, in herbarum genere eam pro conperto constituisse. Paulus Aegineta de simplicibus sexto uolumine agens, non herbam hoc nomine, sed herbarum succum in Arabia ad Aegyptum nascentis appellauit. Idem eodem loco retulit, & eodem quo hic scriptor modo dicere aliquis lapidem Aegyptium esse Othonnam. Hic ipse propterea in confectionibus medicamentorum quorundam, Othonnam interpretatus est, maioris Hirundinarie succum. Nos illud iam pridem cogitauimus, & in eam partem inclinamus, ut credamus sui generis herbam omnino esse Othonnam: quæ uero alia de ea tradunt, a uirum & potestatis similitudine ab alijs credita, dictaque fuisse: & ex eorum ratione, quæ graeci ἀντικαλλόμενα, id est nostræ ætatis medici uocant, quid pro quo, ad Othonnam translata fuisse. Quod autem dicimus, huiusmodi est. Potest Othonna oculorum medicinam esse: quibus cornutum Papauer etiam, Anagallis, Apollinarisque herba pariter utiles (ut ex earum historia medicinarum legentibus patebit, nos enim breuitatis causa suis locis dicenda iterum, nunc relinquimus) succo suo in Othonnae appellationem uenerunt. Ex his facilis coniectura est eius, quod paulo ante diximus, quia pro Othonna, quam non facile omnibus locis inuenisse erat, in Arabia & Trogloditis nascentem, a medicis alia illa imperari soleret, ideo credidisse multos sui generis herbam aliarum multarum succum fuisse: qui legitime deficiente ea, in oculorum uitijs, ob æquales uires, in usu esset. Nec alia ratione Aegyptius lapis Othonna etiam creditus est: quoniam ex eo, scilicet collyria ad eadem oculorum uitia conficerentur. Eum lapidem Barbarus æris colore, quasi χαλκοχρῶν, secutus quorundam codicum fidem dixit. Nos uetustiorum, meliorumque lectionem λευκόχρῶν, id est, candido colore.

μυρ ὄτε

M De Auricula muris. CAP. CCIII.
Myosota, alij Myoton, alij Anthilion, alij Alsinen, nonnulli Myorthochon, alij Myrtosplenon, Latini muris Auriculam uocant, Aphiri Labatholabat. Nomen ideo accepit, quia musculorum aures folijs imitetur. Lucos, & fabulosa loca amat, ideo Alfine dicta est. Ea Helxinæ similis, sed humilior, ac folijs minor. Vim refrigeratoriæ am habet. Oculorum inflammationibus conuenienter ex polenta illinitur. Succus eius aurium doloribus instillatur. In totum eadem potest quæ Helxine.

Pli. li. 27. ca. 12.

M Yosotis Alfine cognominata, quasi nemoralis. Nascitur & in hortis, & maxime in parietibus. Incipit a media hyeme. Arescit æstate media, cum proreperit auribus musculorum expressis. De hac sub uocabulo Alfine repetuntur omnia hæc libro quarto. propterea nihil ibi diximus. Dicuntur Myosotides, & Myosotæ a Galeno.

S Aris cur Myosota, & Alfine herba hæc quondam dicta fuerit, hic scriptor ostendit: & qui

græcas nouerunt literas, auditis tantū uocibus illis, idem intelligent. Plinius etiam libro. 27. capite quarto eam describens ait. Cum prorepat, muscutorū aures folijs imitatur. Cuius animalis uox alijs appellationibus coniuncta, eandem causam habet. Siquidem Myotoni, muris aurem pariter significat: & Myotosplenon, ex muris aure & aspleno herba composita uox est: quæ ab altera muris auricula ad priorem hanc trāsata fuit. Siquidem hic in ea quæ paulo post sequitur Scolopendrio, quæ eadem Aspleno est, similem esse dicet. Est illud in appellationibus his etiam animaduertendum, de eadem herba doceri hoc loco sub titulo Myosora, iterumq; in quarto sub titulo Alfinæ; esseq; eandem utrobique historiam eius & medicinam: ideoq; cum semel hic de ea actum fuerit, non esse de ea iterum agendum. Cum eo peruenimus, iterum legentes idem monebimus. Illud etiam significasse uolumus: quæ plerumq; inuenitur, & quam nos aliquando uidimus Muris auriculam, altera, & quæ statim sequitur est.

¶ De altera Auricula muris. CAP. CCIII.

Muris Auricula quā Myosotida uocant, hærba est caulibus pluribus ab una radice, aliquatenus rubetibus, concavis ab imo. Folijs angustis, oblongis, dorso acuto, nigricantibus, per interualla assidue geminatis, atq; in mucronem desinentibus, & tenuibus cauliculis, ex alarum sinu prodeuntibus, flore cæruleo. Radix digitali crassitudine, multis capillamentis fibrata. In summa, Scolopendrio similis, sed breuior, minor. Radix illita ægilopia sanat. Sunt qui Helxinten, muris Auriculam uocitent.

BARBARI COROLL.
Myosotis hæc quæ posterior describitur, iustius Myosotis tantū dici solet q̄ proxima, quæ Alfine potius, q̄ Myosotis appellata sit ueteribus.

EX M. VERG. COMM.
VNum tantū nos uidimus Muris auriculæ genus, alterum scilicet hoc, & secundo loco a Dioscoride traditum: respondentq; sensui omnes eius notæ: prioris nullum inuenimus oculatum testem. Antiquissimi etiam latini Dioscoridis codices, posteriorem hanc solam ostendunt. Quinetiam Plinij ætate, si quis uerba eius sagacius odoretur, non satis certa res erat. Ait enim post descriptam Alfinem, Sed aliam docebitis quæ iustius Myosotis uocetur. Paulus Aegineta postremo unum tantū genus eius in sexto pariter agnoscit. In omnibus tñ græcis duo capita hæc legunt, quo uertimus modo ubiq; scripta: eaq; ob causam qualia erant latinis reddita.

¶ De Glasto satiuo. CAP. CCV.

ISatis satiuæ, aliquibus Augion, Magis Arusion, Romanis Gluta, laut Glastum dicitur. Glastum quo infectores lanarum utuntur, foliū habet Plantagini simile, uerum pinguius, nigriusq;. Cuius caulis duum cubitorum altitudinem excedit. Illita folia, tumores omnes discutunt, Cruenta uulnera glutinant. Sanguinis profluuiā sistunt. Ignem sacrum, phagedanas, putrescentia ulcera, & quæ serpunt, sanant.

BARBARI COROLL.
Isatim Lactucis syluestribus annuerant. Duo ei genera Plinio redduntur, itemq; Dioscoridi. Nascens in syluis. Alterū infectoribus dicatum: quod & satiuum Dioscoridi, Galenoq; uidetur. Plinius syluaticum uocari tradit, simile Lapathio syluestri folijs, nisi plura essent & nigriora, quam uulgus modo Gualdum, ueteres Glasdum, siue Glastum lingua gallica dicebant. Eo Britannii mares & foeminae oblinebant se. Mares, ut cæruleo colore metum hostibus afferrent. Foeminae, ut in quibusdam sacris incederent nude, colorem Aethiopum imitantes. Isatim Dioscorides Egnen quoq; uocari prodit. Credo hanc ab Hippocrate Ienen, siue Ignem dici. Dioscorides Isatin latine dici Rutam, Apuleius Alutam scribere. Falsum utrunq; suspicor, & Lutam, siue Luteam uocari credo. De Lutea herba Plinius & Vitruuius inter colores tantum loquuntur. Plinius, Chrysocolla inquit illa quoc; herba tingitur; quam Luteam appellant. Idem paulo post: Luteam Chrysocollam ab herba Lutea dictam putant, quam ipsam cæ-

ισάτιο
αυγίων

Pli. li. 26. c. 7.

D I O S C O R I D I S

Ceruleo sublitā pro Chryfocolla inducūt. Viāruuius, qui non possunt inquit Chryfocolla propter raritatem uti herba, quæ Luteum appellatur, cæruleum inficiunt: & utunt viridissimo colore, hæc autem inquit, Insectiua appellatur.

E X M. V E R G. C O M M.

Nihil nunc Isatide notius, Maximūq; sibi uestigal ex ea fecerunt, qui Tiphernates agros ad Tyberim, omnemq; regionis eius tractū, neglecta omni alia annona, hac tantū herba conserūt. Tantus nūc tinctis colore eius lanis honor est. Guadū nostra ætas appellat. Apuleius in commentariolo illo, quod de aliquot herbis reliquit, Alutam ab Italis uocari ait. Quæ uox q̄ integra in eo scriptore sit, non satis cognitū nobis est: quoniā nihil herbæ huic eū corio. Quæcunq; autē ea futura sit, eam credimus esse quā hic pariter uitiosa uoce Rutam a Romanis uocari ait, cōmune nihil, aut simile illi habentē. Non tamen ab re est, ex Ruta, & Aluta uitiosis uocibus, neq; Isatidi conuenientibus teritiā aliquam suspicari, Luthæam, scilicet quā Romani aliquot scriptores inter colores retulerūt, Viāruuiusq; præsertim, ad extremū septimū uolumen dicens, Qui non possint propter caritatē, Chryfocolla uti herba, quā Luthæam appellant, cæruleū inficere. Barbari quondā tingendis corporibus suis tam uiri q̄ foeminae ea utentes, Glastum uocabant. Eratq; in tingendo præcipuus eius usus. Antiquiores græci, latiniq; inter syluestres Lactucas eam numerauerūt. Plinius longissime de ea egit. 20. uolumine capite septimo.

De syluestri Glasto.

C A P. CCVI.

ἄγρια ἰσάτις

Syluestre Glastum satiuo simile est. Folia fert maiora, lactucacis proxima, caules prætenues, multifidos, rubicantes. In quorum cacumine folliculi dependent, quandam linguarum effigiem referentes, in quibus semen. Flore tenui, luteo. Eadem quæ & supradicta præstat. Potu & illitu lienosis auxiliatur. Sed sciendum est, ne tradita errorem

Dariant, satium Glastum, luteum florem, tenuiores, multifidosq; ramulos proferre: in cacumine autem folliculos linguæ speciem representantes, in quibus semen continetur, Melanthio simile, caulemque supra binum cubitorum altitudinem attolli. Syluestre uero nigriora ferre folia, caulem minorem, sed crassiore. Florem purpureum, aut cæruleum, fructum cruciformem, asperum, in quo semen, folijs exilibus quinquepartito diuisum.

B A R B A R I C O R O L L.

DE hac Isati dictum est in satiuo proxima: qui & Radiculā, quæ sit Struthion, Isatin uocari putent, ducunt mendofo loco: quē nos in Plinio correximus. 19. naturalis historię libro.

E X M. V E R G. C O M M.

Abundabāt in syluestri Isatide multa, quæ ab eo quo nos desijimus loco in alijs legunt: eāq; ob eam curtiū, minusq; omni ea parte nos fecimus hoc caput. Nec sine rōne, ut credimus: quādo in antiquissimis græcis, q̄s licuit uidere, nulla ea est. Neq; is quē nos habemus, longissime antiquitatis latinus Dioscorides id habet. Quodq; pluris facere nos decet, q̄ absurdū uidet, post utriusq; Isatidis decreta, hunc ipsum scriptorē, quæ a se facta fuerant dānare, legētesq; his uerbis monere, Cæteriū scire oportet, falsas esse descriptiones has. &c. Cum liceret quæ male incæpta a se fuissent, anteq̄ ederent, in melius, & quod uerū esset mutare. Accreuit ea pars scriptori huic ab aliquo, qui aut certius de Isatide omnia nouisset, aut nouisse se crederet. Multa huic scriptori hac rōne adscripta a medicis, a librarijs deinde illi cōmixta, & inserta mala in sitione, in unū corpus coaluerunt. Quæ nisi diligentius & cautius excutiantur, & purgent, multis locis, usum eius & gratiā dehonestabunt. Est illud etiam hoc loco reperendū, quod non multo antea in Arabide dictum a nobis est, abundare, scilicet hoc loco, quod Isatidem statim sequitur, Arabidis caput. De ea enī quæcūq; ea sit, q̄d oportebat, dictū hoc ipso uolumine fuit.

De Telephio.

C A P. CCVII.

Telephium aliqui syluestre Semperuium, alijs Portulacam syluestrem appellāt, Romani Illecebram, Aegyptij Anoth, Aphri

τὸν ἰσάτιον
αἰσῶν ἄγριον
ἀνδροχύν ἄγρια

Tirtopurin. Hærbæ Portulacæ similis & caule & folijs, habens geminas alas, singulis foliorum geniculis inhaerentes: a quibus rami seni septeni-
ue fruticant, a radice referti cæruleis folijs, crassis, lentis, carnosis. Flore
luteo, aut candido. Nasçitur in cultis, & maxime inter uites. Tempore
uerno folia senis horis illita, albam uutiliginem sanant. Sed postea hordea
cea farina illini debet. Perunctam etiam in sole uutiliginem tollunt. Sed
ubi inaruerunt, absterguntur.

BARBARI COROLL.

Telephion uagum et cõmune plusculis herbis nomen. Dioscorides senos septenosq; ab ra-
dice ramos ei tribuit, Plinius etiam octonos. Differre hanc merito existimant ab alia quam di-
ximus hoc libro Telephion, & Andrachnen agriam uocari: quandoquidem tam Dioscorides
& Plinius medicinas earum, atq; notas seorsum utriusq; reddunt, ceu duorum generum. Tele-
phion hic descriptam, sunt qui eam putent esse, quam Romanæ officinæ Pulmonariam uocant.
Vegetius in Mulomedicina Pulmonariam, siue Pulmonariam appellat: quam & Consiliginē
dici tradit, bubulcis & mulomedicis, hoc est, ueterinarijs præclare cognitam.

EX M. VERG. COMM.

Telephion. 27. uolumine capite ultimo breuius certiusq; scriptore hoc Plinius descripsit.
Nihil tamen non acceptum ab eo est. Quo fit, ut suspicemur uitiū aliquod in historia Diosc. esse.
Sunt enī pleraq; parum certa, nec sequaci uerborū serie tractata. Nos tñ nihil mutauimus: no-
men usq; tm. pter sex horas, q̄ tēporis spacio hic iubet leucem Telephij folijs illini, addere Pliniū
ternis mensibus id faciendum esse: quod in scriptore hoc desiderari posse uidetur. Manifestam
tamen causam id non habet, longiusq; id tempus merito alicui pro rei necessitate uideatur.

The. li. 9. ca. 19
Pl. li. 27. ca. 13.

¶ Finis LIB. Secundi.

PEDACII

B

DIOSCORIDIS

De Medicinali materia. LIB. Tertius.

IO. RVELLIO interprete.



DUPERIORIBVS charissime Ari cõmenta-
rijs, tradidimus de aromatibus, unguentis, oleis,
arboribus, & prodeuntibus ex eis fructibus & la-
chrymis. Item de animalibus, frumentis, oleribus,
& hærbis acrimonia præditis. In hoc autem Tertio
de radicibus, succis, seminibus, hærbis quæ & uernacula consuetudine
usurpantur, quæq; pluribus scatent remedijs, differemus.

¶ De Agarico. CAP. I.

Agaricum radix fertur Laserpitio similis, sed facie summa soluti-
or & fungosa tota. Duo eius genera. Fœmina rectis uenarum
discursibus constat. Mas rotundus est, & undiq; compactior. Vtrique
gustus in initio dulcis, mox in amaritudinē transit Sarmaticæ in Aqu

D I O S C O R I D I S

C folia prouenit. Sunt qui radicem esse Plantæ affirmant. Alij ut fungos nasci in arborum caudicibus, quadam putredine. Gignitur in Galatia Asiae contermina, & Cilicia in cedris. Sed friabile & infirmum. Ad stringendi, calfaciendiq; naturam habet. Contra tormina, & cruditates, rupta, præcipitationesq; efficax. Datur duobus obolis in uino nullo, febrim non sentientibus. Febriculosis uero in aqua mulsa. Arquatís quoque, suspiriosis, iocineris, renumq; uitio laborantibus, dysentericis. Item si urina ægre reddatur, si uulua strangulatus urgeat, si pallor membra decoloret, drachma una dari solet. Si tabes infestat, ex passo. Si lien negocium exhibet, ex aceto mulso. Si dissolutio stomachi est, ita ut cibi tenax non sit, manditur, & sine ulla humoris sorbitione deuoratur. Simili modo acide ructantibus propinatur. Sanguinis reiectiones sistit, tribus obolis ex aqua sumptum. Facit ad coxendicum & articulorum dolores, & comitiales morbos, si cum aceto mulso, pari pondere assumatur. Menses ciet. Fœminis, quas inflatio uulua uexat, utiliter æquali modo datur. Rigores soluit, datum ante februm significationes. Alium purgat drachma una, aut altera, si cum aqua mulsa bibatur. Venenorum antidotum est, drachmæ instar, cum diluta portione sumptum. Si serpentes ictu uibrarunt, morsumq; subfrixerunt, tribus obolis ex uino potum, mire auxiliatur. In summa, internis omnibus uitij conuenit, p uiribus et ætate datū nunc ex aqua, nunc ex uino, ijs ex aceto mulso, alijs ex aqua mulsa.

HERMOLAI BARBARI

Patricij Veneti, & Aquileiensi, Patriarchæ Corollariorum LIB. Tertius.



Pli. lib. 25, ca. 9

AGARICVM in arboribus nascitur, fungi similitudine circa Bosphorū, colore candido. Masculus amarior. Galliarum quoq; glandiferae maximæ arbores Agaricum ferunt. Est autem (ut dixi) fungus odoratus, in sumis arboribus nascens, noctibus relucens, & candidus. Ideoq; in tenebris decerpitur. Dioscorides Agaricum ueneni uim habere, sed id quod nigrum est affirmat: & regione Sarmatarum, quæ ἑρπία, hoc est, syluestris dicitur nasci. Quidam codices non Agriam, sed Agariam habent. Vtrumq; tueri possumus. Primum ex Plinio, Regio inquit Sarmatiae syluestris Hyleum mare, quo alluitur, cognominauit. Alterū ex Ptolomæo, qui Agarum & urbem, & amnem in Sarmatia uocari tradit. Appianus Alexandrinus, Agaros scythicam gentem contra serpentium morsus adhiberi solitam refert, propter quod Mithridates eos apud se habuerit.

De Rhapsontico.

CAP. II.

82 8200

RHa aliqui Rheum, aliqui Rhiā, Latini Rhapsonticum uocant. Prouenit in ijs quæ supra Bosphorū sunt regionibus, ex quibus affertur. Radix nigra, Centaurio magno similis, sed minor & rufior, fungosa, aliquantum leuis, sine odore. Optimum habetur quod teredines non sensit, si gustatu cum remissa adstrictione lentescat, manducatumq; colorem reddat pallidū, aut ad crocū inclinantē. Id eportū facit ad inflatiōes, stomachi imbecillitatē, & omne genus dolorū, ad conulsa, lienosos, hepaticos, tormina, ad renū, uesicæ, & pectoris uitia, aduersus intenta præcordia, & uulua mala, coxendicum dolores, sanguinis

excreationes, suspiria, singultus, dysenterias, & coeliacorum affectus, contra febrium circuitus, & uenenatorum morsus. Datur in singulis ualitudinibus eodem quo Agaricum pondere, & cum eisdem liquoribus: si febris careant, in mulso: sin aliter, ex aqua mulsa: si tabes experiuntur, ex passo: si lienis exercet, in aceto mulso. Si dissolutio est stomachi, id est, cum cibi tenax non est, manditur, & sine sorbitione ulla deuoratur. Liuentia, lichenasque tollit, cum aceto illitum. Inflammationes omnes ueteres ex aqua oblitum dissipat. Summa eius uis adstringens, cum aliquanto calore.

BARBARI COROLL.

Rhaponticum, radicem Ponticam a Cornelio uocari cenfeo, a Galeno & Paulo Rheon, a Plinio Rhacoma, nisi deprauatus (quod fere suspicor) locus sit, uulgo Rheu. Actius Rhaon. Plinius Costo nigro simile demonstrat, in cetera cum Dioscoride conueniens. Habetur & Rha Barbarum, multo praestantius, efficaciusque Pontico, sed ante Paulum Aeginetam fere medicis incognitum. Eius mentionem autem is, in compositione quadam ad podagras habuit.

EX M. VERG. COMM.

Qui supra Pontum & Cymerium Bosphorum ad Panticapeum regionis eius metropolim uicinus Tanais, in Meotidem paludem influit, maioris illius fluminis luce & nomine, non satis in Geographia clarus quondam Rha dictus fluuius, Ponticae radici huic nomen dedit, & in ripis suis nascentem, ueluti adoptione quadam in sui nominis honorem admisit. Nec alia nominis eius, quam a natali solo causa & ratio est, ab Ammiano Marcellino historiae suae. volumine his uerbis tradita. Tanais, qui inter Caucasas oriens rupes, per sinuosos labitur circumflexus, Asiamque ab Europa determinans, in stagnis Meoticis delitescit. Huic Rha uicinus est amnis. In cuius supercilijs uegetabilis quaedam eiusdem nominis gignitur radix, ad multiplicem medelarum usus proficiens. Quod nouisse non parum hijs fuerit, qui sollicitis animis diu fuerunt, & adhuc sunt, Ponticae ne huic radici eadem, an alia sit quam nostra aetas in quotidiano medicinae usu Barbaram appellat, facti enim dimidium, ut poeta cecinit, qui modo caput habet. Auditis siquidem Ponticae huius radicis natalibus, non difficile erit, diligenti per mercatores qui ad nos Barbaram illam afferunt, a uenditoribus facta percontatione, nouisse, an quae nunc Barbara dicitur, Ponticae eadem sit: et an his quibus locis nasci eam Marcellinus ait, an alibi nascatur. Nobis pro comperto haecenus nihil est, & si diligentiores in quaerenda tota hac re fuerimus. Si enim quae nunc ad nos Barbara affertur, aliud quam Rha fluminis supra Pontum & Cymerium Bosphorum ripas natale solum habebit, radices duas eodem nomine, sed diuerso patriae & gentis cognomine tunc esse constituendum erit. Sin contra, ex quibus Amianus Marcellinus locis tradidit ad nos afferri, unum tantum radicis huius faciendum erit genus, & in eo ex diuersis notis, non eadem bonitas. In quam partem inclinat animus nobis. Quo autem maxime inter se differunt, odor est: qui in Barbara uehementissimus, in Pontica nullus, si huic scriptori credendum est, sentitur. Nos certe scimus, sine odore uisam aliquando radicem quae Barbara uideretur, & crederetur, non tamen esset, ideoque a medicis in usu damnatam. Quocumque autem modo id fiat, non uidetur hic scriptor, siue alia penitus, siue bonitate a Pontica diuersa sit, Barbaram cognouisse. Nunquam enim *ῥαποντικόν*, id est, sine odore eam dixisset. Ceterae in hoc & in alijs scriptoribus Ponticae radicis appellationes, ex eodem principio, primaque illa Rha fluminis appellatione fluxerunt, ideoque a nobis & alijs relinquenda. Relinquenda & quam Plinius dixit Rhecomam, sine ratione aliqua, nunc in eo scriptore & incognitam penitus.

De Gentiana. CAP. III.

Gentianam aliqui Centauriam radicem, alij Aloen Gallicam, alij Narcem, alij Chironion, Dardani Aloitin, Romani Gentianam, uel Cicendiam, alij Ciminales uocant. Huius inuentio prima assignatur Gentidi Illyriorum regi, a quo cognomen habuit. Folijs proxime radicem, Iugladi, Plantaginis uel similibus, subrubris, a medio caule, praefertim iuxta cacumen paulum dissectis, caule cauo, & inani, digiti crassitudine, geni

C ij

γλυτικὴν
κατακόρυφον ῥίζαν

D I O S C O R I D I S

Culato, & ex interuallis maioribus foliato, binū saepe cubitorū. Semine in calycibus lato, leui, paleaceo, satis ad Sphōdiliū semē accedente. Radice longæ Aristolochiæ, crassâ, amara. Nascitur in sublimibus montium iugis, umbrosis locis, aquosisq;. Vis radicis excalectorïa, & adstringens. Contra morsus serpentium, duabus drachmis cum pipere, ruta, & uino pota, auxiliatur. Extracti succi drachma, laterum doloribus, & ex sublimi deuolutis, ruptis, & conuulsis prodest. Hepaticis & stomachicis, pota cum aqua subuenit. Radix collyrii modo subdita, partus eiicit. Imposita ut lycium, uulneraria est, & ulcerum cuniculatim depascentiū medela. Succus præcipue eodem effectu prodest. Oculis inflammatione laborantibus illinitur. Pro meconio collyrijs acribus imiscetur. Radix uiriliginem absterget. Succus extrahēdi ratio hæc est. Contrita radix quinq; diebus aqua maceratur. Postea in eadem tantisper decoquitur, dum extent radices. Et ubi refrixit aqua, lintheo excolatur, Mox discoquitur, dum mellis crassitudo fiat. Ficuliq; reconditur.

Pli. li. 25. ca. 7.

B A R B A R I C O R O L L.
Gentianam ubiq; nasci, sed copiosissimam sub Alpinis montibus in Illyrio, præstantissimam affirmant, folio fraxini, magnitudine lactuæ, caule tenero, trium aliquando cubitorum, radice lenta, subnigra, sine odore, aquosa.

E X M. V E R G. C O M M.
DNota omnibus nunc etiam Gentiana est. Eam Centaurio similem Centauriam radicem alii qui nominauerunt, & ex eo Narcem: quoniam Narce Centaurium etiam dicatur. Fuerunt qui Aloem Gallicam, nulla foliorum, sed radicis similitudine aliqua, quam utrūq; genus recta sub terram agit. Chironia a centauro Chirone dicta itidem est, quoniam et Centaurium ab eodem Chironia pariter nominetur. Credimus præterea, quoniam Aloe diceretur Gentiana, a Dardanidis Aloem pariter nominatam fuisse. Suspiciamus tandem in extremo capite uitium esse, illic scilicet ubi de radicis coctura agitur, quam coqui hic iubet usq; dum radix illa superfuerit & emerget. Qui sensus rei non satis responderet. Neq; enim ponderosæ radices, quanta uoluerit aliquis coctura coctæ per se emergent. Potuit quidem sic intellexisse, tamdiu coquendam Gentianæ radicem, donec decrecente paulatim aqua desinat radix sub ea esse, eaq; ratione superfuerit. Verum hic nunq; cocturæ alicuius spatium sic docuit. Præterea antiquissimi latini omnes pro eo habent, donec uirtutem ex se dimiserit: manifesto argumento, aliam fuisse quondam eius locilectionem. Potest tamen ut diximus, defendi res: ideoq; nos cōmunem aliorum omnium lectionem secuti sumus, & nihilominus quod obseruatum etiam a nobis fuerat, alijs significauimus. Non sunt etiam de Gentianæ natalibus Barbaro, & nobis eadem omnia. Ille in altissimis montium crepidinibus nasci eam, nos in altissimis montium uerticibus diximus. Dioscorides in ὑψηλοτάτοις ἀκρωρίαισι ait: quæ uoces nihil aliud q̃ altissimos uertices significat. Siquidē montes omnes a græcis trisariam diuiduntur: ὑς τίρμαν, quod imas partes & radices significat, ὑς ἀκρωρίαν, idest, montium cacumina, & ὑς ὑπώρειαν, qua uoce descendentiā iam montium latetia indicantur. Aitq; hic ἀκρωρίαισι, & addidit ὑψηλοτάτοις, idest, uerticibus altissimis. Cur autē ille crepidines uertit, quæ fundamenta maioris alicuius molis sunt, non satis uideo.

De Aristolochia rotunda. CAP. III.

ἀριστολόχια
σπᾶγγυλα
Aristolochia
quæ ita di-
citur.
Germ: ophthalmy.

Aristolochia rotunda nomen ex eo sibi adoptauit, q̃ existimetur optime puerperis opitulari. Triacius gñā traditur. Vna quæ foemina uocatur, folijs hederaceis, præstanti odore, cum acrimonia, mollibus, subrotundis, multis ab una radice germinibus, prælongisq; palmitibus, flore cādido tanq; pileolo, rubro, grauiter olente.

BARBARI COROLL.

Aristolochiæ color ater, folium Alsinæ, ut Theophrastus inquit, rotundius. Nascitur in montibus præcipua. Genus quadruplex in ea latini seruant. Vñ Rotundæ, quam & Pheuxi-steron uocabant aliqui, folijs inter maluam & hederam nigrioribus, pinguioribusq;: qua cōtusa cum calce, in mari sparsa, pisces aduolant cupiditate mira, ut ait Plinius, uidisse id testatus. Continuoq; exanimati fluitant: ob id piscatores, ingt, Campaniæ uocabant hanc Venenum tertræ. Nunc & Cyclamini radice id contigit in eadem terra: ut putant. Alterum mascule, atq; Longæ. Tertiū radice longissima, quasi uitium nouellarum, efficacissima: quæ & Cretica nominatur, florē purpureo, colore buxæ, bacculas ferens ut Capparis: quæ tamē tria in omnibus quoq; inueniuntur generibus. Est & quarta Pistolochiæ nomine, tenuior q̃ tertia, densis radicis capillamētis, iunci plenioris crassitudine. Hanc quidam Polyrhizon cognominant, & Satyrion esse dicunt, ut in eius mentione docui. Odor omnium medicatus, sed Clematiti, hoc est, tertriæ iocundior. Nardinis quoq; unguentis conueniens. Effodere eas messibus tempestiuū est. Maxime tamen laudat Pontica, & in quocunq; genere ponderosissima, quæq; medicis aptissima. Nascuntur fere pinguibus locis & plano, ut quidam scripsere.

De Aristolochia longa.

CAP. V.

Aristolochia longa, mascula appellatur, nonnullis Dactylitis, alijs Melocarpos, alijs Teuxinon, Latine Aristolochia, longiore q̃ rotunda folio, tenuibus ramulis, dodrantalibus, flore purpureo, grauiter olente, qui marcescens in Pyri similitudinem cōformatur. Tuberbis radicum rotundis, ut Rapum. Longæ uero radix digiti crassitudinem, & palmi longitudinem implet. Nonnunq; paulo grandius adolefcit. Ambæ colore intus buxæ, gustu amaro, & graui. Est etiam num tertia longa, quæ Clematitis uocatur, ramulos habens tenues, refertos folijs subrotundis, minori Semperuiuo similibus, flores Rutæ, pleniores, radices longiores, tenues, crasso cortice odoratoq; uestitas, unguentorum spissamentis conuenientes. Rotunda cæteris uenenis resistit. Longa uero aduersus angues & uenena, drachmæ pondere ex uino bibitur & illinitur. Pota cum pipere, & myrrha, menses, partus, et omnia uuluarum onera eijcit. Eadem efficit subdita in pefso. Rotunda ad eadem pollet. Insuper singulibus, suspirijs, rigoribus, lieni, contu- sis, laterum doloribus, pota cum aqua singulariter auxiliatur. Aculeos & spicula extrahit. Ossium squammas illitu adimit. Vlcera putrida exest, & fordida expurgat. Caua cum iri & melle explet. Gingiuas & dentes extergit. Clematitis ad eadem pollere creditur. Viribus tamen inferior est. Appellatur a quibusdam Ararisa, & Melecaprum, Ephestios, Lestitis, Pyxionix, Dardanion, Iontitis, Gallis Theximō, Aegyptijs Sophœoph, Siculis, Chamæmelon, Italis Malū terræ, Dacis Absinthiū rusticum. Nascitur in montibus & calidis locis, aut campestribus et petrosis. Ad grauem febrim efficax est. Si nidore subditis carbonibus febricitans suffiatur, febris leuatur, Vulnura imposito sanat. Carcinoma- tis narium, cum cypiro & dracunculi semine, & melle prodest. Rigoribus medetur, cocta in oleo, aut adipe suillo, illitaq;.

BARBARI COROLL.

De hac qualis esset proxime indicatum nobis est. De Tertiā, in primo Aristolochiæ genere

C ii

A

Pli. li. 26. cā. 74
lib. 25. cap. 8.

*Aristolochia rotunda
calce confusa, in
mare sparsa, pisces
mira cupiditate ad-
uolans.*

*αριστολoχία
μάκρoν
δoκτυλίτις
μελόκαρπος*

B

C

De dulci Radice.

CAP. VI.

γλυκῆριζα

Glycyrrhizam aliqui Ponticam, alij Glyceraton, quidam Symphyton, alij Leonticam, alij Glycyphyton, aliqui Scythion, alij Adipson, alij Sylithra, alij Lybiestafon, alij Omœnomœon, alij Penthaomœon, Latini dulcem Radicem appellauere. Plurima gignitur in Cappadocia, & Ponto. Fruticosa est, ramis binum cubitorum altitudine assurgentibus, folijs Lentisci, densis, pinguibus, tactuq; gummosis, flore hyacinthi, fructu pilularum platani magnitudinis, asperiore, qui siliquas lentium modo habet, rufas & paruas, radicibus longis, ut gentianæ, coloris buxei, subacerbis & dulcibus, quæ densantur in succum Lytj exemplo. Is in arteriæ scabriciæ efficax habetur. Verum oportet ut linguae subditus eliquescat. Aestuanti stomacho, thoraci, ac iocineri conuenit. Sanat uesicæ scabiem & renum dolores cum passo potus. Idem eliquatus sitim sedat. Vulneribus illitus accommodatur. Comanducatus, stomacho prodest. Recentis radicis decoctum ad eadem conuenit. Eiusdem farina pterygijs commodissime inspargitur.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 22. ca. 9.

Glycyrrhiza, siue ut Palladius, Glycyridia. Sunt qui hanc & Eryngem eadem esse falso putent, quoniam spinosa, & foliata uideretur. Fruticosa est, præstantissima in Cilicia, deinde Ponto. Adipson uocatur: quia sitim, famemq; sedet. Carpitur Vergiliarum occasu: quæ longa est ceu uitis, colore buxeo. Melior nigra, quæ plena, q̃ quæ fragilis.

E X M. V E R G. C O M M.

D

Solo nomine in fingendis componēdisq; uocibus suis Romanis feliciores Græci, amabilem omnibus Glycyrrhizam fecerūt. Nec aliter q̃ in comœdia Glycerium, & in Venusinis carminibus Glyceram grato dulcedinis sensu in amorum leporibus poetæ illi illustrarunt: sic Ponticā, siue ut Theophrastus appellauit Scythicam radicem hanc, grata naturæ eiusdem dulcedinis nota, sola appellatione gens illa cōmendauit. Nec tantum ut amarent eam omnes effecit, sed in Scythia & Ponto sub septemtrionibus nascentem, propriam sibi, noui, & a se facti nominis alij cuius adoptione fecisse conarentur: laborarentq; libenter pro ea omnes, quæ in sanitate & ualitudine tam suauis posset hominī rependere gratias. Quod nos modo agimus, præfenti quotidie ab ea fructu & spe in tussi, & exasperatis faucibus: quo malo, frigiditate, tenuitateq; nostri aeris sæpenumero tentamur. Eam Theophrastus nono de plantarum historia, uolumine nondum facto illi a græcis, aut saltem non recepto ab omnibus, Glycyrrhize nomine Scythicam radicem uocauit. Estq; hoc quod Dioscorides ait, Scythicam ab aliquibus dici: & si passim in græcis non Scythicam, sed scythion corrupte legatur. Verba eius sunt. γλυκῆριζα δὲ καὶ ἡ σκυθική. ἡ δὲ ἰσθμυλινὴ αὐτὴν καλοῦσιν. γίνεται δὲ περὶ τὴν μαίωτιν. Quod est. Dulcis & Scythica radix, quæ aliqui Euthyglyciam uocant. Nascitur circa Mæotim paludem. Idem eodem loco causam reddidit, cur Adipfos etiam diceretur, non tam quia sitim simpliciter arceat, q̃ quia Scythæ ea, & Hippæce, de qua diximus superiore uolumine, decem, & aliquando duodecim diebus sine alio cibo purarent. Verba eius sunt. Δύναται δὲ καὶ τὴν διψᾶν πάντες ἰάνειν ἐν τῷ στόματι ἔχει. Διὸ ταῦτα τε καὶ τὴν ἰσθμυλινὴν λέγουσιν φασὶ τοῦ σκύθας ἡμίρας καὶ δίκας καὶ δωδίκας. Quorum sit sensus qui paulante dictus a nobis est. Eadem ratio fuit, cur Pontica itidem diceretur: cur autē Symphytō, uirium similitudo fecit. Est enim, ut in quarto nolumine certius patebit, Symphyti radix dulci & saluam prouocante sapore. Pectoris & illud uitia emendat: faucium asperitati confert: postremoq; sitim comanducatum arceat: quæ omnia dulcis Radicis propria sunt. Credimusq; nos, ἡ τῶν ἀντιβαλλομένων, idest, ex æqualibus, & eorum comparatione ad dulcem Radicem alterius plantæ translatum nomen fuisse. Dico autem æqualia, quæ nostræ ætatis medici, quid pro quo, appellant. Numerantur & aliæ ab hoc scriptore appellationes. Glyceraton, & Glycyphyton: a dulcedine factæ omnes, sola nominum conformatione diuersæ: quarum altera dulcem plantam, altera quod dulcedine sua amabile sit, significat. Celsus quod hic ipse testatur libro quinto

capite. 10. dulcem radicem simpliciter uocauit; quæ nos imitari, dulce Radicem, & si græca uoce Plinius usus fuerit, Glycyrrhizam diximus. In cæteris appellationibus non est quod legentes moneamus, barbaræ enim sunt, aut adeo corruptæ, ut a barbaris non differant.

De Centaurio magno.

CAP. VII.

Centaurium magnum aliqui Narcei uocant, alij Limnæion, alij Maronem, alij Plectroniam, alij Chironiam, alij Limnestin, Magi Herculis sanguinem, Romani Fel terræ. Folia habet iuglandis, oblonga, uiridi Brassicarum colore, serrata in ambitu, caulem ceu rumicis, binum aut ternum cubitorum, multis ab radice adnatis, in quibus capita ceu Papauerum, in rotunditate oblonga, flos cæruleus, semen Cnideo simile, floccis quibusdam inuolutum. Radix crassa, grauis, solida, tripedalis, succo prægnans, cum adstrictione aliqua, & dulcedine acris, & rubeascentis. Amat solum pingue & apricum, ac syluas & colles. Copiosissima est in Lycia & Peloponneso, in Arcadia, Helide & Messenia, pluribusque locis circa Pholoen, Lyciam & Smyrnam. Radix conuenit ruptis, conuulsis, pleuriticis, halitus difficultati, ueteri tussi. Sanguinem expuentibus, drachmis duabus trita datur: si febris sit, in aqua, cæteris in uino. Item ad tormina & uulua dolores. Ramenta eius in collyrij formam uulua subdita, menses atque partus extrahunt. Succus eadem præstat. Vulneribus prodest. Nam recens tusa, aut arida ante madefacta, ea glutinat & coniungit. Carnes coalescunt, si tusa simul decoquatur. In Lycia succum exprimunt, quo pro Lycio utuntur. Panacia appellata est, quoniam omnia mitiget uitia, quæ inflammationem minantur, plurimisque scateat remedijs. Pulsationes uulnerum, urinæ stillicidia, calculosorum cruciatus, clystere immissa sedat. Legitur matutinis, sole ad ortum spectante, hora diei pura, cum omnia complentur.

BARBARI COROLL.

Centaurion maius, caules habet geniculatos, folia lata & oblonga, & ab radice densa, radix tenera, fragilisque. Durat annis nec ultra duodecim. Cõmentatissima in ijs quatuor Dioscorides meminit regionibus, præterque in Alpibus. Dicitur & Centaurea, & Chironion, quia curatus ea Chiron sit, cum Herculis pertractanti arma sagitta excidisset in pedem. Nostri herbarij aliud Centauriū maioris cognomine demonstrant, flore luteo, folijs per interualla binis, auersa parte candicantibus, interna uirentibus, Salice maioribus, & connexis fere.

Pli. li. 25. ca. 6.

EX M. VERG. COMM.

Quæ Centauriū a biformi quam fabulati poetæ sunt natura eius dicta fuerit, Chironia a nomine, Pelethronia a Thessaliæ monte, in quo Lapithæ quondam equitadi peritæ gens, fræna & giros, ut poetæ cecinit, alios docuerunt: inter quos & Chiron censebatur. Eandem hic Maroniam uocari ait, non amplius ex Thessalia, sed ex Thracia, in qua Maronius mons & Maronia ciuitas Homero notissima erat: quo loco copiosum forte, aut probatū nascitur Centauriū. Limnæion idē a natalibus suis Centauriū aliqui uocauerunt, quod secundū paludes, quas Græci limnas dicunt, & aquarū scatebras nascit: quod & Plinius testatur, Libadiōn eadē aquarum significatione uocari dicens. Quæ deinde Romanæ uoces Centaurio in Dioscoride accreuerunt, Vnefera, & Phieri, nullam nobis significationem habent. Et quod Fel terræ in maiore hoc Centaurio legitur, ex minore adiectum contrariō sensu est. Siquidem ab hoc ipso maioris, radix dulci sapore describitur, minoris amaro. Præter quæ id sensus & experientia etiam ostendit. Alterius enim dulciior, alterius amariior in gustu sapor sentitur. Quo fit, ut Fel.

C iij

D I O S C O R I D I S

C quod amaro sapore est, minori, nō maiori cōueniat. Aperte id Plinius etiā lib. 25. ca. 6. testatur, de minore agens his uerbis. Hoc Centaurion nostri Fel terræ uocat, propter amaritudinē sum mā. Ex eo facile fuit, ex maiore in minus appellationē eam transſerre. Et hæc pro Centaurij ap pellationibus dicta hætenus ſint: in quo ueluti inutilia, nec huic ſcriptori legitima reliquimus, quæ in extremo capite in impreſſis, alijsq; quibuſdā græcis codicibus legūtur ab eo loco, ſcili cet qui in græcis eſt, *ἡλίου δι παντί*. &c. In nouiſſimis aut latinis, cognominata eſt & Pana cia. &c. Fecimusq; id uetuliſſimorū græcorum & latinorū fidem ſecuti, in quibus tota ea pars nulla eſt. Et ſi in Plinianis caſtigatōibus hac ſola auctoritate nixus, qd in Plinio legebat, me detur & ouī morbis decoctæ ſuccus, non ouī, ſed omniū ſcribi oportere Barbarus decreue rit; propterea, q; Panaciā dici etiā Centauriū in Dioſcoridis hac parte legiſſet, quæ uox omniū morborū remedia pollicetur. Verū id nos non pbamus, & nihilominus unicuiq; ſuū ſeruatur iudiciū. Perſuaſitq; id p̄cipue, qd ultimū in ea parte ad ſuperſtitiōē ſolam p̄inet, legendū eſſe, Centauriū appetente ortu ſolis, caſto tēpore, quo oīa pleniora & p̄fectiora ſunt, quæ ætate hu ius ſcriptoris inſueta, et naturā docente homine indigna erant. Scimus qdem Theophrastū lib. 9. de plantarū hiſtoria, multas huiuſcemodi obſeruatiōes p̄currere: & in ſodienda Centaurij ra dice neſcio qd de Triorche accipite dicere, quæ tunc cauere oporteat. Sed nihil qd ad ſolem & tēporis obſeruatiōē pertineat, in eo legitur: & nihilominus cuncta ab eo ex uulgi opinione re ſeruntur: & quatenus tutū ſapienti erat, contra plebis ſuperſtitiones conari, ab eo damnatur. Cautius enim eo loco Theophrastus, ne uideretur religioni obſtrepere, ait. *τὸ δ' ἰσχυρὸν ἐν τῷ κεντρῷ*. quod eſt, præcedente autē precatione aliqua, radices fodere nihil abſurdum. &c. Verum nos latinorum omniū, & meliorum græcorū, in quibus nihil huiuſcemodi legi tur, fidem ſecuti, omnē eam partem expunximus: & nihilominus poterunt uolentes ab alijs eam ſi placuerit repetere. Diximus deinde, naſci Centaurium, & amare ſtūpibus & arboribus conſereta loca, *ἀρμύρα* ſic appellantes, non ſepes, ſed arboribus fruticibusq; denſos montes. Licet em̄ a quercu, quæ *ἀρμύρα* græce dicitur, *ἀρμύρα* fieri uideatur, nihilominus in cōmuni ſigni ficationis æſtimatione, ſyluoſus ſtūpe omnis locus ea uoce indicatur.

D

κεντρῷον μιν
κρόν

De Centaurio minore.

C A P. VIII.

Centaurium minus aliqui Limneſion, alijs Elleboriten, alijs Amma cranton, Magi Herculis ſanguinem, Latini Febrifugam, alijs Au ram, multi Radicem, Daci Tulbellam appellant. Limneſion aliqui uoca uere, quoniam rigua amet loca. Hærbæ Origani, aut Hyperici ſimilis, caule anguloſo, palmum excedente, flore Lychnidis, e puniceo in pur puram uergente, folijs Rutæ prælongis & paruis, fructu tritico ſimili, ra dice puſilla, læui, & ſuperuacua, quæ guſtātū amaritudinem adfert. Hærbæ recens tuſa, ſuo illitu uulnera conglutinat. Vetera ulcera purgat, & cic catrice obducit. Bilem, craſſosq; humores per aluum exigit, ſi decocta de uoretur. Ius decocti iſchiadicis conuenientiſſime inſunditur. Trahit em̄ ſanguinem, & dolorem leuat. Succus oculorum medicamentiſ perq; uti lis. Si quidem cum melle caliginē oculorum expurgat. In uellere ap positus, menſes & partus extrahit. Epotus peculiariter neruorum ui tijs ſuccurrit. Legitur ſemine prægnans, & diebus quinq; madefacta, decoquitur donec ſuperemineat aquæ. Mox ubi refrixit, lintheolo ex primitur. Et ciecta hærbæ, iterum decoquitur, uſquedum mellis craſ ſitudinem habeat. Nonnulli eam recentem, grauidamq; contundunt, atq; ſuccum ſicili non picato exprimunt, & in ſole lignea rude aſſidue mouentes, inſpiſſant. Quod ſi quid concretum faucibus uas ſi adhære ſcat, detrahunt, reliquoq; humori permifcent. Noctū diligenter operiūt. Namq; ros nocturnus, liquores coaleſcere non ſinit. Quæ autem ſiccis ra

dicibus, aut hærbis liquamenta exprimuntur, decocta ut in Gentianæ mentione retulimus, præparantur. Sed quæ ex corticibus humidis, aut contulis hærbis factitatur, in sole, uti ante dictum est, coguntur. Sic e Taplia, sic e Mādragora, reliquisq; similibus succus, sic ex acerbis uuis Meligo elicitor. Lycium tamen, & Absinthium, Hypocistis & consimilia, decocta eo quo diximus modo coguntur.

BARBARI COROLL.

Centaurion minus, a foliorum tenuitate Lepton cognominatū, sicut Libadion, quoniam secundum fontes nascitur. Ipsa herba legitur autumnō. Succus e fronde, aut caulibus concisus madefactisq; 15. diebus capitur. Hoc Centaurium nostri Fel terræ uocant, propter amaritudinem summā, Galli Exacon, quoniam omnia mala medicamenta potum exigat per aluū. Est & Centauris appellata, cognomine Triorches. Hæc qui eruit, iubentur accipitrem cauere, dictum a numero testium Triorchem: quoniam ut Theophrastus inquit, raro non vulneratur ab alite, qui colligit. Tradunt & per se infestam esse carpentibus, raro unq; non ferientibus se, dum secāt. Hæc succum sanguineū mittit. Imperiti miscent has notas, & uni generi assignāt. Nam quod Ceutaurion Panaces uocat, alterius est naturæ, ut in Panace mōstrabimus. Huius radix minoris, penitus inutilis medicinæ est, ut Galenus quoq; scribit.

Theophras.
lib. 9. cap. 9.

EX M. VERG. COMM.

Cur Elleboritem ab aliquibus uocari Cētauriū minus in hoc scriptore legatur, difficilem habet coniecturā. Nihil enim inter eas tam simile est, ut misceri & cōmunicari diuersarum plantarū nomina potuerint. Incertum itidem, quæ Amaranthi nominis in eo causa sit, & ob quas uires Romani Febrifugiam dixerint, & Multiradicem herbam. Cum Amaranthus spica potius q̄ flos sit purpurei coloris, quia nuncq; marcescit, sic appellatus. Nisi forte ex colore floris tantū captata similitudine sic uocari ab aliquibus coeperit: unaq; tantū radice nitatur Centaurium, & nullis febribus mederi hic dixerit. Quales itaq; in scriptore hoc a nobis inuentæ sunt, tales etiam post nos alijs relinquuntur.

B

De Chamæleone albo.

CAP. IX.

Chamæleo albus quibusdam Chrysisceptron, alijs Ixia, Romanis Carduus marinus, Aegyptijs Ephear dicit, alijs Ephthoschin. Ixiam ideo aliqui uocauere, q̄ quibusdam in locis uiscum circa radicem inueniatur: quo pro mastiche utuntur mulieres. Folia habet Sylibo, aut Carduo similia, asperiora, acutiora, nigroq; Chamæleone ualidiora. Caulem non promit. Verū ex medio spinas Echini marini, aut Cinnaræ modo erigit. Flores purpureos ueluti papporum lanugines emit. Semen Cnici simile. Radicem in lætis collibus crassam, in montosis uero graciliorem, in profundo albam, aliquatenus aromaticam, graui odore, dulcem. Quæ pota acetabuli mensura, latas interaneorū tineas pellit. Bibitur autem in uino austero cum Origani feruescenti succo. Hydropicis commodissime drachma in uino datur. Etenim eos extenuat. Contra difficultatem uring decoctum propinatur. Haustra in uino, serpentū uenenis resistit. Occidit canes & sues. Mures item necat subacta cum polenta aut aqua, & oleo madefacta.

χαμαιλίων
λευκός

BARBARI COROLL.

Chamæleontē album, a Theophrasto Ixinē uocari Theodorus existimauit, quia Carduū pineam interpretari uoluit: quæ nihil aliud est, ut Dioscoridi placet, q̄ albus Chamæleon. Plini-

Pli. li. 21. ca. 15.
& 21. ca. 16.

D I O S C O R I D I S

Cus in Theophrasto non Ixinem, sed Helxinem uidetur legisse. Fere suspicor utrūq; falli, Theodorū, & Plinium; Theodorū, quia Chamæleontē album Ixiam quoq; dici nouerat. Sed aliud est Ixine, aliud Ixia Theophrasto noni uoluminis intio, ubi non omaibus locis, sed in Creta la chrymā ab Ixia, hoc est (ut arbitror) Chamæleonte albo fundi scribit. Pliniū quoq; decipi exi stimo, affinitate uocis, Helxinē, pro Ixine capientē, librarijs alterū pro altero scribentibus: qui modo parū diligentes, modo nimis scioli, peruertunt oīa. Tres igit herbæ sunt, Helxine, Ixine, Ixia. Ixia Chamæleon albus est Hippocrati, & Galeno. De Helxine suo loco agei, ubi de Ixina quoq; disserendū nobis erit. Chamæleontē album Ixion quoq; dici uideo, quia uiscū gignital bum, nō ubiq; sed sub alis foliorū, maxime circa Canis ortū, cum Tura nasci dicūtur. Succus radice decoctæ mures cōtrahit & necat, nisi protinus aquā sorbeant. Volētibz scire, uicturus sit æger, nec ne: præcipiūt radice diluto p̄fundi triduo qui langueat; moriturū negantes, qui ter rias uices p̄ferat. Theophrastus auctor. Nascit̄ æque oībus locis, capite magno, & Acano her bæ simili: unde quidā inquit, eam uocauere Acanon, qđ quidē & Ixine appellata cōtinet.

E X M. V E R G. C O M M.

IN Lacertarū genere Aegyptus, Africa, & India Chamæleones passim, & quotidie uidet, ma ter herbarū Italia, regionesq; aliæ oībus fere locis: tā undiq; spinis & aculeis fertiles agros, an nonamq; suā natura omnibus miscet & turbat. Descripsit animal Plinius longissime octauū uo luminis capite. 23. faciliq; est legentibus nouisse, unde factū a leone ferociore, grandiq; bestia nomine, paulominus q̄ integram Lacertā, & minori Crocodilo simile animal, humilem, & ue luti per terrā serpentem Leonē Græci uocauerint. Descripsit idem herbā eiusdem operis uolu mine. 22. capite. 18. possuntq; legentes in eo itidē cognoscere, unde ab animalīū genere in her barū censum humi repens leo ille transferit. Quod non totius, aut partium, diuersorū in natura generū figura & spēs fecit, sed idem mutationis euētus. Vt eī animal mutabili coloris natura est, mutatq; eum subinde, & oculis, & cauda, & toto corpore: redditq; semper quēcūq; proxi me attingit, præter rubrum & candidū (& si discrepent in hoc antiqui scriptores, excipiantq; ali qui candidū tantū) eodē modo & herba cū terra colores mutat: hic nigra, illic uiridis; alibi cya nea, alibi crocea, atq; alijs coloribus. Nec alia noīs huius in herba, q̄ a coloris mutatione, quā similē cōmunemq; cū eo animali habet ratio, in græca appellatione est. Alioquin in censu Car duorū uterq; Chamæleon est, candidus, scilicet & niger. Dico aut Carduos nunc, spinosum o mne illud genus, qđ siue altius a terra erigat̄, siue humiliter serpat: siue his, aut illis, hac ue par te, aut illa aculeatū sit, spinosum florē aliq̄ profert, in quo lanis & pappis semina inuoluunt. Neq; erit difficile, diligenter pingua, inculta loca, præsertimq; rudera mēsisibus Maio & Iunio obseruātibus, utrūq; hoc genus, & eorū discrimina obseruasse: præcipuēq; ex floribus, qui ex latiore ueluti pyxide in altero purpurei prodeunt, in altero quo mox colore describentur. Fue runt qui hunc Pineum Carduum huic scriptori additum legerent.

¶ De Chamæleone nigro. C A P. X.

χαμαιλέον
μύλας

Chamæleo niger, quem Pancarpon aliqui, alij Vlophonon, alij Ixiam, alij Cynomazon, alij Ocimoides, alij Cnidion coccon, alij Cynoxyllon, Latini Carduum nigrum, aut Vernūlaginem, Aegyptij Sobel uocant, folijs Scolymo similis esset, nisi minora, tenuioraq; ac ru bro distincta uiderentur. Caulem emittit dodrantalem, crassitudine digi tali, subrubrum & in umbella flores spinosos, tenues, hyacynthi æmu los, uersicolores, radice crassa, nigra, densa, interdum exesa, quæ dissecta flauescit, & commanducata mordet. Prouenit in campestribus siccis, & cliuosis tractibus, & maritimis. Radix trita, addito atramenti futuri exiguū, cedrino oleo, & axungia, scabiem abigit. Eadem cum sibi sul phur & bitumen asciuit, & cocta in aceto illinitur, impetigines abster get. Decoctum collutione dentium dolorem mitigat. Cum pari pipere & cæra oblita radix, dolenti denti auxiliatur. Radice concisa & in aceto decocta dentes fouentur. Eos quoq; frangit, si scriptorio stylo feruens ad

moueat. Vitia cutis in facie, uutiliginesq; cum sulphure emendat. Erodentibus medicamentis ammiscetur. Phagedænas, tetræq; ulcera illitu sanat. Quare Chamæleo uocetur, a uarietate foliorum euenit. Mutant enim cum terra colorem: hic uiridia, illic albicantia, aliubi cærulea, nonnusquam rubra inueniuntur.

BARBARI COROLL.

Chamæleon niger, spinosi generis, uerū folijs aculeatis non constat. Gelidis & inertibus locis prouenit. Ex nigris, aliqui marē dixere, cui flos esset purpureus: fœminā, cui uiolaceus. Vno nascitur caule, cubitali. Vlophyton uocatur, quoniā anginae modo iuuecas necet, & ab odoris grauitate Cynozolon. Ferunt & nigri uiscū: sed qd pro Mastiche non sit, ut ex albo.

Pli. li. 12. c. 19.

EX M. VERG. COMM.

Communis utriq; Chamæleoni Ixiæ uox & appellatio est, falso tamē, & sine causa: quoniam albo tantū adnascitur uiscum, unde ea facta est, illiusq; propria, cæteras nigro relinquit. Quarum Plinius duas numerauit: Vlophonon, q; ricinos canum necat: iuuecas quoq; Anginae modo perimit. ὄνλεν enim, & φόνος græcis exitium significat. Cynozolon item, propter grauitatem odoris: quoniam ὀν olere iisdem græcis est. Nos illud addidimus, ideo Cynoma non dici, q; in pulte necandis canibus detur, quam Græci μάσαν dicunt. In cæteris non est quod legētes moneamus, præterquā, non uideri integrum, quod redditum est, Librario stilo eadem dēnti, in quo dolor est. &c. Neq; enim rationem nobis aliquam, cur sic fieri debeat, id ostendit. Cogitq; id suspicari antiquissimus latinus Dioscorides, in quo nihil est, quod ad Librarium stilum pertineat: sed in carbonibus combustam radicem Chamæleonis, dentibusq; admodum, eos frangere indicat. Communem tamen omnium Græcorum, & aliorum interpretum lectionem, secuti & nos sumus.

De Crocodilio.

CAP. XI.

Crocodilion Chamæleontis nigri figuram habet. Nascitur in syluosis, radice longa, læui, aliquantum lata, odore ut Nasturcij acuto. Feruefacta in aqua, & pota radix, sanguinem copiosum per nareis pellit. Datur lienosis, eos euidenter adiuuans. Semen ei rotundum inest, duplex uti scutum. Quod suapte ui urinam ciet.

B

κροκόδιλον

BARBARI COROLL.

Crocodillon radice longa, æqualiter crassa, odoris asperi. Aetius hanc fortasse intelligit, cum radicem Crocodiliadis eius quæ maxima est, commendat in eo caput dolore, qui Cephalæa dicitur.

EX M. VERG. COMM.

Differt ab utroq; Chamæleone Crocodilion: q; eorum alter albus scilicet, sine caule in medio inter folia spinam marino Echino similem profert: Niger non unam, uerum duas, tresue aliquando coliculis potius q; caulibus impositas ostendit. Crocodilion autē singularem mittit caulem, & in caule spinosum Echinū. Est & alia differentia: q; illi pingutibus, campestribus & maritimis locis nascuntur: hic inter stirpes, & conserijs arboribus locis. Differunt & radice: quæ in illis est, qualis ab hoc describitur: in Crocodilio longa cum latitudine aliqua, alijsq; notis illis, quæ descriptæ paulo ante sunt. Nasci Crocodilion Barbarus a Plinio acceptum in fabuletis dixit: quæ uox τῶποις ἀπὸ μυῶδων, quibus hic nasci eam ait, nullatenus ut credimus responderet: modo fabuleta illi significant, quod in ruris disciplina cunctis alijs significant. In medicina hoc amplius Græcorum ueteres medici tradiderunt, prodesse Crocodilij radicem pectoris excreationibus.

De Labro Veneris, seu Diplaco.

CAP. XII.

Diplacum aliqui Crocodilion uocant, alijs Chamæleonem, alijs Onocandion, alijs Veneris Lauacrū, Romani Labrum ueneris, alijs Carduū ueneris, Aegyptij Sefencor, alijs Chir, alijs Meleta, Daci Sciarum. Aculeatarū generis est. Caulē habet altū, spinis horridū, folia Lactu

διπλᾶκον

D I O S C O R I D I S

Cæ, aculeata, prælonga, bullas intus & extra spinosas in dorfi medio, binis folijs geniculatim caulem amplectentibus, concauo alarum sinu, in quo imber aut ros asseruetur: unde Dipsaci quasi sitientis nomen traxit. In cacumine caulis, singula furculis capitula insunt, oblonga, echinata spinis, quæ arefacta candida spectantur, dissectæq; medullatenus, uermiculos ostendunt. Sanat rimas sedis fistulasq; si tusa & decocta in uino radix, usq; dum sit crassitudo cæræ, immitatur. Medicamentum ærea pixide recondendum. Aiunt fornicationibus, uerrucisq; pensilibus remedio esse. Vermiculi capitulorū in folliculo alligati, collo aut brachio appensi, produntur quartanis febribus remedio esse.

Pli. li. 24. ca. 13.

DIPSAcos, folio cauo, in quo salsus ros. Nascitur in aquosis & flumine. Huius herbæ carduus is est, quo rudes panni, uel ut echino quodā, ut inquit Plinius, uestes expoliuntur, & coltuuntur. Floccis siue fimbrijs, quas Græci Crocydas appellant, detractis, complanatisue. Hic frutex Labrum Veneris, aut Venereum latine dicitur.

TOTA Romana & antiqua uox est, Labrum Veneris, nō ab oris humani parte sic dicta, sed ab his Labris quæ Maro dixit, plena musto in uindemia spumare. Indicatq; id, q; Græci Romanam uocē imitati, ἀφροδίτης λουτρόν eam dixerūt: quod erat in latinis Labrum, græcæ λουτρόν, ex usu balneorū transferentes. Sunt em̄ græcis λουτρά quæ lauandis corporibus parantur: quemadmodū in balneis labra etiam Romanis. Nota res est, latet tñ causa: nec nos hactenus inuenimus, cur Labrū Veneris spina hæc ab illis quondā dicta fuerit. Videmus quidē quot annis, cauos in ea sinus illos, in quibus etiā ardentissimo solis æstu ex roribus, aut pluuijs aquis ad multos dies seruatur humores. Sed quomodo his Venus laueret, aut se aliquādo lauisset ignoramus. Græci a siti ἄλκαον eam dixerūt: uel ut hic ait, quoniā humorem illū contra eam paratū semper habet: uel quæ nobis ex natura magis causa uidetur, q; secus fontes, aquarū scabreas, aquosos limites & fossas nascit, nec alijs locis raro inuenit. Egregia est plantæ spēs, quæ supra hominis altitudinē aliquādo crescit: quodq; in ea contemplari aliquis gaudeat, bullantes toto eius corpore spinæ sunt, & ueluti peluem constituētia bina illa folia, intra quæ humor semper inuenit. Cum creuit, in summo singulorū caulium singulos Echinos in oblongo rotundos profert, flore qui purpuream lanuginem refert. Oēm eius spēm diu nos obseruauimus: in Echinis autē nascentes uermiculos inuenire non licuit, & nihilominus græci latinique, quod merito credendū sit, oēs testant. In medicina usum radix tantū habet. Nosq; quibus ea medet rimis, fistulis, formicis & uerrucis iam pridem diximus, qualia mala illa omnia in homine sunt.

D

ἀλκαὶ λευκῆ

SPINA alba, quam Agriocinnaram, alij Donacitin, alij Erysisceptrum uocant, Romani Spinam albam, aut Regiam, alij Cardum Ramptarium. Nascitur in montibus & syluosis. Folia albi Chamæleonis, angustiora, & candidiora, aliquantum hispida, & aculeata, caulem supra bina cubita altum, digitū magni aut pollicis crassitudine, albicantem, intus cauum. In cacumine capitulum inest spinosum, echini marini æmulum, sed minus, & oblongum. Flores purpurei, in quibus semē ceu Cnicum, sed rotundius. Huius radix pota, coeliacis, stomachicis, & ijs qui cruenta extussunt, efficax est. Vrinam cit. Tumoribus illinitur. Decocto eius dentes in dolore collui prodest. Epotum semen conuulsis infantibus, & a serpente demorsis auxiliatur. Gestatum pro amuleto, serpentes abigere traditur.

De Spina alba.

C A P. XIII.

BARBARI COROLL.

A Cantha leuce, hoc est, spina candida, ut superius quoque diximus, aliud genus est, quod Leucacantha, siue Leucacanthos, etiam si & hanc nonnulli Galeno teste Leucacanthon uocare consueverunt. Habetur, sed inter arbores uel promiscua, quae Spinus albus uulgo dicitur, cortice ligni candido, molli folio: aculeata tota, Pruni magnitudine. Quo nomine ueteribus cognita haec sit, haud possum reddere.

EX M. VERG. COMM.

Spina haec alba alia est ab ea, quae primo uolumine ab hoc ipso scriptore, & a nobis longius descripta fuit. Illa inter spinosas arbores genus suum habet: haec inter aculeatos frutices, & cum reliquis carduis, quorum multiplex genus est, numeratur. Illa λευκάκανθα, composito & coniuncto nomine, haec discretis uocibus ἀκανθα λευκή appellatur. Illa undique suis spinis, & quales in arboribus uidentur infesta riget: haec praeter spinas in folijs aculeatum etiam echinum in summo caule habet. Illa in sepibus, haec montanis & siluosis nascitur locis. Illa tandem solidam habet materiam, haec concauum & inanem caulem. Sunt praeter haec in utriusque historia & medicina discrimina alia etiam. Quae poterunt uolentes ex hoc scriptore, & ex ipsa facillime cognoscere. Nulli enim non nota omnibus haec spina est, cuius flore ad lactis coagulum multis locis in E-thyria pastores & uillicae in casei confectioe utuntur. Eam hic ait syluestrem Cinarum uocari, propterea quod satiuae Cinarum comparata, minora aliqua, asperiora uero omnia habet. Est enim Ciner a tilis Cardui omne id genus, quod siue in globi squamatis corticibus, intus nitentibus tumet: siue calathi figura longioribus & in exteriorem partem descendentibus, iisdem squamatis corticibus aperitur: quae ueluti naturae monstra in ganeam gulae procures uerterunt.

De Spina arabica. CAP. XIII.

A R A B I C A E spinæ, quae Acanthis aliquibus dicitur, naturam, albæ Spinæ similem esse constat. Ipsa siquidem stringit. Ad sanguinis reiectiones, mensium abundantiam, cæterasque fluctationes radix etiamnum ualet. Prouenit in asperis.

BARBARI COROLL.

A Canthen, hoc est, Spinam arabicam nonnulli hanc esse putant, quam Plinius Lamam uocauit, etiam in India nascentem, a qua gummi adulterio Myrrhae prouenit, ut in Myrrha & Mastiche notauimus. Eandem hanc cum ægyptia spina Acaciam fundente nonnulli faciunt: quoniam Galenus & Paulus hanc & ægyptiam & arabicam appellant.

EX M. VERG. COMM.

Inter congeneres herbarum spinas, non inter aculeatas arbores Arabica, siue Aegyptia spina haec numeranda est. Eam ueteres greci utriusque gentis nomine indicauerunt. Ideoque nos inuenta in antiquissimis grecis, aliam illam uocem Aegyptiam, s. addidimus. Maximas etiam in adstringendo siccandoque uires illi tribuerunt. Peregrina quondam Italiae ea fuit, nunc quod sciamus, nulla est.

De Carduo. CAP. XV.

C A R D V V S graece Scolymos, alias Pherusa, alias Pyracantha nominatur, in Aegypto Cnus. Folia Chamæleonis habet, aut albæ spinæ, nigriora, & crassiora. Caulem longum ædit, foliosum, capite spinoso. Radice nigra & crassa, quae illita graueolentiam asilarum, totiusque corporis emendat. Item si decocta in uino bibatur. Copiosam autem urinam foetidamque expellit. Herba cum recens tenere solet, in olera Asparagi modo transit.

BARBARI COROLL.

Scolymos a Theodoro, Carduus, diu floret, ac sero. Distat a cæteris spinosis, quod radix eius uescendo est, decocta & cruda, maxime dum florescit: quodque lacteum succum durata emittit. circa solstitium flos incipit. Senescens in pappos amittitur, quod quidem est huic generi commune. Mirum quod sine interuallo tota æstate, aliud floret, aliud cõcipit, aliud paritur. Semen uliginosum & armatum aculeo. Folium arescens desinit pungere. Caput ei Theophrastus contra quod Dioscorides, spinosum negauit, sed oblongum haberi dixit: quod in hoc uno tantum spectetur

A

The. li. 6. ca. 3.

ἀκανθα ἀραβική

B

σκόλυμος

Pli. li. 21. ca. 16
lib. 22. cap. 22.

D I O S C O R I D I S

C interea, quæ lanugines folio spinosas obtinent. Nascitur similis Scolymo Carduus circa Teges, radice dulci: quam, cum Pandius statuarum magister esitauisset, alienatus mente ferit. Hactenus Theophrasti de Scolymo sententia. Nunc quæ ceteri scripsere uideamus. Scolymon oriens & Limonia uocauit. Frutex est nunc cubitali altior, utique in montibus, & quædiu syluestris, & nodum altilis. Alioquin in Mauritania caulis ei duodecim cubitos altus. Palmos quaternos crassius esse dicit, thyrsumque foliorum ac radice dulci: laudata quondam in pauperis cœna. Florente Scolymo, caducas acerrimi cantus esse, mulieres libidinis audissimas, uiros contra in coitu pigerrimos, scripserunt Hesiodus, & Alcæus poëte. Distet ab hac, quæ a Plinio ite Lemonia uocatur, contra serpentes, herba lacteo succo manans, cœrescente gummi modo in humidis locis, affirmare non ausim. Est & Lemonion pro syluestri Beta ueteribus acceptum, graui lapsu Theodoti, Limonia, quæ Scolymus est, pro syluestri Beta in Theophrasto capiētis, & aculeato folio eam prodētis. Habet & Anemone genus unum, cognomine Limonia, ut dictum est suo loco. Sunt qui & Cynoglosson herbam Limonion appellent. Sane Scolymos Carduus intelligitur syluester. Syluestrium autem Carduorum genera duo. Alterum fruticosius, a terra statim. Alterum unicaule, & crassius. Vtrique folia pauca, spinosa, muricatis cacuminibus, lanuginoso caule. Sed alter flores purpureum mittit, inter medios aculeos celeriter canescentem, & abeuntem cum aura, qui proprie Scolymus dicatur. Radicis horum ex aqua decoctæ natura, sitim potioribus uini facere. Hinc illud Columella de Cynara.

Quæ dulcis lacho

Potanti ueniat, nec Phœbo grata canenti.

Quid autem sit in Columella uersu, mirtolium in Cynara crinem spectari aliquando, nihil habeo quod afferre possim: nisi quis non mirtolium, sed mirteolum, uel muriceum certe legat. Sunt enim muricata Scolymo cacumina, ut inquit Plinius. Murtioli mentionem in Columella & alio loco uideas, ubi hæc uerba sunt ultimo uolumine. Habeto inquit, uiridis feniculi semina, & lentisci destricta & purgata murtiola. Fateor nescire quid sit murtolium. Scio Murcum montem Romæ dictum, qui sit & Auentinus, autore Festo: ut obiter corrigamus locum in Plinio iuniore, Auentinum & Martium montem, ab Anco Martio Urbis adiectos prodente: non enim martium, sed murtium legere oportet. Scio & intimum circum Romæ a muticis cognomen habuisse, quasi ab urceis, quæ ibi fingerentur, ut Porcilio placet: siue a propinquo Veneris murticæ facello, quæ postea Murteam, & Murtiam uocare cœperint in Auentino colle, ut Varroni. Hinc & Myrtum arborem uulgo, & Murtum, & Murtellam uocamus hodieque. Plinius certe duobus locis Scolymum, & medicinas eius ceu duarum rerum descripsit. Cynaram porro Carduum intelligit scilicet: ita enim Lucius Columella uocat, Palladius Carduum a cinere, ut quidam autumant, quo lætatur, uocatam. Sunt qui puellæ nomen in eam herbam uersæ inrelligant, Paulus, & Aetius Scolymon a Cynara discriminant: priorem stomacho prodesse, Cynaram officere monstrantes. Proxima certe genera uidentur esse. Fuit hæc ueteribus maximi res questus, ex Carthagine magna & Corduba precipue, sestertia fena millia, carduetis etiamnum paruis inferetibus ærario. Tantus est earum rerum proventus, quæ Veneri obsonantur et ganæ: ut nihil iuuerit portenta quædam naturæ uideri Carduos, & quæ refugiant quadrupedes, quo minus in luxum eos humana gula uerteret. Adhibentur Cynaræ conuiuijs, Asparagi modo coctæ iuribus: nec sine his magnifica, aut adicialis ulla est cœna, utique si neque locus, neque tempus obstat. Ligures Arcocum uocant, quasi alcoccalon: ut prima eius uerbi syllaba pro articulo sit, quem Mauritanii omnibus fere uocibus præponunt, ut in Hyoscyamo ex Plinio quoque usu ostendimus. Coccalus uero græce idem est quod Strobilus, hoc est, nux pinea, cui similis est Scolymus. Dioscorides, Romani Scolymum uocant inquit, Strobilum. Nondum irrepsit hoc ferculum Venetiarum, una tantum eius planities Mauriano uico cernitur in hortis barbaricis.

E X M. V E R G. C O M M.

V Agum per aculeatas omnes plantas Pyxacanthæ nomen est: quæ primo uolumine Lycit uocari etiam diximus: suisque spinis tamen, non ubique spinosis omnibus adest. Impudente quidem, sed multo impudentius a suo genere in aliud ab his translata, qui naturam ignorantes, temere omnia miscent. Strobilum a Romanis Carduum uocari Dioscori ait, græca quidem uoce, sed tunc forte quotidiana, & in usu populi: quæ a Pineæ nucis figura cui simile in summo Cardui capitulum habet, facta est. Græci enim σπρόβιλον arborem Pinum, & nucem eius pariter uocant. Quæ quoniam coniuncta in Pinastris, & oblonga est, quam formam Cardui capitulum habet, communica appellatione Strobilos, Carduus hic a Romanis aliquando dici potuit. Siquidem Plinius, 16. uolumine cap. 11. de Pinastris agens ait, Eadem arbores alio nomine per ora Italiæ quas

Scrobilos uocāt, ut pleriq; arbitrātur. Ex quo patet, scribēte etiā Plinio historiā suā, fuisse eā uocē in Pinastris Italię popularē. Similē Chameleoni Cardui, Nicander, Theophrastus, oēs q; aliq; fecerūt. Sed Theophrast. hoc amplius: nō solū habere Carduum radices, quę crudę parē & coctę in hominis cibos ueniant, qd priuatim solus hic in spinoso gñe habet, uerū q; easdē cū florēt optimas habet: quodq; uix credibile uideat, cū duratę p ætatē fuerint, & quasi in lignum transferint, candidum liquorē ex se mittere. Estq; hic Scolymus, siue Carduus is, quo per foliū tūm florētē, Hesiodus ait, in arboribus maxime canere cicadas, acerrimeq; ad uenerem stimulari fœminas, uiros autē ignauissimos tunc ad eam fieri. Descripsit, & remedia eius tradidit pluribus locis Plinius: a quo poterunt uolentes multa audire ad omnes Carduos pertinentia, priuatimq; ad Scolymum hunc, qui priuatim Carduus ab omnibus dicitur, & est.

De Poterio.

CAP. XVI.

Poterium aliqui Phrynion, Iones Neurada, aliqui Acidoton uocant. Large fruticat, cortice obductum tenui, spinis horridum, lanugine spissa, ramulis longis, mollibus, lentis, tenuibus, Tragacanthę proximis, folijs paruis, rotundis, flore exiguo, candidi coloris. Seminis nulli usus, sed gustu acuto & odorato. Nascitur in aquosis & collibus. Radices demittit binum, ternumue cubitorum neruosas, & firmas. Quę proxime terram recisę, dant succum gummi similem. Tussę, pręcisus neruis, & uulneribus glutinandis illinitur. Decoctum quoq; eius neruorum affectibus prodest.

BARBARI COROLL.

Poterio circūfodiūt autumno, pręciditurq; ad succum. Radices habet multas, bene olentes, sed duas, aut tres, cubitorum binū. Galenus hanc Neuradis appellatione intelligit. In Plinio nō Poterio, sed Pontirrim, nec Phrynion, ut in Dioscoride, sed Parcenio. 27. lib. legi uideo, corrupte utrūq;. At. 25. non parcenion, sed Phrynion, nec Pontirrim, sed Polyrrizon mendose item scribitur. Phrynion porro a Rubetis ranis dicta est, quibus aduersat. eas Gręci Phrynos uocāt.

EX M. VERG. COMM.

Quę Poterio in Dioscoride adiectę sunt Neurados, & Phrynij appellationes, in alijs gręcorum & latinorum scriptoribus, Galeno. f. Paulo, Plinioq; pręcipue & post se illam trahentes sunt. Siquidem priores duo illi Neurada tantum uocant, Plinius Phrynion; omnes tamen Poterion ab alijs appellari addunt. A neruorum medicina & ope alterum: a rubetis ranis, quibus ea medetur, alterum nomen illi factum est.

De Acanthio.

CAP. XVII.

Acanthium albę Spinę simile, folijs aculeatis per extremitates, et lanugine araneosa obductis, quę collecta & in unū acruata Bōbicis effigiē p̄bēt. Folia, uel radices ad remedia opisthoni bibunt.

BARBARI COROLL.

Acanthion spinulam significat. Est enim spinę albę proxima, sed minoribus multo folijs.

EX M. VERG. COMM.

Perisse capiti huic aliquid, sermonis parum sequax ductus ostendit. Quid autē desiderare, & amissum instaurare nos oporteat, Plinius. 24. uolumine, cap. 12. manifeste indicat: q de aculeatis plantis quibuscūq; agens, Acanthiū hoc his uerbis descripsit. Huic similis est spina illa quę gręci Acanthion uocant, minoribus multo folijs, aculeatis per extremitates, & araneosa lanugine obductis: qua collecta, etiā uestes quędā Bōbicis similes in oriēte sūt. Ipsa folia uel radices ad remedia opisthoni bibunt. Et hactenus Plin. Quę siq; ab eo dicta cū scriptore hoc cōtulerit, oīa eadē utrūq; esse inueniet. Pręterea, quę Plinius ait, lanugine obductis, in nullis gręcis hactenus inuenta, uerū ad explendā Acanthij & scriptoris huius historiā tā necessaria esse, ut sine eis nō possit integer sensus Diosc. esse: cōtraq; suo loco instauratis nihil aptius audiat. Erit ergo hic sermonis ductus. Spinę albę similia habet folia Acanthium, in summis extremitatibus aculeata, araneosa lanugine obducta: qua collecta, simulq; composita, bombicinis similes uestes sūt.

A

πότηριον

Pli. li. 25. ca. 10
lib. 27. cap. 12.
eod. i. cap. 12.

B

ἀκανθιον

D I O S C O R I D I S

De Acantha. CAP. XVIII.

C
ἄκανθα
ἰπνιδία

ACANTHAM, aut Hærpacantham, quidam Melamphyllon, Romani Pæderotam, aliqui Topiariam, alij Mamolariam, quidam Cræpulam uocant. Nascitur in hortis, petrosis, & riguis. Folia habet multo lactucaceis latiora, & longiora, Erucae diuisura, nigricantia, pingua, laeua. Caulis binum cubitorum, digitali crassitudine, laeuem prope uerticem, ex interuallis circumdatum, foliolis paniculas oblongas referentibus, Hyacinthi similibus. E quibus flos prodit albus, semen oblongum, luteum, caput thyrsi specie. Radicibus nittur longis, mucosis, rubris, & glutinosis. Quæ uitis igni, & luxatis artubus illitæ subueniunt. Potę urinam ciunt, sed aluum cõhibent. Ruptis, conuulsis, tabem sentientibus, mire profunt.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 22. cap.
20, & 22.

ACantha, siue Acanthos, topiaria & urbana est herba, elato longoque folio, crepidines marginum allurgentiumque puluinorum toros in hortis, historiali facilitate uestiens. Duo generaeius sunt, Syluestre, aculeatum, crispum, quod & breuius est, Agriacanthos appellatū. Alterum lene aculatum, quod proprie Pæderota uocant, alij Melamphyllon, de qua hic agitur. Vnguenti quoque genus est, quod Pæderota nominabant, quo & Demetrius Phalereus sibi os linebat. Alexis poeta feminas, quibus nimis candida cutis esset, Pæderote uti solitas in comœdia significat: quod & Aegyptium unguentum dicitur: ut in Staete diximus. Pausanias auctor est, genus herbae Sicyonis in uno tantum ueneris septo nasci Pæderota nomine, folio minore quæ faci, maiore quæ ilicis, & omnino quernis simili, altera parte candido, altera subarbo, ut albe Populi: hanc ibi tñ spectari, præterea nuscę gentium. Sit autem Acanthus hæc uulgaris spina, cuius & in Aspalatho meminimus, nec ne, dubito. Plinius certe duobus locis, altero Acanthon, altero Spinam uulgarem appellando, easdem utriusque medicinas tribuit, Spina est, & Appendix uocata: quoniam bacca in ea puniceo colore nominentur Appendices, siue ut ueteres dicebāt, Ampendices. Ii & Lumam pratenfis spinæ genus appellabant, & ab eo Lumeſta, & Lumarias falces, autor Varro: dictam ita, quæ a terra soluunt, id est, luunt eas agricolæ. Acanthos, Seruius inquit grammaticus, in Aegypto & Cyrenaica insula nasci fertur. Sed homo literator, herbarumque parum gnarus, cum Spina ægyptia confundit, quæ ab Acantho prorsus alia est, ut facile dignosci potest.

Seruius.
Achantus arbor est
in Aegypto, semper
frendens, ut china,
lanius. Et Achantus
dicta quasi spinis
plena, anaribos.
D
nim spina est: nam
est spinosa arbor.
Abundat hæc etiam in
Cyrenaica insula.
Vide Pomp. Sabinum
in Commentarijs
p. Virgilium in Ge-
orgiis, folio 218.

E X. M. V E R G. C O M M.

Hæc est Acantha, siue Acanthus ille (utroque enim genere a græcorum medicis, scriptoribusque & poetis alijs omnibus dicitur) quæ antiquis in tanto laudum & honoris ambitu fuit. Quæ Maroni pastoralis poculi ansas amplectabatur: quæ in hortis crepidines marginum, allurgentiumque puluinorum thoros, longioribus & latioribus folijs uestiebat: et in architectura Corynthiæ columnæ, capitulum grato foliorum amplexu nunc etiam ornat. Quæ inter aculeatas non censeretur, nisi in oblongis foliolis nucamenti modo caulem eius per interualla uestientibus, & ex quibus flos prodit breues aculeos natura illi seruasset. Quod ceteri interpretes cõmunis & uulgari græcorum codicum lectione decepti, ad Hyacinthinum colorem retulerunt: cum ad spinas referendum esset: ἰανυθὸς δὲ τῆς ἰσῆς legentes, quod est Hyacinthinis, cum ἄκανθῶς δὲ τῆς ἰσῆς, id est, spinosis & aculeatis legendum esset, nulla Acanthi cum Hyacintho foliorum coloris in flore, nucamenti, aut Spinæ cõmunionem, similitudinem. Descripsit Acanthum Plinius. 22. uolumine, & eiusdem numeri capite, Melamphyllōque, & Pæderota uocari & ipse ait: sed nullā earū uocū causam docuit: præsertimque cur Pæderota eā aliq̃ diceret: quæ tota græca uox est, nec aliud quæ puero rū amorē, aut quod a pueris amef significat. Quo magis demiret aliq̃, quod in Dioscoridis legit, a Romanis Pæderota Acanthū dici: cū uocis eius, quæadmodū & aliarū illarū græci tñ autores fuerint.

ἀγρία ἄκανθα

De Syluestri spina. CAP. XIX.

Est & syluestris Spina Carduo similis, aculeata, breuior quæ in hortis satius pueniat. Cuius radix ad eadē ad quæ superior pollet.

LIBER TERTIVS.

159

BARBARI COROLL.

DE Agriacantha, hoc est, sylvestri spina, proxime dictum est, ubi alterum spinę genus sylue-
stre nominauimus.

A

De Anonide.

CAP. XX.

ANonis, quam aliqui Onotida appellant, ramos habet frutico-
sos, dodrante maiores, frequentibus geniculis cinctos, cauis a-
larum multis, capitibus rotundis, folijs lenticulę, pusillis ad Rutę, aut
pratenfis Loti folia accedentibus, subhirsutis, odoratis, non iniucunde
olentibus. Muria conditur anteq̃ spinosa fiat. Cibis gratissima. Rami
acutioribus spinis, & ueluti durioribus aculeis horrent. Radicem mit-
tit candidam. Quę excalfacit, & extenuat. Huius cortex ex uino po-
tus, urinam ciet. Calculos comminuit. Margines ulcerum erodit. Ra-
dix cum decoquitur in posca, dolorem dentiũ collutione mitigat. De-
coctum eius potu hæmorrhoidas sanare creditur.

ἀνώνιος

BARBARI COROLL.

ANonis, & Ononis quandoq̃ dicitur, ut Galeno Theophrastoc̃, spinosa post uer, folio rü-
tę, aculeata, ramis ut Tribulus. Nascitur solo culto, præcipueq̃ in segetibus, aratro inimica,
uiuaxq̃ unice. Propagat se in annos, ideoq̃ runcanda & extirpanda tota est, cum terra mi-
bit imbris. Germinare incipit æstate, a frugibus perficitur autumno. Durat anno folium to-
to caule per interualla collocatum, ut corona. Flos mutilus in filiqua, nec conspectus. Est & a-
lia Ononis, cognomine Flomitis, quę a Dioscoride Onosima dicitur, quanq̃ sunt qui Onomi-
da, non Ononida uocent, hoc uolumine a nobis reddendam. Ononim porro dictam Photio
uult, q̃ asinos se ad illam terentes & scabentes iuuat. Plinius Anonin similem Fœno Gręco, Di-
oscorides Loto fenarię, aut Rutę faciunt, ut æstimare liceat, Lotum fenariam, cum Fœno Grę-
co eandem uideri, aut persimilem.

Pli. li. 29. ca. 4.
The. libro. 6.

EX M. VERG. COMM.

Inter aculeatas plantas omnib. facile cognoscenda quotañis renascit̃ Ononis, unice uiuax, &
in annos ipsa seipsam propagans: nisi cū terra imbris maduerit totā runcauerit & extirpa-
uerit diligēs agricola. Frondet ea uiuitq̃ in aruis, sed lætior in proscisso iteraroq̃ agro surgit, la-
bore hominũ ut ceterę fruges & ipsa pficiens: nihilq̃ alicuius locis hac peste frequentius: quę
non solũ pedibus ingredientĩũ aculeis suis nocet, sed aratorē etiā remorat, aratro inimica, & il-
li se implicans. Descripserunt Ononin antiquiores oēs qui de medica materia, aut de plantis ali-
quando egerunt, sed unus omniũ felicissime Theophrastus, 6. de plantarũ historia uolumine.

B

De Leucacantha.

CAP. XXI.

LEUCACANTHAM quidam Polygonaton, alij Phyl-
lon, alij Ischiada uocant, Romani Spinam albam. Radice Cy-
peri ualida & amara. Quę manducata, dolorem dentium sedat. Veteri
laterum dolori, atq̃ ischiadicis prodest, decocto cyathis tribus ex uino
poto. Eadem ruptis & conuulsis medetur. Radicis epotus succus eos-
dem præbet effectus.

λευκάκανθα

BARBARI COROLL.

Leuacantha, siue Leucacanthos, ab Acantha Leuce differt, ut sæpenumero cōmonui; prio-
rem gręce Plinius fere appellat; posteriorem latine Spinā candidā, id est, Acanthā leuce.

EX M. VERG. COMM.

VNo, eodemq̃ breuissimo capite Plinius, 22. uolumine omnem Leucacanthę huius histo-
riam & medicinam complexus est: dicendum ideo nihil nobis aliud superest, q̃ ex similitudine
aliarum plantarum Polygonaton Phyllon, & Ischiada dictam ab aliquibus fuisse: quemadmo-
dum ex earum plantarum historia cognouisse licebit; in quarum singulis aliquid est q̃h Leuca-

D ii

D I O S C O R I D I S

Canthæ huic æquale, aut commine sit. Sine caule, sine flore, sine Echino spina hæc est, folijs longis, aculeatis, Lactuæ similibus.

De Tragacantha. CAP. XXII.

τραγακάνθη

Tragacanthæ radix lata & lignosa, summo cespite nititur, furculos humiles, robustos, latissime fundens, in quibus minuta folia, nonnunquam tenuia exoriuntur. Quæ sub se spinas albas, retortas, & firmas occulunt. Est etiamnū Tragacantha lachryma, quæ, uulnerata radice manans, concreuit. Præstat pellucens, gracilis, sincera, & subdulcis. Cutis spiracula ut gummi obstruit. Huius increbuit usus ad oculorum medicamenta, ad tussim, exasperatas fauces, retusas uoces, cæterasque destillationes, cum melle in delinctu. Subdita quoque linguæ, liquefcit. In passo madefacta drachmæ pondere bibitur, contra renum dolorem, & uesicæ rosiones, mixto cornu cerui usto & cloto, aut scissi aluminis momento.

Pli, li. 13. ca. 21.

BARBARICOROLL.
Tragacantha, siue Tragacanthos, radicem spinæ albæ continet: in Creta nasci tantum credita. Sed & in Achaia, & apud Medos quoque prouenit, in Arcadia largissime: nec Cretica deterior, aspectu tamen prælata: lachrymam non incisura, sed sponte manando spissefcere Theophrastus existimat. Precium Creticæ in libras. 13. apud quam uidelicet & dignatio remansit.

EX M. VERG. COMM.
D In quotidiano medicinæ usu Tragacantha est: utque omnes lachrymâ passim nouerūt, sic peregrinam Italiæ stirpem. Si Theophrasto credimus, pauci nouisse nunc possunt in Creta, Arcadia, Peloponnesi Achaia, & Asiæ Mediâ nascentem. Quo magis græcos demiretur aliquis, qui natam apud se plantam, & plantæ lachrymâ corrumpi in hoc scriptore permiserint, perireque legitimam & necessariâ eius in sole densationem. Quo em loco hic ait, Vocatur Tragacantha etiam sectæ radici inherens lachryma, &c. defunt necessariæ uoces aliquot, quibus doceatur, sectam radicem spinæ huius lachrymam mittere quæ in sole densetur.

De Eryngio. CAP. XXIII.

ἐρύγγιον

Eryngion aliqui Eryngen, alij Caryon, alij Gorginion, alij Heronion, alij Origanum, Chlounion, alij Myracanthion, alij Moly, Aegyptij Crobyson, Magi Siserton, Romani Capitulum Martis, Daci Sicupnoex, Hispani Centumcapita, Aphri Cherdam, alij Oriam Chloem, alij Chida appellant. Aculeatarum generis est. Cuius folia in principio sale condita, in cibos recipiuntur. Lata autem sunt & extremo ambitu aspera, gustu aromatica: quæ cum adolefcunt, per multas caulium prominentias spinose inhorrescunt. In quorū summitatibus globosa capitula, durarū acutissimarūque spinarū ambitu stellatim circūuallant: quorū colos alias uiridis, alias albus, interdū cæruleus inueniūt. Radix oblōga, lata, foris nigra, interne cādida, pollicis crassitudine, odorata. Nascit in asperis, & cæpestribus. Vim habet calfactoriam. Pota menses & urinas pelit. Tormina, inflationesque discutit. Cōtra iocinerū uitia, serpentiū morsus, & hausta uenena, cū uino prodest. Bibit aduersus plurima, cum seminis Pastinacæ drachma una. Appensa illitaue tubercula discutere proditur. Pota cum hydromelite radix, opisthotonicis, & comitialibus medetur.

BARBARICOROLL.

Eryngion, clara in primis aculeatarum herba est. Genera eius duo, albicans, & nigricans. Priorem Græci Hecaton cephalon, nostri Centumcapita uocant, omnes caule & radice in cibos græcorum receptæ, utroq; modo, siue coquere libeat, siue cruda uesci. Radicem eius, alter utrius sexus similitudinem referre prædicant. Raram inuentu. Et si uiris contigerit mas, etiam amabiles fieri. Ob hoc Phaonem Lesbium dilectum a Sappho. Ipsa dura, fruticosa, caule geniculato, cubitali maiore aliquando, & satiuā quidem est; sed & sponte nascitur in asperis, & saxosis, & in littoribus maris, durior nigriorq; folio Apij. Sub solstitio colligi eam iussere quidam. Sunt qui & Acanon Eryngion ascribāt, sicut & Glycyrrhizam falso Asclepiades, ut meminuit Aetius, Eryngion cui Orion, hoc est, montani cognomen est, folijs describit paruis & angustioribus, flore aureo, & oculi figura. Ex Eryngij radice Gallia Cisalpina confectiōem cum saccharo, aut melle condit, Eryngiatum uocatam.

Si Eryngij caulem, ex grege ouis, capellæ aliquā morsu defectum ore substulerit, totus statim subsistit grex, relictoq; pascendi studio, nouo ueluti spectaculo attonitus, nō prius admittari rem desinit, q̃ accedens pastor caulem illum abstulerit: abiectoq; longius, inutile gregis sui ocium, ea ratione castigauerit. Auctores eius rei, Aristoteles primū, qui in nouo grege, & si gregis dux id fecerit, euenire dixit. Post eum Plutarchus, pluresq; alij. Quo magis miretur aliquis in huiusmodi re Plinij silentium, qui similia his pluraq; alia de candida Erynge tradiderit. Hic enim, ut herbarium decebat, necessarias medicinae Eryngij uires tantum tradere debuit. Cuius numerantur plures ab hoc scriptore, modo eius sint, appellationes: sed tam incertæ, & ex alijs plantis tam obscure repetitæ, ut nulla hætenus earum coniectura uti potuerimus. Id tantum monemus: quæ a prima statim sequitur, solo genere in declinatione a priore differre: neutro enim, & foeminino declinatur. Neutro hic, & Græci alij usi sunt: Plinius foeminino, uicesimo secundo uolumine capite septimo his uerbis de ea agens. Et clara in primis aculeatarum Erynge est, siue Eryngion. &c. Idem etiam, quam hic Hispanis Centumcapita tribuit, Romanam suæ ætatis appellationem fuisse testatur, sed candidam tantū ea uoce uocari solitā: Græci etiam eadem ratione εκατονκεφαλον a numero capitum dicunt. Quæ deinde Myracantha inter alias numeratur, a ui & radice odore facta est. Nihil enim aliud q̃ odoratam spinam ea significat uox, Cæteræ quales illic leguntur, tales alijs relinquuntur. Nortū nunc etiam Eryngium est, pluribusq; locis in Italia antiquum seruat nomen & usum: melleq; seruatur radix eius, nec habet ingratum in cibis saporem.

A
Pli. li. ii. ca. 166

VERG.

B

De Aloe.

CAP. XXIII.

ALOE ALIQVIBVS Amphibion, alijs Herminion, alijs Eryngion, alijs Tragoceros, Romanis Aloa, Barbaris Aloe dicitur. Cuius folium Scyllæ similitudinem habet, crassum, pingue, latum, rotundum, retrorsus pandum. Folia utrinq; gerit, ex obliquis spinosa, rariuscule striata, breuia. Caulis emittitur non dissimilis Anthericō. Flos albus. Fructus Hastulæ regiae cognatus. Graui tota est odore, & gustu amarissima. Radice una, ceu palo in terram depacta. Plurima, præpinguisq; in India gignitur, ex qua cōactus succus adfertur. Nasctur etiam in Asia, & Arabia, in insulis quibusdam & maritimis, ut in Andro, minime succo extrahendo idonea, sed ad glutinanda uulnera sane q̃ utilis, si detrita illinatur. Duo succi genera. Quoddam harenosum, quod fidens crassamentum purissimæ esse uidetur. Alterum ad iocineris imaginem uergit. Eligi debet syncæra, quæ nihil doli sentit, nitida, calculeorum expers, rufi coloris, friabilis ac iocineris modo coacta, facile liquefcens, eximie amaritudinis. Improbatur nigra, & fractu contumax. Gummi eam adulterant, quod deprehenditur gustu, amaritudine, & ualido odore. Eoq; argumēto, q̃ digitis friata non ad minima usq; fruz.

D iij

D I O S C O R I D I S

C sta resoluitur. Nec desunt qui Acaciam immisceant. Natura eius est spissare, exiccare, somnium allicere, & corpora densare, aluum resolvere. Stomachum repurgat binum cochlearium mensura, in aqua frigida, aut lacte pota. Sanguinis reiectiones sistit. Regium morbum purgat, tribus obolis ex aqua, aut drachmæ pondere in potu. Deuorata cum resina, aut cum aqua, uel melle cocto sumpta, aluum soluit. Purgationis perfectæ causâ tribus drachmîs sumitur. Alijs purgatorijs medicaminibus ammixta, præstat ut minus stomachum infestent. Sicca glutinandis uulneribus inspargitur. Vlcera ad cicatricem perducit, cohibetq;. Eadem peculiariter ex ulceratis genitalibus medetur. Disrupta infantibus iungit. Condylomata, rimasq; sedis ex passo sanat. Hæmorrhoidum abundantiam, & sanguinis eruptiones sistit. Pterigia ad cicatricem ducit. Liuires & insignita, ex melle tollit. Priuatim scabras, lippitudines, pruriginesq; angulorum permulcet. Dolorem capitis sedat, temporibus & fronti illita, ex aceto & rosaceo. Capillum fluentem continet, cum uino. Tonsillis, gingiuis, & omnibus oris ulceribus, cum melle & uino proficit. Oculorum medicamentis torretur, in munda & candenti testa, pennaq; subinde uersatur, ut possit æqualiter torreri. Lauatur, ut quod sit harenosissimum, tanq; inutile subsidat, & leue ac pinguißimum assumatur.

B A R B A R I C O R O L L

Pli, li. 27, ca. 4:

A Loelaudatissima ex India, post ex Syria Coele, ut Galeno placet, & Arabia. Improbatur e Syria, quasi multo dilutior & languida. Scrit eam Asia, in turbinibus cadorû, ut Sedum maius. Caulis eius tener rubet medius. Inuenitur & per se lachryma adhærens: ob id pauimentandum, ubi sata sit, præcipiunt; ne lachryma quæ manat, absorbeat. In Iudæa super Hierosoly-ma, fossilem gigni, & metallicam, fuere qui traderent, omniû deterrimâ, humidissimâ, nigram. Negat id huius operis præfatione Dioscorides. Familiare constrinxi Aloen, nemo ignorat, Virentem semper, propter Semperuiui marinum, appellatâ uulgo. Aloïdarium uero, medicina dicitur ex Aloe, ad uentrem soluendû, in Oribasio, Philagrîo, Aetio.

E X M. V E R G. C O M M.

A Spinis, quas cõmunes Aloe cum Eryngio habet, Eryngium & ipsa ab aliquibus dicta est, sed mala similitudine: quando in cæteris nihil dissimilius q; Eryngium & Aloe uidetur. Fuerunt etiam qui Amphibia hanc dicerent: quod nisi eadem illa ratione dicatur, qua in genere animalium Amphibia a græcis aliqua dicantur, incertam nobis causam habet. Sunt autem græcis Amphibia, quæ communem & ambiguum in utroq; elemento, terra, scilicet & aquis uitam degunt: qualem hic Castora secundo uolumine descripsit, & quales multæ aues ubiq; sunt. Pouteruntq; aliqui sic Aloem uocasse, q; procul a mari, & maritimis locis, ut hic ait, pariter nascitur: & si ut Amphibios diceretur, non satis discrimen id fore uideri possit. Neq; enim diuersa elemento sunt maritima, & quæ procul a mari distant. Orminion ab aliquibus dicta Aloe pariter fuit, q; utraq; altiore caule est: & quemadmodum Aloe in folijs aculeatas eminentias magis q; spinas habet, sic & Orminium, ut in historia eius certius patebit. Tragocerota postremo eandem Aloem certiore similitudine aliqui appellarunt: ab hircorum cornibus facta appellatione, quibus folia eius quantitate, longitudine, figuraq; apposite respondent. Est & inter appellationes has illud animaduertendum ex antiquissimorum græcorum fide, non dixisse nos in foliorum Aloes historia, habere eam utrinq; folia ex obliquo spinosa, sed utrinq; spinulas. In melioribus enim legitur ἀνδρία, id est, spinulas, non ἀκνίδια, quod commune nobis cum Barbaro est, & si naturæ rei q; id non magnopere interfit.

¶ De Absinthio.

CAP. XXV.

ABSINTHIUM aliqui Bathypicron, Aegyptij Somi, Romani Absinthium. Herba uulgo cognita. Præstantius in Ponto & Cappadocia. In monte Tauro nascitur. Vim habet calfaciendi & adstringendi. Bilem expurgat, quæ & stomacho & uentri inhæsit. Vrinam cit. Crapulam præsumptum arcet. Ad inflationes uentris, & stomachi dolores prodest, cum fœli & nardo gallico potum. Fastidia discutit. Arquatos sanat inadefacti dilutum, aut decocti ius, cotidie tribus cyathis haustum. Menses cit potum, aut cum melle appositum. Contra fungorum strangulationes conuenienter ex aceto bibitur. Aduersatur Ixiæ uenenis cum uino, Item cicuta, & muris aranei morsibus, & draconis marino. Anginæ eo cum melle & nitro perunguntur, & epinyctides ex aqua. Ad sugillata, & oculorum caligines ex melle illinitur. Item auribus, si manat sanies. Dentium, auriumque dolores decoctum, uaporis suffitu compescit. Decoctum in passo, dolentibus oculis oblinitur. Item præcordijs & iocineri, tritum cum cerato cyprino. Stomacho quoque longa ualitudine laboranti cum rosaceo. Cum ficis autem, aceto & Erui farina, aquæ inter cutem lineosque subuenit. Vinum ex eo fit, quod Absinthiten uocant, præsertim in Propontide & Thracia, quo ad antedicta utuntur, cum febris caret. Alioquin in æstate propinant, & acceptam huic uino incolumitatem referunt. In parsum arcis Absinthium, uestes ab erodentium iniuria uindicat. Culices eo, & oleo perunctis abigit, & a corpore arcet. Atramentum librarium diluto eius temperatum, literas a murium erosionem tuetur. Existimatur liquamentum eisdem præstare effectus. Attamen potionibus improbat: quoniam stomachum male habet, & capitis ciet dolorem. Sunt qui cocta Amurca liquamentum adulterant.

BARBARI COROLL.

Absinthii frigidis prouenit. Latinarum ferijs certabant in Capitolio quadrigæ, uictorque Absinthii bibebat: sanitate interpretantibus in eo præmio maioribus. Poetæ Græci sunt, qui Absinthium quandoque dixerint. Hippocrates, Absinthium Cyprium commendat.

¶ De Marino Absinthio.

CAP. XXVI.

RBSINTHIUM Marinum, quod aliqui Seriphum, Latini Centoniceum uocant, copiosissimum in Tauro monte, iuxta Cappadociam, & in Taphysiri Aegypti gignitur. Quo Asiatici pro Oliuæ ramo utuntur. Herba est tenuis, Abrotoni parui similitudine, referta minutulis seminibus, subamara, stomacho inimica. Ea grauiter olet, & cum quadam calfactione adstringit. Id per sese, aut cum Oryza coctum, interaneorum animalia, teretesque tineas, adiecto melle enecat. Aluum laxat. Cum edulio autem, uel lenticula decoctum, eadem præstare potest. Pecora maxime pinguescunt hoc pabulo. ¶ Tertium genus Absinthio assignatur, quo Galatia Alpibus finitima scatet, Id patrio nomi-

A

ἀψινθιον

Vinum factum ex
Absinthio.

B

Pli. li. 27. ca. 7.
Theoph. li. 9.

ἀψινθιον θαλάσσιον

Cne Santonicum uocant, regionis in qua nascitur cognomento, Absinthio non dissimile, uerum subamarum est, non adeo seminis fecundū. Eadem quæ Seriphium potest.

BARBARI COROLL.

Absinthium Seriphion, siue Seriphon, angustius priore, minusq; amarū. Absinthij genera plura. Vulgare, siue Ponticū, de quo diximus. Seriphium, id est, marinū, de quo hic agitur. Ponticum a Ponto ueniens, ubi pecora pinguescunt illo, & propterea sine felle reperiuntur, neq; aliud præstantius, multumq; Italico amarius, sed medulla dulci. Tertium Santonicum a Gallicæ ciuitate appellatum. A Columella uero Santonica herba dicitur.

De Santonico, proxime dictum est. Illud notatu dignum arbitror, Santonicum Absinthio similis describi, quam Seriphium, aut quod idem est, marinum: quoniā marinum Abrotoni potius, q̃ Absinthij figura demonstratur ab Dioscoride ac Plinio, ut prædixi. Recentiores contrarium decernunt. Et sane uidentur haud falsa dicere: Marinum, siue Seriphium docentes Absinthio q̃ Abrotono similis, Santonicum Abrotono, q̃ Absinthio. Marinum certe, id quod passim in litoribus, & secus mare nascitur, sapore salso, & folio albicāte, notum omnibus, nihil fere commune cum Abrotono. Galenus quoq; Seriphium inquit, & conspectu & gustu Absinthio simile est, præterq; q̃ minus linguā adstringit, q̃ Absinthium, sed plus excofacit, & cum quodam salis gustu, amarum sentitur.

EX M. VERG. COMM.

Tria diuersis locis a Plinio etiā Absinthij genera numerantur, Ponticum, Santonicum, & quod Seriphion, siue Marinū a cunctis uocatur, religioni in Aegypto consecratū, cōmune & ubiq; proueniens. Ponticum est, a regione, in qua optimū nascitur, bonitatis magis q̃ naturæ merito inuenta appellatione. Hoc in Dioscoride legitur Rusticum a Romanis uocari: sed nullā habet ea appellatio rationē. De Santonico hic certissime egit, quondāq; in honore & nota Absinthij gentis nomen id fuit, ut cum cecinit ille, Santonica medicata dedit mihi pocula uirga.

DQua parte autē Santones in Gallia ultra Alpes quondā fuerint, & adhuc sint, omnibus patet. De Seriphio, quod & Marinū dictum quondā est, duobus locis Plinius egit lib. 27. cap. 3. his uerbis. Est & Absinthium marinum, qd̃ quidam Seriphium uocant, probatissimū in Taphosiri Aegypti. Huius ramū liliaci præferre solēne habent, angustius priore, minusq; amarum, stomachoq; inimicū. Iterumq; lib. 33. capite. 1. quo loco de eo sic ait. Nascitur & in mari Absinthium, quod aliqui Seriphium uocant, circa Taphosirim Aegypti maxime, exilius terrestri. Quæ id eo repetita a nobis hoc loco sunt, ut quæ a principio capitis huius incerta, aliundeq; repetita, & mixta simul difficilem habent intellectum, legentibus certiora fierent: intelligerentq; omnes, ex Pontico Absinthio ad Seriphium, siue marinū hæc translata esse, quæ in alijs leguntur. Largissime in Cappadocia, & monte Tauro prouenit. Quæ Pontica sunt, & superiore capite, uulgarī Absinthio in censu bonitatis ab hoc ipso dicta. Cum probatissimum in Ponto & Cappadocia nasci ait. Miscere enim diuersa hoc est, intellectumq; rerum adeo confundere, ut nullus possit huius scriptoris usus esse. Qui enim potest Seriphia herba, & ad mare nascens in Cappadocia, & Tauro monte inueniri? Ideoq; nos omnem eam partem, ueluti inutilem, omnemq; illic sensum turbantem expunximus.

De Abrotono.

CAP. XXVII.

*Abrotonum
Germanicum
subranum.*

Abrotonum aliq̃ Abutonon, aliq̃ Absinthium, aliq̃ Heraclion, aliq̃ Cholopœon, aliq̃ Absinthiomenon, aliq̃ Theliphthoricon, aliq̃ Procampylon, Magi Neura phœnicos, aliq̃ Cynanchiten, Romani Absinthium ponticum, nonnulli Thelythamnium, aliq̃ Glycyn ancona uocant. Duorum est generum. Fœmina quadam arboris specie fruticans candicat, circum ramulos folijs Seriphi modo minutim incisis. Floribus referta est, comantibus in summo fulgore auri corymbis. Quod per æstatem prodijt, suauiter olet, cum grauitate quadam & amaro gustu. Id genus Siculum esse constat. Alterum mas uocatur, sarmentosum, tenui semine uti Absinthium. Plurimū in Cappadocia gignitur & Galatia Asia:

tica, atq; in Syriæ Hierapoli. Crudum semen, tritum & fectum ex aqua, in potu auxiliatur orthopnoicis, conuulsis, ruptis, coxendicibus, urinae angustijs, mensibus suppressis, aut remorantibus. In uino potum exitialem uenenorū antidotum est. Rigoribus ex oleo illinitur. Serpentes & substratu & nidore fugat. Contra ictus eorū cum uino potum prodest. Priuatim efficax contra scorpionum & Phalangiorum uenena. Oculorum inflammationibus commode illinitur, cum cotoneo cocto, aut pane. Tritum cum farina hordeacea, decoctumq; tubercula discutit. Iri ni compositionibus ammiscetur.

B A R B A R I C O R O L L.

A Brotonū campestre, ac montanū. Hoc foeminā intelligunt, illud marem. Amaritudo Abrotoni in utroq; Vacuum sponte prouenit, cacuminē suo se propagans. Seritur quoq; sed melius semine, q̃ furculo, aut radice. Numerosum eius semen. Radix una, quæ alte descendit, ceteris in summo terre leuiter hærentibus. Floret cum Fraxino, Siculū laudatissimū, dein Galaticū, Pamphilus, Abrotonū a Romanis Santonicū appellari credidit, a Galeno reprehensus. Græcū uulgus, a contrario Melitinē uocat Abrotonū, sicut semen acrius, & ab interitu tinearum Helminthoboronom, Dioscorides a quibusdā Thelyphthoron, & Thelythanon, & Glycyna Aconna dicit appellari. Saneq; uidetur ij ad historiā, & uetus prouerbiū respicere. Ea est huiusmodi. Lydi gens in libidinē effusissima, foeminas ingenuas constuprare in hortis, ad hoc flagitiū questis, amoenitatibus excultis, aliquādiu impune solita est. Demū Omphale mulier, dominatione haud magno negotio, effœminatis & luxu diffluentibus excussa, imperitare cœpit ipsa: ubi eos cruciatibus uarijs affectos, ulta est, in uxores eorū desæuijt: inclusas enim eas, eisdem septis prostituit fœtibus. Inde uiridario nomen, Glycys aheon, quod & Thelyphthori, & Thelythamni uocabulo significatur, ceu Abrotono consitus fortasse locus esset is.

Pli. li. 27. ca. 7.

De Hyssopō.

CAP. XXVIII.

Hysopum aliqui Later uocat, alij Cassialam, Aegyptij Pesalem. Hærbæ nulli non cognita. Duum generum est, montanum, & hortense. Optimum est Cilicium. Vim habet extenuandi & calfaciendi. Decoctū cum ficis, aqua, melle, & ruta, potumq;, peripneumonicis, diuturnæ tussis, suspiriosis, destillationibus & orthopnoicis auxiliatur. Tineas enecat. Idem facit, si cum melle delingatur. Crassum humorem per aluū extrahit, decoctum ex aceto mulso epotum. Ad subducendam aluū cum ficis uiridibus detritis manditur. Vehementius addita Iri, Cardamomo, aut Irione, derjcit. Colorem in corpore fouet. Lienī, & aquæ intercutem, cum fico, nitroq; inflammationibus quoq; ex uino illinitur. Cum feruente aqua impositū, sugillata discutit. Cum decocto ficorum optime anginis gargarizatur. Decoctum cum aceto, dentium dolorem in collutione sedat. Inflationes auricularū uaporis suffitu discutit.

Hysopum, siue Hyssopus. Præfertur Hippocrati Cilicium, sed e Tauro monte; Dein Pamphilum, & Smyrnæum.

Pli. li. 25. ca. 11.
lib. 26. ca. 11.

E X M. V E R G. C O M M.

Non negligendi usus in medicina Hyssopus est: quā inter cætera hic ait aluū multo efficacius purgare, additis Irīde, aut Irione: aut ut cæteri interpretes uerterunt, Cardamomo: ut autem nos ueterū codicum fide admoniti, Nasturcio; Multa enim, quoniā facilis lubricusq; est lapsus a Cardamomo ad Cardamum, quod Nasturcium est, duarum huiusmodi uocum inter se in scriptoris huius, nouis & antiquis codicibus commutatio & alternatio est. Nobis præ-

D I O S C O R I D I S

Cter meliorū codicum fidem, aptius ad deſciendā aluum Naſturtium q̃ Cardamomū etiam uſum eſt. Sigdem in Cardamomi decretis nihil q̃d ad hunc uſum p̃tineat, in Naſturtio aut legi-
tur, & inter cæteras eius uires numeratur aluū turbare, q̃d a deiectione eius non longe abeſt.

¶ De Stichade.

C A P. XXIX.

σιχάς

Stichas, quā aliqui Syncliopa, alij Alcibiadem, alij Pancration, nonnulli Styphoniā, Aegyptij Suphlo, Magi Pythonis oculū, Romani Sciolebinam uocitant, iuxta Galliam in inſulis eiufdem nominis, e regi-
one Maſſiliæ gignitur, unde cognomentū accipit, Herba tenui ſemine,
coma Thymi, longiore folio, ſubamara guſtu, & aliquātum acris. Cuius
decoctū Hyſſopi modo ad pectoris uitia efficax eſt. Antidotis miſcetur.
Viſcera omnia, & uniuerſum animantis habitum extenuat.

Pli. li. 17. ca. 12.

Stœchas, odorata herba Hyſſopi, aut Thymi coma. Confudere quidam recentiorum Stœ-
chaden cum Stachye, Item cum Santonico Abſinthium.

B A R B A R I C O R O L L.

Maſſiliam incolentibus cunctis notiſſima Stœchas, eiufq̃ gentis mulieribus poſt puerpe-
riū in quotidiano uſu eſt. Siquidem incenſa, Stœchadis ſuffitu a partu ſtatim adhuc confirmat
præteriti puerperij laxamenta, omnemq̃ corporis infirmitatem. Quæ eius uires in græcis ali-
quot non leguntur. Verūtamen reſtituendæ huic capiti fuerūt, propterea q̃ in antiquioribus &
melioribus adhuc leguntur. ἡ φράσις λεπίται, ῥύπται καὶ ῥωννύται. Quinetiam Paulus Aegineta in. 6.
has illi uires præcipue tribuit, σιχὰς ἡ φράσις, ῥύπται, ῥωννύται: τὰτε ἀσάγγα καὶ ὅλην τοῦ σώματος ἴσιν.
Quod eſt. Occludit Stœchas, abſtergit, confirmat interanea, & torum animalis habitum. Quo-
rum aliqua in impreſſo non leguntur: ideoq̃ cum pleriq̃ alijs a Barbaro relictæ, quoniā quo
Dioſcorides codice ille utebatur, nihil huiufcemodi habebat: ſed ex meliorum codicum fide,
& Paulo Aegineta reſtituenda erant. Quod nos fecimus.

D

ὀρίγανος ἡρακλιδῶς
τιμὴ καὶ χυλὴ

¶ De Origano.

C A P. XXX.

Organum Heracleoticum, quod & Cornelion uocant, folium
habet Hyſſopo non diſſimile, umbellamq̃ non in rotæ ſpeciem
orbiculatam, ſed ueluti multifidam, ſemine in ſummis uirgis haudqua-
quam denſo. Excalfacit. Vnde decoctum cum uino potum demorſis a
ſerpente conuenit. Si cicutam, aut meconion hauſerunt, ex paſſo: ſi gi-
pſum, aut ephemeron, ex aceto mulſo propinatur. Ruptis, conuulſis,
hydropicis cum fico eſui datur. Aridum acetabuli menſura potum in a-
qua mulſa, atros humores per aluū extrahit. Menſes ciet, & tuſſi cum
melle linctum medetur. Ad pruriginem, pſoras, regiumq̃ morbum de-
cocti ius, in balneis prodeſt. Succus uirentis tonſillas, uuam, & oris ul-
cera ſanat. Et per nares ex oleo irino inſuſum trahit. Aurium dolores
cum lacte mulcet. Conſicitur ex eo & cepis & rhois frutice quo ad obſo-
nia utuntur, uomitorium medicamentum, his omnibus in cupreo uaſe
per tricenos dies inſolatis, dum caniculæ ſyduſ ſagrat. Hærbæ autē ſub-
ſtratu ſerpentes fugantur.

Pli. li. 21. ca. 10.
lib. 20. ca. 14.

Organum, nigrum, & candidum. Priori nullum ſemen, candido perq̃ minutum. Id autē
cui odor eſt, Creticum uocatur. Negant in Arcadia crumpere, quo ſtatu a mari non accedit.
A ſatu non ante trigefimū diem emicat. Folia ei cadunt a cacuminibus. Aemulus Thymbæ,
hoc eſt, Cunilæ uocatæ ſapor. Nunq̃ utrumq̃ additur, quippe ſimilis effectus. Organū ei ta-
men dumtaxat Aegyptū præfertur. De Cunilæ tribus generibus, in Thymbra diſputabitur:

sicut de Cunilaginibus quatuor in Conyza. Origanum tam pertinaci cum Brassica dissentit odio, ut arefaciat, sugatque aduersum. Origani multa sunt nomina. Heracleoticum, quod a nostris Cunilaca, siue quod magis probro, Cunila Gallinacea uocatur, ab Heraclea Ponti dictum, uel Plauto teste in Triummo.

In Ponto inquit, ubi Absynthum fit, & Cunila Gallinacea.

Sub qua tam Creticū, quā Aegyptium intelligunt, de qua praesens mentio. Deinde est Origanū Onitis, de quo proxime differendum est. Tertium Heracleoticū syluestre. Quartū Tragoriga-
nū. Eius duae species a Dioscoride redduntur, quae a Plinio tribuuntur sunt Heradio. Non est autem omnino idem, Heracleoticū, & Heradium. Prius inter Cunilas accipitur a nostris, posterius pro Tragorigano sumptum uidetur a Dioscoride. Origanum, & Origanus dicitur, producta quae ante ultimam est syllaba. De syluestri & Tragorigano statim prodetur.

EX M. VERG. COMM.

Prima Origanus illa ab Heraclea Ponti ciuitate, bonitatis notam & laudem nominis eā inuenit; dictaque Heracleotica est, ut gentis cognomine illo, a syluestri, & ab Onitide distinguere-
tur, & prima probaretur. Quae itidem causa fuit, ut Heradios eadem diceretur; quod Plinius 10. uolumine, cap. 17. indicat; & si hic uideatur tertium illud & agreste genus potius Heradium uocare. Deerat in aliquibus graecis Heradij illa uox; nosque eam ex meliorum codicum fide huic scriptori restitimus. Fecimusque id autore Nicandro in Theriacis suis: qui non tantum πανάκτιον κοιλαν eam uocari tradidit, uerū ἡράκλειον ὀρίανον. Versiculi eius sunt, πανάκτιον κοιλαν, ἡν τε καὶ ἡράκλειον ὀρίανον ἀμφενίπουνσι. Adiecitque antiquissimus eius interpretes ex autoritate Dioscoridis, Cunilam ab aliquibus Heradium uocari & Origanum, ab aliquibus autem syluestrem Origanum: & Panacem, siue Panactiam, quae omnibus morbis medetur: nihilque Onitidis eius, quae secundum genus huic scriptori facit, aut Nicander, aut interpretes eius meminerunt. Vocauitque Dioscorid. Panacem agrestem illam tantum, quae sibi tertium genus facit, cum tamen Nicander priorē illam ea laude ornauerit. Quae omnia, quod paulo ante dictum a nobis est, indicant, non posse in tam diuersa de Origano tradentibus antiquis scriptoribus, certum aliquid constitui. Nihil etiam in Plinio, multis locis, minus certum Origanos & Cunilas plures quam hic, Theophrastusque, et aliter tradente, graecisque aliquando nominibus, aliquando latinis, nulla certa ratione utente, praefertimque in Cunila. Quae graeci uocant κοιλαν, pene eadem multis locis legentes, merito suspendit. Ob eam causam nos nihil censere ausi, nihil maluimus quam quod nesciremus dicere. Eam hic scriptor ait μέλαινα κατὰ κοιλαν ἄνιν. quae si uerbum de uerbo uertas, nihil significabunt aliud, quam per aluum nigra ducere Origanum. Plinius de Origani uiribus & medicina libro. 20. cap. 17. agēs, extenuare eam ait crassiores pituitas & nigras: eumque imitatus Barbarus, extenuare per aluum, & ipse pituitas nigras dixit. Nos alios omnes secuti, nigra illa ad atram bilem tantum contraximus, nullibi pituitam nigro colore tradi simpliciter inuenientes: in quo posterioribus medicis subscribentes, qui omnes melancholicos humores purgare Origanum dixerunt, certius rem docere arbitrati sumus.

De Onitide. CAP. XXXI.

Quae Onitis appellatur, candidiore est folio, non dissimilis Hysopos. Semen ueluti coniunctos corymbos habet. Vis ei Origani Heraclei, sed multo inefficacior.

Barbari Coroll. Origanum Onitis, siue Prasion. Quidam & Ornithis, quasi Gallinaceum dixerunt, sed genus illud Heracleoticum uocari cerno: quemadmodum proxime indicatum est.

De Syluestri Origano. CAP. XXXII.

Syluestre Origanum aliqui Panaces Heracion, alij Cunilam uocant, ex quibus est Nicander Colophonius. Folijs est Origani, ramis tenuibus palmum altis, in quibus umbellae Anethi insunt. Flores caedidi. Radix tenuis, superuacua. Peculiariter percussis a serpente, folia & flores ex uino poti, auxiliantur.

Barbari Coroll.

In primo genere quod Heracleoticum uocatur, Galenus Origanum syluestrem, Panaces He-

D I O S C O R I D I S

C racion, & Cunilam quoq; dici solitum affirmat.

αργεριναν

De Tragorigano. CAP. XXXIII.

Tragoriganum tenuis frutex est, syluestri Serpyllo, aut Origanis similis, folio & ramulis. Quibusdam in locis uirentius inuenitur, & latioribus folijs, satis glutinosum. Alterum exilibus furculis, ac tenuibus folijs, quod aliqui Prassium uocauerunt. Optimum est Cilicium, & Cretense, & Smyrneum, & in Chio, Cooq; proueniens. Omnia excalfaciunt. Vrinam cient. Aluo accommodantur. Decoctio potu bilem deiciunt. Lienosis ex aceto bibere prodest. Contra pota ixiæ uenena in uino bibuntur. Menses trahunt. Peripneumonicis, tussientibus, ex melle in eclegmate dantur. Grata ac mitis eorum potio est. Quare cibum fastidientibus, & stomacho acide ructanti, imbecilloque traditur. Item si a maritima iactatione nausea, & æstus præcordiorum excitetur. Tumores uero cum polenta discutiantur.

BARBARI COROLL.

De Tragorigano dictum est in Origano Heracleotico.

EX M. VERG. COMM.

Possimus autore Paulo Aegineta, de tam multis Origanis dicere, quod de tam multis antequorum Dñs sapientiores quondam dicebant: nominibus tantum distingui Deos, unam tñ omnium potentiam esse. Simul em̄ de omnibus lib. 6. is egit, complexusq; cunctas, incidere, exrenuare, siccareq; & calefacere in tertio ordine Origanos omnes dixit: quod parum ab eo abest, si qs dicat nominibus distingui Origanos, omniū tñ similes & easdē uires esse. Quo sensu intelligēda sunt q̄q; ab hoc ipso scriptore hoc capite dicuntur, θερμαντικοὶ δὲ πᾶσαι καὶ οὐρητικοὶ καὶ ἰσχυροὶ, &c. Quod est, ut nos reddidimus, Omnes calefaciendi uim habent, &c. Plinius tamen Tragorigano privatim uires quaspiam alias tribuit, quas poterunt uolentes in eo uidere quod diximus uolumine & capite.

γλῆχων

De Pulegio. CAP. XXXIIII.

Glichona Græci, aut Blechra, alij Arsencanthō, Latini Pulegium uocant, Galli Aluolū, Aphri Apoleium, Quidam Galiosolim. Hærbæ uulgaris noticiæ. Extenuat, calfacit, decoquit. Menstrua, secundas, ac partus eiicit. Pulmonis uitia ex melle & aloë potum extrahit. Conuulsis auxiliatur. Nauseas, stomachicq; intercisiones, ex posca p̄mulcet. Atram bilem per aluum exigit. Bibitur in uino utilissime contra serpentium morsus. Defectos animo recreat, cum aceto naribus obiectum. Gingiuas arefacti cinere corroborat. Illitum cum polenta, inflammationes omneis sedat. Podagris per se subuenit, impositum usq; dum rubescat locus. Cum cærato uaros extinguit. Lienosis cum sale utiliter illinitur. Decoctum eius ablutas pruriges mitigat. Conuersas uulvas corrigit. Contra inflationes duriciasq; uulug, in defessiones conuenienter adijcitur. Vocant aliqui Blechona: quoniam dum floret gustatum a pecoribus, balatum concitat.

BARBARI COROLL.

Pli. li. 20, ca. 74.

Pvlegium, ipso brumali die germinat in carnarijs, refloretq; Ramulis etiam a parente abiunctis ut Scylla. Nascitur hoc etiam non satum. Semel uero satum, diutina ære durat. Magna tum Nepeta & Mēdia Pulegio societas. Formina in eo efficacior, florem habet purpure-

um, Mas candidum. Vtriusq; recens incensus pulices necat: unde nomen Pulegio. Habetur & Pulegium sylvestre, Origano simile, folijs minoribus q̃ sativum, & a quibusdam vocatur Dictamnus: occasiōe hinc orta, Dictamnū Creticam Pulegium sylvestre nominātum. Pulegium græci Glecona, & artice Blechon, sed & Blechon quoq; vocant, ut inq̃t Dioscorides. Ego Blechon Hippocrati, pro legumine quodam accipi uideo apud Galenū. Pulegium (ut dixi) brumalis herba dici potest, quemadmodum & solstitialis aliquæ dicuntur. Plinius, Condurdō inquit, solstitialis herba, flore rubro, suspēsa in collo cōprimit surmas, Plautus q̃q; in Pseudulo. Quasi solstitialis, inquit, herba paulisper fui, Repente exortus sum, repentino occidi.

E X M. V E R G. C O M M.

Qvas Plinius uigesimo uolumine, cap. 14. de hoc ipso Pulegio agens, intercisiones uocat, non satis certa nobis indicatione, priuatim ne labem aliquam eius partis sic appeller, an late parentes in hoc scriptore & alijs *ἀνθυμν*, idest, morsus & erosiones. Intulit contra confectioni castigationis graui amaritudine græcus sapiens idem Pulegium, quo tempore dissidentibus & lasciuientibus ciuibz suis, in pulpitem progressus, nihil locutus aliud, uerum sola prolata pulte, cum eam Pulegij ramulo identidem miscuisset, e concione abijt: humili quidem, & facile contemnendo p̃cepto, nisi intellexerit aliquis, nullas comitari frugalitatem ciuium infamiationes, quod cum polenta Pulegium stomacho p̃stat: ne lasciuie petulāterq; aliquid acturos homines, qui paucis contenti, ex horto & agro, non ex macello & foro uitam sibi quesierint: et quas Pulegiū cū posca stomachi erosiones sanat, frugi id uitę genus, nihil male cogitantes ciues, cōcordiā et cōmunē dignitatē amare cōegerit. Erat, ut ex his cōjcere licet, quidianus in sanitatis usu Pulegij cibis. Seruabātq; id sale aliorū Salgamorū mō, ut autor ultimo sui op̃is uolumine Columella est. Nec p̃merito tā multos habet in medicina usus, q̃bus & in sanitate utile etiā est.

De Dictamo.

CAP. XXXV.

Dictamnū, aliquibus sylvestre Pulegium uocatur, alijs Embaton, alijs Belouacos, alijs Artemedeion, alijs Cretica, quibusdam Ephemeron, nonnullis Eldia, aliquibus Belotocos, aut Dorcidion, aut Helbunion, Romanis Vstilago rustica. Cretensis hærba est, acris, læuis, Pulegio similis, sed maioribus folijs, quæ tomento quodam, spissaq; lanugine pubescunt. Florem nullum, aut semen profert. Præstat omnia quæ sativum Pulegium, sed efficacius multo. Non potum modo, sed appositum quoq; aut suffitum, defunctos partus ejicit. Pro dunt in Creta capras sagittis percussas, huius hærbæ pastu, eas excutere. Purgandi uim habet succus illitus, aut cum polenta tritus. Hærba impactos pedibus, reliquoue corpori aculeos, illitu refigit. Ad lienis dolorem efficax habetur. Siquidem ipsum imminuit. Metunt semen æstate & autumnō. Radix eius gustu calfacit. Partus accelerat. Succus cū uino potus, contra serpensium morsus p̃sidio est. Tanta hærbæ facultas est, ut olfacta abigat bestias quæ uenenato ictu sæuiunt, appensaue exanimet. Vulneribus ferro illatis, & uenenatis morfibz, infusus succus p̃sentaneo est remedio, si etiam ab instillatione statim in potu assumatur.

B A R B A R I C O R O L L.

Dictamnū, nō Dictamnū ex Theophrasto, & Virgilij quodā uersu lego. Ramis hoc p̃tenue, Pulegio etiā gustu simile. Caulis nullus, radix gracilis & superuacua, & in Creta quoq; nō spaciōse nascit: nec nisi in asperis, quæ uera Dictamnus sit, minimo p̃dere, accendēs os; quo argumento a falsa proinus discernitur. Qui legere eam, manipulos in ferula, uel harundine condentes p̃eligant, ne potentia euanescat. Mire a capris expetitur. Dictamnū legitimam in Felicis horto Patarij uidisse crederem, folijs interpunctis, quemadmodum & pingitur, nisi q̃ non

E ij

A

Aικταμον

B

The. li. 9. ca. 16

D I O S C O R I D I S

C alibi q̄ in Creta prouenire scribunt. proinde Pseudodictamnnum potius eam fuisse, q̄ Dictamnnum arbitror.

ψευδοδίκταμον

¶ De Pseudodictamo. CAP. XXXVI.

Q V O D Pseudodictamnnum uocant, multis in terris nascitur, antedicto simile, sed minus q̄ illud acre. Eosdem effectus præbet, sed inefficacius multo.

BARBARI COROLL.

Pseudodictamnnum, folio simili, ramulis minoribus, a quibusdam Chondris uocatum. In pinguibus agris nascitur.

¶ De Cretensi Dictamo. CAP. XXXVII.

D Efertur a Creta alterum Dictami genus, folijs Sisymbrij, ramis maioribus. In quibus flores syluestris Origani, nigri, molles. Odor foliorum inter Sisymbrium & Saluiam iucundissimus. Efficax ad eadē, sed uehementius nares ferit. Miscetur emplastris, & medicaminibus quę aduersus serpentū iniurias confingunt, Theriaca uocāt.

BARBARI COROLL.

Dictamnnum hoc neq̄ facie, neq̄ effectū simile uero est.

EX M. VERG. COMM.

D Væ desiderari posse in hoc scriptore uidentur, quæq̄ nobis prima fuit causa, cur omnē Theophrasti de Dictamnīs historiam commentationibus his nostris adijceremus, quibus quod ad eius appellationes pertinet, addendum adhuc est. Artemidion, s. dici Dictamnnum a uenatrice dea Diana, quam Græci Artemida uocant: qm̄ uulneratæ ab ea in uenatione capræ & ceruæ, eius herbæ pastu sanarentur. Quod erat numini in primis gratum, sine maleficio & naturæ iactura, studium & uoluptatem suam amanti. Eademq̄ de causa Dorcidion, quæ si cerualem (dorcada enim græci Inulum, & in ceruorum genere minores) uocāt: quod animal Plinius ait Dictamnnum hanc ostendisse: uulneratis eo pastu, statim decidentibus telis. Fœminino genere hic Dictamnnum ueluti herbā, Theophrastus, pluresq̄ alij neutro tradiderunt. Quę generis mutatio multa in plantis est: non tam quia sexu aliquę a ueteribus discretæ fuerunt, q̄ quia alterutro genere eas antiquissimis appellare placuit: interpositaq̄, n, litera Dictamnnum, non Dictamus dicenda est. Indicant id græcorum codices omnes Theophrasti, huius, aliorūq̄ omnium qui forte Dictamni meminerunt. Indicat & poeta noster in. 12. Aeneidos suæ canens. Tum Venus indigno nati concussa dolore, Dictamnnum genitrix Cretæa carpit ab Ida, Puberibus caulem, folijs, & flore comantem Purpureo: non illa Seris incognita capris, Gramina cū tergo uolucres hēdere sagittæ. Nisi enim producta sit eius uocis penultima syllaba, stare uersus non possit. Quod bene, & ex antiqua Dictamni appellatione feliciter dictum, eandem in homine totius naturæ alioq̄ peritissimo diligentiam desiderari sæpenumero nos cōegit: & in Dictamni pictura, quam ille æternam in suo carmine faciebat, tria eius nō miscuisse gñā. Quod em̄ in eo est, Dictamnnum genitrix Cretæa carpit ab Ida Puberibus folijs, ex uera ueri Dictamni historia est. Siquidē in Creta priuatim nascitur: & ut hic ait, γρηγορευδὴ τὰ φύλλα ἔχει. καὶ ἰσχυρὰ τινὰ ἐπίφυσιν. Quæ enim hic ait, tomentosa folia, & lanosam adnationem, ille ab hominis lanosa pubertate, felicissime indicauit. Quod uero statim ait, caulem & flore comantem purpureo, non ex ueri Dictamni, sed ex eius historia est, quod Theophrastus tradidit, solo nomine Dictamnū esse Sisymbrij folio maioribus ramulis, nec eiusdem usus, aut potestatis. Quodq̄ hic præterea ait, agrestis Origani flore esse medio inter Sisymbrium & Eleisphacō odore. Dictamnū em̄ cretensem herbam omnes sine caule, sine flore, & ob id sine semine, excepto Theophrasto, descripserunt: q̄ quo diximus loco, semen Dictamnno tribuere uidetur: & si semen, prius etiā florē. quando hic naturę ordo est, ut in cunctis semen ex flore aliquo fiat. Verba eius sunt, χρῶνται δὲ τοῖς φύλλοις, οὐ τοῖς κλωνί, οὐδὲ τῷ καρπῷ. quod est. Vtuntur autem folijs, non ramulis, nec semine. Negat Theophrastus seminis usum: qui negandus non fuerat, si natura illud negasset. Ceteri oēs caulem & florem, & semē in Dictamnno negauerunt. Poruicq̄ Maro hunc sequi, & si tantus erit, qui aliorum exemplo, in fabulosa re uoluptati magis q̄ utilitati legērium cōsulere.

Nec nos aliam ob causam locum indicauimus, q̄ ut legētes moneremus, aliam ex professo ali quid scribentibus, q̄ poētis in tradendo rationem esse. His enim suæ artis priuilegio agentibus sibi concessio, licuit, semperq; licebit, non quæ optima & ex re, sed quæ speciosissima sint dicere. Est & illud in Dictamno animaduertendum, quod hic ait, facere Dictamnū quæcunq; & sati uum Pulegium, non ad omnium malorum remedia referendum esse, sed ad menses, secundas & partus: quæ omnia hic Pulegium ducere dixerat. Indicatq; id quod sequitur statim. Non em̄ porum tantum, sed subditum & suffitum enectos in utero foetus pellit. Quod itidem ab hoc di citur. Habet & succus purgandi uim, a Theophrasto sic tantum traditur. Habet Dictamni suc cus aliquid Pulegij succo æquale: nihil aliud intelligens, q̄ qd hic in Pulegio dixit. ἔχει δὲ καὶ κατὰ κοιλίαν μέλαινα, quod uersum a nobis est, per aluum nigram trahere bilem. Et hæc satis pro Dictamnīs omnibus dicta hæcenus a nobis sunt.

De Saluia. CAP. XXXVIII.

Eleliphacon, alij Elaphoboscon, aliqui Phacon, alij Ciosmin, a= alij Phagnon, Aegyptij Becion, Romani Saluiam uocant. Frutex est ramosus, longus, uirgas habens quadrangulas, & canas. Folia mali cotonei effigie, sed longiora, asperiora, crassiora, & quæ sensim attrita= rum quasi uestium scabriciem referant, hirsuta, subalbida, perq; iucun= do odore, sed graui. Semen summis in caulibus syluestri Orminio simi le gerit. In asperis nascitur. Menses cit, & urinas decoctum foliorum, ra morumq; potum. Partus extrahit. Pastinacæ marinę icibus auxiliatur. Capillos denigrat. Vulnerū sanguinem cohibet. Tetra ulcera purgat. Testium pruritus sedant rami, foliaq; si decocto eorum foueantur.

BARBARI COROLL.

Eleliphacos, ut Theophrastus inquit, differt a Sphacelo: q̄ altera mitior est, altera syluestri or. Sphacelo folium breuius, & leuius: Eleliphaco squalidius & scabrius. Sed aliter fere Plini us. Syluestris inquit lens est Eleliphacos, a Græcis dicta, satia lente leuior, & folio minore, at q̄ sicciore & odoratiore. Est & alterum genus eius syluestris, odore graui, hæc mitior: nostri q nunc inquit sunt herbarij, Saluiā appellant, Menthæ similem, canam, odoratam. Eleliphacon sunt qui Hieram botanen, hoc est, faciam herbam cognominent, ut Agrippa, salutarē ad mul ta, præsertim ad fecunditatem: ut inde Saluia fortasse a nostris dicta esse uideri possit. In Aegy pti Copto, multis pestilentia sublati, coactæ sunt mulieres huius herbæ succo ad cōceptū uti.

EX M. VERG. COMM.

Magnæ litis nostra ætate Eleliphacos, quam quondam Plinius Saluiam dici testatur, cū simili & quasi congener fruticosa herba est, cui a claritate oculorum, quibus proffit, nomen in gente nostra factum fuit. Censentibus alijs, quam hic Saluiam uocari a Romanis inquit, alterā illam mutato in uicem nomine esse. Alijs cōtra nitentibus. In quorum numero non pudet nos etiam numerari. Neq; em̄ turpe nobis fore aliquando credimus, autoribus Diosc. Plinio, Apu leio, Serapione, totq; alijs, credidisse id, & consutuisse. Siquidem non uerisimile solum, sed pau lomīnus q̄ necessarium est, testantibus idem tam multis, antiquā plantę eius eam appellationē per manus traditam, continua eiusdem rei significatione ad nos peruenisse. Quid enim, ut ceteros omittamus, aliquando Plinius apertius docuit dicens: Nostri qui nunc sunt herbarij, Eleliphacon græce, latine Saluiam uocant. &c. Aut quis Apuleio non credat, Saluiam totidē quot Diosco. nominibus indicanti, & in medicina iubenti, ad pruritus uerendorū decocto eius infe riores partes fouere? Quod ultimum hic scriptor etiam iubet, dicens finire genitalium prurigi nes foliorum, ramorumq; Saluæ cum uino decoctum, si eo abluantur. Accedunt his deinde caulis, foliorūq; tam p̄sentes notæ, ut suspicari nemo aliud facile possit. Fruticis nō adeo p̄cera altitudo, fruticosus, ramosusq; habitus: quadrangulæ uirgæ, in his & in folijs albicans color: foliorum tam multis additis exceptionibus similitudo: & quod præcipue contempletur, & ad hanc rem amer aliq̄s, attritæ uestis modo aspera: quarum alteri illi aliq̄ congruunt, huic ue ro omnes. Egit Theophrastus libro. 6. de plantarum historia de Eleliphaco hac: simulq; de con genere illi alia, quam Sphacelon nominauit.

A

ἐλελίσφακος
ἐλαφόβοσκον
εὐφάγιον

B

The. li. 6. ca. 2.
Pl. li. 22. ca. 25

E iij

C

¶ De Mentha.

CAP. XXXIX.

ἡδύσμος μίνθη

Hedyosmon satiuū alij Mintham, alij Calaminthan, Latini Mentham uocant, alij Nepetam, Aegyptij Tis, alij Perxo, alij Macetho. Cognita herba est. Calfaciendi, adstringendi, atq; exiccandi uim habet. Sistit sanguinem, potio ex aceto succo. Tineas in uentre teretes enecat. Venerem stimulat. Singultus, uomitiones, choleraeque sedant, terni ramuli cum acidi granati succo poti. Suppurationes discutit, si cum polenta illinatur. Imposita fronti, capitis dolores mulcet. Mammæ si tendantur, aut lacte turgant, compescit. Cum sale, canum moribus illinitur. Aurium doloribus cum aqua mulsa subuenit. Vuluæ ante coitum admota, conceptioni resistit. Linguae scabriciem confecta læuigat. Coire lac, densariq; in caseū non patitur, si folia potionibus lactis immergant. In summa, stomacho utilis est. Et in condimentis peculiarem gratiā habet.

The. li. 7. ca. 7.
Pli. li. 19. ca. 8.
lib. 20. cap. 14.
& de planta.
caus. li. 2. & 5.

B A R B A R I C O R O L L.

Mentha æstate uiret, hyeme lauescit, humido minus gaudet, semel sata pluribus annis re subili fertilitate durat. Menthae nomen suauitas odoris apud Græcos mutauit (hoc enim significat Hedyosmos) cum alioquin Mintha uocaretur: unde ueteres nostri Mētham appellauerunt, aut fortasse quoniam odore mentem excitat. Theodorus Hedyosmon in Theophrasto Menthastrum interpretatur, ut a Mintha in eodē autore separaret. De Menthaastro statim prodetur. Gaenus porro Mintham quæ sit odorata, Hedyosmon, idest, Mentham uocari tradidit, Mintham uero quæ sine odore sit, Syluestrem esse Mintham, & pprie Calaminthā appellari uoluit. Strabo in Achaia montem esse iuxta Pylum scribit Mintham nomine, a Plutonis pellice in hac herbam conuersa, Proserpinæ inuidia, quæ uocatur inquit a quibusdam Hedyosmos. Ouidius. Femineos hortos in olentes uertere Menthas Persephonæ licuit.

D Quærit Aristoteles in problematis, quamobrem dicatur, Mentham in bello nec edendam, nec ferendam? Soluit. Qm inquit refrigeret, absumendo genituram: sed cum alij oēs ex calfacioriam uim Menthae ascribant, fieri potest, ut per se calfaciat, per accidens refrigeret: quod & in alijs plerisque conspicitur.

E X. M. V E R G. C O M M.

Solo nomine in græcis Mentha cōmendatur: nec quisq; est qui eo audito, suauitatem odoris in notissima omnibus herba non amet. Id enim Hedyosmos græcis est. Quod ambitiose nescio, an molliter ab eis factum fuit: qui antiqua Minthes appellatione, quæ hominis in eam cotiuersæ honorem haberet, parum contenti, nouo, & quod uitæ tantum delitiis indicaret, uliginosis locis feliciter prouenientem herbam nomine ornauerunt. Quo secuta ætas, uoluptatis suæ magis q̄ alieni nominis ambitiosa, libentius & frequentius q̄ antiquiore illo usa est. Theophrastus enim nō alio q̄ Minthes nomine, pluribus locis Mentham indicauit: & ante eum tota Græcia, præsertimq; Arcadia: in qua non procul a Pylo nobilis Minthes cognomine mons fuit: quā Plutonis pellicem poetarum fabulæ, & a Proserpina, ut solent pellices semper odifese uxores, in hortensem Mentham transformatam fuisse narrant, æterno in æterna planta hominis monumento. Quam uocem Romani magis amantes, q̄ in ea male habitæ ob amorem puellæ memoria seruaretur, una tantum & altera mutatis literis græcorum, Minthen, Mentham suam fecerunt. Quotidiani in sanitate usus, & præsentis in medicina contra tot mala remediij. Quam cum Calaminthe, quæ Nepeta est, miscere non decet. Sui enim generis Calaminthe herba est, a Menthaastro statim a nobis dicenda: quæ ab imperitis alijs Menthae appellatio nibus importune adiecta est.

ἀγριον ἡδύσμον

¶ De Menthaastro.

CAP. XL.

SYLVESTREM. Mentham Latini Menthastrū uocant, hirsutius folio, et prius maiore q̄ Sisymbrij, grauiore odore. Quare

minus ad sanorum usus expetitur.

B A R B A R I C O R O L L.

Menthastrū, hoc ē, sylvestris Hedyosmos, aliter a Plinio describitur, foliorū specie a sativa differens, quasi figura Ocini, colore Pulegij: propter quod quidam sylvestre Pulegiū uocant. Dioscorides hoc non Menthastrū, sed Calaminthæ genus unū (ut arbitror) existimat.

E X M. V E R G. C O M M.

Sylvestris Mētha Menthastrū est, in hortēsi & rustica re cūctis notissimū, satis a Dioscoride descriptū, & quale passim ab oībus & quotidie uidetur. Inter cætera maius & procerius Sisymbriū ab hoc scriptore dictū fuit: q̄ multa inter Sisymbrium & Mentham similitudo est: mutantq; & degenerat in Menthā neglectum Sisymbriū, quemadmodū secundo & quinto uolumine de causis plantarū testatus Theophrastus est. Quæ fuit huic scriptori causa, ut procerius eo Menthastrū esse diceret: ne multa similitudinis inter se plantæ uidentes fallerēt, haberentq; herbarij certā ex proceritate notā, qua Menthastrum a Sisymbrio discernent.

De Calamintha.

C A P. X L I.

EX Calaminthæ generibus, quædam montibus familiaris, folia Ocini habens, incana, surculos aridos, & caules angulosos, purpureum florem. Altera Pulegio similis est, sed maior. Quam sylvestre Pulegium ideo appellarunt, q̄ odore ipsum æmuletur. Nepetam Latini uocant. Tertia Menthastro cognata est, folijs oblongioribus, caule & ramis maioribus q̄ superioris, sed uiribus inefficacior. Omnium folia gustu feruentia & acria. Radix superuacua. Nascitur in campestribus, asperis, & aquosis. Potu, aut illitu demorsis a serpente opitulatur. Decoctum potu menses & urinas expellit. Ruptis, conuulsis, orthopnoæ, torminibus, cholera, rigoribusq; auxiliatur. Regium morbum expurgat. Præsumpta in uino uenenis resistit. Tineas, cæteraq; interancorū animalia, cum sale & melle pota, enecat. Nec secus cocta crudæ si teratur. Elephanticos esitata adiuuat, si postea serum lactis ebibatur. Folia detrita si in uellere subiiciantur, menses extrahunt, & partus enecant. Accensa, aut substrata serpentes fugant. Nigris cicatricibus candorem reddunt, in uino cocta & illita. Sugillata tollunt. Calamintha ischiadicis imponitur, ut concretum humorem euocet, summam cutem exurens. Vermes necat succus auribus instillatus.

B A R B A R I C O R O L L.

Calaminthā, nostri fere Nepitā appellant, etiāsi Dioscorides spēm eius unā priuatim Nepitam uocari tradat. Profus tāta inter Menthā, Mēthastrū, & Nepitā societas est, ut mirū non sit misceri q̄nq; ab auctoribus earū & spēs & noīa. Alioq; & q̄d modo Pulegiū officinis & ruribus uocant, haud plane scias Calaminthæ genus sit, an uerū Pulegiū. Nepita etiā non satis nascit. Calaminthā græce Cæterā quoq; dictā fuisse, testis est Strabo, q̄ nonnullos scribit existimare, Lacedæmonē ab Homero nō cetoellam a magnitudine, sed cetoellam a Calaminthæ copia uocari,

E X M. V E R G. C O M M.

Congenerem aliqui, similem tantū aliqui Menthæ Calaminthem, quā nos Nepetam diximus, in græcis fecerunt. Subscribitq; illorum sententiā, nomen quod coniunctam sibi habet Mentham. Habent contra posteriores illi figuram, quā Menthæ similem faciunt: naturā uerō & uires, qui sui generis herbam esse dicūt. Triplicem hanc Dioscorides ait: diuersisq; notis intrinsecem separat, sed nō facile cognoscendis: tanta trium generū similitudo est. Plinius unum tantū constituit genus lib. 20. cap. 14. Nepetāq; id uocat. Nicañder in theriacis suis duo tantū, & aliter Calaminthes gēa cognouisse uidetur, aquaticā, palustreq; alterū: montanū uero alterum: haud sane, quia montanā Calaminthē ille dicat, sed cum aquaticā & riguis gaudentē dixit, pro

E ūij

A

Pli. li. 20. ca. 4.

καλαμίνθη

B

D I O S C O R I D I S

C prium signasse genus uidetur: cui diuersum montanum, & in siccis nascens sit. *Verficuli eius sunt. τῆμος δὲ ποταμοῖο πολλὴ γὰρ κατὰ δὴν, ὑδρὸν καὶ μὲν ὁπᾶν χαιτῶσαν. πολλὴ γὰρ δὴν παρὰ ἵσταται ἀμφὶ τὴν χεῖρα, ἀγρῶν οἰσιν ἀγαλλομένη ποταμοῖο.* Quorum sensus est. Sumito tunc circa resonantis fluminis uortices comosam frondentem Calaminthem. Copiosa enim prope aquarū scatebras, & circa labra earum nascitur, fluminibus gaudens. Ex quibus pro comperto habendum est, Nicandro duo hæc tantū genera esse, locis in quibus nascuntur distincta. Hic tamē ex foliorū, ramulorum, florum, & odoris diuersis notis sua genera separat. Non facile, ut diximus, inuenienda & cognoscenda: tanta est nataliū mixtura, & naturę cognatio. Apulcius, quicūq; ille fuit, in cōmentario, qđ de aliquot herbis reliquit, Nepetā hanc ait montanā Mentham a græcis dici, a Magis sanguinem Hammonis, ab Italis Nepetam montanam.

De Thymo. CAP. XLII.
T Hymon quidam Cephaloton, alij Epithymum, alij Thyrsion, Latini Thymum, Aegyptij Stephanen, Daci Mosulam. Thymum ab omnibus cognoscitur, surculosus frutex, exilibus folijs & angustis circumdatus, capitulis in cacumine flore purpureo refertis, Gracili solo & petroso prouenit. Vim habet hanc, ut cum sale & aceto potum, pituitam per aluum detrahat. Decocti ius prodest orthopnoicis, & anhelatoribus. Tineas uentris exigit. Menses, partus, & secundas pellit. Urinas ciet. Cum melle in eclegmate faciles facit excreationes. Recentes tumores discutit cum aceto illitum. Concretū sanguinem dissoluit. Verrucas Thymi colorem reddentes, pensilesq; tollit. Ischiadicis cum uino & polenta impositum subuenit. Hebetibus oculis in cibo prodest. Perq; utile pro condimento, dumtaxat ad usus eorum, qui recte ualent.

Plin. lib. 21. capit. 10. & 21.

BARBARI COROLL.
T Hymū, siue Thyma pluratio numero, siue Thymus, in mari quoq; nasci traditur, extra Herculis columnas, quod eiectum in pumice durecat. In Heroo sinu, color etiamnū floris in eo est, ceu nondū absoluti pars. Quæ aquis extat, duricia lapidis aspicitur, similis tamē uiuenti. Sero floret Thymū, per solstitia fere cum & apes decerpunt, & auguriū mellis est. Seritur flore, in quo semen intelligitur: etiā si oculis deprehendi non potest. Coalescere quidam Thymū negant, nisi afflatu maris seratur. Ideoq; translātū ex Attica non durasse in Arcadia. Nunc prouinda inquit Narbonensi Plinius, lapidei campi Thymo scatent. Flos Thymi perit imbribus. Duo autem sunt genera eius. Candidum radice lignosa, in collibus nascens, quod & præfertur. Alterum nigricans, florispq; nigri. Colligunt in flore Thymum, & in umbra siccant. Epithymum quidem pluribus uidetur flos eius Thymi esse, qđ & durius sit, & similitudinem Cumilæ nostratis habeat. Sed de Epithymo posterius. Thymum e Thyna laudatur ab Hippocrate. Est autem, ut inquit Galenus, Thyna in terra Thracię locus.

EX M. VERG. COMM.
Prima Thymo laus in antiqua plantarū historia græcis a Theophrasto est: qui a principio statim sexti de plantarum historia uoluminis longiore descriptione totā eius naturā fortunāq; complexus est. Post Theophrastum latinis a Plinio, & ante Plinium plarispq; alijs, qui Romanorum, Italięq; hortos & mellationem instruxerunt, Omnium uero maximā & æternam æterno carmine Maro illi fecit, cum in Georgicis suis cecinit. Redolentq; Thymo fragrantia mella, Romana breuitate, & poetica dignitate, omnē plantæ huius honorem & usum in ruris & apii disciplina complexus. Quæ licet præcipui saporis, & egregij odoris homini mel dederit, in quo extremā suauitatis lineam natura clausit: nec secus qđ in humana fortuna totum in regibus, aut etore Pindaro, fastigiū definit, sic mellis extrema in saporibus dulcedo sentiatur: non tamē tanta illi gloria hæcenus fuit, aut posthac erit, suauitate mellis suauiorē homini secisse coenam, qđ multiplici remedio sanitatem eius, & uitā instruxisse, cuius nullū obrepit homini quacunq; aetate fastidium, κέρων δ' ἔχοντες μίλι, ut lyricorum maximus Thebanus poeta cecinit. Quæ ad Thymi historiā, factiq; ex eo mellis bonitatem pertinent, Theophrastus quo diximus loco, Plinius ab illo accepta omnia, 21. uolumine capite decimo, Columella quo loco de apium pabu-

lo & cibarijs agit, in mellificio tandem, ne longiores simus, iam pridem plerique alij prosecuti sunt: possuntque uolentes ex tam multis auctoribus ea repetere. Nobis satis est, locos, & auctores legentibus signare. In quibus monemus, quaecumque a Theophrasto dicta fuerint, a Plinio totidem uerbis reddita ciuibz suis fuisse, nec desideranda Plinium legentibus quæ Theophrastus tradiderit: qui Thymum in duo genera diuidens, candidum, & nigrum, monuit nos quod in Dioscoride legitur, ab aliquibus candidum Thymum dici, non appellationem, sed alterum genus eius esse, a Theophrasto ad hunc scriptorem importune translaturum, qui nulla huiusmodi diuisione usus est. Coloris autem discrimen id Theophrastus in folijs tradidit, in altero genere albicantibus, in altero nigrescentibus. Florem enim hic *περσυρῖοντα*, id est, purpurascentem tradit, inter purpuram, & candorem medium: qualis etiam passim uidetur. Sunt Thymi appellationes aliæ. Epithymis, & Thymon, solo declinationis genere diuersæ: antiquæ & ipsæ. Si quidem Theophrastus genere neutro Thymon dixit: sic fœminino genere Epithymida alij herbam, scilicet intelligentes. Potuerunt Aegyptij accepta a grecis uoce, quoniam forte eo coronarentur, Stephanem, id est, coronam appellasse. Quemadmodum & greci Thyrsion, quoniam Bacchicas hastas, quas in orgijs eius dei Thyrsos uocabant, pro Hederis, ramulis Thymi forte inuoluerent. Suspitiones tamen, seu malis dicere, coniecturæ hæc sunt. Quod postremo est *κεφαλών*, quod capitatum significat, certam ex figura floris capitulorumque eorū in quibus hic florem Thymi purpurascere dixit, rationē habere potest.

A

De Satureia.

CAP. XLIII.

Satureia nota est. Gignitur in asperis locis, & tenui solo, Thymum simili, minor tamen & tenerior. Defert spicam florum plenam, diuque permanentem. Eadem potest quæ Thymum, si modo consimili sumptetur. Aptus sanis usus. Est etiamnum quædam satiuua, syluestri prorsus minor, quæ propter mitiorem acrimoniam commodius in cibos recepta est.

Thymum

BARBARI COROLL.

Thymbra post trigessimū diem nascitur in maris afflatu sata, nec ut quidam putant aliter. Hæc apud nos & Cunila uocatur, & (ut arbitror) transmarina Cunila est. Apud Columellam Thymbra est condimentarij generis. Satureia quoque a nonnullis Thymbra dicitur. Columella Thymbrā a Satureia diuisit, & Cunilā nostratē esse docuit: quā rustici Satureiam nomināt, colore floris purpureo, ut Thymbrā herbaceo. Quintus Serenius spēm Thymbræ Satureiam intelligit, ut Satureia sit non Thymbra simpliciter, sed Thymbra cephalote, quā Plinius Cunilam capitatā semel tantū, quod meminerim, opere toto nuncupat, intra hæc quæ in Cunilagine dicuntur. Cæterū Cunilæ præter satiuam plura sunt in medicina genera, fortasseque hanc Hippocrates intelligi uoluerit, ubi Origanum Cephaloides appellat. Bubulam appellant, semine Pulegij. Origanum ab Aristotele putatū, cuius pastu Testudines cum Serpētibz pugnatæ, uires suas recreant: quamque in hunc usum nonnulli Panaceam uocant. Quidam falso Ligusticum interpretati eam sunt. Corrupta est in L. Columella dictio, ubi cuniculabula, & interim culabula, pro eo, quod est Cunila bubula, inter pecoris medicinas legitur. Plinius Origanum multis locis, non aliter quæ Cunilam bubulam conuertit. Est & Cunila gallinacea, de qua in Origano Heracleotico dictum est. Non omittendum, aduersa dicere hoc loco Dioscoridem, & Plinium. Omnia inquit syluestria fere sunt, & folijs minora, & caulibus succo acriora: sicut Cunila, Origanum, Ruta. Dioscorides contra hic prodidit de Thymbra. Sunt e grecis utique recentioribus, qui non Thymbram, sed Thymbra neutro genere, plurali numero pronuncient. Et nos quandoque seruamus in Satureia. Ouidius, Sunt qui præcipiant herbas Satureia nocentes, Sumere. In Thymbra Paulus Epithymbrum uocari tradit id, quod in Thymo Epithymū. Ridentur merito grammatici fere omnes, in herbarum exponendis, iudicandisque nominibus, in quo & Seruius honoratus sepissime decipitur, & in hac ipsa Thymbra Placidus Lactarius is, qui Papinij Thebaida interpretatus est, Thymbram, a qua Thymbræus Apollo cognominatus sit, latine dici Polium affirmans.

B

Pli. li. 19. ca. 9.

EX M. VERG. COMM.

Habemus antiquissimū & probatissimæ fidei scriptoris huius codicē, in quo plures Thym

D I O S C O R I D I S

Cbræ a principio appellationes aliæ leguntur, Clinopodium, Probation, Ageratum, Origanus agrestis; & post barbaras, nulliusque intellectus plerasque alias, a Romanis Cunilam rusticā appellari Thymbrā. Id ueterum latinorum decretis additū facile confirmauit, quod constitutū iam pridem a nobis fuerat, in Cunilarū genere Thymbrā esse. Siquidem Columella decimo sui operis uolumine de apium passionibus agens, inquit, Eademque regio sit fructibus exigui, fecunda, & maxime Thymi, aut Origani, aut Thymbræ, uel nostratis Cunilæ, quā Satureiam rusticici uocant. Plinius iidem. 19. uolumine capite. 7. inter Cunilas Thymbrā his uerbis numerauit. Thymbrā uero quæ sit Cunila, hoc apud nos habet uocabulū, & aliud Satureia dicta in condimentario genere. Estque quod Columella ait, sic intelligendū, ut ultima illa disunctio, uel nostratis Cunilæ, &c. non herbas, fruticesque duos, sed unius duas appellationes alternet: indicetque autor ille, non Thymbrā, & præter eam nostratē Cunilam, sed hac, aut illa appellatione unā tantum significari: & quā antiquus Dioscorides hic noster a Romanis Cunilā rusticā uocari dicit, Columella nostratē peregrinitatis ratione in alio genere dixerit. Transmarina enim Cunila etiā quondā numerabatur. Sicque bifariam a duobus scriptoribus idem dictū: a Columella nostras, ut eo pronomine a transmarina distingueret: a Dioscoride rusticā, ut a satiaua separaret, inutili & minoris efficaciam. Fuisse autē satiaua Satureiā, & condimentariā idem, in carmine suo restat Columella, cum cecinit ferendū in hortis Nasturciū, Et Satureia Thymi, referens Thymbræque saporem. Quæ quoniā multo minore acrimonia quæ rustica illa esset, ideoque medicinarū inuolū, mutato nomine a grecorum Thymbra, & latinorum Cunila, Satureia dicta est. Eadē quidem, sed diuersis locis nascens, & ex eo diuersæ bonitatis, nō ipsam ubique appellationibus indicata. Quod Plinius aperte ostendit, dicens, Thymbrā uero quæ sit Cunila, hoc apud nos habet uocabulū, & aliud, Satureia dicta in condimentario genere. Nihil certius ex his est, quæ unam & eadem Thymbrā Cunilam dici, habereque in Romana gente id uocabulū: mox aliud Satureiā. scilicet in condimentario genere: quod nihil aliud est, quæ satiaua Satureiā dici. Cunila itaque Thymbra sit Columellæ nostras, ut a peregrina & transmarina discernat: Dioscoridæ uero rusticā, ut a satiaua separetur: Plinio Cunila, incultis & asperis locis: Satureia, in hortis nascens & satiaua. Hoc nos de Thymbra, Cunila, & Satureia sentimus, quod auctoritatibus, ueterumque indicij alijs multis confirmari poterat. Sed breuitati consulentes, cætera omnia relinquimus, præsertim uno Satureiæ nomine totū hoc genus, ubicūque nascatur, indicatibus ætate nostra herbarijs omnibus: quibus nullū Cunilæ alicuius nomen est: utinamque agrestem Origanū, Thymbrā, & Thymū non simul misceret. Non uerūt nunc rura omnia, asperis & incultis locis, montibusque plerumque nascentem Satureiā, ipsam omnibus notis, ab imperitis etiā cognoscendā. Omnem hanc cognoscendarū ex antiquis appellationibus plantarū difficultatē, non tam similitudo, eadēque multarū uires & notæ, quæ in secerendis diuersa appellatione similibus herbariorū negligenter fecerunt: eoque res perducta est, ut tres toto genere diuersas plantas, una appellatione monstrari aliquando audierimus.

De Serpillo.

C A P. XLIII.

ῥοπῖλλο

Serpillum aliqui Zygin syluestrem, alij Polion uocant, Aegyptij Meruopyum, Latini Serpillum. Duorum generum est. Hortensium odore Sampsuchū imitatur, atque in coronas addi solet. Cui a serpendo nomen inditum est, quoniam si qua eius particula terram attingat, inibi radices demittet. Folia & ramulos Origani habet, sed candidiores. In macerij multo procerius assurgit. Syluestre Zygis appellatum non serpit, sed in altitudinem increfcit, ramulos ædens tenues, furculosos, folijs refertos longioribus quæ Rutæ, & durioribus, angustis. Flores iucunde olent, gustati acres. Radicis nullus usus. Nasctur in petris satiuo efficacius, atque magis exalfaciens, & ad medendi usum aptius. Menses trahit. Urinam potu ciet. Torminibus, ruptis, uulsis & incineris inflammationibus auxiliatur. Et aduersus serpentes potu illitue. Capitis dolores mulcet coctum adiecto rosaceo, & madefactum in aceto. Maxime uero Phreniticis & Lethargicis conuenit. Cruentos uo-

mitus sedat, succus drachmis quatuor ex aceto potus.

B A R B A R I C O R O L L.

Serpillo radix multifida, sublimis, retorrda. Crescit in altitudinem quamcūq; adminiculo, aut sepibus appositum. Aqua ei modica satiffacit. Fimo, præcipue iumentorum gaudet. Sed & demissum in puteos, & circa piscinas, & stagna lætissimū provenit, obnoxium squalori. Translatum vehementer iuuatur, autumno fere seritur. In montibus plerisq; copiosissimū, ut Thraciæ. Seritur autem Sicyone. Athenis quoq; ex Hymeto deferentibus auulsos ex ijs ramos aquis. In montibus natum, Satureiæ odorem habet, uehementissimum illum quidem, sed gratum atq; mollem. Satiuum non serpit Plinio, sed ad palmi altitudinem increfcit. Voluntariū, id est, syluestre, serpit in petris maxime: hoc & pinguius, & candidioribus folijs atq; ramis: Dioscoridi contra serpit satiuium, non syluestre.

E X M. V E R G. C O M M.

Serpillum nouerunt, quæ urbes & agros incolunt gentes omnes. Pauci tamen syluestre a satiuo discernere didicerunt: tam paratū ubiq; satiuū est, humana opera a syluestri & horridiore illius aspectu, ad mitiorem & speciosiore habitū translaturum. Quo uno habitu, & ramulorū infirmitate, a syluestri differt. Fit enim in satiuo Serpillo, quod in urbanis & elegantioris uitæ hominibus, ut per se rigentibus ramis stare nequeat, sed hortorum delictijs, & nimia humoris copia uireat quidem speciosius, infirmius tamen per terram serpat. Qua fortuna in urbibus omnia fere sunt, quæ comparata agro sanitatis, uirium, patientiæ, aliorumq; uitæ laborum, & munerū minus habere ubicunq;prehenduntur. Neq; Serpillum a Græcis, & ex eo Serpillum a latinis dictum est, q; per terram simpliciter serpit, quæ latui nostra ætate fortuna est, sed q; ut Theophrastus ait lib. 6. de plantarum historia, proprium quoddam est ramulorū Serpilli incrementum. Priuatim enim possunt in quantā uoluerit aliquis longitudinem trahi, adiecto illis pedamento aliquo: aut si prope sepes plantetur: aut ex altiore loco aliquo deorsum dimittatur. Sic enim in longū protrahuntur: & ab hac plantæ in ramulis eius natura, q; in longū Serpillum latini & græci osus hoc nominauerūt. Syluestris contra illius quod Zygidā hic ait uocari, nulla est nominis eius inuenta nobis ratio. Nisi forte a trutina, quā græci Zygon uocant, rectitudinē eius ad rectitudinem ramulorū in syluestri Serpillo translata ea uox sit. Aut quia ramulis his natuuo lentore ad uinciendum, & utiliū usum aptis, in re rustica forte ueretur antiquitas, Zygis hoc Serpillum dictum fuerit: & q; eo iugarentur uites, quod *ζυγῶν* græci aliquando dicunt, in eadem significatione, in qua ligare & uincire passim latini utuntur. Syluestris Serpilli huius, quod tacuit hic scriptor, duo genera numerauit Theophrastus. Alterum Thymbræam, quod Thymbrææ parem acrimoniam habet. Alterum quod odoratius & mollius sit. Hic autem nullā forte in medicina eorū diuersitatem sentiens, unius generis syluestre Serpillum dixit, & ex præcipuo discrimine a satiuo discerni monuit. Multa alia Theophrastus etiā de Serpillo dixit, qualia sunt. Longissime & speciosissime frondere Satiuū, si in puteum descendere dimittatur, podio eius impositū, nec aliud quodpiam genus eius est: plantariq; Serpillum autumno plerūq; plantari etiā uere: amare domos & hortos: gaudereq; aquis & stercoreatione: præsertimq; ex iumentorum fimo: & meliorescere sæpius translaturum.

De Sampfuco.

CAP. XLV.

Sampfuchum aliqui nomināt Amaracum, alij Triphyllon, alij Agathides, alij Cnecion, alij Acapnon, Pythagoras Thramben, Aegyptij Sopho, Armenij Myurō, Magi Ichrei alinū, aut Hecigonon Isidis, Romani Maioranam. In Cypro & Cyziceno laudatissimum. Secundum sibi locum uendicauit Aegyptium. Amaracum gens Scyculæ & Cyzicena appellat. Herba est ramosa, per terram repens, folijs eius Calaminthæ, quæ tenui folio constat, Letophyllos appellatur, hirsutis & rotundis. Suauissimum odorem spirat, ideo coronis inferitur. Vis eius excalfaciens. Succus decocti potus, conuenit incipientibus hydropicis, & ijs quos urinæ difficultas, aut tormina exerceant. Illi ta ex melle arida folia, sugillata tollunt. Menses subditi in pello tra-

A

Pli. li. 19. ca. 9.

B

αμυγχοῦ
ἀμαράκων

C hunt. Contra scorpionis ictum ex aceto & sale illinuntur. Luxatis tumoribusq; carato excepta imponuntur. Aduersus oculorum inflammationes, tumoresq; cum polline polentæ illini prodest. Acopis malagmaticisq; calfaciendi gratia commiscetur.

B A R B A R I C O R O L L.

Plin. lib. 21. cap. 21.

Sampsuchus in Syria & Aegypto dicitur, Amarantus uero & Amaracus a Siculis. Item a Theophrasto. Semen ei copiosum, odor molliter iucundus. Radix arida, tellure summa harenis, multifida. Floret æstate, non omnis, sed quam Phrygium cognominant. Semine & auulsiōe prouenit. Transserri & plantæ solent.

E X M. V E R G. C O M M.

Diximus primo uolumine, cum de Sampsuchino & Amaracino unguentis ageretur, de Sampsucho & Amaraco ex Plinij historia, quæ satis ad eam rem tunc fore credidimus: distulimusq; in hunc locum, quæ alia tunc ex aliquot græcis scriptoribus omitenda alioquin non erant, nisi ea nunc repetenda fuissent. In quibus præfari illud inutile non fuerit: Magni in plantarū historia referre, quos scriptores, & quibus temporibus scribentes aliquis sequatur: & quæ diuersis locis hysdem, aut alijs nominibus appellantur, obseruasse. Nisi em̃ id fiat, geminari aliquando & augeri in numerū contingeret, quæ unum sunt: & quod idem natura, aut paulo diuersum ubiq; fecit, aliud uideri: eaq; ratione confundi intellectu, & misceri rerum historiā. Quod in Sampsucho hac fit: in qua si Galeum, hunc ipsum scriptorē in unguētis, & Paulum Aeginetam aliquis sequatur, aliud ab Amaraco uidebitur. Siquidem omnes seorsum de utraq; egerunt, aliasq; in medicina uires alterutri assignarunt: Amaracum calefacere in tertio, in secundo uero ordine siccare dicentes. Sampsuchum extenuādi, discutiendiq; uires habere: & in tertio ordine calefacere & siccare, & in unguentis a Dioscoride diuersa, multa in utroq; numerari, quæ tractata suis locis iam pridem a nobis fuerunt. Si Theophrastum, Plinium, poetasq; Latinos, Lucretiū, Maronemq; & Columellā, eandem Sampsucho Amaracū omnes intelligent. Nihilq; certius Plinij decretis in hac re est. Primū lib. 11. capite. 11. quo loco auctore Diole ait, quod Aegyptus & Syria Sampsuchum uocat, Siculos Amaracū appellare. Mox eodem uolumine iterū, sed capite. 12. Sampsuchum, siue Amaracum in Cypro laudatissimū & odoratissimū. Nec multo post. Fit ex eo oleū, quod Sampsuchinū, aut Amaracinum uocatur. Maro, quod pueri omnes nouerūt, super alta Cythera per Venerem auisam Ascanium transtulit, ubi mollis Amaracus illum, &c. Lucretius itidem. Aut Amaracini blandum Staetq; liquorem. Columella etiā in carmine suo Romanorum hortos excolens ait, Grataq; iam ueniant hilari Sampsucha Canopo, peregrina uoce Romanā Amaracum appellans. Et ne longiores simus, hic ipse etiā hoc capite, in Sicilia Amaracū uocari Sampsuchum dicit: nec esse inter Sampsuchum & Amaracū, nisi appellationis discrimen. Graues contra, græcorū medici illi, quos paulo ante nominauimus auctores, ad hanc rem sunt: nec nostrū est, ut in Buccolicis legitur, tantas componere lites. Non tacebimus tamen, uideri nobis aliam historiæ, q̃ medicinæ rationē in multis esse: fieriq; posse, ut, quod idem & congener sit, non tam quia diuersis locis aliter atq; aliter nominetur, q̃ q̃ diuersis locis natū, diuersas uires habet, diuersum in medicina & historia censeat: duplexq; Sampsuchū, scilicet & Amaracū fecerint græcorū medici, quod unū idemq; genere est: quoniā non idem uiribus & natura diuersis locis proueniens esset, diuersisq; gentiū appellationibus, ad constituendas diuersas eorū uires, usi fuerint: non duas in natura plantas, sed in una diuersas nominibus illis uires intelligētes: duplexq; Sampsuchinū & Amaracinum unguentū hac ratione a Dioscoride in primo traditum fuisse: nunc autē in plantæ seorsum, ab unguētis historia & medicina, solum Sampsuchū tradidisse, & de Amaraco id solum testatum fuisse, a Cyzicenis & Siculis Amaracum Sampsuchū dici: quod & in Amaracino unguento etiā dixerat, in Cyzico probatissimū fieri: quoniā in ea gente, quod alibi Sampsuchū uocabatur, Amaracus nominat. Quod & Plinius fecit lib. 13. capite. 1. seorsum de Amaracino et Sampsuchino & ipse agens. Esseq; idem Dioscorid. Sampsuchum & Amaracū illud, in hoc capite præsertim indicat, qd̃ hic ait, probatissimū in Cyzico & Cypro. De Sampsucho agebat, & nihilominus in Cyzico, in qua Amaracinū probatissimū unguentū fiebat, nasci testat. Manifesto argumēto, eandē Sampsucho Amaracū, & Amaraco Sampsuchū esse: quodq; Plinius tot locis ait, nihil aliud indicat, q̃ in Aegypto & Syria Sampsuchū, in Asia deinde, tota Græcia, Sicilia, & ut in uicino sit in Italia Amaracum uocari. Nec si quis ueterū græcorum, latinorūq; historiā

& medicinam diligenter eruscabit, aliter iudicio nostro, de his colligere, ratiocinariq; poterit, præsertim nullam ex professo Amaracum docente Dioscoride, quod relinquendum in quoridiani usus planta, tamq; ob odoris suavitatem amabili, diligentissimo homini non fuerat. Cui a principio adiectæ in Sampfuchum tam multæ appellationes, nullam habent nobis rationem, aut causam: nec nos ab eo commentarijs suis additas credimus, sed per tempora illi accreuisse: quodq; hic proposuerit, Sampfuchum tantum fuisse, tum in bonitatis censu Cyzicentū & Cyprium cæteris omnibus anteposuisse, mox ab eo Aegyptium laudasse, & a Cyzicenis & Siculis Amaracum uocari. Hæc enim in uetustissimo quem habemus latino Dioscoride tm legunt. Quo fit, ut miremur in hoc etiam Barbarum, qui a Cyzicenis & Siculis non Amaracum, sed Amaranthum uocari Sampfuchum dixerit: præsertim docente id tam multis locis Plinio.

De Sertula campana. CAP. XLVI.

SERTULA CAMPANA laudatissima in Attica, & Cyzico, & Carthagine nata. Cuius color uicinus est Croco, boni odoris. Nascitur & in Campania circa Nolam, colore in luteum lingue scente, odore infirmo. Vim habet adstrictoriam. Inflammationem omnem emollit, præsertim quæ in oculis, uulua, sede, aut testibus erūpat, si ex passo cocta illinatur. Interdum autem addito oui luteo assato, aut scenigræci farina, lini semine, aut polline, aut capitulis Papaueris, intybo ue. Recentes meliceridas per se cum aqua, & ulcera manātia in capite, illita cum creta chia, uino, aut galla sanat. Stomachi dolores, & cruda & cocta cum aliquo ex antedictis leuat. Doloribus auriū mitigādis cruda ex passo instillatur. In aceto, aut rosaceo madefacta, capitis dolorē lenit.

BARBARI COROLL.

MELILOTOS, alij Sertulam campanam, Cato Sertam campanicam, quia folium eius coronamēntis sit dicatum, in Campania Italiæ cōmendatissima, ut nostri uolunt, odoratorq; & candida: deinde Attica in Sunio, mox Chalcidica, ubicurq; uero asperis & syluestribus nata, recens, nec candicans, & Croco q; simillima. Melilotos arida, diutius odorē continet: qui et Croco uicinus est, quemadmodum & flos. Ipsa cana, placet maxime, folijs breuissimis atq; pinguis. Inter aromata, quibus defrutum condiri solet. L. Columella Cripam pampinacam nominat. Deprauatū esse locum arbitror, & Sertam campanicam, non cripam pampinacam legendum. Nec ignoro & Crepin, & Crepulam haberi herbas, sed quibus ad unguentum & aromata nihil sit opus.

EX M. VERG. COMM.

CAMPANĀ SERTULĀ Plinius & Celsus Romani sermonis candidi autores, Melilorum appellant. Cato nulla diminutione usus, Sertam Campanicā dixit, ab usu & natali solo tota appellatione hac illi facta. Nosq; his autoribus græco nomini, latinā uocē in titulo capitis addidimus. Nec ratiocinantes facile, quo referenda uox illa κροκίσων esset, quæ Croci aliquid habentem significat, ad colorem contraximus, qui tm nullibi q; in flore uideri potest. Virescūt em folia. Fecimusq; id autōre Plinio, qui de ea lib. 21. ca. 9. agēs ait. Odor eius Croco uicinus est, & flos. Neq; em ad odorē referri & cōtrahi uox illa in hoc scriptore poterat. Sequebatur em statim ἰνὸς δὴν quod odoratum significat. Nisi forte κροκίσων καὶ ἰνὸς δὴν eodem pertinet: dixeritq; hic bis quod ad odorem pertinebat: quod tamen parū uerisimile est. Quod erat etiam ἰνὸς κροκισῶν, quæ uox Carthaginem significat, ad Calcedonem detorsimus: qm in græcis aliquot & latinis omnibus sic legitur. Nisi forte neutrum eorum legendum eo loco sit, sed in Chalcide. Siquidem Plinius ibidem ait. Est enim in Campania Italiæ laudatissima: græcis in Sunio: mox Chalcidica, & Cretica. Ethæc pro Sertula Campana notissima nunc etiam omnibus planta, satis hæcenus dicta sint.

De Maro. CAP. XLVII.

MARV M aliqui Origanida, aut Hyfobriion uocant. Hæc ba cognita uulgo, surculosa, flore Origani, folijs multo cāndi-

D I O S C O R I D I S

Cdioribus, flore odoratiore. Vim habet Sisymbrio confimilem. Substringit enim, & modice calfacit. Qua de causa illitu, serpentia ulcera sistit. Et in calidas illitiones additur. Iuxta Magnesiam & Traleis copiosissima gignitur.

Pli. li. 12, ca. 24

DE Maro Plinius inter odoramenta sic loquitur. In Aegypto inquit nascitur Marum, peius quæ Lydium, maioribus folijs, ac uarijs: illa breuia, minuta, odorata. Lydium Marum Plinio fortasse fuerit, quod Dioscoridi Magnesium: cum sit Magnesia Lydiae ciuitas penes Sipylum, cui uicina Caria est, in qua Tralles, ubi Marum quoque nascitur. Est & Magnesia penes Maandrum, et Tralles in Caria: non tamen ut Lydium propterea decernam idem esse quod Caritum, gentis suæ, ut Plinius ait, appellatum nomine, cuiusque principale, ut in Cario demonstrabitur. Habent & Arabes suum Marum, siue Maru, sed penitus diuersum, & magnis ambagibus impeditum: inter quas illam sit satis indicasse, quæ species eius sunt Mellisophyllon, Marubium, & Buglossa: quo nihil dici poterat ineptius.

E X M. V E R G. C O M M.

Semel tantum Mari (modo illud huic idem sit) Plinius meminit, 12. uolumine cap. 24. tantæ breuitate, ut quale id sibi fuerit, non facile intelligatur. Nihil enim ultra tradidit, quæ nasci in Aegypto Maron peius quæ Lydium, maioribus folijs, ac uarijs: illa breuia, minuta, ac odorata. Nihil enim de Maro in censu medicæ materiæ Paulus Aegineta docuit. Et qui nobis sunt græcus & latinus uetustissimi Dioscori codices, nullum hoc loco, neque alibi Maron ostendunt. Ex eo nihil in peregrina planta, & ad Meandrum in Lydia nascente, præter pauciora illa ex Plinio accepta, dici a nobis potuerunt. Non tacebimus tamen, uideri nobis in eius historia non satis inter se conuenire, scriptorem hunc nostrum, & Plinium. Hic herbam omnibus notam, surculosam, flore Origanis: ideoque Origanida, quasi minorem Origanum dictam, cædidioribus Origanis folijs, & multo odoratiore flore describit: inter nostrates præterea, & hi ad Magnesiam & Tralles nasci dicat, nostrique orbis odoratas alias numerat herbas Melilotum, Acinon, & Barcharem. Ex quo credendum, similem, & natura congenerem illis esse. Plinius contra, suum Maron inter peregrinos odoratos frutices numerat Ligustrum, & Aspalathum: & ab historia Aspalathi statim in Aegypto nasci Maron dicit: non absurda penitus suspitione, si quis dubitet, non esse Plinii & Dioscori idem Maron. Nobis ob eas quas diximus causas, inclinamus animus, diuersa esse. Acceditque opinioni nostræ, quæ Plinius in Aegypto nasci Maron tradit: licetque peius Lydio, in quo poterit Magnesium hoc, & Trallianum forte intelligi: quoniam ad Meandrum in Lydia utraque ciuitas illa fuit: hic tamen Aegypti non meminit, quod relinquentium in censu bonitatis non erat, sed simpliciter ad Magnesiam & Tralles nasci dixit. Plinius præterea folia Lydij Mari, hic flores odoratos esse dixit. Sed quod ratiocinari in tota hac re & animaduertere aliquem oporteat, historia utriusque scriptoris est: quorum alter inter herbas Maron numerat, & Origano comparat: alter fructibus coniungit, nec aliter quæ de frutice omnia tradit.

ἀκινός ἀκινός

De Ocimaistro. CAP. XLVIII.
ACINOS, aut Aconos a Græcis dicitur, ab alijs syluestre Basilicum. Latinis Ocimastrum, tenui siccoque ramulo herba, Ocymo similis, odorata, sed hirsutior. Qua coronæ faciuntur. A nonnullis olitoribus colitur, Menses & aluum pota sistit. Illita panos, ignemque sacrum sanat.

Pli. li. 31, ca. 17.

DE Acinos ab Acono: quæ Acinos Ocimastrum est, siue Ocimi syluestris genus: Aconos spinosa, breuis & lata herba, Eryngio a quibusdam contributa, spinis latioribus. Acinos familiaris Aegypto herba, coronarum & ciborum gratia obseritur: sponte uero nascitur æquinoctio. Hanc et Acinon, & Acinean Plinius appellat, & Epipetron, nunquam florentem. Acquinoctio inquit nascuntur Aphace, Achine, quam Epipetron uocant. Ut nesciam tamen, legendum ita sit, an illo modo potius, Acquinoctio nascuntur Aphace, Acinos, & quam Apipetron uocant, quæ nunquam floret. Ut duo genera faciamus, Acinon, et Epipetron. Alioquin Theophrastus, unde Plinius, ea mutatus est, Epimeurō quidem (ita enim ipse nominat) nunquam florere scribit. De Acino

mentionem nullam habet. Hippocrates Epipetron ad tumores & inflammationes cōmendat, illi tu folijs eius decoctis & impofitis. Hanc ipsam proprietatem, Acino Dioscorides adscripsit: ut coniectari liceat, Plinij uerba quæ prætexui, legenda esse in hunc modum, Aequinoctio nascuntur Aphace & Acinos, quam Epipetron uocant. Mirum grauissimos autores Plinium, & Dioscoridem in huius herbæ medicinis cōtraria præcipere, alterum cieri ea posse menses & urinas, altero contineri. Nec illud mihi abierit indicium, primo & uigesimo libro, priore mentione (his enim loquitur ibi Plinius de Acino) in uetustis aliquot codicibus, non Acinon, siue Acinonem, sed Chenopus legi, quo nomine anserino pedi similis herba significatur. Sed corruptum locum suspicor, etiam si Chenopus quoque celebratur herba.

EX M. VERG. COMM.

Quod hætenus legerim, nulla Theophrasto in plantis suis Acinos est. Plinius pluribus locis Acini meminit: sed ut modo Acinon, modo mutatis aliquibus literis Acinonem, librarij magis scripserint quæ ipse: nihilque certius his quæ ab hoc scriptore accepta lib. 21. cap. 27. his uerbis tradidit, Acinon & coronarum causa, & ciborum Aegyptij serunt. Eademque erat quæ Ocimum, nisi hirsutior ramis & folijs esset, & admodum odorata. Quod solū non est illi cum hoc scriptore idem, menses & urinae sunt: quos hic sistere, Plinius cieri Acinum testatur. Dioscoridi tamen subscribit Paulus Aegineta in .6. mediocres adstringendi uires habere Acinon, dicens, ideoque potius menses & aluum sistere. Nunquam florere Acinon, idem Plinius eodem uolumine, sed cap. 15. ait. Quæ floris priuatione & nota, non male forsitan suspicetur aliquis, quæ Theophrastus, s. de plantarum historia uolumine Epimetron uocat, hisque uerbis tradit, *ἡν αὖ δὲ καὶ ἄλλοι ἀναγνῶντες, κατὰ πᾶν καὶ τὸ ἐπιμύτρων*, quod est, Quædam etiam omnino non florent, ut Epimetron, Acino huic eandem esse, & quam Plinius eodem loco Epipetron dicit: ut in alterutro uerbo literæ tantum uitium sit. Plinij uerba sunt. Et æquinoctio nascens Aphace, Acinos, quam Epipetron uocant, quæ nunquam floret. Seri in hortis Acinon a quibusdam hic ait, Aegyptios intelligens: qui ad coronas & cibos ea passim uterentur. Ocimo notissimo cunctis oleri similis Acinos est: ob eamque similitudinem a posterioribus addita huic scriptori uox illa est. A quibusdam syluestre Basilicum dici Acinon: quoniam quod græcis & latinis Ocimum fuit, nobis ex multo tempore Basilicum in quotidiano sermonis usu est. Non multi tamen facienda uox ea est.

De Bacchare. CAP. XLIX.

BACCHARIS hæba fruticosa, quæ in coronas addit. Cuius folia aspera sunt, media Violæ & Verbasci magnitudine. Caulis angulosus, cubiti altitudinem petens, adnatis appendicibus aliquantulum asperis, flore purpureo subalbicante, odorato. Radicibus Veratro nigro similibus, quibus odor inest Cinnamomo proximus. Asperum, squalidumque solum amat. Radix in aqua decocta ruptis, uulsis, præcipitatis, spirandi difficultati salutaris. Item diurnæ tussi, & urinae difficili. Menses pellit. Contra serpentium morsus utilissime datur in uino. Recens radix apposita, partum extrahit. Puerperis eius decoctum in deflectionibus prodest. In diapasmata utiliter inseritur, iucundi odoris gratia. Folia, utpote quæ adstringant, capitis doloribus illitu profunt. Oculorum inflammationibus, mammae tumetibus a partu, ægilopijs incipientibus, ignibusque sacris auxiliantur. Odor somnū gignit.

BARBARI COROLL.

Baccharis, quæ & Baccar dicitur, quæ fascinum depellitur, radicis dumtaxat florisque odorati est: a quibusdam uocata Nardum Rusticum falso, cum Nardus Rustica sit Asarū. Oleum, & unguenta ex ea radice fieri solita, Hippocrates, & Cephisiodorus, & Aristophanes poetæ testes sunt. Vnde quidam errore ducti, Barbaricam eam uocabant. Addit Cephisiodorus, & pedes eo lini confueuisse, ut Aegyptio manus, Sisyphino brachium, malas & papillas Palmeo, Amaracino comam & cilia, Serpillino ceruicem & genua: quod & in comœdia cecinit Antiphanes. Baccharis inquit Galenus, Hippocrati unguentū quoddam Lydium significat. Similli

D I O S C O R I D I S

Crimini Bacchari Combretum, sed pcerius, & foliorū exilitate usq; in fila extenuatum. Baccha-
rem Plinius Asarū, Dioscorides a nostris appellari uolūt Perpensam, Aretij, & in Illyrico nascē
tem, cōmendatissimam ad calculos: si modo eadem est cūm Perpressa: utroq; cūm mō legitur, &
alterutram lectionē deprauatā esse duco. Sunt exemplaria, in quibus nec Perpsa, nec Perpres-
sa, sed spersa, siue sparsa scriptum sit. Nō defuere, qui Baccharem genus esse floris existimaret:
quem mō Caryophyllon uocamus, sed syluestris: nunc altilis ij spectantur, ab odore ita cogno-
minati, tāta uarietate, amplitudine, pulchritudine, ut Rosę pares, non inferiores uideri possint,
cū eaq; de principatu certent: quando nec colore superantur purpureo, uermicularo, candido:
nec odore, nisi q; a longinquo plus olet recens Rosa. Iam nihil Rosa fugacius. lōgissima namq;
decerpus mora dies. Caryophyllo in triduū, & amplius uita, uigorq; durat. Aliquis tanta ma-
gnitudo, Parauinarum p̄cipue matronarum cura, ut orbem utraq; manu complecti fere ne-
queas. Folia quaterna, quinaq; nonnullis Rosę mō numerosa, mirabili quorundā alabastrum cul-
ture ratione: q; dehiscens, ipso staminum loco alabastrum ostendit alium, pandentem se paulo
post in florem, caliculo priore consenscente. Scio putare aliquos Caryophyllon ueteribus fu-
isse Caltham. Sed cum Virgilius nobis eam luteolo cecinerit colore tinctam, nec Plinius a Vir-
gilio dissentiat, nondum uideo qui possit ita statui. A Caltha porro Calthutę uestis genus dici-
tur, ut a Croci similitudine Crocotula. Quę sit autem Barbarica, cuius mentionem supra mo-
do fecimus, non constat. Nam Sylua barbarica, idest, Conseminea omnino aliud est: quippe
quę ager sit glandibus, & quę sunt ijs similia, manu constitus. Nam & uineę Conseminales di-
cuntur, in quibus diuersa uitium genera consueuerint, auctor Columella. Nam sylua Ciminea,
cuius omnes fere mētionē habēt, Strabo, Plinius, poeta Virgilius, & Silius, in Ethruria mon-
stratur inter coloniam Tusellanam, & Viterbium, & ubi nunc uici lacus dicitur. In ea sylua lo-
ca sunt, in quibus depasta in terram non extrahūtur. Fuisse quidem inter Romanum Sabinūq;
agrum quę Sylua diceretur, scio autore Stephano. De Sylua quoq; populi Romani propria,
seu hac, seu alia Cicero in actionibus suis contra Rullum Tr. Pl. meminit.

E X M. V E R G. C O M M.

Diximus primo uolumine cum de Asaro ageremus, multa quę ad Baccharem pertinerēt.
Illudq; p̄cipue tunc legentes monuimus, non illic, sed hoc loco priuatim de ea nobis agen-
dum fore: quod reddere modo nos decet: & si non adco multum sit quod in notissima omni-
bus planta reperi ex antiquis possit, aut debeat. Satis eam descripsit Plinius libro. 21. capite. 6.
satis & rura omnia uolentibus eam ostendunt. Nosq; utriusq; Plinij scilicet, & ruris auxilio, qd
erat in scriptore hoc, amare Baccharem aspera loca, & uinosa, idest, uliginosa & humentia, in cō-
trarium habitum detorsimus: diximusq; rati antiquam fuisse lectionem, uinosa, nec humida:
propter ea, q; Plinius ait, Gracili, nec humido solo prouenit: & in quibus ea nascitur locis, aqua
& humore omni p̄grumq; carent.

De Ruta. C A P. L.

Ruta duplex, Montana, quam aliqui Rhyten montanā uocāt:
& hortensis, quā Aegyptij Epnubū, Syri Armala, alij Besafa.
Aphri Churina. Mōtana syluestrisq; acrior est, & in cibis damnata. Sa-
tiua uero quę sub arbore Ficus enascitur, magis in cibos admittit. V-
traq; urit, calfacit, exulcerat. Vrinā ciet. Mēstrua pellit. Aluū sistit potu,
ciboue. Lētaliū medicamentorū antidotū est, si semen ex uino acetabu-
li mensura ebibatur. Folia per se p̄sumpta, aut cū nuce iuglāde, aridif-
q; ficis, inefficaces uenenorū uires reddūt. Cōtra serpētes simili mō su-
mere cōuenit. Geniturā cibo, potuue extinguit. Cū Anetho sicco deco-
cta, tormina sedat. Facit ad pectoris laterūq; dolores, difficultatē spirā-
di, tusses, pulmonis inflāmationē, coxendicū articularūq; cruciatus, &
rigores febriū circūitu repetentes, pota ut antedictū est. Item ad inflati-
ones coli, uulua, rectiq; intestini, decocta & imposita. Fœminas uul-
uę strangulatu liberat, si a genitali sedetenus cum melle subiiciatur.

A Feruifacfa ex oleo & pota, uētris tīneas excutit. Articulijs doloribus ex melle, aquæ inter cutem cum ficis illinitur. Eisdem in potu auxilia-
tur, decocta in uino ad dimidias parteis, & oblita. Cruda, conditaq; ci-
bo, uisus aciem excitat. Dolores oculorum cum polenta lenit. Dolori-
bus capitis cum rosaceo, & aceto illita auxiliatur. Profluentem naribus
sanguinem sistit, trita et indita. Testium inflammationibus cum latre-
is folijs imposita, & eruptionibus papularum cum myrto & cærato pro-
dest. Cum pipere autem & nitro affricta, albæ utiligini medetur. Cū
eisdem illita fornicationes tollit, & uerrucas quæ thymi florem repre-
sentant. Contra impetigines cum alumine & melle utilissime imponi-
tur. Succus in mali punici calyce calfactus, aurium dolori efficaciter in-
funditur. Hebetudinem oculi qui sensere, Ruta cum Fœniculi succo
ac melle peruncti iuuantur. Ignem sacrū, ulcera quæ serpunt, aut in ca-
pite manant, cum aceto rosaceo & cerusa perfanat. Mansa Alliorū, Ce-
parumq; acrimoniā domat. Montana si copiosius estur, interficit. Dum
florem promit, & ad niurias colligitur, cutem inflat, et rubore quodam
inficit, cum pruritu ac uehementi inflammatione. Oportet itaq; eam un-
ctis antea manibus & facie colligere. Tradunt succum gallinaceis pul-
lis insparsum feles arcere. Adijciūt eam quæ in Macedonia circa Olci-
mū amnem prodeat, comedentes interimere. Montosus aut is locus, ui-
peris scatet. Semen eius potū cōtra intestina uitia efficax est. In antido-
ta cōmode additur. Contra incontinentiam urinæ, tostū semen septe-
nis diebus potui datur. Radix huius montanum Moly uocatur. Sylue-
stris Ruta satiuæ similis est. Prodest comitialibus, & coxendicum do-
loribus. Menstrua mouet. Partus enecat. Acrior est uiribus q̄ hortē-
sis & ualidior. Syluestris, utpote noxia, cibis abdicatur.

BARBARI COROLL.

Rutam, ut alia quoq; olera, quæ diu uiuunt, unitas caudicis, & p̄grandes ramī, quos Acrē-
monas, & Cremonas quandoq; Græci uocant, arborem uideri faciunt. Latiora satiuæ folia,
Rami fruticosiores. Cicuta Rutæ aduersa, probabili argumento: quoniam colligentes Rutam,
manus Cicutæ succo muniūt sculptores, pictoresq;. Ruta in cibo utuntur, ppter uisum. Mustel-
la cum serpente dimicatura, in murium uenatu, Rutam prius edit. Pythagoras marem minori-
bus & latioribus folijs, & coloris herbacei, disceuit a fœmina & odore. Humore, simū, hyemæ
Ruta odit: apricis gaudet & siccanis, terra q̄ maxime lateritia, & cinere: qui & miscetur semen-
ti, ut careat erucis. Mustū Rutarum populo Romano dari solitum, non ignotum est.

Plin. lib. 26. ca. 19.

De Syluestri Ruta. CAP. LI.

Rutam syluestrem aliqui appellant Hypericō, alij Androsēmō,
alij Coron, alij Chamæpityn, Romani Hederalem, aut Cento-
nalē, Aphri Churma semmaced. Odor seminis resinofus est. Ideo Cha-
mæpitys aliquibus nominatur. Frutex est surculosus, rubescens. Folia
Rutæ figura, flores lutei, qui digitis triti sanguineo succo manant. Vn-
de Androsamon uocitarūt. Ramuli subhirsuti. Siliquæ teretes hordei
effigie, in quibus semen nigrū resinā olens, Gignitur in cultis & aspe-

πύραρον ἄγριον

F iij

D I O S C O R I D I S

Cris. Vrinam ciet. Menfes appositu trahit. Pota cum uino, quartana libe-
rat. Folia cum femine ambustis illitu medentur. Et diebus quadragin-
ta epota ischiadicos sanant. Vocant etiamnum hoc modo syluestrem
Rutam, quod in Cappadocia & Galatia Asiae finitima Moly dicitur.
Frutex est, qui ab una radice multos emittit cauliculos. Folijs multo
q̃ alterius Rutae longioribus, tenerioribusq̃, odore graui, flore candi-
do, capitulis in cacumine paulo maioribus q̃ satiuæ Rutæ, quæ tribus
maxime partibus constant. In quibus triangulum semen, subruffum,
gustu amarum recluditur. Cuius est usus. Semen autumnino maturefcit.
Quod cum melle, uino, croco & sceniculi succo, ac gallinaceo felle, ter-
ritur contra retusam oculorum aciem. Sunt qui eam Armalam uocet,
Syri Befassan. Qui Cappadociam incolunt, Moly, quoniam quandā
cum Moly seruet similitudinem. Radice nigra, flore candido. In colli-
bus & læto solo prouenit.

Rutæ syluestris proprium genus est. Monsana hæc, & uulgaris. Sed & Hipericon nonnulli
ad Rutam syluestrem referunt; de quo inferius.
Ruta Galatica hæc est, quam Plinius intelligit præcipuam in antidotis.

De Moly. CAP. LII.

Moly aliqui syluestre Leucoion appellant. Folia habet grami-
nis, latiora, humi sparsa, florem albæ uiolæ similem, sed mino-
rem, lactei coloris. Caulem candidum, quaternum cubitorum. In cuius
cacumine inest aliquid quod Allij speciem referat. Radix parua, bul-
bosa, quæ mirum in modū ualet ad aperiendas uuluas, si trita cum iri-
no unguento in pello subiiciatur.

BARBARI COROLL.

Moly Homericum, Phineo & Cyllene Arcadiæ uernaculum, radice nigra, Cephæ magni-
tudine, rotunda, folio Scyllæ. Negat Theophrastus uerum esse quod Homerus cecinit, disti-
culter effodi: affirmat Plinius. Hanc uates ille a Dijs uocari putat Moly, Mercurium inuento-
rem fuisse, Vlixiq̃ contra Circes ueneficia monstratam. Ouidius, 14. Metamorph.
Pacifer huic florem dederat Cyllenius album,
Moly uocant Superi, nigra radice retentum.

Aliqui florem eius nō candidū, ut Homerus, sed luteū pinxere. Plinius in Campania effosam,
ægre inter difficultates saxæas & allatam sibi meminit, radicis triginta pedes longæ, ac ne sic q̃-
dem solidæ, sed abruptæ. Tale uerū est Moly. Dicitur & Moly Ruta Galatiæ, de qua diximus: qd̃
solum ætate nostra medici nouere, Harmelā uocantes: quemadmodū & Dioscorides & Gale-
nus a Syris dici eam testantur. Differt ab hac Molon, quam & Syron dici tradit Plinius, etiam si
Oestron, non Syron in exemplaribus quibusdā legit̃, scapo striato, folijs paruis, mollibʹ, radi-
ce quatuor digitorū, in qua extrema Allij caput est: anhelantibus, & stomacho, pdesse credita.

EX M. VERG. COMM.

QUOD in græcis & latinis poetis passim auditur, & celebratur Moly, Homericum, il-
lud est, q̃ cōtra Circes ueneficia Vlyxē Mercurius armauit: & in quo describēdo poe-
ta ille pluries decima Odissæ Rhapsodia cecinit uersus. ὅς ἑρα φωνήσας πῶς φάρμακον ἀργυρόντι, ἢ
γαῖος ἔρυσας, καὶ μοι φέσειν αὐτοῦ ἰδμεῖν. ὅς μιν μέλαι ἰσκι γάλακτι δὲ ἕκτιλον ἄνθος. μῶλον δὲ μιν καλὶ-
νερὶ θεοὶ, καλεπὸν δὲ τ' ὀρίανιν. ἀνδράσι γένετοῖσι θεοὶ δὲ τι πάντα δύνανται. Quodq̃ Naso in Trans-
formationibus suis dixit. Pacifer huic florem dederat Cyllenius album, Moly uocant Superi,
nigra radice retentū. Et qd̃ in Priapeis carminibus audit̃. Hinc legit̃ radix de qua flos lacteus ex-
ir, Quam cur Moly uocant: mentula Moly fuit. Omnia nullam habent, nisi ex Homericō illo

figmēto causam & rationē. Quam tamē graues græcorū & latinorū scriptores, honorem hunc principi omnium poetarum, ut nos credimus, habentes, tanti fecerint, ut Theophrastus libro nono de plantarum historia Moly describens, Homero, præterquam in radice, subscripserit: testatus in Phæneo & Cyllene Arcadiæ nasci, quale Homērus cecinit, radice rōrunda, ceposaque, folio Scyllæ: usumq; eius contra ueneficia & excantationes esse: non tamen difficulter, ut Homerus dixerat, ex terra effodi. Et post Theophrastum Plinius libro uigesimo quinto capite quarto, omnia a Theophrasto dicta Romanos docens, hæc amplius tradiderit, nigro colore radicem eius esse: nec candido flore, sed luteo ab aliquibus græcis describi: nasciq; in Italia, & ab herbarum peritis medicis sua ætate allatum sibi ex Campania, inter difficultates saxæas natum, radicis triginta pedum: quæ nec tota effossa esset, sed abrupta. Ex his tam multis, tantæq; auctoritatis ad hanc rem testibus, ratio cinari, colligereq; necesse est, proprium habere genus inter herbas Moly: nomineq; hoc non syluestrem Rutam, sed sui generis herbam communiter indicari: in Galatia tamen & Asia priuatim syluestrem Rutam eo appellari. Quod manifeste in sexto Paulus Aegineta indicat, de eo his uerbis agens. Moly, quod agrestem Rutam aliqui. &c. Et præter Paulum in græcis & latinis omnes fere alij in agresti Ruta hoc nomine utentes, non aliam ob causam, q̃ in Cappadociæ & Asiæ Galatia syluestris Ruta, ut hic paulo ante testatus est, eo indicabatur. Neq; ætate hac nostra Moly aliud, q̃ syluestrem Rutam significat: eam scilicet quā Plinius in Galatia nascentem, in antidotis præcipue laudauit, Galatiam appellans. Dioscorides tamen aliud a Ruta Moly esse intelligens, cum de agresti Ruta testatus esset Moly a quibusdam uocari: de eo quod priuatim Moly ab Homero & Theophrasto dicit, egit, ex proprijs notis eum legentibus ostendens. Vidimus nos undiq; scriptoris huius historiae, præterq; in flore, respondentem plantam: quem luteo, non candido, & ut hic ait lacteo colore ostendebat: ex quo non penitus uanum opinati sumus quod a Plinio dicitur, tradidisse quosdam luteo flore Moly esse. Verum tamen contra Homerum & Theophrastum temere quispiam aliquid dixerit: neq; ego id ausim: cum similitudo naturæ in huiusmodi late pateat, & ea multiplici uarietate solita sit suos diuersis locis flores effingere. Non relinquendum illud etiam, q̃ parum uerisimile est, proferre Moly hoc caulem altitudine cubitorum quatuor: suspicamurq; nos in cubitorum numero uerum esse: neq; enim herbæ, fruticisue, quale Moly nunc ostenditur, sed arboris legitima altitudo ea est.

De Panace.

CAP. LIIL.

PAnax nonnullis Heracleum dicitur. Ex quo Opopanax colligi solet. Plurima ex parte in Beotia, & in Phocide Arcadiæ nascitur. Ibiq; compendij causa studiose colitur. Folijs est asperis, in terra iacentibus, hærbacei coloris, ad ficulnea accedentibus, in ambitu quinquepartito diuisis. Caule, ut Ferulæ altissimo, qui lanugine quadam incanescit. Folijs etiam minutioribus obsitus. Muscarijs ceu Anethi in cacumine. Flore luteo, & semine odorato, feruenteq; Radices habet multas ab origine una candidas, graue olentes, crassi corticis & amari. Nascitur in Cyrene Libyæ, & Macedonia. Excipitur succus incisa radice, recenti caulium pullulatu. Ea candidum succum emittit, qui siccatus, in summa cute croceum colorem contrahit. Effluentem autem succum excipiunt, folijs excauato solo stratis, quæ siccata tolluntur. Simili modo caule messibus inciso, profluentem succum eximunt. Meliores ex radicibus albæ, rigidæ, & siccæ, ingustabiles, aromaticæ, feruentes gustu. Fructus ex media Ferula cibo idoneus est. Sed ex agnatis stolonibus, ab usu cibario abhorret. Maxime in hoc succi genere probatur, q̃ amarissimus, interne albus, aut subfultuus, foris ad croci colorem inclinans, læuis, pinguis, friabilis, statim in aqua eliquesceus, gra-

D I O S C O R I D I S

Cui odore. Niger improbat ac mollis. Adulteratur Ammoniaco, aut Cara. Sed synceri experimentum est, si digitis in aqua friatus resoluatur, & lactescat. Excalfacit, mollit, extenuat. Febriū rigoribus, uulsis, ruptis, laterum dolori, torminibus, stillicidio urinæ conuenit. Contra uesicæ scabiem ex aqua mulsa, aut uino bibitur. Menses trahit. Foetum enecat. Inflationes quæ uuluam male habent, duriciasq; ex melle impositus discutit. Ischiadicis illinitur. Acopis, & capitis medicaminibus ammiscetur. Carbunculos rumpit. Podagricis cum uua passa illitus, subuenit. Dolorum dentium liberat, cauis inditus. Oculorum aciem excitat. Ex eo & Pice optimum fit emplastrum contra bestiarum morsus, quæ in rabiem efferantur. Ramenta radicis uuluæ admota, partus extrahunt. Ad uetera ulcera efficax est. Nudata ossa, corpore operit, si trita cum melle illinatur. Semen cum Absinthio sumptum, menses pellit. Cum Aristolochia prodest aduersus animalia, quæ uenenum eiulantur. Contra uuluæ strangulatus in uino bibitur.

Plin. lib. 25. capit. 4. & 12.

PANACES generibus continetur pluribus. Syriū nascitur unguētis: quod & in Psophide Arcadiæ, circaq; Erymanthi fontes gignitur. Ferula sui generis quinq; cubitorum, folijs quaternis, mox senis, humi stratis, ampla magnitudine, rotundis in cacumen, oleagineis. Radix autumno, caulis messibus inciditur. Precium succo, in libras bini asses, erant candido. Laudatur enim in primis candor eius coacti: sequens pallido statera. Niger colos, & mollicia improbat: id quod ex Macedonia affertur. Bucolicon uocant: quoniā armentarij succum excipiant eorum penitē sponte. Hoc celerrime euanesce. Secundū genus Asclepion. Tertium Heracion. Quartum Chironion. Quintū Centaurion, & Pharnaceon. Theophrastus primū genus Heracion uocauit, folio magno & lato, undiq; sesquipedem. Radice digitum crassa, bifida, trifidaq; sub falsa, odore turis. Idem auctor & Panaceam noiat, circa Clitorium nascentem in Arcadia. Nec constat, an hæc idem sit habenda, quod Panaces Arcadiæ, de quo per huius capituli initia disserui. Panaces ipso nomine morborum omnium remedia promittit: ob id & medicamento ad uina quæ corrumpi nolunt, Panaceæ nomen dedere scriptores Græci. Radice huius euulsa, religio erat, impleri scrobem eius uario frugum placentarumq; genere: in mercedem uidelicet & piamentum terræ. Panaces, & Panax, Galeno teste dici solita.

LEX M. VERG. COMM.
Libet in Herculeo Panace hoc, & alijs quæ statim sequuntur, Asclepio scilicet, & Chironio, ut in bonorū uirorū arbitrijs quotidie sit, tertium aliquē dari mihi uelim, qui diuersa, contrariāq; de omni Panace sentientibus duobus maximis auctoribus, scriptore hoc, & Theophrasto, alteri accedens, non leuē dirimeret litem, & certiore aliqua nota, ex tam multis unū saltem Panaces nobis ostenderet. Turpiter em, nec sine graui iactura ignoratur, quod solo audito nomine, malorū omnium medicinā, & remedia homini pollicetur. Liceret ad hæc rem Plinio uti: sed alienæ potius historiæ interpret, q̄ suæ assertor ille est: miscensq; duorū sapenū numero simul scriptorum dicta, difficiliora omnia, & minus certa legentibus facit: nunc peregrinā Italiæ plan tam, & unguentis utilem in Syria nascentem, nunc in hortis nostris constat, & in uitæ quotidiano usu receptā: nunc ex tam multis eius generibus unum tantū docens, modo multa & plura q̄ hic & Theophrastus numerās. Quo fit, ut in tantū nominis apud ueteres planta, nostra uetere ætate non satis nota, difficiliora omnia futura sint.

PANAX Asclepij caulem a solo emittit tenuem, cubitalem, geniculatum, maioribus q̄ sceniculi folijs, hirsutioribus, odoratis, aurco flore, acri, odorato, ex muscarijs dependente. Radix parua est & tenuis.

CAP. LIII.

Auxiliarem uim habent flores & semina, contra ulcera, phagedænas & tubercula, si trita cum melle imponantur. Aduersus serpentes ex uino bibuntur, & cum oleo illinuntur. Aliqui Panaces syluestre Origanum uocant, alij Cunilam: de qua in Origanum mentione diximus.

B A R B A R I C O R O L L.

Panaces Asclepium, dictum aiunt, quoniam is filiam Panaciā uocauerit. Huius radicē Theophrastus multi & falsi corticis haberi dixit: quod quidē priori gñi a Dioscoride tribuitur. Est & Heracion appellatū, Herculi ascriptū inuentorī, quod ab alijs Origanū Heracleoticum syluestre accipitur. Quidā Heracion intelligunt genus id, qđ mentione proxima descripsimus.

B A R B A R I C O R O L L.

Quæ hic Asclepiū Panaces, folia Feniculo similia habere dixit Theophrastus li. 9. de plantarū historia, Thapsiæ nulla diuersitate cōparauit. Sigdem Thapsia Feniculi folio est: ut hic in eius historia non multo post dicit. Idē radicem Panacis huius crassam, & candidā esse dixit. Verba eius sunt, τὸ δ' ἀσκληπιον τὴν ρίζαν μῆκος ἔχειν ὡς σισυάμην, λευκὴν δὲ καὶ παχίαν σφῆδρα. Eiusq; nos accedere testimonio pbauimus, qđ in uetustissimo & oīm pbatissimo mihi codice legebat, ρίζα δὲ μικρὰ λευκὴ, qđ est, breuis & candida. Multus, & paulominus q̄ ubiq; in impresso codice hic error est: ut λεπὴν, & λευκόν, quorū alterū tenue, alterū candidū significat, inuicem cōmutent. Quāq; alij tenuē uerterūt, nos Theophrasti et melioris codicis fide adiuti, candidā diximus. Non posse aut tenuē legi, idē Theophrastus indicat, dicens, σφῆδρα παχίαν, i. ualde crassam esse. Superest, ut de longitudine eius etiā aliqd dicamus. Theophrastus σισυάμειαν, i. do drantatē dicit: hic μικράν, i. parū, & si in melioribus græcis μακράν, i. longā legatur.

De Panace Chironio.

CAP. LV.

PANACES Chironium, in Pelio monte maxime prouenit. Folium eius Amaraco simile. Flos aureus. Radix parua, quæ non alte demittitur, gustu acris. Pota radix serpentium ueneno resistit. Illita coma eadem præstat.

B A R B A R I C O R O L L.

Panaces Chironion, & hoc ab inuēto. Folium Rumicis Theophrastus & Plinius ei reddūt, maius tamē & hirsutius, radice parua. Nascitur locis pinguibus: cuius flos efficacissimus, eoq; amplius q̄ supradicta prodest. Est & genus aliud Panacis ab eodem Chirone inuentū, & Centaurion cognominatū. Sed & Pharnaceon in controuersia inuentionis a Rege Pharnace deductum. Seritur hoc longioribus q̄ cætera folijs, & ferratis. Radix odorata, in umbra siccatur; & gratiā uino adiicit. Huius duo genera fecere, alterū leuioris folij, alterū tenuioris.

EX M. VERG. COMM.

Discrepant toto genere in historia foliorū Chironij Panacis Theophrastus, & hic scriptor. Ille em Lapatho, quæ latinis Rumex est, eā comparauit. ἔχει δὲ τὸ μὲν χειρῶνιον φύλλον μὲν ὁμοίον λαπάθῳ, μῆκος δὲ καὶ λεπτέρων. Quibus uerbis, nisi uitiōsa sint, certius aliquid audiri non potest. Hic, φύλλα δὲ ἔχει ἀμαράκῳ ὅμοια, quæ id indicant, quod nos paulo ante diximus, folio Amaraci est: quod in tam grauibis, antiquisq; scriptoribus merito aliquis demiret: multoq; magis, q̄ uterq; habet antiquos alios scriptores idem in cōmentarijs suis testatos. Hic scriptor Nicandrus in Theriacis suis, qui de Chironio Panace hoc agens, ait, πρῶτην μὲν χειρῶνος ἱπαλθία ρίζαν ἔχει, κενθάρων κρονίαλα φερώνμῳ ἢν ποτε χείρων, πηλὶός ἢν νιφότοι κίχον ἰφράσαστο διερῶ, τῆς μὲν ἀμαράκῳ ὅμοια γὰρ περιδιδρομαι καὶ τῇ ἀνθῇ. &c. Quorū is est sensus, qui non multo ante in Herculeo Panace dictus a nobis fuit, idē amplius. Quod Amaraco similis fusa circūuoluitur coma. ἀμαράκῳ enim ille Amaraco similem dixit. Ille Plinium, qui lib. 25. capite. 4. de Chironio Panace ait, folium eius Lapatho simile, maius tamen, & hirsutius. Quæ licet ἡσδὲm uerbis ex Theophrasto reddita ab eo fuerint, nec maior ob id fides huic historiæ accedat, antiquam saltem Theophrasti eam fuisse lectionem testantur. Graues utrinq; scriptores stant, nec leui auctoritate utrinq; pugnatur: & in re non satis nostra ætate certa, difficillimum est censere aliquid: inuenisseq; quomodo Rumicis & Amaraci folijs, quorū grandius alterum, alterum breuius est, comparari eodem tēpore folium aliquod possit. Nisi forte dixerit aliquis, in altero figurā, in altero quantitatem in comparatione æstimari. Verū in tanto discrimine parum uerisimile id

D I O S C O R I D I S

C est. Solent enim cognomines plantæ, quales hæ sunt, maiore sui parte inuicē sibi similes esse. Idque in Origanis, Vellicarijs, utroque Elleboro, alijsque huiusmodi manifesteprehenditur. Neque ego is sum, qui facile persuadear. Si Herculeum Panaces, quod hic ait folia habere *πρὸς τὰ τῶν οὐκ*, quod est, ad ficulnei folij figurā, multoque magis magnitudinē: & Theophrastus *φύλλον ἰχθυμίας καὶ πλατὺ καὶ τρισάκιστον πανταχῇ*, quod est, habere Herculeum Panaces folium grande, latum, & in omnes partes trinis dodrantibus, Chironium hoc ob similitudinē Panaces, itidem appellatum folio Amaraci esse. Inclinat ob eam causam animus in Theophrastum, qui Rumi cis folio Chironij huius Panacis folia comparauerit, quæ grandia Panacum omniū folijs magis congruent. Quodque a Nicandro & scriptore hoc de Amaraco dicitur, odoris, coloris, aut figuræ tantū rationem habere. Legentibus tamen & herbarum peritioribus liberum & arbitrium hoc, quemadmodum & multa alia, relinquatur.

De Ligustico.

C A P. LVI.

λυστικόν

Ligusticum, quod alij Panaciam, alij Panaces uocāt, plurimum in Liguria nascitur, in monte Apennino, Alpibus contermino. Unde nomen traxit. Panaces incolæ non ab re appellant. Quoniam & radice & caule Heracleotico Panaci simile sit, & uiribus eisdem præditum. Gignitur in altissimis asperisque montibus, ac umbrosis, maxime iuxta riuos. Cauliculum fert Anethi, geniculatum, tenuem, & in circumitū folia Sertulæ campanæ molliora, odorata, prope uerticem graciliora, & longe magis diuisa. In cacumine muscarium, in quo semen dependet nigrum, durum, & oblongum, fœniculo proximum, gustanti acre & Aroma olens. Radix candida, Heracleotici Panacis similis, odorata. Radicis feminisq; uis excalfactoria, concoquens. Prodest ad intestinos dolores, tumores, concoctiones. Item ad inflationes, præsertim quibus stomachus turgeat. Et contra serpentium ictus. Urinas, & menses potu trahit. Eisdem præstat effectus appositā radix. Semen cum radice oxyporis, & medicamentis decoquentibus ammiscetur. Stomacho per se utile. Quare pro perepere utuntur eo indigenæ ad obsonia. Adulteratur semine quodā simili. Quod facile gustu discernitur. Amarum enim est. Alij semen Fœniculi, aut Seselis ammiscentes, Ligusticum dolo uitiant.

Pli, li. 19. ca. 9.

B A R B A R I C O R O L L.
Ligusticum syluestre est in Liguria suæ montibus: sed scribitur ubique, quod & suauius est, quæ sine uiribus. Crateias apud Græcos, Cunilam Bubulam eo nomine intelligit falso. Cæteri fere Cunizaminem, Cunilaginemque. Ligusticum Galenus unius inuersione literæ, Libysticon appellat.

E X M. V E R G. C O M M.

Pro Piperis Ligustici semine utebatur ubique antiqua & rustica plebs, serebatque in hortis suis: licet non adeo efficax, ut in montanis Liguria per se nascens: non tam quia Piperis eam nondum copiā miserat India, quā nostra ætas, peragrato omni Indico mari, habet: quando, quia peregrinis mercibus libenter abstinentes, non minus sibi, quæ alijs in obsoniorum conditis liberalem fuisse naturā indicare uoluerunt. Ideoque quibus regio hæc nostra abundat, libenter utebantur. Sentiebant etiam, quas habet nimias Piper in calefaciendo & siccando uires, parcentesque illi, ex montibus, hortisque suis ad coenam saporem, uiresque eius alias quærebant. Præstabant id multa quondam in herbarum & seminum genere, sed Ligusticum præsertim: quo Columella ultimo ultimi libri capite ad Oxypora uti docuit. Frequens peculiarisque Apennini montis ad Alpes planta hæc est: a gente inuento nomine, quod etiam a græcis omnibus receptum fuerit, idque ex Galeno scriptore hoc, cunctisque alijs patet, in Liguria nasci testantibus: & si ut paulo ante diximus, in hortis feri postea coeperit: ne ex India, longinquisque locis repe-

tendum esset, quod sapore Piperis obsonia & pulmentaria eorū temporū cōmendaret. Crēdimusq; nos, esse hoc quod Columella lib. 12. Panacis nomine autumnō, & uere feri iubet, leni & subacta terra, raris interuallis, quo maius incrementū capiat. Idem quo diximus paulo ante loco Oxyporis misceri Ligusticiū iubet; & qualia antiquis Oxypora essent, & quo modo conficerent, longissime etiā docuit: sic dicta, q̄ aceto condita ad intinctus seruarentur.

De Pastinaca.

CAP. LVII.

Pastinacam syluestrem, aliqui Cerasconiam uocant, Latini rusticam Pastinacam, aliqui Carotam, Aegyptij Babubyron, Aphri Sicham. Folia Gingidij habet, latiora, subanara, caulem rectum, scabrum. Umbellam similem Anethi, in qua flores insunt candidi, & in medio purpureum quiddam, ferme croceum. Radix digiti crassitudine, dodrantalis, odorata, quæ cocta manditur. Semen potum uel impostum menstrua mouet. Iis conuenit in portione, quos urinæ difficultas torquet, aut lateralis dolor excruciat, aut si aqua cutem subiit. Serpentium moribus ictibusq; prodest. Præsumentes eam, nulla affici iniuria a serpentibus traduntur. Conceptus adiuuat. Radix urinam pellit. Venerem stimulat. Partus apposita eiicit. Folia trita, & cum melle imposita, phagedænas ulcerum purgant. Satiua ad eadem pollet, inefficacior tamen, & cibo aptior.

BARBARI COROLL.

Pastinaca sylvestris, siue quod idem est Erratica & pratensis, ad differentiam satiuæ dicitur. Præfertur satiuæ sylvestris in medicina, magisq; in petrosis nata. Pastinacæ omni radicibus calens natura, sapor uehemens, ob id Venerem ciere creditur, & propterea Philron uocari. Cartilaginei omnis generis. Satiua in cibum utilis esse incipit annicula. Bima utilior, gravior autumnō, patinisq; maxime, & sic quoq; uirtus intractabile illi est, ut inquit Plinius. De Hibisco & Dauco, quæ simillima existimantur Pastinacæ, dicemus suis locis. Diximus & de Sisere, cui cum Pastinaca uicinitas eadem est. Pastinacam Diocles medicus non Staphylinum, ut cæteri, sed Astaphylinum uocauit, duodecim cubitorum in Mauritania magnitudo caulis, crassitudo palmorum quaternum.

EX M. VERG. COMM.

Dvplex genus Pastinacæ, satiuæ, scilicet & agrestis. Rursusq; agrestis multiplex. Potius dī uilio q̄ genus suspicionē quorundā merito auxit, sit ne agrestis Pastinacæ idē Daucus, an alteri us generis herba: præsertim duobus capitibus, diuersisq; locis de utroq; tradente scriptore hoc. Verum ex his, quæ in græcis & latinis obseruata diu a nobis fuerunt, sciendum illud est, Staphylinum a græcis simpliciter Pastinacam dici olus, & oleris notissimam, & quotidiani usus radicem: nullaq; adiecta nota alia, satiuam semper intelligi. Sic Columella in carmine suo cecinit. Latetur, mollemq; sinum Staphylinus inumbret. Serenda enim in hortis tunc numerabat. Idem libro decimo capite quarto. Tunc agrestis Pastinaca, & eiusdem nominis Edomita, quam Græci Staphylinum uocant: Edomitam satiuam intelligens. Sic rei rusticæ & hortensium scriptores alij. Plinius, quoniā utriusq; quotidianus esset usus, satiuæ, agrestis ue addito discrimine, alter utruq; præcipuum indicat. Habet satiuæ hæc, ut fere in plantarum genere omnia, diuersam sibi syluestrem nascentem ubiq;: multi usus & ipsam, & in medicina præsertim. Nam satiuæ illa præcipuum habet in sanitate interolera usum. Syluestris uenit & ipsa quidem in quotidianos cibos, sed ob multas, quas habet medicas uires, a medicis celebratur, & expetitur magis. Hanc Græci nunc, nisi addito syluestris discrimine, appellant, σαφύλινον ἄγριον uocantes, id est, Pastinacam syluestrem. Intelliguntq; eam, quæ locis incultis nascens, Satiuæ pariter frondeat & floreat, sed minore radice, & magis fibrata sit. Syluestrem hanc idem Græci, ut certiore uocis discrimine a satiuâ illa separaretur, Daucum dixerunt. Testis pluribus locis Galenus: qui de utroq; Staphylino agens, ait, ὁ μὲν ἡμῖν ἀσθενέστερος ὁ δὲ ἄγριος ὢν καὶ ἀκρότερον καλοῦται. Quod est, Satiua quidem Pastinacæ ignauior: agrestis uero, quā Daucū uo-

A

σαφύλινον ἄγριον

Pli. li. 19. c. 35.

B

D I O S C O R I D I S

Cant. &c. Agrestem Staphylinū, Daucum tantū nominis auctor uocari tradidit. Testis Paulus Aegineta lib. 6. de simplicibus agens. *Δαυκός ὁ καὶ σταφυλίνος*, quod est, Daucus, qui & Staphylinus. Sed manifestius primo uolumine capite de his quæ edendo radices habent: in quo cum plures alias numerasset radices, *σταφυλίνον καὶ δαύκον* ait: quod est: Staphylini autē & Dauci, satiuam, & syluestrem Pastinacā intelligens. Plinius præterea multis locis, & ipse congenerū duarum radicū discrimina aperte indicauit. Nec dubitandū cuiusnam esset, quin Staphylinus græcis, & Pastinacā latinis simpliciter dicta, in hortis consita non significet, longiorem, crassio rem, nec fibris capillamentisue tot quot syluestris in terra harentem: Daucus uero illis, nobis agrestis Pastinaca, syluestrem illam significet in aruis, pratis, & incultis locis per se nascētem. Cuius radice per hyemem satis grata in cibis etiā sit. Estur enim cruda in acetarijs, sed cocta suauius respondet & sapit, Rura nostra satiuā illam Pastinacam, Syluestrem non multo diuersa uoce, mutatisq; tantū aliquot literis appellant: ut ex hoc etiā congeneres herbas esse conijcere liceat. Superest modo, ut dicamus, si satiuā tantū, & agrestis Pastinaca sit: illaq; simpliciter Pastinaca, hæc Daucus quondā, aut syluestris Pastinaca dicta fuerit: cur duobus capitibus, diuersis locis, primūq; sub titulo agrestis Pastinacæ, mox sub Dauci uoce de eadē planta hic scripsor egerit. Quod ex Theophrasto, Plinioq; nouisse difficile non fuerit. Neq; em̄ hic, quia diuersi oīno generis sunt, syluestris Staphylinus, & Daucus duobus locis, & duplici historia de eis egit: sed quod uarietate in diuersis gentibus earum herbarū natales & uires natura, restari in medicina seorsum id oportebat. Plura em̄ Daucorum gēna numerauit antiquitas, non gēne, sed natali solo diuersa. Indicatq; id Plinius lib. 19. cap. 4. qui cum agrestem, satiuāq; Pastinacā numerasset, moxq; tertiam, quā ille Hibiscum noiat, statim subiecit. Est & quartū genus in eadem similitudine Pastinacæ, quā nostri Gallicā uocant, Græci uero Daucon. Ex quibus conijcere facile est, quondā in græcis non omnē syluestrem Pastinacā Daucon, ut postea factū est, sed propriū, priuatimq; aliquod eius genus uocatū fuisse: quale Theophrastus lib. 9. de plantarū historia his uerbis indicauit, *Δαυκόν δὲ περὶ τῆς σαυτῆς τῆς ἀχαιῆς διαφέρει θερματικόν φύσει, ἵψαν δὲ τῆς μέλαινας*. quod est, Egregia bonitate autē Daucus in Achaia Spartensi agro, calefacit natura, & nigrā habet radicem. Qui color in satiuā & agresti Pastinaca nescio an in Italia uisus aliquādo fuerit. Ex eo nō fuerit in hoc scriptore absurdū, his de eadem plātā diuersisq; nominibus actū fuisse. Primū, ut quas habet in medicina uires agrestis oīs Pastinaca, ubiq; nascens indicaret: mox Dauci appellatione Cretica, ut ille in Dauco ait, & certis locis nascens doceretur: cuius propriæ uires propria sibi etiā historiā exigenter. Potuit & illud in causā esse, qd quo tēpore hic medicina suam cōmentabatur, Dauci appellatio non oībus syluestribus Pastinacis respondebat, sed Creticæ tantū. Quos em̄ nos testes citauimus Galenū, & Paulum Aeginetā, cum ostenderemus paulo ante eundē illis esse Daucū, & syluestrem Staphylinū, huic scriptori posteriores fuerūt: & quod certa rei ante eos æstimationē habuerat, mutata ut in ceteris humanis rebus sit uocū fortuna, aliud significare potuit. Quotidie em̄ fieri uidemus, qd Flaccus ait, perire multas, renasci multas subinde uoces, si uelit usus. Quæ penes arbitriū itus est & norma loquendi. Nobis, ut tā multa colligamus, pro cōperto est, agrestem Staphylinū, & Daucum græcis eandē radicem ex multo tēpore esse, & a latinis Erraticam Pastinacā uocari: & in hoc scriptore non damnandā eiusdem plantæ duplicem historiā. Factum em̄ id est, uel ob diuersas uires & notas, quas Cretensis & in Achaia nascens Daucus haberet, ob quas hic a cōmuni Staphylino hac uoce separauit: uel in quā partem nos propensiores trahimur, quoniā Dauci uox, antiquiore illa ætate, priuatim inter syluestres Staphylinos, aliquē indicans, a posterioribus ob similitudinē ad totum eorum genus translata fuerit: pertinetq; eo quod Plinius ait. Est & quartū genus in eadē similitudine Pastinacæ nascens, quā nostri Gallicā uocant: Græci uero Daucon. Ex his em̄ ratiocinari licet, Daucum similē Pastinacæ erraticæ esse, non eundē: & a Romanis nomine gentis distingui, quemadmodū in græcis a Staphylino agresti alio noīe distinguebatur. Hunc, siue syluestrem Staphylinū, siue Daucon appeller aliquis, hic *κίρας*, id est, cornu uocari ait. Quod & græcorū Lexica testantur, in quibus legitur *σταφυλίνος ἄγριος ὃν ἔνιοι κίρας καλοῦσι*. Credimusq; nos, quod paulo ante dictū est, a cornu forma & longitudine sic dictū a Græcis fuisse. Potuit tamen & alia rōne sic uocari, a fibrata & capillata radice, quā habet. *κίρας* em̄, ut testatur Plutarchus in li bello, cui titulus est, V trobi, in terrestribus. i. an aquatilibus maior prudētia sit, antiquis græcis *τρίχας*. i. capillū significabat. Cuius significationis indicium est *κίρας* uerbū, quod tondere est: & *κονρά* nomē. i. tonsura: & qui apud Archilochū *κίραπλάσσο* legebat ὁ περὶ κέμην καλλωπιζέη. i. qui in ornāda coma occupat. Quæ snia melior & probanda magis uidet, ob id quod statim sequitur. Sunt qui & comā Staphylinū agrestem, ob eandem scilicet causā uocent.

¶ De Sefeli. CAP. LVIII.

Sefeli Massiliense, quod nonnulli Sphagnon uocant, folia Fœni-
culi habet, crassiora, caulem uegetiorem. Umbellā Anethi, in qua
semen oblongum, angulosum, degustanti acre. Radix longa est, iucun-
di odoris. Semen & radix excalfaciendi uim habent. Potu stranguriæ
& orthopnoeæ medentur. Suffocationibus mulierum, comitialibusque
profunt. Menses & partus trahunt. Ad omnia interna mala pollent.
Tussim ueterem sanant. Semen cum uino potum concoquit, & tormi-
na discutit. Epialis febribus utile. Contra perfrictiones in itineribus, cū
pipere & uino bibitur. Capris, cæterisque pecudibus datur in potu, quo
facilius suos foetus enitantur.

BARBARI COROLL.

Sefeli Massiliense optimum. Lato enim grano & fuluo est: quo & Vultures uescant, & Cer-
uæ parituræ. Sefeli & Sili dicitur, & Seli apud Hippocratem, unde orta confusio Siler pro Sefe-
li uocantiū Arborefcit porro Siler, ut baculos rustici ex eo quæ faciant, in aquaticis nascens.
Molle Siler

Pli. li. 20. ca. 55

a Poeta dictum neutro genere, quod perçrarum sit in arboribus latina lingua. Refugiant hoc
serpentes. At Sefeli frutex non est aquaticus: quod quidem aliqui distinguere putantes, non Si-
ler, sed montanum Siler appellauerunt id, quod Massiliense est Sefeli.

EX M. VERG. COMM.

Aseminis figura latum Cyminum in græcis, Massiliense Sefeli aliqui ut uidetur appellau-
runt. Ea uox in antiquis eorum codicibus adhuc seruatur: nec nos eā negleximus, dicente Pli-
nio optimum Massiliense: lato enim grano, & fuluo est.

B

¶ De Aethiopico Sefeli. CAP. LIX.

Aethiopicum Sefeli, quod Aegyptij Cyonum phricen uocant,
folia habet Hederae, minora, & ad Periclymeni modū oblon-
ga. Frutex nigricat, palmitibus in bina cubita extensis, ramis sesquipe-
dalibus, capitulo Anethi. Semine in Tritici morem denso, nigro, ama-
ro, Massiliensi odoratiore & acriore, multum suauis.

αἰθιοπικὸν σέλιον

BARBARI COROLL.

Sefeli Aethiopico dignitas secunda. Hoc & nigrius est, & nascitur hodieque apud nos: sed fru-
stra, medicis officinisque incognitum.

¶ De Peloponnesi Sefeli. CAP. LX.

Peloponnesense folia habet Cicutæ, latiora, & crassiora. Caulem su-
pra Massiliensis magnitudinem, ferulaceum, & latum in cacumi-
ne capitulum, in quo semen latius, odoratum, & carnosum pendet. Eif-
dem uiribus prædium est. Nascitur in asperis, riguis & collibus. Inue-
nitur etiamnum in Ida monte.

¶ De Cretico Sefeli. CAP. LXI.

Tordylium, quod aliqui Creticum Sefeli uocant, iuxta Cilici-
am in Ameno monte nascitur, hærbula surculosa, semine du-
plici, rotundo, scutulorum effigie, odorato, subacri. Contra urinæ diffi-
cultatem bibitur. Potu cit menses. Succo seminis caulisque uirentis, ter-
nis obolis ex passo decem diebus hausto, renes sanantur. Efficax est ra-

τορδύλιον

G

D I O S C O R I D I S

C dix ad ciendas pectoris excreationes in delinctu cum melle.

BARBARI COROLL.

Tordylon, & Gordylon, & Tordilon & Tordyle dicitur, & Sefeli cognomēro. Creticum inter omnia genera odoratissimum. Tordylon porro, alij semen Sefelis dixerunt, alij herbā per se, quam & Syreon uocauerunt, de qua nihil aliud proditum inuenisse Plinius facetur, q̄ q̄ in montibus nascitur, Paulus non Tordilon, sed Gordylon appellauit.

EX M. VERG. COMM.

Non habet certum in antiqua medicina Tordylon hoc nomen, nec certam penitus historiam: aliter alijs id appellantibus, & de eo tradentibus. Plinius non satis cognouisse rem uidetur, diuerfas ante se scriptorum sententiās tantum referens. Paulus Aegineta in sexto, Gordylon, non Tordylō uocat: facile tamen & lubrico in una tantum litera ad uisum lapsu, quo loco eadem huic scriptori uires illi adscribit. Alij fœminino genere Tordylem uocauerunt. Alij Sefelis semen hoc nomine censi uoluerunt. Alij sui generis herbam Græciæ & Italiæ peregrinā, ideoq̄ parum notam. Nec nos quod pro ea dicamus aliud habemus, q̄ Sefelis genus esse credere nos: ex quo hic statim ab omni Sefeli eā descripsit: propriūq̄ & priuātū ab illis aliud a gente in qua nasceretur nomen sibi inuenisse. Fecit rei incertitudo hæc etiam, ut in fine capitis ab alijs leguntur, ab alijs interpretibus continuata sermonis serie reddita. Nos ea reliquimus indigno huic scriptori uerborum ductu tractata, & in uetustissimis græcis latinisq̄ nusq̄ inuenta.

De Sifone. CAP. LXII.

Sifon exiguum semen est in Syria natum, Apio simile, nigrum, feruens, oblongum. Contra lienis uitia bibitur. Vrinæ difficultatem potu emendat. Remoratos menses citat. Quo in condimentis cum Cucurbita & aceto indigenæ utuntur. In cacumine granula multa gerit.

BARBARI COROLL.

D Sifon, siue Sinon, & Senon Hippocrati, & quandoq̄ Silion uocatur, quaternis consistere ramis scriptum reperio.

EX M. VERG. COMM.

Cognouit Hippocrates Sinnon. sic enim eum appellat. Cognouit & Paulus Aegineta, qui calidū, & subamarum esse testatus est: ideoq̄ concoctiones adiuuare, menses pellere, & interanea, quæ græci ἀνδύνα dicunt, laxare. Latini scriptores, quod hæcenus legerim, aut meminerrim, nihil de eo egerunt. Hic etiā exiguum semen in Syria nasci dicens, importune relicta herba historiam eius inæcepit. Fuisse rem & usum eius satis Hippocrates, Paulus, græciq̄ omnes & latini huius scriptoris codices testantur.

De Aniso. CAP. LXIII.

Anisum semen paruum est in Syria natum. Apio simile est, magnum, feruens, oblongum. Contra lienem et urinam quæ ægre redditur, bibere prodest. Retardatos menses pellit. Id incolæ ad condimenta usurpare solent, & cum Cucurbita in aceto decocta assument. Anisum in summa exalfacit, exiccat. Oris halitum iucundiores facit. Doloris leuamentum præstat. Vrinam ciet. Aquam quæ subijit cutem dissipat. Potū sitim cohibet. Animalium uenenis aduersat. Valet ad inflammationes, aluumq̄. Alba fœminarū profluuiā sistit. Lac ad mamas elicit. Venerē stimulat. Dolores capitis leuat, suffitū narib. Cū rosaceo tritū, instillatūq̄ fractis aurib. medet. Melius semp recēs, plenū, non fursuro sū, odore p̄stans. Inter prima laudatū est Creticū. Proximū Aegyptiū.

BARBARI COROLL.

Pli. li. 20. ca. 17
lib. 19. cap. 8.

Anisum culinis gignitur, crudum, decoctum, uiuens, aridum, panis etiam crustis inferioribus subditum. Succis quoq̄ laudatur additum cum amaris nucibus comendando uino. Ani

etum & hoc uocatur Anethi modo, quoniā appetentiam præstet ciborum. Aegyptium Ligustici uicem præbet in condimentis. Efficacius semper recens & nigerrimum. Stomacho tamen inutile est, præterq̃ inflato.

¶ De Caro. CAP. LXIII.

CArum semen est uulgaris notitiæ. Excalfacit. Vrinam concitat. Stomacho utile. Os commendat. Concoctionem adiuuat. Mistum antidotis & oxyporis Anisi uicem præbet. Radix cocta Pastinacæ modo manditur.

BARBARI COROLL.
Caros arbitror hoc esse, quod Plinius Carium, siue Careum gētis suæ nomine appellatum dixit; ab aliquibus Careosemen, & Caroum: culinis principale, in quacūq; terra serendum ratione qua olus atrum. Laudatissimum in Caria, proximū Phrygia. Caros Græci, ut Pathos neutro genere pronuntiat & inflectunt. Dicitur & Caro, ultima producta. Caron Athenæus Pastinacæ maiorem esse putat, & multo præstantiorem sapore, q̃ Pastinacæ uulgarem. Est & radix Cara, de qua in rebus gestis a Cæsare mentionem facit Hirtius. Hac lacti admixta, multum leuasse dicitur inopiam, similitudine representata panis. Meminit & Plutarchus, sed nomē herbarum non reddidit.

EX. M. VERG. COMM.

Medicinam pluribus subinde remedijs instruens hic scriptor, Cari semen præcipue cōmendauit. Athenæus contra, ganeam cibosq; Dipnosophistas illos suos nono sui operis cōmentario docens, radicem celebrat, Maiorem Pastinacæ appellans, uulgari hac & quotidiana meliorem. Idem Paulus Aegineta libro primo capite de radicibus quæ edendo sunt, tres has ueluti congeneres his uerbis coniunxit. σαφύλινον δὲ καὶ δασύκον καὶ κάρον, αἱ μὲν εἶναι ὀλιγοτροφώτεραι τῷ γογγυλίδων ἰσχυρίσιν, ἀλλὰ καὶ ἀρωματίζονται σαφέστε καὶ οὐρητικῇ. &c. Quod est, Pastinacæ uero, agrestis Pastinacæ idem, & Cari radices minus q̃ Rapa nutriunt; calent tamen, odoratæq; sunt, & manifeste urinam cient. Ex quibus ratiocinari & colligere licet, aut Pastinacis congener, aut illis non dissimile Caron hoc esse.

¶ De Anetho. CAP. LXV.

ANethum quod estur, aliqui Polygida uocant, alij Anicetum, Magi Cynocephali genituram, aut capillos, alij Mercurij semē, Latini Anethum, Aphri Sicciriam, Aegyptij Adracum, Daci Pulpum. Aridi Anethi comæ seminisq; decoctum, potu lac euocat. Inflationes & tormina sedat. Aluum uomitionesq; sistit. Vrinæ ciet. Singultus lenit. Oculorum aciem hebetat. Genituram restinguit assidue potum. Fœminis uulvæ malo opportunis ad deflectiones utile. Condylomata illitus eius cinis tollit.

BARBARI COROLL.

Anethum, culinis Anisi modo gratum. Coronabantur hoc & in conuiuio recenti, atq; roscido, ad conciliandum, ut uidetur Galeno, somnum.

Pli. li. 19. ca. 8.
lib. 20. cap. 18

¶ De Cumino satiuo. CAP. LXVI.

CVminum satium ori gratum est. Sed multo magis Aethiopicum, quod Hippocrates Regium appellauit. Secundum locum tenet Aegyptium. Reliqua sequuntur. Prouenit in Galatia, in Asia, Cilicia, & Therentia, & plerisq; alijs tractibus. Excalfacit, adstringit, excicat. Ad tormina inflationesq; conuenit, coctum & cum oleo inditum, aut cum hordeacea farina illitum. Orthopnoicis datur in posca. De morsu a serpente in uino. Testium collectionibus auxiliatur, imposi-

G ij

Cum cum uua passa, aut lolij farina, cæratoue. Mensium abundantiam inhibet. Contritum autem in aceto, & naribus obiectum, sanguinis p^{er}fluuia sistit. Colorem bibentium, aut perunciorum mutat in pallorem.

Pli. li. 20. cap.
14. & 15.

BARBARI COROLL.

CVmino semen angustum, nudum, canaliculatumq; facile inarescens frumenti modo, ubi plane accreuit, defluū atq; lubricum. Peculiares Cumino morbi, scabies, & falsilago. Nascit in summa tellure, uix hærens, & in sublime tendens; in putribus & calidis medio ferendū uere. In Carpentania maxime laudat; alioquin Aethiopico, Africoq; palma. Quidam huic Aegyptium prætulere. Hippocrates in segetibus inquit triticeis, præsertimq; in Aegypto nascitur semē Aethiopico similē Cumino, uehemētis acrimoniæ, ad conceptus seminarum utile, si uuluis apponatur. Hoc ego Cuminum Aegyptiū interpretor. Basilicum & Aethiopicum apud Hippocratem, pleriq; interpretantur Ammi.

EX M. VERG. COMM.

Meliore scēre feliciusq; provenire Cyminum, lib. 8. de plantarū historia testatur Theophrastus est, si in ferendo maledicant, imprecanturq; illi mala qui id ferunt; nec minus gaudere maledictis his & imprecationibus, q̄ laudibus & blanditijs in spem honoris erigantur homines.

ἄγριον κύμινον

De Syluestri Cumino. CAP. LXVII.

Syluestre Cuminum, siue syluaticum, plurimum efficaciusque in Lycia & Galatiæ Asia, atq; Carthagine Hispaniæ gignitur. Frutice paruo, dodrantali caule, ac tenui, quaternis aut quinis folijs tenuibus, ueluti ferratis, & Gingidij diuisura. In cacumine capitula quina, aut sena habet, mollia, rotunda, in quibus est semen acerosum, gustu satiuo acriore. Nascitur in collibus. Bibitur semen ex aqua aduersus tormina, inflationesq;. Item cōtra uenenatas bestias ex uino. Singultus ex aceto sedat. Somacho utile, quem humor uexat. Sugillata tollit, si manducatum cum melle et uua passa illinatur. Testium inflammationibus, adiectis eisdem medetur. Est & aliud syluestris Cumini genus, satiuo non dissimile, quod a singulis floribus pensilia promit cornicula, in quibus semen est Melathio simile. Quod potum omniū serpentium moribus præsidio est. Calculosis, & ijs qui urinæ stillicidio uexantur, aut concretum sanguinem cum lotio reddunt, auxiliatur. Sed Apij semen feruifacium postea bibendum est.

BARBARI COROLL.

CVminum syluestre est, quod & Rusticum & Thebaicum appellat. Aetius Cuminum inquit syluestre, hoc est quod modo Aethiopicum uocari coepit.

De Ammio. CAP. LXVIII.

AMMI, LATINI Ammium Alexandrinum, nonnulli Aethiopicum, quidam regium Cuminum appellant. Plerique diuersarum naturarum esse Aethiopicum Cuminum, & Ammium existimant. Vulgo notum est, semen exile, multo minus Cumino, Origanū resipiens. Eligendum est purū, minime fursurosum. Vis ei exaltatoria, feruens & exiccās. Facit ad tormina, urinæ difficultatē, serpentium ictus cū uino potū. Menstrua ciet. Miscetur derodentibus cantharidum medicamentis, quæ Ecdoria uocant, ut inde exortis urinæ difficultatibus resistat. Sugillata cum melle tollit. Colorem potu, aut illitu

mutat in pallorem. Suffitum cum uua passa, aut resina, uulvas purgat. **A**

BARBARI COROLL.

Est Cumino simillimum quod Græci uocant Ammi, tantum candidius & exilius Cuminum. Similis autem & huic usus, nam & panibus alexandrinis subigitur, & alimentis interponitur. Herbam quoque ipsam græci uocant Ammi.

EX M. VERG. COMM.

Peregrinum semper Græciæ & Italiæ fuit, siue sui generis herba & semen, siue Cymino cōgener Ammi sit, meliusque & efficacius in Aegypto nascatur. Eamque ob causam usæ eo antiqua medicina est, aliunde inuectio. Fuit in Aegypto quondam domesticus Amos huius, & quotidianus usus: panibus enim cōpinsebant, & alimētis miscebant. Calefacere, siccareque in tertio ordine ueteres græci id dixerunt, maioreque in extenuando uique Cymini esse. Quæ autem a principio statim leguntur, uocare quosdam hoc Aethiopicū, & regium Cyminum, ex aliorum opinione, non huius scriptoris decreto intelligenda sunt. Neque enim ipse id probat, sed a quibusdam sic uocari tamen testatur. Siquidem Aethiopici, et regii uoces, bonitatis a genere in Cymino notæ sunt, non generum diuersitates.

De Coriano. CAP. LXX.

Corium, aut Corianum Aegyptij Ochion uocant. Vulgaris est notitiæ. Vim refrigeratorem habens. Quare illitum cum pane, aut polenta, ignibus sacris, & ulceribus quæ serpunt medetur. Epiphytydas cum melle, uel uua passa, testium inflammationes, carbunculosque sanat. Cum faba fresa, strumas & tubercula discutit. Tineas interanorum expellit, semen cum passo potum. Genituram adauget. Largius tamen sumptum, mentem non sine periculo mouet. Quare continuo & copioso re usu abstinentum. Succus cum cerusa, spumaue argenti, necnon acetato & rosaceo illitus, arduentes summæ cutis inflammationes emendat. **B**

BARBARI COROLL.

Coriandrum, Corion, & a Theophrasto Corianifon uidetur appellatum, siue ut magis probè Coriannon. Ita uocari solitum a ueteribus, testis est Galenus & Dioscorides. Seritur maio, & contumax prouentu scribitur. Radice breuiuscula, nec admodum fibrata: caulibus ramisque multis, nudo semine, ac firmo & diutino. Sub canis ortum falescit. Inter syluestria Coriandrum non est. Huic subrito cum aceto, uis tanta, ut carnem incorruptam seruet æstate. Xenocrates tradit menstrua contineri uno die, si unum granum biberint foeminae: bido, si duo: & totidem diebus, quot grana sumperint.

EX M. VERG. COMM.

Crediderunt Coriandro aliqui in Græcis nomen fecisse Cimices, quos folia eius & caules olent. Et quoniam insectum id græci Corin uocant, ideo olentem eos plantam Corion nominauerint. Sunt contra, qui quod Corian non græci frequentius quam Corion Coriandrum uocent, non a Cimicibus, sed quasi Coriambon, id est hebetantem oculorum pupulas dictum fuisse uelint. *κόρυ* enim oculi pupula, & *ἀμβλύνειν* hebetare idem græci dicunt. Quod quod uerum sit, peritiores intelligent. Ab hoc enim nihil quod ad oculos pertineat priuatim in Coriandro decernitur. Omnium eius appellationum prior illa in hoc, & alijs medicinæ scriptoribus frequentior est. Alteram illam in cōmuniore sermonis usu fuisse, indicat in egiptibus suis Aristophanes. Quocumque autem nomine uocetur, nota omnibus planta est, semperque præcipue: ideoque non ultra a nobis tractanda. Numerat ab hoc ipso scriptore, 6. uolumine inter uenena: odorque præsertim deprehendi, quod similis uiuenti Coriandro toto corpore sentiat. Meminit & Nicæder in Alexipharmacis suis, quod loco interpretis eius syluestri Coriandro ueneni masculium inesse ait: quod ab eo describitur latioribus longioribusque folijs, multis adnatis, & numerosa radice, copiosoque flore. Quod nescio an uerum sit: testante Plinio. 20. uolumine eiusdem numeri capite, non inueniri inter syluestria Coriandrum. De eo iterum in 6. agendum nobis erit.

De Hieracia. CAP. LXX.

Hieracia magna, alijs Sonchites, Romanis Lampuca, Pœnis Si-
thileas, caulem emittit asperum, subrubrum, spinosum, cauum,
G iij

D I O S C O R I D I S

C folia, ex interuallis rariuscule diuifa, similia Soncho per ambitum, luteos flores in oblongis capitulis. Vim refrigerandi habet, & modice substringendi. Vnde illita, stomacho aestuanti, inflammationibusq; prodest. Succus erosionem sorbitione mitigat. Hærbæ cum radice illita, uibratis a scorpione ictibus auxiliatur.

Pli. li. 8. c. 2. 11

BARBARI COROLL.

DE Hieracio inter Lactucas syluestres meminimus: quoniam Romani Lactucam folio rotundo & breui Hieracion intelligebant. Dicta est ex eo, qd accipitres scalpendo eam, & oculis succo tinctis obscuritatem cum sensere, discutunt.

Ἱεράκιον ἢ μικρόν

De Hieracia parua. CAP. LXXI.

Hieracia parua, quam aliqui Sonchiten, alij Entimō agrion, Romanij Intybum syluestre uocant, folia ex interuallis habet diuifa in ambitu. Cauliculos teneros, uirentes, in quibus lutei flores orbem circinantes emicant. Vim suam ad eadem quæ superior impendit.

BARBARI COROLL.

Hieracium, & hoc superius etiam Hieracia dicitur Aetio atq; Horo, cuius succo palpebræ reglutinant. Idem autor eodem loco, Anacollia inquit appellantur, quum lachryma incōmodantes pilos corrigit. Quid aut sint Anacollia nō cōpi: nec simplex, an cōposita sit facultas scio.

EX M. VERG. COMM.

Accipitres, quos græci Hieracas dicunt, Hieracio quondam nomen fecerunt: scalpentes eā, si Plinio credimus, succoq; oculos tingentes, ut eorum obscuritatem cum sibi obrepisse eam senserunt, discutiant. Apuleius, quod fabulosum uideatur, his addidit, Aquilam in altum alas se tollentem, ut rerum naturam certius contempletur, Lactucæ siluaticæ (Hieracium hanc intelligens) folia euellere: succoq; sibi oculos tingentem, optatam eorum claritatem acquirere. Sed quodcunq; id sit, ab his auibus græci Hieracium dixerunt. Sæpe enim a brutis, naturæ necessitate impulsis, ignotum aliquid nobis fit. In quo eorum sensus ignari homines, quod uero similius, non quod uerum sit comminiscuntur: quemadmodum longius in utroq; Echino dictum secundo uolumine a nobis est. In Lactucarum sponte nascētium censu ab omnibus propter similitudinem Hieracion hoc numeratur. Plinius. 20. libro, capite. 7. ultimam hanc in eo genere describit, folijs rotundis, & breuib. Apuleius in agresti Lactuca Hieracifon uocari dicens, meminit eius. Hic Lactucam erraticam dici a quibusdam tradit: quæ uox & appellatio quoniam in scriptore hoc perierat, ex melioribus græcis a nobis instaurata est. Non meminit eius in medicæ materiæ censu Paulus Aegineta: credimus, qd nullas hanc forte intelligeret, diuersas ab agresti Lactuca ures habere. Multa siquidem in Lactucarum censum & nomen uenerunt: Tithymallus, quæ ab aliquibus Caprina, ab aliquibus Marina Lactuca dicta est. Vtræq; istis, quam Glastum, siue Luteam uocari diximus. Hieracia postremo hæc. Omnium eadem ratio & causa fuit, qd latiore. f. & ampliore folio, quali Lactuca est, omnes sunt, & omnes lactis liquorem aliquem sectæ reddunt. Et nihilominus, quoniam priuatim aliquid singulæ habent quod Lactucæ & alijs non congruat, alijs appellationibus dictæ, & in alijs generibus constitutæ fuerunt. Sonchitem maius Hieracium uocari a quibusdam hic ait, manifesta ratione, quoniam am & hæc & illa concauo, & lacteum succum remittente caule est. Foliorum enim quantitate longius interuallo distat Sonchus ab agresti Lactuca, & ex eo ab Hieracio hoc: eamq; ob causam inuenientes in melioribus græcis, quo loco hic ait habere folia Hieracium per interualla incisuris diuifa, Soncho ἰσομήκων, id est, æqualia, non Soncho, quæ nostris Cicirbita est, sed τινύτω, id est, Betæ naturam et rem secuti, Betæ folio, non Sonchi Hieracij folia comparauimus. Lactucæ enim Beta uerius qd Sonchus in foliorum quantitate comparatur. Quemadmodum & minus Hieracium illud quod sequitur, agresti Intybo in foliorum quantitate exæquatam pariter est. Omnia enim eo pertinent, ut Lactucæ simile Hieracion sit. Eius unum tantum caput, Maioris scilicet in melioribus græcis legitur. Nec Plinius nisi unius meminit. Quo sit, ut suspicemur alterum hoc, & minus Hieracium priori illi accretuisse ab aliquo, qui inuentum forte breuius, & ut cœli terræque uis potest huiuscemodi uariare, alterum crediderit a superiore illo esse. Indicatque id, quod neque in historia, neque in medicina posterius hoc a superiore illo diuer-

sum aliquid habet. In censu & genere syluestrium, & sponte nascentium Lactucarum, sine unum, siue duo sint, Hieracia hæc numeranda sunt. Ostenduntque id Paulus Aegineta, qui nihil de his in medica materia egit. Indicant & latini omnes, in quibus Hieraci nulla historia est. Et quem nos habemus antiquissimum Dioscoridis latinum codicem, nihil quod ad Hieracia hæc pertineat, ostendit: cui in huiusmodi antiquitatis vestigijs, & ueræ lectionis coniectura, ob uetustatem suam, nos multum deferimus.

De Apio.

CAP. LXXII.

Satiuum Apium ad eadem quæ Corianum conuenit. Inflammationibus oculorum cum pane, aut polenta illinitur. Aestuantem stomachum mulcet. Mammarum duriciam reprimat. Urinam ciet, siue crudum, siue coctum edatur. Decoctum eius radicisq; potu, uenenorum noxæ resistit, quum uomitiones excitet. Aluum cohibet. Semen uehementius urinam pellit. Contra serpentium uenena, aut epotam argenti spumam auxiliatur. Inflationes discutit. Ammiscetur medicamentis quæ dolorum leuamenta præstant, Theriacis quoq; ac tussis remedijs.

BARBARI COROLL.

Apium & Apius Græci Selenon uocant. Durat biennio. Prouenit crispus, pedibus, aut cylindro, pilæ uel pulsatum, quinquagesimo a satū die, quadragesimo cum ocyslime. Apium aliud folio spisso, hirsuto, crispo. Aliud raro, expanso, caule item maiore. Item aliud caule albo, aliud purpureo, aliud uersicolore. Syluestriora hæc, ut Theophrastus inquit. Propriū Apio, quod colorem mutat. Rami eius per iura quoq; uulgo innant: & in condimentis peculiarem uoluptatem præbent. Pisces quoq; si ægrotant in piscinis, Apio uiridi recreantur. Honos ei in Achæia, coronare uictores sacri certaminis Nemeæ. Apud eruditos, non aliud erutum terra in maiore sententiarum auctoritate est. Distinguitur sexu. Fœmina ut sit crispioribus folijs, atq; duris, crasso caule, sapore acri & feruido. Mas folijs nigrioribus, breuioribus radicis, uermiculosisq; gignens. Neutrum ad cibos admittebant, Nephastrum existimantes, quoniam defunctorum sit epulis feralibus dictum: & ut Plutarchus inquit, coronentur Apio sepulchra: unde uetus illud, indigere Apio, de his qui profligata ualitudine uruntur. Vermiculos & fœminæ caulibus innasci: propterea eos qui ederint, sterilefcere utroq; sexu. In puerperis uero ab eo cibocomitiales fieri, qui ubera infantes hauserint. Innocentior tamen esse marem, eaq; causa est, ne inter Nephastrum frutices damnetur.

Pli. li. 20. ca. 11.
lib. 19. ca. 7. b.

EX M. VERG. COMM.

Quæcunq; a Plinio de Apijs lib. 19. capite. 7. eorumq; folijs, caulibus, coloribusq; dicuntur, multo ante a Theophrasto de plantarum historia octauo uolumine dicta fuerant: Differre scilicet Apiorum inter se genera, folijs & caulibus: Esseq; hoc denso, crispumq; & hirsuto folio, illud raro & lato: hoc maiore caule, illud minore. Et in hoc genere rursus aliud candido, aliud purpureo, aliud uersicolore: totumq; hoc genus syluestri simillimū esse. Rursusq; eodem libro. Quod grande, palustre, montanumq; appellatur, inter se & a satiuo differre: quoniam palustre prope aquarū riuos, & in palustribus nascatur, raro folio, nec hirsuto: simile tamen Apio esse odore, succo, & figura. Quod grande, folio palustri simili, hirsutū, & altiore caule, radiceq; Raphani crassitudine, colore nigro, semine indē nigro, maiore q; Erui: duobusq; hæc cōtra urinæ angustias, calculosq; credi uim habere in albo dulci uino pota. Nasci hoc ubiq; conrescereq; in eo lachrymam Myrrhæ odore, quam ueram esse Myrrhā aliqui crediderunt: Montanum maiores adhuc, & certiores habere differentias. Cicutæ enim folio est, radice tenui, caule Anethi, uerum minore. Vsum huius esse ad muliebria, id est, menses in uino austero. Et hæc Theophrastus quo diximus loco. Quæ omnia a Plinio qua cætera breuitate consuevit, antedicto uolumine numerata, & descripta fuerunt. Columella libro. 12. in hortorū prosa foliorum discrimina hæc, quæ a Theophrasto natia numerantur, culturā & artificio humano facere his uerbis docuit. Apium quoq; possis plantis serere, nec minus semine. Aqua precipue lætatur, & ideo secundū fontes cōmodissime ponitur. Quod si quis id uelit lati folij facere, quantum possint tres digiti seminis cōprehendere, raro linteolo illiget, & ita in areolas dispositum religet. Vel si crispæ frondis id fieri malueris, semen eius inditum pilæ, & saligneo palo pinitum, expoliaturq; similiter in linteolis ligaturum obruas.

Apium palustre ubi
innascitur.

G. iij

D I O S C O R I D I S .

C Potest etiā citra hanc operā fieri crispum qualitercunq; satū, si cum est natum incrementū eius, superuoluto Cylindro coercēas. Quæ omnia de satiuo intelligenda in eo scriptore sunt: ideo longius a nobis repetita, ut sciant, meminerintq; legentes: si natua foliorum Apij Theophrasto discrimina illa sint, licere, sperandumq; homini labore, diligentiaq; sua non imitari, quod multæ aliæ possunt artes, sed in ruris disciplina naturā etiam æquare.

¶ De Eleoselino.

C A P. LXXIII.

ἐλεοσίλινον

Eleoselinum, quod a quibusdam Pedinon, ab alijs Hydroselinon agrion, Romanis Apium rusticum appellatur. In humidis nascitur. Satiuo grandius, & ad eadem efficax.

B A R B A R I C O R O L L.

Eleoselinon, Paludapium, sicut ut solet nomine Theodorus appellauit, quia in paludibus nascatur, secundumq; aquæ ductus, folio raro, nec hirsuto, simile Apio sapore, figura, odore. Homerus Apium Eleothrepton uocauit, hoc est, palustre.

E X M. V E R G. C O M M.

Satis ex Theophrasto superiore capite dictū est, quale hoc Apium sit, & quæ a satiuo & ab alijs discrimina habet: caules scilicet & profluentes aquas prope quas nascitur, rarius foliū, sed non hirsutum: satiuo Apio odore, succo, & figura simile. De eo Palladius in Aprili sic ait. Eleoselinon molli folio, & caule tenero, quod nascitur in lacunis.

¶ De Oreoselino.

C A P. LXXIII.

ὀρεοσίλινον

Oreoselinon, quod aliqui Petroselinon syluestre appellant, Aegyptij Anonim, caule est palmum alto, ab radice tenui exeunte. Ramis & capitulis Cicutæ, multo tamen tenuioribus, semine Cumini, oblongo, acri, & odorato, tenui. Nascitur in petrosis & montibus. Vrinam ciet semine acradice, in uino potis. Menses trahit. Antidotis, necnon medicamentis urinam cientibus, & excalfactorijs inseritur. Nec hallucinari nos oportet, existimantes Oreoselinum esse quod in saxis prouenit. Aliud enim est Petroselinum.

B A R B A R I C O R O L L.

Oreoselinon, a quibusdam Orthoselinon: quia frutice recto nascitur. Caulis Anethi exliore tantum, folio ut Theophrastus inquit cicutæ, nisi quis deprauatum in eo locum putet. καὶ τὰ φύλλα ἔχει κώνυψι ὁμοίῃ, pro eo quod est, κεφάλια ἔχει μακρονίῃ ὁμοίῃ. hoc est, capitula Papaueris similia, ut Dioscoridis uerba sunt.

E X M. V E R G. C O M M.

Diximus in satiuo Apio, quæ Theophrastus in montano discrimina ab omnibus alijs numerasset: ea superuacaneum & inutile repetere nunc fuerit.

¶ De Petroselino.

C A P. LXXV.

πέτρινον καὶ τὸ
πιτροσίλινον

Petroselinum in Macedonia prouenit, in præruptis locis. Semine Ammij, odoratiore, sapore acri, aroma olente. Vrinam cit ac menstrua. Contra stomachi & coli inflationes, & tormina prodest. Laterum, renum, & uesicæ doloribus in potu subuenit. Ammiscetur antidotis urinam cientibus.

B A R B A R I C O R O L L.

Petroselinon, hoc est, Apium in saxis natum. Addidere quidam Buselinon, differens breuitate caulis a satiuo, & radicis colore rufio. Galenus Petroselinon in Ciliciæ Amano monte natum Smyrnion potius, q̃ Petroselinon uideri sibi tradidit.

E X M. V E R G. C O M M.

Indicat uox ipsa, in petris & saxis natū Apium, Petroselinon a Græcis quondā dictum fuisse. Hic tantū in Macedonia natale solū illi assignat. Palladius in latinis nihil aliud de eo, q̃ locis asperis maxime prouenire ait. Nec nos credimus, alia q̃ nataliū ratione a satiuo differre. Mede-

ri inter cetera saxatile Apium crassioris intestini, quod colon dicunt, inflationibus, hic scriptor ait, non totā, neq; ex quacuncq; causa factā colicam affectionē intelligens, sed quæ priuatim ex crasso & quasi peditu efilatur, non transeunte ill hac spiritu sæpe fit.

¶ De Olusatro.

CAP. LXXVI.

Hipposelinum aliqui Grielon, alij Agrioselinum, Latini Olusatrum appellant, aliqui Smyrnion, quāuis aliud sit, quod proprie Smyrnion dicitur, ut paulo post referemus. Est autem maius, & satiuo Apio candidius. Caule alto, cauo, molli, habente ueluti lineas. Folijs latioribus, in puniceum uergentibus, coma Roris marini. Dependentibus in cacumine corymbis, anteq; deflorescat. Ea semine turget nigro, oblongo, acri, solido, aromatico. Radix demittitur tenuis, odorata, candida, quæ os commendat. In umbrosis & palustribus enascitur. Olerum generis ut Apium. Radix cruda, coctæ uel estur. Folia cum caulibus decoctam manduntur, & per se, aut cum piscibus præparantur, crudaq; muria condiuntur. Vim hanc habet, ut potio semine ex mulso uino menses ciat. Rigentes calfacit potu, aut illitu. Urinæ stillicidio auxiliatur. Radix eosdem præstat effectus.

Hipposelinon Theodorus ab equis dictum, Equapiū uocare maluit, cum latine Olusatrum, & Olus pullū dicat. Viret ei foliū cacumine perpetuū, palustri simile, sed pilosum, caule grādi. Radice crassa, mō Rhapsani, sed nigra, fructu Erui maiore, atro. Nascit ubiq; e lachryma sua: quā nihil differe a Myrrha dicūt. Auctorq; est Theophrast. Myrrha fata natū. Serit & radice.

¶ De Smyrnio.

CAP. LXXVII.

Smyrnion, quod in Cilicia Petroselinum uocant, passim in Amaseno monte gignitur. Caulem habet Apij, & stolones multos, folia latiora, pinguis, ad terram infracta, robusta, odore medicato, cum quadam acrimonia iucunda, colore in luteum languescente. Capitibus caulium orbiculatis, ut anethi. Semine Brassicæ, rotundo, nigro, acri, myrrhæ sapore: ita ut alterum alterius loco cedat. Radix quoq; odorata, gustu acri. Fauces mordet, succosa, mollis. Cortex eius foris niger, intus uiridis, aut subalbidus. Nascitur in saxosis & collibus, atq; squallidis, & limitibus terrenis. Vis radicis, hærbæ & seminis, excalfacere. Folijs muria maceratis, ad obsonia utuntur. Aluum sistunt. Radicem contra serpentium ictus bibere conuenit. Tussis & orthopnoeas mitigat. Urinæ difficultati medetur. Recentes tumores, collectiones, duriciasq; discutit. Illita uulnera ad cicatricem perducit. Partus abortu uitiat, si feruefacta subijciatur. Semen, lienis renum, & uesicæ uitrijs prodest. Menses & secundas pellit. Commode datur ischiadicis in uino. Inflationes stomachi lenit. Sudores ciet & ructus. Semen peculiariter datur hydropicis in potu, & contra febrium circuitus.

Smyrniū, caulē habet, q̄estate incipiente arefcit. Cortex radicis intus, & pallet cortice arido. Ad obsonia utunt, cū Mulso, & Oleo, & Garo, maxie in elixis carnibus. Radix sapore Pipi similis. Odor herbe Myrrhæ, unde nomē. Hoc & Petroselinō syluestre uocari scribit Galenus.

D I O S C O R I D I S

E X M. V E R G. C O M. M.

C Sentiebat iam tum cum hæc scriberet Dioscorides a grauissimis plantarum & hortensum scriptoribus confundi cum Olufatro Smyrniū; misceriq; simul cōmunicata inuicē appellatione, similes quidem, & congeneres, non tamē easdem plantas: ideoq; in Olufatro, cuius superiore capite tractata historia & medicina est, aperte omnes monuerat, aliud esse Olufatrum ab eo quod proprie uereq; Smyrniū diceretur. Et in Smyrnio eas numerauit nataliū, uirium, feminis, foliorum, aliarumq; partiū notas, ut his qui Olufatrum nouerunt, nihil facilius posthac sit, q̄ alterum ab altero secernere, præsertimq; ex Myrrhæ gustu, ideoq; pari & promiscuo alterutrius usu. Quod in nostri orbis Olufatro sentiri, deprehendiq; nequit. Miscuisse autē ueteres inuicem similes & cōgeneres plantas, in latinis Columella testis est lib. 12. capite. 1. scribens. Atrūm olus, quod quidam græcorum uocant Hippofelinon, nōnulli Smyrniō. Testis Theophrastus. 9. de plantarum historia uolumine, Hippofelinū nominans quod hic Smyrniō, & quæ Smyrniū in hoc scriptore sunt Hippofelino tribuens. Locus est, ubi de excipiendis plantarum liquoribus ille agit, inter quas Hippofelinon numerat. Suntq; eius hæc uerba. *ἵναι δὲ ἐν ταῖς ῥίζαις ὡς αἰὲρ τοῦ ἱπποσελίνου*, quod est, Aliquorū etiam in radicibus quemadmodū Hippofelini. Paulōq; post. *τὸ μὲν οὖν τοῦ ἱπποσελίνου παρόμοιον τῇ σμύρῃ, καί τινος ἀκούσαντος ὅς ἐν τοῦτον ἡ σμύρῃ, ἡρῶνται βλαστάνειν ἐν αὐτοῖς ἱπποσελίνου*. Quorum sensus est, Hippofelini autē lachryma Myrrhæ similis est. Audientesq; aliqui hinc esse Myrrham, nasci apud eos Hippofelinon existimāt. Ex quibus facile ratiocinari est, a Theophrasto Hippofelinon dici, quod ab alijs Smyrniō uocatur: peregrinamq; Græciæ fuisse plantam, & lachrymam odore & sapore Myrrhæ habere, quod hic semini tribuit. A Myrrha enim, quā Græci Smyrnum uocant, Smyrniō nomen Græcia fecit. Testis Nicander etiam in Theriacis suis: qui Smyrniōn uocat. *ὡς δ' ἀγὲ καὶ σμύρνην αὐτοῦ*. &c. adiectiua forma *σμυρνήνιον* Hippofelinon uocans, hoc scilicet, ut ab illo separaret: addiditq; interpres eius, magno Apio, id est, Hippofelino simile esse Smyrniū: uocariq; Smyrniū, quoniā Myrrham odore refert: uocari & Coptium, auctore Anacreonte in cōmentario de radicū sectione. Similitudo hæc miscet, & in ueterū historia confundi cogit, quæ alioquin diuersa sunt: ut hic, & alij græcorū medici docent. Poterūtq; qui certius nouisse id cupient, colatū differe, quod ad faciendā naturæ diuersitatē magnas habet uires, sed ex uniuersæ plantæ notis & partibus congeneres quidem, diuersas tamen penitus cognoscere.

¶ De Elaphobosco. CAP. LXXVIII.

Ε Græci Elaphoboscon, aliqui Elaphicon, alij Nephriōn, alij Ophigeniōn, nonnulli Ophioctonon, aliqui Herpyxen, alij Eimen uocant, Romani Cerui ocellum, Aegyptij Chemin, Aphri Aschancam. Foeniculaceus caulis est, aut Rorimarino similis, geniculatus, folijs duum digitorum latitudine, ut Terebinthi prælongis, aliquantum asperis, circumfractis. Adnata multa caulis habet, ferentia umbellas Anethi similes, & semina eiusdem, florem subluteum. Radice ternum digitorum longitudinis, & crassitudinis unius. Candida, dulcis, esui apta. Caulis tener pro oleris manditur. Contra serpentium ictus, datur semen in uino. Fama autem est, hoc pabulo ceruas serpentium moribus resistere.

Ε Laphouoscon, ferulaceum est, geniculatum, digiti crassitudine. Semen in corymbis dependentibus similis effigie, sed non amaris. Folia oleris auri.

E X M. V E R G. C O M. M.

Quæ Elaphobosci, id est, Ceruiocelli (modo id Romani sic appellauerint) a principio tam multæ numerantur appellationes, unā eandemq; causam & originem habent, & eam quā hic ipse non procul a fine capitis, & Plinius. 22. uolumine eiusdem numeri capite indicauerunt: quoniā scilicet fama sit, hoc pabulo ceruos resistere serpentibus. Eo siquidē perit, quæ prima illic auditur Elaphicon, id est, ceruina herba, Mox Nebrium, ex eodem euen-

tur: νεφός enim ceruorum inulos Græci uocant. Ophigenium itidem, & Ophiostonon: quarum altera ab enestis serpentibus manifestam habet significatiōem: altera, q̄ serpentes aliquo huiusmodi malo uexet. Corrupta enim est: nec licuit eam instaurare, quemadmodū & eam quæ sequitur Herpyxem. Susplicari tamen in ea licet, ἡ τῶν ἰρπιτῶν, quæ græcis reptilia & serpentes sunt, in ea aliquid fuisse.

De Fœniculo.

CAP. LXXIX.

Fœniculum, si herba edatur, aut semen cum ptisana bibatur, mammas lacte replet. Comæ decoctum, in renum doloribus subditum proficit, quippe quod urinam excitet. Contra serpentium ictus in uino conuenienter bibitur. Menses ciet. In febribus nauseam & stomachi feruorem, ex aqua frigida potum sedat. Contritæ radices, & cum melle illitæ, morbis canum medentur. Succus caule & folijs exprimitur, & in sole siccatus in medicamenta adiicitur, quæ ad excitandam oculorum aciem commode temperantur. Extrahitur etiam semine uiridi, ramulisq̄, & radicibus prima germinatione incisis. In Iberia succum reddit gummi similem. Caulem medium dum hæba floret rustici demetunt, igniq̄ admovent, quo facilius ui caloris exudans gummi remittat. Quod efficacius succo est ad medicamenta oculorum.

Fœniculum in Hiberis Hispaniæ laudatissimū, condimentis prope omnibus inseritur. Quin & crustis in panificio apertissime subiicitur.

EX M. VERG. COMM.

Fœniculū, si Nicandro in Theriacis suis, q̄ mox subiiciemus, scribenti credimus, nobilitauere serpentes, gustatu eius senectū exuendo, oculorūq̄ aciem succo eius reficiendo. Versiculi poëte eius sunt. τῆμος δὲ αὐτῶν φολιδῶν ἀπιδύσας γῆρας. μῶλις ἰπισίχων ἐπὶ φολιδῶν ἔσσι φέγων. ὁμασιν ἀμειλῶσαι, μαράθρου δὲ ἐνέχυντος ἑρπυξ, βωσκῆτις ὠκύντι καὶ ἀνυμένει τισίν. Quorū sensus ille est. Quo tēpore relicta arefcentium squamarū senectute, torpidus & segnis ingrediens, uenacq̄ tempestatē cauti suum fugiens, hebetibus oculis cecutit: uerū depastus Fœniculi comosus ramus, celerem, & claræ lucis eum efficit. Nobilitauere & homines, toto anno quondā uiridi, sicco, seruatoq̄ sale, totaq̄ mensa, non ut nostra ætate sit in secunda, et ad augendā sūm tantū, nec semine solū, sed coma & caulibus utentes. Neq̄ ita merito tā multæ in sanitatis & medicinæ usu dotes illi sunt: quas hic scriptor profecutus, labori huic parcere alios uoluit.

De Erratico Fœniculo.

CAP. LXXX.

Graci Hippomarathrū, aliqui Marathin, alij Marathrū agrion, Aegyptij Sampsoth, Magi Thymarnolion, Latini Fœniculū erraticū, aliqui Mion, Galli Sistrameor. Syluestre est Fœniculū, magnū. Fert autē semen Canchry simile. Cuius radix iucunde olet, potaq̄ stranguis medet. Menses iposita ciet. Ventre sistit, radice, aut semine poto. Contra serpentū morsus auxiliat. Calculos cōminuit. Regiū morbum expurgat. Lactis abundantia facit. Decoctum foliorū haustum, foeminas a partu purgat. Traditur aliud Hippomarathri genus, longo, exili & angusto folio, semine Coriandri, rotundo, acri, & odorato. Excalcificandi naturā habet, & uiribus Fœniculo respondet. Ad omnia infirmius.

Hippomarathrū, a magnitudine uidei appellatum: qd aliqui Mysineū uocant, folijs maioribus, gustu acriore, procerius, crassitudine brachiali, radice candida. Nascit in calidis, sed saxosis, tæte amplitudinis in Mauritania, ut caulis, in cubitis assurgat, crassitudine palmorū quatuor.

D I O S C O R I D I S

C Hippomarathrū aliud hoc est, quod tradidit Diocles: foliū habet angulosum, atq; longū.

E X M. V E R G. C O M M.

Grande est erraticum Feniculum. In cuius appellationibus quæ fœminino genere Marathris dicta est, solā habet ex sexu a superiore illo discriminis causā: qualia in hoc opere multa alia audiuntur, quemadmodum agreste Marathrum eandem Hippomarathro significationem. Ferre erraticum Feniculum hoc semen Cachryi simile Dioscorides ait, Cachry id intelligens, quod ab eo in Libanotide mox describetur, & quod in umbella eius fruticis concipitur et maturatur: cui erraticum Feniculum hoc similem suam habet.

Δαύκος
Διρκάριον

De Dauco. C A P. LXXXI.

DAucum aliqui Dircaum uocant. Creticum, folijs Fœniculo simile, minoribus & tenuioribus, caule dodrantali, umbella coriandri, flore albo, semine acri, candido, hirsuto, suauissimi odoris in mandendo. Radix digitali crassitudine, & palmi longitudine adolefcit. In saxosis nascitur, & locis sole illustratis. Aliud eius genus syluestri Apio simile, acre, odoratum, aroma olens, feruentis gustus. Probatissimum Creticum. Tertium assignatur genus folijs Coriandri, floribus albis, capite & semine anethi, muscario Pastinacæ, semine oblongo ceu Cumini, acri. Omnium semen excalfacit potum. Vrinam, menses & partus extrahit. Torminibus liberat. Veterem tussim mitigat. Phalangiorum morfibuscipotum in uino auxiliatur. Tumores illitu discutit. Seminis dumtaxat in alijs generibus inualuit usus. In Cretico etiam radicis. Quæ maxime contra uenenatorum iniuriam in uino bibitur.

Pli. li. 19. ca. 5.
lib. 25. ca. 9.

DAucus, quæ a nostris Gallica Pastinaca dicitur, specie Lauri, colore Croci, radice nigra Theophrasto. Dauci quatuor nonnulli fecere genera. Dioscorides & Plinius tria persequuntur. Probatissima in Creta. Mox in Achaia, Patrensi & Spartano agro, & ubiq; in fœccis. Priori generi folia etiam hirsuta, caulis rectus, radice suauissimi gustus & odoris. Reliqua genera passim nascuntur, terrenis collibus, limilibusq; nec nisi pingui solo, folijs Coriandri, caule cubitali, capitulis orbiculatis, sæpe plurimis q̄ ternis. Radice lignosa, & cum inaruerit superuacua. Semen Cumino simile: prioris Milio. Album, acre, odoratum omnibus, & feruens. Secundū priore uehementius est, eoq; parce sumi debet. Tertium genus simile Staphylino, semine oblongo, radice dulci. Omnia hæc, & hyeme & æstate, quadrupedi sunt intacta, nisi post abortus. Quidā, ut Paulus, & Galenus prior eo meminit, Daucū nihil aliud esse uoluerunt, q̄ Staphylinū syluestrem: q̄ uidetur a Dauco aliud genus esse Daucos herba cognominata, apud Galenum duas Daucos seorsum indicantem. Nisi quis libentarios accuset, q̄ quæ Galeni non sunt, adiecerint. Hippocrates Daucum Aethiopicam laudat.

E X M. V E R G. C O M M.

Masculino genere, & neutro Daucum dici in antiquis obseruauimus. Nos hunc scriptorem secuti, masculino eum semper indicauimus. Quodq; inter appellationes eius male, Dircaon legebatur, ex Nicandro in Theriacis Daucion emendauimus. Sic enim ille appellauit. Δαύκον ἢ Διρκάριον, quod est, Daucium, & Bryoniæ uitis radices. Fuerunt etiam in antiquis, qui Daucum scriberent, duocq; eius tantū genera facerent, Creticum, & Asiaticum: hic tamen tria, Plutarchus uero plura Daucorum fecit genera. Illud etiam a principio statim quod hic ait, habere Creticum Daucum Feniculo similia folia μικρότερα δὲ καὶ λεπτότερα. Quorum nisi ultimum sit, sensus est, minora tamē & tenuiora: Plinius & Plinium secutus Barbarus, candidiora dixerunt, quasi λευκότερα, non λεπτότερα legendum sit.

Δελφίνιον

De Delphinio. C A P. LXXXII.

Delphinium Græcis Diachysis, alijs Diachytos, alijs Paralysis, alijs Camarus, alijs Hyacinthus, alijs Delphinias, alijs Neria-

dion, aut Sofandrō, aut Cronion, Romanis Bucinus minor uocatur. **A** Surculos emittit a radice una sesquipedales, aut maiores, a quibus folia exeunt parua, tenuia, diuisa, praelonga, quæ Delphinorum effigiem representant. Vnde tractum nomen est. Flos uiolæ albæ non dissimilis, purpureus, & semen in siliquis, milio proximum. Quo non aliud utilius bibi potest ab scorpione percussis. Aiunt enim, obiecta hæba, scorpiones resolui, atq; ignauos torpescere. Semota uero ea, sese recolligere. Prouenit in asperis & apricis.

¶ De altero Delphinio. CAP. LXXXIII.

Alterum est Delphinium, quod Romani Bucinum uocant, superioriori simile, sed folijs & ramis longe gracilius. Viribus eisdem pollet, sed non ita efficacibus.

EX M. VERG. COMM.

Quam nostra ætas Senam officinis omnibus & uulgo notā uocat, antiquitas, ut opinati aliqui sunt, Delphinion appellauit. Posterioris & quo nunc medicina utitur nominis incerta ratio nobis & causa: antiquioris notissimi nauis in mari pisces autores sunt: repando dorso, repandas Delphinij huius siliquas, non folia a se uocari & indicari gaudentes: ut non tantum maris honor Delphinus esset, sed haberet nutritrix & parens omnium terra quod ex eo pisce in suis opibus etiam numeraret. Vtq; in mari beneficus homini semper Delphinus fuit, multisq; salutem humanitatis nostræ sensu quodam attulit, sic etiam in plantis aliqua esset quæ Delphinorum figura, repandoq; siliquarum suarum inflexu salutem homini faceret. Eiusq; beneficii merito Sofandros etiam diceretur. Id enim ea uox significat. Dictumq; Delphinium hoc Sofandros est, q̃ τὴν ἀνδρείαν σώζει, id est, uirium & roboris firmitatem seruat. Fuerunt qui mutata tantum declinationis forma, Delphiniada, s. herbam uocarent, & qui a floris figura Hyacinthum, *ἡακινθὸς* enim a græcis, id est, Hyacinthinus flos eius describitur. Legitur postremo inter appellatōnes hæc a Romanis Delphinium hoc Bucinum minorem dici, quod nullibi hætenus compertum nobis est. Facilis tamen nominis coniectura. ut enim græci a Delphinis & ex mari nomen illi fecerunt, sic posteriores etiam latini potuerunt ex eodem elemento, sed ab alijs piscibus eam indicasse. Sunt enim Bucini in purpurarum genere, sed non repando dorso ut Delphini. Quod mirretur in Delphinio hoc illud est, nihil agere de eo Plinius: nec Delphinij aut Sofandri, quod hætenus legerim in tota eius historia, sub his nominibus unquam meminisse. Nihil etiam Pauli Aeginetam: qui cum medicam omnem materiā lib. s. per capita numeraret, quotidiani in medicina usus herbam, remediumq; relinquere non debuerat. Dubitamus ob eā causam, latere in antiqua etiam medicina Delphinium hoc sub appellatione aliqua alia.

¶ De Pyrethro. CAP. LXXXIII.

Pyrethrum aliqui Dorycnion, alij Pyrinon, alij Pyroton, aut Pyrothron, alij Arnon pyriten, Magi Pyriten, Romani Saluarem uocant. Folia caulemq; emittit ut Daucum syluestre, & Fœniculum, umbellâq; Anethi circinata rotunditatis. Radix longa est, pollicis crassitudine, gustu feruidissimo. Pituitam elicit. Ideo in dolore dentium decocta in aceto, colluto inde ore, auxiliatur. Mansa pituitam extrahit. Sudores ciēt, peruncto ex oleo corpore. Diuturnis rigoribus efficac. Contra perfrictiones membrorum, resolutionesq; eximie conducit.

BARBARI COROLL.

Pyrethro depictum coloribus umbraculum, purpureo, cædido, luteo, porraceo, ut scripsere quidam. Sunt qui hanc interpretentur quam uulgo rustici & olitores, Draconem Acetarium uocant, ut aliubi notauimus, omnino dissimilem eius quam Dioscorides hoc capite demonstrat. Sed æstimanda res tota diligentius.

Pli. li. 25. ca. 9

D I O S C O R I D I S

C E X M. V E R G C O M M.

CNon dedit ut forte opinabitur aliquis in græcis Pyrethro nomen ignis, sed qui in ea similis igni feruidus sapor est. Qui tantus adeoque uehemens in ea sentitur, ut plures in gentibus ab eadem ui appellationes inuenerit. Quæ enim in hoc scriptore numerantur ἀπὸ τοῦ πυρός incipient res uoces, eandem omnes habent causam: & quæ Romanorum appellatio fertur Saluaris herba, a feruidi saporis eius euentu causam & originem duxit. Commāducatum enim copiosam oris saluam proritat: qua potestate plerumque sunt feruida omnia: ideoque ueteres grecorum medicum dici, ad purgandas capitis pituitas eo utebantur. Præcipitque id inter cæteros Paulus Aegineta lib. 1. capite quo de purgantibus caput apophlegmatissimis agit: qui græcis sunt medicamenta omnia quibus per os capitis pituita purgat. Hanc ipsam nō Pyrethron, sed Pyreida Nicander in Theriacis suis uocauit. Versiculus eius est, ἀπὸ τοῦ δ' ἡδωθῆτος πυρετρίδος ἡ χυλοπύλλα. Cur autem Dorycnion uocari etiam feratur, incertum nobis est. Inter uenena enim Dorycnion numeratur, ut sexto uolumine priuatim dicitur.

Λεκανυτῖς

De Rosmarino. C A P. LXXXV.

DVo Rosmarini genera. Alterum fructiferum, aliquibus Zea, aut Campsanema appellatum. Cuius semen Canchrys uocatur. Folia Fœniculi habet, crassiora & latiora, in Rotæ speciem humi sparsa, iucunde olentia, caulem cubiti altitudine, aut maiorem, multis comcauum alis. In cacumine umbellam, in qua semen copiosum, candidum, sphondylo simile, rotundum, angulosum, resinaceum. Quod in mandendo linguam exurit. Radix Tus redolet, candida, prægrandis. Est & alterum omnino consimile, semen ferens latum, nigrum uti sphondylion odoratum, minime exurens, radice foris nigra, intus alba. Verum id quod sterile dicitur, illorum plane similitudinem refert. Sed neque caulem, neque florem, neque semen promit. Nascitur in saxosis & asperis. Trita omnium hæba communiter hæmorrhoidum profluentia sistit. Sedis inflammationes, & condylomata mitigat. Concoquit strumas & abscessus, qui ad maturationem ægre perducuntur. Sicque radices cum melle ulcera purgant. Torminibus medentur cum uino potæ. Et contra serpentium morsus conueniunt. Menses & urinas cient. Veteres tumores illitu discutiunt. Tam radice quam hæbæ succus, adiectio melle illitus, oculorum aciem exacuit. Potum semen ad eadem pollet. Si comitialia mala sentiantur, aut uetus pectoris uitium, auxilio est. Regio morbo laborantibus, cum uino & pipere datur. Sudores mouet cum oleo perunctum. Ruptis & conuulsis prodest. Podagris cum lolilacea farina, & aceto tritum illinitur. Purgat uiriliginis, addito aceto quam acerrimo. Semine in potionibus utendum, eius quidem quod Canchryn non ferat. Quippe illud sua acrimonia arteriam exasperat. Rosmarinum cum Erica nasci, folijs Lactuæ syluestris, asperioribus, candidioribusque radice breui, Theophrastus autor est. Potumque id ipsum alterutra parte purgare.

υδὲ γὰρ

De Canchry. C A P. LXXXVI.

CAnchrys uim habet excalfaciendi & uehementer exiccandi. Quare abstergentibus medicamentis inferitur. Contra oculorum fluctiones capiti illinitur, ita ut tertio die soluatur.

BARBARI COROLL.

Libanotidis uocabulo, multa genera feruntur. Vnum inter Cunilagine a nobis dicendum. Alterum, de quo hic, in species ternas diuisum. Tertium coronariæ: quam Rosmarinum proprie uocari Dioscorides existimat. Libanotis porro, de quo præfens caput loquitur, radicem habet Olusatris: locis putridis, macris, saxosis, & roscidis prouenit: feritur semine, quod quidem fertili Rosmarino, scabrum & oblongum a Theophrasto additur, folio palustris Apij, minore multo, sterili, folium Lactuce syluestris & amaræ, candidius & asperius, radice breui. Vestibus interposita Libanotis, abigit tineas. Carpitur per messem fertilis. Caulis quoque, non modo semen, resinaceus. Folij & radici odor Turis, unde nomen. Libanotiden cum Erice lætissimam nasci Theophrastus inquit. Theodorus locum, non ubi Erice, sed ubi dictum est, conuertit, pro eo quod est *ἐν τῇ ἰσθμῷ*, legens *ἐπὶ τῇ ἰσθμῷ*, libanotidum græcorum sane culpa.

EX M. VERG. COMM.

Plures quondam non Dioscoridi tantum, sed cæteris græcorum herbarijs & medicis omnibus Libanotides fuerunt: ut eodem Turis cognomine omnes, sic non eodem eius odore insignes. Vna enim, & quæ Canchry fert, primo & per se, quæ radix eius Tus olet, ab eo indicari merita est. Cæteræ aut congeneres, aut aliqua parte illi similes, in censum et nomen eius uenerunt. Satisque certa earum diuisione hic usus, posteriores græcorum medicos & herbarios alios subseribentes sibi habuit. Siquidem omnes, excepta Coronaria, quæ statim ab ijs describitur, tria eius genera fecerunt. Fœcundam, fructumque ferentem. Et hanc duplicem. Tum sterilem nuntiantes: peregrinas, ut nos credimus, Italiæ plantas, & quarum omnis misceatur historia, si Theophrastus audiatur, præsertimque in foliorum figura. Quæ palustri Apio in primo genere, in sterili uero amaræ Lactuce similia ille facit. Cum hic Fœniculo comparet, & crassiora tantum, latioraque esse dicat: quæ una foliorum forma, uulgarem nostratam & coronariam Rosmarinum cognomen ille fecit. Alioquin nulla erat ex similitudine causa, cur quondam Libanotis, & nunc tota græcia Dendrolibanon coronaria Rosmarinus diceretur: nihil enim simile, commune vel aliud habet. Quodque facile ex historia earum intelligat aliquis tota, & undique diuersa. Siquidem coronaria Rosmarinus frutex magis, quam herba, ramos habet: illæ caulem, & quæ fructum inter eas ferunt, umbellam etiam. Hæc a terra erigitur, illæ per terram folia spargunt: & ne longiores simus, plures habent illæ notas quibus a Coronaria separantur: quin etiam in folijs prius illud genus suas habet itidem differentias. Quo autem maxime differunt Canchry, est: quod in secundo utroque illo genere in summo caule simile arborum Canchryi surgit, in quo concipitur & maturatur semen. Quid autem Canchrys sit, & quomodo in arboribus nascitur, dictum iam pridem a nobis est. Quæ una nota a coronaria Libanotide, reliquum omne hoc genus præcipue separat. Nec Nicander aliter eam signat in Theriacis suis, *ἡν γὰρ χρυδαίαν ἴδων περιβαλ- πια βίβει*, quod est, Sumito & calidam radicem *καρυδαίαν*. i. cachry hoc ferentem Libanotidis (secundum illud genus significans) Rursus *ἀμμυγὰ καρυφάρω λιθανότιδι*, quod est, Simul cum Libanotide cachry ferente. Vna autem hac nota Libanotis præcipue discernebatur, quæ in medicina cachryos huius, i. seminis tamen usus esset. Eaque ob causam seorsum a reliqua planta Paulus Aegineta de eo egit, fructum, seu seminem Libanotidis uocans: uiresque illi exterendi, discutiedî, & calefaciedî tribuens. Vfus illo etiam est ex oleo contra febrium perfrictioes, & cum tremore algores. Duplexque illud Libanotidis genus secundum ex cachry hoc dictum est. Tertium enim quia eo caret, ideo *ἀκαρπον* sterile & sine fructu a græcis nominatur: prioribus præterque in hoc simile.

De Rosmarino coronario. CAP. LXXXVII.

Rosmarinum quo coronarij utuntur, ramos mittit tenues, et circa eos folia minuta, densa, longa, exilia, subter incana, superne uirentia, graui odore. Excalfactoria ui præditum est. Regium sanat morbum, si decoctum in aqua ante exercitationes bibatur, & ubi laborans exercitationi se crediderit, in balnea descendat, & merum potet. Acopis, gleucinoque unguento ammisceri solet.

BARBARI COROLL.

Libanotis Coronaria, differt quidem folio a prioribus, sed comprehensa forte a Plinio est inter fertiles. Nisi quis hanc pro Cunilagine accipiat. Ea quæ Libanotis uocatur, & in coronas admittitur, Paulus, & Galenus, Dioscoridem secuti, quatuor Libanotidis genera connume-

H ij

A
Pli. li. 19, ca. 12

B

D I O S C O R I D I S

Crat, Vnam Sterilem, Fecundas duas; Quartam generis coronamentarij: quam a Romanis pri-
uatum Rosmarinum dici uolunt, etiam si priora quoque genera Plinius ita uocari prodar.

E X. M. V E R G. C O M M.

Coronaria quondam uulgaris haec nostras Libanotis fuit; nec certior habuit hic scriptor no-
ta qua legentibus eam indicaret. Quotidianus enim hic usus eius erat: necebanturque in coro-
nis ramuli eius non aliter quam Serpillum, & quae alia Theophrastus περιανθή uocat, toto corpo-
re odorata. Nunc alius eius usus est. Descripsit eam satis Diosc, nihilque in tota foliorum figura
desyderari potest. Vnaque haec foliorum similitudo, quae omnibus in se par aequalisque est, et quale
paulo ante in coronaria hic descripsit, in Libanotidum nomen et censum eam asciuit. Quis licet
in priore illo genere foeniculacea sint, ut hic ait, eamque ob causam τριχουδί, i. comosa & capillata:
nihilominus quam in comoso illo habitu latiora & crassiora Foeniculo sunt, ad formam foliorum Li-
banotidis huius, i. coronariae nostraeque Rosmarini accedunt. Fitque haec illis eatenus tantum si-
milis. Quatenus enim Tus Libanotides aliae olent, nihil huic simile habent.

De Sphondylis. CAP. LXXXVIII.

Sphondylium aliqui Arangen uocant, alij Phalangion, alij Astere-
ion, nonnulli Nesyrin aut Sphondylin, quidam Chorodanon, aut
Oenanthen, Romani herbam Rutinalem. Aegyptij Apsaphear, Magi
Osirin. Folia Platani & Panacis habet, Caules foeniculaceos, cubitali al-
titudine, aut amplius assurgentes, in quorum cacumine semen duplex
Sefeli simile, sed latius, candidius & magis paleaceum, grauis odoris.
D Flores eius albi, aut pallentes. Radice Rhaphani candida. Nasquitur in pa-
lustribus & aquosis. Potum semen pituitam per aluum extrahit. Me-
detur iocineris uitij, regio morbo, comitialibus, orthopnoicis, uulua-
rum strangulationi. Venerosus suffitu reuocat. Cum oleo comode in-
funditur capitibus phreniticorum, & lethargicorum, item capitis dolori-
bus. Cum Rura illitum, serpentia ulcera cohibet. Datur radix contra res-
gium morbum, & iocineris uitia. Circumrassa eadem, callos fistularum
derodit. Recentis floris succus exulceratis auribus, purulentisque accomo-
datur. Qui ceterorum succorum more exprimi, dein recondi solet.

B A R B A R I C O R O L L.

Sphondylii succus qui exprimitur, mire appetitur a muscis, & quae sunt ijs similia. Sphon-
dylion ferula est, differens a Panace folijs, quia sunt minora & Platani diuisura. Non nisi in
opacis gignitur, in palustribus Patauini agri saepe uisum. Huic semen eodem nomine medici-
nae tantum utile.

De Ferula. CAP. LXXXIX.

E Viridi Ferula medulla pota, utilis est ad cruentas excreationes,
Ecceliacosque. Contra uiperarum morsus in uino datur. Erumpen-
tem naribus sanguinem indita sistit. Semen potum torminosi auxilia-
tur. Sudores ciet, uncto ex oleo corpore. Caules si edantur, capitis do-
lores faciunt. Muria condiuntur. Ferula itaque caulem profert ternum
saepe cubitorum, folia Foeniculi, longe asperiora, & latiora. Qua ab in-
mo caule uulnerata, Sagapenum efficitur.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 13. ca. 22
lib. 10. cap. 27.
lib. 24. cap. 1.

A Describitur arborum generi Ferula: quoniam teneritudo eius processu transit in lignum.
Propterea Clearchus inter quaestiones lusorias, quas nostri Scirpos, Graeci Gryphos, & Aeni-
gmata uocant, Ferulam dicit esse, lignum non lignum: sicut Pumicem, lapidem non lapidem:
& Noctua, uolucrum non uolucrum. Calidis Ferula nascitur locis, atque trans maria, geniculatisque

uices nodata scapis. Duo ei genera. Narthecem Græci uocant, assurgentem alte. Nartheciam uero semper humilem: quæ ab aliquibus Ferulago dicitur. Quancq; et Thapsia Ferulago appellari solet. Est & instrumentum medicinale Ferula, siue Narthex. A genibus folia exeunt grandia, mollia, multifida, maxima, ut quæq; terræ sunt proxima: caulē amplectantia ut Harundines: sed magis scinditur in coliculos, quibus flores lutei & semen Anechi paulo maius insidet, sed quæ ab uno caule diuiditur in cacumine, femina putatur. Germinat uere primum folio, tū caule: qui annuus ei est. Radice singulari, profunda. Ferulæ lignum omne corticis loco habent, hoc est, forinsecus: ligni autem uice fungosam intus medullam, ut Sambuci. Nonnullæ inanitatē, ut Harundines. Nulli fruticum leuitas maior. Ob id senectuti Baculus. Semen Ferulæ Thapsiam uocauere aliqui falso. Hoc in Italia cibus est. Conditur quippe, duratq; anni spacio in urceis. Caules quoq; decocti eduntur. Commendanturq; musto & melle. Corymbiam nominant: sicut racemos eius quos item condiunt Corymbos: quibus & in coronas utebantur. Ignem Ferulis optime seruari certum est, easq; in Aegypto præcellere. Natura Ferularum Murenis infestissima. Moriunt ea tactæ. Asinis gratissimæ sunt in pabulo. Ceteris iumentis presentia ne ueneno: qua de causa id animal Libero patri assignatur: cui & Ferula. Ferulā nō minus a feruendo dictam uideri facit Hippocrates: qui eam Plestinga uocauit. Inter fortunatas insulas, Norion uocatur. In qua Ferulæ tanta crescunt amplitudine, ut arbores fiant. Earum nigra succo amarissimo damnantur: candidæ probantur, adeo, ut poculentus quoq; sit.

EX M. VERG. COMM.

Condiebatur quondā, seruabaturq; sale ad cibos Ferulæ coliculus toro año: si huic scripto ri primū, mox Columellæ credimus. 13. operis sui uolumine, cap. 7. iubenti cum plerisq; alijs oleribus & hunc condi. Nec fuit hic usus parum in ea laudandus: & si copiosior eius cibus capitatis dolores faciat. Primas enim mensas in acetarijs, secundas uero cū obsonijs cocta multa frugalitate instruebat. Eadem senectuti, & a longa ualitudine se recolligentibus auxilio fuit, et adhuc est: quoniam nulli frutici leuitas maior, et cum leuitate ligni firmiter duricies, & rigor. Quā etiam ob causam Libero patri, Sileno, alijsq; numinis eius comitibus dedicata & concessa est, ut infirmos in ebrietate pedes leui hoc pedamento regerent.

De Peucedano. CAP. XC.

Peucedanum aliqui. Agrion uocant, alij Agriophyllon, Magi bonum demonem, Romani Satariam. Caulem emittit tenuem, gracilentum, Foeniculo similem. Comam habet statim ab terra foliosam, spissamq; flore luteo, radice nigra, crassa, firma, graui odore, succosa. Gignitur in montibus opacis. Tenera radix cultello conciditur, profluentq; e plaga succus, umbræ mandatur. In sole siquidem confestim euascescit. Colligit capite prius & naribus rosaceo perfusis, ne capitis dolor premat, & uertigo sentiatnr. Assata radix utilior fit. Tam lac, q; succus radice & caulibus extrahi solet, sicuti e Mandragora. Verum inefficacior lacte succus habetur, & uelocius expirat. Interdum etiam concretā inuenitur lachryma Turis similitudine, caulibus, radicibusq; adherens. Præfertur succus e Sardonia, & Samothrace, colore ruffo, odore graui, feruens gustu. Ex oleo & rosaceo illitū pdest lethargicis, phreniticis, uertiginosis, comitialibus, & longis capitis doloribus, resolutis, ischiadicis, conuulsis. Omnibus in uniuersum uitijis neruorum, ex oleo & aceto illitum prodest. Eius olfactu respirant uulnæ strangulatus, & ueternosi reuocantur. Incensum serpentes abigit. Auriū doloribus cōuenienter ex rosaceo instillatur. Cauernis dentiū inditum, mitigat dolo rem. Contra tussim efficacissime ex ovo assumit. Suspirijs, torminibus, & inflāmationibus subuenit. Ventrē leniter emollit. Lienē absumit. Dis

D I O S C O R I D I S

C ficiles partus mire adiuuat. Facit ad uesciæ cruciatus, & renum disten-
tiones potum. Vuluam aperit. Radix ad eadem utilis est. Sed ineffica-
cior. Eius decoctum bibitur. Farina eius sordida ulcera purgat, & ue-
tera cicatrice obducit. Squamas ossium extrahit. In cærata & calfacien-
tia malagmata additur. Eligi debet recens, esu difficile, firmū, odoris ple-
num. Succus ad potiones amaris nucibus, aut Ruta, aut pane calido,
aut Anetho resoluitur.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 25. ca. 9
lib. 26. cap. 5.

Peucedanum, siue Peucedanus nomen a Pinu inuenit, ut Myrtidani a Myrto, quan-
quā amaritudinem uocabulum id significat apud poetas, celebrata inter primas herba. Laudatissi-
mum in Arcadia Plinius existimat. Foditur exitu autumni. Placent tenerimæ, & altissimæ ra-
dices. Hæ conciduntur in digitos quaternos ossis cultellis, funduntque succum. Probatum hic
& crassitudine mellea, & odore suauiter graui. Peucedanum officinæ ostendit quale Dioscori-
des in cætera tantum, radice non succosa, sed lignosa, nec graui odore, sed iucundo. Quod nos
admonitionis causa dictum uolumus.

E X M. V E R G C O M M.

Fecit Pinus, quæ græcis Peuce dicitur Peucedano nomen: non congeneri, aut simi-
lis simili planta, sed speciosa & procera arbor, parem folio tantum sibi humiliorem fruticem,
ut inter homines quotidie fit, sola eius partis similitudine in genus & nomen suum sibi adop-
tauit: quod posteriores intelligentes latini, Pinastellum eam uocauerunt. Cuius uocis auctor Apu-
leius est. Sic enim emendanda est quæ corrupte in impresso codice Pinastellum legitur. Idem
quod in Diosc. simpliciter agrion nominatur, ab eo Sison agrion dicitur, quasi ex similitudine
Peucedani hæc Sison etiam diceretur, de quo non multo ante actum est, sed syluestre. Nobis
uero ab re non fore, si quis suspicetur, deesse uoci illi agrion, quæ syluestre significat Marathrum:
ut quoniam similes illi caules, & capillata folia habet, syluestre Marathrum diceretur. Quem
admodum quod sequitur Agriophyllum, agreste Feniculū potuisse quondam legi. Suspi-
tiones tamen hæ sunt: nec nos aliquid mutare ausi sumus, præterquam ex Apuleio agrion. i. agreste Sisonem
uocari Peucedanum inter alia dicentes. Quæ non tamen a Peuce arbore dici in græcis potuit, quæ ab
amaritudine, quæ in eadem gente eadē illa uoce indicatur. In Arcadia nasci Peucedanū Theo-
phrastus ait. 9. de plantarum historia uolumine. Verba eius sunt *γινεται δὲ ἐν ἀρκαδίᾳ*. Quem
autorem secutus Plinius lib. 25. cap. 9. laudatissimam in Arcadia nasci tradidit: tam aperte, tam
quam uetusto autore, ut non dubitandum fuerit, in Arcadia ne, an in Sardinia legendus locus sit.
Theophrastum enim secutus Plinius est. Neque obstat quod hic dixerit, expressum in Sardinia et Sa-
mothrace liquorem, probatissimum esse. Hic enim succum in his gentibus expressum lauda-
uit, illi plantam in Arcadia nasci laudatissimam dixerunt. Eius in antiqua medicina multus fu-
it usus. Tradiditque hic inter cætera, mederi Peucedani liquorem conuulsis: Græci *καταμύει τὸν*
καταμύει uocant, Romani græcæ uocis imitatione, conuulsa appellauerunt.

De Gith, seu Melanthio. C A P. XCII.

μελάνθιον

Gith ex Græcis aliqui Melanthium, alij Mecona agrion mela-
na, Romani Papauer nigrum appellant. Exiguus frutex est,
sæpe binos palmos excedens. Folijs ut Senecionis minutis, sed multo
tenuioribus. Capitulo in cacumine tenui, ceu Papaueris oblongo, in-
tercurfantibus intus membranis. Quibus semen includitur nigrum, a-
cre, odoratum, quod panibus inspargitur. Capitis doloribus illitum
fronti, subuenit. Discutit recentes oculorum suffusiones, tritum ex Iri-
no, & infusum naribus. Tollit lepras, lentigines, duricias, tumoresque
ueteros cum aceto illitum. Circumscarificatos clauos excutit cum uete-
re uino impositum. Dentium doloribus decoctum cum aceto & teda

prodest. Teretes uentris tineas expellit, peruncto ex aqua umbilico. De stillatione laborates adiuuat, tritū in linteo & olfactū. Vrinā & menstrua ciet, multis diebus sumptū. Et lac extrahit. Difficultatē spirandi cū uino potū leuat. Phalangiorū morsibus ex aqua drachmæ pondere haustū auxilia. Incenso serpentes fugant. Tradunt largius epotum enecare.

MELANTHION, qd & Melanspermon, & Melanthe interim ab Hippocrate uocat: & a Theophrasto, ut Theodorus existimat, Anthemon, siue Anthemion, Nigellam interpretatus. Quæ Anthemon oīno alia species est, q̃ Melanthion, siue Git, siue ut Palladius, Giddi. Nam & Melantheon Chamemilon est, Melanion uero nigra Viola. Optimum Git, q̃ excitatissimi odoris, & q̃ nigerrimū. Culices suffitu necat, & muscas. Succum eius largius sumēti, uenenū esse, mirari licet: cū semen ipsum, inferiorē crustam panis, cereali sapore condiat gratissime. Aliud oīno genus uidetur esse Git, qd in segetibus passim nasci cernit: & Pseudomelanthion uocari potest, & Gitago, folijs fere Porri oblongis, flore purpureo, semine ac toto frutice maius q̃ Melanthium, nec odoratū. At uerum Git, de quo præsens Dioscoridi mētio est, folium habet Foeniculi, Senecionisue, florem ceruleum. Odor femini iocundus, nec ubiq̃ prouenit. Hippocrates Cyprium cōmendat. Alia est herba Melandryum, in segete pratisq̃ nascens, albo flore, odorata, cuius cauliculum iocineri tritum, ex uino uetere probant.

Pli. li. 20. ca. 17.
& 22. ca. 21.

VIDENT Maio & Iunio mensibus in pratis, sepibus, limitibusq̃ oibus nascentē rura oīa Nigellā: nihilq̃ eo frutice frequentius, simul & uilius. Quondā grato sapore panē Nigellæ semen cōmendabat. Inspergebatur em̃ ante cocturā illi tritum, quemadmodū & Papaueris: non aliter q̃ & nos modo dulciarijs potius q̃ pani Anisum miscemus. Quod in Nigella merito miratur aliquis, sagacis naturæ artificii est, in conformandis eius uasculis: quibus concipit, maturatur, & seruat semen, colore nigrū, Panici seminis magnitudine. Sunt ea uascula longe papaueraceis minora, nec in mensura sua, ut illa longa. Nullā præterea habent qualē Papauera in summo stellā, sed latiorē umbilicū: neq̃ intus eodē modo discurrentes membranas seminū locos dissepientes. In Papauere em̃ sulcorū modo intercedente, quasi aggere quodam canales sunt: in Nigella per mediū transeunt, quasi parietes, quibus loculamenta illa seminū diuiduntur. Est illud discrimen etiā, quod singula in singulis Papauerū caulibus uascula sunt, in Nigella numerosiora: ut quod numero seminū in singulis uasculis deest, uasculorū numero expleat. Solaq̃ hæc uasculi forma fecit, ut syluestre & nigrū Papauer a quibusdam Nigella diceretur. Græci a colore seminis Melanthion, & eorum exemplo latini Nigellam nominauerunt.

B

De Laserpicio, & Lasere. **CAP. XCIII.**
LAserpiciū in Syria, Armenia, Media, & Libya nascitur, caule ferulaceo, quem Maspetum uocant. Folijs Apio similibus, lato semine. Radix excalfacit. In cibis ægre concoquitur. Vesicæ noxia. Sugillatis illita cum oleo, & strumis, ac tuberculis cum cærato, medetur. Ischiadicis conuenit cum Irino, aut Cyprino cærato. Excrecentibus circa sedem tollendis, illinitur cum putamine mali punici & aceto decocta. Venenis pota resistit. Os commendat, cibis aut sali permista. Laser radice, atq̃ caule scarificatis colligitur. Præfertur autem rufum translucent, Myrrhæ æmulum, non porraceum, odore ualens, suauis gustu. Quod dilutū facile albescit. Syrenaicū si quis degustarit, humorem toto corpore ciet, blandissimo odore, adeo, ut ne os quidem gustanti, nisi paululū spiret. Medicum & Syriacū minus uiribus ualent, & grauiorem reddunt odorem. Laser omne antequā siccescat adulteratur sagapeno, aut fabæ lomento. Quod maleficiū deprehenditur gustu, odore, uisu.

H 111

D I O S C O R I D I S

- C** & madefactione. Caulem aliqui Silphion, radicem Magudarin, & folia Maspeton uocauere. Efficacissimum Laser, mox folia, postremo caulis. Acrem uim habet. Inflationes facit. Peruncias cum aceto, pipere, & uino, alopecias sanat. Oculorum aciem exacuit. Incipientes suffusiones, illitum cum melle dissipat. Cauernis dentium in dolore inditur, aut cum Ture in linteo circumligatur, aut cum Hyssopo, Ficis coctis in posca, os colluitur. Iis prodest, quos bestia in rabiem efferata momorderit, uulneribus immixtum. Valet aduersus uenena telorum, & animalia omnia quæ uirus ei aculantur, potum, aut illitum. Scorpionum plagis oleo dilutum circumlinitur. Gangrænis præcoërcitis immittitur. Et cum ruta, nitro, & melle, uel per se carbunculis. Clauos, callosq; prius circumrasos uellit. Cærato, aut aridorum ficuum carne præmolitum, recentes Lychenas ex aceto sanat. Et excrescentia in carne, polyposq; si alia quot diebus cum atramento sutorio, aut erugine illinatur. Extuberantia cum forfice extrahit. Veteribus faucium scabricis opitulatur. Grauem, subitoq; irrauescentem uocem, dilutum aqua sorbitione confestim expedit. Vuam illitum cum melle reprimat. Anginis ex aqua mulsa utilissime gargarizatur. Vescentes eo, lætiore colore mangonizat. Tussi commode in sorbili ouo datur, & pleuriticis in sorbitionibus. In
- D** fellis suffusione, & aqua inter cutem cum aridis Ficis. Rigores discutit cum uino, pipere, & Ture potum. Neruorum contractionibus, opisthotonicisq; datur oboli pondere deuorandum. Hærentes gulæ hirudines, gargarizatum cum aceto decutit. Ad lac intus coagulatum bibitur. Comitialibus ex aceto mulso proficit. Menses ciet cum pipere & myrrha potum. Celiacos adiuuat in acino uuæ sumptum. Cum lixiuio autem potui datum, repente conuulsis ruptisq; prodest. Ad potiones resoluuntur, nucibus amaris, aut ruta & calido pane. Foliorum succo ad eadem proficitur, sed multo inefficacius. Cum aceto mulso manditur, ad expeditendam arteriam, maxime cum uox retunditur. Eo cum lactucis utuntur, exitq; in uicem Erucae. Fertur & altera Magudaris in Libya nasci. Radix Laserpicio similis, sed minus crassa, acris & fungosa. Ex qua non profluit succus. Eiusdem cum Lasere facultatis.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 19. ca. 3.
lib. 22. cap. 22.

Silphio, id est, Laserpicio, radix crassa, multaq; Caulis annuus, altitudine & crassitudine quasi Ferulæ. Foliū simile Apio: qd ineunte uere prosilit, deciduūq; est, eximū purgando & saginando pecori. Carne mirabilem in modū iocunda. Folio amisso, caulis emicat: qui omnibus modis paratus igni manditur, hominēq; diebus quadraginta purgat omni uitio. Semen ei latum, foliaceum. Succus duplex e scapo, Caulis uocatus. E radice Rizias, uilior ac putrescens. Radici cortex niger, qui & detrahitur ad mercis adulteria. Preparatur uero succus admixto fursure, aut farina. Subinde concutiendo uas, quatenus ad maturitatem perducant, id est, quatenus sudare desinat, & colorem suū capiat. Ita inueteratum a situ uendicant & carie, Laser uocantes. Perlucidior hic & purior a radice, dulcior a caule: ob id farina inditur, ut coeat. Narum ferunt Silphiū hymbre crasso & piceo, repente madefacta tellure circa Hesperidum hortos, Syrtinque maiorem, septem annis ante oppidum Cyrenarū conditum, Vim autē illam, quatuor stadio.

rum spacio in Africa ualuisse, rem ueram & contumacē, atq; si coleretur, in deserta fugientē. **A** Quidā radicem Laserpicio maiorē fuisse cubitali perhibent, e cuius medio caput sublimē conspiciedumq; tuberet, unde primū succus ceu lacteus erumpat. Supernasci caulem Magydarin uocatum. Quē & semen eius quoq; Magydaris ab aliquibus dicitur, ut Galenus scribit, folio aurei coloris: quo seminis uice, austrinis flatibus decussio, a canis ortu Laserpiciū nascatur: eodemq; anno & scapum, & radicem aboleri, solū circumfodi subactum, glutumq; fieri. Radices eius recens præfectas ex aceto mandī. Pecora non purgari eo, sed si ægrotant, aut sanari protinus, quod fere consequitur, aut emori. Prior opinio uidetur persico Silphio congruere, multo infra Cyrenaicum nascenti. E Syria quoq; importari maxime solebat, Parthico, siue Persico deterius, Medico præstantius. Actius Laser a Cyrenaico lacte separauit, siue quia Laser succus ipse Silphij, non lac esset: siue quia Laseris appellatione Persicum, aut Medicum, ut cognobiliora, non Cyrenaicum ueniret: quippe quod ad pondus argenti denarij penderetur, multisq; iam annis, ut Plinius ait, non inuenitur. Cum comedit ouis caulem, protinus dormit, capra sternutat. Tauros inflammari naribus illitis. Serpentes audidissimas uini admixtum rumpit. Præcipit autē se quidam ex alto, cum in dentium dolore cauis addidisset inclusum cæra. Laser Græci Opon uocant. Et quanq; Opos manantem herbæ cuiusq; succum, ex uulnere significet, Cyrenaicum tamē absolute pronuntiatus indicat, ut Varroni placet: qui coagulari lac eo tradit. Post Cyrenaicum auctoritas deinde Medico, & Syriaco, ut Galenus inquit, Hippocrates, Phyllon Libyon, & Aethiopicum uocando ipsum Silphij semen significat Galeno: ut qd præ sua latitudine foliaceum sit. Interim Phyllon uocat hoc, nec adijcit Libycum. Radicem huius proprie Silphion appellat. Caulon uero, & eccaulema, scapum, id est, colem, ut Herodotus. Solini quoq; uerba de Silphio subiiciam. Apud Cyrenenses inquit Syrpe gignitur, odoratis radicibus, uirgulto herbido magis quā arbusco: cuius e culmo exudat æstatis tempore pingue roscidum, idq; pascentium hircorum inhæret barbulis: ubi cum arefactum inoleuit, guttis steriacis legitur ad usum menfarum, uel medelæ potius. Dictum est primum inquit Syrpicum, quia manat in modum lactis. Deinde usu deriuante, Laser nominatum. Paulo post Asbiæ inquit, uiuunt Lasere, hoc aluntur, hoc illis dulce est. Ex his uerbis Solinus satis indicat, se de Silphio loqui uoluisse quidem, sed parum nouisse quid diceret, ita salebrosus & desuetus in eo genere sermo eius est. Plautus in Rudente.

B Speras inquit tibi multum hoc anno futurum Syrpe & Laserpiciū? Sed cur Varro Draconem appellari dicit ipsum lac Cyrenaicum? An non Draconem, sed Diaconem legi potest? quia odorem intentum & uehementem habeat: & an Draconem a colore rubro. Talis enim præfertur. nam & herba Rubia, quandoq; apud Græcos Cinnabaris, & Draconem uocata est, a colore Dioscoride.

Magydaris siue, Magudaris, a Laserpicio differt teneritudine. In Syria & Parnasso monte plurima. Theophrastus & Plinius in Libya eam nasci pernegant. Sunt qui & hanc Laserpiciū appellent. Periti uero facile discernunt uel aspectu.

E X M. V E R G. C O M M.

Longissime omnium Theophrastus de Silphio in sexto de plantarū historia egit. Licetq; Plinius, & præter Pliniū plures alij plantam, partesq; eius omnes longiore historia illustrauerint. nihilominus quoniā cuncta alij ab eo accæperunt, singulicq; aliquid, quod dixisse oportebat, reliquerunt, operæ præcium erit, ex eo scriptore iisdem uerbis omnia semel reddidisse. Quæ huiusmodi sunt. Habet Silphium numerosas radices, & crassas: caulem qualis in Ferula est, & crassitudine illi æqualem. Folium, quod Maspeton uocant, Apio simile. Semen latum, foliaceumq;. Caulem non ultra annū prorogat, quemadmodū & Ferula. Vereq; primū folia & Maspetum hoc profert: quo oues mirifice purgantur, & pinguescunt, egregia odoris suauitate carnes cōmendans. Post hæc caulē profert cibis quocunq; modo aptum. Tostus siquidem, & elixus estur. Feruntq;, quadraginta diebus corpora purgare. Destillat duplicem liquorem Silphium: a caule alterum, ab radice alterum. Vocantq; hunc a caulibus Cauliam, illum a radicibus Rhiziam. Habet radix nigrum corticem: auferuntq; in usu eum. Sunt & radicum, sectionisq; mensuræ quædam, quibus quantum oportet, cedunt, reliquum ad sectiones seruantes. Neq; enim in secando errare, neq; ultra q; constitutum sit secare oportet. Corruptur enim, putrescitq;, si aliter fiat. Curant autē in Pyreæo, Athenas ferentes Silphium hoc modo. Cum in uasa coniecerint, farinam illi miscent, multoq; tempore cōmouent: eaq; tractatione colorem contrahit, rationeq; hæc curatum incorruptum permanet. Quæ igitur in secando, curandoq; Silphio seuanda sunt, sic se habent, Libyæ latos occupat campos; siquidem spacio ultra sta-

C ditorum quatuor milia nascitur: copiosumque prouenire ab Hesperidum hortis ad Syrtim. Proprium illi est, cultos odisse locos: & si colatur, in deserta fugere, uelut id quod ferum sit, & cultura non indigeat. Narrant Cyrenæi, septem ante conditas Cyrenas annis apparuisse. Ex quo autem ædificata urbs est, trecenti intercesserunt anni, magistratum gerente Athenis Simonide. Et hæc quidem sic ferunt aliqui. Alij radicem Silphij ferunt cubitalem, pauloue ampliorem nasci: tumereque in medio ueluti caput, quod sursum in sublime fertur, pauloque minus quam supra terram emergit. Ex qua erumpit quod Lac uocatur. Tum caulis. Et post hunc quod Magydaris, & folium dicitur, quod semen est. Cumque ualidus spirauerit Ausfer post caniculares dies, uenit id spargi: ex eoque nasci Silphium. Eodemque anno radicem fieri, & caulem. Verum non est hoc Silphij proprium. Habent enim & alia. Nisi hoc forte dicunt a sparso semine statim nasci. Quod uero priuatim, & ab alijs diuersum Silphium habet, illud narrant. Oportere annum fodi. Si enim relinquatur, semen totum, caulemque proferre, deteriusque ea ratione fieri & hoc, & radicem eius. Narrant præterea, fieri meliores circumfossas radices: quoniam renouentur terra. Sed hoc contrarium illi est, quod dicitur odisse culturam Silphium. Narrant & comedire radices recentes in acetum concisas, & folium colore auri esse. Contrarium his etiam, purgari oues folium comedentes. Ferunt enim, hyeme & uere in montem exire oues, uescique eo, & alio quod Abrotono simile sit: & quod utrunque calefaciendo est, non purgare, uerum siccare, & concoctionem adiuuare: ideoque fieri, si morbosæ, maleque affectæ ouis aliqua accedat, conualescere statim, aut mori: uerumtamen sæpius conualescere. Hæc autem utro modo se habent, considerandum est. Quæ uero Magydaris dicitur, aliud a Silphio est, rarius, & minore acrimonia, succoque carens: discernitur a peritis solo aspectu. Nascitur in Syria & Cyrene. Narrant & in Parnaso nasci copiosam: & hanc Silphium esse. Si uero culta fugit loca, uelut Silphium, considerandum erit. Similiterque an simile, æqualeue aliquid in folio & caule habet. In uniuersumque, si lachrymam destillat. Et hæc Theophrastus longius forte quam legendum aliquis æquo animo ferre potuerit ab eo & a nobis dicta: sed non inutilia, ut quæ a Dioscoride dicuntur, certius intelligi possint. Siquidem & ille de foliaceo semine, de Maspeto, Magydari, aliisque omnibus pariter egit: & ut tunc ferebat fama, totam Lasericij historiam tradidit, quod Cyrenaico agro probatissimum nascebatur. Tantumque illi ex eo laudis & honoris accreuerat, ut Catullus una hac nota Cyrenem illustrauerit, Lasericiferas in epigrammate suo Cyrenas uocans. Nouerant enim tunc omnes, quod ubique nunc ignoratur. Eratque in quotidiano ciborum usu Lasericium, quos grato sapore & odore commendabat. Miscebatur id, ut indicat Columella, oxyporis: & ut plures alij testantur, Lasericium acetum in multo usu erat. Longior erit commentatio hæc nostra, si quorufus Lasericij habuerit (sic enim Plinius etiam uocat) numerare uouerimus. Illud dixisse satis sit, quod Martialis de simila ait. Nec Lasericis dotes poteris numerare, nec usus. Cum medico totiens, cum sit & eo quo totiens aptum. Vtebatur eo passim antiquitas, ob egregiam calefaciendi uim quam habet. Nunc autem tantum abest, ut nostrorum temporum Lasericio uti, ganea, aut medicina possit: ut rem ipsam utraq; ignoret, nec coniectura saltem ostendere possit. Nouerunt quidem nostræ ætatis medici Opon Cyrenaicum, sed nomen tantum, & in eo nomine, quod longissime ab antiquo Opo Cyrenaico differat. Idem enim Opos Cyrenaicum, & Lasericium hoc quondam fuit: nunc autem in fetida Asa ea uoce utuntur: quæ tetri & ingrati odoris sensu, tantum a Lasericio differt, quantum uersimile est quondam discrepasse eorum usus. In medicina sane infinitus pene fuit eius usus: indicantque græcorum medici omnes, qui adhuc supersunt. Indicat Plinius uigesimalmo secundo uolumine capite uigesimalmo tertio, longissimeque omnium hic scriptor. Ex cuius remedijs nos tantum signabimus, quæ nobis non sunt cum Barbaro eadem, duoque præferim. Quorum id primum est, quod ille ait, mederi Lasericium neruorum contractionibus: contractiones neruorum uertens, quod Dioscorides tetanicos dixit, longe ab illis diuersos. Qui quales sint in Sampfucino unguento dictum longius a nobis est. Alterum uero, quo loco uertit, dari Lasericium his qui lactis coagulum biberint. Quod γάλακτος πρὸς αἵματι hic scriptor uocat, in uenenorum censu ab eo libro sexto numeratum.

De Sagapenio.

C A P. XCIII.

σαγαπένιον

Sagapenium ferulaceæ herbæ succus est, quæ in Media nascitur. Optimum est translucens, fuluo forinfecus colore, & intus albo, nescio quid inter Laser & Galbanum redolens, gustu acri. Prodest la-

terum & pectoris doloribus, tussibus uetustis, conuulsis & ruptis. Crassam pulmonis pituitam expurgat. Datur comitialibus, opisthotonicis, lienosis. Item contra neruorum resolutionem, perfrictiones, & februm circumitus in potu. In unguenta probe admittitur. Menses pellit. Sed foetum exanimat, cum hydromelite potum. Prodest ex uino haustum serpentium icibus. Olfactum ex aceto uuluarum strangulatus excitat. Oculorum cicatrices, offusam caliginem, hebetudines, suffusionesque detergit. Resoluitur succi modo, ruta, aqua, & amaris nucibus, aut melle, aut calido pane.

SAGAPENUM medicinae tantum scribitur in hortis. Dicitur & Sacopenium. Quod apud nos gignitur, in totum transmarino alienatur. Illud enim Hammoniacy lachrymae simile Sagapenum uocant, fructus sui nomine, ut Galenus inquit, per abusionem.

Pli. li. 19. ca. 8.
lib. 20. cap. 18.

EX M. VERG. COM M.
Estat sunt ueteres Graeci, Ferulam Sagapenum ferentem, nullos habere in medicina usus: quodque in ea expetitur, liquorem solum esse: nec ultra id historiae eius aliquid addiderunt. Hic etiam Graeciae peregrinam fecit, in Media nasci dicens: & ex quo ferulaceam herbam dixit, genus, formam, partesque eius ignorasse uidetur. Plinius in Italia nasci Sagapenum testatur, dicens. 20. uolumine capite. 18. Sagapenum quod apud nos gignitur, in totum transmarino alienatur. Neque ipse etiam ferentis id fructus, aut herbae naturam tradidit. Ob eam causam, nec nos longius de eo agemus. Et si Plinius, ut paulo ante diximus, Sagapenum Italiae plantam dixerit, & praeter ea quae paulo ante ex eo citauimus libro. 19. capite septimo, in hortis, sed medicinae tantum feri dicat. In qua separarunt alij interpretes, perfrictiones a circularibus febribus: cum tamen ab hoc scriptore dicatur, dari Sagapenum contra perfrictiones quas circularium febrium accessiones faciunt.

B

De Euphorbio.

CAP. XCIV.

EUPHORBIA Libyca arbore est, Ferulae speciem habens, quae in monte Atlante iuxta Mauritaniam inuenitur. Ea acerrimo succo turget. Cuius eximium feruorem expauescentes incolae, ouillos uentres elutos, arbori circumligant, & eminus caulem contis incidunt. Confestimque plaga perinde atque uase quodam, in uentriculos copiosus lactis humor effluit, praeter id quod sparsi in humum, uulnus ei aculatur. Duo succi genera. Vnum Orobi magnitudine, Sarcocolae modo emicat. Alterum in uentriculis concreuit, atque uitreum spectatur. Eligendum est translucens, & acre. Euphorbium adulteratur Sarcocollae, & glutini mistione. Sed difficile quidem experimentum. Quippe cum leui gustu, os accensum diu detineat, adeo ut quicquid ori obijciatur plane Euphorbium respiciat. Bius inuentio tempore Iubae regis Libyae cognita extitit. Succus illitu suffusiones discutit. Potus tota die exurit. Quare melli, collyriisque pro acrimoniae ratione ammisceri debet. Coxarum doloribus prodest in odorifera portione haustus. Squammas ossium eadem die eximit. Verum eo uidentes necesse est linamentis, aut caeratis communire corpus, quo ossa conuestiuntur. Aliqui memoriae prodiderunt, percussos a serpente nihil molesti passuros, si incisa ossetenus capitis cute, intritus succus infundatur, uulnusque postea consuetur.

Euphorbia

D I O S C O R I D I S

C **E** **B** **A** **R** **B** **A** **R** **I** **C** **O** **R** **O** **L** **L**.
*Pli. li. 26. ca. 11.
 lib. 25. cap. 13.*
 Euphorbium, & Euphorbiam, Iuba Ptolomei pater, in Atlante gigni herbā scribit, dicato priuatim uolumine, folijs acanthinis, appellatam nomine inuentoris eius medici sui, & fratris Musæ. Suscipitur lac non omni uentriculo, sed hædino. Qui colligunt clarius uident. Siccatut Conto, ut effigiem Turis habeat. Adulteratur hædino lacte. Sed discernitur igni. Quod enim syncertū non est, fastidiendum odorem habet. Multū infra hunc succum est, qui in Gallia fit ex herba Chamælea, granum Cocci, ut Plinius inquit, ferente. Fractus, Hammoniaco similis est. Accendit os semel gustatū, & magis ex interuallo, donec fauces quoq; assiccet. Galenus & Paulus Phorbion, siue Phormion herbam quandā nominant, longe ab Euphorbio diuersam: cuius folio & semine, ad albugines utantur cum melle: spicula quoq; corporibus extrahi persuasum est. Græci codices Eupholbion, pro Euphorbio fere scribunt.

De Galbano. **C** **A** **P**. **X** **C** **V** **I**.
χαλβαν
G **A** **L** **B** **A** **N** **U** succus est nascentis in Syria Ferulæ, quod nonnulli Meztopiū uocant. Maxime laudatur cartilaginofum, merū, Thuris effigiem præbens, minime lignosum, retinens, nonnihil adiecti seminis aut Ferulæ, graui odore, neq; humidū, neq; aridū. Adulteratur faba fresa, & Hammoniaco. Galbanū excalfacit, urit, extrahit, discutit. Menses ac partus trahit, appositū, uel suffitu. Lentigines aceto & nitro peruncias tollit. Deuoratur ad tussim ueterem, difficultatē spirandi, suspiria, rupta, conuulsa. Aduersat toxicis potū cum aceto & myrrha. Simili modo sumptum, mortuos partus extrahit. Imponitur lateris doloribus, & furunculis. Comitiales, & uulua strangulatus, & uertiginosos olfactū suscitāt. Si uratur, fugat nidore serpentes, & peruncias feriri non patitur. Serpentes cum oleo & sphondylo circumpositū necat. Dentū dolorem obliuī, aut cauernis inditum, mitigat. Vrinæ difficili prodesse existimatur. Resoluitur ad potiones amaris nucibus, aqua, aut ruta, aut calido pane, mulsaue. Alias meconio, are usto, aut felle liquido. Si purgare Galbanum uoles, in feruentem aquam demittito. Namq; cum liquefactum fuerit, eius fordes fluitabūt. Quas hoc modo facile separabis. Mundo linteo alligatum in fictili, aut ærea pixide ita pendeat, ut imum uasis ne tângat. Operitocq; uase in feruidam aquam demittito. Sic enim syncarum, ueluti per colum eliquescet, & lignosum in linteo remanebit.

B **A** **R** **B** **A** **R** **I** **C** **O** **R** **O** **L** **L**.
*Pli. li. 12. ca. 25.
 lib. 24. cap. 5.*
G **A** **L** **B** **A** **N** **U**, Chalbanen Græci uocant, & ferulam, & lachrymam. Item Stagonitin, & Me-topion. Laudatur simile Hammoniaco. Adulteratur Sagopeno. Permutatur in libras quinq;. Medicinæ hoc tantum Galbanon a colore dictum candido existimant: a quo & uestis nomen Galbanum Iuuenali. Vulgo quoq; nautica operaimenta sic uocamus. Nam Galbecum, ut Tranquillus ait, remedia sunt lanis inuoluta.

E X M. V E R G. C O M M.

S **A** **T** **I** **S** fore legentibus credimus, quod in Galbano natura ostendit: q; in Syria nascens, & doramentorum omnium fecunda genitrice, ut auctor Theophrastus est, ingrato odore tetrum, regionis eius hanc felicitatem turbauit. Nisi forte quæ in agendo sagax natura est, Galbanum Balsamo, Casia, Cinamomo, odoratisq; Calamo & Iunco ideo miscuit, iisdemq; locis nasci uoluit: ut quātum ingrati odoris ex terra Galbanū in se traxisset, tantū purioris odoris illis relinqueretur: damnareturq; una Galbani ferula, ut felicius cætera agerent. Quod illi, & hortos conferentibus consilium aliquando est, male & grauiter odoratis plantis, eodem loco constitis, aliarum odores augere. Nihil tamen sic etiā a natura damnatum, inutile homini penitus genitum est. Habet enim, ut cætera relinquamus, suas uires & laudes Galbanum. Solum aucto-

te Theophrasto, grauiter odoratum in Syria nascens, Potestq; præter alia quæ illi in morbis ab hoc scriptore, & ab alijs tribuuntur, ingrato agitare graues nidore chelidros: ut Maro cecinit. Et Nicander. *ναίμων καὶ βαρυσόδιμος ἐπὶ φλογὶ μνηστῆρα χαλβάνη, καπνὸν ἄγχι καὶ φέρον ὀδμήν.* Prouit quondam etiam, nebellorum & fortunæ gloria, & honoribus careret, oppida expugnare: illisq; liquore suo facibus, Hispaniæ oppidum frustra diu oppugnatum, succendere: eaq; uictoria Romanis ciuibus gentile nomen ex se dare: quod non multo post a Domitij Neronis turpi & funesto principatu, inter Cæsares coleretur: essentq; a Galbano, quo usi in incendio oppidi in Hispania fuerant, Galbæ Romana gens, per Cæsarem suū toto orbe clari. Ex eo non paruum Galbano honoris accessit incrementum. Nōsq; hæcenus a fortunæ gloria laudatum, ad naturam transferimus. Primumq; illud legentes monemus, non Turi tantum, sed Hamōniaco liquori simile Galbanū cæteros dicere, Pliniumq; presertim. Quo fit, ut deesse huic scriptori id suspicemur. Quod præterea in impresso Diosco. legebatur, toxicis mederi *σὺν ἔξῃ*, quod est, cum aceto, ex ueterum meliorumq; codicum fide, cum uino uertimus. Persuasitq; id Plinius lib. 24. cap. 5. aduersari uenenis, maximeq; toxicis, cum Myrrha & uino dicens. Fecit eiusdē scriptoris autoritas etiam, accedente ueterum codicum eadem fide, ut quod erat *σικκὶ δὲ καὶ διουροῦσι ποιεῖν*, significareq; uidebatur, facere ad urinæ angustias, ad contrarium sensum deflecteretur: indicareq; urinæ nocere, & eius angustias facere, Plinius enim eodem loco ait, Nocere urinæ existimatur.

De Ammoniaco. CAP. XCVII.

Ammoniacum hæba est, ex qua Amōniacum fit suffimen qd Tymiam uocant, aliqui Agazyllon, alij Criothēum, alij Helistrum, Romani Guttam appellant. Ferulæ succus est, quam iuxta Cyrenem Aphrica gignit. Cuius fruticem cum radice Agasyllim uocant. Probatur bene coloratum, ligni & calculorum expers, Turis similitudine, minutis glebis, densum, syncerum, nulla sorde spurcatum, castoreum odore imitans, gustu amarum. Hoc genus Trausma, id est, friaturam appellant. Quod uero terram & calculos collegit, Phyrama, quod significat misturam. Gignitur in Aphrica iuxta Ammonis oraculum, succum stillante ferulacea arbore. Mollit, extrahit, calfacit. Tubercula duriciæq; discutit. Potum aluum soluit. Partus extrahit. Lienem consumit, drachmæ pondere haustum. Articulorum coxendicumq; doloribus liberat. Auxilio est anhelatoribus, orthopnoicis, comitialibus. Itē quibus humor in pectore coit, si cum melle delingatur, aut cum ptisanæ succo forbeatur. Cruentam urinam pellit. Albugines oculorum abstergit. Genarum scabriciam absomit. Tritum autem cum aceto & impositum, iocineris lienisq; duricias sedat. Discutit tofos, qui in artubus concalluerunt, cum melle, aut cum pice illitum. Lassitudines & coxendicum dolores eo perūgi utile est, cū nitro et cyprino oleo uice acopi.

BARBARI COROLL.

Hammoniaco dicitur, quoniam stillat in harenis, iuxta Iouis Hammonis oraculum resine modo, aut gummi ipsum Thrausma, siue Thraustum. Turis habet masculi similitudinem. Phyrama uero pingue, resinofumq;. Adulteratur harenis uelut nasceudo apprehensis, igitur q̄ minimis glebis probatur, & q̄ purissimis. Precium optimi in libras asses quadraginta. Metopion arbor ipsa dicitur, ut Galbani a Solino Metops.

EX M. VERG. COMM.

Habet salem, habet liquorem medicina Hamōniacum. Vtrūq; ab harenis, sed diuersa ratione dictum. Illū, q̄ sub harenis concresecat, et inueniatur. Hunc, q̄ in harenosa Libya ad Hammonis Iouis templum ex Ferula in harenas destillet, & ut in Ture fit, concretis grumis inter eas

A

αμμωνιάκος

B

Pli. li. 12. ca. 23.
lib. 24. cap. 6.

D I O S C O R I D I S

C inueniatur. Græci ab harenis, quas *ἡμῶν* dicunt, utrumq; indicauerunt, sed illum salem, hūc liquorem Hāmōniacum, quasi harenosum uocantes; graui periculo miscendi simul diuersa, nī si eorum exemplo discrimen aliquod ex rei substantia addatur. Quod nos timentes, ut illū salē suo loco uocabimur, sic hunc autore Diosc. guttam uocauimus; quasi & hic quemadmodum Tus Stagonias aliquando dictus fuerit: quæ uox in græcis stillicidium & guttam significat. Plinius Hāmōniaci lachrymā eiusdem rei significatione appellat. Græci Hāmōniacō simpliciter, ut tunc erat eius uocis æstimatio, uocant. Fugientesq; nos æquiuocæ appellationis periculum, guttā Hāmōniacam diximus, lachrymam liquorēq; significantes Ferulæ, quæ priuatim in Libya ad Hāmōnis Iouis tēplū tūc nasci ferebat. Quæ siue ab harenis, siue ab Hāmōnis Iouis templo uocari dicat, eandē rationē habet: qm̄ & Deus q̄ int̄ eas harenas colebat, mortalibusq; respōdebat, ab ἡσδē harenis nomē a græcis inuenerat. Ideoq; Criothēos a forma eius, q̄ aricino capite pingebat, eadē hęc Ferula, liquorq; eius parit dictus est. Satisq; hic natale solū illi assigna uit, dicens primum nasci in Lybia ad Cyrenem: mox in Libya ad Hāmōnem, Iouem illum int̄ telligns qui in templo inter Libyæ harenas coleretur. Ceteræ eius appellationes barbaræ sunt, ideoq; nunc omnibus incognitæ.

De Sarcocolla. CAP. XCVI.

σάρκολλα

Sarcocolla lachryma est arboris in Perside nascentis, pollini Turis similis, ruffa, gustu amara. Vulnere glutinat. Oculorum fluxiones inhibet. Emplastris inseritur. Adulteratur ammisso gummi.

BARBARI COROLL.

Pli. li. 24. ca. 14

Sarcocolla uetustate nigrescit maxime. Melior, quo candidior. E spina reddi putant, cum quadam acrimonia dulcem.

EX M. VERG. COMM.

D Inter gummi genera numeratur a Plinio Sarcocolla: eodemq; nomine arbor, & ex ea destillans gummi appellatur: quod ex uī, potestateq; sua nomen inuenit. Carnes enim, quas græci *σάρκα* dicunt, in uulneribus glutinat: quod eiusdem gentis uerbum *καλλῶν* significat. Picioribus idem Plinius utilissimum etiam dixit.

De Glaucio. CAP. XCIX.

γλαύκιον

Glaucium succus est herbæ quæ in Hierapoli Syriæ nascitur, folijs fere corniculati Papaueris, pinguioribus tamen, in terram sparsis, odoris tetri, gustus amari. Tota croceo succo madet. Folia in olla sicili semifrigidis clibanis calfaciunt indigenæ, usq; dum flaccescant. Deinde contulis succum exprimunt. Cuius est usus ad oculorū medicamenta. Vtpote cum inter initia refrigeret.

BARBARI COROLL.

Pli. li. 20. ca. 19
lib. 27. cap. 10.

Glaucion & in Parthia nascitur, folijs densis, minoribus q̄ Papaueris sordidioribusq; gustu amaro, cum quadam astrictione. Granum habet crocei coloris. Hinc temperatur collyrium: quod medici Diaglaucion uocant, in quod recentiores Papauere cornuto utuntur, aut etiam Ghelidonio maiore: ut nihil profecerit Dioscoridis attestatio in mentione Papaueris illius, cū alioquin magno periculo hac parte hallucinentur, q̄ Chelidoni & Papaueris eius natura erodendo sit, Glaucij multo mitior, & refrigerando fere. Propterea collyrium ex illo iumentorum oculis adhiberi solet, ex Glaucio humanis.

EX M. VERG. COMM.

Sunt Plinio, & Dioscoridi in Glaucij medicina & historia eadem fere omnia. Hic ad Hierapolim Syriæ, ille in Syria & Parthia nasci tradit. Ambo humilem herbam, sed ille simpliciter folijs Papaueris, hic cornuti Papaueris priuatim describit. Hic pinguioribus q̄ Papaueris, Plinius sordidioribus dixit: magno discrimine inter sordidum, & pingue. Diuersitatis ea potuit esse causa, ut quod nunc legitur *λεπρότερα*, certa pinguedinis significatione, tunc *ὑπερπρότερα*, i. e. sordidiora legeretur, facillimo & lubrico, ut in Galbeano paulo ante diximus, in unius literæ figura, & sensu ad contrariā & alterutram significationem lapsu. Locum in Plinio est. 27. uolumine cap. 10. Nobis aptius uisum est, Dioscoridem, q̄ Plinium sequi.

De Glutino. CAP. C.

A

Glutinum quod Xylocollan, alijs Taurocollan uocant, præstantissimum Rhodiaceum, quod ex bubulis corijs conficitur. Id candidum est & translucens. Nigrum uero minus probatur. Resolutum in aceto, impetigines, leprasque cutis delet. Ambustis igni ex aqua calida impositum, pustulas crumpere non patitur. Vulneribus prodest melle, aut aceto madefactum.

κόλλα

BARBARI COROLL.

Glutinum, siue Gluten, Græce Colla, Præstantissimum fit ex auribus taurorum, & genitalibus. Sed adulteratur nihil æque, quibusuis pellibus inueteratis, calciamentisque etiam decoctis. Rhodiaceum uero fidelissimum, eoque & pictores, & medici utuntur. Lignosum improbatum. Contexi par est et reliqua Glutinum genera. Auro Glutinum est Santerna, ferro Argilla, gris massis Cadmia, laminis Alumen, Stagnum æra mentis, stagno Argentum, marmori, & plumbo Resina, Plumbum nigrum albo, album ipsum sibi oleo. Est & Glutinum auri cum inducit ligno, Leucoporon, siue Leucophæon uocatum, ex pluribus compositum, Sinopidis pontice selibra, Silis lucidi, pix, & melini greciensis duobus mixtis, tritisque una per duodecim dies. Est & Lithocolla Glutinum ex lapidibus, sicut Ichthyocolla ex piscibus. Habetur et Gluten librarium ex simila & polhne. Nam Gluten Atticum pro gummi ex amygdala quandoque accipitur a Chymicis.

Pli. li. ii. ca. 39

De Glutino piscium. CAP. CI.

Glutin piscium, uenter est piscis cetacei. Præstat candicans, natione Ponticum, subasperum, carens squamis, & quod celerissime liquefit. Vtile emplastris, capitis & leprarum medicaminibus, & tetanothris, quæ cutem faciei erugant & extendunt.

ἰχθυόκολλα

BARBARI COROLL.

Ichthyocolla appellatur piscis, cui glutinosum est corium. Idemque nomen Glutino eius: quod alijs ex corio, alijs ex uentre putant fieri. Ichthyocolla inuentum Dædali. Laudatur carens uenis, squamisque. Madescere debet concisa in aqua, uel aceto nocte & die: mox tundi marinis lapidibus, ut facilius liquecat.

Pli. li. 32. cap. 7

B

E X M. V E R G. C O M M.

Notum cunctis piscium Gluten est. Indiget enim eo uita quotidie & utitur: nec possunt sine ope eius feliciter in artibus tractari multa. Ob eam causam nihil ultra de eo agetur.

De Visco. CAP. CII.

Viscum optimum est recens, intus porraceum, extra fuluum, quod asperi nihil, aut fursurosi concaperit. Fit acinis in robore nascentibus, buxæ fruticis folio. Contusum acinum lauant, & postea in aqua decoquunt. Sunt qui commanducando ipsum efficiant. Gignitur quoque in malo, pyro, & plerisque alijs arboribus. Quinetiam inuenitur in quorundam fruticum radicibus. Emollit, discutit, extrahit. Parotidas, tubercula, cæterasque collectiones, ad maturationem perducit. Cum resina autem & cæra pari, epinyctidas in splenio sanat. Vetera ulcera, suppurationesque, quas cacœthe uocant, ex Ture mollit. Lienem cum calce, Gagete, aut Asio lapide, impositum absumit. Cum sandaraca, aut auripigmento illitum, ungues extrahit: Mistum cum calce & uini faciem suam uim intendit.

ἰξός

BARBARI COROLL.

Viscum Græce Ixos; & Ixias stutex ipse, ut Athenæus ait. Porro Viscum illud, quod inter

Pli. li. 16. ca. 44

I η

D I O S C O R I D I S

C uenena ponitur a Dioscoride, Galeno, Plinio, Ixiam Græci uocant, & Vlochon, siue Vlophonon: quibus nominibus Chamæleontem quoque dici constat: radicemque affirmant esse hoc genus Visci, quod interficit: unde orta dubitatio est, Viscum hoc pro Chamæleontis, an pro sui generis, aut pro fruticis ipsius radice capiamus, ex quo Viscum conficit: Paulus, & Aetius in uenenis Ixiā a Chamæleonte separant, alias & notas & medicinas reddendo. In Quercu, Ilice, Pruno syluestri, Terebintho, nec alijs arboribus adnascitur. Dioscorides addit Malo, & Piro. Copiosissimum in Quercu. Plerique putant, quod Dryos, Hyphear uocant, Ion poeta sudorē quercus: namque quod in Abiete & Larice fit, Stelim Eubœa dicit, Hyphear Arcadia non Viscū. Viscū porro gña bina, uel terna faciunt, & in omni arbore, excepta Ilice, & Quercu. Differentiā cōstituit odor uiridis, & folium, non iocundi odoris. Viscū coloris, ut poeta ingit aures, amarū & lentū, e Robore præcipuū. Hyphear uero, ad saginanda pecora utilius, quā & alimentū plus & pinguetudinis in Larice et Abiete fit. Vina purgat primū: dein pinguefacit, quæ suffecere purgationi ut Silphium. Quibus sit aliqua tabes intus, negant durare. Edendū ratio ætatis quadragenis diebus. Adiciunt aliqui discrimen in hijs, quibus folia decidunt & Viscō decidere. Contra inhærare nato in æterno fronde. Omnino autē satū nullo mō provenit: unde Maroni dictum, Quod non sua seminat arbor.

nec nisi per aluum fimo redditum, maxime palumbis & turdis. Siue ut quidam ex Theophrasto, picis, *κίττα* pro *κίχνα* legentes: cum alioquin Plautus, autore Seruio grammatico, de turdelis intellexerit: cum inquit, ipsa sibi auis mortem creat. Est autem Turdela, Turdi genus alterum, quod in Venetia provincia, Drexanos uulgo nominant. In Liguria præscū nomē retinent maiores. Turdo sunt penna subtus uaria. Græci Cossyphos modo appellant, ut quibusdā uideat. Drexanos porro, quasi Dryxanos, hoc est, quercus ayrodētes uocatos existimāt. Cossyphos certe Aristoteles merulas intelligit, item Cortyphos. Palūbos Græci Phatras, siue Phasias uocant. Sed genus eorum unum, cuius fimo Viscum nascatur. Athenæus Oenadem appellari tradit: quam Theodorus noster, in Aristotele Vinaginem interpretatus est. Altitudo eius non excedit cubitalem, semper fruticosi ac uirentis. Mas fertilis, femina sterilis. Aliquando non fert. Viscum fit ex acinis imaturis, hoc est, uiridibus, nondum candidis, quod eis per maturitatem contingit. Hi per menses collecti, siccant, atque tui, deinde putrefacti aqua, duodenis fere diebus, mox in profluente rursus malleo runduntur, amissis corticibus, interiore carne lentescentes. Quidā decoquunt in aqua tufum, donec innatet. Nonnulli cōmanducantes acinos, expuunt cortices. Optimum est quod sine cortice est, quodque leuissimū. Quidam efficacius futurum promittunt, detractum prima luna e robore sine ferro. Viscō nihil est glutinosius, pennis maxime uolucrum ligandis, Iugladium oleo subactum, cum libeat insidias molliri. Druydes in Gallia nihil habent Viscō & arbore in qua gignatur, si modo sit Robur, sacratius, nec ulla sacra sine ea fronde faciunt. Quicquid rursus adnascitur, e coelo missum putant. Inuentu rarum, magna religione petitur, & ante omnia sexta luna. Post sacrificium & epulas, sub arbore sacerdos ueste candida, falce aurea id demetit, candido excipiente fago: taurosque duos coloris candidi, tum primū cornibus uinctos imolant, precantes ut suum donum deus prosperum faciat. Fecunditatem eo poro dari, cuiusque animalium sterili arbitrantur, contraque uenena omnia esse remedio. Fit & ex alijs quoque rebus Viscum in Syria. Ex acinis, quos ab Augusti honore, ut coniunctio, Sebastos appellant. Hæc Myxa ueteribus fuisse interpretor: quæ per diminutionem quoque Myxaria dicuntur. Arbusti eius ligno, cortex albus, ramis uirens, folio rotundo, amplo, fructus in racemo dulcis, candido lentore plenus, cum interiore nucleo quasi oliuæ siccatur. Hic in medicina uentrem soluit, destillationesque comprimit, & rosiones Vesicæ, & intestinorum animalia. Damascenum inde Viscum paratur, commendatissimum aucupijs, præterque aquatiliū uolucrum. Fingitur & ex radice quadam Viscum Lātanzæ dicti fruticis, æque ueteribus incogniti, folio hirsuto, molli: flore candido, odorato: quem sustinet umbella. Viminibus lentis ad nexū acinis ut uua, primo rubentibus, post nigrantibus.

E X. M. V E R G. C O M M.

Q uale solet siluis brumali frigore Viscum, Fronde uirere noua, quid non sua seminat arbor, tale & suum Dioscoridi describitur, nulla appellationū eius addita diuersitate. Quales in secundo de causis plantarum numerauit Theophrastus, Hyphear, Stelida, & Ixon, siue Ixiā, eandem rem aliter alijs in Græcia uocantibus. Et si non deessent tunc etiam, qui in diuersis arboribus nascens Viscum diuersa appellatione ostenderent, nascique Hyphear & Stelida in abiete & picea dicerent: Viscum uero in quercu, terebintho, alijsque multis. Fuerunt etiam, qui in diuersa parte eiusdem arboris nascens, diuerso nomine indicarent: hincque Hyphear, illinc

Viscum; & Stelida natum appellarent. Quæ nos, nouisse ea uolentibus legenda in Theophrasto relinquimus, & præter Theophrastum in Plinio. 16. uolumine, capite. 45. quo loco reddita iisdem uerbis ex eo scriptore a Plinio omnia fuerunt.

¶ De Aparine. CAP. CIII.

Aparinen aliqui Ampelocarpon, alij Omphalocarpon, nonnulli Philanthropon uocant, ramosam hærbam & quadrangulam, ex interuallis orbiculato foliorum ambitu, ut in Rubia. Flos albus, semen durum, rotundum, concauum, album, umbilici figurâ, asperitate uestium tenaci. Ea pastores coli uice utuntur, ad eximendos e lacte pilos. Seminis caulium ac foliorum succus, potu contra uiperarum, phalangiorumq; morsus auxiliatur. Infusa aurium dolori medetur. Hærbæ cum axungia trita strumas discutit.

BARBARI COROLL.

Aparine, quam nostri & Lappam uocant, Hippocrates Philistion, & Phileterion quoq; ut Galenus putat. Non euidens, sed occultus in ea flos maturefcit, & intra se germinat semen: uelut animalia quæ in se pariunt, ut uiperæ. Nascitur in frumentario agro, inter Lentem præcipue, item pratis, hortisq;. Ramosa hæc & hirsuta, quinis sentisq; in orbem circa ramos, folijs per interualla, Semen subdulce, Omphacocarpon a Plinio, Galeno, & Paulo Aegineta dicitur. Nisi quis Omphalocarpon ex Dioscoride legi malit, ab umbilici similitudine, quam semen præfert. Philanthropos uero dicta est hæc a nonnullis herba, quia uelut amici solent, cōmeantium lacinijs obhæreat. Aliud floris genus est, quod in Parthis nasci scribit Apollodorus, Philadelphum appellatum, ex argumento, qd rami eius ex interuallo sponte cōeant, cū amantes: post digrediantur, concipiant, atq; pariant. Huius tenuissimis uirgis reticulatim compositis, atq; ita confitis, hortorum septa impenetrabili compage fieri.

Pli. li. 27. ca. 5.

EX M. VERG COMM.

Cognitu & inuentu facilem, inter legumina & in frumentaria segete Aparinem sua descriptione Theophrastus & Diosc. fecerunt: ipsa etiam tenaci nexu prætereuntium uestibus hærens, & quale hic descripsit semen ostendens in medio umbilicatum, ad cognoscendâ se, suisq; cōtempationem nolentes etiam couertit. Persequuntur eam quotannis Maio & Iunio mensibus manu, mellioraq; falce agricolæ, pestem satis suis eam sentientes, nihilq; apricis & pinguibus agris frequentius nascitur. Copiosior tñ inter legumina q̃ inter frumenta inuenitur. Nouerunt calamitatem suam rustici. Nomen tñ, & maleficij eius causam ignorant. Et ut in similibus fit, quorum ignoratur nomen, Lappam uocant. Qua uoce non in Aparine tñ, sed in cunctis quorum matura semina uestibus prætereuntium inherent, ignari utuntur. Quæ sanè multa sunt; & inter alia Eupatorium etiam, de quo suo loco dicemus. Ex quo factum est, ut non ætate nostra tñ, sed antiquis etiâ temporibus parum certa in huiusmodi fuerit nominum ratio. Arcionq; Lappam tñ aliqui dixerint, alij Aparinem hanc, alij plures alias quarum semen aut q̃a asperu, amatu ue, aut cuspidatu est uestibus hæret: quasi ad faciendū genus & nomē una hæc nota satis esset.

B

¶ De Alyssō. CAP. CIIII.

Alyssōn, aliq Aspidion, alij Aplophyllō, alij Accysitō, alij Adeston nuncupât. Fruticosa hærbula est, unicaulis, rotundis folijs fructu duplicium scutorū effigie, in quo est semē quadatenus latū. In montibus & aspīs locis emicat. Eius decoctū singultus sine febris potu discutit. Idē efficit, si qs eā aut teneat, aut odoret. Cū melle trita, uitia cutis in facie, et lētigines emēdat. Cōrussa ī edulio, rabiei canis mederi putat. Domib. appēsa, salutaris esse credit. Et hominibus, atq; animalib. fascini, amuletum. Pupureo linteo circumligata pecorum morbos abigit.

ἀλυσσων

BARBARI COROLL.

Alyssōn, distat a Rubia, folijs tantum ramisq; minoribus, ita dictum, qd rabiem canum de-

Pli. li. 24. ca. 11

D I O S C O R I D I S

C fendat. Saniem conspecto eo sicari tradunt. Autor est Aetius, quosdam existimare hanc herbam nihil differre ab Sideriti Heraclea: quæ tertia est inter Siderites, a Dioscoride monstratas. Sed & Phorion grammaticus, folio eam subpurpureo describit: quod & Siderites habet tertia: ut Dioscorides est autor. Ego Alysson ab hac Sideriti plurimū differre nihil dubito. Alysson & poculi genus est, uerū scriptura separat, q̄ & per simplex, f, & per, u. scribitur: at p herba caprum per, y, & per duplex, ff. Sunt qui Cruciale herbam uulgo dictā, pro Alyssō demonstrant. Sed interest, q̄ Alysson quinis per interualla folijs ostēdimus, Cruciale quaternis, unde nomē, & minus hirsutis. Exilius & huic semē q̄ Alyssō est, minus etiamnū, anguloso caule. Flos Alyssō candidus, Cruciali uero luteus. Cæterum impudentius falluntur, qui Alysson p ea capiūt, quæ Liliago, siue Liliarca, et Martegonia rustice uocat, folio quadatenus et flore Lili purpureo.

E X M. V E R G. C O M M.

Fecit sibi ex re nomen Alysson, & ex pluribus quas habet in medendo uires, eam unde uocaretur elegit, quæ grauiori hominis malo succurreret. Et qm̄ rabidi canis morsus sentire non patitur, ideo Alysson passim dicta est. Celebrauit eā symposij sui tertio uolumine Plutarchus: numerauitq̄ inter eas quæ solo contactu, halituue, aut aspectu prodesse homini possunt: non tamē contra rabidi canis maleficiū, sed contra singultum. Verba eius sunt. τὴν δὲ ἄλυσσον καλοῦ-
μένην βοτανὴν, καὶ λαβόντες ὑπὸ τὴν χεῖρα μόνον, οἱ δὲ καὶ προσβλήσαντες ἀπαλλάττονται λυγμοῦ. κίηται δὲ
καὶ ποιμνίαις ἀγαθὴ καὶ ἀπιδόλαις παραφυτιομένη ταῖς μένδραις. Quæ uerbū de uerbo sic uerrat aliq̄s.
Quin etiam herbam quam Alysson uocant, alij in manus accipientes, alij conspicientes solum
a singultu liberantur. Ferrur eadem ouillo & caprino pecori salutaris esse, prope caulas et septa
eorum constita. Quod ab hoc ipso primum & ultimum inter uires & remedia eius numeratur.
Quemadmodum quod ad rabidi canis morsus pertinet, a Paulo Aegineta in quinto traditur,
quo loco Cataplasma contra rabiem canis quoddam instituit, iubetq̄ decocto eius uti, his uer-
bis. μετὰ ἀφιδόματος ἰαλισθομένου, ἢ τῆς σιδιρίτιδος τῆς ἱερουλίας ἢ καὶ ἄλυσσον καλοῦσι τινὲς. Quorum
dubitari cōtigit, sit ne hæc sui generis herba, an Sideritidi re ipsa eadē, nōmine uero tm̄ diuersa.
D Hic propriū genus habere Alysson, separata ab illa eius historia et medicina ostēdit. Plinius hoc
ipsum lib. 24. cap. u. confirmat, Rubiæ similem his uerbis describens. Distat Erithrodanum ab
eo quæ Alysson uocat, folijs tm̄ & ramis minoribus. Verūtm̄ huic nō cōuenit, q̄ folijs rotundo,
cōtra q̄ in Rubia est, Alysson describit: & præter folia singularē caule Alyssō tribuit. Fruticosa
aut Rubia est. Alyssō semē est in latitudine se explicās, Rubia rotundū habet. Et ne lōgiore sim
us, nihil qd certā similitudinē faciat nobis in Rubia inuenitur. Credimus ob eā causam, posterī
oribus his scriptoribus nō satis certas fuisse Alyssi huius historiā & notas: ex quo alij Sideritim
eā crediderūt: & alij Rubiæ, pterq̄ iu folijs & ramis similē fecerunt. Nos Diosco. descriptione,
& Plutarchi testimonio contenti, sui generis herbam antiquis fuisse dicemus.

De Asclepiade. C A P. C V.

ἄσκληπιος

Asclepiadem aliqui Cission, alij Cissophyllon nominant. Ra-
mos emittit longos, folia Hederæ, radices numerosas, tenues,
odoratas. Floris uirus graue. Semen Securidacæ. Nascitur in montibus.
Radices ex uino potæ torminibus auxiliantur, & contra serpentium
ictus. Folia aduersus uuluae mammarumque ulcera, quæ cacœthe uo-
cant, illinuntur.

E X M. V E R G. C O M M.

Habēt Cissos, & Cissophyllos, aliæ Asclepiadis appellationes, manifestam ex foliorū for-
ma, quemadmodum & nos diximus, causam. Omnes enim qualis et ea est Hederæ folio descri-
bunt. Cur aut Asclepias primum dicta sit, coniecisse etiam difficile non fuerit. Vt enim ab in-
uentoribus suis plures aliæ nomen inuenerunt, sic & ab Asclepio faciente homini medicinā an-
tiquo autore Asclepias nominata hæc est. Non parū hoc uno argumento laudanda, et in hono-
re habēda, cui pter ea quæ a Diosco. dicta hoc capite sunt, plures in historiā notas, & in medicī-
na uires græcorū herbarij alij tribuerunt, Nepetæ similem caule, & toto frutice esse dicētes: &
Hederæ quidē folia habere, uerū lōgiore & lanuginosa. Habere itidē, ut hic ait, florē graueolen-
tem, sed Rosæ figura, nasciq̄ nō simpliciter in mōtib, uerū in aquosis mōtib. In medicīna autē

tradiderunt posse radicem eius tantū deraſam, ut nihil aſperitatis habeat, in fiſtulas demiffam callos earum abſumere & implere: Nec folia tantū, uerumetiam flores maleficis māmaram, & muliebrum locorum uitijſ prodeſſe. Quinetiā eandem radicem ſiccata, moxq; in puluerem tuſam, & cum axungia coactam, malagmaris modo impoſitam, inflammationes diſcutere, & neruos mollire. Flores præterea, foliaq; ſiccata, mox trita, in ſumma cute uulneribus utiliter in ſpergi. Sordida purgare ulcera, & ad cicatricem perducere, genitaliumq; uitijſ egregie mederi. Quæ omnia ex antiquis græcis collecta, a nobis hiſtoriæ & medicinæ huius ſcriptoris liber ter addita ſunt, ne quid relinqueretur, quod legentibus prodeſſe aliqua ratione poſſet: Quam deinde nos Securidacam diximus, cuius ſemini ſimile Aſclepiadis ſemen hic ait, ea eſt quam Theophraſtus, pluresq; alij Pelecinum, a ſecuris forma dixerunt.

De Atractylide.

CAP. CVI.

Atractylis, quam aliqui Amyron uocant, alij Cnicon ſylueſtrem, alij Aſpidion, Magi Aphedron, Aegyptij Chenon, Romani Præſepium, aliqui Fuſum agreſtem, alij Colum ruſticam, ſpina eſt Cnico ſimilis, folia multo longiora ferens, in ſummis uirgis, magna parte nuda, aſperaq;. Quæ ſceminæ pro fuſis utuntur. Capitula in cacumine ſpinis horrent. Flos luteus. Quibuſdam in locis purpureus inuenitur. Radix tenuis, ſuperuacua. Coma, ſemen, & folia cum pipere & uino teruntur utiliſſime contra ſcorpionum icſus. Percuſſos tradunt, quamdiu ea teneatur hæriba, nullum experiri dolorem, ipſumq; depoſita ſtatim recrudere.

BARBARI COROLL.

Atractylis aculeata eſt, ſed & acanæa, hoc eſt, & conceptu & floris ſede, aut etiā ſemine, fruſtuq; ſpiñoſo: laborantibus Græcis uno uerbo, tres affectus & qualitates includere: idem erat, quod Acorna, ſiue Acarna, niſi candidior eſſet, & niſi decerpta, cuteq; adhibita ſanguineum ſuccum funderet. Quæ de cauſſa Theophraſto Phonos, & Androſemon quoq; uocatur ab Aetio, odore grauiſ, peſtemq; denunciāns. Sero matureſcente ſemine, nec ante autumnum. Quanquam hoc de omnibus ſpinofiſ dici poteſt. Acornæ ſpinā, pro folio, ut Theophraſtus inquit. Cneco Urbano ſimilis, colore tantum ruſſo; pingui ſucco, Atractylis Cnecum eſt ſylueſtre. De ſatiuo dicitur in mentione ſua. Sylueſtre iterum ſecatur, una mitior & ſatiuo ſimilior: caule rectiore, ac rigido exiliſ. Itaq; & pro colu antiquæ mulieres utebantur: ex eoq; hanc proprie Atractylida nominabant, ſemine candido, grandi, amaro. Altera hiſſutior, toroſiore caule, quaſi Sonchi, & qui pene humi ſerpat, ſemine minuto, amaro, frequent, pilloſo.

EX M. VERG. COMM.

Cogimur ex Theophraſto, pluribus locis de plantarum hiſtoria, certius eam nouiſſe: qui primum inter gênera agreſtis Cnici Atractylidem numerat. Dico autem Cnicum, quem hunc medicina Carthamum, & rura noſtra Crocum ſaracenum uocant. Suntq; poſt multa de Atractylide libro ſexto uerba eiſ hæc. *ἀτρακτύλις δὲ τις καλεῖται καὶ χινοκίτρα τούτων. ἴδιον δὲ ἔχει τὸ φύλλον, ὅτι ἀφαιρούμενον καὶ τῇ σαρκὶ προφειρόμενον αἰματώδην ποιεῖ τὸν χυλόν. διὸ καὶ φέρον ἔνισσι καλοῦσθαι ἀκανθὰν ταύτην. ἔχει δὲ πῶς ὁσμήν διηνκὴν καὶ φονάδην ἐφ' ἧ δὲ καὶ τῆλυι τὸ καρπὸν πρὸς τὸ μιστότερον.* Quod eſt. Vocatur & quædā Atractylis, candidior hiſ: cuius foliū priuatim id habet, ut auuſum, carniq; confricatū, ſanguineum reddat ſuccū. Eamq; ob cauſſam phonon. i. cædem aliqui ſpinā hanc uocant. Habet præterea grauē & ſanguinis in cæde odorē. Sero, nec niſi per autumnum fruſtū abſoluit. Idem libro. 9. de plantarū hiſtoriā a principio ſtatim, de liquore ſuccoq; plantarum & eiſ diuerſitate agens, ſanguineū ſuccum Atractylidi tribuit. Quæ cauſſa fuit, ut a quibuſdā Androſemos uocaretur: quoniā & illa ſanguineo ſucco eſt, ut certius in ea docebitur. Quemadmodū & Cnicos agreſtis: quod a Theophraſto dictum libro ſexto paulo ante reſtat ſumus. Cur autē præſepium (modo integra ea uox ſit) Romani eā uocarent, incertū nobis eſt. Cur autē Colum ruſticā, & agreſtem Fuſum, ex herbæ figura factū eſt: quæ glabro, nudoq; penitus caule ſurgens, & cum aruit in flexili duricie rigente, aliquando cubitali altitudine,

ἀτρακτύλις

Pli. li. 21. ca. 15.

B

D I O S C O R I D I S

C plerunq; autē minor, nec nisi in summo foliosa & aculeata, in maiore illa altitudine colum, in minore fusos rusticis foeminis ad lanificium dedit. Vidimus nos, licetq; omnibus per aetatem uidere, locis incultis & nemoribus nascentem spinis suis, in summo sic dispositis, ut impositos lanarum peniculos, sine uinculo, nexuue alio quopiam sustinere facillime possint. Numerauit eam Paulus Aegineta libro primo inter olera, carduisq; his uerbis coniunxit, τὰ δὲ ἀκανθώδη πάντα ὅν ἐκώλυμεν καὶ ἀτρακτυλὶ καὶ τὰ τριῶντα. Quod est. Aculeata uero omnia, quales Carduus, & Atractylis est. Credimusq; nos, Atractylidis nomine hoc satium Cnicum intellexisse; in cuius genere Theophrastus eam numerauit: & natura praesenti similitudine constituisse uidetur. Ob quam, ut paulo ante diximus, agrestem Cnicum hanc aliqui uocauerunt: & inter eos Theophrastus quo diximus loco.

πολύκνημον

P **De Polycnemo.** **CAP. CVII.**
Polycnemon quidam Clinopodion, alij Polygonaton, alij Iouis colum, alij Echeconymon uocant. Frutex est furculosus, folijs Origani, caule Pulegij, geniculis multis intercepto, sine umbella, tenui in cacumine corymbo, boni odoris & acris. Vulneribus adglutinandis recens, aut aridum cum aqua, efficaciter illinitur. Sed quinto die solui debet. Ad urinae stillicidia, ruptaq; cum uino bibitur. Edocuit experientia contritos in uino albo ramulos, ijs qui affectibus laborant, quae Violentiae uocantur, magno esse praesidio.

B A R B A R I C O R O L L.
Polycnemon, & Cunilae bubulae similis appingitur, odoratis corymbis, acris & dulci odore.

κλινοπόδιον

D

C **De Clinopodio.** **CAP. CVIII.**
Linopodion aliqui Cleonicon, alij Ocimoides, alij Zopyron uocant, fruticem folijs Serpyllō similem, furculosum, duum palmorum altitudine. Nasceitur in petrosis. Flores Marrubij, ex interuallis speciem lectipedum praebent. Bibitur herba & succi eius decoctum, ad conuulsa, rupta, strangurias, serpentium ictus. Menfes & partus pellit. Et peniles uerrucas, quas Acrochordonas uocant, eiecit aliquot diebus potum. Aluum sistit, decoctum ad tertias, potumq; si febrim sentiunt ex aqua. Alioquin ex uino.

Plin. li. 24. ca. 154

B A R B A R I C O R O L L.
Clinopodion, non desunt, quibus herba Orbiculata uulgo dicta, Serpyllō similis etiam si non serpit, aut eadem, aut propinqua esse uideatur: quoniam orbiculato florum habitu a Plinio tradatur. Dubitationem facit Dioscoridis adiectio, dicentis, ex interuallo Marrubij similitudine flores in ea cerni: quod quidem in ea, quae Orbiculata dicitur, non est: sed continua florum series subalbentium, acinis in summo ternis, quaternisue, radice fibris multiplici.

E X M. V E R G. C O M M.

Ex tricinij suis quondam in agrum exeuntes graecorum herbarij, pedumq; lectorum suorum imaginem animo seruantes, facile inter alias quaeritum oculos fallentem, Clinopodion herbam inueniebant. Quodq; illis quotidianum, fabrica spectaculum fecerat: diligentius & speciosius elaboratum, natura locis incultis ostendebat. Nunc mutata artium & fabricae ratione, si quis nouisse id cupiat, herbam inuenisse prius oportebit: tum ex floribus eius in antiquorum lectis, pedum quibus fulcirentur formam didicisse. Verumtamen, ut illud ratione carebat (natura enim artibus exempla in cunctis ex se proposuit, neq; ab artibus ad naturam reuertitur) sic nostra aetate difficillimum, in tam multa florum naturae uarietate, tam multisq; eorum formis, hoc uno argumento herbam deprehendere. Et si Plinius, 24. uolumine capite, non parum ad hanc rem contulerit, orbiculato florum ambitu eam describens, Cuius formae

adiectione satis descripisse rem uidetur. Omnes enim nouimus, quid orbiculato, quid florum, & quid ambitu significetur: plures scilicet simul surgere flores, circum per ambitum facere, & ex eo orbiculum describi: in quo relictis inter eos flores medijs spatijs, inane aliquid & uacuum relinquatur: quam Pedum in antiquis lectis fuisse formā, facile conijcere est. Siquidem his exemplis pictores, statuarij, architecti sua opera adhuc exornant. Nihilque non una hac ratione inuentum ab illis, & tractatum semper est.

De Leontopedalo.

CAP. CIX.

Leontopedalon aliquibus Leontopodion, alijs Leuceoron, alijs Leontion, alijs Doris, aut Dorideris, alijs Lychnis agria, alijs Par dale, alijs Horybethron, alijs Rhapeion, Romanis Patabelclon, aut Semen leoninū dicitur. Caulem emittit dodrātalem, aut altiore, plurimis alis concavū, & in cacumine semina duo aut tria, in filiquis ciceris modo. Flores Fremio similes, punicei coloris. Folia Brassicæ, sed Papaueris diuisura. Radicibus nigris Rapæ similibus, torosis. Nascitur in aruis & segetibus. Radix auxiliatur serpentium ictibus ex uino pota. Nec alia res celerius dolorem finit. Miscetur ischiadicorum clysteribus.

λεοντοπέδαλον

Leontopetalon radice grandi. Vocatur & Dorypetron a Plinio.

B A R B A R I C O R O L L.

E X M. V E R G. C O M M.

Descripsit Leontopetalon libro. 27. capite. 11. Plinius hsdem uerbis, Rapæion alijs uocari dicens, folio Brassicæ, caule semipedali, alis multis, semine in cacumine in filiquis Ciceris modo. Radice Rapæ simili, grandi & nigra. Nasci eam in aruis, & omnium generum serpentibus in uino potam radicem aduersari, nec quicquam celerius proficere. Quæ omnia ab hoc ipso scriptore multo antea dicta fuerant. Nomen a ferocissimo & generosissimo omnium animali in antiquis Grecis inuenit. Quid autem illi cum leone conueniat, non satis certum nobis est. Si nominis origo expendatur, nihil Leontopetalon erit quam leonis folium. Sed quæ leonis partem, uerbi causa pedem, aurem, linguam, aliamue huiusmodi folium referat, non satis pro comperto nobis est: præsertim uariantibus alijs appellationibus Leontio, scilicet Leontopodio, & Leonino semine. Quæ omnes a Leone causam nominis, sed non eodem modo habent. Siquidem Leontion leunculus est, Leontopodion leonis pedem significat: & leoninum semen causam nominis in semine, non in folio esse ostendit. Cur autem agrestis lychnis diceretur floris figura in causa, est: quæ Anemonem & syluestre papauer dici etiam Leontopetalon fecit. Omnes enim hi flores magnitudine, colore, totaque figura similes, aut non dissimiles saltem inter se sunt.

Pli. li. 16. ca. 9.

De Teucrio.

CAP. CX.

Teucrion, siue ut alijs placet, Teucris, hæba est uirgæ refrens effigiem, Trifaginis similitudine, tenui folio, non multum a Cicere alieno. Hæc in Cilicia iuxta Gentiadem Scissademque uberrimum prouenit. Recens cum posca, aut aridæ feruefactæ ius, potu lienem potenter absumit. Lienosis cum aceto & ficis illinitur. Item serpentium morsibus ex aceto solo, siue ficis.

τευκρίον

Teucrion hoc (ut puto) & ramis Hysopi describitur a Plinio: surculosa, folio fabæ. Colligi florentem adhuc iubent, adeo florere non dubitant, maximeque ex Cilicijs & Pisidijs montibus commendant. Dicitur eadem Teucris. Quidam & aliam Teucrion uocarunt, de qua in Hemionitide scribendum nobis est.

Pli. li. 25. ca. 6. lib. 26. cap. 6.

E X M. V E R G. C O M M.

Miscetur, confunduntque aliqui Teucrium hanc cum Aspleno, & Hemionitide. Non ob aliā, ut credimus eam, quam quæ eadem potestate sunt, Oēs enim lienem medentur: sed nullas habent cōes alias notas, ut ex earum historia cognoscere oibus facile est. Diuersa sunt nomina, discrepant partes, seorsumque ueteres Greci de singulis tradiderunt. Plinius, quod paulo ante diximus, uirgas Teucrii luncos uo-

D I O S C O R I D I S

Cauit, lentore & tenace flexura uirgarum in Teucrio contemplatus: & ex pluribus luncorū notis eā elegit, q̄ multis alijs in plantarū historia cōgrueret; nec priuatim, pprieq; iunctū genus faceret. Quod em̄ luncū indicat, nomēq; & genus illi facit. Nudus glaberq; furculus est. Cetera em̄ cōmunia illi cū plerisq; alijs sunt, sed hoc primū illi mox per eū alijs natura dedit. Dico aut̄ foliorū totis caulibus, & uirgis eius priuationē, quæ in Teucrio sunt in uirgis eius pendētia, natiuo lentore uiliū modo flexilibus. Ob quā naturam & formā, non defuerūt qui Teucriū hanc agresti Sedo & Portulacæ similē dicerent, & eorū nominibus etiā indicaret. Volumus & illud legentibus significare, q̄ ab hoc remedium lienosis instituitur, cum ficis ex aceto illini Teucrion. &c. credere nos non simpliciter ficos, sed caricas intelligendas esse.

De Trifagine.

C A P. CXI.

χαμαῖδρως
χαμαῖδρως

Chamædrys Græcis, alijs Chamædrops, Latinis Trifago dicitur. Sunt qui eam Teucrion appellauere, propter eam quā cum Teucrio seruat similitudinem. Nascitur in petrosis & asperis. Frutex draconitæ, folia habens exigua, amara, effigie & diuisura quercus. Flore pene purpureo. Carpitur semine prægnans. Recens in aqua decocta, potu tussibus, indurato lienī, urinæ difficultati, incipientibus hydropicis auxiliatur. Cit̄ menses. Partus extrahit. Lienem ex aceto pota cōsumit. Aduersus serpentū uenena ex uino, potu, illituq; efficacissima. Trita digeritur in pastillos ad supradicta. Purgat uetera ulcera cum melle. Cum oleo illita, caliginem oculorū discutit. Natura eius est calfacere.

B A R B A R I C O R O L L.

lib. 24, cap. 15.

Chamædrys, quæ & Serrata dicitur, q̄ ab ea ferram inuentam purent, folia habet magnitudine Menthæ. Fit & uinum ex ea medicis.

E X M. V E R G. C O M M.

Dioascorides breuitatis Quercus quædā Trixago est: & inde illi in græcis nomē. Neq; em̄ Chamædrys aliud, q̄ humilē & terrestrem Quercū significat. Ab eadem breuitate aliud Chamæropis nomē illi ab aliquibus factū est. Sic em̄ ex ueterū græcorū & latinorū fide legendū esse existimus. Etsi hic Chamædropa uocari tradat, Plinij em̄ codices oēs ante Barbari castigationē Chamæropem, non Chamædropē uocari Trixaginē dicebāt. Eam uocē scriptoris huius lectiōe ille emēdauit. Is etiā quē nos habemus longobardis literis scriptū latinū ueterē Dioscoridē, Chamæropa, non Chamædropa Trixaginē dici testat. Nec nos rationē, aut cām habemus, cur hoc magis, q̄ illud dici oporteat. Et si excogitāda aliqua sit, nulla uero similior erit, q̄ quoniam humi ferpat sic dicta quondā fuerit. Et si id recipiat, tunc Chamærops dicenda potius erit. Nos in ambiguo plures ueluti testes secuti, Chamæropē potius diximus. Cur aut̄ Teucrion hæc etiā diceret, cām hic ipse ostendit: ideoq; a nobis relinquēda est: qui multo labore quæsitā Romanæ appellationis originē nondū inuenimus. Nihil em̄ Plinius aliud inquit, q̄ Trixaginē latine dici Chamædyn herbā. Descripsit tū eam, & q̄ hic folia parua dixit, ille Menthæ magnitudine: & quæ hic figura & incisuris quernis similibus, ille colore & diuisura Quercus. Adiecit p̄terea Serratā ab alijs hæc herbā dici: & ab ea, i. ab incisuris illis, q̄s per ambitū habet, eodē quo nūc modo in ferra uidentē dentes, inuentā fuisse Serrā. Theophrastus cum lib. 9. de plantarū historia eius meminisset, de notis partibusq; eius breuiter egit. Sed quas habet in medicina uires multas, numerauit alias ab hoc scriptore: ideoq; repetēdas hoc loco a nobis: quæ huiuscemodi sunt. Trixaginis aut̄ folia ruptis, uulneribusq; p̄sunt: in quē usum ex oleo trita imponunt. Profsūt & depaſcentibus ulceribus. Purgat semē bilem, cōfert idē oculis, oportetq; tritum foliū ex oleo illis ad mouere. Habet Trixago quernis similia folia, totūq; eius incrementū dodrantalē est: q̄d a nobis in Dioscor. expansæ manus mensura significatū est. Adiecit p̄terea Theophrastus odoratā, suauēq; Trixaginē hanc esse, faciliē inuētū, & ubiq; ex his notis cognoscendā herbam.

De Leucadē.

C A P. CXII.

λευκάδα

Lucas montana, latioribus q̄ urbana folijs, semine acriore, amariorē, ori ingrato, Efficacior tamen q̄ satiuā habetur. Vtraq; ex ui

no contra animalium uenena, præcipue marinorum, opitulatur.

BARBARI COROLL.

Lucas, eadem fortasse fuerit cum Leuce, ut Plinij uerba usurpem. Verum Leucadis inquit speciem, auctores non tradunt. De Leuce uero Mercuriali herbe similem dicunt, nomenque ex causa accepisse, per medium folium candida transcurrente linea, quare Mesoleucon quidam uocant. Leuce dicitur & ipsa radix, Armoracia: Itemque Androsaces. Est & arboris nomen Leuce, hoc est, albæ Populi.

A

Pli. li. 19. ca. 5.
lib. 27. cap. 11.

EX M. VERG. COMM.

Specta omnia. Siquidem Plinius nihil certum de Leucade hac tradidit: nec dubitasse tantum, sed sub hac appellatione ignorasse eam uidetur. Hic ipse etiam parum certe historiam ex his, quæ modo leguntur eius tradit. Fuisseque quondam certioris eius descriptionem, indicio est latinus Dioscorides, & eius præcipue qui apud nos uetustissimus codex est. In quo a necessaria diuisione caput hoc, & his uerbis incipit. Leuce duo sunt genera. Vna est montana, & altera hortiuæ. Mox sequitur quod nunc in Dioscoride legitur, Montana latiore, quæ satiuæ folio est. Videturque hic ordo necessitatem habere, ut facta prius diuisione, Alterius generis historia, & uires tractentur. Sunt præterea in medio capite, quæ manifeste in impressio Dioscoride, & alijs græcis desint: quæ poterunt uolentes facile inuenire. Nobis paulo minus quæ pro comperto est, nullibi in columine esse hoc caput: & quod restitui in integrum non potest, quasi desperatum ulcus relinquitur.

De Lychnide.

CAP. CXIII.

Lychnis coronaria, quam aliqui Athanaton uocant, alij Acyloni-
on, alij Ballarion, alij Geranopodion, quidam Corymbion, alij
qui Taurion, alij Sceptum, aut Maloion, Aegyptij Semeon, Magi San-
guinem Apocathemenes, Romani Genicularem, aut Balariam, Flore
est albæ Violæ simili, quo corollæ faciuntur. Contra scorpionum ictus
semen in uino potum auxiliatur.

Noxiæ

B

BARBARI COROLL.

Lychnis æstate florere. Lucernulam Theodorus conuertit. Plinius quodam loco Flammeam cognominat, alibi Rosam Græcam. Non nisi in humidis locis prouenit, nunquam excedens quinque folia, Violæ magnitudine, odore nullo. Et hæc ab altera Græcula uocata differt, de qua diximus inter Rosas. Differt & a Lychnitide: de qua in Phlomidibus. Amerias Rhizotomus Lychnin e Veneris labro natam putauit, cum a Vulcano compressa lauit se: præstantissimamque haberi in insulis Cipro, Lemno, Strongyle, Herice, Cytheris. Lychnin hanc & Taurion dict scribunt. Alia tamen est quæ Taura uulgo nominatur, siue Tora, flore ceruleo, folio rotundo. radice Polypodij hirsuta, & uermis nigri effigie. Venenosa herba: cui per antipathiam naturæ alia occurrit herba Antitaura, & Antitora cognomine, folio rotundo.

EX M. VERG. COMM.

Quo argumento nautis in mari sæpe uisum piscem Lucernam ueteres Romani appellaue-
runt, ignea per os exerta lingua, tranquillis noctibus relucens: eodem in humidis na-
scentem magnitudine Violæ, sed figura Rosæ, florem Lychnida, ut fertur, ueteres Græci dixerunt.
Noctibus enim hic etiam fulgere creditur, & ut nomen ex re illi factum indicat, ignis fulgore quodam
uidentium oculis in se conuertere. Non aliter quæ & Felium oculi flamarum modo in tenebris ful-
gent, & putres in humidis caudices eodem tempore ignium speciem quandam uidentibus afferunt.
Quorum & si diuersa materia sit, communis tamen omnibus causa humoris copia est. Nisi forte in
Felibus, quod ab Aegyptijs obseruatum fuerat, non in humore, sed in lunæ luminibus lucis eius
causa sit: ad quorum quotidiana incrementa augeantur, dilatenturque in eius animalis oculo pu-
pula: & cum toto orbe mortalibus fulget id sidus, tunc etiam copioso lucis fulgore intra domus
sticos parietes animalis eius nobis oculus splendeat. Quemadmodum secundo uolumine in Mu-
stela longius testati sumus. Verum tamen alterius questionis est, & huius, & eorum quæ paulo
ante dicta a nobis sunt causas & rationes inuenisse. Nunc quod herbarium & scriptoris huius

C interpretem deceat, floris omnē naturam dixisse satis sit. Nascitur locis humentibus hic flos, a Theophrasto ad extremū sexti de plantarū historia uoluminis primus inter aestiuos flores numeratus. Habet enim hac naturae pars sua discrimina. Nec difficile est in ea, eiusque scriptoribus uernos, aestiuos, autumnales & hyemales obseruasse flores: & in aestiuis Lychnidem hanc, quā Plinius flāmeam aliquando ex eo quod diximus argumēto, aliquādo a gente grācam Rosam nominauit, colore purpureo, quinque folijs tantū: & si in satiuā obseruauerint quidam senis flosere aliquādo folijs, agrestem quinis semper. Magnitudo illi est Viola, quā hic nō multo post matronale uocat: eam scilicet quae prima uer nunciat, omnesque alios praue nit flores, & quod propriū eius est, multa uno pediculo pendet. Figura Rosae est, folijs Rosarū modo dispositis & pendentibus. Nullū habet odorē: quod demirēt aliquis: ex quo coronarius flos est, & coronarij nominis honore ab agresti distinguit: deficientemque eo, uerisimile est solam floris spēm in coronis amara fuisse. Ob quā causā in magno nominū & appellationū ambitu in gentibus fuit: alijs Athanarū, i. immortalē appellantibus, quod longissime a prima aetate ad extremū autumnū floret: alijs Bellaryon, quae uox licet incertā modo habeat in grācis significationē, antiquam tamen fuisse in lexico suo Ischius indicat: Ballarin trifoliam herbam esse dicens, nec ultra quicquam de ea testatus est. Plinius lib. 21. capite. 26. radicem Lychnidis non coronariae & satiuae, sed agrēstis Asianos Bolitē appellasse tradidit. Potueruntque hęc simul misceri, & in duabus uocibus quae principij similitudinē aliquā haberēt, in diuersam penitus librariorū incuria sine euasisse. Verū ut saepe alias testati sumus, nō multifaciēda hęc sunt: eaque ob eā cetera a nobis relinquunt.

ἄνθη ἁγρία

De syluestri Lychnide. CAP. CXIII.
Lychnis syluestris, Tragonoton, alias Atocion, alias Hieracopodion, aut Lampas uocatur. Aegyptijs Semura, Magis Apocathemenes Taurus, Romanis Agreste Intubum. Omnia urbanae similis. Bilem per aluum detrahit, semine duabus drachmis potio. Ictis a Scorpione subuenit. Aiunt huius haerbae appositum, scorpiones torpescere & inertes prorsus reddi.

BARBARI COROLL.
Lychnidis syluestris radicē Asiani Boblitem uocāt. Hanc a nostris Accipitrinū pedem appellari scribit Dioscorides, quod Accipitrinus pes apud nostrū uulgus est, quae Corneola quoque dicitur, folio Salicis fere pusillo, flore subluteo, cum filiquis Ciceri similibus, & in his semen in ficere capillos dicitur, colore rubro. Qualis autē sit Pes milui, siue Pes miluinus, dicta Colu-mellae inter herbas, quae in usum colligi & reponi oportet, ipse non explicauit.

EX M. VERG. COMM.
Communes satiuae, Coronariaeque Lychnidis agrestis & rusticae appellationes similitudo fecit. Et quā hic agrestem Hieracopodion, id est, accipitrinū pedem uocari ait, illic satiuā Gruinū noīari dixerat, nulla, aut exigua diuersitate. Credimusque nos, foliorū herbae, non floris notam hanc esse. Quemadmodū certa floris est, quā hic Lampada dixit, manifesta significatione a luce, fulgoreque illo, de quo in Satiuā dictū longius est. Foliorū itidem, nō floris notā habent agreste Intybiū, & Seris. Ceterae a peritoribus docendae relinquuntur. Agrestis Lychnidis tantū in medicina usus est. Nec refert, quod hic satiuū semen scorpionibus aduersari dixerit. Id enim primū & efficacissime agrestis potest. Nec Plinius aliter decreuisse creditur, & ante eum Nicander in Theriacis suis. ὁ ἀνὰ τοὺς ἄνθη ἁγρία, &c. Quo loco interpretis eius de agresti hac intelligi tantum iubet, unamque hanc ὁ ἀνὰ τοὺς ἄνθη ἁγρία, &c. Quo loco interpretis eius de agresti hac intelligi tantum

ἄνθη

De Lilio. CAP. CXV.
Graeci Crinon Basilicon uocant, alij Crinanthemon, alij Calirion, Magi Martis sanguinem. Osthanes auram Crocodili, Aegyptij Simpharphon, quidam Tialon, Latini Lilium, aliqui Rosam Iconis, Syri Safa, Aphri Abiblabon. Lilia coronamentis se dedunt, Lyria a quibusdam uocata. E quibus unguentum temperatur, quod aliqui Lirinum, alij Susinum appellant. Neros, & priuatim uuluae

duricias emolliens. Folia hærbæ illita, contra serpentium ictus auxiliantur. Feruefacta, ambustis proficiunt. Aceto condita, uulneribus optulantur. Succus adiecto melle, aut aceto, in arceo uase coquitur, conuenienti medicamento uetustati ulcerum, & ad recentia uulnera. Inassata radix, & ex rosaceo trita igni, ambusta sanat. Vuluam emollit. Menses ei. Vlcera cicatrice obducit. Cum melle detrita, neruis præcis, luxatissq; medetur. Vitiligines, fursures, & lepras emendat. Vlceraq; in capite manantia expurgat. Abstergit faciem, & erugat. Teritur in aceto, cum Hyoscyami folijs, et farina tritici, mulcendis testium inflammationibus. Semen potum, moribus serpentium aduersatur. Ignibus sacris semen, & folia cum uino illinuntur. Tradunt & rubra esse Lilia. In Syria autem & Pisidia Pamphiliæ, efficacissima unguentis nascuntur.

B A R B A R I C O R O L L.

Lilium Græci Crinon, sed fruticem eius Crinoniam, quasi Liliarium, ut uiolarium, & rosarium appellant. nam Lilieta, rosæra, uioletaq; aliud sunt, ut constat. Lilium e Iunonis lacte natum, Græci perhibent, resperfa terra, dum Hercule dormienti uberibus admoto, mox post sumtum digresso, late fluxit. Ob id Lilium a nostris Iunonia rosâ dictum uideri potest. Philinus a quibusdam Ion uocari quod sit Lilium existimat. Ambrosiam Corinthi Nicander, & Aphrodites Charma, hoc est, quasi Veneris uolupiam cognominari a quibusdam cecinit. In Cossula, ex Alexandri statua enatam in capite Ambrosiâ, Carystius, quæ nihil aliud sit q̃ Liliū, memorie proditum reliquit. Nascitur e lachryma sua Liliū, inarescente cum defluxit, uelut Olufatrum. Liliū quadruplex genus in Theophrasto. Primi, flos Vere cum Viola sepe alba, paulo postea erumpit. Hoc ab eo proprie Crinon, hoc est, Lilium uocatur. Alterū genus Liriū appellat, uere quidem omnino florens, uerū serius cum Narcisso. Forteq; hoc sit quod a Plinio Liliū trans maria nuncupatum est. Tertium æstate floret, & Cerinthum priuatim uocari puto, q̃q; et alias res Cerinthus significat: ut inferius liquebit. Quartū genus, qd itē Liriū Græci nominat, Autumno floret; enicacq; primis hymbribus. Est & rubens Lilium, differēs (ut arbitror) a purpureo, uisum a nobis Patuuij in Felicis orto. Probatissimum in Antiochia, & Laodicea Syriæ; mox Phaselide: quartum locum obtinente: qd in Italia nascitur. Hoc genus pprie Crinon a Græcis uocari, & florem eius Cynorhodon, autor est Plinius. Hoc & Hippocrates accepit, cum rubentia Cynorhoda feminarum purgationibus cōmendat in uino. Lilia purpurea & arte sunt, maceratis in fece uini scapis antequam serantur mense Martio, & in scrobe circumfusa eadem fece: in quem usum scapos arecentes colligunt Iulio mense, Lilia in fumo suspendētes. Cauce gemino Purpurea uisuntur aliquando, carnosiore tantum radice, maiorisq; bulbi, calix herbaceus. Post arcturum & æquinoctium autumni florent Purpurea: quorum genus unum uocant Narcissum: cui uidelicet in radice sunt folia. Calices, ut diximus herbacei, cetera eadem quæ candidis. Albo nihil est fecundius, una radice quinquagenos sæpe nutriente bulbos. Lilium Rosæ nobilitate proximum. Ideoq; Iunonis rosâ dicitur. Nulli florū proceritas maior, in terim cubitorum trium: languido semper collo, & oneri suo impar: candor eximius; folijs eius foris striatis, & ab angustijs in latitudinem paulatim se laxantibus, calathi effigie, resupinis per ambitum labris, tenuiq; filo & semine stantibus in medio croceis. Ita odor, colorq; duplexq;: alius calicis, alius staminis. Differentia angusta. Raro duplex caulis in Lilio. Singulis caulibus Lilia modo singula, modo plura sustinentur: quod & rarius est. Pandit se, uel detractum parietis, etiam si tristius & exilius. Lilio simile in Aegypti palustribus gignitur, sed folijs copiosis, colore admodū uiridibus dispositis, et quasi uno uersu cōditis, ad mulierū profluvia, & fracturas medicis quæsitū. Crinthus, de qua scribere distulimus, & Rhitacē, siue ut Aristoteles, Crithacē significat: quæ & Sādaraca appellat, & a Dioscoride Cerāthemōs, libro quinto, ex arborū succo, gummi mō genita & uerno rorē. Vnde Vernigini quoq; uulgo nomen. De hac & in Propole nō nihil diximus, africi flatu minor, austri, nigrior, aquilonibus melior, et rubēs. Plurimū in Græcis nucibus, apū cibo aptissima dū operatur: q̃ sepe inuenitur in fauorum inanitatibus sepositus, amari saporis, & humore plenus, Menecrates, sed nemo præter eum, ut inq̃ Plinius, autor

Pli. li. 21, ca. 5.
The. li. 6, ca. 6

B *Pomponius Sabinius.*

K

C est, Erithacem, aut Cerinthum florem esse futuræ mellationis indicium. Est & Cerinthe quæ uocatur herba propter apes ferenda, folio candido, incuruo, cubitalis, capite concauo, mellis succum habente: cuius gramen Virgilius esse dixit ignobile. Quæ nominum uicinitas, fortasse Menecratem fecellit. Nam & Aristoteles Cerinthi florem ad hunc usum citat in libro de animalibus: quanquæ in eo non Cerinthus, sed mendose scribitur, calythrus.

E X M. V E R G. C O M M.

Exigebat floris maestas, ut longius de eo ageremus: sed tã certã in Plinio, Theophrastoq; et in his q̃ eos scriptores cõmentationibus suis miscuerunt, historia est, ut nihil dicendũ nobis relictũ fuerit. Nõ tacebimus tũ qđ hic ait Liriu a quibusdã Lilium dici a Theophrasto uolumine. 6. de plantarum historia, non magis Lilio q̃ Narcisso tribui. Verba eius sunt, ὁ δὲ νερίκιστος ἢ τὸ λυρίον, οἱ μὲν γὰρ τοῦ τοιοῦτο καλοῦσιν. Quod est, Narcissus uero, aut Lirium. Hi enim sic, illi eò nomine uocant. Verum certius suo loco Narcissi tractabitur historia.

B De Ballote, seu Marrubio nigro. **C A P. CXVI.**
 Alloten, nomine alio nigrum Marrubium, aut magnum uocant, aliqui Nophthan, alij Notianoscemin, alij Nosprasson, alij Nothera, alij Nochelin, aut Nostelim, alij Nophrim, alij Gnoturim, Romani Uicerariam, aut Marrubium nigrum, alij Canthurinum, Aegyptij Asphon, Magi Isonis sanguinem. Caules edit quadrangulos, nigros, subhirsutos, complures ex una radice. Folijs maioribus q̃ Marrubij, hispidis, intercedente spacio, subrotundis, graue olentibus, Apiaastro proximis. Vnde aliqui Apiastrum eam uocauerunt. Caulibus albis, orbiculato florum ambitu, qui Rotæ speciem præbeat. Vis eius effica aduersus canis morsus, folijs ex sale illitis. Feruenti cinere flaccescunt folia, ut cõdylomata reprimãt. Purgãt & sordida ulcera cũ melle.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 27. ca. 9.
lib. 24. cap. 15.

Ballote, fruticosa est herba. Nec uideo qui possim tueri Pliniũ, qui ait, Græci Porrum nigrũ uocant. Et infra, Ballote inquit folijs est Porri maioribus, nigrioribusq;. At Græci non Porrum nigrum, sed Marrubium nigrum Ballotem, sine ulla controuersia cognominant. Nec folia ei sunt porracea, sed Marrubij & Citraginis. Deceptum affinitate nominum constat Prasion, melan, pro prasion legentem. Est autem Prasion Porrum, Prasion Marrubium. Idem error a Plinio committitur in herba Stachye.

E X M. V E R G. C O M M.

Deprehenderunt iam pridem & alij turpem Plinij in Ballote lapsum lib. 27. cap. 9. Porrum nigrum eam appellantis. Diuq; iactatus contra eum scriptorem hic error est: q̃ nulla ratione excusari in homine potest, tam apertam culpam, & ex culpa facilem criminationem habet. Id nos relinquimus, quod semel in iudicium delatum fuerit, ad nouam reuocare censuram asperius existimantes. Nec aliud bonarum artium, præsertimq; græcarum literarum cupidos monemus, q̃ nullam fore unquẽ satis in earum professione illis diligentiam, ex quo in unius tantũ literæ mutatione, adiectione, detractiõneue tantum uersatur periculum: ut pro Marrubio, Porrum aliquis alios doceat. Nota omnibus modo etiam Ballote est, a foliorum similitudine Marrubium, a coloris diuersitate Nigrum dicta. Siquidem candidus Marrubio, Ballote uero niger. caulis est, reliqua omnia similia & æqualia habentibus: ut ex utriusq; historia cognouisse facile est. Hanc Marrubium, alterum Marrubium, id est, secundum aliqui manifesta indicatione dixerunt: quoniam illud prius, hoc posterius sit: non naturæ ordine, sed hominum honore & appellatione. Habet & ulceraria appellatio alia certam ex usu & uiribus causam: quemadmodum & Marrubium Cantherinum a Romanis dici potuit, q̃ eo pascerentur cantherij.

C A P. CXVII.

πλίστος φουλλαν

M De Apiaastro. **C A P. CXVII.**
 Elisophyllon Græci, alij Melithæum, alij Melithænam, alij Meliphyllon, alij Erythran, Latini Apiastrũ, aut Citraginem, Galli Merisimorion uocant. Id sibi nomen usurpauit, quoniã apes ipsa

hærbæ delectantur. Cauliculi & folia Ballotæ, de qua paulo ante dixi- **A**
mus, similia essent, nisi minora, tenuioraq; nec ita hirsuta spectarentur.
Citream malum olent. Folia cum uino pota, aut illita, profunt contra
ictus phalangiorum, scorpionumq;. Item aduersus canis morsum. De
cocto eorundem gratia, foueri prodest. Defectionibus sceminarum ad
ciundos menses conuenit. Dentes eodem in dolore colluuntur. Dysen-
tericis infunditur. Fungorum strangulationibus folia, addito nitro, po-
tu auxiliant. Torminibus, & orthopnoicis delinctu. Illita cum sale stru-
mas discutunt. Vlcerâ purgant. Articulares dolores illita sedant.

BARBARI COROLL.

Melissophyllon, siue Melinon, Apiastrum ab Igin o uocari cepit, eruditissimo alioquin ui-
ro, sed quæ omnes hac in parte damnant. Et quod magis mirere, sequantur tamē. Nam & Dio-
scorides, & Varro ita eam uocant. In coronamenta folio & hæc uenit. Adeo autem nullo ma-
gis flore apes gaudent, ut si perungantur alucaria eo, non fugiant, & in copia eius examina fa-
cillime contineantur. Citraginem a nostris uocari & hanc Dioscorides affirmat, ab odoris si-
militudine. Palladius uero q̄ recte, nescio, Melissophyllon aliud a Citragine, siue quod idem
est, Citreagine uidetur intellexisse, in mentione apum.

Pli. li. ii. ca. 10
lib. 10. cap. 11.

EX M. VERG. COMM.

Omnes Apiastri in græcis appellationes, exceptis barbaris, latinisq;, a melle & ab apibus
sunt. Satisq; indicadis his, ne tot alios numeremus, Nicæder in græcis, Maro in latinis est. Quo-
rum alter fame pressis, aut morbo laborantibus apibus apponi iussit trita Melissophylla. &c.
Alter in theriacis suis longius descripta re cecinit. τὴν ἡτοι μείφωλλον ἰπικλίουσι βοτῆραι διὰ μίλι-
ταιναν, τὴν γὰρ περὶ φύλλα μέλισσαι. ὅδ' αὖ θελήσμεναι μίλιτος ροῖς ἡδὸν ἔνται. Quin etiâ Plinius. 11. uolu-
mine & capite uicelimo Melitenā uocari Apiastrū dixit. Omnibus, ut testati paulo ante sum-
us, mellis, aut apium ratio & significatio coniuncta est.

B

De Marrubio. CAP. CXVIII.

PRASSIONE Græcis aliqui uocant, alij Eupatorium, alij **πρᾶσιον**
Phyllophæres, alij Tripedilon, alij Camelopodion, Aegyptij
Asteropen, Magi Tauri sanguinem, aliqui Aphedron, Latini Mar-
rubium, aliqui Labeoniam, Aphri Atierberziam. Frutex est ab radice
ramosus, candicans, subhirsutus, quadrangularibus ramis. Folium pol-
licem æquat, subrotundum, hispidum, rugosum, gustu amaro. Se-
men in caulibus, & ex interuallis flores uerticillato ambitu asperi. Na-
scitur propter ædificia, & ruderata loca. Huius folia sicca, cum semine
decocta in aqua, aut uiridium succus, datur cum melle suspensio, tus-
sientibus, & ad tabitudinem redactis. Crassam e pectore pituitam, cum
sicca Iri eijcit. Mulieribus a partu non purgatis datur, ut menstrua &
secundas extrahat. Item in difficili partu, & his qui uenena hauserunt,
aut a serpentibus demorsi sunt. Vesicam, renescq; lædit. Folia cum mel-
le illinuntur sordidis ulceribus purgandis. Pterygia, nomasq; sistunt.
Lacertum dolores mitigant. Succus folijs contulis expressus, & sole cōa-
ctus, ad eadem pollet. Cum uino & melle illitus, oculorum claritatem
adiuuat. Naribus regium morbum expurgat. Aurium doloribus con-
uenienter instillatur, per se, aut cum rosaceo.

K ij

D I O S C O R I D I S

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 20. ca. 22

Marrubium duplex, folio herbaceo, & incisuris altioribus serrato, unguentarijs, ut Theophrastus ait, quaesito ad quaedam. Hoc & candidum appellauerim. Alterum folio rotundiore, uehementer squalido, ut Saluia, & obscurius serrato: quod quidē ego, aut Balloten ipsam, de qua diximus, aut ei ualde similem interpreter. nam & medicinae congruunt in Plinio.

E X M. V E R G. C O M M.

Fecit Theophrastus libro sexto de plantarum historia Marrubij duo genera. Alterum quod magis herbaceum, magisque incisuris diuisum folium haberet: quo qui pharmaca & morborum remedia tractant, in aliquibus uterentur. Alterū quod rotundiore & squalidiorē folio esset: quale in altero Saluiae genere, quod Sphacelum nominant, uidet & in eo tenuioribus incisuris. Videturq; diuiso haec in hoc tantum Marrubij genere facta ab eo fuisse. Quam uero Plinius, autore Castore, in nigrum & candidum tradidit Ballotem, paulo ante descriptam, & hoc manifeste complectitur. Nisi forte quod hic colore tantum discreuit, Theophrastus incisuris foliorum indicauit, & praeter incisuras herbaceo colore & squalore: ut ex his niger color, & candidus intelligeretur. Siquidem nigredo in plantarum folijs, plenior & obscurior uiredo intelligenda est: & in squalore cinereus et albicans color in plantis plerumq; uidet. In quam partem inclinat animus nobis: nec aliud, sed aliter a Theophrasto & Plinio dictū fuisse de utroq; Marrubio existimamus. Fuit hoc olus in multo nominum honore apud ueteres, quemadmodum multis in medicina etiam usus, praesertimq; in laxandis liene & iecore, curandisq; tot alijs morbis & uitijs, quae hoc capite a Dioscoride numerantur.

De Stachye. CAP. I. CXIX.

56xv

Stachys frutex est, Marrubio similis, sed longior. Folia ferens numerosa, hirsuta, rara, praedura, cana, odoris iucundi, & complures uirgas ab radice exeuntes, Marrubio candidiores. Nascitur in montibus & asperis. Vim habet excalfactoriam & acrem. Foliorum decoctum potu pellit menstrua & secundas.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 24. ca. 17

Stachys, folijs colore in luteum inclinante, nec Porri, ut Plinio placet, sed ut Dioscoridi, qd & nos uidimus, Marrubij similibus: quod & in Ballote idem autor peccauit. Vidimus eam Romanae, ubi & Nauiculam, & alij Coronatam herbam uocant.

E X M. V E R G. C O M M.

Inominis in Stachy hac ratio expendat, spicatus credetur frutex: quales pleriq; alij, & herbe quotidie uident. In frugibus em primo Stachyn graeci adhuc Spicā uocāt. Sed nullū Spicē uelut gium in eo deprehendit. Hic nihil qd eo pertineat dixit. Nec Plinius lib. 24. cap. 17. de eo agens Spicā aliqd simile in eo ostendit. Graecorū medici nihil addiderunt, praeter amaro sapore esse Stachyn, tertium in calefaciendo ordinem habere: nec solū menses et secundas pellere, sed abortiuum etiā esse. Quod uero omnibus comune sit, Marrubio simile oēs fecerunt. Qua una similitudinis ratio, nullam in eo Spicam consicere licet. Habet qdem graecorum Stachys praeter primam illam Spicā significationē pleraq; alias. Nam & in medicina nexus, uinculiq; modus & ratio quaedam Stachys dictus est. Et in nauium fabrica, alijsq; aliquot artibus nomen hoc inuenitur: sed ubiq; a Spicis translatus. Fecit rem minus certam Plinius etiam, qui contra hunc scriptorem colore in luteum inclinato folia describit, quae hic candida tradit.

De Phyllitide. CAP. CXX.

9vllv

Phyllitis, quam aliqui Phyllin, alij Acaulon, alij syluestre Lappathum uocitant, folia promit Rumici similia, longiora, & uiridiora, sēna, aut septena, quae parte anteriore lauiā cernunt, a tergo autem pensiles quasi uermiculos ostendunt. In umbrosis, & opacis hortorum ambulationibus emicat, gustu acerbo. Neq; caulē, neq; semē pfert. Folia in uino pota serpentiū moribus aduersant. Quadrupedibus pos infusa auxilio sūt. Et si dysēteria, aut resoluta aluus exercet, potui dant.

BARBARI COROLL.

Aliud videtur genus Phyllitis esse, q̄ Phyllanthion. Est aut̄ Phyllanthion cognomento Dy-
ticon apud Democritum, ad purpuram tingendam satis celebre, nec præterea quale id sit mon-
stratur. In Theophrasto ac Plinio legitur & Phyllanthus herba, inter spinosas, sed mitior acule-
is, & ab radice tantum foliata.

EX. M. VERG. COMM.

Foliosus cespes potius q̄ planta Phyllitis est, ubiq; ad parietū radices nascens. Ob quam cau-
sam ex antiquis græcis & posterioribus latinis aliqui, non Phyllitida tantum a folijs, sed Pyrgi-
tim a turribus etiā, q̄ ad radices earum nascitur eam dixerunt. Viret diu herba, contra geli-
cidia hyemis contumax, nullo unq; prolato caule: ex quo Acaulos etiā dicta fuit. Id enim ea
vox græcis significat. Feliciq; similitudinis comparatione usi sunt, qui Rumici eam, ut est, simi-
lem videntes, sylvestrem Rumicem appellauerunt. Rigent recta in altum surgentia eius folia.
Ex quo hic interiorem eius partem appellauit, eam scilicet, quā se inuicem folia spectant multo
læuore nitentia, extrinseca autem qua parietes & terram. Negauit hic ultra caulem, flores & se-
mine ferre Phyllitim: nec nos aliter obseruauimus. Dubitandum tamen, & querendum de se-
mine est, cum copiosa, & quibus locis antea non fuerat nascatur. Paulus Aegineta nihil de ea
aliud tradit, q̄ acerbo sapore esse, ideoq; potam fluores alui compescere.

De Phalangio. CAP. CXXI.

Phalangium a quibusdam Phalangition uocatur, ab alijs Leu-
cacantha. Ramuli sunt ei duo, pluresue, in diuersa tendētes. Flos
candidus, Lilio similis, multas incisuras habens. Semine nigro, lato ad
Lenticulę dimidiatę figuram, multo tenuiore. Radice parua, tenui, hæ-
r bacei coloris, dum a terra eruitur. Prouenit in collibus. Huius folio, se-
mine, flore cum uino poto, auxiliatur contra scorpionum, phalangio-
rumq; ictus. Tormina quoq; discutit.

BARBARI COROLL.

EX. M. VERG. COMM.

Phalangion, & Leucanthemon, & Leucacantham uocant. Flos Lilio rubro similis.
Omittimus quæ Paulus Aegineta libro. 6. de ea dixerit, φαλαγγίτης ὀνόμασαι μὲν ἀπὸ τοῦ τοῖς
φαλαγγιδίκοις βουθῖν. Plinius enim satis unus est idem testatus lib. 27. Huius folio, uel flore, uel
semine contra scorpionum, phalangiorumq; & serpentium ictus auxiliatur. &c. Tantaq; illi,
& tam presens contra Phalangiorum morsus uis est, ut uno hoc salutis humanę auxilio cla-
ra inter alias plantas semper fuerit. Nec tantum illi ad gloriam nominis profuit Lilio similis &
candidissimus flos, ob quem Leucacantha dicta etiā est. Candorem enim floris utraq; ea uox
indicat, quātum a ueneno insecti illius per eam seruata homini salus. Habet Phalangites notas
ubiq; & adhuc omnes illas quæ a Diosco. & ab alijs in historia eius illi tribuuntur. Nec diffici-
le est locis inculcis eam inuenire. Nosq; ex obseruatione eius, non sine ratione persuademur qd
nunc in Diosc. legitur, flores multas habere incisuras, non de floribus, uerum de folijs rectius
intelligi posse. Plures enim quales in quercu folium eius incisuras habet, idq; mediocris Betæ
quantitate est: nihil tamen in communi græcorum omnium lectione mutatum a nobis est. Eo-
dem modo quod παχύ, idest, crassum in cunctis legitur, πλατὺ latum legi debere. Plinius enim
lato semine eam describit: & hic dimidiatę Lentis quantitate dicit esse: pauloq; post Lente graci-
lius, quod crassitudini non responderet.

De Trifolio. CAP. CXXII.

Græci Triphyllon, alijs Oxyphyllon, alijs Menyanthes, alijs As-
phaltion, alijs Cnicion uocant, Romani Trifoliū, aut acutum,
aut odoratum. Frutex supra cubiti altitudinem attollitur, uirgas habes
tenues, iunceas & nigras, e quibus ramulares enascuntur appēdiculæ,
quæ in terna singulis germinationibus exeunt folia, Loto arbori simi-
lia. Iis recenter enatis Rutæ odor inest. Vbi autem adoleuerunt, bitu-
K iij

A
Pli, li. 21. c. 115.

φαλαγγίτης
φαλαγγίτιον

B

τριφυλλον

D I O S C O R I D I S

C men olent. Florem ædit purpureum, semen quadamtenus latum, sub-
hirsutum, ex altera extremitate exertum, ueluti corniculum gerens. Ra-
dix tenuis, longa, ualida. Semen & folia in aqua pota pleuriticis, urinæ
difficultati, comitalibus, & ijs qui aquæ inter cutem principia sentiunt,
fœminis quoque uulvæ uitio opportunis, auxiliantur. Menses cit, ternæ
drachmæ e semine dari debent, e folijs uero quaternæ. Contra serpen-
tium ictus trita folia, & ex aceto mulso pota, præsidio sunt. Tradunt
aliqui totius fruticis, radices, foliorumque decoctum foru dolores eorum
finire, quos serpentes percusserint. Quæ autem aqua huiusmodi sana-
tus quis fuerit, si ea quispiam alius foueatur, qui ulcus habuerit, perin-
de afficitur ut a serpente demorsus. Quidam terna folia, aut semina in
tertianis, cum uino potui dedere, & in quartanis quaterna, ut quæ fe-
brium circūitus discuterent. Radix antidotis inseritur.

Pli. li. 29. ca. 6.
lib. 21. cap. 9.

B A R B A R I C O R O L L.

Trifolium tribus generibus. Minyanthes, siue Asphaltio, siue Asphalitis, ut Archigenes,
maiore folio: quo utuntur coronarij. Alterum acuto, Oxytriphylon cognomine. Tertium ex
omnibus minutissimum. Herba optima in prato Trifolij est. Præfagia tempestatum habet. in-
horrescit enim, & subrigitur contra eas. Sophocles pœta uenenatū id existimat. Serpentes in
Trifolio nunquam spectantur. Columella Trifolium Simonianum, & acutum quoque dici hoc tra-
folium pratense.

E X M. V E R G. C O M M.

D Quæ in scriptore hoc a principio capitis huius statim numerantur Trifolij tres appellatio-
nes, Oxytriphylon, Memyanthes, & Asphaltion, non satis certam in antiquis scrip-
tibus rationem habent: nec constituisse ex illis facile est, sint ne diuersorum Trifolij generum di-
uersæ notæ, an eiusdem plantæ diuersarum gentium diuersæ tamen appellationes. Nicander in The-
riacis suis unum esse Trifolium quod pluribus nominibus censeatur, his indicat uerbis. *οὐ μὲν
καὶ τριφύλλον ὀνόμαζο. & c. τὴν ἴστω μινιανθὸς ὃ δὲ τριπίτλον ἐν ἰνίσσῳ, καὶ τὴν μὲν λωτο τριπέταλον
ὀνομαζο. Quod est, Sumito & Trifolium, quod Menianthes aliquis, aliquis uero Tripetalon uo-
cat. Pro quibus interpret eius a Dionysio herbario Trifolium Menianthes uocari ait: habere-
que Loto simile folium, odorem uero Rutæ cum nondum creuit: postquæ uero exoleuit, deflu-
entibus iam folijs, odore bituminis sentiri. Quæ omnia huius scriptori eadem sunt. Qui, modo
integra in eo pars illa sit, non aliter de Trifolio sentire uidetur, quam unum, idemque omne esse, diuer-
sisque his nominibus ob diuersas censeris causas. Nec aliud Paulus Aegineta etiam libro sexto
de Trifolio tradidit, *τριφύλλον* dicens *ἰσὶ δὲ ἀσφάλτιον, ἰσὶ δὲ ὀξυτρίφυλλον, ἰσὶ δὲ μινιανθὸς*. Quod est.
Trifolium, quod alij Asphaltion, alij Oxytriphylon, alij Menianthes uocant. Plinius contra
uicesimo primo uolumine, capite nono diuersa genera his uocibus indicari tradidit. Folio co-
ronat & Trifolium. Tria eius genera, Menianthes uocant græci. Alij Asphaltion maiore folio,
quo utuntur coronarij. Alterum acuto, Oxytriphylon. Tertium ex omnibus minutissimum.
Manifesteque Menianthes, & Asphaltion illi idem est: Oxytriphylon autem diuersum. Colu-
mella grauis & ipse autor, lib. 7. ca. 15. de Trifolio hæc ait. Vel simonianū Trifoliū, qd inuenitur
fragosis locis efficacissimū tradit, odoris grauis, neque ab similibus bitumini, et iccirco græci Asphal-
tion appellant. Nostri autem propter figurā uocant acutum Trifoliū: nam longis, & hirsutis folijs
uirtet, caulemque robustiorem facit quam pratense. Quæ Plinio contraria sunt. Ille enim Menianthes, &
Asphaltion idem facit: hic Asphaltion & Oxytriphylon. Theophrastus semper sere Menianthes
Trifoliū omne uocat. Ex his non facile censere in Trifolio est, quæ nā eius gēna, & generū appel-
lationes quidam fuerint. Nobis ex his quæ diu obseruauimus, in eam partem inclinat animus,
ut duo sint Trifolij genera. Cōmune et pratense hoc, omnibus notū. Et acutioris folij alterū, qd
græci Oxytriphylon dixerunt: & hoc Menianthes & Asphaltio uocari. Factūque illi primā apel-
lationē, quod flore suo se indicet: id enim ea uox significat. Secidā uero, cū iam ab integra ætate dis-
sihi cœpit, & bituminis odorē cōtraxerit, inuenisse. Suum tamen unicuique iudiciū & arbitrium erit.*

De Polio.

CAP. CXXII.

A

πόλιον

Polium montanum, aliqui Theuthrion, alij Feuxaspidion, alij Achamenin, alij Ebenitin, alij Melosimon, nonnulli Belion, quidam Leontocharon uocant. Duo genera eius. Montanum, cui Teuthrio nomen est, & cuius est usus. Tenuis frutex est, candidus, neq; palmo altior, semine refertus. Capitulo in cacumine quendam corymborum speciem præseferente paruo, canis hominis simili, grauius olente, non sine quadam suauitate. Alterum fruticosius, non usque adeo ualens odore, & uiribus infirmius. Potum feruescitur ius auxiliatur serpentium ictibus. Hydro picis, morbo regio, & lienosis ex aceto. Stomachum male habet. Caput doloribus afficit. Aluum & menses ciet. Substratum, suffitum uic serpentibus abigit. Illitum uulnera conglutinat.

BARBARI COROLL.

Polium carnosum, ut alia multa, folio, uestibus interpositum, arceat animalium nocentia. Culi cæ ab eo, caprifici modo generari, Theophrastus scribit. Herba indyca Hesiodi, & Musæi, laudibus ad oia utilem prædicanti, & ad famam quoq; dignitatis perungi, tractari, coliq; iubentium. Folia eius mane candida, meridie purpurea, sole occidente cerulea spectari: quod quidam a Dioscoride Tripolij floribus ascribitur. Theophrastus certe modo Polium, modo Tripolium eandem uocauit herbam. Ideoq; a Tripolio differre quidam negarunt. Folia Polij, canis hominis similia, a radice protinus nuncq; palmo altiora Plinius existimat. Quidam folia Thymi reddunt, nisi q; molliora sunt, & lanatiore canicie. Nulla magis herba conuenit medicamentis, quod Alexipharmacum uocant: in quod minore, ut Galenus inquit, utimur.

Pli. li. 21. ca. 7.
26. cap. 7.
Theoph. li. 1.
de hist. plant.

EX M. VERG. COMM.

Non potest, Polium cum Tripolio diuersi generis plantas, tam multis locis miscens, defendi Plinius: nec eius scriptores auctoritate excusari, qui commentationibus suis, dissimulato hominis errore, eadē illa ut erant, adiecerunt. Contra Plinium enim scriptor hic, Theophrastusq; & quod pluris merito faciendum est, res ipsa stant. Polium siquidem uidere passim licet, nullas Tripolij notas habens. Obseruauit multo ante hæc tempora in Plinio, qd dicimus, & commentario quodam suo declarauit Leoniceus, uir nostra ætate huiusmodi doctrinarum peritissimus. Eaq; ob causam, non erimus nos in his ultra longiores. Satisq; græcarum literarum imperitis nouisse fuerit, caniciem Polio nomen fecisse, quæ in summo plantæ cacumine pendens, canos hominis capillos præfenti quadam imagine offendit: consueuissq; Græcos scriptores, cum maioris amaritudinis indicatione aliqua uti uellent, a Polio hoc rationem & exemplum sumere: semperq; βαρύδαιμον, quod est graue olens, appellare. Theophrastus primo de plantarum historia uolumine, quod ad seruandam rem domesticam pertineat, Polio tribuit, ut uestibus interpositum ab insectis, quæ eas erodendo dehonestant, incolumes seruet. Verba eius sunt. τούτο δὲ καὶ πρὸς εὐπρεπὸς τοῦ ἐν τοῖς ἱματίοις ἀγαθόν. Meminit eius & Nicander in Theriacis suis. ἡ πικρότερον βαρύδαιμον ὅλην γύναιον ὠφελεῖν. Laudauitq; præcipue contra uenenata.

B

De Scordio.

CAP. CXXIII.

σκόρδιον

SCORDIVM aliqui Scorbion, alij Pleuritina, alij Dysofmon, alij syluestrem Calaminthen, quidam Chamædryn, alij Mithridation, Magi Podotis sanguinem, Aegyptij Apho, Romani Trifaginem palustrem appellant. In montibus & palustribus nascitur, folijs Trifaginis, maioribus, non sic in ambitu diuisis, aliquantum Allia redolentibus, gustu amaris & adstringentibus. Quadrangulis caulibus, sub rubro flore. Herba uim excafactoriam habet. Urinam cit. Cocta recens aridaue cum uino, aduersus uenenatos serpentium morsus bibitur. Ad stomachi quoq; rofiones, dysenteriam, & urinæ difficultatem, bis

K iij

D I O S C O R I D I S

Cnis drachmis cum hydromelite. Crassamen purulentum peſtore expel-
lit. Facit aridæ farina ad ueterem tuſſim, rupta, conuulſa, ſi cum naſtur-
cio, melle, & reſina miſceatur in eclegmate. Inſtammata modice præcor-
dia cærato excepta, recreat. Cum aceto acri, aut aqua, podagris conueni-
enter illinitur. Menſes impoſita mouet. Vulnera conglutinat. Vetera ul-
cera purgat, & ex melle ad cicatricem perducit. Sicca excreſcentias in car-
ne cohibet. Succus ad eadem uitia bibitur. Inter prima efficax Ponticum
natione, Creticumq;

Pli. li. 25. ca. 6.
26. cap. 8.

SCORDION, item Scordotis Mithridati aſcripta eſt: cuius depictâ manu Crateias medicus ui-
dit, magnitudine cubitali, ramoſam, folijs lanuginofis. Reperitur in Ponto, campis humidis,
pinguibus. Eſt & alterius generis latioribus folijs, Menthafro ſimilis. Alia eſt a Mithridate ſimi-
liter inuenta, quam Mithridation uocant. Huic folia inquit Plinius, duo a radice Acantho ſi-
milia, caulis inter utraq; ſuſtinens roſeum florem. Hanc ipſam puto eſt, quâ idem Plinius Cha-
mæropa uocauit libro ſexto & uigeſimo, iſs uerbis. Eoſdem inquit effectus habet, lateris do-
loribus Chamærops, myrtis circa caulem geminis folijs, capitibus græculæ Roſæ.

VERG.

Haber certas, & cum ſcriptore hoc cunctis alijs eaſdem, quibus inueniri & inuenta cogno-
ſci poſſit paluſtris Trixago notas: odorē, qui illiberalis, nec Allio abſimilis illi eſt: & poſt
odorem ſerratam foliorum formam: quibus primo & per ſe dictam totam Trixaginem reſert.
Haber & quæ numeratæ a Dioſcoride non ſunt, in ſummis caulibus roſeos flores, & in quibus
uariet antiquis ſcriptores proprios & natales eius locos: cenſente hoc in mōtanis, Plinio aut-
em in campeſtribus naſci herbam. Cuius ob diuerſas, multasq; has notas plura fuerunt quon-
dam nomina, Scordion, quæ uox ab Allijs facta illi eſt: cuius odore ſentitur. Scorodon enim
Græci Allium uocant. Quo etiam Scordotis pertinet a Plinio dicta, & ab hoc Dyſſomon ma-
li & ingrati odoris ſenſum indicans. Quemadmodum agreſtis Nepeta, a Plinio autem Men-
thaſtrum dicta, generis nota magis q̃ appellatio alia eſt. Siquidem Plinius. 25. uolumine capi-
te. 6. ait. Eſt & alterius generis latioribus folijs Menthafro ſimilis. Ex quo factū eſt, ut quæ di-
uerſi generis nota quondam fuit, inter appellationes ab imperitis numerata fuerit. Vt autem

D

Trixago appellaretur, ſimilitudo ſecit, & Mithridanes Ponti rex, medicinæ tantopere fauenſ:
ut inuentionē eius Crateias herbarius illi adſcripſerit. Habet poſt omnes paluſtris Trixago Ro-
mana uox, certam ex ſuperioribus cauſſam. Trixagini em̃ ſimilis eodem nomine dicta eſt. Palu-
ſtris uero, quoniā ut Plinius, & hic dixerunt, humenibus locis naſcitur. Cōueniuntq; in hoc
omnes, diſcrepant autē in reliquis. Hic enim *ῥιχνός*, id eſt, montanis, Plinius campis humidis,
pinguibusq; naſci dixerunt: nō leui diſcrimine, inter campeſtre, & montanū terreni genus. No-
bis in Plinij ſententiā magis inclināt animus. Vidimus em̃ in incilis margine campeſtri agro na-
tam rubēte roſaceo flore, certiffimo Alliorū odoris ſenſu. Multi in medicina uſus paluſtris Tri-
xago hæc quondā fuit. Noſq; inter cætera diximus, purgare quæ in peſtore hæſerunt, craſſa
purulenta. Non purulentas exſcreationes illas intelligentes, quas Græci empyemata noſant,
ſed pituitā, craſſoſq; humores qui frigore, gelicidiorq; aliquo in peſtore puris modo albeſcen-
tes concreuerint. Id enim ſignificare nobis uidetur *πάχυν πύωδις*.

rixiiv

De Tuſſilagine.

C A P. CXXIIII.

BEchion Græci, quidam Richion, alijs Petrinam uocant, alijs Pega-
ton, alijs Pithion, alijs Pagonaton, alijs Chamæleucen, alijs Proche-
ton, alijs Arcophyton, alijs Chamægiron, Aegyptij Saarthan, Latini
Tuſſilaginem, quidam Pharphariam, aut Puſtulinem, Beſſi Aſa.
Folia ei ſunt maiuſcula q̃ Hedere, ſex, aut ſeptem a radice, ſubalbida a
terra, ſuperne uiuentia, in plures angulos exeuntia. Caulis palmum altus,
flos luteus. In uere flore & caule confeſtim exiuit. Inde nonnulli his
uacare exiſtimauerunt. Radix tenuis eſt & ſuperuacua. Naſcitur in a-

moenis & riguis. Folia ex melle trita igni sacro, & omnibus inflammacionibus illicitu medetur. Arida fumus per infundibulum hianti ore raptus, hos sanat qui sicca tussi, atq; orthopnoea infestantur. Pectoris uomicas rumpit. Eundem effectum præbet suffita radix. Decocta in hydromelite, & pota, emortuos partus eijcit.

B A R B A R I C O R O L L.

Bechion, siue Bechicon, duo habet genera. Sylvestris ubi nascitur, subesse aquas credunt: Et hoc habent signum aquilegi. Describitq; hanc Plinius aliter, q̃ Dio scorides, folia eius tradendo superne pallida, subalbida a terra, sine caule, sine flore, sine semine. Altera a quibusdam Saluia dicitur, similis Verbasco. Hanc a Dioscoride Verbascum sylvestre dici puto, ita scribente. Habetur inquit & Verbascum sylvestre altum, uirgis arboreis, folio Saluiae, orbibus uirgas cingentibus, ut Marrubium, floris lutei, fulgore auri. Quidam priorem Arcion, & alio nomine Chamaeleucen putant. Est autem Chamaeleuce, quam nostri Farfugium uocant, folio Populi, sed ampliore, nascens iuxta fluuios: unde Populago dicta sit a nostris. Hanc & Farfariam uocari Dioscorides testis est, a fluuiio fortasse Farfaro, quem Virgilius Farbarim appellat. In Sabinis Plautus, Dissipabo inquit te ut folia Farfari.

Itemq; in Penulo.

Prosternebam inquit eos, ut folia Farfari.

E X M. V E R G. C O M M.

Haec est Tussilago illa, quam hic in totius operis proœmio dixerat, falso credidisse quoddam, nec caulem, nec florem, nec semen ferre: & quam ignorantia eorum causam tunc reliquerat, legendam uolentibus hoc loco tradidit: ferre quidem illa aliarum plantarum modo restatus: sed tam breuis uitæ cuncta esse, ut obseruari facile non potuerint: quodq; obseruatum non fuerat, negatum naturæ imprudenter fuisse. Quæ si ad Hypanim fluuium, qui ab Europæ parte in Pontum influit, in animalium censu bestiolas genuit, quæ unum diem uiuunt: in plantis multo facilius eandem potuit ostendere fortunam: herbasq; aliquas esse, quæ prolaro caule statim decaulescerent, & pendente se flore deflorescerent. Qualis Tussilago hæc est, a Græcis Bechion ideo dicta, q̃ tussi & tussientibus medetur: non omnibus, sed his qui tantum tussiant, nihil autem pituitosi excrementi simul extussiant. Quod genus hic, siccam tussim dixit: Plinius ueterem nominauit. Ex quo factum est, ut Plinij uerba exscribens in Dioscoride Barbarus, quod *ἐξὸν βήχας*, id est, siccam, siue aridam tussim hic dixit, ueterem ille dixerit, Sic autem sicca & uetus tussis eadem, an inter se discrepent, medici censebunt.

De Artemisia.

CAP. CXXV.

ARTEMISIA RAMOSA, Græcis quibusdā Monoclonos, alijs Toxitesia, alijs Ephesia, alijs Anactorios, alijs Sotzusa, alijs Lycophryx, Magis hominis Sanguis, alijs Crysanthemom, Romanis Hærbæ regia, aut Artemisia, alijs Rapium, aut Tertana, Gallis Pona, Dacis Zuoste dicitur. Magna ex parte in maritimis nascitur. Absinthij modo fruticosa, maioribus & pinguioribus folijs, ramisq;. Tenuior autem flore est paruo, tenui, candido, graue olente. Aestate floret. Sunt qui in mediterraneis Vnicaulis nomine appellant, tenuem hærbulam, simplici caule & minuto, floribus scatente, flauo colore. Hæc iucundior em q̃ præcedens efflat odorem. Vtraq; excalscit, extenuat. Feruefactæ conuenienter in muliebres defessus adiunguntur, ad detrahendos menses, partus, secundasq;. Item ad præclusiones uuluarum, & eiusdem inflammationes. Calculos comminuunt. Remorata urinam cient. Menses pellunt pubi illitæ, Succus uuluarum in-

A

Pli, li. 16, ca. 6.

B

ἐξὸν βήχας
Germanice *βήχας*.

D I O S C O R I D I S

Cditus ex Myrrha eadem quæ incessio trahit. Coma tribus drachmis eorundem educendorum gratia bibitur.

B A R B A R I C O R O L L.
 Pli. li. 25. ca. 7. & decimo. **A**rtemisiam, & Lachanon Basilicon, hoc est, olus Regium nonnulli uocant. Dictam putant ab Artemisia uxore Mausoli: quæ sibi hanc herbam adoptauerit, cum antea Parthenis uocaretur. Sunt qui ab Artemide cognominatam putent: quoniam priuatim medicatur fœminarum malis: quibus Artemis, hoc est, Diana præsit. Secundo generi teneritudine tribuunt, non nisi in maritimis nascenti. Tercio minima folia florenti, cum uua maturefcit: quod quidam Botryn, alij Ambrosiam uocari tradunt: qualis in Cappadocia proueniat.

E X M. V E R G. C O M M.
In multo nominum ambitu & honore quondam Artemisia fuit, Parthenis, id est, uirginis primo dicta, quæ uirgo Dea scilicet nomen illi dederit. Mox βασιλικόν λυχνάρον, id est, regium olus. Tum ex eadem causa, Anactonium. Anactas enim Græci uocant. Ephesia a regione dicta eadem est. Quemadmodum a præsentis remedio & ope, Sozusa, id est, salutaris. Romani Regiam herbam Græcorum exemplo: & si recipiendum id sit a similitudine, Serpyllum maius dixerunt. Et hæc antiquioribus Artemisiam nomenclatura fuit. Ex posterioribus alij in Cannabibus genere Artemisiam numerauerunt: congenerem illi facientes, & eodem illi nomine eam indicantes. Alij Matricariam, notum omnibus olus esse Artemisiam testati sunt. Quod non aliunde, ut credimus, quæ ex duplici eius genere factum est. Quæ enim ab hoc scriptore Monoclonos, a Plinio aut simplicis caulis nominatur, non dissimili penitus figura, præsertimque ob singularem, quæ profert caule, a Cannabe describitur. Quæ contra Absinthij modo fruticosa ab hoc, & ab alijs traditur, facile ob quas habet uires ad nostri orbis, & nostræ ætatis Matricariam transferri potuit. Quod & si Græcorum de Artemisia historiae oïno non respondeat, nec certo aliquo auctore confirmari possit, non reiiciendum tamen penitus est. Egregia enim in mulieribus. Dico autem nunc muliebria, quæ Græci γυναικία uocant. Longius in Acoro a nobis tractata Artemisiam uis est. Credendumque, non aliunde quæ a matricibus posteriori Matricariæ nomen fecisse posteriores.

De Artemisia tenuiore. **C A P. CXXVI.**
Altera tenuioribus folijs, in sepibus & cultis, iuxta aquarum ductus nascitur. Cuius flores & folia contrita, Samplici odorem reddunt. Si quis stomacho laboret, herbam cum amygdalino oleo bene contundat, in malagmatis lentorem, & stomacho imponat, sanitati restituetur. Qui neruorum dolore cruciantur, si succum ex rosaceo illinant, sanantur.

B A R B A R I C O R O L L.
In quibusdam exemplaribus Artemisiam hanc multis nominibus inuenias. Toxicisiam, Ephesiam. Parthenicon. Hypolysson, Anactonium, Sozusan, Lian, Leucophryca. Prophetæ Sanguinem hominis, Romani Valentiam, nonnulli Persepollentem, alij Herbam regiam, Galii Ponem, Daci Zonustem.

E X M. V E R G. C O M M.
Desyderatur, sed sine iactura aliqua, in uetustissimis Græcorum, latinorumque codicibus hoc caput. Accreuisseque huic scriptori inuuliter multa indicat. Phrasis primæ, sermonisque forma: quæ in Græcis a scriptoris huius indole longe absunt. Mox nulla eorum quæ in eo iubenent, necessitate.

De Ambrosia. **C A P. CXXVII.**
Ambrosia, quam Romani Caprum syluaticum uocant, quidam Botryn, alij Apium rusticum, Aegyptij Merseon. Tenuis fruticosa, ramosa, trium fere palmorum, folijs Rutæ, circa imum caulem exiguis. Cauliculi seminibus, perinde quasi racemulis grauidi, nunquam flores pariunt. Odore uinoso, suauis. Radice tenui, sesquipedali. Coronantur ea Cappadoces. Vis eius, reprimere ac repellere, et illitu adstringere humores, qui in aliquam partem incumbunt.

AMBROSIA, uagi herba nominis, & circa alias quoque fluctuans. Athenienses in dedicatione Iouis Cresti, Ambrosiam in cado ferendam iuebant. Non herbam intelligentes eo nomine, sed ut Athenæus inquit, fruges omnijugas, et oleum, & latices.

EX M. VERG. COMM.

Non inter herbas aliquas fluctuans & uagum nomen tantum quondam Ambrosiæ fuit, sed quodcumque odoris, aut cibi suauitate placeret in poetis scriptoribusque alijs, eodem hoc nomine ab antiquis dicebatur, & quasi immortalitatem utentibus faceret, sic appellata illis fuit. Frequens & notum ubique nomen, ignota tamen res, & inter herbas non facilis inuentu: alijs aliter eam ostendentibus, & cum Artemisia miscentibus fere cunctis. Audent tamē nostræ ætatis herbarij eam ostendere, trium dodrahtum altitudine, & altiore aliquando herbam, ut hic ait, ramosam, semine per totum caulem racemoso, sed longe maioribus quam Rutæ folijs: & quod hic ait, nunc florentibus racemis, lanuginosis, papposisque, nullo nec uini, nec alterius rei odore. Quo fit, ut in peregrina Italiæ, ut nos credimus, herba nihil pro comperto constituere audeamus. Plinius. 17. uolumine capite. 4. integrum scriptoris huius caput commentationibus suis inseruit: cum tamen non multo antea libro. 25. capite septimo de Artemisia agens, dixisset. Sunt qui in mediterraneis eodem Artemisiæ nomine uocant simpliciter caule, minimis folijs, odore non iniocundo, quam quidam Botryn, alij Ambrosiam uocant. Ex quo manifesteprehenditur, quod paulo ante diximus, uagum per multa Ambrosiæ nomen esse plantas, cibos, & pocula: eo usque, ut Athenienses hoc nomine omnigenas fruges, oleum, uinum, laticesque alios, quos Djs in ara offerrent, Ambrosiam nominarent. Nobis inclinatur animus, ut peregrinam nostrum orbi, peculiariter Cappadociæ herbam existimemus: nam quæ a nostris herbarijs hoc nomine ostenditur, uulgaris, & ubique nascens, inuentu facillima est, præsertimque ex capitulorum racemis, quos habet pappi plenos, nunc a nobis florere uisos.

De Botrye.

CAP. CXXXVIII.

BOTRYS fruticosa herba est, lutea tota, & in multas alas sparsa. Semen circa ramulos prouenit. Folia Cicorio similia. Tota suauem odorem spirat. Quare uestimentis interponitur. Inuenitur in torrentium ripis. Pota Orthopnoceas mulcet. Hanc Cappadoces Ambrosiam uocant, alij Artemisiam.

BARBARI COROLL.

Botryn Cappadoces & Ambrosiam uocant. Alij Artemisiam.

EX M. VERG. COMM.

Totidem, si idemque uerbis genti suæ quondam Plinius cognoscendam Botryn tradidit, quos quibusque antea græcis Diosco. eam descripsit. Verba elus sunt. Botrys fruticosa herba est, luteis ramulis. Semen circa totam nascitur. Folia Cicorio similia. Inuenitur in torrentium ripis. Medetur Orthopnoicis. Hoc Cappadoces Ambrosiam uocant: alij Artemisiam. Quæ collata Dioscori, eandem in utroque medicinā & historiam faciunt. Posteriores etiā Græcorum medici, qualis Paulus Aegineta est, nihil ab hoc scriptore traditis addiderunt. Eius uerba sunt lib. 6. Botrys ὅς ἐστι ἀμύρσιαν ὅς ἐστι ἀρτεμισίαν φυτόν ἐστιν ἐν ὁδοῖς ἰκαγῶς. ἐν δὲ τοῖς γούν πτόμασι ἐρροπνοικοῦς ἀφελῆ. Quod est. Botrys, quam aliqui Ambrosiam, aliqui Artemisiam dicunt, planta est ualde odorata. Hæc cum uino pota, orthopnoicis medetur. Sunt de Botry hac totidem, & eadē a cunctis dicta: nec nos habemus, quod eorum decretis & historiæ addamus.

De Geranio.

CAP. CXXXIX.

GERANION aliqui Peloniten, alij Trica, alij Geranogeronta, Romani Vchinastrū, Aphri Lescen appellant. Folijs Fremij, diuisuris longioribus, radice rotunda, dulci. Quæ drachmæ pondere in uino pota, uulnæ inflationes discutit.

BARBARI COROLL.

Geranion, & Myrridō uocatur Genus primum. Geranion uera creditur a quibusdam, sed & secundum utique, si descriptionem græcorum sequare, non latinorum: ut mox docemus.

D I O S C O R I D I S

C

¶ De altero Geranio.

CAP. CXXX.

Geranium alterum, aliqui Myrrhin, alij Oxyphyllon, alij Cardamomum, alij Origanum uocant, Magi Hierobryncas, Latini Gruinam, aut Pulmoniam, aut Cicotriam. Caulibus minutis & pilosis, sesquipedalibus, folijs maluae. In summis alijs sursum spectantia gruum capitula insunt, cum suis rostris, aut canini dentes. Nullius in medicina usus.

Pl. li. 16. ca. 11.

B A R B A R I C O R O L L.
Geranium secundum medicis inutile, aliter a Graecis, aliter a latinis describitur. Dioscorides & omnino Graeci, folijs paulo candidioribus q̃ Maluae, ramofum ex interuallis. Hanc ego aut eandem, aut omnino similem esse uideo cum ea, quam Galliae transalpinae uulneribus & fistulis in potum commendant, & herbam Robertianam cognominant, coliculis rubentibus, flore paruo, subpurpureoq̃, ac ceteris notis omnibus: quae hoc loco a Dioscoride Geranio redduntur, etiam si ab eo medicinae aliena existimetur. Quid enim prohibet, ignoratas eius uires fuisse olim? Nostri, ut inquit Plinius, Geranion ostendunt Cicutae folijs minutionibus, & caule breuius, rotundo, saporis & odoris iocundi. Verum haec proprie Geranion non est, sed Myrrhis: de qua post agemus: confusione orta, q̃ Geranion a quibusdam Myrrhis etiam dicatur: unde natum & illud sit, ut Geranion in latino Cicutaria nomen habeat: cum aliqui Cicutariae proprie Myrrhis esse uideatur.

D

E X M. V E R G. C O M M.
Geranium haec est, in qua Gruini capitis imaginem in summo eius plantae capitulo contemplant Graeci, nulla similitudine aptius rem indicare potuerunt. Vidimus nos alteram Geranion, paucis statim a radice prodeuntibus Maluae folijs, ut hic describit. Tum nudo surgente caule, dimidij cubiti altitudine: crassoq̃ in caulis illius cacumine, folioso inuolucro tumentem, ex quo per longitudinem ex altero latere dimidiati digiti longitudine acutus procedebat apex. Erantq̃ in folliculo illo cum uiridi colores alij plures, praesertimq̃ cinereus: tam praesenti totius colli, capitisq̃, & rostri Gruini imagine, ut aptiore pictura ostendi a peritissimo pictore animalis eius tota ea pars non potuisset. Alteram, quae Cicutae folijs est, ipsi non uidimus. Obseruauimus tamen in antiquis scriptoribus, Plinioq̃ praesertim, utriusq̃ huius herbae misceri historiam. Nec satis cognosci in eo posse, Gruino ne collo et capite utraq̃ sit, an altera tantum. Id certe ex Dioscoride collegisse facile est, Cicutae folijs alteram earum esse: ideoq̃ Cicutariam dici, & Myrrhida: quoniam & Myrrhis Cicutae folio sit: quemadmodum hic quarto uolumine docebit. Cur autem priorem Romani Echinasrum dixerint, non satis pro comperto nobis est. Quemadmodum in altera per se patent Cicutaria & Gruina ex foliorum & Gruini capituli forma factae appellationes. Longissime de utraq̃ Plinius uolumine. 26. capite. 12. agit. Poteruntq̃ in eo uolentes uidere, quam nos paulo ante diximus, utriusq̃ Geranij historia uarietatem.

praeparat

¶ De Gnaphalio. CAP. CXXXI.
GNAPHALION, alij Hires, alij Ampetocon, alij Anaxiton, alij Anaphalin, Aegyptij Smeon, Galli Gelafonen, Latini Centunculum uocant, quidam Tucularem, alij Albinum. Cuius folijs mollibus minutisq̃ pro tomento utuntur. Bibuntur efficaciter folia in uino austero ad dysenteriam.

Pl. li. 17. ca. 10.

B A R B A R I C O R O L L.
GNaphalion, alij Chamazelon uocant. Gnaphalion porro dicitur, quasi herba fulloniae, siue Tomenticia. Quemadmodum & piscis quidam Gnapheus, hoc est, fullo dictus est, quoniam omnes maculas decoctum eius eluat. Hanc puto esse, quae ab Alceo poeta Gnaphos appellatur: aut eam quae Hippophanes nomen habet. Nam & illa fullonibus est propria. Est apud Aristotelem & auis dicta Gnaphalus, quam miror a Theodoro praetermissam, imo uero cum altera, quae uocatur Helea confusam ab ipso. Tomentum a nostris dici quidam putant Gnaphalion. Lomentum certe in Plinij codicibus impressis legitur, Tomentum in scriptis manu: qui tamen non Lomentum dici,

sed pro lomento esse scribit: quod & Dioscorides quoque affirmat. Etenim Creta, qua fuillones in albandis & poliendis uestibus utuntur, Lomentum a nostris, Gnaphalion & Gnaphalis græce dicitur: ut in Ceruleo notauimus ex Plinij sententia. Sed & fabacea farina Lomentum est: quod Aetius Fabam nominat quandoque. Ego Tomentum potius quam lomentum dixerim hoc loco, ut tamen sciamus, Gnaphalion utrumque uideri significare, tam Lomentum, quam Tomentum. Addu cor eo, quod Dioscorides Centunculum uocari hanc Romæ, prodat. Est autem Centonibus cum Tomento maxima cognatio. Nam & folia Dictamni, quod mollia esse uideantur, tomentitia, & lanea dicuntur a Dioscoride, hoc est, Gnaphalide. Sed & pars Cucurbitæ interior, quæ semen complectitur, ab Aetio Gnaphalides esse dicitur, ob candorem cum mollicia.

VERISIMILE est, rusticam plebem diu hac usam fuisse: quemadmodum & adhuc in Alpibus, ubi frondium copia est, fieri passim uidemus. Græci enim γνάφαλον inter cætera Tomentum uocant. Est autem laniis Tomentum omne id, quo culcitæ ad molliorem & calidiorem quietem infarciunt: siue id lana sit, siue pluma, siue quod uoluerit aliquis excipiendo molliet & fouedis calore corporibus nostris aptum. Sic Suetonius, sic in re latina plures alij indicauerunt, Græci etiam, ut hic ipse in Dictamno dixit, γνάφαλλον quasi Tomentitia huiusmodi omnia appellant. Quam ob causam nos Tomentum herbam diximus: & præter Tomentum, autore hoc ipso, Centunculum. Et diuersum quadamtenus usum Centones, & Tomenta habent. Vulgaris herba hæc est, candicans semper, præsertimque in maturitate. Folia eius non adeo magna sunt. Flores minimi, & ipsi albescetes. Cum creuit, sternitur per terram. Nascitur pingui solo, præsertimque in marginibus itinerum, in hortis, & inter uites. Nullus nostra ætate usus eius est: nec quicquam in herbarum consuetudine modo, & neglectius uiret, & cum aruit minus cognoscitur.

TYPHA folium ædit Cyperidi simile, caulem album, leuem, æquabilem, florem in cacumine ambientem, densum, qui in pappos soluitur, quod lanuginem aliqui nominant. Huius herbe flos, fuillo adipe eloto exceptus, ambustis medetur. Gignitur in palustribus & aquis stagnantibus.

DIFFERRE Typham a Tiphæ, quæ frumenti genus est, & per litteram iota scribitur, existimo: sine geniculis, scilicet modo nascens, radicibus multis, ut triticum ordeumque, folliculo multiplici, culmo simplici, leuissima frumentorum, solo etiam gracili facile proueniens, tritico persimilis ut Zea. Pistam ferunt, qui mutari uolunt in triticum, idque anno demum tertio procedit. Theophrastus sine folio gigni Tiphæ uocatam prodidit, Orchomenium circa lacum, parte radici proxima, esu præcipue pueris tenera. Idem, an diuersum genus faciat cum prædictis, æstimandum relinquo.

PALUSTREM esse plantam Typham, satis unus testari posse uidebatur Plutarchus cap. 2. de naturalibus causis, inter plerasque alias palustres his uerbis eam numerans. ἡ δὲ ἔλαθε τὸν λαΐτον ὅτι καὶ τὰ λιμένα φυτόν ἐστι καὶ φλίωσ καὶ θρύον ἀναγεῖ καὶ ἀβλαστὴ μίνε. Quarebat enim, cur celestibus aquis magis quam profluentibus proficerent ad generationem & incrementum semina? Disputantque contra laicum quendam, qui diceret, cadentibus pluuijs aperiri terram: pulsque illo apertam citius ad radices per se aquam transmittere. Contraria ratione a palustribus his plantis ratiocinabatur, ad quarum radices non transit aperta terra hymber. Numerabatque eas quas paulo ante diximus. Esse autem palustrem, & præter id caulem habere enodem Theophrastus indicat: qui primo uolumine de plantarum historia, de fruticoso & sarmentoso genere docens, & quales in caulibus ramulisque suis differentias hoc genus habet, totam his uerbis rem docuit. περὶ δὲ τὰ φρυγανικά καὶ θαμνώδη καὶ ὅλωσ τὰ κλήματα καὶ ἄλλας τίς ἂν λαβοῖ διαφοράς. ὁ μὲν γὰρ κάλαμος γονατώδης ὁ δὲ βάτος καὶ ὁ παλινουρὸς ἀκανθώδης. ἡ δὲ τύφη καὶ ἕννα τῶν ἑλίων ἢ λιμεναίων ὁ μάλιστα ἀδάρρακτα, καὶ ὁμαλὴ καθάπερ χεῖνος. Quorum sensus hic sit. In furculosis autem & fruticosis, in uniuersumque Viticulis alias constituere differentias aliquis poterit. Harundo enim geniculata, rubus, & paliurus aculeati. Typha autem, & aquaticorum palustrumque aliqua nullo intercedente nodo qui partes dissepiat, per totum æqualia sunt: qualis luncus est. Folia postremo an-

D I O S C O R I D I S

C guloso, odorato luncu similia hic fecit, qualia ea etiā sunt, Intelligitq; in lūcorū gñe Cyperū, de quo primo uolumine lōgius actum est. Quem gñe foeminino Cyperida hoc loco uocauit, qm eo nomine radix eius appellatur; ut in cōmentationibus nostris rīc longius dictū fuit. Non aliam ob causam, nisi quia radicis eius tm̄ usus est. Et quemadmodum latini lunci radicem plantam uocant, sic gr̄ci Cyperida ex radice genere foeminino luncum ipsum aliqui nominauerūt.

¶ De Circea. CAP. CXXXIII.

κίρκια

Circea, quam & Dirceam aliqui uocant, folijs est hortensis Solani. Agnatis crebris, flore nigro, pusillo, copioso. Semine Miliij nascente in quibusdam corniculis. Dodrantali radice, triplici ferme, aut quadruplici, candida, odorata, excalfaciente. Nascitur in apricis, saxis & uento perflatis. Radicis tusc̄ triens, in sextarijs tribus uini dulcis, per diem & noctem maceratur, potuq; triduo uulūas expurgat. Semē forbitionibus datum, lacte mammas nutricum explet.

BARBARI COROLL.

Circeam a Circe dictam, nonnulli uerisimile putant. Quisitum est autem a nobis, quid esset apud Columellam Circea. Nunquid pro Circea deprauatus esset locus? Respōdi, non Circeā, sed Cymam legendum.

EX. M. VERG. COMM.

D Vnt in gr̄cis qui neutro genere Circeon hanc uocent, notam, ut ex commentarijs eorum ratiocinari licet, tunc omnibus herbam. Nunc quod uiderim, aut audierim, nulli nisi in ueterū Plinijq; præsertim commentarijs auditam: qui uolumine. 27. capite. 9. non iisdem omnibus cū scriptore hoc in historia notis, neq; in medicina obseruationibus eam descripsit.

¶ De Oenanthē. CAP. CXXXIIII.

οινάνθη

Oenanthē, quam aliq; Cerascomiō, aliq; Leucanthon uocitant. Folia habet Pastinacæ, florem candidum, caulem crassum, palmi altitudine. Semen Atriplicis. Radicem magnam, in multa rotunda capitula extuberantem. Nascitur in petris. Caulis eius & folia, cū melle & uino pota, secundas eiiciunt. Radix e uino urinæ stillicidio conuenit.

BARBARI COROLL.

Pli. li. 12. ca. 29
lib. 21. cap. 24.

Oenanthē a Theodoro Viriflora dicitur, post Narcissum uere floret. Plurimum durat, si diuulsa crebro prohibeatur sementescere. Flos ei candidus in racemis, ut Labrusca: odore germi nantis uix, unde nomen. Nascitur locis tepidis, obseritur semine. Habetur & altera Oenanthē, inter uites dicenda.

EX. M. VERG. COMM.

Alia hæc Oenanthē est ab ea de qua quinto uolumine agetur. Illa in uitium genere Labruscæ flos est: hæc in herbarum censu a Theophrasto inter coronarias plantas & flores, qui secundi per uer florent numeratur. Illa primo & per se Oenanthē est, uinum & florem ipso nomine indicans. Hæc, ut fit, deficientibus proprijs, indicationem & nomen floris & odoris sui similitudine ab illa facile impetrauit. Nec ideo Oenanthē dicta est, quia Labruscæ flos sit, sed q; candidus illi flos, racemi ut in Labrusca specie sit: & præter racemosum florem illum, odor qualis in pubescente uite flore; eius sentitur. Amat hæc tepidiora loca. Quondamq; ad coronas in hortis etiam serebarur: in quibus non tantum odore, sed longiore florum suorum uita placebat. Hanc Dioscorides ait Cerascomen uocari: qua uoce Staphylinum, id est, Pastinacam a quibusdam nominari dixerat: cui quoniam hæc folio similis est, ideo & nomine illius etiam indicabatur. Quid autem Cerascome significet, in Staphylino & Pastinaca querendum est. Eandem Leucanthum uocari hic ait, manifesta a florum candore significatione. Neque enim alia eius uocis uis est. Quæ deinde hic dixit, habere Oenanthem hanc in radicibus numerosa & rotunda capita, tubera sunt, & ueluti tumores quibus ea inæqualiter tumet. Plinius ad radicū copiam id retulit: radice magna, numerosa dicēs: cū tñ gr̄di radice hic Oenanthē dicat, et in radice illa multis rotundis capitibus, quæ ad radicū copiosorem numerū, referri posse non uidentur.

¶ De Conyza magna. CAP. CXXXV.

Conyza magna ab aliquibus Cynozematitis, alijs Danaïs, alijs Tanachion, aliquibus Phycos, alijs Ichis, alijs Dinosmos, Magis Brephoctonos, quibusdam Anubias, nonnullis Hedemias, Aegyptijs Creti, Romanis Militaris, aut Deliarium, aut Febrifuga, alijs Fragínosa nuncupatur.

BARBARI COROLL.

Conyza, quæ nostris Cunilago dicitur, et Plinio Cunila quandoque libro decimo, & a Theodoro Pulcaris, quia pulices necat. Folio coronat, & maior & minor appellata. Maior dicitur esse mascula, folio aspero, pinguiore quam minoris, et imbricato, torosiore caule, magisque ramoso, radice lignosa; quæ a quibusdam ut herba quoque ipsa, Libanotis dicitur, autore Plinio. Manipulo eius abiecto, omnes etiam a rota domo blattæ conueniunt ad eam. Vtriusque genus ferotinum, ut quod post arcturum germen, floremque mittat. In summa Cunilaginis appellatione, quatuor herbarum ueniunt: mascula, et foemina. Et quæ tertio loco ponitur foedissimi inter omnes odoris. Quarta reddit Plinius: quæ appellatur satiuum Serpyllo simile, et Cunilagine mōrana facta. Est & quinta eius species Hippoc, ut dicitur paulopost. Cunilago dicitur et ipsum Ligusticum ab aliquibus, sed falso. At Cunilæ tria sunt genera siue nomina. Capitata et nostratæ, quæ Satureia sit, uocamus Gallinaceam quæ Origanum, Heracleoticum: Bubulæ, quæ quædammodum a Græcis dicitur, aliud non cōpi, quæ quæ Plinius per Origanum accipere multis locis uidetur, in qua significatiōe uocabulo eo et nos uti sumus.

A

κόνυζα μέγα

Pli. li. 21. ca. 10
lib. 26. cap. 15.

¶ De Conyza parua. CAP. CXXXVI.

Conyzæ duo genera. Quæ parua uocatur, odore præstantior est. Maior uero frutice altior, & folijs latioribus, graui odore. Vtriusque folia Oliuæ similia, hirsuta, pinguis. In maiore caulis binum cubitorum altitudine attollitur. In minore pedem æquat. Flos squalidus, lutei, aut fului coloris. Quin in pappum abit. Radices superuacue. Suffitu, substratuque frutex animalia fugat. Culices abigit, & pulices necat. Folia conuenienter illinuntur serpentium plagis, & tuberculis, ac uulneribus. Flos cum uino ad menses partusque efficiendos bibitur. Item contra urinæ stillicidia, arquat morbum, & tormina. Comitiales potus ex aceto adiuuat. Decoctum in deflectionibus medetur uulnæ malis. Impositus succus abortum facit. Ex oleo efficaciter rigoribus oblinitur. Capitis dolores tenuis illita sanat.

BARBARI COROLL.

Conyza minor eadem foemina, Hippocrati Cunilago semper mollis uocatur. Folia huius trita, mellis odorem habent, digitis tactu coherentibus. Hanc Dioscorides Libanotidem appellat, cum Plinius masculam ita nominet. Pilosiora minori folia & rami: qui & aculeati sunt. Flos squalidior, odore acriore, qui tamen grauior sit masculæ.

κόνυζα μικρά

B

Pli. li. 21. ca. 10
lib. 26. cap. 15.

¶ De Altera Conyza. CAP. CXXXVII.

Est & tertium Conyzae genus, quod aliqui Paruam, alijs Panion, alijs Libanotidem. Magi Cronon uocant. Caule crassiore, ac molliore. Folijs quam Paruæ maiusculis, minime pinguis, & maiore minor, multo grauioris odoris & iniucundioris, sed inefficacior. Prouenit locis non riguis.

BARBARI COROLL.

Hippocrates Cunilaginem, siue Conyzam, præter supradictas, aliam describit. Apio crispo similem: in maritimis, sabulosisque nascentem, odoris teterrimi, & maxime fastidiendi; quam cum

L ij

D I O S C O R I D I S

Cum melle atq; uino foeminarum locis, quæ sortum non recipiant, ad moueri præcipit, libro de muliebribus causis secundo.

E X M. V E R G. C O M M.

Confundit, miscetq; Plinius pluribus locis cum Origano Conyzam. Nec facile est eodem nomine duas diuersasq; plâras ab eo sæpius appellatas, in historiæ medicinq; gratiam & usum secernere. Longior fuerim, si omnia quæ tam multis locis de Conyza, Cunilagine, & Cunila ab eo dicta sunt, coaceruare hoc loco cogitem. Superuacaneum id etiam fuerit, qm signanda non multo post & repetenda a nobis omnia, aut plura saltē ex illis erunt. Aliud itaq; prius agemus, & ut nouerint omnes, non esse Conyzam Origano eandem, neq; ediuerso utriusq; proprias numerabimus notās: ut propositis his, quæ a Plinio miscentur certius pareant. Incipimus autem ab Origano, quam hic ait folium Hyssopo simile habere, umbellā non comosam, uerum diuisam, & in summis uirgis semen. Et quod ad alia Origani genera pertineat Onetida candidioribus folijs, sed magis Hyssopo similibus esse; semine uero corymborum mō: & quā agrestem Origanum dicunt, folia priorī Origano similia habere; uirgas dodrantes, in quibus Anethi modo umbellæ sint, & candidi flores. Et hæc omnium Origanorum in hoc scriptore notæ sunt. Conyza uero, quas paulo ante diximus folium oleaginū, non Hyssopi, hirsutum, pingueq; caules bicubitales: flores lutei, fragiles, subamari, & qui in pappos euolent. Quorū nihil habet Origanus aliqua, Plinius autem lib. 19. cap. 7. autore herbario Crætea, Ligusticum primo seu Panaces Cunilam bubulam uocari tradit; ceteros hanc Conyzam græce appellare, & ab eodem Cunilaginem dici. Idem non multo post uolumine. 20. cap. 15. Cunilæ præter satiuam plura sunt in medicina genera. Quæ Bubula appellatur, semen Pulegij habet; utile ad uulnē cōmanducatum, impositumq; ut quinto post die soluatur. Contra serpentes quoq; in uino bibitur, ac tritum plagis imponitur. Vulnē ab his facta confricatur. Item testudines cum serpentibus pugnaturæ, hæc se muniunt. Hic ipse Plinius sequenti capite etiam ait. Est alia Cunila appellata a nostris, a græcis Origanum Heracleoticum. Totoq; hoc capite nihil, nisi multiplex Cunila ab eo tractatur: manifesteq; Conyza hæc Cunilæ nomine censetur, cū ait. Pulices etiam contritæ cum aqua sparæ necant. Quod priuatim Conyza habet. Poterant & alia repeti, sed ad eam quam cogitauimus rem satis hæc sunt. Nec nobis aliud modo propositum est, q̃ monere ex his quæ paulo ante dicta sunt, toto genere differre inter se Origanum omnem, & Conyzam omnem, Pliniumq; Cunilæ nomine in utraq; passim uti. Omitimus quod primum ille ait. Ligusticum, seu Panaces Cunilam a quibusdam dici. Falsum enim non multo post esse id ipse testatur. Quod autem lib. 20. cap. 15. ab eo dicitur, Cunilæ præter satiuam plura sunt genera, &c. ad Origanum manifeste pertinet: præsertimq; quod de testudinibus cum serpentibus pugnantibus eo loco tradit: si Plutarcho credimus in naturalibus causis dicenti. ἡ δὲ χιλιὰν φάρμακον τὴν σάρκα τοῦ ἑχέως ὀρίανον ἔχουσα, quod & si idem penitus non sit, eandem tamen rationē habet. Quæ deinde statim ab hoc loco descripta ab eodem sunt. Est & alia Cunila a nostris appellata, a græcis Origanum Heracleoticum, ad Origanū similiter pertinent. Cumq; plura Cunilæ genera fecisset, uni ex his omnia Conyzae huius tribuit. Tamq; uagus in hoc Cunilæ nomine, incertusq; est, ut nihil nos ex decretis eius certum asserre audeamus. Quod autem conijcimus, huiuscemodi est. Origanum græci uocant notam omnibus herbā: & ut sit in gentibus, quibus semper & ubique non fuerunt eadem rerum nomina, eandem Conilam uocauerunt. Testisq; hic ipse in Origanis, sed multo certius in Theriacis suis Nicander dicens. κόρχον ἢ μὲν δὲ πάντα πανάρχαιον τιμονίαν, ἢν τε καὶ ἱπράκιον ὀρίανον ἀμφίπουναι. Quorum sensus est. Et corchorū clauso folio, & omnia sanantem Conilam, quam Herculeam Origanum appellant. Nihil aut quorum duorum scriptorum, ut uiderur, certiore fide cōfirmari poterat. Pro compertoq; est, Conilam antiquis græcis Origanum fuisse. Potuitq; Plinius eorum autoritate Origanum Conilam uocare. Nescimus tamen, an Cunilam, quæ si latinis est quæ græcis Conyza, misceri totiens ab eo non debuerat. Suspiciamurq; nos, quod est minimum inter duas has uoces discernimen (una siquidem litera uariant) causam Plinio dedisse, ut diuersas plantas eiusdem Cunilæ nomine totiens misceret: cum tamē Origani græca uox, Conila per, o, latina uero Conyza, modo hæc illi respondeat, per, u, scribenda sit. In græca illa uoce certa omnia sunt: in latina facile est ratiocinari, Cunilam, siue malis Cunilaginem appellare Conyzam hanc, aut illi similem fuisse. Est enim non Plinio tantum, uerum Columellæ, alijsq; scriptoribus frequens hæc uox: Pliniusq; priuatim græcorum Conizam Cunilā manifeste appellauit libro decimo, capite. 20. cum ait. Non potest petris auelli polypus. Idem Cunila admora, ab odore protinus resiliit. Acceptum id ab Aristotele est libro quinto de historia animalium his uerbis idem docente.

καὶ οἱ πολὺ ποδὲς ὅν τω ὄντι προσέρχονται ὥστε μὴ ἀποσπασθῆναι, ἀλλ' ὑπομένειν ἀποτεμνόμενοι. ἴαν δὲ τις
 κανὺσαν προσενέγκῃ ὡς φασὶν ἰνύβη ὁσφραίνεσθαι ἀφ' ἑαυτῶν. Quod ab hoc scriptore relictum, alterius au-
 toritate & testimonio addere placuit. Et ut meminissent legentes, non posse Conyzam terri-
 ri & grauissimi odoris herbam, cum Origanis misceri; neq; si diuersarum gentium uoces for-
 tuito concursu eundem sonum reddant, ideo eandem in illis rerum esse significationem. Fiunt
 enim in græcis & latinis multa huiuscemodi: suum tamen in sua gente intellectum omnes ha-
 bent. Dicimus id, quoniā si latinis Cunila est quæ græcis Conyza, non debuerat uicinitate no-
 minis ad Origanum, quæ Conila græcis est, transferri, & cum illa misceri. Nec dicimus, p co-
 perto habere, latinam, Cunilam græcam Conyzam esse. Verū illud testamur, ex quo tam mul-
 tis ea uox in usu est, in eam partem propensiores esse, & per, u, in principio scribendam: quem
 admodum cum Origanū ostendere uolumus, per, o, illam Cunilā; hanc Conilā dicentes. Pul-
 cariam simpliciter in Aristotele quo diximus loco Conyzam uertit Theodorus Gaza; factū ex
 euentu illi hoc nomine, quia, s. pulceſ enecet; alioquin in nomine nulla est pulicū ratio. No-
 bis Conyzam hanc magis placuit uocare: ut quarto uolumine descriptam, & Psyllion appella-
 tam herbam, certius ex græco nomine Pulcariam appellemus. ψύλλα enim græcis pulex est: &
 ψύλλον herba a pulcibus uocat; q; insectis his similis semina habet parua, nigra, & tota pulicū
 figura. Erit ob eam causam duplex in hoc opere nobis Pulcaria, altera præcedente Conyze no-
 mine signata, altera simpliciter a pulcibus nominata. Quemadmodum tunc etiā iterum a
 nobis dicitur. Habet Conyza hæc pulcaris, quo in græcis modo leguntur, numerosas appel-
 lationes, fereq; omnes incertas: ideoq; non tractandas a nobis, præterq; Dinofmon: quæ uox
 a grauitate odoris illi facta est: & Pissam, quæ pix græcis est, a glutinoso lentore dicta: qd Pli-
 nius significauit dicēs. Trita mellis odorem habet digitis tactu eius coherētibus. Tria eius gña
 Diosc. numerat, maiorem, minoremq; & tertiam inter utraq; mediam: crassiore mollioreq;
 caule: folijs maioribus minore, minoribus uero maiore. Theophrastus alijs nominibus duo
 genera tantum Conyze facit, s. de plantarum historia uolumine, his uerbis. Conyze duo ge-
 nera, mas altera, fœmina altera. Differentias inter se habent, quemadmodum & alia quæ sic di-
 uiduntur. Fœmina tenuiore folio, & constrictiore est, in uniuersumq; minor. Mas maior est,
 crassiore caule, ramosior, & folium maius, pinguiusq; habet, & præter hoc florem magis splen-
 dentē. Semen fert utraq;. In uniuersumq; sero germinat & floret. Nec nisi circa, aut post arctu-
 rum. Grauis masculæ odor, fœminæ acrior. Quam ob causam contra uenenata utilis. Et hæc
 a Theophrasto dicta sic se habent. Quæ cōmentationibus his nostris placuit addere, ut duorū
 scriptorum concursus eademq; historia Conyze cognoscere: & si non iisdem uerbis, neq; eo-
 dem modo ab utroq; omnia dicta fuerint. In Dioscoride autem quod ad floris colorem perti-
 net, qui duplex in cōmuni græcorum lectione legitur, μέλιον ἢ υπόκιρον luteus & subrufus, mu-
 ratum a nobis est: secundamq; illam uocem ὑπόκιρον, quod est, subamarum fecimus, luteum
 & subruffum diuersos colores male coniungi & misceri sentientes: mox monentibus uetustissi-
 mis græcis & latinis codicibus, in quibus amarum adhuc manifeste legitur.

De Lilio syluestri. CAP. CXXXVIII.

GRæci Hemerocallen, alij Hemerocalacton, alij Crinon agri-
 on, alij Crinanthemon, alij Porphyranthes, alij Bulbum hæ-
 maticon, alij Anticantharō, Romani Bulbum, aut Liliū syluestre, aut
 marinum, Aphri Abiblabon uocant. Foliū & caulem habet Lilij, por-
 raceo colore. Flores in caule per singulos exortus, terni aut quaterni ex-
 rumpunt, Lilij diuisura, quoties dehiscere cœperunt. Colore perq; pal-
 lido. Radix magna est atq; bulbosa. Quæ pota, aut cum melle & lana
 in pello apposita, aquam educit et sanguinem. Folia trita, mammarum
 inflammationes a partu contractas, oculorumq; collectiones mitigant.
 Radix & folia igni ambustis utilissime illinuntur.

BARBARI COROLL.

Hemerocalles, Elium a Theodoro dicitur, q; in Dioscoridis exemplaribus deprauatis Eli-
 um marinum dici, a nostris cum florem legisset. Ego Liliū marinum, non Elium in Dioscori-
 L ij

A

B

ἡμεροκαλλίς

Pli. li. ii. ca. ii.

D I O S C O R I D I S

C de legendum arbitror: nam & græce Crinon a quibusdam, & a nostris Lilium idem autor uocari tradit. Coronamētis folio tantum dicata hæc est. Pallidum hoc e uiridi, & molle habet, radicem odoratam. Seritur semine. Antiquus grammaticus Theodorus, cognomine Panages, Hemerocalles Athenis dici prodidit, non florem, sed uellus, aut lenniscum puniceum, & uerſi colorem, quo in ſacris utebantur. Dioſcorides & hanc & Lilium a ueteribus Crinanthemon uocari tradit. Hippocrates quoq; Crinanthemon duplex haberi ſignificat: cum alterum ingreſſe in ædibus noſtris proueniens.

E X M. V E R G. C O M M.

Serebatur quondam in hortis ad coronas Hemerocallis, æmulus cum tota planta Lilio flos, & quaſi rudimentum naturæ Lilia facere conſciſcentis: nunc totis agris, & inter ſegetes præſertim pallore ſuo ſe indicat: longe Lilio minor, figura pene illi idem. Differt tātum, q; in Lilio floribus ſolia cum tota ſe in calathum aperuerunt, reſima a ſuperiore parte ſe inuertunt: in hoc dum deſloreſcat, recta diu rigent. Vnaq; hac nota maxime legentes fallere non poteſt. Color enim non tam diuerſus: licet in Lilio candoris ſuperbia, in Hemerocallide palloris triſtitia ſit: ut non ſimilis, et paulo minus q; idem facile uideatur. Eamq; ob cauſam, a Lilio, Lilioq; ſimilibus alijs floribus pleraſq; appellationes inuenit, Agreſte Lilium, Crinanthemon, quæ Lilio uox etiam adiecta eſt. Porphyranthes, & Bulbus uomitorius: quæ Narcissi nomina ſequenti uolumine erunt. Lilium marinum, & Anticantharon: quæ uox aduerſari ſcarabeis hunc florem ſignificat, quemadmodum & Roſæ: quibus obrutum id animal perire naturales aliqui dixerunt. Breuiſſime Plinius libro uiceſimo primo, capite eiufdem numeri de Hemerocalli hac egit: quodque Porri inter uiredinem palloremq; colorem ea ratione indicans, Nobis ex uerbis ſcriptoris huius rem demonſtrare placuit.

De Viola alba. C A P. CXXXIX.

λευκοίον

Leucoion ex Græcis aliqui Baſilion uocant, Latini Violam albam, aliqui Auguſtiam, nonnulli Violam autumnalē, aut Paſſaſtrinam. Vulgaris eſt notitiæ, ſed in floribus differentia quædam. Nam q; aut cærulei, aut albi, aut purpurei, aut lutei inueniuntur. Luteæ uero præcipui in medicina uſus. Huius aridi flores ſeruſfacti in deſeſſionibus, ualent contra uulua inflammationes. Et menſtrua expellunt. Sanguinant oris ulcera cum melle. Cum cærato rimas ſedis. Semen duum drachmarū pondere ex uino potum, aut cum melle indiūt, menſes, ſecundas, & partus extrahit. Radices cum aceto illitæ lienem reprimunt, & podagricos iuuant.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 21. ca. 11
lib. 6. cap. 19.
The. li. 6. ca. 7

Leucoion, & ſi candidam Violam ipſo nomine ſignificat, tamen & pro lutea, & cerulea, & purpurea ſæpe capitur. Hinc apud Columellam candida Leucoia, quaſi & nigra quædam ſint. Hippocrates certe, nigra inquit, Leucoia quaerantur. Paulus, Ioton inquit oleum, hoc eſt, Violaceum, modo ex purpureis, modo ex candidis, modo ex croceis conſici ſolere Violis. Sciendum & illud eſt, Dioſcoridem hoc loco ſcribere Violam, quæ græce Leucoion dicatur, a Romanis Liguſtiam quandoq; nominari: etiamſi codices ſunt, in quibus non Liguſtria, ſed Auguſtia legatur: ut fortaſſe Columella in horto ſuo intelligat de Viola cum cecinit, Nigro cōmiſta Liguſtro.

Seruius
Liguſtrum flor
ex candidiſſimis
ſed uiliſſimis.

Comperimus Sabina

Liguſtrum arbor eſt

quam graeci Cyprian

nam, & ſolia ſol

uicioribus & ualidioribus

et ſolia ſol

horum candidiſſima

Liguſtrum uocant, & ſolia ſol

Hæc etate ſeruius & odoris gratia ſunt ex Liguſtri

ligno ſeruius

Nam Liguſtrum candidum, pro Cypri flore capitur. Cæterū de purpurea, ſive nigra, ſeorſum poſt dicitur. Cerulea quæ ſit, non conſtat, niſi quis Cyanū hāc intelligat. Eſt aut Cyanus flos, roſam excipiens: cuius color honorem, nomenq; dederit ceruleo. Cyanū Amarāthus excipit. Triuiſalis, ut qdā exiſtimauere, flos eſt Cyanus, in frumētariis haſcēs agro, & hortis q; ruſtico rūt & puellarū corollis, calice Roſarum, ſed ſquarroſo, atq; triſti, ſine odore, utriſq; ſuma coloris eiufſalce. nam & ſeculā ueteres dixerunt falce. Florū porro prima ſe oſtendit alba Viola, nec diu exacta hyeme. Sub idē ſere tempus, exit & Viola cognomēto flamæa, quæ Phlogion uocatur; Sylueſtris tantum ab aliquibus Phlox: ut errare putem, qui Phlogiō candē eſſe cū lutea Viola

scribere, quod quidem ex sequentibus apertissime liquebit. Theodorus flammam uocauit; colore commendabili, odore nullo, semine proueniens coronis: Non est hæc autem Iouis flos, aut quod idem est, Iouis flamma, hoc est, Diosanthos. Idque neu dubitem, facit, quod Iouis flos, licet sine odore sit, & coronarius, & obseruatur semine, tamen æstate floret, non per hyemem, ut Flammea. Plinius quoque, Iouis inquit flos, colore tantum commendatur, odor abest, sicut & illi, qui a Græcis inquit Phlox uocatur. Diximus & Lychmion uocari quandoque Flammeam, sed inter Rosas potius quam Violas. Aliud est apud Græcos Phlogis. Nam & uestis genus significat, quod nos flammeam, et flammearios opifices in Plauto uocamus, & carnem rostram, ut est apud Stratidem. Violarum ergo Alba & Flammea plurimum durat. Sed satius maxima auctoritas Luteolis: qui colos in nuptialibus Flammeis quaesitus, ritu antiquissimo & fœminis totus concessus traditur: ideoque fortasse non numeratur inter principales, hoc est, communes maribus & fœminis: quoniam coloribus societas principatum dabat. Genera Lutearum Tusculana, & quæ appellatur Marina, folio aliquanto latiore, sed minus odorato: in totum uero sine odore, ac minuto folio. Calathiana, munus autumnus. Ceteræ ueris. Proxima ei Caltha est, concolori amplitudine, uincit numero foliorum Marina, quinque folia non excedentem. Eadem odore superatur. Est enim grauis Caltha, non leuior ei, quam Scoparia regiam appellant. Quamquam folia eius oleant, non flores, ut inquit Plinius. Quod autem genus ei sit inter Violas Scoparia regia, parum liquet. Dioscorides Scoparia regiam Naporum generi connumerat. Plinius alio loco Sideritina, quæ latissimo folio sit, Scoparia regiam a nostris dici uult. Viola odor e longinquo suauior, propinquus hebetatur. Vita longissima Candidæ, triennium. Ab eo tempore degenerat & minuitur: floresque assidue candidiores affert. Minor uis est recentibus. Ideoque aridis utuntur post annum. Honor Violis apud antiquos post Rosam & Lilium. Violam iccirco dictam Ion Græci putant, quod cum Io in uaccam a Ioue conuersa esset, terra florem illum pabulo bouis eius fuderit. Nostri quoque Violam, quasi uitulam, imitatione græca uideri possunt, appellasse.

EX M. VERG. COMM.

DEuult candori multum in hoc flore antiquitas, hæc leuem splendoris sui gratiam illi habuit, una ab eo facta appellatione tres alios colores indicans: qui in toto hoc Violatum genere a scriptore hoc numerantur, & uno excepto a cunctis passim quotannis uidentur. Leucolorum enim nomine in græcis omnes indicantur Violæ hæ, quæ primæ flores suos profecerunt, ubi mitior & tepidior aer fuerit ab hyeme statim: ubi asperior & frigidior, postea: ubi quoque autem per uer primæ noui anni aduentum nunciantes, pluresque non uno tantulo tantum, sed uno pediculo florentes: quæ causa fuit, ut a quibusdam Polyphæræ inter alias appellationes dicerentur. Id enim ea vox significat. Florent hæ passim triplici colore, candido, luteo, & purpureo. Qui quartus deinde ab hoc numeratur, ceruleus in Violarum genere hoc, quod sciam, in Italia nullibi uidentur. Ex eo oborta nobis suspitio est, posse in græcis abundare eam uocem; & si in cunctis pariter legatur: is etiam quem nos habemus egregiæ antiquitatis, & fidei latinum Dioscoridem, longobardis literis scriptum, tres tantum colores illos nos omnes numerat: quartus hic ceruleus nullus in eo est. Nec nos tantum illi deferimus, ut utrum uelimus pro cunctis alijs nobis esse, sed accedente rei naturæque & suspicioni huic nostræ hoc ueluti teste, qualiscunque ille est, non fore credidimus inutile hoc etiam legentes monere. Præsertim nullibi, ut paulo ante diximus, ostendente in hoc flore eum colorem naturæ. Alioquin oportebit, quæ primo uolumine in lasine dicta a nobis fuerunt, meminisse: & quæ longius illic de Violis docentur, in hunc locum referre: opinarique in ceruleo colore hoc, aut alijs locis nasci hunc florem. Latè enim pater naturæ uis, & admirabilis eius maiestas: quæ potest multa ubique variare, & quæ nobis, & nostro orbi negauit, alijs dedisse: aut Violarum appellatione alia etiam censeret florum genera. Quales Iesiminos omnes tunc esse diximus, modo magnitudine & forma pares & similes illis sint: & intellexisse in Dioscoride necesse erit, florem quempiam alium cerulei coloris: qualis uerbi causa Cyanus est, sic a Græcis a colore dictus, uulgaris flos, omnibus notus inter segetes, Maio & Iunio mense nascens. Quem rura nostra florem Alysum uocant, triplici & ipsum colore, candido, purpureo, plerumque autem ceruleo. Nobis tamen in priorem illam sententiam inclinatur animus. Credimusque quantum illum colorem huic scriptori temere accreuisse. Utimurque ea ratione præcipue, quod non uerisimile est, miscuisse diuersa simul genera Dioscoridem: & cum de Leucoijs certo scilicet genere priuatim ageret, de cunctis Violis, quæ Græci λευκῶν uocant,

L iij

D I O S C O R I D I S

C agere cogitasse. Obseruauimus enim τῶν ἰῶν, id est, Violarum latius patere appellationem, pluresq; completi flores: Nigram, seu malis ferrugineam Violam, lesminos omnes, Calathianam, & quam Græci Phloga, Plinius Flammeam uocat, pluresq; alios qui figura, quantitate, foliorum positura, aliq; huiusmodi ratione aliqua proprie dictis Violis similes æqualesue sint. λευκοῖων autem triplex tantum hoc genus, quod solo colore differt, quodq; nos paulo ante ex Theophrasto descripsimus. Solæ enim hæ Violæ Leucoia dicuntur. Accedit & illud, q; si Cyanus in hoc genere intelligendus erit, ex qua uoce nos credimus irrepsisse eum colorem in has Violas, uidebitur temere miscuisse Dioscorides, quæ non eodem tempore florent. Illæ enim ab hyeme statim aliquibus locis, ubiq; autem & semper uere florent, Cyanus autem prima æstate tantum. Ille sponte sua in parietibus, & murorum pinnis aliquando, illi inter segetes passim nascuntur. Possunt quidem ambo in hortis conseri, sed nos simplices naturæ natales & notas, non coacta artis opera tractamus hoc loco.

De Cratægono.

C A P. CXL.

κραταιόγονον

C Ratægonum, siue ut alijs placet, Cratænon, folijs tritico simile est, multis calamis ex una radice emicantibus, multorumq; geniculorū. Semine Milij. Nascitur in opacis & frutetosis, summopere acre. Traditum est a quibusdam, quod si bibat ieiuno ore, ter in die post mensis purgatos, tribus obolis in cyathis aquæ duobus mulier, ante conceptionem quadraginta diebus, & uir modo consimili, totidem diebus ante coitum hauriat, uirilis sexus partum futurum.

BARBARI COROLL.

Pli. li. 26, ca. 10.

D

E St & alia Cratægon, siue Cratægonos, siue Cratægonos, quæ Theligonos uocatur. Differentia intelligitur lenitate gustus. Hippocrates Polycriton appellat: quam Cratægonon cæteri, Plinius Cratægonon, spicæ tritici similem demonstrat. Dioscorides Melampyro. Theophrastus lino tritico, id est, λίνω πυριτῶ, fortasse hoc intelligens, quod Plinius culmum, siue spicam tritici. Theodorus nescio q; diligenter lini modo rustum uertit: quia πυρρὸν, non πυριτῶν in Theophrasto legerit. In Theophrasto arboris etiam genus est Cratægos, siue Cratægona: quam Italia uocat Aquifolium: neq; magna ualde, neq; crassa, ligno robusto, uersicolore, flauo, cortice læui, ut Mespilo, folijs item Mespili, hoc est, promissis, uerum latitudine ac longitudine maioribus, nec ad eundem modum serratis, fructu plurimum rotundo: qui mature scens siccatur, nigrescitq; gustu & succo Mespili: sereq; Mespilus syluestris fuerit, ut Theophrasti uerbis utar. Aquifoliam porro, siue Aquifolium, ipse nihil aliud ueteribus fuisse uideo, q; Illicem. Illex porro duo habet genera, minus, & prolixius.

EX M. V E R G. C O M M.

Tota stat gentium uulgiq; fama & fide Cratægoni in scriptore hoc & Plinio medicina: neq; in historia, quod sciam, ex antiquo illo tempore a quoquā additum illi aliquid est. Nos etiā quod præter dicta a duobus his Cratægono adijciamus, non habemus. Monuisse tamē obiter legentes inutile non erit, ideo Cratægonon a græcis dictam fuisse, q; ui, potestatemq; sua κρατὶ τοῦ γόνου, euincit scilicet, superatq; & genituræ dominatur. Potestq; humani seminis naturam ad mares conceptus cogere.

De Phyllo.

C A P. CXLI.

φύλλον

Phyllon aliqui Elæophyllon uocant. Nascitur in saxis, sed quod Thelygonon uocant, est ueluti muscus, folio Oliuæ, magis hærebacei coloris. Caule tenui ac breui. Radice minuta. Flore candido. Semine Papaueris simili, maiore. Sed Arrhenogogon cætera huic simile, solo fructu distat. Habet enim uuas deflorentibus oleis non dissimiles. Arrhenogogon potu, masculi sexus facere partus, ut Thelygonon foeminei proditur. Horum Cratæas author est. Sed huiusmodi historiatus, mihi produxisse uidetur.

BARBARI COROLL.

Phyllon radicē parua. Differt ab hac Phyllitis: de qua diximus. Differt & Phyllandron, siue ut alij scribunt, Phellandron: de quo nihil aliud proditum inuenio, q̄ q̄ in palustribus nascitur, folio Apij: q̄q̄ semen eius propter calculos, & incōmoda uesticæ bibitur. Ab hoc sunt qui Phellandron, eandem esse cum Helioselino, id est, Apio palustri censeant. Herbam quoc̄q̄ illam, quæ a Plinio Silaus appellari traditur in glareosis, ac perennibus riuus, Apij folio nata, quam ad uesticæ incommoda coquendam præcipit. Sunt qui pro Phellandrio Heleoselinoq̄ accipi putēt. De hoc in Sio plura diximus & Lauere. Non Silaum scribi posse, cum inibi, tum in Apologia quoq̄ nostra ostendimus.

EX M. VERG. COMM.

Descripsit Folium hanc, s. de plantarū historia uolumine Theophrastus his uerbis. *ἔνια δὲ ἵναι ἐστὶ τὸ ἀρρενογονεῖν ἢ θηλυγονεῖν. διὸ καὶ καλοῦσι φύλλον τὸ μὲν ἀρρενογονεῖν τὸ δὲ θηλυγονεῖν, ὁμοίαι δὲ ἀμφοῖ καὶ μορφὴν ἔχοντα ὀκίμων. ὁ δὲ καρπὸς τοῦ μὲν θηλυγονοῦ καθάπερ ἑλαιοῦ βρύου ὡχρότερος δὲ τοῦ ἀρρενογονοῦ, οἷον περὶ ἑλαιοῦ ὅταν ἄρτι φύκῃ ἐν τοῦ βρύου δίσκῳ δὲ ὡς περὶ ὄρχιδος ἀνθρώπων.* Quorū sensus sit. Quædam præterea esse maribus, aut alterius sexus concipiendis fecibus apta, eamq̄ ob causam Folium aliam mares, aliam fœmineos conceptus facientem dixerunt: sibi inuicem similes, & Ocimi figuram habentes ambas. Est tamen alterius quæ fœminarum conceptus facit, semen muscoso flori Oleæ simile, pallidiusq̄: q̄ alterius, figura nuper ex muscoso flore incipientis Oliuæ, coherens sibi, geminumq̄ Testiculorum hominis modo. Et hæc quidem Theophrastus eadem huic scriptori, si diligentius omnia expendantur.

De Testiculo Canis.

CAP. CXLII.

TESTICVLVS Canis, quem Græci Orchin, aut Cynosorchin uocant, folijs circa caulem mollis, Oleæ similibus, in terra stratis longioribus, angustis, læuibus. Caule dodrantali, floribus purpureis, radice bulbosa, oblonga, Oliuæ modo angusta, duplici ordine: superiore, quæ plenior est: inferiore, quæ mollior ac rugosior. Eduntur radices coctæ, ut bulbi. Ex quibus si maiorem edant uiri, mares generari dicuntur. Si minorem, fœminæ, alterum sexum. Addunt, in Thessalia mollem mulieres in lacte caprino bibere, ad stimulandos cōitus. Aridam uero, ad inhibendos. Et alterum alterius potu resolui. Nascitur in petrosis & sabuletis.

BARBARI COROLL.

Orchis, qui priuatim Cynosorchis, id est, Testiculus canis dicitur, inueniri solet fere in uineis, folijs ternis, paruis, semipedalibus, radice ad formā testium hominis, alternis annis intumescere ac residente. Atq̄ hic mas est & fœmina eiusdē nominis: quæ distinguitur internodijs, & ramosiore frutice, radice fascini. Nascitur fere iuxta mare Cynosorchis, & Satyrion uocatur, minus proprie. Aliud enī genus est, quod proprie Satyrion appellant, ut paulo post monstrabitur. Est & Orchis cognomine Serapias, de qua modo prodendum.

EX M. VERG. COMM.

Aliter potius q̄ aliud de utraq̄ Orchis, id est, Testiculi huius radice docuit Theophrastus nono de plantarum historia uolumine. Quo loco cum de nouis, & uix credendis plantarum quarundam uiribus ageret, numerassetq̄ fabulosa etiam aliqua de sterilitate, fœcunditateq̄ ad conceptus & partus agere incipiens, subiecit. *καθάπερ ἐπὶ τοῦ ὄρχιδος καλουμένου. διὸν γὰρ ὄντοιν, τοῦ μὲν μεγάλου, τοῦ δὲ μικροῦ, τὸ μὲν μίγαν' ἐνεργότερον ποιεῖ πρὸς τὰς ὁμιλίας, σὺν γάλακτι διδιδωμεν αἰγῶς ὅρτε τοῦ τὸν δὲ ἑλάττω σίνεσται καὶ κωλύει. ἔχει δὲ τὸ μὲν φύλλον σκυλλώδες, λεϊότερον δὲ καὶ ἑλαττον, τὸν δὲ καυλόν, ὁμοιωτάτον ἀπίω.* Quorum summa & sensus est, Quemadmodum in ea quæ Orchis, id est, Testiculus uocatur. Qui cum duo sint, maior aliter, minor uero alter, Maior ad Venerem efficaciorē hominem facit, in lacte capræ, in montibus pastæ sumptum. Minor autem nocet illi & impedit. Haber planta Scyllaceum folium, minus tamen, & minore læuore nitens. Caulem postremo agresti Raphano, quam Græci Apion dicunt, simillimū. Et hæc Theophrastus de Testiculo herba: quam hic petrosis & sabulosis locis nasci tradidit, contra q̄ græcorum & latinorum aliqui testati fuerunt, ad mare nasci affirmantes.

A

Pli. li. 22. ca. 16.

27. cap. 12.

Theoph. li. 9.

ὄρχις

κυνόρχις

B

Pli. li. 26. ca. 10.

C De altero Testiculo. CAP. CXLIII.

Testiculus, qui alio nomine Serapias, Andrea authore, uocatur, quoniam radix inter pauca utilis sit. Folijs est Porri, latioribus, oblongis, pinguibus, ex alarum sinu inflexis. Caule palmeo, floribus perne purpureis. Radice Testiculis simili. Quæ illita tumores discutit. Vlcera purgat, & serpere eadem non patitur. Abolet fistulas. Et illitu inflammationes lenit. Aridæ radices nomas inhibent. Sanatq; oris putredines, & ulcera cacoëthe. Aluum sistunt e uino potæ. De hac, eadem quæ de Testiculo canis produntur.

B A R B A R I C O R O L L.

Orchis Serapias, quæ Triorchin cognominat Aetius, folium habet Scillæ, ut Theophrastus & Plinius testatur: nō Silphij, siue Laseris, ut Theodorus cōuertit, Silphiodes, pro Scillo des in eo legens. Eteim Silphio foliū est Apij, non Scillaceū, aut Porraceū, ut Serapiadi. Spinus huic herbæ caulis, & Apio, i. Raphano syluestri, nō ut Theodorus inquit, Piro similis.

E X M. V E R G. C O M M.

Priori Testiculo cōgener posterior hic est, radicum numero diuersus, & alter ab illo dictus. Duabus em, & quales descriptæ sunt, ille nitū. Hic a Diosco. minimis Testiculis, nullo eorū de creto numero similes radices habere traditur. Ab alijs tñ Triorchis noīatur: manifesto ex ea appellatione argumēto, non duabus, sed tribus testiculatis radicibus niti in terra. Sic em posteriores medici appellauerūt, præsertimq; Paulus Aegineta ultimo suæ medicinæ libro, capite de fordidis ulceribus, *σαρapiάδος τῆς καὶ τριόρχιδος*, id est, Sarapiadis herbæ, quæ & Triorchis dicit. Mox lib. 6. de simplicibus *ὄρχις ἢ σαρapiάς ἢ διὰ τριόρχιν*. Quod est. Orchis, aut Sarapias, quæ quidam Triorchin uocant. Sic etiā Aetius, sic posteriores alijs. Ex quibus uidere licet, non uiricari dixerit, quoniā multos habet radix eius usus, non satis certum nobis est.

D

C De Satyrio.

CAP. CXLIIII.

σατύριον

Satyrium aliqui Trifolium uocant, quoniam tria fert folia, ad terram infracta, Rumici, aut Lilio similia, minora tamen, ac rubra. Caulem cubitalem, nudum. Florem Lilij effigie, candidum. Radicem bulbosam, mali magnitudine, fuluam, intus ut ouū candidam, gustanti dulcem, & ori non ingratam. Quam in uino nigro austero bibere conuenit, contra opisthotonum. Utendū ea dum concumbendū incescit cupiditas. Siquidem ea proniores ad uenerem fieri affirmant.

B A R B A R I C O R O L L.

Satyrii primū genus, caule leui, radice gemina, hoc est, duplici ordine, a Plinio describitur.

C De Satyrio Erythronio.

CAP. CXLV.

σατύριον τὸ ἔρυθρον

Satyriū Erythronion, aliqui Erythraicon, alijs Melion aqueum, alijs Entaticon, alijs Priapicon, aut Satyriscon, aliqui Satyri Testiculū appellant, Latini Molorticulum Veneris. Semine lini, maiore, duro, laui, splendente. Quod fertur, non secus atq; Scincus libidinē excitare. Cortice radici gracili, ruffo. Intus aut album includitur, sapore dulci, non ingrato ori. In montosis & apricis enascitur. Venerem, ut produnt, si oīno manu teneatur radix, stimulat, Eoq; magis si bibatur in uino.

B A R B A R I C O R O L L.

Satyriū hoc notum pastoribus, quoniam arietibus & hircis fegnioribus in potu datur, &

in Sarmatia equis ob assiduū laborem pigrioribus in coitu: quod uitium Proledamū uocant. **A** In totū quidem Græci concitationē hanc uolentes significari, Satyrion, & Satyrifmon, & Satyriflin appellant, ideo & Aristocholix genus unum, quod Polyrizon cognomināt. Satyrion ex facto uocari cenſeo. Herbam quoq; illā Satyrion Indam appellauerim, Theophrasto allatā ex India: cuius contactu libidinē durare septuagesimo coitu meminerit, nec speciem eius, aut nomen aliud reddiderit. Habēt hodieq; Syri herbam simili effectu, Bucheidenq; nomināt, & Indā Satyrion: fortasse cum ea, cuius mentionē Theophrastum fecisse diximus, eandem radice candida & dura, cōmendatiore quo crassior & rugosior, & albior, podagris utili. Est & alia Satyrifini significatio Hippocrati, pro tuberculis prælongis, qualia Satyrionū pingūtur, sub ipsas aures, quæ a quibusdam & Theres, & Pheres appellantur, ut inquit Galenus.

E X M. V E R G. C O M M.
Omnes Satyrin huius appellationes, aut ex colore radices, aut ex uiribus, impetuq; eius ad Venerem factæ sunt. Neq; enim Erythron, & Erythroccum aliud significant, q̄ rubens simpliciter, & ueluti cocco infectum. Quæ deinde uox Entaticos sequitur, non aliunde q̄ ἀνὰ τὸν ἰντρίνθαι est. Græcis enim intendi, & arrire ea uox significat. Quemadmodum Priapiscus, Satyriscus, & Satyrin Testiculus. Omnes enim a salacitate Veneris ad hanc herbam translatæ sunt. Priapum quotidie in hortis suis uidebat antiquitas ad Venerem semper paratum, & qualem in Priapicis carminibus audire adhuc licet.

De Horminō. CAP. CXLVI.
HORMINVM satium a Latinis Geminalis, a Dacis Hormia dicitur. Folijs est Marrubio similis, caule semicubitali, quadrangulo, circa quem eminentiæ siliquis similes prodeunt, quæ ad radicem spectant, in quibus diuersum semen recluditur. Siquidem in syluestri rotundum, fuscumq; inuenitur. In altero nigrum, & oblongum: cuius est usus. Ad Venerem stimulant, cum uino bibi uolunt. Purgat cum melle argema, albuginesq;. Illitum ex aqua tumores discutit. Eo etiam extrahuntur aculei ex corpore. Idem effectus est illitæ hærbæ. Syluestre magis uiribus pollet. Quare unguentis præsertim gleucino permiscuntur.

B A R B A R I C O R O L L.
Horminon amarum, nigrumq;, nec Cumino penitus ab simile, dodrantali Plinio altitudinis: medicamentis annumerandum potius, q̄ inter fruges. Dictum ita, quia Venerem extimulet. Seritur cum Sefama & Irione, omninoq; cum æstiuis, hoc est, cum his quæ æstate ante Ver-giliarum exortum seruntur. Est & Horminiū, siue Hormienon, & Hormenion, sed illud Cor-ruda intelligitur. Plinius huic folium Porri tradidit. Ceteri Marrubio simile fecerunt: qui error fatalis fere Plinio est, ut in Ballote & Stachye.

E X M. V E R G. C O M M.
Frugum generi adnumerauit aliquot locis de plantarū historia Horminon hoc Theophrastus. Idem Theophrastum secutus decimo octauo uolumine Plinius tradidit capitibus. 10. & 7. Quinetiam post hæc. 22. uolumine, capite ultimo duorum generum, & ipse Horminum fecit: alterum nigro, ut hic semine; alterum candido, contra q̄ Dioscorides, qui φαιόν dixit: quæ uoce Græci indicant, quæ nigrescunt magis, q̄ quæ nigra sunt. Alij inter medicamenta, & frutices potius, q̄ inter fruges numerare Horminum maluerunt. In quam partem & nos propensiores sumus. Neq; enim antiquis in usu ciborum fuit, & ætate hac nostra uix ab agricolis cognoscitur. Descripserunt satis id antedicti scriptores, Ciminoq; simile, præsertim semine fecerunt. Ob quam causam nihil ultra de eo nos agemus.

De Securidaca. CAP. CXLVII.
HEdysaron unguentarij Pelecinum, id est, Securidacam uocant. **B** Fruticosa est, folijs Ciceris. Semen rufum in siliquis fert, corniculorum modo aduncis, quod ancipitem securim æmularur. Vnde nos

D I O S C O R I D I S

C men accipit. Amarum gustu. Stomacho utile in potu. Additur in antidotis. Cum melle ante coitus subditum, concipiendi spem adimit. Nas-
citur in segetibus & hordeis.

Theoph. li. 9.
Pli. li. 27. ca. 12.

HEDYSARON, quoniam Pelecinon a Græcis dicatur, a nostris Securidaca nomen habuit, stru-
nicola cauliculis, semen siliquis ternis, quaternisque, quale Git nouimus amarum. Nasquitur in
segetibus. Hac Lentem necari, Plinius, & e Græcis aliqui recentioribus existimant. Theopha-
stus Aphacen, Lentem uero ab Aparina, quæ Lappa sit, strangulari complexu scribit. Ita sape
fallit uocabuli similitudo. nam Græci Lentem Phacon uocant, non Aphacen. Sciebant & hoc
discrimē illi q̄s dubitat sed liberariorū culpā, ut sapenūro cōtingit, hallucinādo suā fecere: q̄d
quidē & nobis accidisse aliquibus locis hoc opere nō dubitamus. hoc em̄ est hominē esse.

E X M. V E R G. C O M M.

NAsci Securidacā in hordeacea & triticea segete hic ait. Secutusq̄ eum Plinius, in segetibus
inueniri lib. 27. cap. 11. tantū testatus est. Theophrastus tamē octauo de plantarū historia uolu-
mine, Lentibus noxiā & pestilentem dicens, non aliter q̄ tritico lolium, & auenā uerisimile fe-
cit, illic potius inueniendam ubi magis grassetur. Hæc enim malorū, nozarūq̄ omnium natu-
ra plerūq̄ est, ut ubi maleficiū suum exercere possint, illic libentius agant, & si recentiora in-
ueniant. Pelecinus ab antiquioribus dicta in græcis diu planta hæc fuit: nec nos, præterq̄ in no-
uissimis scriptoris huius codicibus alio noīe descriptā in Dioscor. hæcenus inuenimus. Is etiā
quē nos egregiæ antiquitatis habemus latinū Dioscoridem, Pelecinū, non Hedyfarum legen-
tibus proponit. Quo fit, ut suspicemur posteriorem hanc esse plantā huius appellationē, & a
suauitate odoris, usq̄ unguentariorū factam huic scriptori a posterioribus græcorū medicis
accreuisse. Dico autē posteriores, qui Theophrastum, & scriptoris huius tempora secuti sunt.
Paulus Aegineta utroq̄ nomine eam in. 6. his uerbis indicauit. Hedyfaron, quæ & Pelecinus.
Eius semen ante coitum ex melle appositum hic ait ἀρόγον esse, id est, sterilitatem facere. Bar-
barus autē aliter penitus uertit, dicens cū melle appositū ante consuetudinē prohibere partus.

D Nos unam eandemq̄ uocis significationem semper secuti sumus; ille quod alijs locis abortiuū
dixerat, hoc loco contrario penitus sensu partus prohibere dixit.

De Onosmate. C A P. CXLVIII.

Onosma aliqui Osmaden, alij Ononin, alij Phlonytin appellant.
Oblonga folia habet, ad similitudinem Anchusæ, longitudine
quattuor digitorum, & duū latitudine, mollia, in terra iacentia. Sine cau-
le, sine semine, sine flore. Radice nititur longa, tenui, infirma, rubescēte.
Gignitur in asperis. Folia in uino pota partus extrahunt. Prægnās si eam
supergradiatur, abortum facere dicitur.

Pli. li. 27. ca. 12.

Onosma, & Oenoma, & Onoma, & Onomis, & Ononis, & Phlōitis, & Phlomis poti-
us, & Hyperbaton nocatur. Folia eius non ad quatuor, sed ad tres digitos longa Plinius scri-
bit, strata in terram, tria, incisaq̄. Quid sit Hippocrati Oxosma, quo Lichenes tolluntur, haud
comperi: nisi quis acetariam compositionem in eo uocabulo contineri censat. Acetum sane
contra Lichenas pollere nemō dubitat.

E X M. V E R G. C O M M.

BReuis, & p̄ter a Dioscoride dicta nulla est Onosmatis huius in alijs scriptoribus historia.
Plinius. 27. uolumine cap. 12. eadē huic scriptori oīa reddidit. Quā solū foliorū longitudinē hic
quattuor digitorū, ille triū fecit. Paulus Aegineta etiā nihil addidit aliud, q̄ acrem amarāq̄ esse:
eamq̄ ob eā folia eius in uino pota enecare simul, & pellere ex uterō humanos fetus.

De Nymphaea. C A P. CXLIX.

νυμφαία

Nymphaea nascitur in paludibus, & stagnantibus aquis, folijs ci-
borio minoribus, & longioribus. Alijs in summa aqua, alijs de-
mersis, pluribus ex radice prodeuntibus. Flore Lilio simili, albo, & in me-

dio crocos habente. Cum defloruerit, ut rotundum malum, aut papae ueris caput, extuberat. Nigro semine, denso & lato, lenti gustus. Caulis est laevis, niger, minime crassus, ciborio cognatus. Radix nigra, scabra, clauae similis. Quae autumnis secatur. Sicca cum uino pota coeliacis, dysentericisq; auxiliatur. Lienem absumit. Radix stomachi ac uescicae doloribus illinitur. Vitiliginis ex aqua emendat. Imposita cum pice, alopecij medetur. Eadem contra ueneris insomnia bibitur. Siquidem ea prorsus adimit. Pota assidue aliquot diebus, genitale infirmit. Idem semen potum efficit. Nymphæae nomen sibi uendicasse uidetur; quoniam aquosa amet. Plurima inuenitur in Helide, in Anygro amne, & in Beotiae Haliarto.

BARBARI COROLL.

Nymphæae radix dulcis: quam & in sole siccant. Nata fertur a nymphea erga Herculem zelotypa, proptereaq; mortua: quare Heracleon uocant aliqui. Alij Rhopalon, a radice clauae simili, laudatissima in Orchomeno & Marathone. Sed & in Creta quoq; ut Theophrastus putat. Boetij Manodion, siue Madon, ut idem Theophrastus indicat, appellant, edentes semen.

Theo. lib. 9.

EX M. VERG. COMM.

Non comparauit Theophrastus nono de plantarum historia uolumine Nymphæam describens, folia eius Aegyptiae Fabae folijs, uerum simpliciter grande folium sub aqua habere dixit. Addidit praeterea, sistendo sanguini utilia esse folia eius, ideoq; trita uulneribus imponi. Quod hic non testatur uesci radice eius gentes in Orchomeno Boetiae, Marathone, & Creta, quibus locis copiosam nasci Nymphæam tradidit. Numeraturq; ab eo inter radices dulces, qualis Scythica est, pluresq; aliae. Satis hic nominis causam declarasse uidetur: & si ex ueteribus fabulati aliqui fuerint, a Nympha priuatum nomen herbae factum fuisse, quae claua ab Hercule interfecta sit, uel ipsa zelotypia eius intabuerit, in palustrem hanc plantam mutata. Vulgaris & nota omnibus herba, qua nihil in palustribus speciosius nascatur & uiuat. Facileq; est ex folio eius, quale Aegyptiae Fabae folium sit ratio cinari. Hoc enim illi comparat Dioscorides. Nec praeterquam figura simile illi facit. Grandius enim illud est, & quale secundo uolumine in Aegyptia Fabae ex ueterum monumentis & historijs descriptum a nobis est.

B

De altera Nymphæa. CAP. CL.

Et altera Nymphæa, cuius flos Blephara dicitur, folijs antedictae. Radice alba, scabra, flore luteo, nitente, Rosae simili. Huius semen & radix, contra sceminarum profluuium efficaciter ex uino nigro bibuntur. Nascitur in Thessalia amne Penco.

BARBARI COROLL.

Nymphæa alia caput habet Rosae magnitudine.

EX M. VERG. COMM.

Quam habet nominis causam Nymphæa, eandem & Nymphon. Folia haec superiori similia habet. Quod discrepat, radice color, & floris, & praeter colorem floris figura est: quae in illa Lili, in hac Rosae describitur. Non facile inuicem discernuntur, nisi quis a primo ex aqua earum emerfu, dum deflorescant, utranq; obseruauerit.

De Androsace. CAP. CLI.

Androsaces, sunt qui Picrada appellant, alij Leucen, alij Thalassiam. Haerba est amara, tenues spargens iuncos, sine folijs. Folliculos in capitulis habens, in quibus semen continetur. Gignitur in Syriæ maritimis. Ea drachmis duabus in uino pota, copiosam hydropicis urinam ciet. Idem effectus est semini poto, & haerbae decocto. Po-

Androsace

M

D I O S C O R I D I S

C dagris utiliter illinitur.

EX M. VERG COMM.

Sapor Picrida, color Leucem, ortus Thalassiam Androsaces uocari fecit. Prima enim uox illa amaritudinem, altera candorem, tertia mare & maritimum significat: quæ tota fere eius historia est. Amarescit enim, albescit, & maritimis locis in Syria nascitur: unde repetenda alia essent. Sed nimis a nostro orbe distat regio illa: ob eam causam Dioscoridis & Plinij in Androsace historia contenti, Asplenon nostro orbi cognitam, neque inuentu difficilem tractabimus.

De Asplenio. CAP. CLII.

Pl. li. 27. ca. 5.

ASPLENIVM aliqui Scolopendrium uocant, alij Splenion, alij Hemionium, alij Pteryx, alij Lonchitium, alij Aturion, alij Phrygium, aut Phrygitum, aliqui Philodotem, Magi mustellæ sanguinem. Folijs est multis, Scolopendræ animalium similibus, ab radice uerna prodeuntibus. Nascitur in parietibus, saxisque siliceis, & opacis. Nec caulem, nec florem, nec semen habet. Folia Filiculæ modo diuiduntur. Subter flauescencia hirsutaque, superne uiridia. Vim hanc habent folia in aceto feruifaceta, ut per dies quadraginta pota, lienem absument. Quibus etiam contritis, lienem ex uino illini oportet. Stranguriæ, & regio morbo prodest. Singultum sedat. Calculos in uesica comminuit. Conceptum adimere creditur, per sese, aut cum muli liene appensa. Tradunt noctu, silente luna, huius rei gratia effodiendam.

BARBARI COROLL.

Pl. li. 27. ca. 5.

D

Asplenon, folijs tristialibus, radice limosa, cauernosa sicut Filicis, candida, hirsuta. Gaudet humidis. Laudatissima in Creta, ubi & repertam Viétruius affirmat, circa Potereum amnem: qui duas urbes Gnoson & Cortynam interlabitur, parte quæ ad Cortynam spectat, pecoribus sine liene inuentis: quia herbam eam roderent, ex altera parte quæ ad Gnosum est, lienem habentibus: quia ibi herba illa non appareret. Theophrastus Hemionion hanc appellat. Theodorus Mulam uertit, folio Scolopendrij, radice multiplici, multosque petrososque planities amat, delectari cibo eius Mulas, & ob id datum ei nomen. Fœminas steriles quæ hanc herbam in cibo sumperint, admixta Mulae ungula, & corio, aut semine: prout aliqui non derma, sed sperme in Theophrasto legunt. Quod autem Scolopendrij folio describit eam, uidetur aliud genus quod Scolopendrium, siue quod idem est Asplenon haberi uoluisse Theophrastus: nisi quod ab eo Scolopendrium, & Scolopendra sumptum intelligat.

EX M. VERG. COMM.

Hemionion Athenis Theophrastus, quod muli libenter ea uescuntur, uocari Asplenon tradit. Cretes Asplenon, quod primi in ea insula Cortynæ obseruauerint, ad Potherieum fluuium pastentia hanc herbam pecora sua, lienem imminuere. Vulgus ubique Splenion, quod longitudine latitudineque sua fasciole, & ut sic loquamur, emplastelli formam habet. Posteriores usque ad ætatem hanc nostram, Scolopendriam, a Scolopendrarum similitudine & figura, quam habet, foliosum magis cespitem quam plantam uocauerunt. Indicata alijs etiam appellationibus est, sed non adeo certa rei indicatione.

De Hemionitide. CAP. CLIII.

Pl. li. 27. ca. 5.

Hemionitis, quam aliqui Splenion uocant, folium emittit Dracontuli, lunatum. Radicibus cohaeret multis, tenuibus. Nunc flores, neque semen, neque caulem gignit. In petrosis nascens, austero sapore. Ea ex aceto pota lienem absument.

BARBARI COROLL.

Pl. li. 27. ca. 5.
lib. 26. cap. 7.

Hemionitis, uidetur esse quam Plinius Hermion, & Teucron, ab inuente Teucro uocata perhibet, uigesimo quinto historiae naturalis uolumine, natam in asperis, austero gustu, nec florem ferentem, neque semen, lienibus medentem: quæ omnia et Hemionitidi a Dioscoride tributa sunt. Nam quod

Plinius iuncos tenues spargentē describit, Diosc. radice multiplici, & exili demonstrauit: q̄ ille folijs paruis, hic folijs Dracuntij, lunæ modo incuruis deliniat, idest, *μνυιδι*, proindeq; non folijs paruis, sed folijs curuis, in Plinio scribendum cenſeo locum eum. Inuentam ſic affirmat, cum exta ſuper eam proiecta eſſent, adhæſiſſetq; leni, eumq; exinanisset, propterea & Splenon uocatam. Sues quoq; qui radicem eius ederint, ſine illo uiſcere compertōs.

EX M. VERG. COMM.

Non temere penitus ſuſpicati ſunt ex antiquis & poſterioribus medicis aliqui, eandem Aſpleno Hemionitum hanc eſſe: nec duplicem, ſed unam utriuſq; hiftoriam & medicinam in ſcriptore hoc legi. Vtraq; enim a multis factō nomine indicatur. Vtraq; nec caulē, nec florem, nec ſemen fert. Vtraq; in petris naſcitur. Vtraq; lienes minuit: & quod in folijs alterius diſſerre uideatur, idē facile eſſe poteſt. Longitudine enim & figura non adeo diſſert a Scolopendria Dracunculus, ut non potuerit alterutro aliquid comparari: diuq; nos in ſuſpitione hac ancipites, autoribus antiquiſſimis, & optimis græcorum medicis, præſertimq; Paulo Aegineta, ſeorſum de utraq; agentibus, ſeorſum tandem de utraq; egimus: illam Aſplenon, hanc priuatim Hemionitum uocari tradentes: congenerem illi quidem, foliorum tamen aliqua diuerſitate diſſimilē. Nec uiribus æqualem. Si quidem extenuat Aſplenos, non tamen calet. Hemionitis adſtringendi uires cum amaritudine habet: ut teſtari de utraq; meliores græcorum medici fuerūt. Magna inter eas foliorum ſimilitudo: quæ non ſatis fuiſſet, ſimpliciter lunata dixiſſe a ſcriptore hoc *μνυιδι* appellata. Habet enim id ſidus plura luminum incrementa: eademq; luna, non eadem luce ſemper fulget, ſed eſt cum toto orbe fulgens, totam illuſtrat noctem. Eſt cum utrinq; gibboſa, quam ueteres græci *ἐμφύρτον*, ut illam *πανέλληνον* uocant, maiorem noctis partē copioſa impleat luce. Eſt cum dimidiato globo ſplendens, *διχόμηνος* a græcis dicitur. Eſt tandem cum a ſole digrediens uſq; ad quartam diem, non multa luce adhuc fulget: eoq; tempore græci plerumq; *μίνν* uocant. Et in hoc lunæ interuallo Hemionitidis folia ſideri illi comparauit hic ſcriptor. Alioquin ſi lunatum ſimpliciter eius folium dixerit aliquis, incertam ex incerta eius ſideris quantitate & ſpecie figuram ſignificabit. Veritq; nos, ne quod in lunæ amoribus fabula q̄ aliqui ſunt, nobis accideret, pluribus græcam uocem *μνυιδις* uertimus: diximusq; lunę nō dum tumentis in globum, ex Hemionitidis folio lunæ lumina deſcribentes.

De Anthyllide. CAP. CLIII.

Anthyllis, quam quidam Anthemida uocant, alij Eranthemin, *ἐρανθιδις* alij Leucanthemon, alij Soranthin, alij Campeſtrem florem, Romani Solaſtrum, duplex eſt. Quædam enim Lenti ſimillima, folijs mollibus, rectis ramulis, palmi altitudine, radice parua, tenui. Naſcitur in ſaliſ terris, & a ſole illuſtratis, non in ſulſo guſtu. Altera eſt folijs ramuliſque Triſagini ſimilis, hirtuſioribus tamen, breuioribus & aſperioribus. Flore purpureo, odoris admodum grauis. Radice Cichorij. Pota drachmis quatuor, urinæ difficultati, renibuſq; plurimum prodeſt. Tritæ, uulue pituitas emolliunt, cum roſaceo & lacte impoſitæ. Vulneribus medentur: quæ autem Triſaginis ſimilitudinem refert, pota cum aceto mulſo comitiales ſanat.

BARBARI COROLL.

Anthyllis, & Anthyllion, & Anthycellion uocatur. Genus eius primum in ſabuloſis. Alterum naſcitur in ſaxoſis. Eſt & in Aegypto fructus non quidem Anthyllion, ſed Anthaliō uocatus, a Theophrasto Malum Anthali, magnitudine & rotunditate Meſpili, ſine nucleo, ſine cortice, folijs Cyperi: haud procul a Nilo, etiamſi Plinius ſcribat longius a flumine. Decoquit ibi hæc in Bryto hordeaceo, uehementer iocunda & dulcia, & quæ bellariorum uicem in ſecundis menſis impleant.

Pli. li. 21. ca. 29
lib. 26. cap. 8.

De Anthemide. CAP. CLV.

Anthemida aliqui Leucanthemon, alij Heranthemon, quoniam uere floreat, alij Chamæmelon, quoniam mali odorem habet.

ἀνθημίδα

M ij

D I O S C O R I D I S

C beat, nonnulli Melanthemum, alij Chrysocomam, alij Calliam, Romanij Mallium, Aphri Astartiphen appellant. Genera eius tria, tantum flore distantia. Rami palmum non excedunt, fruticosi, alis multis, concavi. Tenuibus ramulis, rotundis capitulis, floribus in medio aurēis, foris secus orbiculato ambitu, candidis, melinis aut purpureis, magnitudine foliorum Rutæ. Nascitur in asperis, & iuxta semitas. Colligitur uere. Vim habent radices, flores, & herba excalfaciendi, extenuandiq; Potu & infusione pellunt menstrua, partus, urinam, calculosq; Aduersus inflammationes, & ilei tormenta bibuntur. Bilem suffusam expurgant. Locine rum uitia sanant, Decocto earum uesicæ fouentur. Ex omnibus his generibus ad calculos efficacissima est, quæ florem purpureum habet, cuius amplitudo maiuscula est. Hanc proprie Heranthemon uocant. Ea cui Leucanthemo nomen est, item quæ Chrysanthemon dicitur, uementius urinam ciunt. Aegylopijs illitæ medentur. Comanducata, ulcerum eruptiones in ore sanant. Nonnulli in clysteribus ex oleo utuntur. Teruntur in farinam ad abigendos febrium circuitus. Flores & folia recondi debet, & priuatim tusa, in pastillos digeri. Radix quoq; sic cari, dūq; ingruit necessitas, binæ partes herbe dari, modo floris aut radicis pars una, modo contra, floris partes duæ & herbe una, permutatim duplicato pondere alternis diebus. Bibere autem oportet in uino mulso diluto.

Pl. li. 22, ca. 21
The. li. 7, ca. 13

B A R B A R I C O R O L L.

Anthemis, quæ & Leucanthesis uocatur, per ea quæ Chamæmilon uulgo dicitur, magnis est ab Asclepiade celebrata laudibus. Theophrastus Anthemon, & Anthemion appellat, quæ Dioscorides Anthemida, & Hippocrates (ut arbitror) Euanthemion. Duo genera constituens. Vnū eius, quæ ab radice distaxat foliata sit. Alterum quæ caule tñ. Desfluere incipit utriq; catuminibus, cū ceteræ ab imo incipiant. Flore candido, in orbem medijs herbaceo. Semini colos q; florari. Decidere hoc sicut & spinosis, cōceptaculo inani relicto. Theodorus Anthemō, per Melanthion uidetur intellexisse, ut qui Nigellam interpretatus sit. Reponuntur Anthemidis flores in coronamenta, sed collecti uere. Est & saltationis apud Athenæum cuiusdam popularis nomen Anthema, cum illo ioculari numero. Vbi rosa, ubi Viola, ubi florens Apium? Vbi hæc rosa? ubi hæc Viola? ubi hoc florens Apium?

E X M. V E R G. C O M M.

In Anthemide hac nulla est ex tam multis appellationibus, quæ non certam & rei coniunctam significationē habeat. Omittimus quas hic ipse declarauit Eranthemion, quæ uere floreat: & Chamæmalum, quæ pomi odorem habet dici. Ceteræ etiam ex floris colore, odore uel cōsensu aliorum gentium factæ sunt: quæ ut interiorem, exterioremue floris colorem magis amauerant, sic Leucanthemon a colore albo, aut Chrysanthemon, Chrysocomenue a flauo auri colore eam indicauerunt. Vtroq; enim modo in scriptore hoc legitur. Quemadmodum ab odore Mali quæ habet, Malanthemon. Mali enim florem ea uox significat. Libet his addere a Theophrasto libro de plantarum historia octauo, sæpius genere neutro Anthemon dictam fuisse. Et qui passim in græcis modo leguntur, dodrantes ramuli, in uetustissimis utriusq; gentis codicibus, duorum dodrantum altitudine herbam describunt. Nec multo post, ubi passim legitur, κλωνία, ἢ μικρά λεπτά φυλλάρια, legi oportere, non ramulos, sed foliola. Prius enim de ramis actum fuerat, tunc autem de folijs herbe agendum erat. Inducant id uetustissimi græcorum codices, & antiqua Dioscoridis interpretatio: quorum ope nos quæ miscuerant alij interpretes, redire in sua loca cōegimus: diximusq; foliolis paruis, tenuibus, numerosisq; &c. Cetera in Chamæmalis satis nota per se sunt, ideoq; a nobis longius non tractanda.

¶ De Parthenio. CAP. CLVI.

PArthenium aliqui Amaracon uocant, alij Anthemida, alij Leucanthemon, alij Camemelon, alij Chryfocalin, alij Melabathron, nonnulli campestem florem, Romani Solis seculum, aliqui Millefolium, Ethrusci Cautam, Aphri Thamath. Folijs est Coriandri, tenuibus, flore per ambitum albo, intus melino, odore graui, sapore amaro. Siccatum cum aceto mulso, aut sale potum, non secus atq; Epithymum, & bilem & pituitam detrahīt. Suspiriosis prodest, & melancholicis. Hærb sine flore a calculosis, et anhelatoribus magna utilitate bibitur. Valet decoctum ad insedendum in duricia uluarum & inflammationibus. Illinitur sacro igni & collectionibus cum flore.

BARBARI COROLL.

PArthenij flos odorem habet Mali. Nascitur in sepibus: Matricaria dici eā multi putāt. Sunt qui Cotulam appellēt. Nam & ipse Dioscorides testatur ab Ethruscis uocari Cautā, unde Caula deducitur, ac deinde Cotula. Sed & Leucanthen, & Tamnaciū Plinius hanc appellat. Nisi librariorum menda sit, Tamnaciū p. Amaraco scribentium. Nam & Amaracus a Diosc. uocāt: nec aliter a Galeno, atq; Paulo. Celsus apud nos Pallectiū, & Muralium appellat, ut Plinius intelligit. Ego Celsum de alia Parthenio Muraliū dixisse autumo: quæ non in sepibus, sed in muris, parietibusq; nascitur: ob id & Parietaria uulgo nominata, ut in Helxine docuimus. Est & Parthenis pro Artemisia: quanq; sunt qui Artemin legant, nō Parthenin, castigando protinus errore medicorum: q; Parthenion, de qua modo loquimur, Artemisiam esse uoluerunt. Apud Hippocratem quæ sit herba Parthenion cognomento Microphyllon, hoc est, Paruifolia, dubitatur a Galeno: qui Dioscoridem pro Helxine, aut etiam Mercuriali capiedum existimasse scribit. Sed quid si eam pro Artemisia secundo genere Hippocrates intelligit, cuius minuta folia traduntur: aut etiam pro Matricaria, de qua hic agitur, quæ folijs Coriandri describitur?

EX M. VERG. COMM.

Alia hæc Parthenion est ab ea quam Celsus lib. 3. Perdiciō uocari etiam tradit, reprimereq; simul, & refrigerare. Illa Elxine muralis, & Perdicion dicta: hæc pluribus ab Anthemide inuentis appellationibus, similis congenerq; illi credenda est. Illa a Nicandro in Theriacis uenentis mederi prodita: hæc sanandis suspirijs, atræ bili, calculosisq; inflamatis, duratisq; muliebribus locis apta. Hæc Chamemalo similis, flore per ambitum candido, in medio luteo, illa Mercurialis herbæ folijs descripta: & ne longiores simus, notis omnibus inter se diuersæ, solo eodē nomine legentes fallunt. Fallit autem non nomine, sed re Parthenion, tam similis Chamemalo, ut pro eā sæpius ab impitis carpatur. Habet enim illi similem paulominus q; in cunctis florem. Differt magnitudine, quæ in Parthenio amplior undiq; est. Differt et figura, q; coloribus in utriusq; flore paribus Chamemali flos in medio tumet, & in altum erigitur: folia uero ad terrā inflexa descendunt: in Parthenio folia medio exequata per ambitum stant. Nobis ex his quæ diu obseruauimus, inclinari animus, Chamemalo cōgenerem esse: & ut in plerisq; alijs sit, nota aliqua priuatim ab alijs dispesci, quæ in Parthenio hac uirosus odor est. Quemadmodum in Bonis oculo, quæ uox dicenda erit, sola magnitudo, qua a Parthenio hac illa distinguitur.

¶ De Bupthalamo. CAP. CLVII.

Bupthalamon quidam Cachlam uocant, alij Balsamenam, Magi Hæmoran, alij Mercurij genituram, alij Aphthitis semen, aut Mnesitheum, Romani Cappacoraniā, Aphri Narat. Tenuis emit tit cauliculos, mollesq; folia Fœniculi, luteum florem Anthemide maiorem, oculi similitudine. Vnde nomen traxit. Circa oppida nascitur, et in campestribus. Flores cum cærato triti, tumores duriciasq; discutiūt. Aiunt epotam post exitum a balneis, regio morbo correptis, colorem

M iij

A

παρθένιον

Pli. li. 22. ca. 17
lib. 21. cap. 30.

B

βούφθαλλος

C tractu temporis reddere.

Pli. li. 25. ca. 9.

B A R B A R I C O R O L L.

Buphthalmos, siue Buphthalmon, siue ut Hippocrates Buanthemmon, fruticosa caulibus, qui & manduntur decocti. Flores huius maiores multo, acrioresq; sentiuntur, q; Anthemidis. Differt a Butomo frutice palustri, Orchomenio lacu plurimo, caule inoffensissimo, peculiari quodā leuore, folio harūdinis angulari, fructu nigro, Malī amplitudine, sexu duplici. Mas fecundus, foemina uiciliū ad nexus utili. Pars ab radice tenera manditur, puerorum cibo grata. Buphthalmon uero eandem esse cum Chrysanthemo uocata, puto, de qua sequenti libro Dioscorid. hæc ipsa repetit. Facitq; quod Alcmā poeta, Calchan, siue Cachlan, hoc est, Buphthalmon, ita nominat, ut aureum torquem ex huius constare floribus ostendat, χρυσίον ἔργον ἵκων φαδινὰν πετάλοισι κάχχαν. Nicolaus Damascenus, lacum sub Alpes esse scribit. Multorum stadio rum circuitu, ubi toto fere aīno flores suauissimi odoris & coloris prestantissimi per ambitum uisuntur, similes Buphthalmo. Nō uidetur hæc Buphthalmos esse, quam rustici Bouis oculū, & Cottulam cognomento, foetidam ab odore appellant, pratensam herbam, q; eius candidi flores sunt, Buphthalmi uero lutei, ut Dioscorides & alij testantur: etiam si cætera satis cum ea congruāt. Est & alia Buphthalmos, de qua in Cucumere syluestri diximus. Buphthalmon Dioscorides & Hæluron dici meminit. Ego & Hælurion uocari quandam stirpem lego apud Photionem: diuersa, nec ne sit, haud constat. Porro Hæluos animal est, quod nos Felem appellamus, uulgo, ut qdā interpretantur, Cattus: quod & Aegiluros quoq; dicitur a poetis. Inuenio & Chalcan uocari purpurā, & herbę genus, quo purpura tingit, apud Photionē grāmaticum.

E X. M. V E R G. C O M M.

Quæ Solis oculū Parthenion uocari causa fecerat, per ambitū floris radiata folia, & in medio discus colore luteo, eadē similit̃ illi Buphthalmon nominari fecit. Figura floris em̃ in utraq; paulo minus q; eadē: sola magnitudo discrimen facit. Eamq; ob causam, nomen hæc sibi a maiore maioris quadrupedis oculo inuenit, Bouisq; oculus dici uoluit: & si a magnitudi ne oculi simpliciter potius dictā forte aliquis non male credat, præsertim dicente hoc ipso sim pliciter esse ὀφθαλμοειδῆ, quod tantum figura & specie oculi significat. Plinius tamen. 25. uolumi ne, capite. 8. his uerbis eam describit. Est & Buphthalmos similis boum oculis. Quem nos se cuti, Bouis oculum interpretati simus.

D

γλυκύσθηρ
παιονία

De Pæonia. C A P. CLVIII.

Pæonia mas, siue Glycyfide, Græcis aliquibus Pentoboron di citur, alijs Orobælion, quibusdam Orobax, alijs Hæmagogon, alijs Pēscēden, alijs Monogeniō, alijs Meniō, alijs Pæoniō, alijs Panthice ratos, alijs Idei Dactyli, alijs Aglaōphotis, alijs Theodoniō, alijs Seleni on, Magis Selenogonō, alijs Phthisis, Romanis Casta. Caulis altitudine sesquipedis adolefcit, comitātibus multis stolonibus. Huius duo gñā, Mas folia luglandis habet. In femina uero Smyrniī more diuiditur. Summo caule siliquas emittit ueluti græcas nuces. In quibus quum de hiscunt, multa granula rubra, acinis punicorum similia, inueniuntur, & in medio nigra, quinq; aut sex, purpurea. Radix maris tenuis, digitali crassitudine, & palmi longitudine, gustu adstringens, alba. Fœminæ ra dicibus ceu glandes circiter septem aut octo inherēt, ut in Hastula re gia. Fœminis a partu non purgatis, sicca radix datur. Ciet menses nu cis græcæ magnitudine pota. Sic uentris doloribus cum uino auxilia tur. Valet contra regium morbum, & renum ac uesicę dolores. Decoz eta in uino, aluum sistit. Rubra grana rubenteis menses sistunt, decem, uel duodecim pota in uino austero & nigro. Stomacho & erosioni bus eius esse prodest. A pueris pota, initia calculorum eximunt.

A Grana nigra auxiliantur suppressionibus nocturnis, uulua strangulationibus, & matricis doloribus, quoddecim numero pota, in aqua multa, aut uino. Nascitur in altissimis montibus, & promontorijs.

B A R B A R I C O R O L L.
V Etuissima inuenta Pæonia est, auctorisque nomen retinet. Theodorus apud nos Dulcissimam uocauit: quia Glycyfiden Græci quoque dicerent. Nascitur opacis, syluosisque montibus. Caule palmorum duum. Inuenio & digitorum quatuor, ab eodem Plinio descripta, cute Lauri subrutila, agnascens duobus, aut tribus, ferente in cacumine, uelut amygdalis quatuor aut quinque. folio nucis pinguiore, rotundioreque ac minore. Inhaerent & radicibus maris glandulae, sed plures quæ octo: quoniam non una radice nituntur. Fœminæ folia myrrham redolent, & densiora sunt. Radices, fructusque legi noctibus præcipiunt: quia Picus Martius interdum facere dicatur impetum in oculos: alioquin effodientibus radicem Pæoniæ, sedes procidit, si Theophrasto credimus. Confictum id ad uenditationem rei Plinius existimat. Hanc & Ephialtion uocabant antiqui, utpote contra suppressiones incuborum, faunorumque nocturnas ualentem. Seleucus Glycyfiden, pomi genus, specie fici tradit, quod mulieres maxime deuitent, in saturationis metu. Ita enim μεταίσμων interpretor. Glycyfida porro dicta est Pæonia, quæ acinos Mali punci similes habere uideatur. Nam Sidan, Malum punicum a Boëtis uocari, supra docuimus.

Pli. li. 27. ca. 10

E X M. V E R G. C O M M.
V Num Pæoniæ genus tantum tradidit Theophrastus libro. 9. de plantarum historia, quo loco, nisi a Plinio ipsdem uerbis redditum esset, quod ab eo traditur, non diceremus. Id huiusce modi est. ἀλλὰ τὰ τοιαῦτα ὡς ἐπὶ κήρυκα καὶ πύργων. ὅσον τὴν παιωνίαν οἱ δὲ γλυκύσιδον καλοῦσι νύκτωρ κελύουσιν ὀρύττειν, ἵνα γὰρ ἡμέρας, καὶ ὅρθῃ τὴν ὑπὸ δρυνοκαλάπην τὸ ὡν καρπὸν ἀπολήγαν, κινδυνεύει τοῖς ὀφθαλμοῖς. Quorum sensus sit, ut Plinius etiam reddidit (uerum adijciuntur hæc, & ex longinquo) Quemadmodum Pæoniam, quam Glycyfidem uocant, noctu effodi iubent: quoniam si per diem fodiatur, uideatque Picus auis, qui semen legit oculis periclitatur. Vidimus nos, renascentemque aliquot annis utramque Pæoniam obseruauimus: & ex his, quas habebant ambæ præcipuas & certiores notas, folia scilicet, caules, folliculos, & in folliculis semina, nihil scriptoris huius historię aptius respondere uisum est.

B

De Lithospermo.

CAP. CLIX.

LITHOSPERMON alij Aegonychon uocant, alij Leontion, alij Leoninum lapidem, alij Gorgonion, alij Tantalitin, alij Diosporon, Romani Columbam, Daci Gonoletam, alij Heracliam. A feminis duricia nomen accepit. Folijs est Oliuæ longioribus, & latioribus. Iacent humi, quæ ab radice exiliunt. Ramulis furculosis, rectis, tenuibus, firmis, crassitudine iunci. In quorum cacumine bifidi exortus, cauliculorum speciem exhibent. Folijs longis, inter quæ paruum semen, rotundum, Erui magnitudine, duricia lapidea. Nascitur in asperis & æditis locis. Vim hanc habet, ut semine cum uino albo poto, calculus frangat, pellatque urinam.

λὶθόσπερμον

B A R B A R I C O R O L L.
Lithospermon, herba quincuncialis, fere folijs duplo maioribus quæ Rutæ. Gerit iuxta folia singulas ueluti barbulas, & in earum cacuminibus, lapillos uelut aurificum arte, inter folia eius alternos, candore & rotunditate margaritarum: ipsi qua pediculis adhæreant, cauernulas habent, & intus semen. Nascitur & in Italia, sed laudatissimum in Creta: lacere, atque humi serpere auctores tradunt. Plinius uulsam, non hærentem uidisse meminit. Hanc a Theophrasto Diospyron, quasi Iouis triticum appellatam arbitror, ut in Ceraso commonui. Lithospermon, & Aetonychon, nonnulli dixerunt. Est & alia Lithospermon, nihil a supradicta differens: nisi magnitudine: ut quæ non serpat, sed arbuti modo fruticet.

Pli. li. 27. ca. 11.

E X M. V E R G. C O M M.
Theophrastus Diospyron inter segetes nascentem herbam, aut hanc, aut huic similem indicat, Fecit eadem soliditatis ratio, ut Hercules etiam diceretur: facilis inuenta herba: tamque certis

M iij

D I O S C O R I D I S

C. notis, ut nullibi legentes possit fallere. Nos sæpe uidimus, sed multo minore semine, q̃ Plinius tradiderit: qui libro. 27. capite. 10. magnitudine Ciceris semina eius describit. Quæ aut nos uidimus, magnitudine grandioris Milij erant. Cætera eadem illi & naturæ sunt. Nec quicq̃ felicius in descriptione eius a Plinio dictum est, q̃ cum dixit: tantus est decor, ueluti artificum arte inter folia indicantibus margaritis. Illis enim duricia, læuore, rotunditateq̃ optime comparata fuerunt. Color tamen liuescens in his seminibus est: qui in margaritis candidus passim uidetur. Sed hæc terræ, cœliq̃ bonitas uariare facile potest.

¶ De Phalaride.

C A P. CLX.

φάλαρις

Phalaris cauliculos emittit, quales Zea, e minutis, ac nullius usus radicibus, multos, duum palmorum, geniculis cinctos. Semen candidum, oblongum, Milij magnitudine. Tunditur, & in aqua, aut uino succus ad uesticæ cruciatus utilissime bibitur. Semen cochleari mensura potum, ad eadem efficax est.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 27. ca. 12.

Phalaris, caulem habet longum in summo flore, qui spicaceus a nobis uisus est, inclinatum, semen simile Sefamæ.

E X M. V E R G. C O M M.

Ostenderunt nobis herbarij aliquādo uno tantū culmo magis q̃ caule, aut calamo, ex terra surgentē Phalarim. Verioremq̃ Plinij q̃ scriptoris huius historiā fecerunt: qui thyrsum habere tenuem, longū ceu calamū eam ait. Hic tamē numero multitudinis καυλία πολλά, quod est, coliculos multos illi tribuit. Cætera omnibus eadem erant. Erant & in ea quam uidimus folia alternis hinc & hinc per interualla toto caule disposita: & in summo ceruleus spicatus flos, sed raris in spica illa floribus.

D

ῥυθροδάκτυλος

¶ De Rubia.

C A P. CLXI.

ERythrodanū aliqui Teuthrion, alij Dracanon, alij Cinnabarim, Latini Rubiam, Etrusci Lappam minorem, Aegyptij Sophobi uocant. Radix rubra est, qua tinguntur lanæ. Vna sponte provenit. Altera feritur, ut in Thebana Galileæ, & Rauenna Italiæ. In Caria inter oleas, ut in aruis solo creditur. Hanc non sine quaestu ferunt. Namq̃ maximum ex ea sentiunt prouentum. Asperi caules, & quadranguli, longi, Aparinæ non dissimiles, robustiores, & multo maiores. Folijs per interualla certa circum articulos stellatim decussatis. Semen eius rotundum, inter initia uiride, mox rubrum, postea cum ematur uir nigrum. Radix tenuis, longa, rubra. Urinam ciet. Qua de causa regio morbo opitulatur, pota cum aqua mulsæ. Item Ischiadicis, & resolutis. Crassam, copiosamq̃ urinam pellit, nonnunq̃ & sanguinem. Bibentes tamen quotidie lauare oportet, & excrementorum quæ redduntur differentiam spectare. Aduersus serpentium morsus, succum ex uino bibere prodest. Semen ex aceto potum, lienem absumit. Imposita radix trahit partus, menses, secundasq̃. Albæ uirilgini, illita ex aceto medetur.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 24. ca. 11.

ERythrodanum, & Ereuthodanum dicitur, folium Hederae, sed rotundius, serpit humi, ut gramen, locis umbris conspicienda, quinis per genicula caulium folijs. Laudatissima Italica, & maxime suburbana, & omnes pene provinciæ scatent ea. Radice amara, & Anchusæ modo rubicunda, uelleribus tingendis, & pellibus perficiendis utili, præsertim Italica, ut Democrito placuisse dicunt: ob id a quibusdam appellata Byssos. Cæterum Byssos proprie Lini genus est, de quo Plinius. Honor inquit proximus Byssino, mulierum maxime deli-

cñs, circa Elín in Achaia genito, quaternis denarijs stipula eius permutata quondam, ut áuri. Pausanias, Byssus inquit, non alia Græciæ parte nascitur, q̃ in Elide, tanta tenuitate, ut ne Iudaicæ quidem Byssó cedat: etiam si colore minus rufier, q̃ Iudaica. De Byssó Iudaica pleni sunt sacrarum literarum codices.

EX M. VERG. COMM.
V Edigal rusticæ plebi non contēnendum, tota Ethruriá, Florentinocq; præfertim agro ex non multo tempore Rubia est: noueruntq; eam pueri oēs per hyemē, quo tempore a rustico omni alio opere cessant, radices eius paruo ligone in sepibus eruscantes, inuentasq; & effossas tingendis lanis utiles uedentes. Radices eam lanariæ officinæ simpliciter in gente nostra uocant. Reliquū uero uulgus, q̃ asperitate sua tractata manibus picis modo hæreat, manus Piceantē noiant: nihilq; modo notius est, in sepibus, & ut passim uidere licet, umbrosis locis ubiq; nascentem. A rubore radices, quo lanæ & coria tinguntur, factum illi nomen est. Quemadmodum & a latinis ob eandem causam Rubiam dici ratiocinari facile est.

De Lonchitide. CAP. CLXII.
L Onchitis, quæ Cestron, aut Medusa alio nomine dicitur, latine Venerca, aut Lanceola, folia habet latioris Porri, rubentia, plurima, ad radicem circumfracta, ueluti in terrā procumbentia, pauca in caule. In quo flores ceu galericuli hiantibus comicis personis similes, nigri, & uelut e rictu albam exerentes linguam, quæ ad labrum inferius semen promat, lanceæ simile, triangulum. Vnde sibi cognomen tum arrogauit. Radix Dauci. Nascitur in sitientibus & asperis. Radix ex uino pota urinam ciet.

BARBARI COROLL.
L Onchitis, non ut pleriq; existimauerunt, eadem est quæ Xiphion, & Phasganion. Qz q̃ semine cuspidaceo, radicibus prælongis.

EX M. VERG. COMM.
E Gregius & speciosus Lonchitidis huius flos est, & qualem hic describit in uerso pileolo similis, colore in purpura nigro: qui theatralis laruæ, & histrionicæ personæ rotunditate sua formam referat: ex cuius medio, quasi ex aperto & hiant ore, candido colore se profert, ueluti lingua. Ob quam causam aliqui Medusam, & florem, & ex eo plantā dixerunt, Gorgonis defecto capiti similem. Qua specie in antiquis monumentis, monstri eius caput adhuc uidetur, q̃ maxime potest aperto ore linguam exerens. Cur autē Romani Venercam dixerint, non satis certum nobis est: nisi forte folijs Acoro, quæ Venerca dicitur, quadamtenus similis hæc sit. Quemadmodum quod nam lati seminis, aut fructus Porrum hic dicat: cui Lonchitidis folia a principio statim comparat. Nullum enim huiusmodi Porri genus in plantarum historia, aut medica materia auditur. Nisi forte capitatum ea uoce intellexisse oporteat.

De altera Lonchitide. CAP. CLXIII.
A ltera est Lonchitis, quam aliqui asperam Lonchitin, Latini Longinam, aut Calabrinam dicunt. Folia Scolopendrij emittit, sed asperiora, maioraq; ac multo magis diuisa. Vulneribus mirum in modum prodest. In eisq; inflammationes excitari non patitur. Pota ex aceto lienem absumit.

De Althæa. CAP. CLXIII.
A lthæa, quā alij Althiocon, alij Ibiscū uocant, in syuestriū Maluarū gñe est, cui folia ut Cyclamino rotūda, lanugine canescūt. Flore rosaceo, bicubitali caule. Radice lenta, intus alba. Althæa appellat, q̃ inter primas sit utilis, et plurib. polleat remedijs. Decocta em̃ in uino, aut aqua mulsā, in potu efficax ē cōtra uulnera, parotidas, abscessus, māmārū

A

λογίτις

Pli. li. 26. ca. 8
 lib. 25. cap. 11.
 B

τραχύτις
 λογίτις

αλθαία

D I O S C O R I D I S

C inflamationes, attritus sedis, inflatiōes, neruorū rigores. Siquidē discutit, & excoquit, rumpit, et ad cicatricē perducit. Cocta, ut dictum est, adiecto suillo adipe, aut anserino, terebinthinaue, ut malagmatis lentor fiat, facit ad uulua inflamationes, preclusionesq; in pessis subdita. Decoctum eodem fungitur munere. Onera uulua, reliquiasq; a partu extrahit. Decocta succus ex uino potus, succurrit urinæ difficultati, calculosorum cruditatibus, dysentericis, ischiadicis, tremulis, ruptis. Dentium multet dolorem, cum aceto decocta, colluto inde ore. Viride semen, siccūq; tritum, uutiligines in sole perunctas emendat. Eodem cum oleo peruncti, a uenenatis non feriunt. Valet contra dysenteriam, & sanguinis reiectiones, aluiq; profluuium. In posca, aut uino decoctum bibitur, contra omnes uesperum, apum, similiumq; aculeatos ictus. Folia cum olei momento, moribus & igni ambustis illinuntur. Constat, aquam trita radice addita, sub diuo addensari.

B A R B A R I C O R O L L.
Medici Althæam uocādo, ut Theophrastus inquit, Maluam syluestrem intelligunt, ab excellentia effectus. A quibusdam Aristalthæa dicitur, Anadendromalache a Galeno. Item E-biscus, siue Ibisus. Quod Plinius Althæam ab Ibisco separauit, in medicina usu. Ibisus inquit, a Pastinaca gracilitate tantū distat: damnatus in cibis, & medicina dumtaxat utilis: quā Græci *μαλάχην* inquit *ἀγρίαν* uocant, & aliqui Pistolochiam. Althæa folium Maluæ a Theophrasto redditur, sed grandius & pilosius, cauliculi molles, flos luteus, radix alba, neruosaq; semen Maluæ, gustus quoq; caulium, ut Maluæ.

E X M. V E R G. C O M M.
Dihil Althæa græcis aliud est, q̄ si a medendo Medicam simpliciter dicas: quibus *ἄλθεα* in medicina pharmacum, remediumq; & *ἀλθαίνειν* uerbū mederi est. Nec aliter in Theriacis suis Nicander *ἀλθινύα* aliquid sæpe appellat. Hanc Palladius in Octobri mense Hibiscum dici, his uerbis testat. Althæe, hoc est, Hibisci folia, &c. Vtutq; ea, ut uerbis eius utamur, ut ex molli forte uinum fiat, Theophrastus syluestrem esse Maluam libro. 9. de plantarum historia confirmat his uerbis. *ἡ δὲ ἢ οἱ ἰσθὶ ἀλθαίαν ἰκίνοσι δὲ μαλάχην ἀγρίαν καλοῦσι*. Quod est, Et eam quam hi Althæam, illi uero syluestrem Maluam appellat. Galenus Anadendromalachen uocauit, quā si arboream, siue arboreascentem Maluam. Plinius diuersis locis. 19. 20. & 21. uoluminibus, plura Maluarum genera describens, non satis certam earum historiam tradit. Nos Græcos, & hunc præsertim scriptorē secuti, præcipua duo Maluarū genera fecimus, alterū secundo, alterum tertio hoc uolumine tractatū. Non ignorantes, hæc ipsa a quibusdam iterum diuidi, & in utroq; genere satiuam, & sponte sua nascentē numerari. In priore illa hortensem, quā in cibis pro oleo uterentur, & locis incultis nascentē: ut tunc in Maluæ cōmentationibus nostris longius diximus. In posteriore hac syluestrem esse, quæ duabus illis undiq; procerior sit, altiusq; a terra erigatur, & in hortis consita arboreascent, multoq; maiores flores, nec minore ambitu Rosarū profert. Verūtamen quæ artificio & opere humano meliorescunt, diuersi generis ob id censenda non sunt. Descripsit Althæan hanc Theophrastus eodem libro. Quodq; in nullo Maluæ flore, quod hactenus ipse uiderim, aut ab alijs audierim, luteum illi florem dedit. Nec nos scimus, quomodo naturæ, & alijs scriptoribus in Malua color ille respondere possit. Ostendit quoniam in omni Malua natura inter ruborem & purpuram splendentē florem. Hic etiā Rhodoides, quod est, Rosæ simile dicit esse, neq; ad formā magis, q̄ ad colorē referri id oportet. Quo fit, ut peritioribus dirimendā inter Theophrastū, scriptoresq; alios tam grauē litem relinquamus.

De Alcea. **C A P. C L X V.**
Alcea syluestrium Maluarum generi assignatur. Folia habet diuisa, Verbenacæ proxima, caules treis aut quatuor, cortice canabino uestitos. Florem Rosæ, paruum, radices albas, latas, quinq;

aut fex, cum plurimum cubitales. Quæ cum uino, aut aqua potæ, dy- **A**
fentericis, ruptisq; medentur.

B A R B A R I C O R O L L.

Alcea caulibus foliosis. Nascitur in pingui solo, nec sicco: quam & Peristereon cognomi-
nant, a similitudine foliorū, ut conijcio. Ipsam quoq; Leonis caudam, qua multum pollet a-
nimal id Homero, Catullo, & Plinio testibus, appellant Græci Alceam. Differentia in eo, ut
quibusdam placet, q; herba diphthongum non habet in penultima. Dicitur, & Cercis cauda
eius. Qzq; & herba quædam Cercis est, e qua radij fiant textoribus, unde & nomen.

E X M. V E R G. C O M M.

Breuis in antiquis græcorū medicis Alceæ huius historia & medicina est. Nec Plinius ali-
ter a Dioscoride lib. 27. capite. 4. de ea agit. Nos etiā, quod illi adjiciamus, non habemus. Illud
tantū tacuisse nolumus, in antiquissimis latinis codicibus coniunctā superiori hanc esse, unoq;
capite de utraq; agi. Quod fecisse congener earum natura uidetur.

De sylvestri Cannabe. C A P. CLXVI.

Sylvestris Cannabis, quam aliqui Hydrastinam, Romani Termi-
snalem uocant, uirgas fert Althææ similes, minores, nigriores, &
asperiores, cubiti altitudinem æquantes. Folio satiuæ, nigriore & asperi-
ore, flore Lychnidis, subrubro semine, & radice Althææ. Decocta radix,
illitu inflammationes mulcet. Tumores discutit. Tosos articularū dissipa-
t. Huius cortex, torquendis funibus accommodatus.

καλλιόκη δρυία

De satiuæ Cannabe. C A P. CLXVII.

Satiuæ Cannabim aliqui Cānabion, alij Schinostrophon, alij Aste-
rion appellarunt, plantam magni in uita usus, ad robustissimos fu- **B**
nes facitandos. Folijs mali, graui odore, caulibus proceris, inanibus, se-
mine rotundo. Quod largiore cibo genituram extinguit. Succus ex ea re-
cente, conuenienter aurium doloribus instillatur.

B A R B A R I C O R O L L.

Fvnes Cannabini præferuntur in sicco, ferulacei generis. Hæc herba optima Alabandi-
ca, plagarum usibus præcipue. Triā ibi eius discrimina. Improbatur cortici proximum, aut
medullæ. Laudatissimum est e medio, quod & Mesa uocant. Secunda commendatio Mi-
lase; nam quod ad proceritatem attinet Rosea, agri Sabini arborum altitudinem æquat. Se-
ritur a fauonio ubiq;. Quo densior, eo semen eius, cum est maturum, ab æquinoctio autu-
mni defringitur, & sole, aut uento, aut fumo siccat. Ipsa Cannabis, post uindemiam carpi-
tur, & lucubrationibus decorticata purgatur. Varro, Gellius, & Palladius, Cannabum, non
Cannabim appellant. Sanè Cannabus, græcè lignum illud gracile significat, in quod pileum
uicilibus, aut centonibus intexitur, ob id Samyrionē poëtam stratis Caninabum uocabat, pro-
pter macilentiam, ut inquit Pollux.

Pli. li. 19. ca. 9.
lib. 20. cap. 25.

De Anagyri. C A P. CLXVIII.

Anagyris, quam aliqui Acopon, alij Anagyron, alij A-
gnacopon uocant, frutex est arboris instar, grauis odore, folijs
Agni, uirgisq; flore oleris. Semen in corniculis non breuibus gignit,
subrotundum, firmū, uersicolori facie, simile renibus, quod durefcit per
messes. Tenera folia tumores illitu reprimunt. Si partus hæreat, & secun-
dæ, mensesq; morentur, drachmæ pondere bibuntur in passo. Sic & su-
spiriosis dantur, & cōtra capitis dolores in uino. Difficulter parientibus.
adalligantur, ita ut a partu statim auferantur. Radicis cortex con-

ἀνάγυρις
ἀνάγυρις

D I O S C O R I D I S

Coquendis, discutiendisq; adhibetur. Semen commanducatum, uomitiones uehementer ciet.

B A R B A R I C O R O L L.

Pl. li. 27. ca. 4.

ANagyris, odore terro prouerbium peperit, contra eos, qui ossitura sibi comouent. Dicitur & Anagyros. Hanc sunt, qui a Plauto Nauteam uocari putent in Asinaria, sed auctorem non habent. Nauteam porro herbam grauem esse scribit Festus, qua coriarij utantur: a nauidi-
am, quasi nauseam.

E X M. V E R G. C O M M.

Foret Maio & Iunio mensibus grato inter alios frutices per sylvas spectaculo Anagyris: multoq; flore, quem flauum ex longinquo ostendit, prætereuntium oculos facile in se conuertit: & si abesset ingratus odor, quo merito spretus, damnatusq; est, antiquorum coronas pri-
mus nobilitasset. Fruticosa stirps magis q; arbor est. Nos tamen uidimus tonsura, putationeq; coactam ad legitimam arboris altitudinem crescere: nullumq; florente ea lætius spectaculum, aut syluæ, aut agri, si forte consta in eis fuerit, ostendunt. Respondent naturæ omnia, quæ in historia a Dioscoride illi tribuuntur.

De Cepæa. CAP. CLXIX.

κίττα

Cepæa Portulacæ similis est, sed nigriora habet folia, & radicem tenuem. Folia in uino pota, urinæ stillicidio, & uescicæ scabie laborantibus, opitulantur. Maxime id præstat, si cum decoctio radicum Asparagi bibatur.

B A R B A R I C O R O L L.

Cepæa, quasi hortensianam uoces, radice nigriore q; Portulacæ inutili. Nasctur in littoribus arenosis, gustu amara, ut inquit Plinius, etiam si deprauata in eo habetur lectio.

E X M. V E R G. C O M M.

DHorrense olus Cepæam esse, uox ipsa, & Portulacæ similitudo indicauit: & si Plinius libro 26. capite. 7. in harenolis littoribus nasci tradat. Nullibi in græcis, præter q; in scriptore hoc de ea legisse memini. Non potest incognita aliter a nobis describi: capropter qualem in græcis inuenimus, eam legentibus tradimus: illud tantum monentes, scribere Plinium quæ ab hoc non dicuntur, nigriore radice q; Portulacæ esse, eaq; inutili: & præter id gustu amaram, simpliciterq; cum Asparagi radice uescicis plurimum prodesse: & præter Plinium, Paulum Aeginetam stillicidijs uescicæ utilem dicere: uerum non omnibus, sed his tantum quæ sunt, ut ille ait, in κίττα, id est, opplente urinæ iter obice aliquo.

De Alismate. CAP. CLXX.

ἄλμα
ἀλματώδης

Alisma, alij Alceam, alij Damassonion, alij Acyron, alij Lyron appellant. Folia ei Plantaginis, nisi angustiora essent, laciniosa, connexaq; in terram, caule simpliciter tenui, cubito altiore, capitibus Thyrsi. Flore tenui, candido, pallecente, radicibus tenuibus, ut Veratri nigri, acribus, odoratis, pinguibus. Aquosos amat tractus. Rarè si drachma una, aut altera bibatur, his conuenit, qui leporem maris num deuorarunt, aut a rubetis ranis demorfi sunt, aut opium hauserunt. Torminibus, atq; dysentericæ, per se, aut cum pari modo Dauici, potui datur. Conuulsis & contra uitia uulvæ prodest. Hærbæ sistit aluum. Menstrua pellit. Tumores illita mitigat.

Pl. li. 27. ca. 10.

B A R B A R I C O R O L L.

Alismatis, siue Damascenij huius folia magis laciniosa, q; Plantaginis uidentur. Alio-
qui similiter uenosa, radicibus densis. Alterum genus euisdem in syluis nigrius, & maioribus folijs. Plinius hanc herbam uidetur quodam loco appellasse Caucalin: sed mendosam in eo lectionem monstrauimus.

LIBER TERTIVS.

EX M. VERG. COMM.

211

Damafoniu Plinius, 26. uolumine, capite quinto Alisma appellat: & si corrupta illic ea uox sit. Idem, 25. capite, 9. eandem Alisma uocat: additq; Damafonion & Lyron uocari, eandem appellationem ceteris modo preponens, modo subiiciens, nec alijs notis q; Diosc. eam descripsi t. Quod tñ hic *suprauidio*, quæ uox thyrsi figurā tñ significat, ille capite thyrsi ait, duo breuius forte complexus q; exigeret sibi rei non satis nunc certè intellectus: & thyrsi formā in caule eius, & in summo caule capitulū. Thyrsum autē hic intelligit uirgam potius q; hastā frōdibus uestitā: quæ in orgijs & cœtu Bacchi a comitibus eius gestaretur. Nos etiā quod a Diosc. torminibus & in testinorū torminibus cum pari Dauco prodesse Alisma dictum est, cum pari semine eius diximus ex eodem hoc scriptore, qui in Dauco semine tantū eius utitur contra tormina.

A

De Onobrychide. CAP. CLXXI.

Onobrychis, quam e Græcis aliqui Onobrochilon, alij Eschasmenem, alij Corion, alij Chamæpityn, Romani Opacam, alij Brichilatā, alij Loptā, alij Locinalē, Daci Aniaffexe appellāt. Folia habet lentis, lōgiora paulo, caulē dodrantalē. Florē purpureū, Radicē paruā. Nascitur in uliginosis. Hærbæ suapte ui, si trita illinat, tubercula dissipat. Cum uino pota, strangurias sanat. Illita ex oleo, sudores mouet.

ὄνοβρυχις

BARBARI COROLL.

Onobrychis, radice gracili nascitur circa fontes.

EX M. VERG. COMM.

Nihil in Onobrychidis historia Dioscoridi Plinius addidit, hīdem notis & uerbis, 24. uolumine, cap. 16. eam describens. Nihil etiā in medicina Paulus Aegineta, amboq; ex hoc scriptore tñ eam tradiderunt. Neq; ex tam multis eius appellationibus, unam saltem cōmentarijs suis adiecerunt. Ex eo conijcere licet, nouas esse omnes, & ex similitudine adiectas illi pro tempore fuisse. Nec nos quod pro cōperto cōstituere de ea ualeamus, q; habemus. Herbarij q; aliqui nobiscū egerunt, uicinitate nominis decepti, cū Onochile, quæ ab asinorū labris dicta est, miscerent: quemadmodum in Anchusis quarto uolumine non multo post patebit. Si uocis rationē nouisse aliquis amet, nihil q; asini rudium Onobrychis significabit. Verum ut paulo ante diximus, nihil neq; ex hac, neq; ex alijs causis de re & nomine pro comperto nobis est.

B

De Hyperico. CAP. CLXXII.

Hypericum alij Androsæmon, alij Corion, alij Chamæpityn appellant, quoniam semen odore resinam imitatur. Surculaceo frutice, dodrantali, rubente. Folio Rutæ, flore albæ violæ simili, qui digitis tritus, sanguineū succū remittit. Qua ex causa Androsæmon cognominat. Subhirsuta siliqua, et tereti, hordei magnitudine, semine intus nigro, resinosi odoris. Gigni in cultis & asperis. Urinam cit. Menstruā pellit appositū. Tertianis, quartanisq; cū uino potū liberat. Semen xxx. dieb. haustū, ischiadicis medet. Folia cū semine illita abusta sanāt.

*ὑπερικόν
ἀνδρῶσαιμον*

BARBARI COROLL.

Hypericon, frutex est oleaceus et tenuis, acri odore, cubitali, nigro semine, cū hordeo maturo rescente, ut Plinius demonstrat. Caput hoc ad uerbū in syluestri Ruta supius a Diosc. repetitur. Reuitati consulentes, monemus solum duo Hyperici genera facere Pliniū lib. 26. ca. 8. Primum hoc qd Corion uocari ait: & quartum in hoc ordine, quod mox a nobis tradet Corindici, ab eo traditum: contra ea quæ a scriptore hoc docentur: dicente palam Ascyron Hyperici genus esse, & Androsæmon ab Hyperico & Ascyro differre tantum. &c.

Pli. li. 26. ca. 8.

VERG.

De Ascyro. CAP. CLXXIII.

Ascyrum, quod a quibusdam Ascyroides nominatur, Hyperici genus est, magnitudine distans, fruticosius, maiores habens

ἀσχυροειδής

N

D I O S C O R I D I S

C ramos, rubetia folia, tenuia. Flores luteos, & fructum resinofum, Hyperico non abfimilem. Cuius attritu digiti fere cruentantur. Qua de causa Androfæmum uocauere. Vfus feminis ad ischiadicos. Potum in hydromelitis sextario, biliofa recrementa ampliffime detrahit. Sed affidue dare oportet, donec fanitati refituantur. Illinitur et ambuftis efficaciter.

Pli. li. 27. ca. 5. **BARBARI COROLL.**
A Scyron, & Ascyroides fimilia inter fe sunt, ut inquit Plinius, fed Ascyron maiores habet ramos, Ascyroides uero ferulaceos, omninoq; rubentes. Semen utriq; in caliculis nigrum, piffillum. Comæ Ascyri trita, uelut cruentatæ apparent.

BARBARI COROLL.
S eparat Plinius Ascyron ab Ascyroide, duo eufdem plantæ genera faciens. 27. uolumine, capite quinto. Defcribitq; priuatim & ex proprijs utranq; notis. Hic tamen unum, quod bifaria uocetur Ascyron. f. & Ascyroides efle tradit. Nec alibi, quod hactenus inuenerim, Ascyroides aliquod Dioscoridi eft. Plinij tamen hiftoria diuerfitatis huius caufam indicat. Alit enim ille. Ascyron & Ascyroides fimilia funt inter fe, fed Ascyros maiores habet ramos, qui Ascyroides uocatur, ferulaceos. &c. Similia inter fe Plinius duo hæc ait efle, & fola magnitudine differre: quæ quoniam poteft bonitate cæli terræq; fieri, a Dioscoride neglecta eft. Vnumq; genus fecit, quod forte ante fe herbarij alij duo fecerant: quos fecutus Plinius, diuerfam ab hoc uidetur Ascyri hiftoriam tradidiffe, quæ tamen una in utroq; eft.

De Androfæmo. CAP. CLXXIII.
A ndrofæmon, fiue ut alij appellauere Ascyron, aut Dionyfiamdem, ab Hyperico, Ascyroq; differt: quod furculofum ac tenue fit. Rubentes rami, & folia Rutæ duplicia, aut triplicia. Quæ trita, uinofu fucco manant. Complureis alas habet in cacumine, in uerfus utrinq; digeftas. In quibus flores pufilli, lutei, & in caliculis fermen Pa paueris nigri, infigne lineis. Huius comæ trita, resinofum odorem reddunt. Semen drachmis duabus potum, biliofa excrementa pellit. Ifchia dicis medetur, fed a purgatione aquam exforbere oportet. Herba ambuftis illita medetur. Vulneribus fanguinem cohibet.

Pli. li. 27. ca. 5. **BARBARI COROLL.**
A ndrofæmon, non abfimile Hyperico eft, cauliculis maioribus, denfioribusq; ac magis rubentibus. Folia alba. Gignitur in uineis, fere medio autumno effoditur, fufpenditurq; Gale nus Androfæmon duplex inquit eft: Ascyron, fiue Ascyroides, de quo fupra uidelicet locutus fumus. Alterum Dionyfias priuatim appellatum ab aliquibus. Vtriq; par effectus.

De Cori. CAP. CLXXV.
C oris, quod aliqui Hypericon uocant, frutex eft folio Ericæ, rubro, pinguiore, ac minore, non altior palmo, fuauis, odoratus, acris. Potum femē menses trahit & urinas. Cōtra Phalangiorum morfus ex uino potum auxilio eft. Rigoribus ex pipere, opiftotonicis ex oleo aptiffime illinitur. Radix uino decocta, potaq; defectis, opem ferre creditur. Sed laborantem inter potandū q̄ optime coōperiri licet. Si quidē corpus totū defudabit, ex qua re priuinā agilitatē recuperabit.

BARBARI COROLL.
C oris fub Tamarice nafci dicitur, folijs minus rubentibus, leniter aculeatum. Hippocrates Coren hanc uocauit, ut Galenus inquit, argumento feminis, q̄ Pupulæ fimilitudinem præfentat: quanq̄ funt recentiores, qui Pupulam, fiue Pupillam dicendo, herbam a Dioscoride Si utri appellatam fignificant.

Vndiq; totoq; corpore rubentē Corin hanc nobis aliquot herbarij ostenderunt. Dico autem undiq; & toto corpore, folijs, ramulis, & florum doliolis. Hic tamen rubere tantum folia ait. Natura Corim rubentem totam fere ostendit, uerum inæqualiter, aliquaq; parte magis: aliquaq; uero minus. Ob quam causam credimus & hunc, & Plinium ex ruboris abundantia, rubere tantum eius folia dixisse.

A

De Aiuga.

CAP. CLXXVI.

CRæcis Chamæpitys, alijs Pitysforylis, alijs Orizelon, ijs qui Pontum incolunt Olocyron, alijs Bryonia syluestris, Athenis Ionia, Euboicis Sideritis, Magis Mineruæ sanguis, Latinis Aiuga, aut Cypripum, Dacis Dochela appellatur. Herba in terra repens, incurua, folijs semperuiui minoris, multo tenuioribus, hirsutis & pinguioribus, circum ramos densis. Odore Pinus, flore tenui, luteo, uel candido, radicibus Cichorij. Folia septem diebus in uino pota, regio morbo medentur. Et quadraginta diebus ex hydromelite, ischiadicos sanant. Dantur peculiariter urinæ difficultatibus, iocineris & renum uitij. Torminosi profunt. Ea apud Heracleam ponticam, perinde atq; antidoto contra aconitum utuntur, bibentes decoctum. Ad antedicta illinitur, cum polenta iure decocti subacta. Trita in farinam, & cum fico in pilulis sumpta, aluum emollit. Excæpta melle cum aris squamma & resina purgat. Apposita ex melle, uulua uitia extrahit. Mammarum duricias discutit. Vulnera glutinat. Vlcera quæ serpunt, cum melle illita cohibet.

χαμμήνις

B

BARBARI COROLL.

Chamæpitys, & Aiuga, siue Abiga dicitur a latinis propter abortus. Inuenio et Ibigam uocari: quod nomen fere seruant hodieque Illyrici, nostrum uulgus suam. Est ubi appellatur, ut inquit Plinius, etiam Tus terræ, tria eius discrimina reddēdo. Vnum sesquipedalibus furculis, flore Pinus, & odore. Alterum breuius & incuruū. De tertio dicemus paulo post, sua mentione. Recentiores aliam Chamæpityn nouerunt, eiusdem (ut ipsi arbitrantur) effectus, folio Saluæ rimoso, angustiore tñ, & ad radicē maiore, flore subcādido, ac luteo, e folliculis schæg. i. cristæ gallinacæ similibus, sapore Pinus, in maritimis mōtibusq; nascentem, nigro semine: quæ non serpit. Chamæpityn Athenis, alijs Dionysiam, alijs Didoniam, alijs (qd uerius existimo) Ioniam uocari scribunt, ut Apollodorus, & Athenæus. Item alijs Holocyron, ut Dioscorides, & q̄s mō nominauimus. Alijs Holocleron, ut Paulus. Credo librorum culpa uariatū fuisse in uocabulo: sed res constat, satis est. Nicander Ionida quandam herbam nominat, fortasse Chamæpityn significare uoluit, pumilam & humilem eam dicendo.

Pli. li. 24. ca. 6.

EX M. VERG. COMM.

Plinium imitati ante nos interpretes alijs, quocūq; loco nos Piceam in hoc capite diximus, ubiq; Pinum dixerunt. Ille enim, 24. uolumine, capite, 6. Chamæpityn describens, flore Pinus, et odore esse dixit. Idem non multo post Pitysam pariter describens, Frutex est similis Piceæ ait, eandem in duobus nominibus græcorum Pityn diuersa interpretatione ostendens. Per cuius uestigia ingressus Barbarus, eadem uarietate quam Pityn primo uolumine Piceam dixerat, hoc loco Pinum dixit. Nobis quod semel primo uolumine dictum probatumq; fuit, seruare hoc loco etiam placuit: poteruntq; cupientes ex nostra Piceæ commentatione causas, rationesq; nominum huiusmodi cognoscere. Quia Piceam olent folia eius, Chamæpitys dicta herba hæc est. Quæ etiam causa fuit, ut Tus terræ uocaretur: qm̄ totius Pinorum generis resina Tus olet: hæc autem Piceam. Triplex Chamæpityos huius genus est, diuersis inter se partibus alijs, sed eodem Piceæ odore: ob quam causam creuerunt per tempora tam multe eius appellationes, alijs plantis, alijs eas comparantibus herbarijs, & ex his, illisue notis eas describentibus.

N ij

D I O S C O R I D I S

C De altera Aiuga. CAP. CLXXVII.

Alterum est genus Aiugæ, cubitalibus ramis, in anchoræ speciem incuruatis, præcenuibus, coma præcedentis, flore candido, semine nigro. Hæc Pinum redolet. Tertia mas nominatur, paruula, folijs exilibus, albis, scabris, caule aspo, cādido, luteis florib. semine iuxta alas. Resipit hæc Pinū. Vim eandē obtinet, sed nō usq̃ adeo efficacem.

DE CHAMÆPITYE SECUNDA dictum est in prima.
BARBARI COROLL.
¶ Chamæpitys tertia folis scabris, caule digitalis crassitudine aspicitur.

¶ Finis LIB. Tertij.

P E D A C I I

D I O S C O R I D I S

De Medicinali materia. LIB. Quartus;

IO. RVELLIO interprete.

D



In superioribus libris, amantissime Ari, tradidimus de odoramentis, oleis, arboribus, unguētis, animabus, frumentis, oleribus, radicibus, succis, herbis, seminibusq̃. In hoc autem Quarto differemus de radicibus, & eis quæ restant hærbis.

κίτρον
ψυχότροφον

¶ De Betonica. CAP. I.

Cestron Psychotrophon uocitur, quoniam frigidis locis inueniatur. Latini Betonicam appellant. Hærbæ est, caulem ferens tenuem, cubiti altitudine, aut maiore, quadratū, folia Quercus, mollia, longa, in ambitu diuisa, odorata, prope radicē maiora. In summis caulibus, semē ueluti Satureiæ spicātū inest. Decerpta huius folia siccantur, plurimos ad usus. Radicibus nitit̃ ut Veratri tenuibus. Quæ ex hydromelite in potu, pituitosam uomitionem euocant. Folia dari debent ruptis, conuulsis, mulieribus uulue malo oportunis, & ad laxandos uteri strangulatus, drachmæ unius pōdere cū hydromelite. Tres in uini sextatio drachmæ, contra serpentū morsus edibunt. Hærbæ magna utilitate illatis a serpente uulneribus illiniūt. Aduersus etiam uenena, drachma ex uino pota conuenit. Præsumpta ea, si uenenū hauriatur, nihil nocebit. Vrinam ciet. Aluum subducit. Medetur comitialibus, & infans, pota ex aqua, & iocineris lienisq̃ uitijis, drachmæ pondere in aceto mulso. Concoctionē adiuuat, si q̃s ea fabæ magnitudine secundū cornā cum melle cocto deuorarit. Modo consimili acide ruçantibus p̃pinat̃.

Stomachicis eam manducare, & succū deuorare proderit, si postea dilu- **A**
lutum uino sorbeat. Datur sanguinem exscreantibus tribus obolis,
cum diluti uini, aut lactis cyatho. Ischiadicis, renum & uescicæ dolori-
bus ex aqua. Aquæ intercutem binis drachmis ex hydromelite. Regio
morbo laborantes recreat. Menses pellit, drachmæ pondere cum uino
pota. Alium purgant drachmæ quatuor potæ, in hydromelitis decem
cyathis. Facit cum melle ad tabem & purulentam exscreationem. Folia
sicca, tritaq; fictili uase reconduntur.



HERMOLAI BARBARI

Patricij Veneti, & Aquileiensi Patriarchæ Co-
sollariorum LIB. Quartus.

Estron a Vetonibus inuentam in Hispania, Betonicam in Gallia nominari co-
ptam putant. Alij Chironem, alij Gomistem, prophetæ Hieracæ, Thuscia Indi-
cem, alij Pendouiam, Syri Periponion, alij Sideritin, alij Theriopauon, alij *βιτανική*, hoc est,
radicem diuinam, in Italia Serratulam uocauere. Caulem habet interrim cubitorū duum, a ra-
dice spargens folia fere Lapathi, ut Plinius inquit, serrata, semine purpureo, ut idem autor est,
seu stamine purpureo, ut Dioscorides, qui hoc dicit in altera mentione Betonice. Fit uinum ex
eā, & acetum medicis. Multum differt specie, non effectu alia Betonica, ut Paulo Aeginetæ pla-
cet, uniuersalis, ramulos habens Pulegij, tenuiores, & gustu satuos, in petrosis fere proteniens.

Pli. li. 25. ca. 9.



MARCELLI VERGILII

in Dioscoridem ANN Orationes abbreviatæ.

Vod forte desiderauerit aliquis, non relinquamus. A uarietate & copia remedio-
rum Cestron a græcis dictam fuisse, quimulta alia una hac appellatione indicaue-
runt. Telum primo, quod persico bello inuentum fuerit. Opus inter punctum, acutius pictum.
Veneris & foeminarum ornatum, & si priuatim Cestos hic dicatur. Libri præterea a uarietate
subiecti, ab aliquot græcis hoc titulo inscripti sunt. Sic etiam Plinius aliquando Ebur Cestru,
id est, picturatum dixit. Latini ab inuentoribus cognominata Vetonicam semper uocauerunt.

B

De Britanica. CAP. II.

Bretanica, aut Vetonica, folia habet syluestris Lapathi, sed ni-
griora, & densiora, gustu adstringentia. Radicem tenuem et bre-
uem. Caulem paruū emittit. Folijs exprimitur succus, qui igni aut sole
cogit. Vim habet adstringentē. Priuatim depascentibus oris, et tonsilla-
rū ulcerib; cōmodatā. Valet etiā ad reliqua, quibus adstrictio est opus.

βιτανική
βιττονική

BARBARI COROLL.

Britanica, in insulis Oceani, aut in confini Britannia Oceano reperta est, folia habens oblon-
ga, nigra, & radicem nigram, succusq; eius exprimitur & ex radice. Florem Vibones uocant:
qui collectus, anteq; tonitrua audiantur, & deuoratus, securos in totum reddebat milites Cæ-
sar germanici a morbis, quos medici Stomacacæ & Scelotyrbem dicebant. Siquidē in Ger-
mania trās Rhenum, castris ab eo promotis, maritimo tractu, fons erat aquæ dulcis solus, qua
pota, dentes intra biennium deciderent, compagesq; in genibus soluerentur: quibus incōmo-
dis in Arabia quoq; Romani legiones tentatas fuisse Augusti Cæsaris principatu, Helij Galli
ductu, Strabo refert. Sed quærunt nonnulli, quamobrem Vibones dicant huius herbae flores.
Diuinare non ausim. Ceterū Strabo autor est, apud Vibonem in Brutij repertū, coronis flo-
res necere, in eum quoq; locum propter flores e Sicilia migrasse Proserpinā. Propinqua est &
Viboni Petilia: quæ nomen Petilio florī dedit in Lucanis autumnali, et circa uesperes nascēti: tñ
colore cōmendatur, q̄ est Rosæ syluestris: mirumq; in eo flore insecti cacumē, nec nisi intorto
folia nasci, paruo calice, ac uersicolore, luteum semen includente. Hunc dixi ab oppido Luca-
niæ uideri appellatum. Nisi q̄s a Petilio Romæ luco, itemq; Petilino altero existimet. Alioq;
Petilus, pro exili capitur Lucillio. De hac itaq; Britanica Dioscorides in præsentī loquitur. Est
& Cantabrica in Hispania, per eiusdem Augusti tempora a Cantabris inuenta, nascens ubiq;

Pli. li. 25. ca. 3.

Strabo lib. 6.
geographiæ.

N in

D I O S C O R I D I S

Caulis iunceo, pedali: in quo sunt flosculi oblongi, uelut calathi, & in his semen per quod minutum.

E X M. V E R G. C O M M.

Scelotybe malum, quo Plinius ait compages in genibus solui, Galenus in diffinitionibus suis his uerbis describit. Resolutionis genus Scelotybe est, qua recta totus ingreditur homo nequit, sed aliquando sinistrum latus in dextrum, aliquando dextrum in sinistrum circumfert, aliquando crus post se trahit, non aliter quam ualde accliuos locos ascendentes. Sequitur Britannicam in cunctis fere grecorum codicibus alterum Vettonicæ caput, superstitiose & imprudenter huic scriptori adiectum. Id in antiquissimis, quos habemus Dioscoridis grecos latinisque codices, nullibi legitur. Nec uerisimile est, post tractatam semel totam Vettonicam, intercedente alio capite, de eadem iterum agendum huic scriptori fuisse. Accedit his quod in plerisque alijs etiam diximus, nihil in hoc scriptore maiestate eius indignius, nec cui minus credere oporteat, quam ubi superstitiosum aliquod, & ad religionem nostram pertinens ab eo docetur. Poterunt legentes quod dicimus, ex his quæ alij interpretes reddiderunt, censere. Nobis non placuit religionem naturæ miscere, & quæ tam longo interuallo distant in scriptore hoc eadem facere. Vana hominum mortalitas hæc primum inserit: mox imprudentia & salutis studium excipit: exceptaque per manus diu feruntur. Nisi prudentior aliquis, quod sapientes præcipiunt, de genere in genus non transeundum esse alios monuerit.

De Vettonica. C A P. III.

ΒΑΥΤΩΝΙΚΗ

Vettonica nascitur in pratis, & montibus, locis mundis, & opacis, circa frutices. Animas hominum & corpora custodit, nocturnas ambulationes, & loca sancta. Grauibis somnis resistit. Ad omnem medendi usum commendata. Radicem habet rubram, odoratam, porracea folia, medio eorum puniceo, in recto calamo triangula, floribus in cacumine purpureis. Farina recentis uulneribus capitis indita, dolorem finit. Vulnere glutinat. Fracta ossa extrahit. Sed quotidie imponi debet, dum persanescant. Dolori capitis medetur, si iure decocti perfundatur, aut temporibus cum bitumine illinatur, aut radix suffiatur.

B A R B A R I C O R O L L.

Caput hoc, non in omnibus codicibus inuenias. Illud mirum quibusdam, quod Plinius Betonicæ folia Rumici scribit similia: hoc Britannicæ Dioscorides assignat, cum Betonicæ quæna potius uisantur. Nec illud minus licet mirari, quam obrem mentiones duas Betonica meruerit. Nisi quod duo quoque genera Betonicæ demonstrata nobis a Dioscoride contenderit. Duas & Paulus Aeginetæ Betonicæ facies intelligit, effectu parili, ut prædiximus.

De Lyfimachia. C A P. IIII.

ΛΥΣΙΜΑΧΙΑ
ΛΥΤΡΟΝ

Lysimachia, quam aliqui Lytron appellant, caules emittit cubitales, altioresque, fruticosos, tenues, prodeuntibus geniculatim folijs, tenuibus, salicis figura, gustu adstringentibus, flore ruffo, aut aureo. Gignitur in aquosis & palustribus. Foliorum succus adstringente sua ui, sanguinis reiectionem supprimit. Dysentericis potui datur, aut infunditur. Mensium abundantiam sistit, in pello. Sanguinis profluuium subuenit, si nares ea hærbæ obturentur. Vulnerum cruorem cohibet. Acerrimum nidorem suffita reddit. Qua de causa serpentes fugat, & muscas interficit.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 25. ca. 7.

Lysimachio, & Lysimachios, & Lysimachia uocatur. Inuenit hæc Lysimachus. Folia eius uiridia, ramuli erecti, odore graui, flos purpureus, fruticosusque, ut Plinius uerbis utar. Vis huius herbæ

tata, ut iumentis discordantibus iugo imposita, asperitate cohibeat. Patauij demonstrata nobis est.

A

De Sanguinaria, seu Polygono.

CAP. V.

Polygonum Arrhen, aliqui Polygonatum appellant, alij Cynochalam, alij Heracliam, alij Asphalton, alij Chiliophyllon, alij Clema, alij Polycarpon, alij Carcinethron, alij Teuthalida, alij Myrtopetalon, alij Cnopodion, alij Zarietheam, alij Pedalion, Aegyptij Telphin, aliqui Stemphin, Magi Genituram herois, aliqui Vinguem muris, Latini Sanguinariam, aut Seminalem, Aphri Chulum. Ramos habet teneros & molles, frequentibus geniculis cinctos, qui per terram, ut gramen repunt. Folia Rutæ, sed molliora, planioraq;. Semine sub omnibus folijs turgescente. Vnde marem appellari uolunt. Flos ei candidus, aut puniceus. Vis e poti succi est spissare, ac refrigerare. Prodest cruentæ exscreationi, cholerae, alui fluctionibus, & urinæ stillicidio. Vrinam aperte cict. Cum uino potus, contra serpentium morsus auxiliatur. Datur in febribus per horam ante significationes. Fœminarum profluuia impositu sistit. Idem succus purulentis auribus instillatur. Facit eximie ad genitaliū ulcera, cum uino adiecto melle decoctus. Stomachi feruori, sanguinis reiectionibus, ulceribus quæ serpūt, ignibus sacris, collectionibus, tumori bus, & recentibus uulneribus folia illinuntur.

B A R B A R I C O R O L L.

Polygonon, & Caligonon appellatū uidetur a multitudine seminis, ppter ea Seminalis in latino dicit: q̄q; & Sanguinalis, & Sanguinaria uocat. Alij a densitate fruticis, alij a frequentia geniculorū arbitrant. Quidā & Halmada noiant. Inueniunt, qui fœminā esse hanc contendant, mare aut maiorē, minusq; nigrū, & geniculis densiorē. Herbarij nullā magis aridā, q̄ Polygonon seruāt. Dioscorides Polygonon quibusdā locis uocari tradit Pedaliū. Plautus quidē ita in Gurgulione appellat odoratæ genus herbæ.

Plin. li. 27. ca. 12.

B

Tu Rosa, tu Crocus, & Casia es, tu Pedaliū.

Aut certe unguētū nomē est in ea fabula Pedalion. Forasse uerō nō Pedaliū, sed Bdelliū in poetā eo legeris. Polygonon Aetius & *ἰατρικόν*, hoc est, solis herbæ dici meminit, uulgo Centinodia, & Corrigiola. Proserpinacā in Plinio, sunt qui Polygonon accipiāt, dicēte uulgarē herbam esse Proserpinacā, eximij aduersus scorpiones remedi; & lassitudinē, si linguæ subijciat: si deuoret, uomitionē sequi salutarē, ut corrupte legat in Diosc. hoc loco, stopinacā pro Scorpinaca, siue Proserpinaca: quādo utrūq; nomē Polygonon tributū uideas in eo libro, qui. L. Apuleij fuisse credit a multis. Illud mirari subit, q̄ Plinius eodē capi. Proserpinacā, & Polygonon, quasi diuersas herbas demonstrat, & utrūq; ad anginas cōmendat. 17. uolumine.

E X M. V E R G. C O M M.

Sanguinariam Plinius Sanguinalem, Columella græcā Polygonon uocant: illē. 17. uolumine capite. 12. hic libro. 7. capite. 10. Nec fuit Romanis scriptoribus alia nominis ratio; q̄ ex ui & usu eius, qui sentientes sanguinē exspuentibus, cruentisq; intestinorum torminibus eam mederi, ex meliore hac potestate nomen illi fecerunt. Græci contra, a seminis copia, uel geniculorum, quos habet frequentia, cognosci eam uoluerunt. Vtrūq; enim Polygoni uox significare potest. Siquidem genti illi gonos, genitura, & semen: gony uero genu, & diminutiua forma geniculus est.

De Sanguinaria Fœminā.

CAP. VI.

Sanguinaria Fœmina fruticat uno caule, arūdinī teneræ simili, densis geniculis, & in se tubarum modo factis, tuberibus articulorum eminulis, torulisq; cingentibus. Folijs Picæ. Radicis nullus usus. Nā

N iij

D I O S C O R I D I S

C scitur in riguis. Huic quoque spissandi, refrigerandique natura, ad eadem ualens, sed inefficacior.

B A R B A R I C O R O L L.
Polygoni quatuor genera Plinius existimat, Marem, & Fœminam, Tertium Oreum, hoc est, montanum, quod & describit eadem forma, qua Dioscorides hic Fœminā. Quartū genus Polygonaton priuatim appellatur: de quo protinus indicandum nobis est.

E X M. V E R G. C O M M.
Quotquot hætenus uidere Dioscoridis græcos codices licuit, in extrema capitis huius parte eodem intellectu, & iisdem uerbis ostendunt, fœminatam Sanguinalem herbam in cunctis mascula minus efficacem, & ignauiozem esse. Plinius etiā eodem libro & capite, historiam, & medicinā eius tractās, inefficacius quā superiora (plura enim Polygoni genera ille secērat) hoc genus esse ait. Solus Paulus Aegineta in. 6. Polygoni uires numerās, contra & his uerbis decreuit, τὸ δὲ ἄλλο τὸ ὑψίον ἰσχυρότερον, quod est, Fœminā autē Mascula ualidior, & efficacior est. Quo fit, ut oporteat, quemadmodū & Plinius indicat, credere diuersas ex sexu Polygoni notas omnibus locis, & gentibus non fuisse easdem, sed uariatis appellationibus, quæ græcis uerbi causa Mascula Sanguinalis erat, latinis Fœminā esse: sicque ediuerso, Plinius, cuius atque uaga hæc nomina, etiā erant uerba, hac in primo genere sunt. Qui plura genera Polygoni faciunt, hanc Marem intelligi uolunt. Idque Dioscoridi cōuenit. Mox paulo post. Necnon inueniuntur, qui hanc Fœminā esse dicant: quod Paulo Aeginetæ cōuenit, qui Fœminā potentiozem Mascula dicens, sexus notam hanc, ex aliorum indicatione tradidisse uideri debet. Eamque ob causam, nihil in huiuscemodi, nisi factio prius periculo, certū constitui modo potest: tam multis locis & gentibus res aliquando, nomina autem semper uariant.

De Polygonato. C A P. VII.
Polygonatum nascitur in montibus, frutice cubito altiore, folijs Lauri, latoribus, & læuioribus, sapore mali Cotonei, aut Punici, cum quadam adstrictione. Flores per singulos foliorū exortus promittunt, candidos, folijs numerosiores, incæpta a radice supputatione. Radicem habet albam, mollem, longam, crebro geniculatam, densam, graueolentem, digitum crassitudine æquantem. Quæ uulneribus efficaciter illinitur. Quinetiam maculas in facie delet.

B A R B A R I C O R O L L.
Polygonaton Diosc. montanū Polygonon, syluestre Plinius intelligit, etiā si descriptio fortasse dissonat in plerisque. Arborea inquit pene modo fruticat radice lignosa, stirpe Cedri rubicundo, ramis Sparti, binū palmorū, nigris, geniculorū ternis, quaternisque articulis, odore quodā, siue gustu fastidioso: quæ ne explicari quidē recte possit, ut Paulus Aegineta scribit, & eo prior Gale.

E X M. V E R G. C O M M.
Inter Polygoni genera, quæ a Plinio plura ex aliquorū historia numerantur, Polygonatos hæc refert. Nobis tamē toto genere differre hæc ab illa uidei. Iacet enim (quod præcipuū inter eas discrimē sit) & graminis modo per terrā spargitur Polygonus: Polygonatos autē cubitali, & fere semper procior caule erigit. Vidimus nos, quinto, & sexto deinceps foliorū ordine ad eam altitudinē surgentē: quæ a radice statim exiguis interuallis, per caule usque ad summū uirgabant laurinis, ut hic ait, similia. Flores ipsi non uidimus. Iampridem enim Augusto mense defloruerat herba, quæ nobis prolata est. Nulloque magis indicio, quæ radice Polygonatum se ostendebat: quæ longitudine pedali, colore albescēte, frequentioribusque, quæ in gramine geniculis curgebat. Vtque consicere licuit, nihil Polygono congenerē multis hanc fecit, quæ geniculorum par similibusque in utraque frequentia. Verumtamen, ut paulo ante dictum a nobis est, exceptis his, diuersa in Polygonato, & alia a Polygono cætera nobis uisa sunt.

De Clematide. C A P. VIII.
Clematis Græcis, alijs Phyleterion, ab alijs Daphnoides, ab alijs Smyrnoides, aut Polygonoides appellatur. Læto, pinguique solo.

prouenit, iuncos spargens exiguos. Folia Lauri figura & colore, multo minora. Folia cum caulibus in uino pota, alui profluuiā, & dysenterias sedant. Subdita in pello, cum lacte & rosaceo, aut cyprino, cruciatibus uulue medentur. Dolores dentium commanducata finit. Imposita serpentium moribus, iuuamentum prestat. Fertur etiam contra aspidum ictus ex aceto pota opitulari. Gignitur solo inculto.

CLEMATIS hæc, siue Clematidis Aegyptia cognominatur, quoniam Aegyptus hanc maxime gignat, prælonga, tenuisq; in prouerbium usq; cessit, κληματις αινυμια. ita nominado eos, qui procero & nigro sunt corpore: ut est apud Phalereum Demetrium.

Pli. li. 24. ca. 15.

De altera Clematide.

CAP. IX.

EST & altera Clematis, quam aliqui Epigeton, Aegyptij Philacrimon, Romani Ambuxum uocitant. Viticulos emittit rubescentes, lentos. Folium gustu admodum acre, ac exulcerans. Repit per arbores, ut Smilax. Semen tritum, pituitam bilemque detrahit, in aqua, aut hydromelite potum. Folia eius illita, lepras purgant. Cum Lepidio conditur ad cibos.

CLEMATIS secunda, siue Clematidis, Smilaci, hoc est, Hederæ Ciliciæ similis effingit, geniculata & ipsa, repensque per arbores. Hanc, aut non dissimilem (ut puto) Plinius est ubi Echiten, & Laginen uocant, & tenuem Scamoneam: quia pedales, foliosos, non dissimiles Scamoneæ ramos habeat, nisi quod minora, nigrioraque sunt folia. Inuenit in uineis, aruisque: parat cibis, ut olus cum oleo & sale. Sit hic frutex, qui Conuoluulus a nostris dicitur, cuius flos Lili rudioris figuram præbet, ob id & Liliastri quoque nomen habens: & uulgo etiam Ligustri (quod Ligustrum proprie cyprius est) æstimatur iudicent. Nam & folium ei pinnatum est, ut Scamoneæ, nec Smilaci dissimile. Volubilis maioris noie. Semen nigrum, triangulum, in folliculis acinorum specie, qui numero tres habent, in uinetis, aruisque. De hoc Plinius uerba subiicimus. Est inquit flos, non dissimilis Lilio, in herba quam Conuoluulum uocat, nascens per fruteta, nullo odore, nec crocis intus, candorem tantum referens, & ueluti rudimentum naturæ Liliæ facere condiscens. Inuenio qui Periclymenon uocent Conuoluulum, atque ita pictam in Græcis codicibus uidi. Sed uera Periclymenos alia est, ut post liquabit. Habetur & Clematis tertia, Centunculus a nostris appellata, rostratis folijs, ad similitudinem capitis penularum, iacens in aruis. Dioscorides & Gnaphalion herbarum, Centunculum a latinis dici meminit: quod non habeo compertum, eadem sit, an diuersa Gnaphalion, a tertia Clematide, quandoquidem & medicina congruunt: & apud nos utraque Centunculi nomen habet. Sciendum Galeno teste, Dioscoridem hoc loco de prima tantum Clematide locutum: quæ non simpliciter Clematidis, sed Clematidis Daphnoides, aut Myrsinoides, aut Polygomoides appellanda esse uideatur. De secunda uero Clematide, quæ & absolute Clematidin uocari tradit, in quarti huius libri fine scriptum esse, non hic existimat. Addidere tamen librarum utroque loco eam, quod & in alijs herbis fecere. Pamphilus duas Clematides in unum confudit. A Galenoque ob id incessitur iure. Idem uidetur & Plinius fecisse, medicinas aliquot prioris, secundæ tribuendo.

Fuisse quondam plures Clematidas, Plinius manifeste. 24. uolumine capite. 11. indicat. Sed exceptis duabus his, non ueras fuisse Clematidas alias, sed sola uiticularum ratione hoc nomen uenisse, testes in græcis, hic scriptor primus, qui nullam aliam in medica materia stirpem hoc nomine describit: mox Paulus Aegineta lib. 6. his uerbis utraque describens. Clematis, quam alij Daphnoides, alij Myrsinoides uocant, uiticulam habet longam crassitudine iunci, quem Oloschaenum dicunt: folium uero Lauri. &c. Altera autem quæ arboribus Smilacis Hederæ modo aduoluitur. &c. Fuerunt qui posteriorem hanc Conuoluulum crederent. Cuius flores Lilia candore, & amplitudine æmulantes, certare cum nobilissimo flore uoluisse uidentur: quos etiam Plinius aliquando dixit Rudimentum naturæ esse, Lilia facere condiscens, ubique & omnibus notissimos. Verum ex huius historia, in qua rubentes uiticulae illi assignantur, Conuoluulo conuenire non uidetur. Tacuisse præterea de floribus, qui tam egregia specie in Conuoluulo

B

*

Pli. li. 27. ca. 12.
24. cap. 10.

VERG.

D I O S C O R I D I S

C florent, aliam ab illo Clematida esse arguit. Nobis inclinatur animus Smilaci congenerem Cle-
matidem hanc esse. Non tamen pro comperto hoc decernimus. Quod autem hic ait, uocari Epi-
getida, humilem terrestremque significat, facta a terra, quam Græci γῆν uocant, nomine: quasi
terraneam dicas, quoniam scilicet nisi alias scandat stirpes, per terram spargitur.

πολεμώνιον
φιλίτηριον

De Polemonia.

C A P. X.

Polemoniam alij Phyletariam, Cappadoces Chiliodynamin ap-
pellant, Ramis exilibus, in uersus utrinque digestis. Folijs paulo quæ
Rutæ maioribus, ac longioribus, Calaminthæ, aut Sanguinariæ prox-
mis. Quibus in summis corymbi dependent, nigro semine. Radice cubi-
tali, albicante, radiculæ simili. Nascitur in montosis & asperis. Bibitur in
uino radix contra serpentes & dysenteriam. Et ex aqua aduersus urinæ
difficultatem & coxendicum cruciatus. Datur ex aceto drachmæ pondere
relienosis. Eadem scorpionis plagæ alligatur. Tradunt, eum qui radicem
gestauerit, a scorpione non feriri, eumque si ictus sit, nihil molesti passus
rum. Dentium dolorem mansa mitigat.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 25, ca. 6.

Polemonium, siue Polemonia, alij Philetariam, a certamine regum inuentionis appellaue-
runt. Radice crassa, nigro semine. In Plinio & Melemonium uocari herbam quandam inuenias,
uomituris utilem; tamen haud certus sum, ecquid corrupta sit in ea uocis lectio.

E X M. V E R G. C O M M.

Officiosa certe uoluntas non deest, urgetque in Polemonia hac, ut moneamus legentes. Quæ
hic, & Plinius dixerunt in Cappadocia a multitudine uirium χιλιόδυναμιν, quod est, mille uires
habentem uocari, in antiquissimis Græcorum & Latinorum scriptoris huius codicum, qui mihi
sunt, non Chiliodynamin, sed Chelidoniam manifeste legi. Non conuellenda tamen ob id duo-
rum scriptorum tam certa auctoritas & fides. Ob eam causam & nos ex communi lectione uo-
cem uertimus. Illud contra in dubio est, dissidentque Dioscorides & Plinius in radicis historia.
Hic ait πυχρίαν esse, quod est, cubitalem; Plinius, 25. uolumine capite. 6. Polemonia describens
ait, Cappadoces Chiliodynamin uocant, radice crassa; quasi non πυχρίαν, sed παχρίαν legerit.
Nos neque in græcis, neque in latinis aliter quæ cubitalem legimus. Plinius tamē uel sic forte per sua-
sus, uel uocis uicinitate decaptus, pro cubitali, crassam reddidit. Nisi forte, quod hic ait, Lanariæ
herbæ radici similem ad crassitudinē ille rettulit. Diximus id, quoniam non parui refert, in depre-
hendenda Polemonia, cubitalem, aut crassam radicem obseruasse.

De Alo.

C A P. XI.

συμφυτον

Symphyton petraeum, id est Alus, nascitur in petris, ramis tenuibus,
paruis, Origano similibus, capitulis Thymi, furculosum totum, or-
doratum, gustu dulce, saluam ciens. Longa radice, subrussa, digitali crassitu-
dine. Decoctum in aqua mulsa, & potum, pulmonis uitia purgat. San-
guinem reijicientibus, & renum malis ex aqua datur. Ad dysenteriam, ru-
braque fœminarum profluvia in uino decoctum. Ad conuulsa uero & ru-
pta, ex aceto mulso bibitur. Quin & commandacatum sitim sedat. Fauci-
bus asperis subuenit. Vulnere recentia, enterocelasque conglutinat, & il-
litu cohibet. Carnes autem cum Symphyto decoctæ coalescunt.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 27, ca. 6.

Symphyton Petraeum, nos Alum gallice uocamus, folijs paruis, ramis tribus, aut quatuor
a radice. Nascitur in petris, ideoque Petraeum cognominant. Symphyto autem Græci nomen
imponere, quoniam consolidet. Hanc Veneri Coroneam appellant, ut inquit Plinius, Rosæ
radicis, alibi albæ, alibi nigræ.

Quæ est constipandi, consolidandiq; egregia utriq; Symphyto uis, nomen illi in græcis id fecit. In posterioribus autē latinis inconcinne quidem, sed aperta significatione Consolidam uocari eandem persuasit. Et quoniam duo saltem genera eius sunt. Alterum, de quo nunc agimus, quoniā in petris nascitur, Petræum antiquitas nominauit. Alterum uero simpliciter Symphyton. Iactant tamē præter hæc nostræ ætatis herbarij plura alia Consolidæ genera se inuenisse, quæ medicis, & illis censenda relinquimus. Dioscoridem enim latinū facimus, non omnium aliorū dicta & decreta cōaceruamus: præsertim duo, & hæc tantū gñā Symphyti tractante etiā Paulo Aegineta, qui habere hoc Symphyton ait aliquid, qd incidat, ideoq; purget, quæ in pectore & pulmonibus purulēta concreuerūt: habere etiā aliquid qd adstringat, qua ui sanguinis excreationibus medetur: habere humiditatē, qua sitim arceat: discutere præterea, consolidareq; corpora: & ne longiores simus, ex contrarijs aliquibus uiribus constare.

De altero Symphyto.

CAP. XII.

Est & aliud Symphyton, quod aliqui Pecton, Romani Soldagi-
nem uocant. Id caulem emittit bicubitalem, aut maiorem, crassum, leuem, angulosum, inanem, quasi fungosum: circa quem breui interuacante spacio, folia exeunt angusta, linguae Bubulæ proxima, oblonga, hirsuta, caule secundum angulos quosdam striato. Folijs tenuibus, ex alarum sinu prodeuntibus. In quibus flores lutei, rutaceis similes, & uerbasci semina emicant. Tam caulis q̃ folia, aspera lanugine horrent, tactuq; pruritus concitant. Radices demittuntur foris nigrae, intus candidæ, uiscosæ. Quarum est usus. Tritæ et potæ, cruentis excreationibus, ruptisq; proficiunt. Recentia uulnera illitæ conglutinant. Carnes quoq; si concoquantur, cogunt additæ. Inflammationibus, præsertim sedis, cum Sectionis folijs, utiliter illinuntur.

Hoc Galenus Symphyton mega, id est, magnum cognominat, nec gustu dulce, nec odoratum, ut superius. Herbarij recentiores tria Symphyti, seu Consolidæ genera constituunt, præter Petræum: quod ne cognoscunt quidem. Magnum, de quo hic agitur. Minus, sed radice intus & foris alba, fere bulbi effigie rotunda. Minimum, flore in spicam purpureo, ac folio quidem Origanī, ut Petræum, sed in humidis genitum, radice lignosa, superuacua, nec odorata, nec dulci, nec saluam ciente: quæ sunt in Petræo omnia.

De Holosteio.

CAP. XIII.

Holosteon quadrantalē hærbula est, humi repens, folijs uiticulisq; Coronopo, aut Gramini proximis, gustu adstringentibus. Radice albā, prætenui usq; in capillamentū speciem, longitudine quatuor digitorum. Nascitur in collibus terrenis. Usus eius ad rupta in uino posita. Nam & carnes coguntur, decoctionibus addita.

Holosteū sine duriciā est herba, etiā si ab osse nomē habuit, per antistropheū uidelicet, hoc est, ex aduerso a Græcis appellata, sicut Fel dulce, folijs angustis. Nascit in collibus terrenis.

EX M. VERG. COMM.

Ex aduerso græcis Holosteon herba hæc dicta est. Toto corpore em & undiq; osseam uox illa significat: cum tamē tenerior, & fragilior ea sit, longeq; ab ossium duricie discesserit. Quærendum in ea, quo nam modo trium, aut quatuor digitorum altitudine eam hic dicat a terra extolli: & an digitos per longitudinem continuatos, an ut in antiquorum palmo erant, per crassitudinē coniunctos, & sibi suppositos indicet? Nobis in posteriorē hanc partē inclinamus. Nā quatuor digitorū per longitudinē mēsurā, alijs poterat, et debuerat uocibus indicari.

Stoebe, quam alij Tobion, Romani Stipam uocant. Vulgaris est noticiæ. Cuius semen & folia stringunt. Quapropter decoctum dyfentericis infunditur. Auribus quoq; purulentis instillatur. Illita folia, oculis ab ictu cruentis profunt. Erupentis sanguinis impetus cohibent.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 21. ca. 15.
lib. 22. cap. 11.
Theoph. li. 1.
& 6. plant.
Strabo. li. 16.

Stoeben Theophrastus & Plinius Phleon quoq; dici tradidere. Pollux Phlun, cuius lanugine mulieres ad lixiuū utantur. Molle inquit Theophrastus, & plantaceum est Phleon, colore subrubido. Meminit & Aristoteles, sed a Theodoro Flaus uertitur. Fœminā in eo accipit, quæ sit sterilis, & ad nexus utilis. Vnde Phœinas uestes in Herodoto q; legat & Pausania, qui bus aues in Arabia Stympthalides, ut uisco ceteræ capiant: cum alia materia nō resistat earū rostris. Nam et in Aethiopia Arabiq; aduersa nasci Phleon testis est Strabo, flumine præsertim, qd Cinnamo semina determinat. Orchomenio lacu numerosum id haberi: a quo & nomen Phleos: etenim Græci φλεών, p eo qd est fecundū esse capiunt. Hinc & Bacchū ueteres Phleona cognominabant, auctor Helianus. Partem huius herbæ teneram ab radice, pueris in cibo gratam esse. Radicem ipsam pecudum pabulo uelli copiosam, nec in profundum actam, folio & caule aculeatis. Stipam a latinis dici auctor est Dioscorides. Illud notauerim, si Stoebe idem sit qd Phleos, errare qui Stœbam pro ea herba capiunt, quæ uulgo Scabiosa dicitur, folio Erucae hirsuto: non tamen aculeis horrente, cerulei floris, ex qua & Scopæ fiunt. Sit autem Scabiosa, quæ ab Aetio Psora dicitur, cuius ustæ fumo arborum Erucae moriantur, non habeo commentum. Phorion lini genus tradit, Stypion uocatum. Alioquin Stypos inquit Picæ caudæ est, itemq; prædurum & solidum lignū quodcunq;. Interdum & humilis stipes ita dicitur potest. Est & Strybion & Stybe, de qua diximus in Hyppophæe. Nam Stion calculus est marinus Hippocrati. Festus linum impositum, Dorice stuppam dici meminit.

E X M. V E R G. C O M M.

Phleon duobus locis uocari a quibusdam Stœben hanc Plinius testatus est: primum. 21. uolumine capite. 15. his uerbis. Quædam in folio habent, & in caule, ut Phleos, quam aliqui Stœbem appellauere. Mox iterum uigesimo secundo uolumine capite undecimo. Stoebe, quam aliqui Phleon uocant. Videturq; nobis Theophrastum ubiq; appellare. Is enim inter aculeatas Phleon. 6. de plantarum historia numerat, & inter eas quæ folia secundum spinas proferunt: quales in palustribus Tribulus, & in arida Ononis est. Et Stœben libro primo de plantarū historia inter fruticosā, & quæ carnosum folium habent.

De Volucro. CAP. XV.

κλυμένη

Græci Clymenon uocant, alij Calycanthemon, alij Peryclymenon, alij Helyophyes, nonnulli Hepatitin, alij Milacem, alij Anatolicon, alij Dyticon, alij Merginem, Latini Volucrum, aliqui Volucrum maius. Aegyptij Oxioni, Clymenion, quod & Agonon, id est, sterile nuncupant, caulem fert fabæ, quadratum, folia Plantaginis, foliculis supra caulem in sese inflexis, Iridi, & poliporum Cirris non absimilibus. Probatissimum est e montibus. E frutice toto cum radice succus exprimitur, qui ad sanguinis reiectiones in potu efficax est. Cœliacos, rubraq; fœminarum profluvia, refrigerando infrenat. Sanguinem naribus erumpentem supprimit. Trita folia, aut siliquæ recentibus uulneribus impositæ, ea ad cicatricem perducunt.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 27. ca. 12.
Theoph. li. 9.

Clymenos appellata a rege dicitur, describi aliter a nostris, q; a Græcis Plinius affirmat, hoc est, Hederæ folijs ramosam, caule inani, articulis præcinctam, odore graui & semine Hederæ, syluestribus montosisq; nascentem. Sterilescere pota ea etiam uiros, sextario eius in triginta dies diuiso, Theophrastus auctor est. Quod quidem Dioscorides Peridymeno uocatæ tri-

buit, Nam & descriptio nostrorum de Clymeno quā prætexui: Periclymeno fere conuenit.

EX M. VERG. COMM.

Regiae dignitatis herba Clymenos est, & ab inuentore rege sic appellata: non aliter quā & ple-
rūq; alia a Diosc. hætenus, & a Plinio diuersis locis ex antiquorum historia descripta fuerit.
Eam pluribus indicauerunt ueteres appellationibus: inter quas ex plantæ ipsius natura, no-
tis, & antiquorum in ea obseruationibus factæ aliquæ sunt. Qualis Calycanthemos est. signifi-
cat enim, quæ in Calyce floreat. Dixerunt autem in floribus antiqui Calyces, in uolucra illa quæ
lia in Rosis sunt, quibus dehiscenibus in sua folia se flores pandunt. In Clymeno autem hæc ca-
lyces folliculos eos intelligebat, de quibus hic paulopost egit: Peridymenos uero, confuso mi-
xtoq; ob similitudinem cum ea quæ sequitur nomine.

De Periclymeno. CAP. XVI.

Periclymenon aliqui Aeginam, alij Cylmenon, alij Carpathon,
alij Splenion, alij Epetim, alij Axinam maiorem, nonnulli Cle-
matin, alij Myrcinen, alij Calycanthemō, Magi Polion Veneris, Aeg-
gyptij Turcon, Romani Volucrum maius, Aphri Lanath appellant.
Simplex fruticat, ex interuallis parua folia habens, ipsum amplecten-
tia, subcandida, hederacea. Inter folia surculi exeunt, in quibus baccae,
Hederæ similes. Flos fabæ, candidus, aliquantum rotundus, et quasi in
folium procumbens, semen durum, & quod difficile euellatur. Radice
rotunda, crassa. Nasceitur in aruis ac sepibus, conuoluens se adminicu-
lis propter assidentibus. Semen eius postquam ematuruit collectum, &
in umbra siccatū, drachmæ pondere dat in uino quadragenis diebus,
ut lienem absumat, ac molestiā discutiat. Sed urinā ciet, statim a sexto
die cruentam. Orthopnoeæ, & singultui prodest. Partū accelerat. Folia
sunt eisdem uiribus prædita. Quæ tricenis septenis diebus epota, steri-
litate facere produntur. Perunctis ex oleo febrium rigores abigunt.

BARBARI COROLL.

De Periclymeno dictum est in Clymeno. Nunc Caprifolium, & Matersylua dicitur uulgo:
quoniam Dioscorides Matersyluam pro Hedera capit, cui Periclymenon simile est.

De Tribulo. CAP. XVII.

Tribulus aliquibus Bucephalus, alijs Tauroceros, Romanis Tri-
bulus aquaticus dicitur. Tribuli genus unū terrestre, folijs ad
effigiem Portulacæ, tenuioribus uiticulis, in terra stratis, spinis secun-
dum folia rigidis, præduris. Iuxta amnes & domicilia nascitur. Est &
alterū genus aquis familiare, quod in fluminibus natū comā exerit, acule-
os cōdēs. Folijs latis & pediculo lōgo. Caule parte sumā quæ ima crassi-
ori. Capillamenta quedā indidem exorta spicant. Semen durum, ab altero
non abhorrens. Vterque refrigerantis & inspissantis est naturæ. Ideo in-
flammationes omneis cataplasmate adiuuat. Ulcera in ore erumpentia,
putredines, gingiuas, tonsillasque perfanat. Succus ex his colligit ad ocu-
lorū medicinas. Semen dum recens bibit, calculosis iuuamentū affert.
Drachma terrestris Tribuli pota, illitaue, ictos a uipera recreat. Contra
uenena cum uino aptissime bibitur. Decoctū eius sparsum, pulices nec-
cat. Thraces, qui ad Strymona amnem habitant, uirenti Tribulo equis.

D I O S C O R I D I S

C faginant, & e dulci semine & esculento panem quo uestuntur faciūt.

BARBARI COROLL.

Pli. li. 18. ca. 17
lib. 21. cap. 16.

T Ribulus, siue Tribulum, in segetibus madidis & palustribus nascitur, non excedente quina fere cubita, gurgitum altitudine, ut in Strymone amne. Capillamenta in eo quædam inter se contraria, eo breuiora, quo propius ad radicem sunt, adeo, ut in ea quasi desinant, ac procumbat, a lateribus terna & quaterna germina: ut amplissimum sit quod minus ab radice distat, et reliqua pro suo cuiusque numero. Exit a parente soboles, omnino similis folio, fructuque, sed gracilior. Semē nigrum, prædurum: quo cadente, ipsum se propagat. Folium habet secundū spinā. In semine quoque gerit aculeus. Radicē eius alij annuā, alij diuturniorē esse putāt. Duo gñā eius. Vni Cicerculæ folium: alteri aculeatū. Vere germinant, serius tñ: cui in folio aculei: magisque hoc septa uillarum obliat. Semen habēs rotundius, et nigrū in filiqua: qd alreri, hoc est, præcoci arenaceum & Sesamæ figura cernitur. Nihil Cicere infestius Tribulo est. Nascit & in hortis Tribulus. Dira res alibi, sed iuxta Nilum & Strymonē amnes, in cibos recipit. Panis ex eo fit prædulcis, & comprimens uentrem, Hippocrates genus Tribuli Parathalassion, hoc est, maritimum appellat, idem cum terrestri: quod & minus est aquatico. Ex aquatico sane panes fiunt: ob id & Ferrariensem Castaneam, Gallia padana Tribulum uocat.

De Sarxiphago. CAP. XVIII.

exp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

S Arxiphagon, aliqui Sarxiphrangon, alij Empetron, Romani Saxifragiam uocāt. Frutex est surculosus, in petris & asperis locis nascens. Coctus in uino, mox potus, febricitantibus opitulatur. Stranguariæ prodest. Singultum sedat. Calculos uesicæ frangit, & urinam ciet.

BARBARI COROLL.

Pli. li. 27. ca. 9.

S Axifragum, et Saxifraga latine dicitur, item Calcifraga (si modo hæc est) quam et Plinius et Dioscorides alio loco Empetron appellant, Paulus Sarxiphages. Empetron inquit Plinius, fere in saxo nascitur. Recenti uires sunt. Vetustate perdit eas. Lapillos qui sufferuefiant, una rumpi affirmant. Habetur & Saxifragi genus alterum, in Adianto nobis explicandum. Corrosi & ambusti sunt hac parte Græci codices, nec quale sit huius herbæ folium animaduerti ullo modo potest: et in ipso uerborum textu, spaciolum inane uacat. Porro ueterem in Dioscoride picturā huius herbæ uidi, non plus folijs, q̃ Cirris minutis, per ramos ex intervallo conditis, nec frequentibus: in cacumine surculorum flocci ceu arentes porius q̃ flosculi, subrubida radice, nō sine fibris. Romæ talis ostendit in maritimis, ac montosis tantum, non rubida radice, sed candida: flosculis quoque candidis. Recentioribus de hac herba parum conuenit. Alij Tritici foliorū figurā, alij marinæ Bati similem dixere, alij Tormentillæ uulgo dictæ. Est aut (ut uolunt) Tormē tilla, Quinquefolio herbæ similis, nisi q̃ septem fere habet folia, nō gnq̃. Quarti herbā, quæ florem Caryophyllon uocatum ferat, de quo aliubi dictum est. Quinti Saxifragā eādem esse, aut proximam ei quæ Pampinula, Pimpinella, & Bipēnula, & Sanguisorba ruri dicitur: qm uulneribus iniecta ferrū & spicula facile ac citra sensum doloris exigit. Folio paruo, orbiculato, & extremitatibus serrato: qd et mandi soleat, paratū oleo, sale, aceto, surculis ab eadē radice plurimis atq; densis, rubentibus cū radice, ut ferunt. Quibusdam locis uermiculus eruit, q̃ curatus, sericis præcipue tingendis, Purpuram facit incomparabilem, cæteros colores splendore quodā & hilaritate superans. Inuentus, ut alia quoque multa casu, excrementis gallinaceorū, ira coloratis. Nam & usus Purpuræ, ut est apud Iulium Pollucem, ab Hercule uidet institutus, cōspecto canis rostro, qui purpuram deuorasset, infecto. Igitur Purpurissimum, ex hoc uermiculo Carbasinū præstanti amphitheatralium uelorum (ut arbitror) colore dicitur. Quidā Carmasinū appellat colorem, qm uermiculus is, punica lingua Carmes appelletur, quemadmodū & Coccus. Prodest & ab urbe Charmi, quæ Sardibus est, nomen accepisse coloris, quod lanas inficere Sardibus cœptū sit, ut inquit Plinius. Nā Carbatinis in Aristotelis secūdo de animalibus uolumine legendum, non carbasinis est. Sunt aut Carbatinæ, quas Catullus Carpatinas crepidas uocauit, calciamenti genus e Caria translatus, quod hodieque uulgo sic uocatur, detractis utiq; posterioribus syllabis, & s, litera principio adiecta, ut assolēt. Nam et Carpsiculus calciamenti genus est, ut Flauius Vopiscus ait, in Aureliani Cæsaris uita. Quidam tamen Carbasa etiamnum uocāt boum coria: quæ Cæsar Alutas appellauit. nam, ut Suidas scribit, ubi defecissent calcei, Carbatinis utebantur, ex crudis boum tergoribus recens detractis, ut illud Virgilianum. Vestigia nuda sinistræ,

Instituere pedis, crudus tegit altera pero.

De hoc uermiculo, nihil apud ueteres inuenias. Nam Sandix indica, de qua in Aureliani Celsa ris uitalegit, preciosas Purpuras fecisse, aliud tincturę genus puto. Hieronymus i sacris literis, uermiculū, & uermiculatas uestes nominat: granū (ut opinor) Aquifolia significans: qđ autō re Plinio quibusdā locis uermiculi similitudine conspicitur. Hinc deriuatum arbitror, ut Cocci nea uestis, Scoletidatā, hoc est, uermiculata uulgo diceret, siue quasi qsq̄uiliata (etenim granū Cocci, etiam Quisquiliū uocatur Plinio) a Quisq̄lijs opinor. Sunt em̄ Quisquilię, ut Festus ait, quicqđ ex arboribus minutū cadit. De uermiculo purpureo, Democritus qđ meminit tincturis utili, sed e purpuris, ac murice, ut conijcio. Nam et de uermiculo Galatę, hoc est, iligno*meminit. Pampinulę similis est, folio tantū minore, ac magis serrato & lentiusculo, quā nostri herbarij Eufragiā appellāt, minus fruticosa, flore luteolo, præcipue claritatis ad oīa uitā oculorū: ueteribus incompertam existimant: quemadmodum & illam, quæ Cartosilago dicitur a uulnerarijs. Nos Ceratophylacen uocandam putamus: quia partem oculorum Ceratoiden, hoc est, corneam defendat, salutiq; percussam restituat, folijs Seriphij, uel potius Roris marini, aut Lini quoq; capitulis arentibus, cirris subluteis.

A

De Limonio. CAP. XIX.

Limonion aliquibus Potamogiton appellatur, alijs Neuroides, alijs Lonchitis, alijs Rapionion, Mysijs Mendruta, Syris Meuda, alijs Lycosemphyllon, alijs Heleborosmata, alijs Scyllion, Magis lupi Cor, Romanis Viartum nigrum, quibusdam Titinabulum terrę, Gallis Iumbarum, Dacis Dacioa. Folia habet Betę, tenuiora & longiora, decem, sæpe plura, caulem tenuem, rectum, ut in Lilio æqualem, feminibus scatentem, quæ gustata adstringunt. Semen tritum, & ex uino acetabuli mensura potu, dysentericis coeliacisq; prodest. Rubra foeminarum profluuiā sistit. Nascitur in pratis & palustribus.

λημόνιον

B

BARBARI COROLL.

Limonium Beta est sylvestris, densioribus folijs. Aqua e radice cocta, maculas uestium, & membranarum eluit. Aliud genus est a Limonio Limania, ut in Scolymo notauimus. Limonium Aetius etiam Cynoglosson, hoc est, linguam canis uocari scribit.

Pli. li. 10. cā. 3

EX M. VERG. COMM.

Sylvestrem Betam Plinius, qđ eius folio sit, uolumine. 10. capite. 8. Limoniam uocat. Numeratq; eam in Betarum censu non male, si palustrem potius, qđ sylvestrem a natalibus eius appellasset. Creditur idem a multis eandem hanc, quoniam in riguis & aquosis pratis nascitur, & ab eis nomen in gręcis inuenit. 18. uolumine, cap. 6. pratensem herbam nominasse. Theophrastus in sexto de plantarum historia ad finem Limoniam gñe foeminino, inter Anemones genera descripsit sylvestrem, & inter ea quę tertium ordinem inter uernos flores antiqua ætate habuerūt. Nobis pro comperto non est, diuersum ne, an idem utriusq; genus sit. Hic enim floris Limonij huius non meminit. Neurodes Plinius uocari etiam Limonium ait: sed nulla ab alterutro dicta nominis eius causa est. Cur autem Potamogetona aliqui eam dicerent, in promptu causa est. Palustris enim planta, fluminibus uicina, qđ Potamogeton significat, merito dici potuit. Priuatim tñ eo nomine alia quondā indicata est, hoc ipso uolumine declaranda. Ab Elleboro nomē illi etiam factū in gręcis est, & a latinis Veratrum nigrum: qm̄ folio simile illi est Limonium: qđ in Elleboro describitur Plantaginis, aut sylvestris Betę. Quibus & hoc simillimū est, & eousq; æquale, ut palustris Beta Limonium dictum fuerit. Differunt in historia Limonij non leuiter scriptor hic, Pliniusq;. Hic decem, et pluribus aliquando folijs in caule uirere dicit: ille undecim sæpe caulium herbam esse testatur. Quod peritiores uideant.

De Lagopo. CAP. XX.

Lagopus hærbā, quam aliqui Leporis cuminum appellant, si sit aluum in uino pota, aut in febris ex aqua. Eadem inguini adligatur, in inflammatione. Nascitur in segetibus.

ληγόπουν

O ij

D I O S C O R I D I S

BARBARI COROLL.

C Lagopus, quasi pes leporis dicat. Sane & similis est ei aspectu. Proinde haud probarim eorum sententiam, qui Caryophyllatam uulgo dictam rentur, in opacis montanis gigni solitam, non in segetibus, ut Lagopus. Hippocrates nominat & Lagopyron, quasi leporis triticum intelligas, furfuribus cum inaruit simillimam: folio paruo, quasi oleagineo, longiore tantu, cruentis uulneribus imponens. Hanc Galenus Leporariam inquit herbam esse.

EX M. VERG. COMM.

Discrepant grauissime in leporini Pedis herbae natalibus hic scriptor, & Plinius. Alter enim in segetibus, quae in re latina manifestam ex Varrone significationem habent; alter in ratis agris nasci tradiderunt. Quae graecis sunt quadratae hortorum ad confectionem olerum dispositae areae. Nos graecorum lectionem secuti, qualem inuenimus uocem uertimus. Barbarus ex Plinio in segetibus nasci tradidit, magno inter segetes & hortorum areas discrimine. Qualis autem haec nascatur, non erit difficile leporino Pedi similem Paniculam in ea obseruasse.

De Medio. CAP. XXI.

Medion aliqui Medicam appellant, alij Triphyllon, alij Clemathion, nonnulli Olmon, quidam Trigonon, alij Cybellion, alij Polyphyllon, Romani Trifolium odoratum, Aegyptij Epaphon. Medion in faxis & opacis nascitur. Folia habet Iridis, caulē tricubitalem, & in eo florem grandē, purpureū, rotundū, semine Cnici minuto, radicē dodrantalem, crassitudine baculi, gustu acerbo. Quae trita, in farinam, & ex melle decocta, rubros menses foeminarum sistit, eclegmate per aliquot dies sumpto. Semen in uino potum menstrua pellit.

BARBARI COROLL.

DMedion. Exemplaria sunt in quibus folia ei non Seridis, sed Iridis reperiuntur: Plinius quoque Iridis satiuæ scripsit. Sed cum satiuæ adiecerit, non de Iride, quam nemo legat satiuam esse, quando, ut inquit Theophrastus, Iris cultum nullum desiderat, sed de Seride uidetur intellexisse: cuius constat duo esse genera, satiuum, & syluestre.

EX M. VERG. COMM.

Discrepant in similitudine foliorum eius ueteres graeci. Alij enim Iridi, alij Seridi, quae Cichorii genus est, secundo libro a nobis tractati, similia dicunt. Plinius quoque Iridis satiuæ dicens, scripsisse Seridis credi potest: quando satiuæ discrimen Seridi proprium sit: Iridis autem nescio an haecenus aliquando hic dixerit. Scimus quidem, syluestrem Iridem dici in plantarum censu, sed ea proprium habet Xyridis nomen, de qua mox dicetur. Nobis inclinatur animus, ut Seridis potius quam Iridis folio Medium esse opinemur.

De Epimedio. CAP. XXII.

Epimedium, ab alijs Erineos, ab alijs Tryas, a nonnullis Polyrhizon, a Romanis Vindicta nominatur. Caulis est non magnus, Hederæ folijs, denis atque duodenis, neque florem, neque fructum ferens. Radice tenui, nigra, graui odore, gustu fatuo. Nascitur in humidis. Folia cum oleo trita, imposito cataplasmate, mañas crescere non sinunt. Radix conceptu adimit. Folia quinis drachmis, post menstruas purgationes quinq; diebus in uino pota, praestant mulieribus ne concipiant.

EX M. VERG. COMM.

Avet quae Medio in plāta hac addita graecorum prepositio ἐπι est. Significat enim Epimedio, quod Medio accesserit. Id autem est foliorum magnitudo, quae in Medio satiuæ Seridis sunt, in hoc Fici. Ideoque Caprificum a quibusdam hic uocari eā tradit: & eadē significatione Thriada. ἐπίον enim graeci ficulneum folium uocant. Sunt tamen in quibus non ἐπίον per, i, sed ἐπυδον per, v, legunt. Quod si recipiatur, tunc dictam intellexisse oportebit, a palustri planta, quam Thryon idem graeci dicunt.

De Gladiola. CAP. XXIII.

Xiphion, aliqui Anaclorion, alij Phasganon, alij Machæronion, alij Arion uocant, Romani Gladiolam, quidam Genitalem. Nomen inde accepit, quod folium gladij præbeat speciem. Iridi simile erat, nisi minus & angustius uideretur, & gladij modo mucronatū, neruosumque. In caulem exit cubitalem, in quo purpurei flores, in ordinem digesti, inter se distant. Rotundo semine, radicibus geminis, una bulborum modo super alteram insidēte. Quarum inferior gracilis est, superna uberior. Nasclitur in aruis. Pars superior radice cum thure illita, admisto uino, spicula & aculeos e corpore extrahit. Panos cum lilij farina & hydromelite discutit. Qua de re huiusmodi emplastris inferi solet. Menses imposita trahit. Superiōri radice ex uino pota, Venere rem stimulari, & inferiore sumpta sterilefcere tradunt. Superiōrē quoque utiliter infantium enterocelis, cum aqua potui dari præcipiunt.

BARBARI COROLL.

Xiphion, a Theodoro dicitur Pugio. Floret uere, cum Viola nigra. Falso plerique arbitrantur Xiphion eandem esse, quæ & Lonchitis. Sed illa in siccaneis, hæc in humidis nascitur. Sunt & alia discrimina, quæ notari possint uolentibus. Habet hæc & radicem ad nucis auellanæ similitudinem fimbriatam, quæ effodi ante messes oportet, & in umbra sicari. Videtur hæc & Phasganon, & Machæronion, hoc est, Ensis uocari: radice, ut Theophrastus inquit, dulci, decocta, & comendata panificis, si trita farinæ admisceatur. Vnde Machæronij pastilli fortasse ortū habere, quos tertio Kalendas octobres uulgus elstat. Item rotunda, & sine cortice capillata fibris, ut Gethyum. Scolymus tendre in herbam frequenter conueniunt. Est & compositionis cuiusdam in medicina uiridis nomen Machæron, ad morbos articulares, & Ischiada. Habet & Xiphias piscis, quem Gladiolū interpretantur, duo, ut inquit Aristoteles habes rostra, sed dentibus carēs.

Pli. li. 25. ca. 111.

EX M. VERG COMM.

Hæc est Gladiolus illa, cultellato folio herba, cui a principio statim Iridis folia hic comparantur: princeps in hoc foliorum genere, & quæ prima huiusmodi similitudinis notam ceteris dedit: ideoque tot gladiorum appellationibus diuersis locis indicata. Florere hanc uere cum Oenāthe, nigra Viola, Helychryso, Limonia, Anemone, & Hyacintho Theoph. ait. Vocaturque & ipse Xiphion, Plinius multis locis Gladiolum: quo tamen loco expressio de ea agit. 25. uolum. cap. 11. Xiphion, & Phasganon græcis nominibus eam appellat. Nec de folio eius aliud tradit, quam cum primum ex terra prodit gladij ostendere speciem. Hic ultra addidit, Iridi simile esse, breuius tamen & angustius, ἢ ἡ ἱρις ὡς μαχαιρίων. In quo uidendum est, an in mucronem desinens dicendum sit, an decurtati mucronis: quales cultelli aliquando in incidendi tamen usum fabricantur. Vtrique enim ἄκρον significare ex diuersa propositionis eius ui potest: & quod ἀκρον ὄν. i. in acutum derafum est, & cui ex acumine suo ablatum aliquid fuerit: ut ἀκρον Thucydides ait, & in græcis multa alia inueniuntur. Pro duabus deinde radicibus eius reuocanda legentibus in hunc locum erunt, quæ in Testiculis duabus plantis superiore uolumine dicta a nobis fuerunt. Nec aliter in Gladiolo hac duas inueniri radices, quam in bulbosis plerisque alijs, in quibus præteritū anni bulbis & radix inferior semper est: genitaque ex se alia cedit ipsa, donec tertio, aut quarto anno tota pereat. Auellanis Plinius eas comparauit: hic naturæ notas magis secutus, bulbos paruos uocauit. Discrepant in natalibus eius Dioscorides & Plinius magnopere. Hic in aruis, ille in Pumis: alter in genere ἀρουρίων, quæ qualia sunt superiore libro dictum a nobis est, posuit: alter in aquis & palustribus. Potest tamen uterque quod uerū sit dixisse: nam possunt arua humida esse. Diosc. præterea in aruis maxime nasci dicēs, nō negauit penitus posse etiā in aquis nasci.

De Sparganio. CAP. XXIII.

Sparganion aliqui Xiphidion, alij Bolon uocant. Folia Gladiolæ, sed arciora & in terram magis procumbentia. In summo caule piceo

σπάργανιον

O iij

D I O S C O R I D I S

Culæ prominent, in quibus semén. Contra serpentis uenena radix cum uino datur.

E X M. V E R G. C O M M.

In decursu, & ueluti ad alia festinans Plinius, de Sparganio hac. 25. uolumine, capite. 9. egit: nihil ultra de ea testatus, q̄ aduersus serpentes bibi radicem eius quam Sparganion uocant, ex uino albo. Nec nos quod illi adiciamus aliud habemus, q̄ esse in græcis qui ἀπὸ τῶν σπάργανων dictam putent: q. f. folijs eius satis, & uilium modo lentis, pro fascijs his uterentur: quibus nutrices infantes suos ulneunt, quas græci σπάργανον dicunt: & σπάργανον uerbum, in infantium uinculis & fascijs his notissimum.

De syluestri Iride. C A P. XXV.

Evrip

XYris ab aliquibus Iris agria, ab alijs Cacos, a Romanis Gladiolus, aut Iris agrestis, a Dæcis Caprus dicitur. Folia habet Iridis, latiora, & in turbinem mucronata, quorū medio caulis erumpit, crassus, cubitalis, ex quo siliquæ triangulares depēdent. In quibus purpureus flos, in medio puniceus. Semen in folliculis simile fabis, rotundum, rubrum, acre. Radix longa, geniculata, ruffa. Contra capitis uulnera, fractaq̄ efficax est. Aculeos & spicula omnia citra molestiam extrahit, adiecta floris æris tertia parte, & radices Centaurij, ac mellis contra. Tumoribus & collectionibus illita cum aceto medetur. Radix ex passo bibitur, ad conuulsa, rupta, coxendicū dolores, strangurias & alui profluvia. Semen tribus obolis potum, urinam uehementius impellit, & cum aceto lienem absumit.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli, li. 21. ca. 20

D

XYris, & Xeris, aut Xyrida, Galeno teste, dicitur. Scelus herbariorum quorundam aperit hoc loco Plinius, partem eius seruantium, & quarundam aliarum herbarum, & Plāraginis, & Iridis substituentiū, si parū mercedis tulisse arbitrantur: rursusq̄, ut plus operis acquirant, partem eā quā seruauere, eodē loco infodiūt. Credo ingit, ut uitia, quæ sanauerint, faciāt rebellare.

E X M. V E R G. C O M M.

Posteriores de syluestri hac Iride docuerunt, quod nos nunq̄ non in agris æstate discedentes, in sepibus uidimus: cultellato ut hic ait, folio inter uepres & saxa nascentem herbā, multo foliorū cespere, acuminato mucrone, multo breuioribus q̄ Iridis, & ut hic ait latioribus: duob. tribusue, & aliquā quatuor caulibus, in q̄bus tument oblōga ueluti capitula: quæ suo tpe puniceo magis q̄ purpureo colore florēt: et cū defloruerūt, folliculos relinquētia lōgitudine digitali triquetros, in q̄bus tria, quatuorue semina ex oscillis suis pendent priuatim, nec aliq̄ in Fabae locis distincta: colore rubro cū maturuerūt: quæ nō sunt ipsa uere semina, sed latentium intra se seminum pericarpia & inuolucra: qualia licebit uolentibus quotannis obseruare. Saxosae sepes, & quasi macerias agrorū amat: luctaturq̄ inter saxa exiēs. Hos eius natales, & has plantæ notas nos obseruauimus: poteruntq̄ aliq̄ ex his facillime cætera deprehendere.

De Anchusa. C A P. XXVI.

Evrip

ANCHUSA aliqui Cantanchusam uocant, aliq̄ Libycam, aliq̄ Archibellion, aliq̄ Alcibiadion, aliq̄ Onophyllon, aliq̄ Porphyrida, aliq̄ Mydusam, aliq̄ Calycā. aliq̄ Noneā, Aphri Bunefath. Anchusa, quæ alio nomine Calyx, aut Onoclia appellatur, folia habet Lactucæ acuti folij similia, hirsuta, aspera, nigra, multa, quoquoersum humi sparsa, spinis horrida. Radici crassitudo digitalis. Quæ æstate prouenit, manus inficit sanguineo colore. Lætō solo nascitur. Radix adstringit. Ad ambusta & uetera ulcera, ex oleo & cæra efficax est.

Igni sacro cum polenta medetur. Lepris & uutiliginibus illinitur ex acet-
ro. Partus extrahit, uuluæ indita. Eius decoctum renum uitijis, lieni & bi-
le suffusis datur, & si febris sit, ex aqua mulsâ. Siftunt aluum folia in uino
pota. Radice pigmentarij utuntur ad spissamenta.

B A R B A R I C O R O L L.

Anchusæ caulis, non ut aculeatarum multiserpens, sed stans. Funditur Papyri modo. Radix
inficiendo ligno, cerisq; apta, præparans & lanas preciosis coloribus, Laodicens maxime. Vt
Democrito placet, liquari non potest in aqua ad medicinas: oleo resoluitur: idq; synceræ expé-
rimentum est. Habetur & alia similis, Pseudanchusa, ob id appellata a quibusdam Enchusâ,
aut Doris, & multis alijs nominibus, lanuginosior, & minus pinguis, tenuioribus folijs, &
languidiorebus, radice oleum non fundente, sed rubentem succum: & hoc ab Anchusâ discer-
nitur. Anchusæ primum genus, Onoclea cognomen habet, & Chærospelethos in Paulo. Se-
cundum Onochelos, siue Alcibiadios. Tertium pusilla, fereq; innominata. Quartum Lyco-
psos. Anchusam poetæ sunt, qui & Enchusam uocant: q̄q; Enchusa pro Pseudanchusâ po-
tius, q̄ pro Anchusâ capitur a nonnullis, ut prædixi. Hippocrates Anchusam uidetur intel-
lexisse, cum Schelida nominauit, ut Galeno placet.

Pli. li. 21. ca. 6.
Theoph. li. 9.
plant.

E X M. V E R G. C O M M.

Numerauit, coniunxitq; Anchusam Theophrastus libro octauo de plantarum historia
Coronopodi, quam cornicis Pedem uocauimus: Chamæmalo: & plerisq; alijs, quæ ἰπικυό-
φυλλα ille uocat, id est, folia per terram spargentia: quod hic ait πρᾶσιπλάμιναι τῇ γῇ, quod est,
per terram sparsa. Nicander, quod & ab hoc dicitur, Lactucæ similia ostendit. Versiculus eius
est, ἂν γὰρ ὄτ' ἀρχαῖον ἐπιδεικνύει δάσος χαίτην. quod est, Lactucæ similia. Plinius inter aculea-
tas numerat, a cæteris in foliorum positura discrepans. Locus est. 21. uolumine capite. 16. Acu-
leatarum caules aliquarum per terram serpunt, ut eius quam Coronopon dicunt: & ex diuer-
so stans Anchusâ. Stantem Anchusam dicit, quam Theophrastus ἰπικυόφυλλον uocauit. Nec re-
fert, q̄ Plinius caules dixerit, in caulibus enim folia. Omnes postremo sanguinei coloris ha-
bere radicem testantur, non toto quidem anno, sed æstate tantum, quo tempore colorem illum
natura in ea decernit. Ex qua tēporis nota, quod passim in cunctis græcis legebatur, in τῷ ἔρι-
γινωμένῳ, id est, æstate nascentem, ex antiquissimi codicis nostri fide γινωσκόμενον instaurationi-
mus, & uertimus. Quod enim hic ait, eo pertinet, ut per æstatem tantum eo colore sit, tuncq; co-
gnosci, & deprehendi tuto possit. Fuisse autem colorem ex Anchusæ huius radice in precio
& honore quondam, nihilq; non eo colorare ueteres consueuisse, græci latinique passim omnes te-
stantur. Pliniusq; quo diximus loco, Inficiendo ligno, cerisq; radice apta. Nec multo post. 22.
uolumine, capi. 20. Manus inficit sanguineo colore, lanasq; præparat preciosis coloribus. Hic
ipse in rosaceo monuit unguentarios, ad bonitatem coloris Anchusam illi addere. Et ne longio-
res simus, nihil nō Anchusæ radice sanguineo succo colorabatur. Eamq; ob causam iniectus
mihi scrupulus est, quod in extremo capite legitur, ad unguentorum spissationem, non ad hoc,
sed ad colorem potuisse quondam pertinere. Rara hæc in alijs plantis coloris nota: eamq; ob
causam diligentius in hac eruscanda. Nobis hætenus uidere eam non licuit, & præter ab an-
tiquis dicta, nihil oculati testes addere illi possumus: eadem in tribus alijs eius generibus for-
tuna etiam utentes. Audiuius tamen, in pascuis quæ ad Populoniæ amplissima sint, nasci
herbam, quam gregibus suis noxiam pastores uident, omnibus ijs notis ab eis descriptâ, præ-
sertimq; sanguineo radicem succo: sed nihil pro comperto nobis aliud de ea est.

De alia Anchusâ.

CAP. XXVII.

Est & alia quam aliqui Alchibiadion, aut Onochiles appellarunt.
Hæc a priore distat, q̄ minora habeat folia, sed simili modo aspera,
ramulos exiles, florem purpureum, radices rubras, oblongas. Quæ mes-
sibus sanguineum succum fundunt. In sabulosis nascitur. Vis ei folijsq;
inest, quæ contra uirus cum reliquorum serpentium, tum maxime Vi-
perarum auxiliatur, siue cibo, siue potu, siue alligatu. Nam si quisquā man-
dens in serpentis os inspuat, eum necabit.

D I O S C O R I D I S

B A R B A R I C O R O L L.

C Anchusa Onochelos, alij Thexiam, & Archeuion, multi Enchryson: paruo frutice, radice præterq; mellibus nigra: tunc em sanguinea est, uiresq; habet. Folijs tritis, odor Cucumeris.

De alia Anchusa.

C A P. XXVIII.

Est & alia huic haud dissimilis, semine puniceo, minore. Cuius semen manducatum, si in serpentis fauces inspuatur, eam interficiet. Radix acetabuli mensura cum Hyssopo & Cardamomo pota, latus uentris tinea excutit.

E X M. V E R G. C O M M.

Quatuor fere antiquis Anchusæ. Tres dictæ hæcenus: & quæ statim sequit cognomen Lycopsis: etsi postremâ hanc priuatim aliqui, & per se docuerint. Omnes cõmunè aliquid, & in quo cõueniant habent, ideoq; cognomines: id autè maxime, rubes radice succus est: alioquin in medicina uires diuersæ & inæquales illis sunt. Siquidem quæ Onoclea dicitur, prima in earũ censu, adstringente, & subamarâ habet radicem: ideoq; lienosis, & cū urinis malo aliquo doloribus mederi dicta est. Eadem cū polenta, emplastri modo imposita, sacris ignibus accommodata credebatur. Eiusdem folia, q; minus q; radix refrigerat & siccant, cõtra fluores alui, q; diarrhiâ uocant, quondâ bibebant. Quæ uero Lycopsis dicta est, de qua mox agei, maiore adstringendi ui q; illa, sacris ignibus magis accommodata erat. Quæ Onochelos, siue Alcibiados dicit, maiore reliquis oibus in medendo ui uiperarũ moribus in cibo, potuq; & alligata in usu erat. Quarta omnium aliarũ breuior, sine nomine, maiore q; Alcibiados illa amaritudine pellendis uentris animalibus in usu fuit. Et hæc in antiquis græcorũ medicis Anchusarum omnium decreta fuerunt, omnia ut uidetur ab hoc scriptore accepta.

De Lycopsi.

C A P. XXIX.

LY C O P S I S, quæ nonnullis Anchusa uocatur, longioribus q; Lactuca constat folijs, asperioribus, latioribusq; crassis, ad radicis caput recidentibus. Caule longo, recto, scabro, hirsutis adnatis multis, cubitalibus, flore paruo, purpureo. Radice rubra & adstringente. Nasçitur in campestribus. Cum oleo radix illita uulneribus medetur, & cum farina hordeacea ignibus sacris. Sudores peruncta mouet, adiecto oleo.

E X M. V E R G. C O M M.

Priuatim, seorsumq; a reliquis Anchusis Plinius de Lycopside hac uigesimo septimo uolumine, capite decimo egit. Nihil tamen illi tribuit, quod ab hoc scriptore acceptum non fuerit. Idem & Nicander in Theriacis suis fecit, post Anchusam Lycopsidem cum plerisq; alijs numerans. Antiquiores autè Græci Anchusæ congenerem fecerunt, secundamq; in eo censu numerabant, hic ultimâ docuit: licetq; Anchusam esse non dicat, sed ab aliquibus uocari, lioriæ tamen ordo, & quæ illi tribuuntur notæ, Anchusis alijs congenerè merito faciunt.

De Echio.

C A P. XXX.

ECHION aliqui Aridam, alij Alcibiadion, Romani Alcibiacum nominant. Folia habet prælonga, hirsuta, subalbida, Anchusæ proxima, minora tamen, subrubra, & pinguis, spinulis tenuibus horridula. Cauliculos exiles, numerosos, minutaq; utroq; latere folia, in uersus digesta, nigra, in summo caule minuscule. Flores secundum folia purpureos, in quibus semina capiti Viperarum similia insunt. Radix nigricat, digito tenuior. Quæ non percussis modo a serpentibus ex uino prodest, sed eos qui antea biberint feriri non patitur. Folia &

semen idem præstant mnnus. Lumborum dolores sedat. In uino aut A
forbitione sumpta, lac extrahit.

BARBARI COROLL.

EChios, etiam Dorias a Paulo uocatur. Plinius, Echios inquit, utriusq; generis Pulegio si-
milis est, coronata folijs: altera lanugine distinguitur spinosa, cui & capitula sunt Viperæ. Qui
dam Echion pro Personaria inquit cõpere. Dioscorides hoc loco unum facit genus Echij, non
geminum. Sed Nicandrum uidetur sequutus esse Plinius, in theriacis dicentem, Echios duas
esse, contra bestiarum ætus utiles. Alteram humilem, folio Anchusæ spinis horrido, sed exili.
Alteram altiore, maiore folio, flore paucio, per ambitū purpureo, capitulis Viperæ, cacumine
aspero, atrisq; lanugine. Idem poëta paulo supra, quasi tertiam eiusdē nominis reddendo,
Echios inquit, cognomine Alcibios, herba est spinosa, coma sustinente flores, radice alta & exi-
li: quā ad serpentes, & inijci uulneribus, & cõmanducari quoq; præcipit. Folia quoq; ipsa non
multo post, eiusdē Alcibij cõmendat, quantū manu cõprehendi possit. Plinius. 27. uolumine.
Alcibios inquit herba, qualis esset, apud auctores non cõperi: sed radicē eius, & foliā trita, ad
serpentis morsus bibi & imponi iubent, folia quantū manus capiat, trita cum uini meri cya-
this tribus, radicem drachmarū trium pondere cum uini eadem mensura. Ideo autē qualis es-
set Alcibios apud auctores comperisse negat, quoniā præter Nicandri uerba illa, & pauca, &
alijs cõmunia quæ prætexui, non legitur qui descriperit. Alteram uero esse Alcibion Nican-
dro q̃ duas illas priores Echios, scilicet, ostenditur: & q̃ Echis hæc, non Echios ab ipso dicitur.
Et q̃ eandem herbam uno loco bis depingi opus non erat.

Pli, li, 29, ca, 6.

EX M. VERG. COMM.

Duo Echij, siue Alcibij huius genera antiquiores fecerunt, præsertimq; Nicander utrunq;
his uerbis describens. Ἰνδὰ δὲ αὖτ' ἔχια πιδάκιο, τὴν δὲ τὸ μὲν πον ἀρχαῖον προσοικὸν ἀκανθὴν πιδάκιο
παῖρον ἐπὶ τυτθόντι καὶ ἐν χθονὶ πυθμὶνα τίνι, ἡ δ' ἰτίρη πιδάκιοι, καὶ ἐν καλύνιασι θάλασσα ἡ-
δὲ πῖρις πορφυρίεται ἐνθεὶ βλάστῃ δ' ὅσ' ἔχ' ὅσ' ὀφειδανὸν δ' ἰσχυρὸν καὶ ἀνών. Quorum sensus sit. Esse
duo Echia, habereq; alterum spinosa Anchusæ modo folia, uerum parua, et per terram sparsa.
Alterum maioribus folijs, & purpureo flore esse, aspero, lanuginosoq; caule, capitulis Vipe-
rarum figura, quod Plinius ait. Item altera, quæ lanugine distinguitur spinosa: cui & capitula
sunt Viperæ similia. Nicandri interpres ex Numenij antiquissimi scriptoris Theriacis, duo E-
chij genera itidem facit: uocariq; alterum, quod breuius est, Ocimoides: quoniā Ocimo simi-
lia habet folia: Alterū uero spinoso folio, priuatim Echion. Quod primū a Dioscoride descri-
ptum est: mox autē describetur alterū, non sub Echij, sed Ocimoidis nomine.

B

De Ocimaistro.

CAP. XXXI.

OCymoides aliqui & hanc Echion uocant, alij Scorpium, alij
Sparganon, alij Althæam, alij Amaranthida, alij Probathæam,
alij Elaphion, alij Antiminon, alij Porphyriada, alij Agion, alij Nemesi-
on, alij Phileterion, alij Hyænopsolon, alij Thyrsitū, alij Themutū, alij
Misopathos, Latini Ocimaistrum. Folia fert Ocimi, & ramos dodranta-
les, hirsutos, filiquas Hyoscyamo similes, semine ut Gith nigro prægan-
tes. Vim habet semen in uino potum, qua uiperarum, cæterarumq; ser-
pentium morsibus medeatur. Datur ischiadicis cū melle, uino, myrrha,
& pipere. Radice nititur tenui & superuacua.

δουμανθία

BARBARI COROLL.

DE Ocimoide, nonnihil in Ocimo dictum est.

EX M. VERG. COMM.

Quo syluestris ad satium discriminē Menthastrum, Apiastrumq; latini uetères dixerunt,
eadem naturæ, & nataliū analogia Ocimaistrum ab ipsdē dictum fuisse, uerisimile
est. Plinius tamē syluestre Ocimū contētus dixisse, paucis medicinā & historiam eius absoluit.
Hic in maiore honore ueteribus fuisse Ocimaistrū, ex tam multis eius appellationibus indicat:
quarū plures ex alicuius partis ad alias herbas similitudine illi a gentibus per tempora accreue-

C runt. Nec difficilius hoc tēpore quicq̃ est, q̃ earū multiplices huiusmodi rationes inuenisse: præsertim non bene semper similia inter se cōparantibus imperitis herbarijs, aut ex una, altera ue simili parte neglectis maioribus, & quæ magis ex re sint differentijs, medicā materiam alijs, atq̃ alijs appellantijs. Cur autē Echion Ocimoides diceretur, satis superiore capite dictū est. Cur autē Scorpium, Sparganium, Althæa, Amaranthis, & Philetærium, quæ omnes in scriptore hoc plantæ sunt, ex earū similitudine uidentū est. Probatæa deinde, & Elaphios, ut conijcere licet, ouilla & ceruina herba dicta est: uel q̃ quadrupedes hæc libenter ea uescantur: uel q̃ natura docuerit, uel homines inuenerint, uenenatorū maleficia hoc remedio ab illis arce. Porphyris mox a colore floris, quemadmodum & Augion ab eius splendore, Thyrsitis postremo ab hirsutis ramulis, quos thyrsorum figura profert.

¶ De Erinō.

C A P. XXXII.

E Rinon aliqui Hydreron, aliqui Ocymoides uocant. Nascitur apud fontes & fluuios, folijs Ocymi, sed minoribus, parte super na diuisis, quinis, senisue, dodrantalibus furculis, flore candido, semine nigro, & acerbo. Folia & caules lacteo succo turgent. Semen drachmis duabus, in quatuor mellis cyathis oblitum, oculorū fluctiones cohibet. Succus cum sulphure & nitro instillatus, aurium dolores sedat.

B A R B A R I C O R O L.

E Rinos herba cognominis arbori Caprifico est, ob id a Plinio inter Ficos, Caprificosq̃ red dita, non naturæ, sed gentilitatis respectu. Lac eius dulce. Galenus hanc non Erinon, sed Echionon uocare maluit. Vetus quoq̃ Dioscoridis sunt codices, in quibus non Erinos, sed Echionos scriptum sit. Est & apud Hippocratem Echini herbæ mentio.

E X M. V E R G. C O M M.

D Secutus græcorum nomen Plinius, aquatici Ocimi huius historiam & medicinam inter Ficos libro. 27. capite octauo tractauit. Longeq̃ a congeneribus suis herbam inter arbores descripsit: contra scriptoris huius præcepta & leges, qui in totius operis proœmio grauiter damnauit, qui literarum ordinem sequentes, cognata a congeneribus suis diuellerent: manifesto argumento, in tractanda medica materia, indicibus librorum magis, q̃ totis commentarijs usum fuisse eum scriptorem. Posteriores rem magis, q̃ nomen secuti, inter Ocima de eo tractauerunt: neglectaq̃ lactei, & qualis in Fico est, liquoris una nota, ex qua Plinius Ficis id adnumerauit, ex alijs quæ multæ inter herbas describi herbam cōgebant, aquaticum Ocimum, aut Ocimoides, quod Ocimo simile significat, appellauerunt. In quo habent grauissimum testem hunc scriptorem, qui inter congeneres herbas, & statim a uero Ocimoide eam tractauit. Nec si Græci a ficulnei lactis liquore eam appellauerant, ideo separanda a congeneribus suis erat. Illi enim non, quia Ficus, arborue sit, Erinon, id est, Caprificum eam uocauerunt, sed quoniam Caprificorum modo lac sectus eius caulis, & expressa folia stillant. Laudauit aquaticum Ocimum hoc contra uenenata in Theriacis suis Nicander, quod in scriptore hoc non legi, demiretur aliquis, præsertim testante id Plinio. Versiculus Nicandri est, *κλωθοντ' ἐν ἀρκίσειν ἱρίον*. Quod est, Et uirentis ad radices montium Erini. Tradidit Dioscles, a quo Plinius multa accipit, Ocimo simile esse: nasci prope flumina & fontes, & præter id apricis locis, & ad radices montium. Est illud etiam animaduertendum, credere nos quod in extremo capite est, finire aurium dolores instillatum succum, de lacteo liquore illo intelligendum esse. Is enim eius herbæ succus est. Nos tamen *χρὸν* inuenientes, ex instituta a principio in his nominibus a nobis lege, nihil detorsimus, incorruptam in hoc scriptore uocum, & eandem semper significationem seruantes.

¶ De Gramine.

C A P. XXXIII.

A Grostin aliqui Aegicon, alij Amaxitin, Aegyptij An uphi uocant, Latini Gramen, aliqui Asphyllion, alij Sanguinalem, alij Vniolam, Hispani Apariam, Daci Coriatam. Aphri lebal. Gramen geniculatis serpit ramulis, a quibus crebro radices spargit dulces, articulis

præcinctas. Folia dura, & ut harundinis parua lata, in exilitatem fastigi-
antur. Ea quæ iumenta & boues pascunt. Trita radix illitu, uulnera conglu-
tinat. Decoctum eius in potu, torminibus medetur, & urinæ difficultati-
bus. Calculosa etiam uesicæ excrementa comminuit.

BARBARI COROLL.

Gramini ab internodijs ramorum, & cacuminibus radices nouæ pullulant. Sunt qui & aculeatum Gramen inuehant, trium generum, Dactyli cognomine. Vnum, cuius in cacumine aculei sunt plurimum quini. Alterum Aizoo simile, Dactylon priuatim uocatum, quoniam digitis medeatur. Tertium genus tenue. Nascitur in parietinis, aut tegulis. Nulla herba graminis iumentis Gramine, siue uiridis, siue in fœno siccata. Tunditur aspersa aqua, Radix adhuc tenera mandendo est. Gramen Marti consecrauit antiquitas, quod ex humano cruore procreatum crediderit. Quæ & omnis herba Gramen abusione dicitur. Quidam Saturno dicant, quod ab eo satum primo perhibent. Glaucum uero immortalitatem, huius herbe cibo consecutum, Aethæus ex Aeschionis poetæ uerbis existimat.

Plin. li. 24. ca. 19.

EX M. VERG. COMM.

Vulgatissimum inter herbas Gramen est. A capris Aegicon, a iumentis Amaxitim antiquitas nominauit: quod capræ scilicet, & iugo, carpentisquæ seruietia iumenta eo passim uestiant. Sanguinali uero, quod humano cruore procreari ueteres falso crediderint. Angustij urinæ opitulanti hic ait: conuenitque in eo antiquis medicinarum auctoribus, qui inter diuretica simpliciter id numerant: ultra quod hic lapidosa etiam uesicæ excrementa frangere ait. Extrema tamen hæc pars in aliquibus græcis aliter legitur, καὶ λίθου σπύγμης, quod est, facere Gramen ad urinæ angustias, uesicæque ulcera, & calculos frangere. Quæ omnia a Plinio. 24. uolumine capite decimonono, toridem, & ipsædem uerbis reddita fuerunt.

De harundinaceo Gramine. CAP. XXXIII.

Est & harundinaceum Gramen, priore multo maius, quod iumenta nec
care tradit, præsertim in Babylone. Idque iuxta uias nascitur.

καλὴ καὶ ὑγίαινη

B

BARBARI COROLL.

Alamagrostis, a Plinio Gramen simpliciter uocatur, infestum camelis. Quidam Babylonum Gramen cognominant.

EX M. VERG. COMM.

Contraxit Plinius ad Camelos, quæ hic iumenta dixit, enecare Gramen in Babylonis regione iuxta uias nascens. Nec facile est nobis modo ratiocinari, camelos ne ille dixerit, quia multo hoc, & quasi solo ad uesturam iumento semper usa ea regio fuerit: an quia Gramini illi, & animali huic ex naturæ antipathia discordia sit. Huic idem, aut simile uidetur esse, quod a Parnaso Gramine statim hic ait: natum in Cilicia Gramen, in cibo sumptum boues exure: facereque id alter ex interpretibus ait impositum, alter uero in Sicilia: cum tamen antiqua & uera lectio sit, ἐν καλῇ, & βρωσίμῃ, id est, in Cilicia, & in cibo sumptum; Plinius longissime de omni Gramine, quo diximus loco paulo ante longius egit: neque ab hoc scriptore adeo diuersus, ut de his ultra agere nos oporteat.

De Gramine Parnasi. CAP. XXXV.

Quod in Parnaso monte gignitur, densius fruticat, folijs hederaceis, flore odorato, candido, semine paruo, non inutili. Radicibus quinis aut senis, digitali crassitudine, candidis, mollibus, & mirum in modum dulcibus. Succus si in uino cum melle pari, & myrrhæ dimidio decoquat, adiciaturque piperis & turis tertiæ portiones, probatissimum erit oculorum medicamentum. Id in area pixide recondit. Decoctum radicis, idem quod herba præstat. Semen uehementius urinam impellit. Alium, uomitionesque sistit. Natum in Sicilia Gramen, quod incolæ Cinnam appellant, boues inflammat, si eo uirenti sæpe pascantur.

D I O S C O R I D I S

C B A R B A R I C O R O L L

C Gramen Parnaso monte, folium habet Hederæ, densius quàm usquam fruticans, cum in reliquo orbe folia in exilitate fastigent. Succus huius excipiunt propter ubertatem, qui & dulcis est. Gramen Ciliciū, hoc est, Cinna, Sunt qui & Medon uocent: nec amburi eius recentis pastu boues, sed pinguescere contendant. Nato alterutris errore, quod alij *πινυγγοι τοῦ βίου* legebāt, alij *πινυγγοι*.

¶ De Siderite.

C A P. XXXVI.

videtur

Sideritū aliqui Heracleam uocant, Magi Genituram, aut sanguinem Titani, alij Scorpionis urinā, Pythagoras Parmiron, Andreas Xanthophanea, Osthane Bocphthalmon, Aegyptij Sendionor, Romani Vertemnium, alij Soleastrum, Aphri Vdedonin. Folia habet Marrubij, sed longiora, satis ad frondem quercus, aut saluæ accedentia, minoramen, & hirsuta. Caules ædit quadratos, palmum saepe excedentes, non iniucundi gustus, aliquantumque substringentis. In quibus per interstitia, orbiculatæ uertebrae, ut in Marrubio spectantur. Et semen in eis nigrum. Nascitur in petrosis. Illita folia, suapte ui, uulneca sine inflammationis periculo iungunt.

C B A R B A R I C O R O L L

Pli. li. 12. ca. 17.

Sideritū primam, aliqui ueram Achilleum cognominant, alij Sideriten. Odoris foedi cum teritur, tradunt. Nostri Sideritū eam, quæ est latissimo folio, Scopam regiam appellant, medentem anginis suum peculiariter.

¶ De alia Siderite.

C A P. XXXVII.

D

Alia Sideritis binum cubitorum, ramulis exilibus, folio Filicis, in ambitu utraq; parte diuiso, pediculo longo, pdeuntibus e summo alarum sinu furculis, longis, tenuibus, capitulo in cacumine orbiculato, aspero, in quo semen continetur, quod Betæ rotundius aliquanto, ac durius. Huius uis foliorumque ad uulnera præcipua.

C B A R B A R I C O R O L L

Sideritis secunda, ramulos habet triangulos.

E X M. V E R G. C O M M.

Ingenue fatemur, in tanta ueterum & iuniorū diuersitate, nihil habere nos de Siderite, quod pro comperto tradere ualeamus. Quæ Plinius multis locis nunc de toto Sideritidum genere, nunc priuatim in hac, aut illa tradiderit, facile est omnibus uidisse, & cum uiderint censere. Notum nos labori eorū parcere: neque ingenij, iudicijque sui gloriam illis auferre. Quod autem nos in melioribus græcis obseruauimus, tacendū non est. Duo esse illis præcipua Sideritidis genera: Heracleam, id est, priorem illam: & Achilleam, quæ mox dicenda erit. Nec aliter Paulus Aegineta in. 6. tradidit. Eam Græci a ferro Sideritū dixerunt, quoniā glutinosis uulneribus apta, percipuum in bello haberet usum: quod saepe ab eo metallo in græcis scriptoribus indicat, ex eadem scilicet causa, ex qua quæ sequitur Achillea militaris etiā dicta fuit. Dubitamus nos in priore Sideritide, quo loco hic ait, habere Marrubij folia, longiora tamen, ad Saluæ, aut Quercus. & c. abutere earū notarum alterā: fuisseque ex alio Sideritidis genere ab imperitioribus aliquo additā. Non enim possunt Querna Saluæ folijs in cōparatione alterius coniungi: tam dissimilia inter se sunt.

¶ De alia Siderite.

C A P. XXXVIII.

Sideritū aliam esse tradunt, quam Crateuas Heracleam uocat, in maceris & uineis nascentē, folijs Coriani, a radice numerosis, dodrantalibus cauliculis, læuibus, teneris, in rubore candicantibus. Flore purpureo, paruo, gustanti amaro & uiscido. Huius ea uis est, ut quamuis recentis uulneri imposita, sanguinem supprimat.

Sideritis tertia, similis Achilleo est, mox prodeudæ, sed candidioribus folijs, & pinguioribus, tenuioribus cauliculis.

ACHILLEA. **De Achillea.** CAP. XXXIX.
ACHILLEA. Aliqui Myriomorpho nominant, alij Chiliophyllon, alij Stratioticon, alij Heracleon, Latini supercilium Veneris, alij Acron syluaticum, alij Militarem, alij Millefolium, Aphri Asterchillos, & aliqui Achilleam Sideritin. Dodrantes, aut maiores gerit scapös, fusorum effigie, quasi minutulis folijs circumdatos, crebris in latere foliorum sectionibus, Coriandri similitudine, subfuluo colore, odore multo, non insuauis, medicato, & uiscido. Umbella in cacumine rotunda, floribus candidis, purpureis, & aurum æmulantibus. Prouenit læto solo. Trita coma sanguinolenta glutinat, & ab inflammationum periculo tuetur. Erumpentem sanguinem inhibet, & cruentam uulnæ profluuiam in uellere. Decocto quoque insident foeminae fluctione uulnæ laborantes. Ad dysenteriam bibitur.

BARBARI COROLL.
Sideritis Achilleos dicitur, quoniam inuenit eam Achilles, discipulus Chironis, qua uulneribus mederetur, & Telephum sanauerit. Alij primum Aeruginē inuenisse tradunt utilissimam emplastris: ideoque pingitur, ex cuspide decutens eam gladio in uulnus Telepho: Alij utroque usum medicamento uolunt. Hanc nonnulli Panaces Heracleon appellauerunt. Nostri proprie Millefoliam, cubitali scapo ramosam: minutioribus quæ Feniculi folijs, uestitam ab imo: Alij uerā Achilleon esse dicunt, scapo ceruleo, pedali, sine ramis, ex omni parte singulis folijs rotundis inter circumdatā. Alij primum genus Sideritis Achilleo uerā, ut diximus, acceperunt. Ethruria folia uocat, herbā in pratis tenuem, a lateribus capillamenti modo foliosam, eximij usus ad uulnera. Boiū neruos abscissos uomere, solidari ea, rursusque iungi, addita axungia, affirmant. Achillos, et Achillion uocatur quarra Sideritis, ut dictum est: et a latinis quibusdā Lumbus Veneris. Dioscorides Supercilium Veneris, non Lumbum dici uoluit, alterutro errore orto, quod Graeci ὀφρύν lumbum, ὀφρύν supercilium appellant.

BATIS. **De Rubo.** CAP. XL.
BATIS. a Graecis, ab alijs Cynosbatos; ab alijs, Selinobrition, ab alijs Syntrophos, a Magis Titani sanguis, ab alijs Ibis sanguis, a Romanis Rubus, ab alijs Scites, a quibusdam Moribaticana, a Dacis Manthia, Aegyptijs Hamöos, alijs Ametros appellatur. Rubus notitiae uulgaris. Vinum habet siccandi & adstringendi. Capillum tingit. Ramorum decoctum, potu aluum sistit, & foeminarum profluuium. Præsteris morfui accommodatissimum. Gingiuas firmat. Oris uitij folia comendicata medentur. Cohibent ulcera quæ serpunt. Vlcerebus in capite manantibus, oculisque procidentibus remedio sunt. Condylomatis, & hæmorrhoidibus folia illinuntur. Cardiacis, & stomachi doloribus, trita conuenienter imponuntur. Caulēs cum folijs tunduntur, exprimiturque succus, mox sole cogitur, singulari remedio contra omnia quæ modo dicta sunt. Mori in Rubo nascentis, quæ optime maturi succus, ad oris medicamenta conuenit. Sistit aluus præmaturi cibo, necnon florē in uino potō.

D I O S C O R I D I S

B A R B A R I C O R O L L.

CRubi multa genera, sed quæ magno separantur discrimine. Chamæbaton uocant humi-
lem Rubum, qui protinus quæ paulo accreuit, retro uergit in terram, atque ita radicitur, & Humi-
rubus a Theodoro dicitur. At Rubus inter arbores aquaticas statuatur. Rubi unum genus fert
mora, quæ & manduntur. Huius radicis spongiolæ, duricia lapidis uisuntur. Alterum rosas:
de quo in Cynosbato dictum est. Flos mori candidus, per melle colligitur. Locus Rubis con-
sistit, quem nos Senticetum & Dumetum uocamus, Græci Bariam, & Apobaton appellant.

E X M. V E R G. C O M M.

Commune græcis Batos Ruborum omnium nomen est: quo in toto hoc genere titutes, ad
ditis notis aliquibus, species eius distinguunt. Chamæbaton uerbi causa, Cynosbatonue, aut Idæu-
batum uocantes: quæ tria sunt uniuersi generis huius discrimina. Latini modo Rubum, ut Plini-
us, modo Sentem, ut Columella appellant, Idæum rubum, uel Sentem, Canisem sentem, & sim-
pliciter sentem seu Rubum: quem autem Theophrasto libro. 3. de plantarum historia Chamæ-
baton, id est, humilem & terrestrem uocauimus. Verba eius quo diximus loco hæc sunt:
ἔτι δὲ καὶ τοῦ βάτου πλείω γένη. μάλιστα δὲ ἔχοντα διαφέρειν, ὅτι ὁ μὲν ὀρθοῦν καὶ ἄνω ἔχων. ὁ δὲ
ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ὑποῖς κάτω ἵκναι. καὶ ὅταν συνάπτῃ τῇ γῇ ριζοῦμενος παλιν ἐν δὲ καλοῦσι τινὲς χαμαίβατον.
ὁ δὲ κυνόβατος ἐκ καρπὸν ἐπὶ ῥύθρον ἔχει, καὶ παραπλάσιον τῷ τῆς ρίζης. ἵς δὲ διδύμου καὶ θάμνου μετα-
καὶ παρόμοιον ταῖς ρίζαις, τὸ δὲ φύλλον ἀγνώστου. Quorum sensus est. Ruborum item plura genera.
Præcipuam uero habent differentiam, quæ alter recta & in altitudinem erigitur. Alter deorsum
& in terram uergit: & cum primum terram attigit, iterum radicitur. Vocantque hunc aliqui hu-
mitem, seu terrestrem Rubum. Qui uero Cynosbatos, id est, canis Sentis dicitur, fructum fert ru-
bentem, puniceæ cytino similem. Estque inter fruticem & arborem medius, puniceæ similis, folio
uiticis. Et hæc Theophrastus de duobus Rubi generibus: quorum alter primo uolumine a Dio-
scoride descriptus est, alter modo docet. Estque hic Chamæbatos, id est, humilis ille Rubus, Sen-
tis, uel Rubus a latinis simpliciter appellatus. Cuius mora extrema æstate maturescencia, aut
bus grato, & hominibus non inutili cibo in sepibus nigrescunt. Quæ inter Romanas Rubi ap-
pellationes in Dioscoride nunc leguntur: Vaticanæque dicuntur, augustiore unius Romani col-
lis, quæ ex reliqua Italia nominis nota.

De Idæo Rubo. C A P. XLII.

βκτορ ἰδαία

IDæus Rubus appellatus est, quoniam passim in Ida proteniat.
DEst autem longe tenerior priore, ac minoribus spinis horrens. Quan-
tum & sine spinis inueniatur. Eadem præstat quæ supradictus. Caterum
flos cum melle, oculorum collectionibus commodissime illinitur. Ignem
sacrum extinguit. Stomachicisque ex aqua bibendus datur.

B A R B A R I C O R O L L.

Rubus Idæus, in Ida, non alias nascitur, sub arborum umbra, rarioribus aculeis, & minus
aduncis.

E X M. V E R G. C O M M.

IDæus Rubus hic dictus est, quoniam in Ida, nec alibi copiosior nascitur, tenerior, paruis acu-
leis, & aliquando, ut hic ait, nullis. Tertium genus in superiore illa diuisione nostra faciens. A lo-
co græci appellauerunt, ob eam quam diximus causam.

De Helxine, id est, murali hæba. C A P. XLIII.

ἑλξίνη

Helxinen aliqui Elitim uocant, alij Canocersæam, alij Amelxinem,
alij Eufinen, nonnulli, Amorginen, alij Sucorachos, alij Psych-
uacos, alij Psychouacos, alij Melampelon, alij Cittampelon, alij Cissam-
methon, alij Anatetamenon, Romani uolutum Lapparon, Aegyptij
Apap, alij Parthenion, alij Sideritin, alij Heracleam, nonnulli Agriam,
quidam Clibodion, alij Polyonymon. Nascitur in sepibus, uinetis, mace-
rijis, et segetibus. Folia ei Mercurialis adsunt, hirsuta, cauliculi leniter ru-
bentes, & circa eos ueluti semina aspa, adherentia uestibus. Folia refri-

gerandi spissandiq; naturam habent. Quæ ex causâ sanant illitu ignes A
sacros, adusta, condylomata, incipientes panos, tumores, inflationesq;.
Succus eius cum cerusa, ignibus sacris, & ulceribus quæ serpunt apu-
sime illinitur. Imponiturq; podagris, cum hircinô seuo, aut cærato cy-
prino. Veterem tussim adiuuat, cyatho hausto. Tonsillis inflammatio-
ne turgentibus, utilissime & gargarizatur, et illinitur. Succus in aurium
dolore infusus, iuuamen præstat.

B A R B A R I C O R O L L.

H Elxine duplex Dioscoridi, & omnino autoribus. Altera Partheniô, altera Cissanthemos
ab Hedera folijs uocata. Plinio item duplex, sed aliter. Altera de qua hic agitur Parthenij & Per-
dicij, siue Perdicadiis cognominè: qm perdecies hac præcipue uescantur. Folia tamẽ ei non Mer-
curialis, ut Dioscorides, sed mixtæ similitudinis, Plâtagini & Marrubio tribuit, cauliculis den-
sis lanas infici, semina in capitibus lappaceis adhærescentia uestibus: a quo & Helxinem dictâ
uolunt. Hanc Aëoliæ gentes, & Aegyptij edunt. Crassas, plurimasq; habet radices, ut inq; Pli-
nius. Altera idem autor inq; uerior est Helxine, cui radix foliosa, ex qua similis malo carduus
seminis plenius extubêrat. Seminalis Acanus a Theophrasto dictus, cuius inciso fumo uertice,
lachryma erumpit iocundi saporis, Acanthica Mastiche uocata, proptereaq; adulterium ex ea
fit, ut diximus. Germinat, atq; floret æstate folio, & caule, lanugines spinosas habens. Hæc Pli-
nius. Nos hanc non Helxinem, sed Ixinem uocari credimus: ut in Chamæleonte candido di-
ctum est: quanq; porro prior Helxine Perdicion, & Parthenion dicatur. Aliud tamen intelligo,
Plinium secutus, Perdicion, quæ a nostris herba Vrceolaris uocatur, ab alijs Astericum, folio
similis Ocimo, nigrior tantum, nascens in tegulis parietinisq;: ob id & Parietaria, et Muralium, B
& Muralis uulgo dicta, & Vineago: & Parthenion, qm a Minerua in somno contra præcipitia
lapsusq; monstrata est Pericli Atheniensium principi, cû uernula ei charus ex altitudine cecidisset,
Splachnôptes appellatus. Turtures, columbæ, gallinacii annum fastidium deducere di-
cuntur Helxina pasci, autor est Plinius. Triplex igitur inuenio Parthenium. Vnum folio Cori-
andri, quæ Amâracus a Galeno, Parthenium a Dioscoride nominat, uulgo Matricaria. Alteru
folio Mercurialis, ut Dioscorides hoc loco, siue Plantaginis & Marrobij, ut Plinius, quæ dicit
Helxine, ac de ipsa hic agitur. Tertium folio Ocimi, quæ Parietaria, & Muralis uocetur: de qua
mirum est Dioscoridem nihil præcipere, qd scia. Nisi qs eum dicat sub Helxine hanc q; accep-
tisse: qm hirsutula fit, & adhærescat uestibus, nec a Mercurialis herbæ folijs omnino multu di-
stet, præterq; q Mercuriali serrata leuiter ea sunt, Parietariæ non sunt. Sunt qui & Mercurialem
ipsam Parthenion quoq; dicant Helxinem, ut Dioscorides in Myosotide scriptum reliquit. Eti-
am Alfine dicta est, quanq; corrupte in Theophrasto legitur Alfine, ubi Theodorus Volucru
interpretatur, arbores amplexu Hedera modo strangulantem.

E X M. V E R G. C O M M.

P Luribus, & inter eas aliquot plantis alijs cõmunibus Helxine appellationibus qndam in-
dicata est. Testantur in græcis id Græcoru medici, qui Helxinem primo Perdicium, Partheniu,
Sideritim, & Heradeam uocari aiunt. Mox & Cissampelum. Duobusq; capitibus de eiusdem
nominis herba agentes, neq; easdem utriq; uires tribuentes, duas manifeste Helxines eodem
nomine, sed diuersa natura constituisse uidentur. Præter eos Nicander etiam in Theriacis suis
Parthenij primum, mox Helxines facta mentione, utranq; cõtra uenenata laudauit. *ἡ ἑλξίνη καὶ ἡ ἑρ-
ιδίνη, τὴν αὖ κλίσβαν καλοῦσι.* Quo loco interpretis eius, Clybatim, Sideritim, Parthenium, & Perdi-
cium, & omnibus his unam eandemq; plantam uocari ait: iterumq; *ἡ ἑλξίνη παρθένηςιο.* &c. Ite-
rumq; idem interpret testatus est, Parthenium a quibusdam Helxinem, et Perdicium nomina-
ri. In latinis Plinius lib. 22. capite. 17. his uerbis græcos secutus est. Helxinem aliqui Perdicium
uocant: quoniam Perdecies ea præcipue uescantur: alij Sideritim: nonnulli Parthenium. Non li-
cet in tam concordi tot testium fide, tam multis appellationibus dictam fuisse quondam Hel-
xinem, non fateri. Non ideo tamen credendum, unam duas esse plantas, notis & uiribus diuer-
sas. Oportet enim in cognominibus unum esse quod primo, uere, & per se nomine illo indice-
tur: tum ex similitudine ad id nomen alia admitri: quæ genus suum seruantia, in parem no-
minis cõmunis societatem, cõmunionemq; adoptione illa ueniant. Esse autem duas Helxines, dis-
similes naturæ inter se notæ ostendunt: & post naturam antiquiores græci, præsertimq; Paulus
P ij

D I O S C O R I D I S

C Aegineta priuati, seorsumque his uerbis de utraque in. c. agēs ἡλξιν αἰ αἰ περδινον, ἢ αἰ περδινον, ἢ αἰ περδινον, ἢ αἰ περδινον. Quod est. Helxine sunt qui Perdicium, qui Parthenium, qui Sideritum, qui Heracleam uocent. Vis eius est abstergere purgare, & cum frigida humiditate aliqua sensim leniterque adstringere. Estque hæc Helxines capite hoc a Diosc. tractata ex Paulo historia, & medicina. Postquam statim idē ait, ἡλξιν καὶ μερκαρίου διαφορτικὴν ἐστὶ δυνάμειν, id est, Helxine, quæ Cissampelos dicitur, discutendi uim habet. Huius nulla est in Diosc. historia. Habent quidem impressi, & plerique alij codices, in fine capitis additam magis quæ a principio descriptam breuissimam eius historiam & medicinam, & quæ huic scriptori acceussisse manifeste uideatur. Eam alij interpretes suis additionibus coniunxerunt. Nobis, qui opus hoc eo consilio suscepimus, ut ex meliorum fide omnia in Diosc. insaurentur, contra uetustissimos, eosdemque optimos testes uertere ea non placuit: præsertim discordi eas ab antiquis medicina, quam in discutendo Paulus Aegineta, codices uero illi in soluenda alio esse dixerunt. At dæ sunt Helxine, fatemur id quidem: non ideo tamen in Dioscoride legenda quæ illi parum conueniant, & alijs discrepent. Pocius enim huic scriptori satis esse, inter alterius appellationes huius generis meminisse: aut quod in plerisque alijs factum est, persisse huic capiti altera hæc Helxine. Ex his duas esse Helxines ratiocinari facile est. Alteram Mercurialis herbæ folijs, ut hic aicitur autem Plinius, mixta similitudinis inter Plantaginē, & Marrubium: alteram Hederæ, in uineis nascentem, ideoque Cissampelo uocatam. Illam primo & perfecte dictam: hanc illi congenerem, aut similem saltem: similemque ut nos opinamur, in tenaci uetum nexu illo. Hæc enim Helxines præcipua nota est, & unde factum illi nomen fuit. Querendum post hæc etiam, unde tot aliæ illæ appellationes ad Helxinem irrepserint: non utraq, sed ut nos credimus, priorē illā, quæ femina fert in capitibus lappaceis, uetustibus adhærentia. Possunt euentus eius in alijs plures esse causæ. Sed cur Perdicium dicta fuerit, nulla, præter a Plinio & Theophrasto allatam: quæ scilicet femine eius perdisces notissimæ aues uescunt: herbamque fodiunt, & in ea uoluntantur, iussit hoc nomine uocata uti Absyrtus, ueterinariæ medicinæ græcus autor, contra iumentorum tussim. Verba eius uti. Περδινὸν ἢ ρομαίων περδινὸν καλεῖται. Celsus etiam secundo medicinæ suæ libro, Muralē herbam nominans, hanc intellexisse creditur: quoniam parietes & muros natalem sibi locum fecerit. Ob quam causam a multis alijs quorū locis Parietaria nunc etiam dicitur. Hæc etiam ὑφραγμοῖς καὶ ταῖς, id est, macerijs & muris nasci ait. Sunt hæc uenæ appellationes hæc priori huic Helxine proprie ex diuersis causis illi assignatæ: Sideritis uero, & Parthenion alijs plantis proprie, huic uero additæ, & ex similitudine aliqua receptæ. Credimusque nos, Helxinem ideo Sideritum dictam, quæ utraq, Marrubij folijs sit. Similitudinis inter Plantaginē & Marrubium, Vtraque folio aspero est. Sola enim asperitate uterque tenaci nexu hæc retinet. Vtraque etiam inter saxa nascitur. Cur autem Parthenios quondam diceretur, non satis modo nobis constat. Quæ hoc nomine dicta proprie fuerit, Anthemidi congener herbæ est, superiore uolumine inter Chamæmalum & Bouis oculum tractata. Ceteris, quæ plures in medicæ materiæ disciplina sunt, addita, & ex similitudine recepta ea appellatio est. Siquidem & Artemisia Parthenion dicta est. Esse autem Parthenion Helxines appellatiōnem, non genus, manifeste indicat Paulus Aegineta: quæ cum de Helxine egisset, non multo post proposita Parthenio, id tantum ait, ὑφραγὲν ἢ τῇ ἡλξιν. quod est, Dictum in Helxine: quasi per se Parthenion nulla est, sed ex multis una Helxines appellatio. Vulgo fere nota Muralis, Parietariaque hæc Helxine. Quæmadmodum contra cognitu difficilis quæ Cissampelos primo: eamque ob causam nominata est, quæ Hederæ folio in uineis nascitur; ex qua eius natura factæ aliæ illæ appellationes etiam sunt, Melampelon, & Cissantheion. Omnes enim coniunctum sibi Hederæ nomen habent, natalis loci, & soliorum eius index. Obseruati pluribus locis in scriptore hoc a nobis est, plantarū genera, non nomina appellationibus his ab eo numerari. Factumque id hoc loco credimus: quoniam sunt quæ in nominibus his utrique generi Helxines seorsum competant; discusseque eas ex his quæ hæctenus dicta sunt, non erit legendibus difficile. Adficiemus illud etiam, quam hic Polyonymon, id est, multi nominis appellationem Helxines esse ait, ad priorem illam pertinere. Ea enim est quæ tam multis nominibus indicatur.

ΕΛΚΤΙΥΑ

gentibus. Nascitur in fegetibus & cultis. Oculorum fluctionibus & in inflammationibus auxiliatur, folijs cum polenta tritis & impositis. Eadē cocta sorbitionis usu dysenteriam sistit.

BARBARI COROLL.
Elatine, folio Cassia a Plinio describitur: cetera cum Dioscoride conueniunt. Corruptam in Plinio lectionem esse haud sum dubius, librarijs Cassiam pro Helxina substituentibus: quandoquidem Elatina modo uisitur, Helxina similis, hoc est, folio Hederæ propinquo, non Cassia: cuius id oleaceum est: ut in Chamælea dicitur.

Pli. li. 27. ca. 9.

EX M. VERG. COMM.
Similis Helxina Elatine est, non simpliciter, sed ei quam folio Hederæ Cissampelon uocari diximus: eamque ob causam ab Helxine statim tractata. Eam ueteres græcorum medici mediocriter adstringere, & refrigerare dixerunt.

De Eupatorio. CAP. XLIII.
Evporium, siue ut alijs placet Hepatorium, aut Hepatitis, fruticosa hærba est, unum efferens caulem, lignosum, nigricantem, rectum, tenuem, hirsutum, cubitalem, interdum ampliorem. Folijs per interualla Quinquefolij, aut Cannabis similibus, quinquepartito, aut amplius diuisis, nigricantibus, per ambitum ferratis. Semen medio caule erumpit, pilosum, deorsum spectans, quod siccatum uestibus inhæret. Contrita huius folia, & cum suillo adipe imposita, ulceribus quæ agre cicatricem trahunt, medentur. Hærba, aut semen in uino potum, dysenteria, iocineris uitijs, & serpentium ictibus liberat. Nec desunt qui aberrantes, Artemisiam hanc appellarint, cum tamen longe alia sit, uti exposuimus.

ὑπατῶριον

BARBARI COROLL.
Evporium, & Eupatoria quoque dicitur. Regiam & hæc auctoritatem habet, folijs plumosum, medio caulis, flore candido, radice superuacua. Mauritanii aliud Eupatorium demonstrant, folijs penitus diuersum figura, sed effectum par, scapo exiguo, fere cubitali, folio Centauri minoris, frutice odorato, sed flore magis, gluteus ei est, radice superuacua. Passim nascitur.

EX M. VERG. COMM.
Everunt quondam, & adhuc sunt, magnæ inter autores & medicos litis Eupatorium, & Argemone. Nec persuaderi adhuc possunt aliqui, non esse Argemonem Eupatorium: ex tam multo tempore, tamque antiquæ fidei in medicina autoribus, ea multorum animis opinio infedit. Licetque hic iam pridem in Anemone, & nunc in Eupatorio dixerit decipi pluresque, falsoque credere Argemonem Eupatorium esse: non desinunt tamen quotidie pro ea re uiolenter aliqui certare. Verba eius in Anemone sunt, qualia poterunt uolentes cum libuerit uidere: ea nunc etiam repetita ab eo sunt. Nosque illorum memores, necessario locum in extremo hoc capite emendauimus: & pro Artemisia, Argemonem uertimus. Quod enim hic ait, quosdam Artemisiam hanc uocasse deceptos, alia enim est ut præmonstrauimus, in Artemisia non legitur, at in Anemone manifeste id inuenitur. Sunt Diosco. in Anemone uerba hæc. ἡνιοὶ δὲ καὶ λυγρόνιοι ἀνέμων ἀπὸ τῆς ἀργίας ἀνέμωνος τὴν λεγομένην ἀργεμόνην, καὶ τὴν τοιάδε μίκρον. περὶ ἧς ἔν ταῖς μίκραις ἱερῆσι. καὶ διὰ τὴν ἀνθὸν ὁ μόχρον φαινικὸν ὑπάρχον πλανῶνται τὴν ἀργεμόνην ὑπατῶριον ὀνομάζοντες. &c. Quorum sensus est, qui in Anemone redditus a nobis fuit: cui & hic responderet locus. Neque Artemisiam, sed Argemonem falso inquit Diosco. credere quosdam Eupatorium esse. Neglexerunt hoc alij interpretes, quod alioquin multifaciendum erat: ut quale uerum Eupatorium esset aliquando cognosceretur. Vidimus nos in maioris ciuitatis nostræ Nosocomij hortis natam plantam, quæ omnibus a Diosco. traditis notis, ueram Eupatorium se ostenderet: præsertimque semine in terram declinui, & postquam aruerat uestibus herente. Nihil in quotidiana multarum plantarum obseruatione certius antiquæ historiæ respondere aliqui mihi uisum est: furculosum genus, singularis uirga, lignosa postquam aruit duricies, plumosa undique aspiditas, color liuens magis quam niger, & folia

P ij

D I O S C O R I D I S

C per interualla, sed contrarijs pediculis pendentia. Quod non penitus huic scriptori respondere uidebatur; comparatio tantum erat, qua Cannabis, aut Quinquefolij folijs ea comparabatur. Cetera naturæ & Dioscoridi eadem omnia erant. Regiæ dignitatis herba Eupatorium etiam est, ab Eupatore rege inuenta. Et quoniam iecori præcipue medeatur, quod graeci hepar dicunt, ideo Hepatorium, & Heparitis ab aliquibus dicta.

πεντάφυλλον

De Quinquefolio.

C A P. XLV.

PEntaphyllon aliqui Pentapetes, alij Pentatomon, alij Pentadactylon, alij Pseudoselinum, alij Callipetalon, alij Xyloloton, non nulli Xylopetalon, alij Asphalton, alij Pentaccenon, alij Thymiatiin, Aegyptij Orphitebœocen, alij Enotron, Magi Ibidis unguem, alij Ibidis pennam, alij Hermodactylon, Romani Quinquefolium, Galli Pentepulam, Daci Propedulam appellant. Ramulos fert furculaceos, tenues, palmi magnitudine, in quibus semen. Folia Menthæ, quina singulis pediculis, raro plura, in ambitu serrata. Florem ex luteo pallefcentem, interdum auri æmulum. Nascitur in riguis, & aquarijs ductibus. Sub rubram habet radicem, oblongam, Veratro nigro crassiore. Plurimis pollet remedijs. Ius radicis decoctæ ad tertias, si in ore contineatur, dentium dolores sedat. Putrida oris ulcera, collutione sistit. Arteriæ scabritias, gargarizatu læuigat. Contra alui profluuiâ, & dysenterias auxilia tur. Item articulorum, coxendicium, & cruciatibus potum. Cocta in aceto & illita, serpentia ulcera cohibet. Scirrums, tumores, duricias, abscessus, & distentiones discutit. Ignis sacros, reducias, condylomata, pleuræ, & sanant. Teneræ radicis succus contra ictericis, pulmone, & uitiâ prodest. Item aduersum uenena. Cum hydromente autem, uel diluto uino, & piperis exiguo bibuntur folia, contra febriû circûitus. In quartana quidem quaternum ramulorum, in tertiana uero ternum, in quotidiana unius. Tricena quoque folia, tricenis pota diebus, comitialibus profunt. Foliorum succus, tribus cyathis aliquot dies potus, celerrime regio morbo medetur. Illita cum melle, & sale, tam uulneribus quam fistulis remedio sunt. Enterocelicis auxilium præstant. Quinquefolium sanguinis profluuiâ & potu & illitu sistit. Ad expiationes, castimonias, et sanæ guinis eruptiones inciditur.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 25. ca. 9.
Theo. lib. 9.
de planta. hi.

PEntaphyllon, & Pentapteron in Theophrasto, Theodorus Quinquefoliam, & Quinqueniam conuertit. Aetius hanc Hermubotanem, hoc est, Mercurij herbam uocari tradit. Aegyptij etiam Dislyphi cognominant. Daci Drocila. Itali Psyllitum, Soloram, & Thebeotin: quamquam corrupta puto nomina. Nam & Therumbros, & Theonestron quoque dictam inuenio. Radice cum recens est, rubente, nigra: cum inarescit, quadrangula: folio uitis pusillo: augetur, desinitque cum uite: caulibus tenuibus, crebris geniculis. Nomen a numero foliorum. Quidam Graeci Chamæzeleon, quasi fruticem terræ uocant. Commendari Quinquefolium fraga terrestria gignendo, Plinius existimat. Ego id, qui uerum esse possit, non intelligo. Nam herba ea quæ fraga gignit, Trifolia est, non Quinquefolia, flore candido, non luteo, in Rheticis & Vindelicis alpiibus, etiamnum frequens secus uias. Hippocrates duo uidetur nouisse Quinquefolia. Candidum, quod & herbaceum, & procerius est a terra. Nigrum, quod humilius. Est & quæ Tormentilla uulgo dicitur Quinquefolio simillima, nisi quod septem, non quinque

habet folia. Potest a nobis Heptaphyllon uocari, hoc est, Septemfolia: ex cuius radice pasillos theriacos (si Dijs placet) officinae pro uiperarum carne subiiciunt: quoniam uiperæ modo, ut ipsi putant, nuncq̃ uiuantur.

EX M. VERG. COMM.

Nouerunt rura omnia Quinquefoliū, soloq; hoc nomine maxime cognitum ubiq; in honore aliquo est. Theophrastus, 9. de plantarū historia non Pentaphyllon tantū uocari sua ætate dixit, uerum Pentapetes etiam, factō ab aliquibus illi nomine a pennis auium, ut credidit Gaza: ut autē nos opinamur, quia in quinque folia se pandit, & extendit. Fecit eadem etiā foliorū forma, ut Pentatomon, id est, in quinque partes diuisum diceretur. Sic Pentadactylon, q̃ ut in hominis manu quinque digiti sunt, sic in ea planta totidem foliorū diuisiones. Pseudoselinon dictum etiā, quod Apīū mentiatur, sitq; illi in foliorū sectionibus illis quadatenus simile. Quæ itidem illi a gentibus aliæ appellationes fuerunt, aliquā huiusmodi causam habuerunt. Quales Calliperalon, & Xyloperalon sunt, a foliorum specie & diuicie factæ. Quemadmodū uerisimile est, in barbaris illis latere incognitā modo nobis, ex figura, aut uiribus eius rationē aliquam. De radice, folioq; eius libro, 9. de plantarū historia agens Theophrastus, addidit, nigrescere Quinquefolij radicem effosam, siccatamq;. Quod a Dioscoride ideo dictum non est, quoniam satis fore sibi hic scriptor credidit, si qualis ea esset cum foderetur, dixisset. Post id enim tempus medicis certo loco signatam, seruari relinquebat. Adiecit etiam Vitigineum Quinquefolij folium esse, non quantitate (pusillum enim est) sed colore & forma, & quasi naturā Vitis sequeretur, augeri simul, & tabescere cum ea, caules per terram spargi graciles, crebras, habentes, ut ille ait *κνίμυς*, non crura, sed a cruris humani forma inter duos geniculos interualla, quæ *κνίμυς* ille, qua diximus ratione uocat. Videndum illud etiam, quo modo hic Mentha, ille Vitis folio Quinquefolium esse dicat. Nobis male inuicem comparari posse plantarum illarum folia inter se uidentur: quemadmodum & floris color in pallido albus, simul & auri flauo colore dici. Hoc tamen non adeo difficile, ut illud. Videmus enim aliquando in pallore hominis utrunq; colorem illum.

De Phœnice

CAP. XLVI.

Phœnice aliqui Rhon, alij Anchinopa, alij Phœnicopteron, alij *ῥήστα*, alij Osthale, Aegyptij Athnon nominant. Folia habet hordei, leuiora, & angustiora, spicam Lolio similem, ramis digitorum senuum, radici aduolutos, septenas octonasue spicas. In aruis tectisq; recenter illitis nascitur. Harum uirū compos, ut in uino austero pota, alui profluuium, & emanantem uulua sanguinem sistat, urinae impetus infraenet. Sunt qui adalligatam in puniceo uellere, & suspensam, sanguinem suppressere prodant.

BARBARI COROLL.

Phœnix a Plinio dicitur herba Phœnicea, inter fruges ab eo posita: quoniam a nostris Ordeum murinum uocetur.

Pli, li. 22, ca. 15.

EX M. VERG. COMM.

Herbæ nomen fecit color, q̃ non dissimilis in ea maturis palmulis uidet. Eaq; ob cām Phœnicopteros, a punice coloris aue dicta etiā ab aliquibus fuit. Nascit hæc in regulis frequentior, q̃ in aruis. Dico autē regulas nūc a tegēdo, oēm qua domus tegit, & hymbris stillicidia deriuant materiam. *στῆλ* em̄ hic, non *κράμνον* dixit: quā uoce Græci indicauerūt, quæcūq; familiā a coelesti aqua tuenē, siue fideles regulæ, siue ex materia tabulæ, siue stramēta sint. Hordeū murinū Plinius uocari a latinis ait: q̃ hordeaceo folio sit, & seminibus eius iter regulas mures uescant: hic Lolū murinū, a spicæ figura: uterq; idē, sed diuersa rōne. Quot ramuli, uel potius culmi illi sunt, tot etiā spicæ. Diximusq; nos, sedigiales culmos illos, lōgitudinē, nō crassitudinē eorū intelligētes.

De Idæa radice.

CAP. XLVII.

Idææ radici folia sunt ea, quæ Rusco. Adhærent his, ueluti exigui pampini, in quibus flos. Radix spissandi, cohibendiq; naturam habet, his conueniens, quibus adstrictione opus est. Pota citam aluum.

O iij

Idæa pisa

D I O S C O R I D I S

C mensescq; & omnem abundantiam sanguinis sistit.

B A R B A R I C O R O L L.

Idae radix, acerba gustu, misceri solita luctantium in palestra pulueri, ad ea quae repercutere tantum oporteat, ut Paulus Aegineta scribit.

E X M. V E R G. C O M M.

Radicem Dioseor. Pliniusq; herbā Idæam uocat: alter a tota natura, alter a potiore eius parte, & qua sola medicinæ inseruit, eam appellans. Peregrina Italiæ planta est, peregrinitatēq; suam natalis loci cognomine indicat. Rusco, de qua in extremo uolumine hoc agetur, omnes eam comparauerunt: cuspidatis ideo folijs herbam intelligere oportet, sed non tam solidis, rigentibusq; ramulis, ut Ruscus est: quando Helices secus folia habere hanc Dioscorides ait, Plinius uero eiusdem rei significatione pampinos.

De Rhodia Radice. C A P. XLVIII.

Radix pifæ

Gignitur Rhodia Radix in Macedonia, Costo similis, leuior, inaequabilis. Quæ contrita Rosas redolet. Vtilissima capitis doloribus, si madefacta fronti, & temporibus cum Nardo imponatur.

B A R B A R I C O R O L L.

Habetur & Radicis Cinthiæ mētio Hippocrati, fouendis feminarū locis. Inuenio & Rhodion uocari coloris genus Democrito, Italicū præferente in uellerū tinctura: fortasse id, quod nos uulgari nomine Rosaceum uocamus. Galenus Rhizam, hoc est, Radicem ab eo dici genus quoddam fati scribit, sine caule, sine flore, sine semine, tribus dūtaxat folijs, sed proceris, & in terra stratis, digitorum duorū magnitudine, similibus Anchusæ, radicē ipsam prætenue, purgandi uiribus, sed exiliter. Alia uidet herba, quæ uocat Oxysa Plinio, etiam si folia æque terna habet: quippe quæ non purget, sed contra potius adstringat, & ad stomachū dissolutū, & Enterocleas in cibo detur. Proinde sunt, qui Oxyn putent esse, quam uulgius Tauram, & Triada, hoc est, Trinitatē, & Sphragida, hoc est, sigillum Solomonis appellauit, folio triplici, aut uno potius in terna disposito, radice capillamētis multiplici, flore cū maculis quibusdam candidis ceruleo. Est & Oplnys Plinio herba denticulato oleri similis, folijs duobus, quæ capillū inquit denigrat. Est & Mamiras herbula cuiusdam radícula, ut Paulus notat, geniculis frequentibus nodosis, albugines, & cicatrices exterens, atq; comminuens.

E X M. V E R G. C O M M.

Rosa, quas Græci Rhoda nominant, non Rhodus insula radici huic nomē fecerunt. Quæ autem, & cuius plantæ radix ea sit, legisse me hæcenus non memini. Nec integrū undiq; caput hoc uidetur. Desyderatur enim in eo aliquid: præsertimq; quo loco hic ait, Imponitur cum Nardo tenuis, & mox fronti temporibusq; inspergitur. Duplex remediū ratio docetur: ut imponatur capiti scilicet, & inspergatur ea frons, temporaq;. Verum in utroq; desyderatur aliquid, quo scilicet addito liquore inspergenda sit fronti & temporibus. *in pexu* enim par

De Equiseti.

C A P. XLIX.

in nouis

Equisetum Græci Hippurin, alij Trimachion, alij Anabasin, alij Cheredranon, alij Phædran, alij Itiandendron, alij Gis, alij Scceniosrophon uocant. Aegyptij Pherphram, Magi Saturni cibum, Romanij Equinalem, alij Equi salicem, aut Anabasion, alij Ephydron. In riguis & scrobibus nascitur. Cauliculi prodeūt inanes, geniculati, in se facti, rubescences, scabri, & iunceæ circa eos folia, crebra, exilia. In sublime Equisetum attollitur, uicinos arborum caudices scandens, obuolutumq; dependet, comis multis, nigris, ut equorum cauda. Radix lignosa, dura. Vis eius spissare. Quare sanguinem naribus erumpentem succus ipse sistit. Prodest dysentericis in uino potus. Vrinam cit. Sanguinolenta uulnēra glutinantur, tritis folijs & illitis. Tussim, orthopneam, ruptaq; ad-

iuuat. Folij in aqua potis, diffeciones uesicæ & intestinorum, enterocæ
læq; in unum cōalefcere, cogiq; feruntur.

HIPPURIS, Equisetū, & Equiselis dicit a latinis, inuisa senifecis, nascens in pratis. Est autē pi-
lus terræ, Equinæ setæ similis, ut nostri tradunt. Græcorū aliqui Pinū folijs nigricantē, eodem
noīe appellant. Hanc uero, quæ hic describitur, folia habere pauca, tenuia, exigua, iunceas co-
mas, semē rotundū, simile Coriandro. Nasci in arbutis maxime, auctor Plinius, hanc herbā
Dioscorides a Romanis Salicē uocari tradit: de quā fortasse Verrius, homo doctus apud Festū
intellexerit; cū diceret, uirgulti genus esse Salicē: non ridicule, ut idē Festus carpit, interpretatus:
q; ea celeritate crescat, ut salire uideat: qñ Græci q; hanc & steamdendron, & Anabasin a Sal-
cis quadā similitudine, & a scandēdi more uocitant. Alio loco Plinius, Ventoso tractu nascit,
inq; scandiq; arbores, et ppendentē ex ramis, folio nullo cirris nūerosam, qui sunt lunci gen-
culati, radice pallida. Nec mirū sit alicui, q; folia modo pauca, modo nulla tribuant. facit hoc
& auctorū, quos secutus est, et locorū, atq; temporū diuersitas. Hanc ipsam Cauū, siue Dau-
cum uocari legas in aliq; codicibus: uetusta tamen exemplaria id uocabulū non habent.

Pli. li. 26. ca. 15.

EX M. VERG. COMM.

Si uideat nascentē aliquis Equisetū herbam, exeuntēq; ex terra aliquot diebus contēpletur,
nūq; unde futura sit equina cauda in ea intelliget: tam breui, nudo, concretōq; oritur aspara-
go & scapo. Nullibi dissimiliore naturā finem, q; in hac planta a suo principio fecit. Oritur em
humani pollicis longitudine, crassitudineq; in acutū fastigiata: mox procedente tēpore pandit
concretus ille scapus, pandensq; se per interualla, & inter ea certis spacijs iunca folia, & quasi
capillamēta quædā profert: quæ dum augētur, undiq; ad terrā feruntur, eadē gracilitate qua in
equina cauda pili sunt: quā non potest ostendere, nisi cum aut uiuens proha pender ex alto, aut
secta ad terrā inuerso cacumine descendētib; iunceis & capillatis folijs illis, totā equinæ cau-
dæ imaginē reddat. Nota oib; planta, & qua nulla in fossis ppe aquas umbrosos locis frequē-
tiōr nascit. Anabasin ab ascendēdo aliq; ea dixerunt: qñ infirma alijs stirpibus libet hærere.
Charadranon itidē, q; in fossarū faucibus, q; Græci χαράδραν uocāt, ortus & uita illi sit. Nec mi-
nus Ephydron ob eandē cām, nihil em aliud, q; ἐν τῷ ἑφιδρον .i. in aqua Ephydron significat.
Vocauerūt aliqui etiā Schoenostrophion, q; iunca eius folia illa non aliter, q; Cannabis, aut
Lihū in funes texunt. Græci Salicem arborē, & Romani Salicē equinalē ob hanc ipsam causam
uocauerūt. Plinius lib. 18. cap. 27. inimicā senifecis & inutilem pratis dixit: mox lib. 26. cap. 14.
iterum de ea agens, non cōuenire inter græcos, nec cum græcis latinōs ait. Vulgaris tamē de-
scripta a Dioscoride hoc loco herba est, oib; locis cognita & inuentu facilissima.

B.

De altero Equiseto.

CAP. L.

Alterū Equisetū, quod aliqui Equition, alijs Chedran, alijs Gy-
non appellant. Caulis est rectus, cubitalis, aut maior, inanīs. Co-
mis per interualla breuioribus, candidioribus, & mollioribus. Id cum a-
ceto tritum, uulneribus remedio est. Eademq; fungitur facultate.

SCiendum Hippurū uocari & piscem quendam, siue Hippurea: quem aliqui etiā Cory-
phaenem cognominant. Differt ab hoc, qui uocatur Hippus, ab Epicharmo dictus Ispidion,
siue ut legunt aliqui, Lapidion.

Differt a priore Equiseto posterior hæc sola comarum breuitate, candore & mollicie: quæ
maiores in hac, q; in illa notē sunt: ideoq; facillimæ utraq; cognitionis: desyderat solū, cui
æqualem hic caulem eius dicat, congeneris ne sibi antedictæ, an alterius plantæ alicuius. In-
certum id est. Iron em hic tantū ait, eamq; ob causam uitij nota signatus locus a nobis est.

VERG.

De Cocco, seu Infectorio.

CAP. LI.

Coccum quo infectores utuntur, frutex est furculosus, paruus, cui
grana ceu lentes adhærent, quæ electa congeruntur. Optimū gi-
gnitur in Galatia, et Armenia. Deinde Asia, & Cilicia. Vltimus ex omni-
bus Hispanicus. Vis huic spissandi, Vulneribus neruisq; præcis, con-

κόκκος βαφικῶς

Cuenienter ex aceto illinitur. Nascitur quoque in Ciliciæ Quercubus, cochlearum exilium similitudine, quod illius regionis mulieres ore legunt, & Coccum uocitant.

Pl. li. 9. ca. 41.

B A R B A R I C O R O L L.
Differt Coccus Baphica, hoc est, granum tinctorium, a Cocco Gnidio, siue Grano Gnidio, ut apertissime constabit Galenū, & utriusque notas contemplantibus. Magnitudo huic, id est, Gnidio Grano, piperis maior, uis ardens, rotundum, rubensque est colore Cocci. Frutex, qui hoc ferat, Thymælea, siue Chamælea dicitur. At qui tinctorium granum gignit, aut priuatim Coccus dicitur, ut Dioscoridi placere uideo: aut Illex est Aquifolia. Granum inquit hoc Plinius, rubens est, primumque ceu species fructes paruos Aquifoliae Illicis. Quisquiliū uocant, Pensionē alteram, tributi pauperibus Hispaniæ donati. Est enim Illex gemina, ut Columellæ placet. Minor, apibus quæ sita, & prolixior, ab omnibus improbata mellificio. Omnes inquit Plinius, roboris dotes, Illex solo prouocat Cocco. Granum hoc Galatiæ, aut circa Emeritā Lusitaniam in maxima laude inquit habebat. Gignitur & in Africa, & Pisidia. Pessimū in Sardinia. Est autem genus ex eo inquit in Africa fere, & Asia nascens, celerrime in uermiculū se mutans: quod ideo Scoletion uocabant: improbantque Limaci paruæ similē: culici, ut Dioscorides affirmat, & Pausanias: qui fruticem hunc in Locride copiosum ad Ambrysom Rhamni amplitudine, præterea Lentisco similem, nigriore tantum, & molliore folio describit. Fructu Solani quidem specie, sed Erui magnitudine. Colligendum præcipiunt antequam uermiculus is nascatur. Galatæ, qui supra Phrygiā sunt, gentilitier Liyg uocant. Eum fruticē Iones & Græcia tota, Coccum. Anniculo itaque Grano, succus ad pigmetra languidus. Quadrimo euanidus. Ita nec recenti uires, nec senescenti. Colos inter Principales, Imperatoris tantum paludamentis dicatus: qualis in Rosa micat, & quo nihil aspectu gratius, & in purpuras Tyrias, Dibaphasque, aut Laconicas: etenim Tyrio primum tinctas, mox & Cocco tingere mos erat, aut contra, ut fieret Byssinum. Nam & tertio, & quarto, & quinto saturabantur. Unde nomina illa uestium, monocoros, dicoros, tricoros, tetracos, pentacos in uitis principum. Sit autem granum Tinctorium, an Phœnicobalanus, atque Palmula, quod Hippocrates Phœnicion Coccon, quasi granum puniceum uocauit, æstimaturis relinquo. Illud quoque hoc loco referendum est, Coicina quædam legi apud Græcos texta, quæ nostri ceu Coccina legentes, in Strabone rubra, conuerterunt. Caterum Coicina dicuntur a Coice frutice in Aegypto textili: cuius mentio & apud Theophrastum est. Coix inquit, folio Harundinis angulari, ad nexus utilis, a quo & hircellæ genus Coix attice, ut inquit Pollux, quod dorice Cois dicitur.

E X M. V E R G. C O M M.

Coccum nasci in Illice Theophrastus lib. 3. de plantari hist. dixit, καὶ ἡ πρώτη τὸν φοινικῶν κόκκον. Et Illex puniceum Coccum. Quæ Plinius secutus lib. 24. cap. 4. Coccum Illicis ait. Idem tamen multo antea lib. 16. cap. 9. dixerat, Seruato Illicis genere, priuatimque ceu species fructes paruos Aquifoliae Illicis. Ex quo genere hic fruticem paruū, surculosum dixit: qualem & nostra ætas in legendo Cocco, in Romanorum provincia quotidie uidet. Barbarus, quæ græcos codices secutus fuerit, quos nos etiam uidimus, in quibus non legeretur μικρὸν, eam reliquit partē. Nos ex alijs græcis, Plinijque historia admoniti, eam seruauimus uocem. Paruos enim fructes ille ait, quæ hic μικρὸν ἢ μικρὸν φρυγανόδον dixit. Quod autem Dioscorides ait, hæere Coccum fruticibus his φοινί, id est, lenticulari modo, non ad formam Grani, sed hærendi modum referendum est. Nota modo, & uulgaris res, quæ etiam ex alijs nationibus laudetur. Quod postremo hic ait, in Cilicia nascentem in roboribus Coccum, minimis cochleis simile, ab incolis mulieribus ore auelli, aut excipi, parum certam & uerisimilem nobis habet historiā: neque intelligimus, in quæ usum id fieri opus fuerit. Corruptum credimus esse locum, & pro illo τὸ σόμκτι, quod ore significat, aliter quondam legi potuisse, pertinereque ad tempus, quo legendus Coccus esset.

De Tragio.

C A P. L I I.

794/100

Tragium nascitur in Creta tantum insula, Lentisco simile, & semine, folio & ramis. Singulis tamen minoribus. Succus ei lacteus, gummi non dissimilis. Semen, folia, lachrymaque illitu spicula e corpore eijciunt. Omnia quoque corpori impacta, euocant. Pota stranguriæ medentur. Calculos uesicæ frangunt, Menses trahunt, Modus in sumptione

ne est, drachma una. Fama est, syluestres capras sagittis confossas, eius A
hærbæ pabulo spicula excutere.

B A R B A R I C O R O L L.

T Ragon alij similem Terebintho faciunt, alij Iunipero per omnia: succo lacteo, qui spissatur in gummi, nascentem non alibi, q̃ in maritimis Cretæ. Dicitur & Tragonis.

E X M. V E R G. C O M M.

P eregrino Italiæ, gentibusq; alijs frutici nomen in Creta insula tantū caprinum pecus fecit, ob eam quam hic in extremo capite caussam reddidit. Plinius Terebintho primum lib. 17. capite. 21. mox Iunipero. 27. uolumine, ultimo capite similem fecit. Ex qua hominis diuersa eiusdem rei historia facile est conijcere, modo hos, modo illos delibasse eum auctores: ideoq; multis locis non esse earundem rerum eandem illi historiam. Idem liquorem eius lacteum esse, & in maritimis nasci dixit. Nos in peregrino, & ob id incognito frutice nihil habemus aliud, quod monere legentes ualeamus.

De alio Tragio.

C A P. LIII.

E St & aliud Tragium, quod Tragoceros aliqui uocant, alij Scorpi
on, alij Garganon, Romani Cornulacam, Daci Saliam, Aegyptij
Sober, Aphri Achicosim. Folia Scolopendrij habet, & radicem syluest
ris Rhaphani, tenuem, candidam. Quam crudam, uel coctam esse, dy
sentericis prodest. Folia autumnu, hyrci uirus olent: exinde sibi Tragij
nomen adoptauit. Prouenit in montibus, & præcipitijs.

B A R B A R I C O R O L L.

T Ragon hæc minor est priore, nec in Creta solum, ut illud, sed multis locis nascitur, ut B
Galenus inquit.

E X M. V E R G. C O M M.

P riori posteriorem hanc Tragon cognominem tantū faciunt Galenus, Paulus Aegineta,
Græcorumq; alij herbarij omnes, & medici: neq; immerito. Siquidem foliorum figura differt,
quæ in hac Scolopendrij, in illa Lentisci sunt. Differt natalibus: q̃ illa natiuum sibi solum habet
Cretam insulam, hæc ut Paulus Aegineta ait, *φύται πολλαχόθεν*, quod est, multis locis nasci
tur. Differt postremo uiribus: quæ in illa *ἰατρικαί*, id est, extrahendi sunt, in hac adstringentes:
ideoq; fluidis affectionibus cunctis accommodata. Accedit his, q̃ hæc amariore sapore est, qui
in illa non sentitur. Cur autem illi idem factum a gentibus nomen fuerit, hyrcinum foliorum
uirus fuit. Hanc ipsam Dioscorides Tragocerotha, id est, hyrcinū cornu dictā testatur. Facileq;
est ex græca hac uoce, Romanā illam Cornulacā, quæcunq; ea est, factam fuisse. Scorpij dein
de appellatio male ex Trago, quæ mox dicendā est, ad hanc translata fuit.

De Trago.

C A P. LIIII.

E St etiam hærbæ Tragos, quam aliqui Scorpion, aut Tragonon
uocant, maxime in maritimis nascens, palmum alta, aut ampli
or, fruticosa, humilis, oblonga, sine folijs, pusillis circa ramos acinis,
ruffis, multis, magnitudine tritici, acuto cacumine, gustu multum ad
stringente. Racemorum grana decem ex uino pota, coeliacis, & foemis
nis fluctione uulua laborantibus auxiliantur. Tunduntur a plæriscq; &
in pastillos digeruntur, quibus utuntur.

B A R B A R I C O R O L L.

T Ragon Asia fert, uepre ut Plinius dicit, sine folijs, racemis rubentibus, ad medicinæ
dumtaxat usum. Hanc & in littoribus nostris gigni modo perhibent herbarij, Iunco marino si
milem: a quo & Iuncum marinū multi uocant eam. Tragos alia est, quā nos Hyrculū uocau
mus inter Nardos. Item alia Sitodes, hoc est, cerealis cognominata, inter frugesq; dicta.

E X M. V E R G. C O M M.

P eregrina & hæc Italiæ planta est, si Plinio credimus, qui natale solū Asiā illi assignauit,

D I O S C O R I D I S

C duobus locis, eam describens. 13. uolumine, primū capite. 21. mox. 27. capite. 12. Quæ poterunt uolentes certius in eo uidere. In Iuncorum genere aliqui eam numerāt, nec dissimilem marino Iunco in aliquibus faciunt. Plinius Veprem uocat, sine folijs, ramis rubentibus, semipedem altam, fruticosam, racemis rubentibus, grano tritici, acuto cacumine, in maritimis nascentem. Quæ eadem fere huic scriptori historia est.

De Iunco.

CAP. LV.

ὀξυρρίσια

Oxyrhis aliquibus Schinos læuis, alijs Oxypternos, alijs Solis superciliū, Romanis Iuncus marinus, aut Manualis dicitur. Duo eius genera. Vnū læuis nominati. Alterū acuti, qui in mucronem fastigia tur. Cuius etiā duo assignant genera. Vnū sterile. Reliquū fert semen nigrū, rotundū, & crassiore constat calamo, carnosioreq;. Tertius est Iuncus, qui uocatur Oloschinos, prioribus carnosior, asperiorq;, qui similem fructū in cacumine parit. Semen utriusq; tostum, ex diluto potum, si sit aluū, & rubra foeminarū profluua. Vrinam cit. Capitisq; dolores facit. Quæ proxima sunt radici folia, tenera, conuenienter illinuntur aduersus phalangiorū morsus. Aethiopici Iunci semine somnus allicitur. Sed modus in potione seruandus est, ne sopor fiat.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 21. ca. 13.

Iunco palustri, Græcos ad funes usos nomini credamus, quo herbā eam appellant, unde funambuli Schœnobatae ab ijs dicantur. Qui nauigare in Indos Alexandri milites, Iuncos lapideos uidere per littora simillimos nostratibus. Iunci uterū turgentem quodā cacuminis callo præferunt; mox coherētia quædā, uelut oia pariunt, pediculis circa spicaceis, in quibus uascula rotunda, leuiterq; hirscentia, & in ijs semen nigrū cuspidis effigie, non dissimile Asterisco, dumtaxat exilius, radice longa: quæ crassior multo sit, q; maribus cognominatis. Caput huic Cepis, et Gethyo simile, in tegumentis modice rubentibus. Iuncus palustris, hoc est, Schœnos Helios, in multa gña concidit. Oxyshœnos proprie is est, quæ marinum Iuncū uocamus. Sterilem masculū existimāt, foecundū foeminam. Is qui semen nigrū habet, Melancranis appellatur, quasi Iuncus atriceps, Melancraena dictus Strabonē. Vnde funditoribus Balearicis, Amenta, quod & Phileta meminit. Hic sine alijs generibus nascitur ex suo semine: sicut is quem marem noiamus, ex semetipso, cacumine in terrā defixo. Nam Oxyshœnon, & Holoschœnon, eodē cespite, contēplatum se Theophrastus, & admiratū scribit. Omnium radices singulis annis intermori tradunt. Holoschœnon Mariscū a magnitudine (ut puto) nostri uocant: quæ admodū & Mariscus ficus: auctore Festo, quæ Græci Busyca, hoc est, grandiores & fatuas ficos. Ob id & Sycomora esse quidā Mariscus uolunt. Hic & ad tegetes, ut Plinius inquit, & omnino utilia utilissimus, quoniā mollis carnosusq; sit. Vfus omnium ad nassas marinas, nexu elegantia, lucernarū lumina, præcipua medullæ amplitudine iuxta maritimas alpes tanta, ut in ciso uentre, impleāt pene unciarū latitudinē: in Aegypto uero cribrorū longitudinē, non alias utiliorē: ob id cribrū significaturi, Iuncū effigiant, ut inquit Horus. Idem auctor, in Aegypto scribi Iuncis, nec aliter, affirmat. Videtur aut palustris Iuncus idē cum Scirpo esse, nec in fructū inquit Plinius, nec in uepriū cauliumue, neq; in herbarū alioque ullo q; suo gñe numerentur iure. Scirpi fragiles, palustresq;, ad regulū & tegetes, e quibus detractō cortice candelæ luminibus, & funeribus seruiūt. Firmior quibusdā in locis etiā rigor. Namq; ijs uelificant, non in Pado tantum nauis, uerū in mari piscator Africo, p̄p̄stero more uela intra malos suspendēs. Et mapalia sua Mauri tegūt, p̄ximeq; æstimāt, hoc uideant esse, quo papyri usu. Ob id etiā sunt apud nos, qui Scirpos interpretentur, q̄s Græci Biblos, id est, papyros uocant. Sed fruticosi gñis sunt Papyri, enodes, & sine fronde Scirpi, leues, proceriq; ut Festus ait: unde prouerbiū quoq; natum sit, Nodū in Scirpo quæri. Habent Græci & alterū ex Iunci nomine prouerbiū ὀξυρρίσια ἢ μεμλτωμένον, hoc est, Fugit funiculū rubrica tinctū. Contra reos desidias, q; Athenis, qui nō in tēpore ad concionē uenissent, rubricato fune in foro cōprehensi notabant, & mulctabant. Huc uidetur alluisse in Penulo poëta Plautus, cum de scoris uilibus diceret, Vestras schœno delibutas, schœnicolas sordidas,

Quantum & rubricatas, hoc est, fucolitas intelligi uult eas. Est & in uerbo Schoenicola adagiū, *χίον διατρίβειν*, & ut sint quales Græci *χινωτρίγες* uocant, hoc est, spartū rodentes: qđ itē de inerbibus & nugarijs, ut Varroni placet, & alienum laborem frustra cōsumētibz, uisū pari soler. Notum est argumentum illius Oeni, de quo multa in castigatione Pliniana diximus. Scio qđdam intelligere, non Schoenū, id est, Spartum, sed Lentiscum, hoc est, Schinū rodi ab segnibus: quia prouerbiū id cōtra eos dici scribant auctores, qui nimio se comendi studio superfluunt, ac dentibus extēdendis & fricandis incubant: qualis in Lentisco Mastiche uis redditur. Sed schoenotrogēs tamē in omnibus Græcis codicibus, non schinotrogēs legas. Sunt qđ Schoenotrogēs a Scilla dictos putent, quā & Aristophanes, & alij Schoenon quoq; appellant, & dentibus prodesse constat. Vnde Schoenida Venerem cognominatam Lycophronij sunt qui credant, qđ cibo eius accendatur libido: ut Schoenotrogēs, & Schoeniculas hinc quoq; dici meretricēs autumare liceat. Vel forte Scenicolas *ἀπὸ τῆς σκηνῆς*, quasi tabernicolæ. Nam & Alicarias, & Prostitulas uocabant, qđ circa pistrinulas & stabula uersarentur, ut ait Festus. Scinicolas ab unguento aut pessimo uocatas, quod Græci Schem dicunt. Habetur & Luncus Euripice uocatus, & Triquetus, & Odoratius, in suis quiq; mentiones adeundi.

Euripicem non desunt qui Tropicem appellent inter recentiores: quorum pleriq; ut eruditionis suæ periculum faciant, multis partibus rei latinæ officunt.

De Lichene. CAP. LVII.

Lichen, qui saxis est familiaris, aliquibus Bryon appellatur. Asperginosis petris adhæret, ut muscus. Qui illitus sanguinis profluuiā sistit. Inflammationes arceat. Impetigini medetur. Iuuat regio morbo correptos, cum melle illitus. Oris & linguæ defluções inhihet.

BARBARI COROLL.

Lichen, siue Lechen est Muscus, de quo hic. Itēq; herba alia nascens in petrosīs: nomine utriq; inuento, quoniam contra lichenas, remedijs omnibus anteponiuntur. Folium herbæ unum ad radicem latum, caule uno paruo, longis folijs dependentibus. Vtramq; recentiores herbarij Epaticam appellant. Appuli herbam, cuius unum ad radicem folium haberi diximus, Iecorariam, siue Ficellam cognominant, folio succi pleno, & crasso: ita nominatam, quia iocinoris fibræ similis aspicitur. Diuersa est eodem nomine apud nos, in littore passim nascens, & olitorio foro, ieiuniorū tempore uenalis, hederaceo fere folio, flore purpureo, Lilijs pusilli effigie. Cōuoluit herba se quibus appropinquat. Soluit aluum cocta, & cruda oleris modo accepta. Sunt & Lichenes sui equis calli, de quibus secundo libro dictum.

EX M. VERG. COMM.

Eodem nomine malum, & mali remedium græci appellauerunt. Lichen enim impetigo si mul, & qui impetigines sanat, herbosus in petris herens Muscus ab eis uocatur: magnō argumento, nullo magis præsidio contra eas ufuros esse homines. Sciendum tamen, proprium habere genus hunc Muscum ab eo, quo muscantur in torrentibus lapides diuersum. Hic enim in aridis nascitur petris, crassior aquatīco illo, & procerior, umbrōsis plerumq; locis, in saxosis rupibus herens. Vis illi est, ut ueteres græcorum medici decreuerunt, extēgendo purgare, mēdiocriterq; siccare, & refrigerare. Idem, quasi pro comperto illis non esset, de cōpescendis sanguinis eruptionibus, in scriptoris huius fidem id reiecerunt.

De Paronychia. CAP. LVIII.

Aronychia alijs Adocetos, alijs Neuras, alijs Phrynion, Romanis Bouinalis, exiguus frutex in petris nascens, Peplo similis, minor longitudine, maioribus folijs. Illita Paronychij atq; duricij remedio est.

BARBARI COROLL.

Hanc, & Neurada cognominari docent auctores. Quid autē sit Neuras muliebribz malis quæsitā Hippocrati, non liquet planē, *πρὸς μὲν οὖν ὑστέρων νεύραν καὶ ἀλκυρὸν καὶ θυμύραν*. Nisi quis (quod & fere affirmo) non Neurin, sed Nerin, hoc est, Nardum montanum legat.

EX M. VERG. COMM.

Fecerunt & huic nomen abscessus, qui ad radices humani unguis fiunt, Paronychiz a græ-

A

λεγχίον

B

Plin. 16, ca. 4.

παρωνυχία

Cis dicti. His em præfenti remedio herba est: eamq; ob causam honoris huius prærogatiua, ab antiquioribus herbarijs & medicis ornata, nec alio nomine quondam in uetere medicina cognita est. Describunt, effigiantq; eam nostræ ætatis herbarij, petrosis locis nascentem, ut hic etiam ait, folijs latifoliæ Lauri: duobus, aut cum pluribus quatuor ramulis: inter quæ spicatus flos exit, crassitudine pollicis & longitudine, colore inter flauum & luteum.

Χρυσοκόμη **De Chrysocome.** CAP. LVIII.
Chrysocome, alijs Chrysitis, alijs Chrysanthemon, nonnullis Amaranton, alijs Diospogon, Aphris Dubath, uel Buchumath, Romanis Iouis Barba appellatur. Palmi altitudine fruticat. Coma specie corymborum, Hyssopo simili. Radice hirsuta Veratri nigri modo, tenui, Cyperum æquante, gustu non iniucundo, ex austero dulci. In petrosis opacisq; nascitur. Radix excalfacit et adstringit. His conueniens, quos iecur, aut pulmonis inflammatio male habet. Contra purgationes uulvæ, decocta cum hydromelite assumitur.

BARBARI COROLL.

Chrysocome sine folijs, sine semine, solo scapo, comas habet, fulgore auri, unde nomen. Vocatur & Diosgenia, hoc est, Iouis barba.

EX M. VERG. COMM.

Quod hæcenus in Plinio, latinisq; alijs legerim, nulla inter flores, herbasue Iouis Barbæ nomine planta numeratur. Inter arbores quidem. 16. uolumine, cap. 19. a Plinio his uerbis arbor describitur. Odit aquas, & quæ appellatur Iouis Barba: in opere topiario consilis, & in rotunditatem spissa. Inter flores autem in Violarum genere. 21. uolumine, cap. 10. & 11. Iouis flos apte ab eodem uocatur. Coronat folio tantum Iouis flos. Pauloq; post. Succedunt illis æstiuu Lychnis, & Iouis flos, & alterum genus Lilij. & c. Quinetiam. 27. uolumine, ca. 4. idem Plinius aut eundem, aut alium in Violarum tamen genere florem Iouis Flammam uocat. Qualiter flos quem Iouis Flammam appellauimus in Violis. Dicimus autem alium, aut eundem eo nomine significari a Plinio florem: quoniam Theophrasto diuersi flores sint *δύο ἀντὶς*, & *φλέξ*, id est, Iouis Flos, & Flamma. Plinius autem sæpenumero huiusmodi miscet, & in tanta naturæ uarietate non semper illi respondet. Quæ hæcenus dicta a nobis sunt, ut ostendatur, quod in Diosco, nunc legitur Iouis Barbam dici, a Romanis Chrysocomon, in antiqs non inueniri. Plinius em in arbores manifeste Iouis Barbam numerat, seorsumq; a Iouis flore, & flamma Chrysocomen describit. Negat habere latinam appellationem. Quodq; magis animaduertendum sit, Iouis florem, flammamq; inter Violas censer, & sine odore esse: quod & Theophrastus itidē testatus est. Cuius floris nota, omnibus figura est longe a corymbis diuersa, quibus hic & alijs omnes Chrysocomen florere dixerunt. In Violis em singuli flores singulis pediculis, & aliqui ramulis nituntur: in corymbis uero uno pediculo plures. Illi singulares, & plerumq; grandiores: In his acruus magis, & ueluti grumus florum q; flos aliquis est. Licetq; in utroq; genere discrimina hæc passim uidere. Ex his constituendum est proprium, & aliud a Violis genus habere Chrysocomen: quam Plinius Chrysitin uocari etiam ex eo ait, q; comantibus fulgore auri corymbis floret. Et hæc tantum plantæ huius legitime appellationes sunt, cæteræ falso, & ab imperitis illi accreuerunt. Qui enim potest Amaranthos, aut Chrysanthemos dici flos, qui auri fulgore comantibus corymbis splendet? Cum Amaranthus spica uerius purpurea, q; flos sit, & Chrysanthemus alius undiq; a Chrysocome describatur, quemadmodū nō multo post a Dioscoride tradetur.

Χρυσογόνον **De Chrysogono.** CAP. LIX.
Chrysogonon, aliqui Chrysospermon uocant, alijs Daspin, alijs Origanum, alijs Arcophthalmon, Romani Arilariam. Densè fruticat, quernis folijs, flore coronarij Verbasci. Radix ut Rapum extuberat, intus ruberrima, foris nigra, quæ trita cū aceto, atq; imposita, muris aranei moribus auxiliatur.

EX M. VERG. COMM.

QVale Chryfagon non hoc fit, & unde factū illi nomine sic appellē, nullibi legiſſe me mini. Cæteri etiam græci, præſertimq; Paulus Aegineta, quo libro omnem numerat medicam materiam, Chryfagoni huius ad medicinam nullibi meminit. Plinio itidem nulla inter plantas Chryfagoni uox eſt: ſimilem tamen Chryſocomæ, & alijs a colore auri appellatis nomen facit. Et ex quo hic ipſe ait Chryſoſpermon a quibuſdam etiam uocari, conijcere licet; non in flore, ſed in ſemine auri colorem eſſe. Idem enim Chryfagonon, & Chryſoſpermon eſt, aurei ſcilicet ſeminis herba. Satis ex hiſtoria eius patet, qualis hic frutex ſit, & qua notarum obſervatione deprehendi poſſit.

De Helichryſo. CAP. LX.

HELichryſon quidā Chryſanthemō, nonnulli & id Amaranton uocant, quo Lymphas coronant. Ramulū habet candidum, uirentem, rectum, firmum. Folia intercedentibus ſpacijs anguſta, Abrotono ſimilia, comam aureæ lucis, in orbem, umbella rotunda, ueluti ſiccis corymbis dependētibus, radice tenui. Naſcitur in aſperis, & torrentium alueis. Contra ſerpentium iſtus, coxendicum dolores, urinæ ſtillidicia, ruptaq; coma e uino pota opitulatur. Ciet menſes. Sanguinem concretum uentris ac ueſicæ abſumit, pota cum mulſo folia. leiunis, trium obolorum pondere, ſiſtit deſtillationes, data in uino albo diluto. Veſtibus inferitur ut eas ab erodentium iniurijs tucatur.

BARBARI COROLL.

Helichryſos, & Heliochryſos a Theodoro Aurelia uocatur, ad ſolis repercuffum, comantibus in orbem folijs fulgore auri, a quo nomen. Alij à uirgine Ephelia, quæ hoc flore prima coronauerit Dianam, Coronari eo & Deos Ptolomæus rex Aegypti diligentiffime curauit. Veſtes odore cōmendat non ineleganti. Exiſtimationem & gloriam parere coronatis flore credit, ſi unguento ſe perfundant ex auro, quod Apyron, hoc eſt, ignem non expertum uocatur. Floret fere cum Viola nigra uere. Flos auri modo fulget, radix ſummo terræ corio innixa folio cædido, caule tenui & duro, non ut Theodorus inquit, ſemine, qui carpon, non caulon in Theophrasto legerit. G A L Enus hanc Amaranthi nomine ſignificat, nec aliter uocauit, ob id corymbos eius nunq; marceſcere, Plinius ſcriptum reliquit. Philoſtratus ex Amarantho coronariſepulturas quoq; ſolitas affirmat; idq; Theſſalos inſtituiſſe primos ad tumulum Achillis.

EX M. VERG. COMM.

Helichryſum Plinius in hiſtoria pluribus locis, in medicina lib. 21. ca. 25. Heliochryſum eandem aurei floris plantam appellat. Habetq; utriuſq; uocis certam primum ex natura cauſam, tum ex græcis ſcriptoribus, Poetas, Theophrastumq; autores: quorum illi Helichryſum, hic uero ſemper Heliochryſum in plantarum hiſtoria nominat. Diuerſitatis huius cauſa eſt: q; q Helichryſum uocant, a quoliſ & paluſtribus locis, quæ græci ἡλιόχρυον dicunt, naſcentem florem indicant: qui uero Heliochryſum, quoniam ἡλιος Sol græcis eſt, ad ſolis repercuffum aurea luce fulgentem ſignificant. Quæ illi natura eſt, non aliter q; multis alijs, quæ accedente Solis luce, colores ſuos uariant, et eos qui non ſint habere uidetur. Quod hic ſignificauit, dicens χρυσοφάνη, id eſt, quæ aureo colore & luce ſe oſtendant. Sunt tamen qui utroq; modo enunciatum hunc florem a paluſtribus locis dictum fuiſſe uelint: neq; ἡλιόχρυον, in qua uoce Sol eſt, uerum ἡλιόχρυσον, in qua paluſtres loci audiuntur, ſcribendum eſſe. Quibus literis in Theophrasto ſcripta etiam nunc ea uox plærumq; inuenitur. Sed nos in melioribus obſeruauimus, a Sole id nomen factum. Acceditq; naturæ cauſa, quæ illi eſt, ut Plinius ait, ad ſolis repercuffum aurea luce fulgere: quodq; hic ait χρυσοφάνη, id eſt, aureo colore uideri. Cuius euentus nō niſi in Sole cauſa eſt. Chryſanthemon eundem hic uocari a quibuſdam ait ab eodem auri colore, ſed ex alio flore: de quo mox dicitur accepta appellatione. Quod ſola nominis, & coloris ſimilitudo fecit. Ad didit præterea, Amaranthum ab aliquibus Helichryſum etiam dici: non quia ſpicatus flos ſit, qualis eſt qui proprie Amaranthus dicit, de quo in Chryſocome dictum paulo ante eſt, ſed ab eadem longioris ſine detrimento uitæ natura. Quæ enim proprie Amaranthus a græcis nominata eſt, ſpica, ut prægōſtrauimus, uerius q; flos eſt, colore purpureo, ſine odore, auguſto mē-

C se protitens, in autumnum durans: & qui, quod mirum sit, postq̃ defecere cuncti flores, m̃ defactus aqua reuiuiscit. Ideoq̃ antiquis hibernas faciebat coronas. Summa tamen eius natura in nomine est, ἀπό τοῦ μὴ μαρῆναι, id est, q̃a nō marcescit a gr̃ecis appellati. Ex qua natura ui, hic etiam ob similitudinem aliquam Helichrysum uocari ait, quia scilicet corymbi eius nunquam marcescunt; eamq̃ ob causam Deorum simulachra ad longioris temporis ornatum hoc flore antiquitas coronabat: quod cunctis gentibus adeo tunc cōmune erat, ut hic inter notas eius dixerit esse Helichrysum, quo Deorum imagines in templis coronantur. Galenus Acanthi nōmine, ob eam quam diximus causam, semper hunc uocauit: quemadmodum & spicam illam purpuream: ideoq̃ diligentius ex uiribus & usu in medicina discernendus in eo uterq̃ hic flos erit. Flore Helichrysum Theophrastus uere ait, una cum Viola nigra. Estq̃ locus ad extremum sextum eius de plantarū historia uolumen. Idē longius lib. 9. de eodem egit. Quē item a Plinio quoq̃ reddita lib. 21. cap. 11. fuerunt. Et quorum sit sensus, Gratiam, & uitę gloriam sibi etiam acquirit, qui Helichrysi flore coronatus, unguento ex auro quod ignem non sentit se insperget. Habet autem Helichrysus florem auri colore, candidum folium, colicolum tenuem & durum, radicem in superficie terrę, eandemq̃ gracilem. Vtuntur ea cōtra morsus uenenatorum in uino. Vtuntur & ad ambusta, cinerem eius melle excipientes.

De Chrysanthemo. CAP. LXI.

χρυσάνθεμον

Chrysanthemum, aut Chalcas, aliqui Chalchitin uocāt, alij Chalcanthum, alij Chalcanthemon, alij Buphthalmō, Romani Acanthum, Ethrusci Garuleum, Aphri Churseten. Hærbā est tenera, fruticosa, leues proferens caules, & multifida folia, flores supra modum splendentes, luteos, orbem oculi imitantes, unde nomen traxit. Propter opipida nascitur. Cuius caules oleris uice manduntur. Flores cum cæratō triti, scæatomata discutere prōduntur. Regio morbo correptis, colorem breui reddit, si sequente longo balnei usu, post exitum ebibatur.

BARBARI COROLL.

Chrysanthemum, nec forma, nec uiribus a Buphthalmo superius indicata differt: uerba tantum mutata sunt, eodem manente sensu: ut ne Dioscoridis quidem caput suspicentur aliqui. Illud nota uero, a Dioscoride quidem uocari hanc etiam Chalchitin, sed an sit eadem quæ Plinio Chalceon in uineis nascens, & iocineri trita imponi iussa, nescio.

EX M. VERG. COMM.

Nos aliquando cogitauimus, quasi nulla esset Chrysanthemum, aut si sit, eandē Buphthalmum esse, nullam capitis huius habere rationē: & q̃d nullū in re esset, nullū in labore hoc nostro etiam fore. Sed in contrariā traxere partē Chrysanthemum primū nomē, q̃d a Buphthalmo aliud Diosc. & Plinio est. Mox quē in Chrysanthemo alia a Buphthalmo sunt; habere, scilicet caules eius leuiores, folia incisuris diuisa, nō ut illa Fœniculi figura, & capillata. Postremo, olerū mō in cibis admitti: quod Buphthalmo neq̃ a scriptore hoc, neq̃ ab alijs tribuit: et q̃d in medicina relinquēdū nō est, Buphthalmi folijs cū cera sanari duricies tumoresq̃, Chrysanthemo autē priuatim scæatomata. Accessit his etiā, q̃ nobis est, pbatissimę & antiquissimę fidei gr̃ecus Diosc. multa toto hoc capite diuersa habet. Quā em̃ ceteri codices a Romanis Acanthā uocari Chrysanthemum ostēdunt, ille Caltā habet. Et quæ illi πολυχιδὴ φύλλα, hic προχιδὴ. Quodq̃ in floribus pictura passim legit̃, καὶ ὀφθαλμὸν κυκλωτὴν, in eo non est. Sic etiam in medicina & remedijs, q̃ soli flores se suffufis mederi dicunt, in eo folia & flores legunt. Tantaq̃ est uarietas, tantaq̃ ex uarietate suspicio oritur, ut esse Chrysanthemum a Bouis oculo aliā credamus: et quod ex Bouis oculo illi accreuerint, ab imperitis & ex similitudine diuersas plantas misceribus, accreuisse. Variant em̃ in sermonis ductu, rerumq̃ serie scriptoris huius exemplaria: & quo antiquiora sunt, eo certiorē coniecturam faciunt, fuisse quādam per se, & adhuc esse, Chrysanthemum a Bouis oculo diuersam. Accedit his Plinius etiam uicesimo sexto uolumine, capite octauo, Chrysanthemum priuatim nominans: perissequē huius capiti quæ propria Chrysanthemum erant: successisseque illis ex Bouis oculo, quæ eius propria erant, facile crediderit aliquis. **P L I N I U S** enim Chrysanthemo ad uelliscæ uitia utitur, quorum nulla in hoc capite inter alia Chrysanthemum remedia ratio habita est. Qualia obseruari a nobis hæc potuerunt, talia etiam docentur. Cupimus tamen cuncta a nobis hoc capite dicta, suspiciones, coniecturasq̃, nō decreta haberi.

Neque enim alio consilio dicta longius a nobis fuerunt, quam ut labore hoc nostro, quicumque is est, ad ueritatis eruscationem ceteri facilius proficiant. Qui illud etiam meminere, credere nos cunctas Chrysanthemo adiectas appellationes, a uoce illa Chalca incipientes, alterutram habere rationem & causam. Aut enim ob luteum medij floris colorem, a simili & concolori aeris metallo, quod graeci chalcon dicunt, factae fuerunt: Aut, quod nos magis probamus, quoniam Buphthalmo pariter, & eadem Chrysanthemos Chacta a quibusdam credita & dicta fuerit, ex eo nomine caeterae illae omnes Chrysanthemi appellationes, corruptae tamen fluxerunt.

De Agerato. CAP. LXII.

Ageraton fruticosa haerba est, palmari longitudine assurgens, simplex, humilis, Origano non dissimilis. Umbellam gerit, in qua flos bullis aureis emicat, Helichryso minor. Nomen ei inditum est, quoniam diutissime flos in sua coloris specie conseruetur. Vis decocti feruens. Huius uisae nidor urinam cit, & uuluae duricias emollit.

EX M. VERG. COMM.

In latinis sub hoc nomine nulla, quae nota nobis sit, plantae huius historia est. Graeci uires discutienti habere eam tradiderunt: & praeter id, leniter inflammationes arcere.

De Verbenaca. CAP. LXIII.

Verbenacam rectam, Graeci Peristereona uocant, alij Trigoniō, alij Bunion, alij Hierobotanē, alij Philtrodoren, Aegyptij Peni sempe, Magi Iunonis Lachrymam, nonnulli Mustellae sanguinem, alij Sanguinem Mercurij, Romani Cristam gallinaceam, alij Pheriam, alij Trixalidem, alij Exuperam, aliqui Haerbam sanguinalem. Nasctur in aquosis. Nomen ex eo duxisse uidetur, quod columbae circa hanc per se libenter nersari soleant. Palmi altitudine, & interdum amplius adolescit. Folia e caule prodeunt incisa, & subalbida. Ea singulari ramo, radiceque sola constare saepius inuenitur. Folia cum suillo adipe recenti, aut rosa ceo imposita, uuluarum dolores finire putatur. Ignem sacrum illita ex aceto reprimunt. Putrida ulcera cohibent. Vulnere glutinant. Vetera quae ex melle, ad cicatricem perducunt.

BARBARI COROLL.

Peristereon a Graecis uocata, quod columbae in ea mansuet. Item Peristerium, unde Columbaris uocatur. Item Lucinia, & Lustrago, & Militaria. Sunt qui Petonomo a uolucris pastu noient, & a colorum uarietate Panchromon, a nostris Verbenae, & Verbenaca, siue (ut arbitror) corrupte Verminaca dicitur. Item Ferraria, non feria, etiam si Dioscorides ita noiasse uideatur: quandoquidem secundum huius herbae genus ab ipsomet Dioscoride Sideritis appellatur. Hac & Iouis mensa uerebatur. Verbenam porro & sagmina, Romani, hoc est, gramen ex loco sacro, praesertim ex arce Capitolij, cum sua terra euulsum, in publicis remedijs, & in sacris legationibus, cum ad hostem clarigatumque mitterentur, ferebant: coronatis ita secalibus & patre patrato, uel foedera facturis, uel bella indicturis. Sed omnes quoque frondes sacratas, purasque per abusionem Verbenas uocabant. Dioscorides duo facit genera, rectum, & supinum. Plinius mare, & foeminam. Mari caules reddendo plures & tenues, itemque cubitales & angulosos: demum quae cumque Dioscorides supine, nisi quod rariora mari folia quam foeminae adiicit. Quidam non distinguunt, sed unum omnino genus tradunt. Vtraque fortunae galli, & praecuntur responsa. Hac perunctos, Magi putant impetrare quae uelint, amicitias conciliare. Colligi circa canis ortum debere: ita, ut ne luna, aut sol conspiciat, sauis ante & melle terrae ad piamentum datis: circumscriptam ferro effodi, sinistra manu, & in sublime tolli. Sicari in umbra separatim folia, caulem, & radicem. Vtraque genus in planis aquosis nascitur. Diuisurae foliorum utriusque similes quidem omnino quernis, sed maiores. Rectum erui praecipitur, sole arietis signum meante. Non quidem ad omnia, sed ad me-

Q. iij

A

ἀγέρων

περιστεριον

B

Phil. li. 25. ca. 9

D I O S C O R I D I S

C dicamentum illud, quod propterea Criogenes pastillas dicitur.

E X M. V E R G C O M M.

Pli. li. 22. ca. 2
N illa in toto herbarum censu Romanæ nobilitatis plus habet quàm Verbenaca. Vna enim hac domus purgabat, lustrabatur familia, & Iouis mensa ad sacrificium & epulas uerebatur. Vna auctoribus Romani imperij, conditoribusque imensum quiddam dedit. Non aliunde sagmina in remedijs publicis, & in sacris legationibus Verbenæ, quæ ex hac genti illi fuere; qua coronati ad hostes clarigatiq; mitterent: ideoque sacra Herba uulgo dicta, & cognita: Romani Verbenacâ, quæ sola & per se uerbenas faceret, dixerunt, Gentij iura, & publicæ utilitatis causâ secuti. Greci, quibus nulli feciales erant, nec idem in legatis ritus, naturam contemplati, Peristereona nominauerunt, a columbis, ut hic ait, facto nomine: quæ hac auis libenter inter eam uersetur.

fig. 804

De supina Verbenaca.

C A P. L X I I I.

fig. 804
S Vpinam Verbenacam aliqui sacram Hærbam appellant, alij Eriogenion, alij Chamælycon, alij Sideritin, quidam Curitin, alij Persephonion, alij Iouis colum, alij Dichromon, alij Callesin, alij Hipparifon, nonnulli demetriada, Aegyptij Penphtheuphtham, Pythagoras Erysisceptron, Romani Cincinallæ. Ramulos emittit cubitales, aut maiusculos, angulosos, in quibus ex interuallis folia Quercus, sed minoran gustioraque, eisdem diuisuris in ambitu, colore aliquatenus cæsius. Radix longa, tenuis. Flores purpurei, graciles. Folia cum radice in uino pota, illitaue, aduersus serpentes pollent. Eadem drachmæ pondere cum turris obolis tribus, in uini ueteris hemina, quadragenis diebus ieiuno ore, contra regium morbum bibuntur. Veteres tumores, & inflammations mitigant. Sordida ulcera purgant. Tota in uino decocta tonsillarum crustas abrumpit. Oris nomas gargarisatu cohibet. Aiunt, si aqua spargatur triclinium, qua maduerit, lætiores conuietus fieri. Datur potandum in tertianis febribus, tertium a terra geniculum, cum folijs circumdantibus, quartanis quartum. Sacram uocant hærbam, quoniam multum ad amuleta, expiationesque commendetur.

B A R B A R I C O R O L L.

P Eristereon hyptios, hoc est, supina, frequentior est quàm superior. Latissimus est quorundam error, existimantium Verbenam & Peristereon priorem esse: quam olitores Sclaream modo uocant: de qua ueteres nihil dixisse (quod sciam) uehementer miror. Folium ei Betæ lanuginosum, serratumque in modum cristæ: flos spicaceus, & ceruleo purpureus, odorata tota, & uulgaris. Nisi quis hanc Alektorolophon, id est, cristam gallinaceam interpretetur. Alektorolophos inquit Plinius, folia habet similia cristæ gallinaceæ plura, caulem tenuem, et semen nigrum in siliquis. Mutat colorem, sed ex nigra albicare incipit, & intumescit, ac exit. Vtilis tussiculis & oculorum caligini. Solidum semen consicitur in oculum, nec turbat, sed in se caliginem contrahit. Hæc Plinius. Hoc quidem ipsum facere uidetur semen eius, quam uocant herbarij Sclaream. Folio cristæ simili, ac nigro semine: uerum non in siliquis, sed in folliculis, siue capitulis post florem. Nisi quis siliquas in Plinio pro uasculis quibuscunque accipiat.

E X M. V E R G C O M M.

S Vperiolem Verbenacam graeci, quæ recto caule riget, Rectam: hanc quæ deiectis in terram ramulis quasi iacet, Supinam uocauerunt. Nec solum inter eas hoc discrimen obseruatum ab illis est, sed, ut ex utriusque historia licet cognoscere, plura alia sunt quibus inter se disconueniant: præsertimque numerus, & longitudo ramulorum. Quod idem ambabus est, & quod cognomines eas fecit, foliorum figura, & in folijs pares incisuræ sunt. Vidimus nos, quâ nunc rectâ Verbenacam dicunt, multo maiore altitudine quàm dodrantali: contraque Supinâ longe breuioribus quàm cubitalibus uirgis: & in utraque: quod in scriptore hoc non legit, quadrâgulis ramulis: Rectâ itidem singulari caule, sed non singulari radice: nisi hic unam eius radicem forte dixerit, quæ crassior a-

lijs est: cæteras uero fibras & capillamenta magis q̄ radices esse uoluerit: In utrâq̄ autē quod paulo ante diximus, eadem serrata, & quernis similia folia sunt. Visæq̄ nobis plantæ hæ sunt magis ad Plinij, q̄ ad scriptoris huius picturam accedere.

De Astragalo.

CAP. LXV.

Astragalum aliqui Chamæfycen, alij Gatalen, alij Onyca uocant, Romani Pinum triuiam, aut Ficum terre, aliqui Glandulam, alij Thium, alij Nonariam. Astragalus paruus in terra frutex, folijs & ramis lupino similis, flore purpureo, paruo, radice rotunda, Rhaphani modo grandi, quæ adnatas appendices firmas habet, nigras, præduras, ueluti cornua inter se implicatas, gustu adstringentes. Nascitur in uentosis, opacis, & in uallibus. Eo Memphis Arcadiæ scatet. Aluum sistit radix in uino pota. Vrinam mouet. Vetusis ulceribus, sicca efficaciter inspargitur. Sanguinem supprimit. Aegre propter duriciam tunditur.

BARBARI COROLL.

Astragalus aliter a Plinio describitur, folio longo, incisuris multis, obliquis circa radicem, caules terni, aut quaterni, foliorum pleni, flores Hyacinthi, radices uillofæ, implicatæ, subentes, præduræ. Nascitur in petrosis, & Arcadiæ Peneo, siue ut Galenus & Paulus, Pheneo. Colligitur exitu autumnii, cum folia amiserit. Siccatur in umbra.

Pli. li. 26. ca. 9.

EX M. VERG. COM M.

EX Arcadia, si forte adhuc nomine hoc illic cognoscitur, Astragalus repetenda, Italiæ em aut nulla, aut tam rara modo est, ut a nullo cognoscatur. Nomen illi, ut uidetur, radix fecit rotunda, durâq̄: & ob id animalium talo similis. Id enim Astragalus græcis est: a quo quibus pueri quondam luderent, non cubi, tesserae dicti sunt, sed talit: quibus Ganymedem & Cupidinē Apollonius finxit in cælo colludentes; & Plinius Astragalizontas Polydetti opus appellauit, in quo si Apollonij carmen lib. 3, in Medæe amoribus diligenter aliquis, ludicq̄ genus obserua uerit, uictoriæ præmij potius q̄ fortunæ & ludi instrumentum Astragalos esse intelliget. Locus in eo poeta uidendus his, qui in antiquitatis cognitione diligentiores haberi uolunt. Cur autē Astragalum hanc Chamæfycen Græci, Latini uero Ficum terræ dixerint, in Chamæfycæ certius intelligitur. Radicis enim similitudo, cognomines, diuersas alioquin plantas, fecit. Viderunt præterea ab eadem rotunda crassitudine Romani Glandulam, manifesta rei indicatione. Nasci eam nos in Phæneo Arcadiæ, non in Memphis diximus: quoniam nulla est Memphis Arcadiæ. Et Plinius in Phæneo provincie eius oppido nasci testatur: & præter Plinium uetustissimi & optimi græcorum codices in Phæneo adhuc habent.

B.

De Hyacintho.

CAP. LXVI.

HYacinthum aliqui Heloniam, alij Porphyranes, Romani Vælcinum, alij Vlcinū uocant. Folia habet Bulbi, dodrantalem caulem, minimo digito tenuiorem, hærbaceum, comam procumbentem, florum purpureorum plenam, incuruant, radicem bulbaceam. Quæ ut creditur, pueris cum uino albo illita, pubertatem coërcet, & non patitur erumpere. Sistit aluum. Pota urinam impellit. Phalangiorum morsibus auxiliatur. Semen adstringentius est, theriacis expetitur. Regium morbum emendat, cum uino potum.

BARBARI COROLL.

HYacinthi, cū Viola nigra erupunt uete, sed ante Rosam, ut fere oia, quæ in coronas a moribus petunt. Exeunt & cū Gladiolo, sed eximie in Gallia, ubi & Hysginū eo tingit. Nā colos in ueste Hyacinthinus, nō ex hoc tantū Hyacintho, ut fere credit, sed & Viola, q̄ syluestris Hyacinthus quoq̄ dicit, traxisse nomē uidet, Plinio utitur: "Nā q̄s in eo Ianthinū malit, q̄ Hyacinthū legere. ut Martialis, Coccina famosæ donas, & Ianthina moræ."

Pli. li. 21. ca. 11.

Q. III

D I O S C O R I D I S

C De quo in castigatione Pliniana diximus. Hyacinthi & albi & ferruginei, hoc est, cerulei uisum tur. Nam & lapis frutici cognominis ceruleo nitore fulget, ut Solinus inquit, ut qui colorē eorū li dixerunt Hyacinthinū, de ceruleo uideant accēpisse. Porro tam syluestres, q̄ urbani plurimū durant. Comitatur florē hunc duplex fabula, luctum præferēs eius, quē Apollo dilexerit, aut ex Aiācis cruore editum: ita discurrentibus uenis, ut græcarū literarum figura ea legatur inscripta. Paulanias florem qui natus sit extincto Aiāce apud Salamina, credi refert editum primo, nec Hyacinthū, sed literis Hyacintho similem uideri ex cādido rubentē, ac Lilio minorē. Idem auctor Cosmofandalon dici florem apud Hermionenses Trōezeniis confines, quem ipse Hyacinthū uidetur interpretari. Eo flore coronatos festa, quæ Chthonia uocāt, agere. De Cosmofandalis & Cratinus & Clearchus. Palladius Hyacinthum, & Irim, & Gladiolum a similitudine foliorum uocari dicit. Qui Seruium grāmaticum accusant, q̄ Hyacinthum esse dixerit, quē Virgilius Vacinium in carmine uocari, Dioscoridem accusant, affirmantem Hyacinthum a Romanis Vacinium appellari. Plinius quoq; Vacinia inquit, aucupij Italia seruitur, Gallie uero etiā purpurea tingendis seruiorū uestibus. Item alibi. Transalpina Gallia herbis Tyrium atq; Conchylū tingit, omnesq; alios colores. Item alibi. Mire inquit Hyacinthus in Gallia pro uenit: quo ibi pro Cocco Hysginū tingitur. Est autē Hysginus color, a quo Græci uestes Hysginobaphes appellant, hoc tinctas colore. Quo fit, ut recte senserit grāmaticus hac parte, Vacinium Maroni pro Hyacintho acceptum fuisse. Nec obstat, q̄ nigra dicat poëta: quando purpuream quoq; Violam, est ubi auctores nigram uocare soleant.

E X M. V E R G. C O M M.

Palladius primo sui operis uolumine, capite. 37. Hyacinthum cum Iride his uerbis miscuit. Hyacinthum, qui Iris, uel Gladiolus foliorum similitudine dicitur. Obijciat forte mihi hoc loco aliquis, non esse multum Palladio tribuendum, nec posteriori scriptori, & qui degenerante iam declinūq; latini sermonis candore scripserit, contra antiquiorum dicta fidem habendam. Multa enim in eo sunt, præter multa etiam contra Romanorum uocum proprietatem, dignitatemq;. Fatemur id nos, concedimusq;. Non tamen adeo negligendus scriptor, nec tam longo interuallo ab antiquitatis candore illo distans, ut non uestigia saltem in eo, & coniecturæ aliquæ super sint, quibus deprehendi antiqua ueritas possit: accedentibus præsertim melioribus, & antiquiorum scriptorum testimonijs aliquibus, & rerum necessitatibus. Cogitādum illud etiam in nominum mutationibus, quæ quotidie a gentibus sunt, sic plarūq; priora nouis cedere, ut aliquæ semper super sint in nouitate uetustatis reliquæ: aut mutationis saltem causæ in illis intelligantur. Neq; ut inquit Hesiodus, penitus uanam perire famā illam, quam, ut ipse ait, multæ famigerant gentes. Isq; ego sum, qui non facile persuadeam, quæ de Iride & Hyacintho dicta a Palladio eo loco sunt, temere penitus dicta existimari debeant: sed ut in huiusmodi sit, mutata penitus nominis potius, q̄ rei æstimatione, quod fuerat commune Iridi & alteri flori, Hyacinthi nomen aliquando, quo tempore ille scribebat, ad solam Irim contractum fuisse. Vtorq; ad hanc rem huiusmodi coniecturis, Columellæ primum auctoritate: qui eo quo diximus libro & capite de Apium passionibus agens, & quibus floribus præcipue gaudeant, & generosum mel conficiant, inter cætera Hyacinthum numerauit: addiditq;, celestis numinis: quæ duæ uoces in graui scriptore non aliam ut credimus habent rationem, q̄ ut Hyacinthum, quem ille Apibus circa aluearia conferi iubebat, ab alio, uulgarisq; Hyacintho, & inutili Apibus, ea honoris nota distingueret: appellasseq; Hyacinthum celestis numinis, quem Palladius dixerat, Hyacinthus qui Iris & Gladiolus dicitur. Neq; immerito male uel Irim Hyacinthum celestis numinis dixisse credi potest: quando Iris celeste numen est lunonis nuncia, & inter celestia phænomena ex admiratione hominum diuinitatis particeps. Nec aliud, iudicio nostro, intellexisse ea nota Columella uidetur, q̄ non esse simpliciter Hyacinthum circa aluearia conferendum: sed Hyacinthum celestis numinis, id est, is qui a celestis numinis nomine etiam indicatur. Ratio cinariq; (si sic intelligendus Columella sit) oportet, cōmune Hyacinthi quondam nomen, & Iridi & Hyacintho priuatim dicto fuisse. Nec tantum duobus his floribus, sed figura Iridi similibus, licet colore diuerso plarisq; alijs. Quod ex eodem Columella in carmine suo manifeste cognoscitur, cū ait. Nec non uel nivosos, uel ceruleos Hyacinthos. Quo colore flores Hyacinthi nomine indicari proprie non possunt. Siquidem purpureo flore Hyacinthus, non candido, aut ceruleo est. Credimusq; nos, in Hyacinthis quondam euenisse quod in Violis: in quibus quemadmodū in Iasme primo uolumine testari sumus, figura, florisq; forma, non color genus faceret. Sed hoc latius patet, q̄ res nostra modo exigit.

*Seruius.
Vacinia sunt in
la, quas purp-
ra, coloris esse
manifestum est.
Pomponius Sabinius.
Vacinium arbor est, quæ
in Italia ad antiquam se-
ritur: in Gallia uero hi-
ad tingendas uestes. Flo-
res enim purpureos
habet. Vacinia autē
Maroni uocari nigra,
interpretantur satyrici
ea ratione, quia de purpu-
ream item uolam
dicitur nigram po-
te. Nam uolam, id est
uolantem, Iridem quæ
Hyacinthus.*

Papauer erraticum, quod Rhceam uocant, nonnulli Oxytonon, Romani Papaueralem, Aegyptij Nanti, uere quidem in aruis cum hordeo nascitur, flore protinus deciduo, unde & nomen apud Græcos accipit. Folia Erucæ, aut Origano, aut Cichorio, aut Thymo similia spectantur, sed longiora, diuisa, scabra. luncus ei caulis, rectus, cubitalis, asper: flos syluestris Fremij, puniceus, interdum albus, oblongum caput, sed q̄ Fremij minus: semen rufum, radix longa, subalbida, minoris digiti crassitudine, gustu amara. Huius capita quinque aut sex, in uini cyathis tribus ad dimidias decocta, potui dabis, quibus somnus accersuolus est. Semina acetabuli mēsurā ex aqua mulsa pota, aluum leniter emolliunt. Ad idem præstandum mellitis rebus, & dulciarijs ammiscetur. Folia cum calycibus illita, inflammationes sanant. Eorundem fortu & perfusione, somnus allicitur.

BARBARI COROLL.

Papauer Rhceas, hoc est, erraticū, capite, ut Theophrastus inquit, unguis potlicaris amplitudine. Legitur uiridiusculū ante messem ordeī. Hoc & satiuus ascribitur: q̄q̄ inter syluestria & satia melius fortasse, quasi medium constituas, quoniam sponte quidem, sed in aruis nascatur. Admonendi tamen sumus, Rhceadis cognomento non hoc tantū Papaueris genus uenire solitum, sed & alia duo syluestria, ut mox liquebit: hoc quoniam flores eius breui decidant, illa quoniam fluat ex ipsis, conuulserato scāpo succus lacteus, Opion appellatus.

EX M. VERG. COMM.

Comparatur in scriptore hoc inuicem Papauer erraticum hoc, & Anemone, de qua secundo uolumine a Dioscoride, & a nobis actum longius est. Et ut in similibus sit, quorū reciprocae notæ sunt, Papaueri huic eadem dicta & credita Anemone est, Anemoneq̄ contra Papauer hoc. Illa agreste nigrumq̄ Papauer, & Meconium uocari dicta est, hoc manifeste syluestri Anemone simile dicitur. Præsenti nec negligenda dubitatione, quales duo hi flores sint, quibus locis inueniendi, quibusq̄ nominibus priuatim indicandi, & quod tota hæc res modo exigit, quod nā Papauer hoc erraticum sit. Diximus in Anemonibus cōmentationibus nostris longius, quæ tunc pro illa dici potuerūt. Inter quæ præcipuū illud fuit, non uideri nobis, priuatim Anemonibus uoce, rubrū Papauer (sic enim modo erraticum hoc appellamus) indicari posse: quoniam quæ de Anemone in antiquorum cōmentarijs legerētur, rubro Papaueri non omnia competere: ideoq̄ credere nos, aliā ab illo Anemone esse. Vsq̄ post multa alia ad eam rem sumus capitis huius, & in eo erratici Papaueris historia & descriptione. Quæ tota eius esse floris manifeste cognoscitur, qui ruffo colore, & aliquādo candido, paucissimis folijs, sed his amplioribus, quocunq̄ pulsu & iniuria deciduis, in triticea & hordeacea segete, Maio præsertim mēse floret. Nihil enim naturæ exemplari illi in hoc scriptore deest, qui multa breuitate cōmplexus omnia est: deciduū protinus florem, uernos ortus, natalem locū, arua & segetes, & quæ alia illi ab eadem natura accepta adscribuntur. Quodq̄ animaduertat aliquis, sponte sua nasci: cum plærūq̄ Papauer omne satiuū sit. Quod solum afferri contra possit: crediq̄ utilius, aliquod Papaueris hoc genus esse illud est quod hic ait. Quo tempore etiam colligitur, cuius laboris & operæ nulla est in erratico hoc nostra ætate ratio & usus. Sed non est ex usu hominum ratio in natura accipiēda. Mutatur enim quotidie quæ homines agunt, placuitq̄ quondam quod nunc in nullo honore est: rursusq̄ multa in honore modo sunt, quæ futuris seculis, aut nulla, aut inutilia habebuntur. Præterea si seruandum semen eius ad medicinam & dulciaria fuerat, tunc legi oportebat cum maturuisset. Meminisse illud etiam necesse erit, cum ab Anemone diuersum Papauer hoc ostēdere aliquis cogitabit, in toto Papauerum genere florem in purpureo candidum esse, abundareq̄ in eo candorem, in hoc autem rufum, aut album colorem totum esse: in hoc oblongum caput describi, breuiusq̄, & minus q̄ in Anemone. Quod si recipiendum est, manifeste indicat, Papauer hoc in aruis, & in segetibus nascens illud esse. Nullum enim inter Papauera omnia minore capitulo est. Quod intelligens Theophrastus, ma-

A

ΜΗΚΟΝ ΡΗΧΕΑ

Pli. lib. 19. c. 25.
19. cap. 8. 20.
cap. 19.

B

Cognitudine humani unguis esse dixit. Meminerit etiam, in Anemone plures numerari colores: in hoc autem duos tantum, rufum, & candidum: & ne longiores simus, plura alia inueniet discrimina, quæ collata inuicem, duorum florum duplici historia facillime deprehenduntur. Nos interim ex Theophrasto libro nono de plantarum historia, monebimus hîdem notis, omnibus idem hoc Papauer, & his uerbis describi. *ἡ τῆρα δὲ μέγαν φοῖτον καλονμένην. παραμοία κίχρηται ἀγρία διὰ τὴν ἰσθίται. ἐν ταῖς ἀρούραις δὲ φέται, καὶ μέγιστα ἐν ταῖς κριθαῖς. ἄνθος δὲ ἔχει ἱερνθρόν, καυδὶάν δὲ ὅσον ὄνυχά τοῦ δακτύλου. συλλέγεται δὲ πρὸ τοῦ θρίσμου τῶν κριθῶν ὑμχλωροτέρα δὲ μάλλον.* Quorū sit sensus. Alterum uero Papauer, quod Rhœada uocant, syluestri Cichorio simile est: eamq; ob causam comeditur. Nascitur in aruis, maximeq; inter hordea. Florem habet rubentem: uasculum quantitate unguis digiti. Colligitur ante demessum hordeum uiridior adhuc. Non potest Theophrasti historia hac aptius quicquam ad hanc rem excogitari. Cur autem Græci Rhœada Papauer hoc nominauerint, causam hic attulit: Quia protinus folia illi decidunt, non plantæ, sed floris. Nihil enim minus hoc flore tenax est: & ἀπὸ τοῦ ρύν, quod est fluere, *φοῖδρα* Papauer hoc dictum fuit. Latini, ut hic inquit, Papaueralida diminutiua in græcis forma appellauerunt. Sed hæc posterior uox est, & in latino nomine a græcis formata. Plinius erraticum Papauer uocauit, eadem ratione qua cætera in plantis erratica a latinis dicta fuerunt, sponte sua passim, incultisq; locis, & nullo humano opere nascencia. In comparatione foliorum deinde, credimus abundare insertas imprudenter ab aliquo plantas aliquas. Theophrastus enim syluestri tantum Cichorio comparauit.

De Papauere satiuo.

CAP. LXVIII.

Papauer satiuum aliqui Chamaesylen, alij Oxytonon appellant, Romani Papauer, Aegyptij Nanti. E satiuo genere, quoddam hortensium est, cuius semen in panem densatur, qui sanis in usu sit. Eo bet longum, & semen candidum. Syluestre uero, caput insidens, demissumq; & nigrum semen. Quod Pithitis nominatur. Nonnullis tamen & ipsum Rhœas dicitur, quoniā eius scapo lacteus succus emanat. Tertium magis syluestre, & ad medicinas ualentius, multo his longius, productiore capitulo. Omnium in commune natura refrigeratrix. Quare si capita ipsa, & folia decoquantur in aqua, somnum totum conciliabunt. Bibitur decoctum contra uigilias. Calyces cum polenta triti, & cataplasmatibus ammistis, ignibus sacris, & inflammationibus prosunt. Tunduntur quoq; uirides, & digeruntur in pastillos, qui siccati ad usum reconduntur. Capita quoq; in aqua coquuntur ad dimidias, iterumq; adiecto melle, dum humor cōeat in eclegmatis lentorem. Id medicamentum in tussi, arteriæ fluctationibus, & coeliacorum affectu, doloris leuamentum præbet. Efficacius tamen redditur, addito Hypocystidis succo, & Acaçia. Papaueris nigri semen tritum cum uino bibitur contra citam alui, & foeminarum profluuiā. In peruigilijs fronti, temporibusq; illinitur, ex aqua. Opium eius magis refrigerat, inspissat, siccaturq;. Sumptum Erui magnitudine, dolorem finit, concoquit, & somnum allicit. Tussi atq; coeliacorum ualitudini auxiliatur. Verum si copiosius hauriatur, nocet, cum lethargicos efficiens interimat. Ad dolores capitis, cum rosaceo perfusum efficax est. Aurium dolori, cum amygdalino, myrrha & croco instillatur. Inflammationibus oculorum cum torrefacto oui luteo proficit. Igni sacro, & uulneribus cum aceto, podagris cum lacte mulierum.

eris, & croco. Somnum accersit, subditum sedi pro Balatio. Optimū ha-
 betur graue, & densum, gustu amarum, odoratu soporiferū, quod facile
 aqua diluitur, læue, candidum, neq; asperum, neq; grumofum, quod in-
 ter colandum non ut cæra cōeat, & in sole diffundatur. Dein ad motū lu-
 cernis non atra luceat flamma, extinctum deniq; odoris uim conseruet.
 Sed Opion glaucio, gummi, aut syluestris lactucæ succo, adulterant. Ve-
 rum glaucio fucatum in dilutione croci colorem reddit: lactucaceo succo
 fictum exiliter spirat, & asperius spectatur. Gūmi uitiatum, splendescit,
 & infirmū est. Nec desunt qui eo dementiæ deuenerint, ut adipem ei ad-
 miscerent. Fictili nouo torretur, ad oculorum medicamenta, dum mollis
 us, atq; rufius appareat. Diagoras, ut Erasistratus author est, usum eius
 damnavit, oculorū lippitudinibus, & aurium uitij infundi uetans: quo-
 niam uisus aciem hebetaret, & soporem gigneret. Addidit Andreas, illi-
 tos eo, protinus excæcari, si non adulteraretur. Mnesidemus usum dum-
 taxat olfactandi probauit, quoniam ad conciliandum somnum conueni-
 ret: alioqui nobis, ut noxiū interdicit. Quæ cōmenticia esse, experimen-
 to deprehenduntur. Siquidem effectus uiriū huiusce medicamenti, fident
 faciunt. Quare non alienum fuerit scriptis mandare, quo nam modo is
 excipiat succus. Aliqui capita ipsa & folia tundunt, & prælo expri-
 munt, terentesq; in mortario, digerunt in pastillos. Id Meconium uoca-
 tur multum Opio ignauius. Porro Opij faciundi ratio hæc est. Cum ros
 in eo exaruerit, cultro circumdante asterisco, ne penitus adigatur, ex ob-
 liquo in rectum summam cutem incidere oportet, lachrymam excun-
 tem, digito in concham abstergere. Nec multo post redire, ut concreta
 inueniatur. Etenim quæ tum, aut postero die etiam offenditur, in uetere
 pile teri debet, & in pastillos cogi. Cum tamen inciditur, retrocedendum
 est, ne uestibus succus deradatur.

B A R B A R I C O R O L L.

Satiū omne magis rotundat capita: id syluestri longū, ac pusillum, ad effectus oēs ualenti-
 us. Optimū in siccis, & ubi raro pluit. Papaueris satiui tria fecere gēa. Candidum, cuius semen
 tostum in secunda mensa, cū melle tragematis loco edebatur. Hoc, & panis rustici crustas, ouo
 affuso cōmendabat. Alterum nigrum, cuius scapo inciso lac exprimitur. Tertium Rheas, de
 quo diximus: q̄q; nisi maturuisset, edomitum existimari nullo modo posset. Galenus & Dio-
 scorides Papaueris genera sex enumerant. Rheada, Ceratitin. Aphrodes, Satiuum, siue Thy-
 lacin, & duo alia syluestria. Capite sessili unum: oblongo alterum: quæ & Rheadas uocant
 aliqui: propterea q̄ e duobus ijs quæsitum lac, scapo inciso fluat.

Differt Meconiū ab Opio, si proprie loquaris, sicut apud nos succus a lacte, qd & sapor,
 & lachryma quoq; dicitur. Succus & Meconion uocat, qui decocto, uel crudo Papauere, ut in
 cæteris exprimit. Lac uero & Opion, quod caule inciso manat e Papauere nigro, ut Diag-
 ras suadet, cum turgescit, ut lollas cum deflorescit. Incidit subent sub capite & calice: nec in alio
 genere ipsum inciditur caput. Humor hic, & herbæ cuiusq; lana excipitur: aut si exiguus est,
 ungue pollicis, aut lactucis, & postero die magis, quod inaruit passilli siccantur in umbra. Ac-
 cenditur syncerū difficiliter, et crebro extinguit. In aqua innatat nebula. Aestiuo sole sudat, et se
 diluit, donec simile recenti succo fiat. Confectum in posca cōit. Mnesides optime seruari putat,
 Hyoscyami semine adiecto. Alij in Faba. Adulterat hoc Alexandrie. Thebanū Opium celebra-
 ri ad multa uideo: p̄sertim in collyrijs duobus, q̄ Lynceus, & Proteus, ab Aegineta Paulo co-

D I O S C O R I D I S

C gnominatur. Sicut Hermolaus & Antoninus, ab Aetio, in qua non Opiū modo, sed Acacia quoq; poscit ad repercussum. Achaicū quoq; Asianūq; Opiū auctores Græci noiant.

μαλὸν κινεῖται

P De corniculato Papauere. CAP. LXIX.
Papauer, Ceratidem, id est, Corniculatum, aliqui Paralion, alij syluestre Papauer, alij Thalassion, Romani Fabulum marinum, Aphri Sisimacam uocant. Folia habet candida, hirsuta, Verbasco similia, in ambitu syluestrium Papauerum more serrata, caule non dissimili, flore luteo, calyculo Fcenogræci, in corniculorum modum inflexo. Unde nomen mutuatur. Semine Papaueris, pusillo, nigroq; radice per summa cespitum nigra, crassa. Nascitur in maritimis & asperis. Radici ea uis inest, ut in aqua decocta ad dimidias, coxendicum & iocineris affectus, potu sanet. Prodest his, qui crassa quædam, aspera, aut araneosa cum lotio reddunt. Aluum leniter purgat semen, acetabulo in aqua mulla posito. Crustas emarginant, illita ex oleo folia, floresq; Argema ac nubeculas iumentorum perunctas, abstergunt. Sunt qui Glaucium, hoc Papaueris genere facitari existimarunt, falsi quadam foliorum cognatione. Qui hoc Papauer hauserit, non alia accidet, q̃ qui Opium ebiberit. Cui eisdem succurritur auxilijs. Semen æstate dum siccum est, colligitur. Decoctum radicis bibitur cum uino, sanatq; dysenteriam.

D EX M. V E R G. C O M M.
Papauer ceratidis, siue ceraticon, hoc est, cornicularium, syluestre est, cubitali altitudine, folio Verbasci nigri, minus atro. Radice breui & corticosa. Tempestiuum mellibus. folia huic minora & tenuiora, q̃ cæteris syluestribus. Nascitur & nigro loco, & Glaucion a quibusdam appellatur, haud proprie.

V EX M. V E R G. C O M M.
Nus satis Theophrastus est, ut cornicularis Papaueris huius historiam, & tot nominum eius in græcis rationem intelligamus: qui, 9. de plantarum historia inter agrestia numeratum his uerbis descripsit. ταύτη το φύλλον ὡς φλόμιον τὸ μαλίνον ἢ πὺν δι μέλαν. τοῦ δι λευκοῦ τὸ ἴσον ὡς πυχαιόν. ἢ ἢ δι βράχια καὶ ἐπιπόλαιον ὡς καὶ πὸς καμπύλον. ὡς τὸ τῶν κινεῖται. συλλέγεται δι πυρὸς πυροτεμνίᾳ. ἀνάται δι καθαίρειν πῦρ καίαν. τὸ δι φύλλον ἄγρια πρὸς τοῖς ἀφαιρί. φύεται δι πᾶσι θάλασσιν ὡς ἂν ἢ περὶ τὴν χωρία. Quorū summa & sensus est. Huius foliū nigro Verbasco simile, minus tamen nigrum. Caulis altitudo cubitalis est. Radix breuis, & in summa terra hærens. Fructus inflexus, siliquis, quas Græci Ceratia uocant, similis. Cæpitur per messem. Aluum purgat, Pecoris albugines foliū exterit. Nascitur ad mare petrosis locis. Ex his dubitauerit merito, quæsieritq; aliquis, ceratide ne hoc Papauer a cornuū figura simpliciter, ut hic ait Græci nominauerint. An ut in Theophrasto auditur, a ceratijs, quas latini siliquas græcas dixerūt, de quibus primo uolumine actū a nobis est, quæ & ipsæ inflexæ sunt, & cornuū figura per longitudinem incuruatur? Multifacienda scriptoris huius auctoritas, aliorūq; omnium, qui eum secuti, corniculis fructū eius comparauerūt. Non spernendus etiā Theophrastus grauis auctor, & in disciplina plantarū cunctis alijs merito antefendus. Nobis in Theophrasti sententiā inclināt animus. Etsi nullū in re discrimen sit: nec si cornibus, aut ceratijs cōparauerit Papaueris huius fructū aliquis, diuersam rem ostēderit. Ambo em̃, cornuū scilicet, & ceratia in longitudine producta inflectuntur: nec siliquæ illæ aliunde, q̃ a cornibus ceratia a græcis dictæ sunt. Ex eodem Theophrasto nouerit aliquis, etiā agreste Papauer hoc recte dici, cōmuni tamē agrestibus alijs appellatione. In eorum em̃ censu est. Nec minus quoniā ad mare nascitur Paralion: Id enim ea uox significat. Quā naturæ, nataliūq; eius notā secuti Latini, Fabiolū marinum uocauerunt: quoniā ad mare nasceretur, fabaccisq; siliquis in longitudine similia uascula sua ferret. Habere hoc Dioscorides ait folia λευκά, id est, candida, Barbaris quasi qui nōν λευκά, id est, candida, sed λευκὰ, id est, tenuia legeret, folia habere tenuia id dixit. Nescimus nos, an ex fuorū codicum

lectione sic ueriter: tan potius a Plinio in ea re monitus, candorem ad tenuitatem transfulerit. Verba Plinij sunt. 10. uolumine, capite. 19. Folia minora, tenuioraq; q̄ ceteris syluestribus. Nos communem omnium quotquot uidimus græcorum codicum fidem secuti, candido colore folia eius esse diximus. Indicare id Theophrastum opinati, cum ait, folio esse hoc Papauer Verbasci nigri, sed minus illo nigro. Sentimus quidem leui argumento hoc niti. In ambigua tamē re, monuisse omnia inutile non fuerit.

¶ De spumeo Papauere. CAP. LXX.

Alterum Papaueris genus, Aphrodes, id est, Spumeū uocatur, ab alijs Heraclium, caule dodrantali, folijs admodū paruis, Radiculæ similibus, fructu inter ea candido. Nam herbula alba est, & spumea tota. Radice in summo cespite. Legitur æstate semen, cum integre adoleuit, deciditq; exiccatum. Datum acetabuli mensura in aqua mulsa, uomitione expurgat. Priuatim huiusmodi purgatio, comitialib. pdest.

BARBARI COROLL.

Papauer hoc Heracleon, siue Aphrodes, hoc est, Herculeum, & Spumosum dicitur: cuius folia herbæ Radiculæ, quam Græci Struthion uocant, similia sunt Dioscoridi, Theophrasto, q̄, ut multi censent. Et quoniam Struthion etiam passerē significat, Plinius hac parte, folijs inquit, si procul intuearis, speciem passerum representantibus. Verba porro Theophrasti hæc sunt. Papauer, inquit Heracleon φύλλον ἔχει διον σπέρμα, ὃ τὰ λίνια λευκαίνουσιν. hoc est, folium habet quæ le struthos, quo lina candefaciunt. Plinius hæc non de Radicula, ut dixi, quæ lanis demum lauiandis aptissima est, curans eas, & conferens candore molliciaq; ut tradit ipse Plinius. 19. libro, sed de passeribus intelligit. Ex ipso autem Papauere lina inquit splendorem trahunt. Quia tū Plinio contradicere non prius audeo, q̄ si possum, contempler oculis, passerum, an Radiculæ speciem Papauer illud præbeat, uerbum Græcum posuimus in latino: ut liberum esset exquiraturis arbitrium. Semen huic spumeum, Aestate tunditur in pila. Utilissimum hoc, medicamentum nobili, quod Diacodion, & Asteriacen uocant, Etenim capita Papaueris, & Codias, & Asteriscos Græci appellant. Quin & humanum caput Pœtæ interim Codian uocant, ut inquit Polylux. Fit autem huius Papaueris, aut cuiuscūq; syluestris capitibus. 126. in aquæ celestis sextarijs tribus, biduo maceratis, in eademq; decoctis. Deinde siccat, iterumq; cum melle coctis, ad dimidias partes uapore tenui, Addidere postea drachmas fenas croci, hypocistidis, turis, acaciæ, & passii cretici sextarium. Aetius Papauer hoc (ut arbitror) intelligit, cum Mecaphroditon commendat, herbam contra uiperas in potu præbens, fortasse quia uomitionibus probetur.

EX M. VERG. COM M.

Heraclium uocari Papauer hoc tantum Theophrastus eodem libro testatus est. Nec nos scimus, ab Hercule ne sic uocatum fuerit, an ex tam multis quæ toto orbe aliquando fuerunt urbes Heraclia aliqua, ad quam frequens, aut speciosum Papauer hoc nasceretur, nomen illi fecerit. Plures alij a candore & raritate spumæ, quas habet notas, Spumeum nominauerunt. Theophrasti historia de eo hæc est. ἰτίρα δὲ μίκαν ἡράκλεια καλεῖται, τὸ μὲν φύλλον ἔχουσα διονσπέρμιον ὃ τὰ δόνηα λευκαίνει, ῥίζαν δὲ λευκὴν ἐπιπέλαιον, τὸν δὲ καρπὸν λευκόν, καθαίρει ἂν τοῦτο ἢ ῥίζα, χρῶνται δὲ τινες πρὸς τοῦτο ἐπιδιδόπου ἐν μελιράτῳ. Quod est. Aliud etiam Papauer Heraclium uocatur, folium habens Struthio, id est, Lanariæ herbæ, qua lintea dealbancur, similem: Radicem candidam in superficie terræ. Fructum itidem candidum. Purgat per superna radix eius. Utuntur ea aliqui ad comitiales in mulsa aqua. Quæ non ideo dicta a nobis sunt, ut quæ parū feliciter Plinius ex Theophrasto in hoc Papauere reddidit, redargueremus: iam pridem enim a Leonicensio, & ab alijs deprehensum id est, sed ut concordem antiquorum duorum scriptorum in hac planta historiam & medicinam ostenderemus: simulq; moneremus, quæ mutata ex communi lectione a nobis fuerūt, autore Theophrasto mutata fuisse: nec illud etiam relinqueremus, accedere nos eorum iudicio, qui Plinium in descriptione Papaueris huius redarguunt, nec posse a quoq; in tam manifesta re satis defendi.

¶ De Hypocōo. CAP. LXXI.

Hypocōon, aliq̄ Hypopheō uocāt. Nascit in segetibus aruisq; folijs Rutæ, exilibus ramis. Natura eadē quæ Papaueris succo.

D I O S C O R I D I S

EX M. VERG COM M.

C DE Hypecōo sunt inter latinos Plinio omnia eadem. Nasci in segetibus enim ait Rutæ folijs, & eandem Papaueris succo naturam illi esse.

H De Apollinari, & Hyoscyamo. CAP. LXXII.
 Hyoscyamon, alij Pythonion, aliqui Dioscyamō uocant, alij Adamanta, alij Adamenon, alij Hypnoticon, alij Emmanes, alij Atomon, nonnulli Dithiambrion, Magi, Pythagoras, & Oftanes, Zecleo, Zoroastres Tiphomon, alij Raponticam, Romani Apollinarem, Aegyptij Saphtho, Ethrusci Sabulum, Galli Billinuntiam, Daci Dieli am. Frutex est caules emitens crassos, folia lata, oblonga, diuisa, nigra, hirsuta. Flores e latere caulis ordine prodeunt, tanq̃ puniceorum Cytini, scutulis septi seminum plenis, ut Papaueris. Tres eius differentiae. Vna semine nigro, floribus pene purpureis, similaceis folijs, cytinis pediculis, & spinosis. Alterius semen subflauum, ut Irionis. Flores lutei, folia & filiquae simplices. Ambo insaniam gignunt, & soporem. Ideo in communi usu damnantur. Tertium genus, ut quod mitissimum esset, medici recipere, pingue, lanuginosum, molle, candidi floris, seminibusq̃, in maritimis rudibusq̃ nascens. In cuius deficientis uicem, rufum usurpari oportet. Niger ut deterrimus, improbatur. Recenti semine, catulisq̃ folijsq̃ tussis, succus in sole exprimitur, & exiccato humore, usus ad annum usq̃ prorogatur. Nam facile corruptionem sentit. Extrahitur etiam separatim ex sicco semine, in aqua calida tuso, et obtrito. Succo autem liquamentū praestantius, & magis dolores finit. Contusa herba, addita trimestri farina, digeritur in pastillos, & reconditur. Liquamentum primum, & quod a sicco semine exemptum est, collirijs quae doloris sensum auferunt, commodissime inferi solent. Contra acutas, calidasq̃ fluctiones, dolores aurium, atq̃ uuluae mala profunt. Cum fariina autem, aut polenta, oculorum, pedum, ceterarumq̃ partium inflammationes placant. Semen eadem praebet. Tussi, destillationibus, oculorum fluctioni, & doloribus, efficax. Contra mensium abundantiam, & erumpentem aliunde sanguinem, oboli pondere cum Papaueris semine & aqua mulsa bibitur. Podagris subuenit, testibus inflatis, matrisq̃ tumentibus a partu, tritum ex uino illinitur. Alijs quoq̃ cataplasmatibus, quae doloris leuamentum praestant, ammisceri solet. Folia omnibus medicamentis dolorem sedantibus, per sese, & ex polenta, utilissime imponuntur. Recentia, ad mitigandos omne genus dolores, oblinuntur. Cum uino ter quaterne pota, sanant algidas febres, quas Hepialos uocant. Cocta olerum modo folia, si acetabuli mensura manduntur, mercurio insaniam gignunt. Idem efficere tradunt, si colo ulcus sentiente infundantur. Radice in aceto decocta, dentes in dolore colluuntur.

BARBARIOROLL.

Alter Dioscorides (ut Galenus inquit) Hyoscyamon apud Hippocratem uidetur interpre-

ratus, id quod ille *κνᾶμος κάρπρον*, hoc est, fabæ semen appellauit. Hyofcyamon uero Græci ut dentur appellasse, hoc est, fabam suillam, propterea, quod, ut Hælianus ait, pastu eius herbæ, resoluuntur & conuellantur apri. Sed remediū nouere. Aquas enim statim adeūt, et cancos uenant, atque ita protinus saluti restituntur.

EX M. VERG. COMM.

Hæc est Hyofcyamos illa, contra cuius maleficium hic ipse scriptor pluribus remedijs. 6. uolumine pugnabit. In qua non male damnauerit aliquis naturam, quæ humanæ menti noxiā, & in furorem homines agentem herbam, tam sagaci artificio, contra cœli iniurias omnes munierit & ornauerit. Nec minus etiam demirabitur gentes, quæ tam multis, tamque honestis appellationibus, optabilem ignaris & admirabilem fecerint plantā, quæ alioquin ob eam quæ diximus causam, ableganda ultra Sauromatas fuerat & glaciale Oceanum: ut aliosis locis illic nascens, ante maturum semen tota aliquando periret. Nisi forte contra uota hæc nostra intulerit aliquis, tam grauem noxam non minore bono eam rependere: optandamque in orbe nostro plantam, quæ tam efficax remedio contra dolores, quibus tota aliquando perit uita hominis, pugnet. Nec quia menti noceat, ideo doloris lenimenta quæ habet, abijcienda. Parum sapienter enim, quia malo coniunctum sit bonum, ex altero utrumque damnatur: cum liceat districte in diuersa contrarijs malo prudenter carere, bono autem feliciter uti. Quod in Apollinari herba, præsertim faciendum. Quam Græci Hyofcyamon, id est, suum Fabam ideo uocauerunt, quod ut in historia sua retulit Helianus, pastu eius conuellantur sues, præsentis mortis periculo, nisi copiosa aqua statim se foris & intus proluerint. Alij, ut fit, in desiderio salutis, & suauiore uoluptatis sensu, cum ope eius a dolore ad indolentiam quasi diuino quodam beneficio restituti fuissent, non ultra Hyofcyamum a suis, sed a Ioue Dyofcyamum, id est, Iouis Fabam dixerunt. Vbi eadem nominis ratione illi etiam sunt, qui a medicinæ autore deo Apolline, Apollinarem herbam, & Phythonion eam dixerunt. Phœbeum enim & illud a Pythone nomen est. Fuerunt contra, quæ a maleficio eius Emmanes, id est, in insaniam & furorem agentem eam nominauerint: & a somno quem facit Hipnoricon, Somnificum enim ea uox significat.

De Psyllio.

CAP. LXXIII.

Psyllion aliqui Cataphysin, alij Cyncephalion, alij Chrystalion, alij Cynomyam, alij Psyllerin, alij Sicelioticon, Siculi Comidijn, Romani hærbam Pulicarem, aut Silbacium. Aphri Vargugum appellant. Folijs Coronopo non dissimilibus, hirsutis, longioribus, sarmentosa in totum hærbula, ramis dodrantalibus. Coma a medio caule exoritur, duobus tribusue conuolutis in cacumine capitulis, semine duro, nigro, pulicum simili. Vnde & nomen. In aruis et incultis nascitur. Vis ei ad refrigerandum, inspissandum, & molliendum conueniens. Articuli morbis, parotidibus, tuberculis, tumoribus, uulsis, illitum auxiliatur. Imponitur in dolore capitis, cum Rosaceo, aqua, aut aceto. Enterocelis infantium, & prominenti umbilico, illitum ex aceto, medetur. Teritur acetabuli mensura, & in aquæ sextario madefactum, ubi concreuit aqua, illinitur. Siquidem uehementer refrigerat, & in ferpentem aquam deicctum, calorem reprimat. Contra ignes sacros efficax est. Facilis est, si uirens domum importetur, non sinere in ea pulices gigni. Cum adipe tusum, sordida ulcera, & quæ cacœthe uocantur, expurgat. Succus uermiculosis auribus, aut fluctione laborantibus, ex melle prodest.

BARBARI COROLL.

Psyllium, radice tenui, superuacua, sarmentosum, fabæ granis in cacuminibus, flores canino capiti, ut Plinius non dissimiles, ob id Cyncephalion uocatur, & Cynoides. Corrigendū enim locum in Plinio putamus, ubi non floribus, sed folijs canino capiti similibus describitur.

R ij

Pli. li. 26. ca. 10
& s.

Cur. Alioquin in exemplaribus manu scriptis, floribus, non folijs. Semen in baccis effigie pulicis; unde nomen. Prouenit in uitarijs. Mendosum & illa quoque parte Plinium exilimo, cum dicit, Psyllibus lacteum succum esse, qui densatus in gummi, & sumptus cum melle, uomitiones faciat, praefertimque bilem trahat. Quid enim sint Psylles, non comperi.

E X M. V E R G. C O M M.

Reuocanda in hunc locum quae superiore uolumine de Conyza constituta fuerunt. Catendumque legentibus, quoniam duae Pulicares herbae in hoc opere nobis sunt, ne difficili utriusque intellectu, earum simul nomina misceantur. Illa enim Conyza Pulicaris, haec simpliciter Pulicaris dici tunc iussa est. Cur autem diuersas eodem indicauerimus nomine, non leuis fecit causa. Non poterat huic ex graeci nominis ratione nota haec deesse. Graeci enim a Psyllis, quae pulices in ea gente sunt, Psyllion, id est, Pulicarem uocauerunt. Non poterat graeca uox etiam aliter uerti. In illa cogebat omnium haecenus scriptorum consensus, qui Pulicarem eam in commentarijs suis passim uocauerant, a pulicibus pariter indicare. Accedebat deinde his, quod utraque causam aliquam cur sic uocari posset ostendebat. Illa, quod haerentes sibi pulices enecat. Haec, quod semine, ut Plinius ait, puliceo est: & si uerum sit quod hic ait, uiridem in domum illatam pulicem generationem prohibere. Descripsit hanc Pulicarem Plinius lib. 27. cap. 9. Pluresque & ille ex adiectis his appellationibus numerauit, Crystalion, Sicelicon, Cynomyam, & Cynoides. Quarum aliquae non satis certam modo causam habent; aliquae a uiribus notis; eius factae sunt. Qualis Crystalion est, qua indicantur qui ea usi sunt crassescendi densandique uim quam ea habet. Crystallum enim glaciem graeci uocant: quae in lapidis duriciem concreta, densataque frigore aqua est. Illi simile aliquid Pulicaris huius herbae liquor habet, ut ex eius in scriptore hoc historia, & ex Plinio patet. Retulit idem Plinius, folijs cantno capiti (modo integer locus ille sit) non dissimilibus esse: contra quod hic, qui Cornicis pedi herbae comparauit. Quo fit, ut uiridum in Plinio suspicemur. Nec tamen habemus unde Cynocephalum, & Cynomyiam, in quibus uocibus ex ca ne aliquid est, dictam fuisse significemus. Sicelicam deinde a Sicilia uocatam, cognoscere facile est. Sarmetosam, quam hic *χερσόλιον* Plinius esse dixit. Nos Feni modo foliosam furculosamque potius diximus: longo intervallo distare latinorum sarmenta, a graecorum *χερσος* scientes: qua uoce illi significant omnes quae ad Fenum in pratis nascuntur herbas. In uiribus eius etiam non parum uariant antiqui scriptores. Hic mollire, adstringere & refrigerare eam dixit. Plinius illi ad refrigerandum & discutiendum ingentem uim assignauit. **P A V L V S A E-**gineta in secundo ordine refrigerare, & praeter id medias habere, in siccando & humando uires testatus est. Quae quoniam non sunt omnibus eadem, signare legentibus placuit. Quemadmodum, & quo loco corruptae, nec bene respondentis lectionis notam adiecinus, legentes monemus: uideri nobis, quod & Plinius indicat, praecipui a scriptore hoc, contra capitis dolores ex aceto, aquaue, aut rosaceo fronti temporibusque imponi semen. Mox in alijs affectionibus, nestinorum ramicibus uerbi causa, aut procidentibus umbilicis habendum in duabus aquae hemiuis tritum idem semen: & cum aquam, ueluti in gelu & glaciem densauerit, quod ut eius fore intelligendum est, tunc concreto seminis eius diluto illo antedicta uitia inungere. Sed parum certus in scriptore hoc sensus hic est. Cui etiam in antiquioribus & melioribus graecis deest quod ultimum in hoc capite, & ab eo loco legitur, Eadem in feruentem aquam dimissa, &c.

D De Hortensi Solano. **C A P. LXXIII.**

ερσος καπνισ

Hortensium, seu urbanum Strychnon, Romani Solanum uocant, alij Cacabulum, Aegyptij Allelo, Galli Scubulum, Aphri Astrismunim. Frutex cibus idoneus, exilis, pusillus, multis concauis, folio nigro, maiore quam Ocimi, & latiore, fructu rotundo, uiridi, qui post maturitatem nigricat, aut fuluescit. Haerba innocentis gustus. Natura ei refrigerandi. Quare folia ulceribus quae serpunt, & ignibus sacris, conuenienter cum polline polentae illinunt. Aegilopia, capitibusque dolores, trita & imposita sanant. Aestuanti stomacho auxiliantur. Parotidas, cum sale detrita illitu discutiunt. Valet succus eius aduersus ignem sacrum, atque ulcera quae serpunt, cum cerussa, rosaceo & argenti spiritu.

ma, ad agilopas cum pane, infantium adustioni, quam Syriāsim uocāt, **A** cum rosaceo perfusus proficit. In colyrijs, aque uel oui uicem exhibet, contra acutas fluctiones, suffusionesq;. Aurium dolori instillatus prodest. Mensium abundantia sistit, in uellere subditus. Succus fuluo galinarum in domibus oberuantium fimo subactus, & linteo appositus, agilopijs praesentaneo est remedio.

BARBARI COROLL.

Strychnon, siue ut Galenus Trychnon, satium, quod & melan, hoc est, nigrum cognominant, a nostris Solanum dicitur, familiare cibis, in Aegypto maxime. Nihil mali corporibus esse praedicat Xenocrates, cui hoc salutare non sit. Flos huic est candidus, acini, siue poma potius herbacea, & quadamtenus aculeata, in quibus semen. Hoc Romae uidimus in horto oratoris Galli.

Pli. li. 21. ca. 31

EX M. VERG COMM.

Vesicarias in Theophrasti plantis Gaza Strychnos duas appellauit: sopores alteram, furores facientem alteram: quae huic scriptori in quatuor eius generibus postremae sunt. Videturque ex Plinio uolumine. 21. cap. 11. comune id nomen omnibus fecisse: cum tamē Plinius secundum eius genus tantum cognomento Halicacabum, Vesicariam uocet: causamque afferat, quod uesicae & calculis prosit: in qua uis subscribentem sibi habet hunc scriptorem, qui *δυσιπνόν* ait Strychnon eum esse. Verumtamen dubitari facile potest, an alia nominis eius causa quondam fuerit, qualis in eo mox a nobis dicitur. Vesicarias, ut praemonstratum est, Strychnos omnes ille dixit. Celsus contra, ultimo secundi libri capite, cum numeraret quae reprimunt simul & refrigerant, post multa his uerbis Solanum Strychnum uocauit. Sifer, apium, solanum, quam Strychnum graeci uocant, hanc intelligens, cui & a Dioscoride praecipua in refrigerando uis assignatur. Nosque latine rei antiquum autorem secuti, Solanum, non uesicariam Strychnum hortense, siue satium diximus, quae nigris folijs & in extrema maturitate nigro semine ab hoc & ab alijs describitur, pingui cultoque solo proueniens: cuius nostra aetate nullus in cibis usus est: & si hic hortense, satium, edendo esse & in cibo innocens dicat. Quibus conijcere aliquis merito possit, fuisse quondam in sanitate aliquem eius usum. Solani huius. 9. de plantarum historia Theophrastus duo tantum facit genera, *πνόςλη καὶ μακρόν*, id est, quod soporem, & quod furorem gignit. Suntque de utroque multa ab eo dicta, quae suis locis ex eius historia a nobis repetentur. Ceteri omnes, autore ut nos credimus Dioscoride, quatuor Strychnos deinceps numerauerunt, Satium, hortensemque hunc, & cibarium: quem omnes nigrum a colore fructus uocauerunt. Mox Halicacabum cognomento, quem priuatim nos Vesicariam a Plinio uocari credimus, rubente fructu, utraque acini figura. Tertium somnificum, quem fruticosum describunt. Postremo insaniam facientem: diuersis in medicina etiam uiribus, quae ab hoc scriptore statim patebunt. Obseruauimusque nos, ad refrigerandum praeterque usum Solani fuisse, & ex tam multis eius generibus Hortense ad eum usum maxime probasse antiquos. Ceteris enim maleficij periculum magis quam remedium inest. Facilis cognitu herba, nuncque deceptura incautos, si quas habent totius generis discretas folijs, fructu, coloreque notas diligentius obseruauerint. Vt ut hortensis huius Solani succo Paulus Aegineta in primo ad refrigerandos in infantibus capitis ardores, quos Graeci Syriāsim uocauerunt.

B

De Vesicaria.

CAP. LXXV.

Est & aliud Solanum, quod peculiari nomine Halicacabō, id est, Vesicariam, aut Physalida uocant, folijs antedicto latioribus. Cuius caules posteaque adoleuerunt, humi prosternuntur, folliculis orbiculatis, fuluo intus acino, uesiculis simili, rotundo, leui. Quo coronarij uentuntur, & corollas facitiant. Vim usumque hortensij Solani habet. Verum cibis nequaquam expetitur. Regium morbum purgat, semine potio. Et urinam pellit. Ex utraque herba succus extrahitur, qui siccatus in umbra reconditur, ad eadem ualens.

πνόςλη καὶ μακρόν
βού

R iij

D I O S C O R I D I S

C BARBARI COROLL.

Strychnon Halicacabon folijs Ocimi describitur a Plinio, commendatum quidem & hoc ab aliquibus, licet hortense præferatur, Radicem Halicacabi bibunt, qui sunt uaticinandi callentes, qui furere ad confirmandam superstitionem aspici se uolunt. Aspidum naturæ in tæsum aduersa hæc herba est, ut radice propius admota, soporentur.

E X M. V E R G. C O M M.

Coronaria, quod hic, & Plinius testantur Vesficaria hæc quondam herba fuit. Damnarunt tamen ambo eius in cibis usum, nec ad coronas amasse ueteres aliud in ea uidentur, q̃ uellicas, folliculosq̃ illos qui per ambitum capitis ex coronis pendentes, grato spectaculo ruberent, turbinati, grandeq̃, & Iliaci sistri, ex quo crepitacula pendeant, imaginē reddentes. Nascitur Vesficaria hæc multa in uineis, in Italia herba uerius q̃ frutex: p̃fertq̃ Veslicas illas Septēbri mense colore primū uiridi, mox paulatim rubescēte, turbinatas ut Plinius ait: semen Ciceris magnitudinē intra se claudentes, rubro colore, nec nisi extremo Autumno maturefcens: in nullo nostra ætate honore, aut usu. Vesficariāq̃ nos credimus a uellicis his potius, q̃ quia proficit uellicē. Et si Plinius id testē dictū fuisse, in τῶν φασῶν, etenim ex uellicis folliculisq̃ his factum illi nomē est. Nec aliē herbā inuentibus uidebitur: tam similes animalium uellicis folliculi illi sunt.

De Solano somnifero. C A P. LXXVI.

σπύχων ὀπινύτι-
κός

Spellant, alij Strychnon, alij Manicon, alij Dorycnion, alij Calliada, Romani Apollinarem minorem, alij Vlticanam hærbam, aut Opfaginem, Daci Cycolidē, Pœni Cacabum. Fruticat multis ramis, densis, lignosis, fractu contumacibus, pinguium foliorum, Cotoneāq̃ malī similitū, plenis, flore grandī, rubro, fructu in folliculis crocato, radice longa, subrubro cortice uestita. Nascitur in saxis non procul a mari. Radicis cortex, in uino drachmæ pondere potus, somnificam uim habet, Opio mitiorem. Semen uehementer urinam cit. Corymbi duodecim, hydropicis dantur. Si quid numero adiiciatur, alienationem mentis faciunt. Remedio est aqua copiosa mulsa, potui data. Succus pastillis inferitur, & medicamentis quæ doloris leuamentum præbent. Decoctus in uino, si in ore contineatur, dentium doloribus auxiliatur. Radicis succus, cum melle illitus, oculorum hebetudines tollit.

The. li. 7. ca. 14

B A R B A R I C O R O L L.

Strychnon Hypnoticon, id est, soporiferum, ab alijs Morion, ab alijs Moly appellatum, Coronarijs in Aegypto expetitur, inuitante similitudine florum Hederæ. Velocius hoc ad mortem q̃ Opium. Inuenio & Strychnen, & Eubepaton, & Callion uocatam: nostri Vesficariam, a folliculis, uel quia uellicæ proficit & calculis. Theodorus omnes Strychnos Vesficarias appellat. Radix huius sanguinis modo rubra Theophrasto candida, cum inarescit. Semen coccineis, folia mali Coronei, Lactucæ caprinæ: sed hirsuta, magno cespite, in rupibus sepulchretisq̃ nascitur. Genus hoc Dioscorides libro primo Alicacabū uocauit. Eademq̃ ad uerbū fere scripsit, quæ nunc in soporifero leguntur. Sed Alicacabus tamen uera est, quæ proximo capitē superius descripta est, ut Galenus inquit. Laudat hoc a loco* ad fruendū, & Tamarisfo.

σπύχων ὀπινύτι-
κός

De Manico Solano. C A P. LXXVII.

Strychnon, siue Solanum Manicon, aliqui Persion, alij Thryon appellauere, alij Andron, alij Pentadryon, alij Enoron, quidam Orthogyon. Huic folium Erucæ simile, maius aliquanto, satis ad spinam, quam pæderota uocant, accedens. Caules a radice eximios emittit, decem aut duodecim ulnarum altitudine adolēcentes, caput: in

acumine Oliua maius, & latius, & ut Platani pillula, hirsutius. Flo- **A**
rem nigrum. Postq̃ eo exuitur, racemus exit rotundus, niger, denis,
aut duodenis acinis constans, similibus Hederae corymbis, ut uuae mol-
libus. Radice firmatur candida, crassa, caua, cubitali. Gignitur in mon-
tibus uento perflatis, maritimis foueis, & uagis. Radix drachmae uni-
us pondere pota ex uino, facit species uanas, imaginesq; non iniucun-
das obuersari. Sed duplicatus hic modus, ad treis usq; dies, mentis alie-
nationem affert. Triplicatus, interimit. Remedio est aqua mulsa copio-
sius pota, & uomitione reiecta.

B A R B A R I C O R O L L.

Strychnon Manicon, insaniosa herba: qua & Doryon, siue potius Dorycnion uocatur: quae
cuspidem in plijs eo tingentem, passim nascente. Alij Perisson appellabant. folijs Erucae masculu-
lum, capite Gethyi maiore pilosioresq; ut Theophrastus scribit, qui hoc edant uideri sibi pul-
cherrimos affirmas. Hoc & coronarijs placebat. Erythron dicebat, & Neurita qui nequiter oc-
cultabat, ut inquit Plinius. Frutex est furculosus uerius q̃ herba, ut Plinius tradit: folliculis ma-
gnis, latisq; ac turbinatis, grandi intus acino: qui maturefcit Nouembri mense.

De Dorycnio.

CAP. LXXVIII.

Dorycnion Crataeas Halicacabon, aut Caleam uocat. Frutex **Δορυκνιον**
Oleae nuper prodeunti similis. Nascitur in petris non procul a
mari, ramis cubito minoribus, folijs Oleae similibus colore, minuscu-
lis, firmioribus, praeter modum scabris, flore candido, siliquis in cacu-
mine ceu Ciceris, densis, rotundis, quinque intus, aut senis seminibus, **Bl**
exigui Erui magnitudine, lauibis, firmis, uersicoloribus. Radix ad
digiti crassitudinem & cubiti longitudinem adolescit. Id somniferum esse
se constat. Copiosius haustum mortem adfert. Nec defuere, qui dice-
rent, semen in amatoria expeti.

B A R B A R I C O R O L L.

Dorycnion, siue Dorychnidiō, tam per, c, q̃ per, ch, etiā pro Strychno Manico acceptū a
quibusdā ueteribus inuenio. Dioscorides & Galenus, uidentur aliud ab eo genus existimasse.
Dicitur fortasse ita, q̃ cuspidem telorū inficere mos esset illo, ut in Manico Strychno diximus.
Dorycnio gustus lactis est, & con fracto emanat.

De Mandragora.

CAP. LXXIX.

Mandragorā aliqui Circeum, alij Xeranthēs, aliqui Antimnion, **μανδραγόρας**
aut Antimion, alij Bombochylon, nonnulli Minon, Aegyptij
Apemum, Pythagoras Anthropomorphon, alij Aloeten, alij Thrida-
ciam, alij Cammaron, Zoroastres Diamonon, aut Archinen, Magi He-
mionos, aliqui Gonogeonas, Romani Caninū malum, alij Terrestre ma-
lum, quidam Antimelon, nonnulli Dircaam, alij Circaam uocant, quo-
ntam uideatur radix ad amatoria conducere. Duo eius genera. Niger,
quae foemina existimatur, Thridacias appellatur, angustioribus folijs, ac
minoribus q̃ Lactucae, graueolentibus, in terra sparsis. Mala gerit luteis
ouorum similia, pallida, odorata: in quibus semen ueluti pyrorum.
Radicibus inhaeret binis, ternisue, inter se conuolutis, nigris foris, in
R. iij

D I O S C O R I D I S

C tus albis, carnofis, ingētibus. Verum is Mandragoras caule uiduus est. Alter candidus, qui mas dicitur, nonnullis Norion uocitatus. Huius folia magna, alba, lata, læuia ut Betæ. Mala q̄p alterius duplo maiora, colore in crocum inclinante, iucunde cum grauitate quadam olentia. Horum pomorum cibo, aliquantum opiliones soporantur. Radix alterius similis, maior, & candidior, orbata caule. Succus fit e cortice recentis radicis tuso, & prælis subiecto, qui terendo coactus, fictili reconditur. Malis quoq̄ succus depromitur, sed aliquanto ignauior. Delibratur radix, & traiectus lino cortex, ad usum suspenditur. Aliqui radices in uino ad tertias coquunt, & defæcatum ius feruant. Cyathosq̄ uno utuntur, in peruigilijs, & doloribus, & ante sectiones, uisionesq̄, ne sentiantur. Succus duobus obolis ex mulso potus, ut Veratrum, per uomitiones bilem atram, pituitamq̄ extrahit. Verum potu largiore, uita adimitur. Medicamentis ocularibus, & his quæ dolores finiunt, pellis quoq̄ emollientibus, ammiscetur. Semioboli pondere inditus, menses & parus expellit. Subditus pro Balano, somnificus est. Radix ebur emolliare fertur, quæ senis horis cum eo decocta sit, & ad accipiendam quam effingere optaueris formam, ipsum facile præstat. Folia recentia conuenienter oculorum inflammationibus, & collectionibus, quas ulcera citarunt, cum polenta illinuntur. Duricias omneis, suppuraciones, strumas, & tubercula discutunt. Stigmata sine exulceratione desunt, si quinis senisue diebus sensim perfricentur. Folia seruantur in murijs, eosdem ad usus. Trita radix ignibus sacris ex aceto, & serpentium icibus ex melle aut oleo medetur. Strumas atq̄ tubercula, cum aqua dissipat. Articulorum cruciatus, cum polenta sedat. Fit citra coctionem uinum e cortice radicis ad hunc modum. Ternæ minæ in uini dulcis metretam coniunguntur. Dantur ex eo terni cyathi, ijs qui secari, aut amburi debent, ut ante dictum est. Siquidem nullo tunc afficiuntur dolore. Sed ueterno quodam pressu, torpescunt. Mala soporem afferunt olfactu, & etiam si mandantur. Item expressus ex eis succus. Nimio tamen odore percussi, obmutescunt. Semen malorum potum uulvas purgat, appositumq̄ cum sulphure ignem non experto. Rubra sceminarum profluuia sistit. Scarificatis multiphariam radicibus, erumpens lachryma, cauo uase recipitur. Est autem lachryma lacteo succo efficacior. Sed non ubiq̄, ut experientia docet, radices lacteum succum delachrymant. Alium tradunt esse Mandragoram nomine Morion, in opacis iuxta specus enatum, folijs albi Mandragoræ, minoribus, albis, dodrantalibus, in orbem circum radicem. Quæ mollis est & candida, paulo maior palmo, pollicemq̄ crassitudine æquat. Tradunt eam in pane, ossa, obsonioque drachmæ pondere deuoratam, non memoriam modo, sed usum quoq̄ rationis intercipere.

Obdormiscit enim homo, eo fere quo comederit habitu, sensus impos, A
ternis quaternisque ex quo data est horis. Hac medici utuntur, cum scin-
dendi, urendique necessitas adest. Antidotum esse uolunt radicem cum
Manico Solano potam.

B A R B A R I C O R O L L.

M Andragoræ fructus niger, sapore quodam uini, effigie oui: non ut Theodorus putat, race
ini *βασανιουδιος*, aut *βερνιδιος*, pro eo quod erat *ωουδιος* in Theophrasto legens. Fœminæ folia
hirsuta, radices carnosæ, teneræ, cubitales fere. Mala hæc fert Auellanarum nucum magnitudine.
Mas Arsen, & Hypoplomon quoque dictus, folio latiore, ut Lapathi satiuæ. Cauent effossuri
contrariū uentū, tribus circulis ante gladio circūscribentes, ad occasumque spectantes. Succus
non ubique inuenitur, sed ubi potest. Circa uindemias queritur. Odor grauis eius, sed radices & ma-
li grauior. Succū excipiunt deciso caulibus cacumine. Adeo caulē habere non dubitant, etiam si
Dioscorides id negat. Hic & hirsutus fœminæ tribuit. Foliorum succus Roscidorum pestis est, ut
ingit Plinius. Mandagorā conclamati frigoris uenenū esse, nemo non scit. Inuenio herbæ no-
men Andraclon, a similitudine uirili dictæ. An eadē hæc sit cum Mandragora, nō legi. Sed est
cur esse sentiat: quippe cum & Anthropomorphon dicat. Nisi quis Andraclon, quia frangat, &
occidat hominē, dictam putarit: cuiusmodi uim multæ habent herbæ. Nam & annus uitæ. 63.
ut est apud Maternū, Andracles uideatur appellatus: quia duplici ratione climatericus sit, & maxie
frangat hoies. Alioquin ab hois effigie Andricelon potius, quæ Andraclon dici potuisset. In quo &
illud notandū, Andricelon apud Græcos, ut Aristoteles, & Iulius pollux testantur, coloris genus
est, quæ nos Purpurissimum dicimus: atque ita placuisse, Theodoro quoque nostro liquet.

Pli. li. 25. ca. 11.
Theoph. li. 9.
cap. 9. 15.

De Morio Mandragora nihil habeo quod addi possit, quæ a Dioscoride norant. Sed quo
nā mala Terrestria & Canina Mandragoræ fructus appellantur, in mentē subeunt quæ uulgo
Melenzana uocamus, hoc est, ut ipse puto, Mala insana: de quibus nihil ueteribus scriptum
fuisse, iam desino mirari, quod multa huiusmodi repio. Sicut hercle multa quondam fuere, quæ mo-
do uel ignorant, uel certe non habent. Mala ergo insana e frutice uulgarī sunt, passim nascēte,
ut melones, & cucurbitæ. Pari quoque cultu, folijs prope ficulneis, flore oblongo, specioso, can-
dido, Manditur uulgo pomū ex oleo, sale, pipere, Fungorum modo coctum.

B

E X M. V E R G. C O M M.

Q Vi Mandagoram quotidie circūferunt Agyrtæ, iactantque tanto periculo effodi huma-
na forma, ignaræ plebi eam ostendentes, ex uno (ut nos credimus) Pythagoræ no-
mine, eius Anthropomorphos mēdaci sui occasione arripuerunt. Neque enim uox illa aliud, quæ
humana forma plantæ significat. Accessit & Pythagoræ Columella, qui ex eadem ueluti no-
minū supersticiosa ostentatione, in carmine suo cecidit. Quāuis semihominis uesano gramine
facta, Mandagoræ pariat flores, mœstamque Cicutam. &c. Non desuerunt illis etiam in iactan-
da cū foditur Mandagoras religione, Theophrastus in Græcis, in Latinis uero Plinius. Quos
non puduit, in tanta rerum grauitate quas scribebant, ne quid contra cōmunem sensum dixisse
uiderentur, populares, & sine ratione ritus huiusmodi posteris tradere. Quæ autem Theo-
phrastus pro Mandagoræ fossura docuit, huiusmodi sunt. περιγράφει δὲ καὶ τὸν μανδραγόραν
ὡς τρεῖς εἶδη, τὸ μὲν δὲ πρὸς ἰατρικὴν βλεπόντα, τὸν δὲ ἕτερον κύκλῳ περιγραφίσθαι καὶ λέγειν ὅς τις αὖτε
πρὸς ἀποδοτικόν. Quorum sensus sit. Circumscribunt & Mandagoram gladio ter: secantque ad
occasum spectantes, lubent & alium saltatē tripudio circumagi: multaque de Veneris usu &
re dicere. Plinius lib. 25. cap. 11. pleraque eadem Theophrasto, & his non dissimilia quædam. Ca-
uent fossuri contrariū uentum, & tribus circulis ante gladio circūscribunt: postea fodiūt, ad oc-
casum spectantes. His auctoribus, & quasi per manus translata huiusmodi superstitione, uerissi-
mile est, uanis periculorum, religionisque, & humana forma mēdaci celebrari nūc etiā Mandra-
gorā. Cum tū id potius querendū fuerit, cur a sapiente illo Samio honestiore hominis nomi-
ne indicata fuerit. Neque enim uerisimile est, quia bina radice, & hominis crura imitante nitatur,
plerumque in terra sic dictam ab eo fuisse: trinis enim aliquando hæret, multaque alix stirpes huiusce-
modi bifida radice diuisione uidetur. Abstrusiorē ex religione, cuius ubique magnus ille auctor
erat, causam habuisse id nomē oportet. Nos illud ignoramus, relinquimusque inueniendū peri-
toribus & docendū: neque hoc tantū, sed tam multas appellationes alias, quibus Mandagorā
antiquitas indicauit, Quæ enim inter eas notiores sunt Circæon, & Thridacias, ab hoc ipso scri-

Cptore declarare, & per se satis patet. Sunt toro hoc capite aliqua per se, & quoniam non sunt nobis cum alijs eadē, legentibus aduertenda. Quale est, qd hic ait, poma Mandragoræ ouorū uitelis similia esse, a Plinio Auellanæ nucis similitudine describi, non leui inter utrāq; formā, colorēq; diuersitate. Theophrastus, s. de plantarū historia, nisi uitiū in lectione eius sit, qd suspicamur, contra utrūq; uidet de pomi huius colore, & magnitudine tradidisse. Verba eius sunt. Ἰδιον δὲ ὁ καρπὸς τοῦ μανδραγόρου. τὸ μέγεθος καὶ γὰρ ὁμοῖον καὶ οἰνωδὲς εἶναι τῷ χυμῷ. Quod est. Priuatim uero Mandragoræ fructus, quia niger, acinosusq; & sapore uinosus est. Colore nigrū, acino uis equalē, & uinoso sapore pomū Mandragoræ Theophrastus describit: Hic autē uorum uitelis, qui orbiculati sunt, cōparat: & ὥρεα, id est, pallida dicit: quā descriptionē natura magis confirmat. Discrepant non leuiter etiā hīdem auctores: q; hic utrūq; Mandragorā caule carere ait, Theophrastus contra eodem loco cum Ferulam descripsisset, subiecit. τῶν δὲ ἁλλῶν τὰ μὴ ὁμοίωτον τούτῳ τὸν κανὼν ἔχει καθάπερ ὁ μανδραγόρας καὶ τὸ κώνιον. Quorū uerborū sensus est. In reliquis aliæ quidem similiorem huic caulem ferunt, qualis Mandragoras est, & Cicuta. Plinius etiā quo diximus loco idem testatur dicens. Succus fit & e malis, & e caule deciso cacumine. Palāq; ambo hi caulem Mandragoræ tribuunt, quē Dioscorides penitus aufert. Non ausim ego inter tam graues auctores tertius ueluti arbiter censere. Sensus id faciet: poteruntq; uolentes uel a peritis audire, uel ipsi totam Mandragoræ naturā obseruare.

De Aconito.

CAP. LXXX.

ἀκόνιτον

AConitum aliqui Pardalianches, alij Cammoron, alij Thelyphoton, alij Myocitonon, alij Therophonon uocant. Folia habet Cyclamini, aut Cucumeris, tria aut quatuor, minora & subhirsuta, caulem palmo altum. Radix scorpionis caudam æmulatur, & alabastris modo splendet. Torpescit, ut fama est, scorpiones admota radice, stupentque. Qui rursum Hellebori contactu excitantur. Oculorū medicamentis leuandi doloribus gratia adijcitur. Enecat pantheras, fues, lupos, & feras omnes, in carnibus obiectum.

D

B A R B A R I C O R O L L.

Theoph. li. 9.

cap. 16.

Pli. li. 27. ca. 2.

AConiti primū genus Pardalianches, & Thelyphonon, siue potius Theriphonon cognominatur. Cæterū Theophrastus simpliciter, & sine Aconiti mentione Thelyphonon, & Scorpion, a radice similitudine uocauit, geniculatū tradens, graminis modo, locis umbrosis, & cætera quæ hic a Dioscoride tradunt. Hoc solum genus a Plinio demonstratū est, hirsuta leuiter eius folia prodendo. Vocatur & Myocitonon: quoniam e longinquo mures odore necat. Inuenio & Myephonon uocari genus herbae, quā & Sciada quidā noiant: nec quæ sit ea docent, præterq; q; Phanas in lib. de stirpibus, hæc habet uerba. Pileari forma sunt, semen Anisi, Feniculi, Coriandri, Caucalidis, Cicutæ, Pastinacæ, Sciadis, quā & Myephonon uocat. Plinius & Theophrastus, Myophonon, cui neruosus est cauliculus. Aconiti porro Theophrastus in Creta, & Zacyntho nasci maxie putant: de Lycoctono (ut arbitror) locutus. Sed optimū in Pontu circa Heracliam, ubi monstrat Hercules ad inferos aditus, quasi ex spumis cerberi canis oritur. Hoc a Thelyphono, ut testatur modo sum, disserre arbitror. Constat enim folio syluestris Intubiti: q; Aetius non Seridis (id enim significat Intubū) sed Iridis syluestris accipit. Radice nō nucis, ut Theodorus transulit, sed Gamaris marini specie: quoniam Caryas pro Caridas, uel Carabidas legisset. In quo notandum, Carabos, qui & Grapsi sunt, interim pro locustis, interim pro Gamaris a ueteribus acceptos: ut Athenæus auctor est. Carides uero Squillæ sunt, quas & Curidas, & Coridas, & Colybdenas quidā uocant. Etiam si marinū geniale, Nicanter Colybdenā putauit. Aconito sane breuis herba, nec superfluens, sed ut Frumeto. Semen ei tamen in spica non est. Nascitur ubiq; nec tantū in cauitib; nudis, quas Aconas uocant, unde Aconiti nōnulli uolunt appellatū. Alij quia in petrosis parte plurima nascenti, nullus iuxta puluis esset. Alij a pago, siue oppidulo, siue portu Peridandynorū ad Heraclia ita noiato. Alij quoniam uis eadē in mortē esset, q; cotibus ad acie ferri decutiendā, statimq; admota uelocitas sentiretur. Fructū eius & foliū nihil nocere prædicat. Vm mortiferā in radice haberi. Ad erodendā uti ea medicos: pparari uero posse, ut tollat biennio, aīo, mēlib; sex, tribus, duobus, uno (rōne etiā pitioribus occulta) miserius perire, q; potō eo diutius uitā extrahant. Differri, celerariq; sumēti

bus exitū, prout sero, aut ocus collectū fuerit. Debellari pestē eam nō alia radice, ut quidā ex prompser, sed aut uino, aut melle successu raro. Alioq̃n reperto in uisceribus ueneno, ceu parī inuēto, nō perimit, sed colluctat cum eo tantū. Ita duo uenena cōmoriunt, ut anial superfit. O- mniū porro uenenorū ocysimū esse Aconitū, ut tactis quoq̃ genitalibus foeminini sexus ani- maliū, eodem die mortē inferat, quo modo interēptas a Calphurnio bestias dormiētes uxores M. Caelius obiecit. Fugitiuos eo in uinculis uti solitos, desponso animo Aconitū seruanti- bus, instituta capitis poena. Quod autē sit herbæ genus Aconitias uocatū, non reperi. Eteū ut Athenæus inquit, grāmaticorū mos est, poētas, & auctores alios enarrantiū, cum qd huiusmo- di occurrerit, quasi cōnuendo præterire, nihil aliud testantes, q̃ aut lapidis, aut animalis, aut floris genus esse. Quo fit, ut parū fidei grāmaticis in hac eruditōis parte semper habuerim. A- conitū inuenisse prima dicitur Hecate, uenenorū insigni crudelitate foemina, quæ Persam pa- trem, Solis filium, perinde crudelissimū, ueneno sustulit, auctor Diodorus. Proptereaq̃ Oui- dius in Metamorphosi cum herbā dixit Hecateida, uidetur Aconitum accapisse.

BARBARI COROLL.

Contra Grāmaticorum omnium decreta, Poëtarumq̃ fidem, quorum illi rationem nomi- nis secuti, ἀπὸ τῶν ἀκονῶν, id est, a cautibus, in quibus nascitur Aconitum, dici passim testan- tur, hi, præsertimq̃ Naso in Transformationibus suis eecinerunt. Quæ quia nascuntur dura, uiuacia caute, Agrestes Aconita uocant. Theophrastus. 9. de plantarum historia ubiq̃ nasci Aconitum testatus est: neq̃ a cautibus, quas Græci Acōnas uocant, nomen illi factum fuisse, sed ab Aconis Periandynorum pago, qui ad Heracliam Ponti est, Aconitum uocari. Amare quidem, & nasci plerumq̃ in petrosis, non tamen a petris nomen inuenisse. Verba eius sunt, *quod diximus loco. φηται δὲ πανταχοῦ καὶ οὐκ ἐν ταῖς ἀκόναις μόνον ἀπὸ τῶν ἰχθυῶν πρὸς ποταμῶν. αὐτὰ δὲ ἐστὶ καὶ ἐν τοῖς περὶ ἀνδρῶν, φησὶ δὲ μάστιγα τοῦ περὶ ἀκόναις τόπου.* Quorum sensus ille est, quæ paulo ante diximus. Duo hic scriptor Aconiti genera eodem nomine tradit. Theophrastus tamen eodem de plantarum historia uolumine, alterum hoc quod modo docetur simpliciter nomine Thelyphoni tradidit. In his, ut uidetur Theophrasto, & huic, omnia fere eadē sunt. Discrepant tantū, q̃ hic Aconitū, ille Thelyphonō primo uocat nomine: neuter tamē manifestā nominis eius aliquā indicat causam. Quo fit, ut suspicari aliquis possit, in utroq̃ corruptā esse hanc uocem: nec Thelyphonon, quod est foeminas, sed Theriophonon, quod est, bestias enecās, quas multas in capitis sine hic numerat, legendum esse locum. Nisi quod Theophrastus ait, plantæ huius radicem genitalibus omnium quadrupedum inditam, eadem die eas enecare, de foemi- narum genitalibus intelligendum tantū sit. In quā partem inclināt animus nobis: dicente Plinio lib. 27. capite. 2. tactis quoq̃ genitalibus foeminini sexus animalium, eodem die inferre mor- tem. Quod magis adhuc miretur aliquis, sciens neq̃ in altero Aconito huiusmodi aliquid restari Theophrastum, Plinius quo diximus loco, tractata simul utriusq̃ rei historia, unū tan- tum uidetur Aconiti genus fecisse; eiusq̃ appellationes aliquot palam indicasse: Pardalianchesq̃ ab enecandis Pantheris uocari ostendisse, cum ait, Tangunt carnes Aconito, necantq̃ gustatu earum Pantheras: nisi hoc fieret, repleturas illos situs: ob id quidam Pardalianches uocauere. Thelyphonon etiam, ut diximus, quoniam foeminini sexus animalia enecet, Myo- ctonon aliq̃, ab enecandis muribus, quoniam e longinquo mures odore enecet. Cammaron, a radicis flexura, quam Carydi, id est, marinæ Squillæ similem habet, quam in historia eius hic scorpionis caudæ similem fecit, & Alabastrorum modo splendere ait.

De altero Aconito.

CAP. LXXXI.

Est & alterum Aconitum, quod aliqui Cynoctonon, aliq̃ Lycop-
non appellant, aliq̃ Cyamon leucon, Romani Colomestrum.
Huius genera sunt tria. Vnum, quo utuntur uenatores: alia duo in u-
sum suum uertere medici. E quibus tertium, quod Ponticū nominatur,
magna ex parte in Italia montibus Iustinis exilit: a priore distans, quo-
niam folia faciat effigie Platani, crebriore diuisura, longiora, & multo ni-
griora. Caulē Filicis, læuem stylum, cubitali altitudine, aut ampliorē
em. Semen in siliquis oblongis recondit. Radices in modum Squillæ
piscis scirrorum nigrescunt. Quibus ad uenationem luporum utuntur.

C Infertæ siquidem crudis carnibus, & deuorata, lupos enecant.

B A R B A R I C O R O L L.
 Huius Aconiti neq; formam, neq; medicinas Dioscorides exequitur. Librariorum (ut arbitror) culpa fuit: tria capita scribentium, cum duo tantum Aconiti summa genera dicantur, Galeno teste, Pardalianches, & Lycoctonon.

De Lycoctono, cuius species tres haberi constat, in primo Aconiti genere differui, Theophrastum & Plinium secutus. Lycoctonos dicta est, quia lupos enecat. Habent & nostri rustici ad eundem usum Lupariam uocant, folio uitis, multas habente diuisuras, & maculas candidas, flore oblongo, luteo. Aetius, Aconitum inquit sunt, qui Aconistomon, & Irin sylvestre, & Pharmaciaden uocent, radícula fere graminis.

E X M. V E R G. C O M M.

Quale Thelyphonon Aconitum descripsit Theophrastus, satis superiore capite dictum a nobis fuit, superest modo alterum hoc. Quod quale in scriptore hoc sit, parum nobis constat. Dicimus autem quale, integrum ne, an corruptum & decurtatum. Demiramur enim nihil quod ad hominis salutem, aut maleficium pertineat in eo tradi: præsertim docente multa Theophrasto de maleficio eius & remedijs, & præter Theophrastum Paulo Aegineta eadem priori uires illi decernente: priuatimq; lupos enecare, quemadmodum illud Pantheras: ideoq; Lycoctonon hoc, ut illud Pardalianches seorsum uocari: & præter hos Plinio libro. 27. capi. 7. unum tantum genus utriusq; nominibus indicat, multoq; aliter q; Theophrastus, qui. 9. de plantarum historia alterum hoc Aconitum his uerbis descripsit. Nascitur ut ferunt Aconitum in Creta, Zacynthoq;. Plurimum autem & optimum in Heraclia Ponti. Foliū habet Intibi, quod uocant Cichoriū, figura. Radicem figura coloreq; maris Squillæ similem; & in hac localem uim esse. Contraq; foliorū & feminis nullas ad mortē uires esse. Herba autē semen est non furculosæ materiæ. Breuis tamē herba ipsa, nec quicq; egregium habens, tritico similis, non tamen semen illi in spica maturescit. Non uescitur Aconito ouis, nec aliud quidpiā animal. Adiecit his alia quædam scriptor idem, quæ uolentes relinquimus: ne ultra q; opus sit legentes remoremur.

D Monemus tamē, in cognoscendis illis non fore inutile eorum laborem. Nobis em̄ satis est, pro Aconiti historia breuiter hæc signasse: ut quod paulo ante diximus, cunctis certius fieret, non cōuenire penitus in Aconitorū historia Græcos, Latinosq; antiquos scriptores. Qui tamē omnes, excepto Plinio, duo eius gēa fecerūt. Alterū quod Pardalianches a Theophrasto, Thelyphonon priuatim dictū est. Alterū, quod Lycoctonon: illud ab enecandis Pantheris, hoc a lupis. Et hæc auctore Paulo Aegineta cognomina utriusq; & notæ quondā fuerūt. Siquidem ait. ἀκόνιτον τὸ μὴ παρδαλῶδες σπικτικὸν καὶ ἀλκυονίδιον ἀνιόντως ἴσιν: ὅτε μὴ αὐτὸ οὐκ ἀπὸ τῆς φύσεως τοῦ λυκοῦς, ἀλλ' ἐκ τῆς ἀσπίδος τοῦ παρδαλῶδους. Quod est. Et Aconitū quidem cognomēto Pardalianches excedentē, & localem uim habet. Eamq; ob causam intus cauendum est. Foris tamen in carnibus, quas exedi oporteat, uti licet. Quod uero a lupis Lycoctonon dicitur, easdē priori uires habens, priuatim lupos, ut illud pantheras enecat. Et hæc pro altero Aconito hoc ex Theophrasto & alijs inuenta, & obseruata hætenus a nobis fuerunt.

¶ De Cicuta.

C A P. LXXXII.

κώκυβι

Conion aliquibus Aegynos, alijs Ethusa, alijs Apolegusa, alijs Dolia, alijs Amaurosis, alijs Paralysis, nonnullis Aphron, Quibusdam Creidion, alijs Coeten, alijs Catechomenion, alijs Abioton, alijs Absēudes, alijs Ageomoron, alijs Timoron, alijs Polyanodinos, alijs Dardanis, alijs Catapsyxis, Ostani Babathy, Aegyptijs Apemphi, Romanis Cicuta appellatur. Caulem ædit geniculatum, ut Fœniculi grandē, in cacumine ramosum, folia Ferulæ, angustiora, graui odoratu. Vmbellæ in summo prodeunt, flores quoq; albicantes, & semen Aniso candidius. Radice non alta, concaua. Cicutæ locale uenenū inest, suaq; uire frigeratoria necat. Remedio est uini meraculi potus. Succus exprimitur contulis cacuminibus, priusq; semina & comæ siccescant, qui sole densa

tur in pastillos. Præcipuus ad medendi rationem usus est aridi. Misce **A**
tur collyrijs, quæ leuandi doloris gratia temperantur. Ignēs sacros, &
ulcera quæ serpunt, illitu restinguit. Hærbæ cum coma trita, & testibus
circumlita, libidinum imaginationes in somno compescit. Sed genita-
le resoluit. Lac puerperarum mammis apposita, extinguit. In uirginita-
te mammas cœrcet, & increfcere non patitur. Pueris præstat, ut eo-
rum testiculū cibum non sentientes, intabescant. Efficacissima uis Cræ-
ticæ, Megarensi, mox Atticæ, & in Chio & Cilicia nascenti.

B A R B A R I C O R O L L.

Cicutæ Græce Coniōn, inuisa & hæc, publicæ Atheniensium pœna. Semen habet noxium.
Caulis eius uiridis: & urit plerumq; ut in Platanis. Leuis hic est, & geniculatus, ut Harundo,
nigricans, altior sæpe, binis cubitis. Hinc & spacium, quod est inter cannarū, ut Seruius exi-
stimat, genicula, Cicutā uocari à Marone. Folia Coriandri tenuiora. Semen Aniso crassius. Ra-
dice nullius usus, ut Plinio uidetur. Semini & folijs refrigeratoria uis. Quæ si enecat, incipiunt
extrema corporis algere. In uino potā, irremediabilis existimatur. Succus exprimitur folijs, flo-
ribusq; Tunc em̄ maxime tempestiuus est, & melior. Semine trito expressus, & sole densatus,
nocentior q̄ semen ipsum, ut in Thapsia: cum in reliquis contra sit, necat enim sanguinem ex-
pissando. Hæc altera uis est, & ideo sic necatorum maculæ in corporibus apparent. Ad dissol-
uenda medicamenta utuntur illo pro aqua. Fuerit autem Cicutæ herba, cuius gustatu exerci-
tus M. Antonij cum fame laboraret, pene sit extinctus in Parthia, non traditur: alioquin reme-
dium, ut Plutarchus ait, in uino tantum erat. Plinius quoq; Maxima inquit Cicutæ uis terræ
Parthorum. Mox Laconicæ, Creticæ, Asiaticæ. In Græcia uero Megaricæ, deinde Atticæ. Thra-
syas, & discipulus eius Alexias, & hanc, & cætera uenena temperabant, ita, ut sine aliqua offen-
sione, aut tæbe tollerent, in quantum uis tempus dilata morte. In Cicutæ præcipiebant, ut e Su-
sis, aut prægelidis opacisq; locis ad hunc usum reponeretur. Chij, ut Theophrastus scribit, non
tereabant eam, ut ceteri cum tegmine, sed hoc detracto, tufam & tenui cribro emissam, ex aqua
propinabant. In Ceo insula mos fuit, ut sexagenarij senes, conuocatis necessarijs, solenni sacri-
ficio Cicutam epulati, & coronati biberent. Strabo autor, ut fere in Theophrasto non Chios,
sed Cios legendum putem. Cui consuetudini se Valerius quoq; maximus secundo libro, in-
terfuisse tradit, in eius insulæ oppido Iulide. Cicutam sunt qui etiam Ephemerōn, a celeritate
interitus uocant, ut Photion autor est. Recentiores Cicutæ duo faciunt summa genera. Aqua-
ticæ, frigentis naturæ. Terrestris, calidæ. Terrestris duo item genera. Maius, et Minus. Sed quo-
niam autorem nullum proferunt idoneum, uereor ne (ut fere solent) hallucinati fuerint. Alio-
quin Cicutæ similem diximus esse Myrrhin herbam, ob id Cicutariam a nostris appellatam, ca-
lentis ingenij. Nam uerba illa Plinij, Caulis inquit Cicutæ uiridis, & urit plerumq;, ut in Plata-
nis, quia sensum nullum commodiorem habent, correximus ex Theophrasto ad hunc modum.
Caulis Cicutæ uiridis, e Susijs plerumq; Athenas perlatus. Quancq; Cicutæ uis est & illa (si Cel-
so credimus libro quinto) exedendi corpora: ut sorte seminibus & folijs frigida sit potestas, cau-
li feruida. Illud uero minus tolerabile, q̄ Mauritanij, uel eorum interpretes, illud Rutæ genus
syluestris, quod Dioscorides & Plinius Armala uocari scribunt, ipsi pro Cicutæ capiunt. Sunt
qui (quod Galenus ait tertio libro *κραιων*) Cicutam Sturno cibum, homini uenenum esse, cō-
uerterint, Hyoscyamum esse Turdo cibum, homini uenenum: quo nihil esse potest fœdus, im-
peritius, absurdus.

E X. M. V E R G. C O M M.

Avixerunt Cicutæ famam Athenienses, succo eius ad mortem in publicis & capitalibus iu-
dicij utentes. Alioquin indigna erat herba, quæ in omnium poetarum carminibus & sapienti-
um cōmentarijs inueniretur. Vulgaris, ubiq; fere nascens, & homini præcipue noxia. Sed hæc
est omnium fortunā rerum, ut aliquando ex usu gentium honorem, & quam possunt gratiam
inuenierint. Factum id tunc in Cicutæ est, quæ neglecta modo & incognita multis iacet. Muta-
tæq; leges, & pœnarum in sceleribus rationes, pecori herbam relinqui cōegerunt, quæ quondā
malo hominis fato nascebatur. Et ut testatus Theophrastus est, in quotidianos usus ex Susijs
frigidissimiq; alijs locis maiore diligentia repetebatur. Non erimus ob eam causam nos in e-
ius historia longiores. Quod enim satis sit, ab herbarijs omnibus cognoscitur, Fœniculi caule,

D I O S C O R I D I S

C folio Ferulæ, alijsq; a Dioscoride descriptis notis.

¶ De Taxo. CAP. LXXXIII.

Smilax a Græcis, Taxus a Latinis appellatur. Arbor Abietis magnitudine, & foliorum eiusdē figura. In Italia & Narbonensi Gallia Hispaniæ cōtermina nascens. Auicula quæ Italicæ Taxi baccas deuorant, denigrantur, & qui ederint easdem homines, alibi profluuiū eorū ripiuntur. Narbone tam præsentis est ueneni, ut si qui dormiāt sub ea, aut in eius umbra subsideant, lædantur, & sæpenuero moriant. Quare de Taxo hæc traduntur, ut ab ea cauamus.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 16. ca. 11.

Smilax, siue Taxus, est ubi a Theophrasto & Dioscoride Milos appellata sit, folio ætēno, extremitatibus & lateribus sinuato, ut Quercus & Paliuri, & omnino llicis, molliore tantum profundioreq;. Differt & materia ab llice, q; soluta & tenera in operibus est Taxo, præsertim in Arcadia: ubi & nigra est ac punicea. Flauet in Ida, tam similis Cedro, ut imponat mercantibus, præsertim medulla. Germen ei maxime serodinum. Floret paulo ante solstitium. Fructificata uergillarum obitu. Facillime augetur, procera, similis Abieti, minus excelsa, sed alijs erēbrioribus. Folium quoq;, ut scribit Plinius, Abietis, sed pinguius, ac minus uirens. Strigosa, tristis & dira: nullo succo, baccifera. Radices ei graciles, per summa cespitum breues. Circa Idam rara. In Macedonia et Arcadia frequentior. Rotundo fructu, et paulo ampliore q; Faba, colore ruffo, tactu molli, ueterinis locifera, non item ruminantibus. Sunt qui eum quoq; mandant suauī cibo, & innocentem prædicent. Vmbrosissimis locis prouenit. Fumus ex eo mures perimit. Mari fructus, ut Plinio uidetur, noxiū, locale quippe. Baccis, in Hispania præcipue, uenenum inest. Vasa etiam uiatoria ex ea uinis in Gallia facta, compertum est mortifera fuisse. Sunt qui Taxica hinc appellata putent, quæ nunc Toxica uocantur, quibus sagittæ tingunt in Arcadia, ueneni uel præsentissimi. Repertum innoxiam fieri, si in ipsam arborem clauus a reus adigatur. Conglutinamenta, siue subscudes, ex ea serinijs & subfellijs parantur. Nunc et arcus, & scorpiones. Nec Taxus uulgo, sed literæ prioris immutatione, Naxus, & Naxius quoq; dicitur: quod nomen & Dioscoridi fuisse cognitum uideo, ubi uenena libro sexto numerat, eodem loco, non Taxum, sed Toxum a Romanis dici credidit. Nec Thymalon, ut hic, sed Thymilon scribendum: quod & Actius quoq; sequitur. Paulus Thymion. Galenus Taxum etiam dicit. Caeton inquit, Paulus Caeton spinæ genus esse, quam Dioscorides libro sexto uocauit Axon, cuius pappi recentes, in cibo sumpti strangulant, in quibusdam exemplaribus Ixiæ nominati. Verisimile est hanc esse Caeton, de qua Theophrastus & Plinius loquuntur. Caetos inquit, Siciliæ tantum nascitur suæ proprietatis, cuius in terra serpunt caules & radice, lato folio, & spinoso, quos uocant Caetos, nec cibo desquamatos fastidiunt, gustu amariusculo. Sed & seruati sale uescendo sunt. Vnum caulem rectum habent: qui Pternix dicitur, eiusdem suauitatis, sed uetustatis impatientem. Semen ei lanuginis, quam Pappon uocat: quo detracto & cortice, teneritas cerebro Palmæ similis relinquitur. Vocant Scalam, siue ut Plinius Afcaliā. Alii bi Plinius, Sunt inquit & cæduæ Palmarum quoq; syluæ, quæ minantes, rursus ab radice succi sæ, dulcis medulla earum in cacumine, quod Acrum appellant, exemptaq; uiuunt, quod non alia. Vocantur autem Chamæriphe etiam a Theophrasto, folio latiore ac molli, ad utilia utilissimo, copiosæ in Creta, sed magis in Sicilia. Nunc uulgo Siculum Romanumq; Ciphilio nem, mercatu eius frequenti nominat. Aliqui Palmidium ab quadam Palma spadicum similitudine, ut ex quibus scopæ fiant, Margyllion Hispaniæ modo appellant credo, quia bacculas rubentes, margaritis similes ferant, Dumulos uocatas, quibus filo inmissis, seminæ supplicationes precesq; suas numerant. Plinius quodam loco, Margarides inquit Palmæ breues, candidæ, rotundæ, acinis q; balanis similliores: quare & nomina inquit a margaritis accepere. Diversum tamen genus hoc ab Hispano illo fecerim, q; in meridiano tantum orbe Margarides nascunt, et quidem una tantum eius arbore in Chora, ut idem Plinius affirmat. Iam hoc quod dixi Palmidium uocari, non Siciliæ modo peculiare, sed Aegypto, & Hispaniæ. In Italia quoq; nasci perhibent, non procul Terracina. Mirum quod traditur in Aegypto, ipsis etiam Palmarum quæ runda innasce truncis, sed minoris operis ad mandendum. In orbe reliquo duorū generum, sed eodem cespite proueniunt, mas & femina, Sexum distinguī semine, quod Pappon, ut dixi

mus appellant. Fallit hoc imprudentes, opertum cortice multiplici, tunicis ferrugineis interue-
stientibus. Cortex Folij modo in latum ex angusto panditur, & armatur aculeis. Ideoq; latū &
spinosum a Theoph. dictum est. Ex huius crassitudine in Aegypto charta mō tingitur uilis, ad
contegendas inuoluendaq; segestriū ufumerces. Ex tunicis quas intercursare diximus, in eadē
provincia, funes, rudentesq; neuntur. Caulis ipse cēduus quotannis, alioquin adolescit crassi-
tudine in tantum, ut arboris iustæ truncum æquet ambitu.

* E X. M. V E R G. C O M M.

Cecinīt quondam Maro primus idem, maximusq; Bucolici carminis latinus autor, Iunipe-
ri soler esse grauis cantatibus umbra: monuitq; pastore, s' sub spinosam, densioriq; umbræ arbo-
rem uocandas homini non esse musas. Mox pro Apibus præcepit, Et tua Cyrneas fugiant exa-
mina Taxos: nullibi equa malefici dispensatione. Siquidem Taxos fugisse potius q̃ Iuniperos
homines oportebat: si ut hic, & alij tradiderūt, lætalis homini earum umbra est. Plinius, 26. uo-
lumine, cap. 11. de ea ait. Et esse in Arcadia tam præsentis uenenī, ut si qui dormiant sub ea, cibū
ue capiant, moriantur. Et præter Plinium Plutarchus sui Symposij tertio cōmentario, quo ca-
pite quaerit, Si in conuiuio florum coronis utendum sit, ἰσοροῦσι γὰρ ὅτι καὶ σικὰ σμύλακος ἀποκτείν-
ει τοὺς ἑγκαταδραβήντας ὅταν ὄργα μάλιστα πρὸς τὴν ἀνθρώπινον. Quod est. Ferunt enim & Smylacis um-
bram, in ea dormientes perimere, quo tempore præsertim ad nouos flores turget. Contraxitq;
umbræ eius noxam ad id tempus maxime Plutarchus, quod ab re nō est, ob eam quam ille tra-
didit causam, dicens ueluti telis, sagitisq; aliquibus uulnerari cerebrum halitu florum per na-
res attracto: qui cum in hac arbore semper lætalis sit, in noua florum productione, ob acriorē
maioresq; eius copiam magis nocet. Descripsit Plinius quo diximus loco arborem longius:
Barbarus etiam in Corollario suo, ex græcis latinisq; scriptoribus omnem eius historiam col-
legit: & præter eos uulgaris, notaq; cunctis nunc etiam arbor est. Quæ una tantum mutata lite-
ra, p. Taxo, Naxus nobis uocat. Durissimę materię arbor, & ob id in fabrica experta, ad ea quę
diuturniora futura sunt. Balistę, arcusq; nunc etiam ex ea fiunt. Sed quondam in frequentiore
eius teli usu, & ipsa in maiore usu fuit. Fluores alui baccas eius uescientibus fieri, hic scriptor ait:
ex eademq; causa Maronē nos credimus monuisse, fugiendā Apibus esse arborem: ne cita aluo,
cui male obnoxie sunt, perirent. Quia enim ui homini nocet, eadē illis nocere credendū est.

De Apocyno.

CAP. LXXXIII.

Apocynon aliqui Cynanchon appellant, alij Pardalianches, alij
Cynomoron, alij Cynocramben, alij Cynoctionon, alij Phaleō,
alij Cynanchen, alij Oligorō, alij Hippomanes, alij Onistū, alij Ophi-
oscorodon, alij Cynaricam, alij Elaphoscorodon, Magi Paralyfin, Ro-
mani Brassicam rusticam, aut caninam. Frutex est paruis uiticulis con-
stans, male olentibus, fractu fere inuictis, folio Hederae, molliore tamē,
& per extremum acutiore, uiscoso, graui odore. Id luteo succo turget.
Siliquæ ceu Fabarum, digiti longitudine protenduntur, semine intus
albo, duro, paruo. Folia cum adipe in panes coacta, canes, lupos, uul-
pes, & pantheras enecant in cibo data, & p̃tinus eorū coxas resoluūt.

B A R B A R I C O R O L L.

Apocynon, semine acuto, diuiso, lanuginoso, graui odore, uirgis minus longis q̃ Hedera;
Quadrupes necat, si uescantur, omnes. Est & uenenum hominibus. Dicitur & Cynocram-
be a Galeno, ab aliquibus Hippomanes. Quanq; & uirus defluens ab equarū inguinibus quo
tempore amoris infania feruntur, Hippomanes appellant. Apud Hesiodum certe Hippoma-
nes herba est, quam edentes equi, aguntur in furorem. Dicitur & Capparis Hippomanes. Est
& saltationis genus apud Comicos Apocinon, sed scriptura distinguitur.

E X. M. V E R G. C O M M.

Inutilis medicinæ huic scriptori Canina Brassica est. Posteriores tamen greci calidam, sine sic-
candi ui eam descriperunt. Eamq; ob causam emplastri modo impositam, discutiendi uim ha-
bere. Plinius præterea li. 24. capite. 11. Suspiriosos, pleureticos, & omnes lateris dolores ex aqua
semen eius sanare testatus est. Quo loco isdem notis, & paulominus q̃ isdē huc scriptori uer-
bis eam effigiauit. Canes, & omnes quadrupes necare in cibo datam Diosc. pariter testatus:

S ij

A

B

ἀπόκυνον

Pli. li. 24. ca. 11

D I O S C O R I D I S

C Quæ nominis frutici huic præcipua causa est. Pluresq; ex appellationibus eius non aliunde q̃ ex eo usu causam habent. Dico autem, ex eo usu: quoniam sæpe fit a uenatoribus, & alijs quibus syluas, aut alienas domos ingredientibus adlatrari in eodem modo fit, ut cum odisse canes in coeperint, ueneno aliquo cibo eos interceptant: quale Apocynon hoc est: quod Paulus Aegina in. 9. ait ideo Cynocramben, id est, caninam Brassicam, et Cynomoron, id est, canum mortem uocari, q̃ eos celerrime enecet: eadem q̃ ui maleficium & letalis homini sit. Quod pariter indicat Apocyni uox: nihil aliud grecis significans, q̃ qd abesse canes facit. Quæadmodum Cynagos, qd canes angit & stragulat: & Cynoctono, qd canes enecat. Quæ oēs eiusdē rei indices uoces, eadē hñt causā. In ceteris nō tā facilis nob̃ intellectus ē, ob eāq; cām pitioribus relinquunt̃.

N **De Nerio, seu Rhododendro. CAP. LXXXV.**
NERIO Naliqui Rhododaphnē, alij Rhododendro, alij Spongiō, alij Hæmostarin, Romani Rhododendro, Lucani Iemanen, Aegyptij Scympham, Pœni Rhododaphnem appellauerunt. Frutex est uulgaris noticiæ, longioribus q̃ Amygdala folijs, asperioribusq; flore in Rosam conformato, fructu Nuci græcæ simili, corniculato, qui patefactus quandā floccorum speciem ostendit, Hyacinthi pappos representantē. Radice longa, acuta, lignosa, gustati salsa. Nasctur in amœnis, maritimis, amnibusq;. Flores & folia mulis, asinis & quadrupedum plurimis uenena sunt, hominum uero contra serpentium morsus præsidia. E uino pota, eo magis Ruta addita, imbecillæ etiam animantes, ut pecus & capræ, si aquam bibant in qua folia ea maduerint, moriuntur.

N **BARBARI COROLL.**
NERION Sabina quoq; herba dicitur. Sempiternum fronde, caulibus fruticosum. Mel insanum e Ponto contrahitur, Rhododendri flore, quo scatent syluæ. Hoc nomen quidem apud nos inuenit latinum, ut Plinius irradit. Galenus hanc intelligit, quoties Rododaphnen nominat, aut Nerion, duobus eam locis prodens. Photion Rhodoniam quoq; dici meminit. Quosdam tamen Rhodoniam interpretatos inquit fuisse uitem, flauas uuas ferentem. Dioscorides Rhododaphnen a quibusdam uocari Spongon scribit. Aetius Spongittin herbam dicendo, proidentia sedis utilem, quid intelligat haud scio.

E X M. V E R G. . C O M M.
FEcerunt grecis Rhododaphnē Rosæ flos, & Lauri folium, quæ fruticis huius præcipue notæ sunt. Fecit idem Rosæ flos & arbor eidem genti Rhododendri. Sic enim fruticem hunc etiam uocarunt. Pliniusq; hac sæpius q̃ illa pluribus locis uoce usus est. Nec refert q̃ hic Amygdalæ folijs folia eius comparauerit. Lauro em̃ & Amygdalæ non dissimilis magnopere foliorum figura est: longa eiusdem fere latitudinis & in cuspidem acuminata. In ceteris eius appellationibus parum certa nobis ratio est: ideoq; indescriptæ relinquuntur.

N **De Fungis. CAP. LXXXVI.**
FVngorum differentia duplex. Aut enim manduntur, aut perniciosales sunt. Multis de causis ueneni gignuntur. Si enim clauus ferreus, in quo sit rubigo, aut panni marcior adfuerit: aut si iuxta serpentis cauernam, arboreæ, quæ pariunt noxios fructus, erumpant. Continent nescio quod strigmentum, concretamque pituitam, terraque eruti q̃ celerrime computrescunt, atque marcore uitiantur. Sed qui ueneno imbuti non sunt, suauem in iuribus gratiam habent. Larcius tamen sumpti, nocent, & ægrius concocti strangulant, aut choleram morbum citant. Remedio est nitri potus, aut lixiuium cum acida.

muria, aut feruefactæ Saturciæ, aut Origani iusculum. Debellantur etiā **A** am gallinacei fimi potu ex aceto, aut eiusdem delinctu cum melle multo. Corpus alunt, sed ægre dissoluuntur, cum magna ex parte integri ipsi, cum recementis alui reſciantur.

BARBARI COROLL.

Fungi cortice, medulla, neruo, uena carent, pediculo admodum æquali: quāq; qui ex his Pezicæ a græcis uocantur, nec pediculum, nec radicem habent. Fungos græci Mycetas uocant: nec distinguunt. Quāq; Paulus etiam Boletos cognouit, Bolitas appellandō: quibus & principatum inter Fungos dedit, sicut secundum locum his qui Amanitæ nominantur. Sunt & Egiræ, sed industriæ fermento in ipsis Populi nigrae truncis diluto aqua, protinus coalescentes. Quorundam facile noscuntur uenena, diluto rubore, rancido aspectu, liuido intus colore, rimosa striata, pallide per ambitum labros. Non sunt hæc in quibusdam, sicut & Nitri similes, ueluti guttas in uertice albas ex tunica sua gerunt. Voluā em terra ob hoc prius gignit. Ipsum potest in uolua, ceu in ouo est luteum, nec tunicæ minor gratia in cibo infantis Boleti. Rumpitur hæc primo nascente, mox crescente in pediculo corpus absumit, raroq; unq; gemini ex uno pede. Origo prima elimo, & acescente succo madentis terræ, aut radice ferme glandiferæ. Initio spuma lentior: dein corpus membranæ simile: mox partus, ut diximus. Deprehendisse periciales, nisi agrestes possunt, atq; qui colligunt. Caligaris clauus, & rubigo ferri, aut calybs uenatos faciunt. Boletis ortus occasusq; includitur septem diebus. Fungorum lentior natura, & numerosa gēa, nec nisi ex arborum fere pituita. Tutissimi qui rubent, callo minus diluto q; Boletis rubore. Mox candidi, uelut apice flaminis, insignibus pediculis. Tertiū genus suillis ac comodati uenenis. Quidā disereuere arborū generibus, Fico, Ferula, & gumiferis. Non itē Fago aut Robore, aut Cupressō. Omnium colos liuidus. Sed his aberit argumētū ueneni, q̄ similiores arbori Fico fuerint. Noxij erunt Fungi, qui in coquendo duriores fiunt. Innocētiore, q̄ nitro addito coquantur, si utiq; percoquantur. Imbribus proueniūt omnia hæc. Siccant pendentes suilli funco transfixi, quales a Bithynia ueniunt, Succineis nouaculis, & argenteo apparatu Fungos ipsæ suis manibus delictæ coquebat uñ Græci hos Deorū cibo nasci dicebat, ut Tranquilus in Nerone meminit. Porphyrius, non cibum, sed filios Deorū Fungos & tubera uocabant, qā puenire uiderent sine semine. Nata forte diuersitas, qd uerbū *θεοτρόφος*, & est q̄ alit, & eū qui alitur significat, accentu mō cōmeante. Porro Deorum & cibus & alumni ideo uideri possunt, qm̄ & eos quorum pater ignotus est, filios terræ dicimus: qd quidem & Cicero in quadam ad Atticum epistola confirmat de Licā. Recentiores alia quoq; nomina, uel genera dedere. Ouatos, ab oui similitudine. Spongiolos, a spōgia. Digitellos, a digitis. Porriginosos, a porrigine. Pezicas, quasi sessiles & pediculis carētes. Lacinia priuatim dicuntur e castanea, magnitudine spectabiles, ut singuli sufficiant. Innocentissimi sunt e rubis & carduis uere nati, rotunditate dufi li, q̄s inde Prunulos, & Spinulos appellant, & Cardeolos. Oriū & e saxo. i. lapide Lyncurio, siue Lynego, uulgarī uoce dicto Fungus, admirabili natura. Præciditur hic in esum, & alius subnascit anno toto. Pediculi pars relicta duratur in silicē, atq; ita semp̄ crescit lapis, restibili fecunditate: nec credidimus, anteq; domi natos ita menducaremus. Nouum et hoc uita sibi cōperit in uicē multa perdit: quāq; est ubi Plinius hoc innuat, ut in castigatione Pliniana. 20. secundū libri diximus. Sunt & igniarij quidam Fungi, & quibus strigilium uice tostrina utitur.

EX M. VERG. COMM.

DE tota Fungorum natura, quos tantopere ad cibos & ganeam mortalitas expetit, breuissime & uno carmine decreuit Flaccus, cum in Sermonibus suis cecinit. Præfibus optima Fungis natura est: alijs male creditur. O sapientem pōetam, qui dum ganeam, multosq; eius sapores didicisse uideri uult, humanæ uitæ tam utiliter consuluerit. Græcorum medici etiam, exceptis Boletis, & quos Paulus Aegineta suorum, ut nos credimus, temperorum nomine Amanitas uocat, omnes unā sententia damnauerunt, frigidos, pituitosos, & crassioris humoris in cibo constituentes. Plinius tamen. 22. uolumine eiusdem numeri capite, proximōq; illi longiorē historia, bonitatis eorum, uitæq; & totam naturam profecus est. Quæ poterunt uolentes certius in eo cognoscere. Fuerunt medicorum & sapientiorum de Fungorum natura & uī decreta quæ paulo ante dicta sunt. Poetæ tamen Boletos præcipue laudarunt. Et inter antiquos medicos Paulus Aegineta primo uolumine de Fungis, Boletisq; sic dicens. *οι δε μακρῆς ζωῆς ἐν τῇ φλογματώδους καὶ κακοῦ χυμοῖ, τούτων δὲ ἀντὶν οἱ μὲν βωλίται ἀβλαβέστερον καὶ ἀπονοήκαλλον ἐστὶν ἐν τῇ*

Pli. li. 22. cā. 22

B

D I O S C O R I D I S

Cοι δὲ ἀμύνται διυτρεσ ἴσι τάςωσ. τῶν δὲ ἄλλων μυκήτων ἀπὶ χεῖρας αὐτοῖς, πολλοὶ γὰρ ἔξ αὐτῶν θανάτου. καὶ αὐτοὶ δὲ ἐν βολίται ἀνιθότεροι ἰσθιόμενοι κινδύνον παρὰ τοῖς πολλοῖς γίνονται. Quorum sensus est. Fungi uero frigidi, pituitosi, & mali succi sunt. Omnium minus nocetes Boleti sunt. Ad summum elixi. Qui uero Amanite dicunt, secundum post Boletos ordinem habent. A ceteris abstinentium est. Plures enim eorum mortiferi sunt. Quinetiam Boleti ipsi si minus elixi comedant, periculi, mortisque causam habent. Et hec per Fungorum maleficio, tuncque usu satis sunt. In quibus uidentur, sint ne Pauli Aeginete Amanite, Flacci pratenses, Boletos enim credimus nos a probo τῷ βόλον, i. a bolo dictos fuisse.

καλχικόν

De Colchico. CAP. LXXXVII.

Colchico aliqui Ephemerum, Romani agrestem Bulbum uocant. Autumni exitu florem addit Croci, candicantem, ab eo tempore folia Bulbi, sed pinguiora, caule palmo altum, ferentem rufum seminem, radicem foris e nigra rufescentem, quae delibrata, candida et mollis spectat. Lacteo succo madet, atque gustatu dulcis inuenitur. Bulbus mediam habet rimam, fissuramque, qua flos erumpit. Plurimum in Messenia, et Colchis nascitur. Ea comesta, Fungorum more, strangulando enecat. Hanc autem depinximus, ne a quocumque imprudenter pro Bulbo deuoret. Miram enim incautis uoluptatem affert. Remedia sunt eadem quae Fungis. Bubulum etiam lac potum auxiliatur. Itaque cum adfuerit, non aliud desideratur auxilium.

BARBARI COROLL.

Pli. li. 25. ca. 10
& li. 25. ca. 11

Colchicon, & Ephemerum, de quo mox prodetur, Hermodactyli genera a neotericis uocantur. Galenus & Paulus Ephemerum duplex faciunt, Dioscoridem sequuti. Vnum delibutorum ueneni uis, de quo hic. Alterum quod Irim syluestrem cognominant, de quo proxime dicemus. Colchicon sane haberi modo passim praedicant, Ephemerum nesciri. Hermodactyli porro, ex quibus pilulae ad podagras tantopere commendantur, ab Aetio & Paulo, Quinquifolium sit, an Ephemerum, parum mihi constat. Alioquin recentiores per Ephemerum accipiunt. Dioscorides Quinquifolium

D Hermodactylum quippe dicit, & morbis articularibus, et coxae dicit conuenire, prout, Ephemerum minoribus.

EX M. VERG. COMM.

Misceri in antiquis scriptoribus inuicem Colchicon, et Ephemerum aliqui crediderunt, Nican drum in Alexipharmacis suis dicentem audientes. ἢν δὲ τὸ μηδὲν κολλήδου ἔχοντων πρὸς καὶνο ποτὸν δίδεται ἐφήμερον. Quod est, Si uero Colchidis Medea infestum ignem poculum illud hauserit Ephemerum. Mox Plinium inter uenena Colchicum, & inter medicas herbas Ephemerum numerantem. Quinetiam huiusmodi hoc loco priuatim de utroque agentem, & inuicem utrumque Colchicon et Ephemerum uocantem. Post hos Paulum Aeginetam, Ephemerum in quo inter uenena constituentem: mox iterum in. 6. Ephemerum his uerbis describentem. ἐφήμερον ἐν δηλητήριον ἄλλ' ὅπερ ἴριος ἀγρία καλεῖται. Quod est. Ephemerum non quod noxium & letale, sed quod agrestem Irim uocant. Et ne longiores simus, in cunctis graecis modo uenenum, modo utilem dentibus & tumoribus herbam Ephemerum inuenientes, praesenti & periculosa semper dubitatione. Nisi cognouerit aliquis duo quoddam Ephemerum genera fuisse: alterum quod Colchicon a natali solo diceret, flore albicante, crocinio simili: radice bulbi, sed pinguiore: caule dodrantali, notisque alijs quae a scriptore hoc in historia eius numerantur. Quod Colchicon Plinius simpliciter nominauit lib. 25. cap. 10. & Paulus Aegineta in quinto Ephemerum: cuius uerba sunt. τοῖς δὲ ἐφήμερον λαβοῦσι ὃ ἴριος καλοῦσι κολλήκον διὰ τὸ ἐν κολλήδι φέρεσθαι. Quorum sensus est. His autem qui Ephemerum hauserint, quid quidam quia in Colchide nascitur Colchico uocant. Quodque hic idem scriptor in sexto inter uenena, non Colchico, sed Ephemerum uocabit, quo loco cum hic plantam descripsisset, maleficio eius & ueneni notas remediaque: certius illic docet. Alterum quod simpliciter Ephemerum dicitur innocens, & ut paulo ante nos diximus, dentibus & tumoribus utile. Cuius meminit Plinius lib. 25. cap. 11. his uerbis. Ephemerum folia habet Lilij, sed minor, caulem parem, &c. Quod hic ipse scriptor mox describet. Et ut rem totam absoluamus: quod Paulus Aegineta in. 6. descripsit, habereque ait reperiendi discutiendi uires, esseque Ephemerum duo: & qualia nos diximus uenenum alterum, innocens alterum, satis idem Paulus Aegineta indicat: qui de innocente hoc agere incipiens ait, ἐφήμερον ἐν τῷ δηλητήριον. Quod est. Ephemerum, non quod noxium & letale, &c. Manifesto ex ea propositione, diuisioneque argumento, duplex eius generis

esse, alterum qđ ueneni, & alterũ quod remedij rationem habet. Factum ideo est, dum in anti-
quis græcis uaga appellatione utrũq; Ephemeron dicitur, ne sine causã crediderint aliqui, mi-
seri inuicem Colchici, & Ephemeris appellationes. Verumtamen quantum similitudo aliqua
nominis cõmunione in illis fecit, tantũ natura uiribus ea discreuit: eamq; ob causã in ue-
terum scriptorum lectione obseruanda diligentius ea uox erit, ut noxium ab utili, & uenenum
a medica materia secerini possit. In quo non parũ proderit, de quo agatur, & quomodo obser-
uasse. Fuerunt qui maleficum illud Ephemerũ dictum putauerint, q̃ hausto eo, una tantũ die
superfites sint, qui id hauserunt: & a similitudine eius, deinde alterum illud. Nos tamen pro-
fiteri non audemus, utrius similitudo alteri nomen fecerit.

De Ephemero.

CAP. LXXXVIII.

Ephemeron aliqui syluestrem Irin appellant. Folia habet Liliij, sed tenuiora, caulem parem, florem candidum, amarum, semen molle, radicem unam, digitali crassitudine, longã, adstringentem, odoratam. Nascitur in syluis & opacis. Huius radix dentibus præcipua, si decoctio colluantur. Folia in uino cocta, discutunt tumores, & tubercula, quæ nihil adhuc humidi contraxerunt.

BARBARI COROLL.

Ephemeron folijs Liliij, minoribus, semine superuacuo: dictum ita, quod intra diem iugulet, ut Theophrastus putat. Sed illud alterũ genus est, & Colchicon proprie crediderim, folio Ellebori. Radicula omnibus nota. Seruorũ in desperatione confugiũ. Hoc ipsum Colchicon, & Plinius Ephemeris appellatione intelligit, quotiens medicinas contra Ephemerũ impactum commemorat, Ephemerũ radicem longa, non ut Colchico rotunda. Quidam Ephemeris uocabulo delibutorij ueneni compositionem quandam capiunt, ut Aetius testatur.

EX M. VERG. COMM.

Satis in Colchico superiore capite de Ephemero hoc dictum a nobis fuit. Querendum modo superioribus relinquimus, sint ne quos medici & herbarij nunc Hermodactylos uocant, Ephemeron hoc, an Colchicon, illud paulo ante descriptum. Nihil enim modo superest, q̃ monere legentes, dicere Barbarum, habere Ephemeron hoc florem ceruleum, quẽ nos candidum, ex cõmuni, eademq; omnium quotquot uidimus codicum lectione. Plinium ut uidetur in floribus eius colore, potius q̃ Dioscoridem, quẽ uertebat, secutus ille est. Sunt em̃ in historia Ephemeris huius Plinij hæc uerba. Ephemeron folia habet Liliij, sed minora: caulem parem, florem ceruleum. At hic ἀνὰ λευκὸν αἶψ, quæ uoces nisi ad candidũ colorem trahi non possunt. Signasse hoc etiã placuit, ut quibus auctoribus qđ diuersum sit uterq; nostrũ uerterit, legentes sciant.

De Alsine.

CAP. LXXXIX.

Alsinen aliqui Anthyllion, alij Myortochon, alij Myrtosplenon, Romani Muris auriculam, Poeni Labatholabat, nonnulli Myosota uocant, quoniam muscutorum aures folia imitantur. Lucis, opacisq; gaudet, unde Alsine dicta est. Hæc erate eadem quæ Helxine, nisi folijs minor, minusq; hirsuta esset. Cum teritur, odorem Cucumis reddit. Vim refrigerandi adstringendiq; obtinet. Oculorum inflammationibus cum polenta illinitur. Succus aurium doloribus infunditur. Quin & emēdat omnia quæ Helxine, id est, Muralis hærbæ.

De palustri Lente.

CAP. XC.

Lens palustris, quam agriam aliqui, alij Epipterion, Romani Viperalem uocant. Inuenitur in aqua non fluente, muscus Lentici- læ similis, refrigeratoriæ naturæ. Propter quod conuenienter collectionibus, igni sacro, & podagris illinitur per se, & cum polenta; Glutinat & procidentia puerorum interanea.

D I O S C O R I D I S

C L B A R B A R I C O R O L L

Lens palustris, Phacos Epitelmaton a Græcis uocat, sine radice, sine folijs, etiam si id qd in ea fructificat, simile folio conspicitur, minus habili humore, q̃ ut in eo solum conflare possit. Quidam genus aliud, non quidem in aqua nascens, sed in uliginosis dilutisq̃, maius contrahunt, carens folio, Agriam Phaceam, hoc est, syluaticam Lentem uocant.

E X M. V E R G. C O M M.

Quemadmodum in cognomine legumine secundo libro illud describens Dioscorides *φακός ὁ ἐπιτμήματος*, id est, Lens quæ comeditur dixerat, ut ab hac, & ab Elclisphaco eam separaret: eadem ratione de palustri hac docens, *φακός ἐν τῶν τιλμάτων*, quod est, Lens quæ in lacustribus inuenitur, dixit. Cognomines enim, sed natura diuersæ, separari discrimine aliquo debuerat. Id acceptum est in illa ab usu, in hac a natalibus. Secutiq̃ posteriores omnes hunc scriptorem, in discriminibus his sunt. Muscum, non herbam hic dicit inueniri, in aquis non fluentibus. Vnq̃ uoce illa satis naturam eius indicauit. Fluitat enim in summa aqua Lentis figura, a cuius similitudine nomen inuenit.

De Semperuiuo, seu Sedo magno. C A P. XCI.

ἰζώον

Aizoon maius, aliqui Aithales, alij Ambrosion, alij Chrysispermon, alij Zoöphthallon, alij Buböphthallon, alij Stergethron, alij Aeonion, alij Aichryson, alij Olochryson, nonnulli Chrysanthemum, alij Protogonon, alij Boron, alij Notion. Magi Paronychiam, alij Chrystin, Romani Ceriam cuspiam, aut louis caulem nominant, alij Lepetes, alij Sedum maius, Aegyptij Pamphanes. Semperuiuum ideo nominatur, quoniam perpetuo folia uireant, cuius caules cubiti altitudinem implent, interdum excedunt, pingues, crassitudine pollicari, uirescentes, Characiæ Titimali modo insecti, folia carnosa, longitudine pollicari, in cacumine linguæ similia, alia in terram conuexa, alia in capite

Dstantia inuicem: ita ut ambitu effigiem imitentur oculi. Nascitur in montibus, & testaceis. Supra domicilia etiam feritur. Eius uis refrigerare, & adstringere. Medentur igni sacro, nomis, ulceribus quæ serpunt, oculorum inflammationibus, ambustis igni, podagris per se, & cum polenta illita folia. Succus capiti, in doloribus cum polenta, aut rosacco perfunditur. Datur in potu contra phalangiorum ictus, dysenteriam, aluiq̃ profluuiâ. Teretes tineas potus in uino excutit. Subditus in uellere, mulierum abundantiam sistit. Succus oculorum lippitudinibus, sanguinis uicio conceptis inungitur.

Pli. li. 25. ca. 17.
lib. 28. cap. 17.
lib. 26. ca. 8. 11.

B A R B A R I C O R O L L

Aizoon maius, aliqui Iouis caulem, siue oculum, alij Digitellum, alij Spegeton, siue Hypogefon, quod in subgrundis fere nascitur. Aliqui Amerimnon a sollicitudinis depulso. Sunt qui Trithalles a terno flore. Sunt qui Aethalles, ab æternitate. Sunt qui Erothales, & Erogetton, a uerno tempore, aut quoniam amatorijs conueniat. Latini & Sedum maius. Alij Sadum. Opilius Aurelius Sefuium. Nonnulli Semperuiuum. Vulgus Auricularem. Huic crassitudo caulis plus q̃ pollicaris: folia carnosa, larga, succo, leuia, oblonga. Sedum herbam fuisse putant eam, quæ Glauco immortalitatem dederit, Marino Deo. Fuit & alter Glauco in fabulis, qui Dracone medico monstrante, contactu herbæ, cuius non redditur nomen, reuixerit sub Minœ.

E X M. V E R G. C O M M.

Viret ubiq̃ Sedum in tegulis, nec alibi nūc facile inuenitur, inuasitq̃ iam pridem aliquibus locis plebis animos indigna cælo opinio, non percuti fulmine domum, in cuius tegulis uireat Sedum, frigoreq̃ suo plātam cœlestibus illis ignibus aduersari. Quod minus miretur aliquis, memor, ob eam causam Laurea semper contra easdem iniurias munisse caput Romanos Cæ-

fares. Sed ignaui, nihilq; timēdi ignes illi erunt, si tam exiguae plantae frigore mortalis fiet flammam illarum fulgor. Non tanta coelestibus infirmitas est: nec contra Iouis tela, quibus poëtae ut Deum ad poenam finxerunt, tam facile praesidium mortalibus est. Inuenit natalem locum sibi Sedum, in quo procul ab alijs plantis caelo propinquior, & foli, cuius radios non timeret, copioso succo ipse abundans, eodemq; frigidissimo terrae humore ad uitam non indigeret. Non aliter q̃ qui in meliore fortuna sibi ipsis, ut Lucretius cecinit, ualere & uiuere possunt, nec aliorum ope ad uitam indigent, & ab aliorum iniurijs per se tuti, iocundo animi sensu, pereuntes ubiq; alios contemplantur: non quia iactari quencq; sit dulce uidere, sed quibus ipse malis careas, quia cernere sua uice est. Quae Sedi fortuna semper fuit: uiuensq; ipsum in tegulis, aeterna uita pereuntes quotannis tota terra nunc aestiu, nunc frigore, nunc alijs caeli & naturae iniurijs plantas alias spectat. Ob quam causam in tanto nominum ambitu ueteribus fuit: praesertimq; graecis, qui non contenti a uitae aeternitate Aizoon, & Aeonion uocasse, tot alijs similibus appellationibus id ornauerunt.

De minore Semperuiuo.

CAP. XCII.

A Izoon paruū, alijs Petrophyes appellant, alijs Brotion, alijs Theorotion, alijs Crobysson, alijs Chimerinen, alijs Cerauniam, Romani Vitalem, alijs Semperuiuum, Aegyptij Eriyceltam. In petris, parietinis, & macerijs, necnon scrobibus opacis nascitur, caulibus ab una radice multis, tenuibus, crebro foliatis, exilibus folijs, rotundis, pinguibus, mucronatis, caule a medio emicante, palmū alto, umbellam haeridosq; flores & tenues gerente. Folia eisdem cum priore uiribus praedita sunt. Semperuiuum quod tenui constat folio, aliqui Aizoon paruū, alijs Petrophyes, alijs Aizoon syluestre, Romani Semperuiuum minus appellant. Tertium uidetur Semperuiui genus, quam aliqui Andrachnen agriam, aut Telephion uocauerunt, Romani Illecebram, pusillis crassioribusq; folijs, hirsutis, Portulacae proximis. Vis ei excafactoria, acris, exulcerans. Illita cum axungia strumas discutit.

BARBARI COROLL.

A Izoon minus, Herideis, & Heristhales, & Chrysothales uocatur, a quibusdam Treles, siue Trichales, quia ter floreat. Hoc in muris, parietinisq; nascitur & tegulis. Fructicosum a radice, & sursum usq; ad cacumen: folijs angustis, succosis: radice inutiles. Vermicularis uulgo dicitur. Sunt qui Iessitin, ut Plinius, aut Hyssitin, aut Isoteos, tribus enim modis scriptum inuenitur, forteq; Gessitin melius. Quando & maius quoq; Aizoon Hypogessum dici ostendimus, hoc est, Subgrundiarium.

Tertium genus Aizoi Andrachne agria, hoc est, syluestris Portulaca dicitur: de qua etiam superius iisdem uerbis a Dioscoride scriptum est.

De Veneris Vmbilico.

CAP. XCIII.

C Otyledon aliquibus Cymbalion, alijs Scytalion, alijs Cepos Aphrodites, alijs terrae Vmbilicus, alijs Stoechis, alijs Stergeathon, Latinis Vmbilicus Veneris dicitur. Folio est in acetabuli formā tornato, ineuidēter concauo, breui in medio cauliculo, in quo semen inest, radice Oliuae modo rotunda. Succus cum uino circumlitus, instillatus ue, asperam carnis excrecentiā, constringentē os uuluae, reprimat. Inflammationibus, sacris ingnibus, strumis, pnionibus illitu auxiliat. Stomachi ardorē refrigerat. Folia cū radice comesta, calculos frangunt: urinā cient:

ΚΟΥΛΑΔΩΝ

D I O S C O R I D I S

C Hydropicis ex melle dantur. Hærbæ utuntur ad amatoria.

Pli. li. 25. ca. 17.

B A R B A R I C O R O L L.

C Otyledon paruula herba, cauliculo tenero, folijs pinguibus. Nascitur in maritimis, petiolisq; uiridis. Non est hæc, ut quidam rentur ea, quæ uulgo Cimbalaris appellatur. Etiam si Cymbalion a Dioscoride uocetur. Est autem Cimbalaris herba, foliotenus anguloso, hederaceo, flore paruo, purpureo, in muris terræ nascens. Quam quidem nonnulli genus alterum Capni dictæ faciunt, ut in Capno testati sumus.

E X M. V E R G. C O M M.

R Ara, & nescio an in toto plantarum censu, similis inuenienda alia, orbicularis, & concaua foliorum in Umbilico Veneris figura, nomē illi in græcis Coryledonis, in latinis uero Umbilici fecit. Licetq; Plinius græca uoce Coryledona semper uocet, res ipsa ramen, & Apuleius in commentariolo illo de herbis, uerisimilem, temporibusq; illis congruam eam appellationem indicat. Persuademurq; facile nos, & his, & alijs indicijs, fuisse græcæ Coryledonis Romanam appellationem Veneris Umbilici: quales in plerisque alijs ea gens habuit Capillum Veneris, Supercilium Veneris, & plerasq; alias. Libenter em ab ea Dea, quæ totius generationis symbolum in gentium religione quondam habuit, & quæ leporibus & blanditijs uitæ præfecta esset, ad naturæ partes, quæ grata, aut utili aliqua specie nascerentur, nominum auspicia ueteres Romani sumpturunt. Ex qua obseruatione, uidentes in græcorum Coryledone circumacta in orbem folia, leni in concauitate descensu, humani Umbilici formam describere, Umbilicum primo: mox ut rei maiestatem aliquam adderent, Veneris Umbilicum uocarunt. In orbem enim circumagitur, & in concauitatem descendit hominis umbilicus. Eadem, sed non tam honesta ratio fuit in Umbilico terræ. Adiecit hic etiam *κῆπον ἀφροδίτης*, id est, Veneris hortum dici Coryledona. Idq; Apuleius ille etiā testatus est. Significat autem *κῆπος* græcis in comuni significationis æstimatione hortum: eamq; ob causam nos Veneris hortum uertimus. Oborta tamē suspicio nobis est, posse *κῆπον* hoc loco non hortum indicare, sed tonsuram, & ornatum capitis, capilliq; antiquam in Persideratione, qua forte Venus a pictoribus fingeretur: & quoniam circumageretur in ea ante frontem in orbem capillus, ideo aliqui non ab Umbilico, quæ pars in homine, præsertimq; femina saluo pudore ostendi non potest, sed a capite honestiore & aperta cunctis parte appellare maluerint. Hoc enim nos magis probamus, q̃ si ea uoce significari etiā moneamus mulierum *τὸ ῥόσκαλον*. i. pubem, quod græcorum grammatici docent. Fuisse autem græcis *κῆπον* tonsuræ genus, in eius gentis scriptoribus notissimum est. Suspicio tamē coniecturæq; non decretum hoc sit. Eadem causa fuit, cur Cymbalion a cymbalorum consimili forma etiā diceretur. Concaua enim pariter & rotunda cymbala sunt. Contra autem Scytalion non satis certam habet rationem: nec nobis rationari facile est, quomodo Scytale, quæ longior erat, ad rotunditatem per similitudinem transferri poterit.

D

E St & alterum genus eiusdem, Cymbalion aliqui uocant, pingui-

bus folijs, latioribus, ligularum modo densis, circa radicem ambitum oculi describentibus, ut in maiore Semperuiuo, adstringentis gustus, cauliculo tenui, in quo flores & semina Hyperici, radice maiuscula. Facit eadem quæ Semperuiuum.

B A R B A R I C O R O L L.

C Otyledon secunda, caule longiore, sed pergracili, gustus asperrimi. Huius usu Hippocrates in cibo femininum sexum concipi, sicut priore masculinum prodidit.

E X M. V E R G. C O M M.

N On est quod in altera Acetabulo hac legentes moneamus. Satis enim per se patet historia eius, a Plinio iisdem uerbis tradita. In medicina autem & remedijs eadem illi omnia quæ maiori Sedo hic tribuit, & ex eo repetenda sunt.

¶ De Vrtica.

C A P. XCV.

ἀκαλὺφα

A Calyphen aliqui Cniden, alij Adicen, Latini Vrticam, Aegyptij Selepsion, Daci Dyn appellant. Acalyphen etiam alteram aliqui Cniphen, Romani Vrticam mollem uocant. Duo eius genera.

Syluestris asperior, latioribus, nigrioribusq; folijs, semine Lini, sed minore. Altera non æque aspera, minuto semine. Folia utriusq; illita, canis moribus addito sale medentur. Gangrænas, carcinomata, sordida ulcera, & quæ cacoëthe uocantur, item luxata, panos, tubercula, parotidas, suppurationesq; sanant. Lienosis cum cerato imponuntur. Faciunt ad profluuium narium cum succo trita, et naribus indita. Menses ciunt, eadem recentia detrita cum Myrrha, & imposita. Procidentes uulvas, contactu resiliere cogunt. Semen potu ex passio, Venerem stimulat. Vuluam aperit. Cum melle delinctum, orthopnoeæ, & lateris & pulmonum inflammationibus prodest. Thoracem expurgat. Erodentibus medicamentis amiscetur. Cocta cum conchis folia, aluum emolliunt. Vrinam mouent. In flationes discutiant. Decocta cum ptisana, uitia pectoris extrahunt. Mulierum menses euocant, cum myrrhæ modico pota. Inflammatione turgentem uuam, gargarisatus succus reprimat.

V **B A R B A R I C O R O L L.**
 Rtica, ex oibus aculeatis generibus notissima est. Acetabulis in flore purpuream lanuginem fundentibus. Sæpe altior binis cubitis. Mitior Fœmina est. Inter syluestres, quæ dicitur Cænina acrior, caule quoq; mordaci, fimbriatis folijs; quæ uero etiã odorem mittit Herculanæa uocatur. Semen omnibus copiosum, nigrum. Mirum, sine uillis spinarum, aculeis lanuginem ipsam noxiam, & tactu tantum leui, pruritus, pustulasq; adusto similes existere. Notum est remedium olei. Sed mordacitas non protinus cum ipsa herba gignitur, nec nisi foliis roborata. Incipiens quidem ipsa nasci uere, non ingrato, multis etiam religioso in cibo est, ad pellendos totius anni morbos. Syluestrium quoq; radix omnem carnem teneriorem facit simul cocta. Quæ uero ex ijs mitissima, & folijs non mordentibus, Lamium, siue Acononium uocatur, a quibusdam Vrtica incens, & mortua. Album hæc habet in medio folio, sacris ignibus utile. Quidam e nostris discreuere genera temporibus, autumnale appellando, & reliquis ad eandem rationem. Celsus & marinæ cognomine Plinius ad uesciæ uitia. Condit laudes Vrticæ Phaniæ physicus, utilissimam cibis coctam, in ueteratq; professus. Si quadrupes factum non admittat, Vrtica ruralia earum fricanda monstrant. In Oeta monte, steriliu, nec iniri se patientium caprarum ubera terrentes ea, lac eliciunt. Ex Vrtica in Aegypto fit oleum. Semen colligi messibus oportet. Alexandrinum maxime laudatur ad omnia. Vrticam Hippocrates Nidam uidetur appellasse, cum alij Cnidam uocent. Est ubi Clidam legas corrupte, ut censeo: nisi aliud genus sit. Grana inquit Clidæ sexaginta, clysteris uuluis iniiciantur, quas bilis infestauerit.

Pli. li. 21. ca. 115.

V **E X M. V E R G. C O M M.**
 Rtica nihil in censu olerum inuisius nascitur, igneo pruritu urens: & inde factum nomine. Vesciebantur nihilominus ea antiqui. Suntq; eius in cibo usus, testes antiqui in latinis poetarum: quibus iocundum erat Ocimo se & Vrtica recreare. Vbiq; & omnibus tam nota herba est, ut nihil monere in ea opus sit. Præterq; a Græcis Cnidem, ab eorum uerbo κνίδω dictam fuisse. Significat id cum dolore pungi, uexariq;: Vocauit Acalyphas etiam Aristoteles in mari Vrticas tactu eadem in urendo ui; Medetur ea multis in humano corpore morbis, plurimisque scater remedijs. Eamq; ob causam non minus ad medicinam, q; ad cibos medicis & olitoribus curanda.

B

G **De Galiopsi. C A P. XCVI.**
 GALIOPSIS, aut ut alijs Galcobdolon, uel Gallephos, Aegyptijs Aetopi, Latinis Vrtica labeo dicitur. Frutex in totum caulem & folia habet Vrticæ, læuiores, & quæ grauem odorem trita reddant. Flore purpureo, tenui. Nascit circa sepes, edificia, ac semitas, ubiq; Folia, caules, semen, succusq; duricias & carcinomata dissipant. Strumas,

galiopsi

D E F O S C O R I D I S

C. panos, & parotidas discutunt. Oportet bis in die tepidū ex aceto catapla-
sina imponere, & eius decoctio fouere. Ad putrescentia, gangranas, &
nomas, cum sale efficaciter illinuntur.

Lege Plin. lib.
27. cap. 9.

B A R B A R I C O R O L L.

E X M. V E R G. C O M M.

T. Oram Galiopsis huius medicinam & historiam isdem huic scriptori uerbis prosecutus
27. uolumine, capite. 9. Plinius est. Discrepant solum, q̃ Plinius Galeobdalon uocari ait,
quam hic Galeobdolon dicit; & nihilominus lactis, candorisue in ea nihil est, quod Pliniana
illa uox significare uidetur. Ignoramus & illud etiam, quod hic Vrticam Labconem a Ro-
manis dici testatur.

γάλιον

De Galio.

C A P. XCVII.

G. Alion, siue ut alijs Galacion, aut Galerion, nomen ex eo tra-
xit, q̃ in contrahendo lacte, coaguli uicem impleat. Ramulū, fo-
liumq̃ habet Aparinæ simillimū, rectum: florem in cacumine luteum, te-
nuem, odoratū. Flos igni ambustis illinitur. Sanguinis profluuiā sistit.
Cærato rosaceo Galion ammiscetur, insolatū usq̃ dum albescat. Lassitu-
dines reficit. Radix Venerem concitat. Nascitur in palustribus.

E X M. V E R G. C O M M.

D

L. Asteo, non luteo flore Galion hanc posteriores aliqui tradiderunt: testati nomen illi lactis
candorem, qui in flore sit, nō in coagulando lacte uim eius, ut hic ait, fecisse. Describuntq̃ eam
binis folijs, per interualla toto caule usq̃ ad summū uestitam, Lauro similibus. Verum tamen
scriptori huic, græcisq̃ alijs in historia eius magis credendū: præsertim his uerbis docente eam
in sexto sui operis Paulo Aegineta. γάλιον ὠνόμασθαι ἔδωκεν τὸ γάλα πικρύνει, παραπλάθει δὲ τὴν
ἀπαρίνην. ξηραντικόν τὸ καὶ ὑπόδριμν. τὸ δὲ ἄνθος αὐτοῦ πρὸς ἀιμορραγίαν ἐρυθροῦ καὶ πρὸς πυρίκαυτα. Quo-
rum sensus est. Aui coagulandi lactis dictum Galion est Aparinæ simile. Siccandi uim, medio-
cremque acrimoniam habet. Flore eius ad ambusta, & sanguinis ex naribus eruptiones utun-
tur. Et hoc solum est, quod pro Galio hac dici a nobis possit. Poterit ex notis suis cognosci,
& a pastribus sicubi pro coagulo lactis ea utantur.

ῥίγιστον

De Senetione.

C A P. XCVIII.

E. Rigeron a Græcis uocatur, a Latinis Hærbulum, aut Senetio,
alias Erechites. Cauliculo est cubitali, subrubro, folijs continuis,
is, diuisura Eruch, sed minoribus multo, luteis floribus, qui celeriter disse-
ci, uanescunt in pappos. Nomen uero sibi uendicauit, quoniam flores ca-
pillorū ritu uere canescant. Radice superuacua. Nascitur maxime in ma-
cerijs, & circum oppida. Folia cum floribus refrigerant. Quare illita cum
uini modico, uel per sese, testium & sedis inflammationes sanant. Quin
& ex manna thuris medentur, cum reliquis uulneribus, tum ijs quæ ner-
ui accæperunt. Illiti cum aceto pappi, idem munus præstant. Verum rez-
centes epoti, strangulant. Totus caulis si coctus in passo potui detur, sto-
machi dolores a bili contractos, per sanat

Theoph. li. 9.
plant.

B A R B A R I C O R O L L.

E. Rigeron, a nostris fere Trislaginis specie describitur, & cum mollicia nasci fertur in tegu-
lis, murisq̃; cauliculis subrubentibus, lanugine qualis est spinæ, inter diuisuras capitis exeu-
re. Ob id Galli Xuscæ, Callimachus Acanthiden, alijs Pappum uocant. Nec deinde Græcis
de ea constare Plinius affirmat, alios Eruce folijs, alios Roboris, sed minoribus multo dixisse.
Item radice alios superuacua, alios neruis uili, alios potu strangulante. Nec desuere qui aliter

genus facerent, nec quale esset demonstrarent: dantes contra serpentes bibendā, edendam uero comitialibus. Aggredimur medicinas, quia notae defunt. Nicander uidetur aut hanc intellexisse, cum Geraon pogona dixit, nam & nos Senecionem uocamus, aut Tragopogoni simile herbulam, quae uulgo Barba senis dicitur, aut Chrysocomen, quam & Iouis barbam appellamus. Quamquam & Arbor quaedam est quae Iouis barba dicitur, in opere topiario tonsillis, & in rotunditatem spissa argenteo folio, aquas odit, ut Plinius describit, nec adhuc plura.

EX M. VERG. COMM.

Romani Senecionem eam uocauerunt, facilem inuentu & cognitu herbam, qua urbani, et in agro agentes passim in acetariis utuntur. Nasci eam hic ait ad radices parietum, & in eorum rimis, iuncturisque. Verumtamen in cultis locis, et aruis copiosa etiam inuenitur. Theophrastus de plantarum historia, inter *κρυπτάδες* eam numerauit. Sed uidendum in eo, Cichoriodes ne ille plantas eodem modo semper & ubique appelleret. Et an satiuo Intybo, aut erratico similes ea nota significet. Si Senecionis in scriptore hoc historia expendatur, in qua exigua & longe exarata minora eius folia describuntur, erratico Intybo similia intellexisse oportebit. Sin contra Cichoriodes Theophrasto erit, quod longo & lato folio, & ob id satiuo Intybo simile, alia comparationis & similitudinis rationem in eo inuenisse opus erit: aut in alterutro diuersam suspicari plantam. Quale non multo post in hoc capite etiam erat. Quo loco scilicet passim, & in cunctis fere legebatur, *ὁ δὲ γὰρ οἶνος*, id est, in exiguo uino. Non enim sic legendum erat, sed in dulci uino. Quod uetustiores, & meliores graeci habebant.

De Thaliastro. CAP. XCIX.

Thaliastron folia Coriandri habet, pinguiora paulo, caulem Rutae, in quo folia. Quae trita, illitu antiqua ulcera ad cicatricem perducunt. Nascitur maxime in campestribus.

BARBARI COROLL.

Thaliastron, cauliculum habet crassitudine Papaueris: ut inquit Plinius, Rutae ut Galenus: cubiti, ut Dioscorides, librariis similitudine uocabulorum deceptis, Nos Rutae, Galenum secuti uertimus.

EX M. VERG. COMM.

Sunt Plinio & huic de Thaliastro, exceptis paucis, eadem omnia. Hic Rutae coliculū, ille Papaueris habere ait. Ille ulceribus cum melle, hic simpliciter concisa eius folia mederi dixit. Hic contra diutina ulcera, ille ulcera simpliciter sanari eo praecepit. Paulus Aegineta de eo tantum ait, Siccandi sine erosione uim habet Thaliastrum. Diutina enim ulcera ad cicatricem perducit.

De marino Bryo. CAP. C.

Marinum Bryon, aliqui Balaryin, alij Iranen uocant. Nascitur in scopulis testaceisque haud procul a mari, gracile, capillaceū, caulis expers. Praecipua ei spissandi uis, & collectiones cohibendi, & podagras, quas refrigerare opus sit.

BARBARI COROLL.

Bryon Thalassion cognominatur, ut a Bryo differat in arboribus nascente: marina herba haec, sed in terra tantum nascitur & scopulis: folio herbido ac lato, nec Lactucae dissimili, rugo fiore tantum, uelut contracta, sine caule: sed ab ima radice principio alio atque alio, plusculis exuntibus folijs.

EX M. VERG. COMM.

Non facile persuadeor, esse Bryon hoc loco a Dioscoride tractatum, idem a Plinio libro tricesimo secundo, quoniam capite descripto. Hic enim capillatum esse hoc suum dicit, ille Lactucae folijs, quae grandia & latiora sunt suum describit. Quae itidem alia in historia huius traduntur. Omnia Musco magis quam herbae congruunt. Capillata species, gracilitas, natales in saxis & piscium testis. Ob quam causam nobis Muscum uertere potius, quam herbam intelligere placuit. Cetera utrisque eadem sunt, ideoque a nobis ulterius non tractata.

T

A

θαλιastroν

B

βρυον θαλάσσιον

Pli. li. 32. ca. 56

C

φύκος θαλάσσιον

De Fuco marino. CAP. CI.

Fuci marini generibus, quoddam latum. Et alterum sublongius, & rubens. Tertium candidum, nascens in Creta, floridum ualde, quod nulla corruptionis labe polluitur. Omnia uim habent refrigeratoriam, non podagræ modo, sed etiam inflammationibus, in eaplastasmatis efficaciter utilem. Verum ijs uti humidis conuenit, priusq̃ exarescant. Nicander puniceum aduersus serpentes dedit. Hoc Fuco quidam putant mulieres suum colorem mentiri. Cum tamen sit radícula eiusdem nominis, qua sese fucant.

Pli. li. 13. ca. 27

BARBARI COROLL.

Phycos non habet alia lingua nomen: ut Plinio uidetur. Etiam si Fucus inde apud nos dictus esse uideatur: quoniam Alga inquit herba sit potius, hic autem frutex: quanq̃ est ubi maris Algam uocet & Fucum marinum Lactuce similem: qui conchilijs subternitur. Genus ei triplex. Vnum folio lato, uiridi, ob id Prasson uocatum, ab aliquibus Zoster: radice foris pilosa, intus squamatum compacta, prælonga, & crassa, ut Cepis, & Gethyo. Alterum simile Foeniculo: nec uiride, sed pallidum, sine caule: rigens tantum, atq̃ flans: & eo Copten a duricia uocatum. In testis fractis, saxisq̃ nascitur terra, ut mari tamē alluatur. Nam superius inuadit haud procul littore. Extra Hercules columnas magnitudine mirabili. Latitudo quæ manu cōprehēdi nequeat. Fertur hoc, fluctu extrinsecus in nostrum mare, Prasson ut diximus uocatum: quia pari fronde sit. Annuū esse traditur. Vtrumq̃ præcipiti uerno enasci, per æstatem uigere, autumno flaccescere, emori hyeme. Tertium graminis simile est, radice lōga, obliqua, geniculata: caule harūdinis, longe minus q̃ cetera. Alij breuius tria gēia folio distinguunt. Primum lato. Secundū longo, quod & rubens sit. Vltimū crispo: quod & Pelagion, & Cretense nominatur: quia spongiarū uiridiores ex alto id petant. Circa Cretā in petris copiosissimū & præstantissimum: quo & tēnias, & lanas, & uestes inficiant, prouocante purpuras, q̃ diu recens tinctura est: ita colorē alligās, ut elui postea nō possit: ob id & Pseudoconchylion a Democrito uocatur, & flos, siue Coccus marinus, & a Strabone in Arabico sinu Minū, hoc est, ut Nicander uisit, Bryō, Mulcū. Laudatissimum a parte aglonis, quemadmodū & spōgia. Phycos autē marinū, siue Thalassion cognominatur, ut a phyco, id est, fuco metallico distet. Refrigerātis apud Galenum est naturæ metallicū, & Cerussæ proximū uiribus, etiam tenuitate penetrandi uiuens: de quo nihil Diosco. In Aristotele de animalibus, Littoralem herbam, hoc est, quæ litus oleat, uidetur intellexisse Theodorus, cum uertit Lintuum, id quod ille ῥέσινα uocat. Fieri tamē potest, ut litus ipsum, & odor eius in eo uocabulo accipiendus sit.

D

EX M. VERG. COMM.

Vocauit hoc Plinius plerumq̃ Phycon, aliquando tamen maris Algam. Ideoq̃ nos utroq̃ nomine caput hoc inscripsimus, & si autor ille dixerit libro. 13. quo diximus capite, non habere Phycos alia lingua nomen, quoniam Alga herba sit, ille autem frutex. Nos tamen & Plinij, qui Algam maris aliquando uocauit, & aliorum auctoritatem secuti, non ueriti sumus Algam etiam nominare. Quod deinde hic ait, Nicandrum contra uenenata Puniceo uti, sic in eo pōeta se habet. ἡντι καὶ φοινίσαν ἂν καταβάλλας φύκος.

παταμογύτων

De Potamogetone. CAP. CII.

Potamogeton alias Stachyites, apud Aegyptios Etheuchis, Latine Fatalis dicitur, folium Betæ simile, hirsutum, paululum supereminens extra aquam. Refrigerat & inspissat. Folium pruriginibus utile. Et contra ueterum ulcerum nomas. Nomen ex eo inditum est, quod palustribus & aquosis enascatur.

BARBARI COROLL.

Potamogeton Castor hanc aliter nouerat, tenui folio, uelut equinis setis, thyrso leui & longo, in aquosis nascentem: cuius radix strumas tollebat. Potamogeton aduersatur crocodilis. Itaq̃ secum habent eam, qui uenantur eos.

Congrua, et in antiquissimis Græcis a nobis inuenta Potamogetonis appellatio, Betæ foliū etiam est. Nos etiam Fontinalem emendauimus, qđ in omnibus fantalis legebatur. Naturā em herbę oēs hę uoces sequunt. Quemadmodū & Stachytis, quasi spicata, ob caulē quem ex se mittit, floribus & femine spicatum. Græci aut Potamogetona a fluminū uicinitate prope quę nasci appellauerunt. Vbiq; in aquosis nascitur Betæ foliū hoc, oleris eius egregia similitudine, in cuius folijs maculę quędam ueluti puncta intercurrent colore inter puniceū & luteum.

De Stratiote. CAP. CIII.

Stratiotes in aquis nascens, aliquibus fluuiatilis Stratiotes nuncupatur, Aegyptijs Tibus, Magis Aeluri sanguis. Aquis supernatat, & sine radice uiuit. Vnde cognomentum traxit. Hærba Semperuiuo similis, ni maiora haberet folia. Quę refrigerant. Sanguinem qui defluit a renibus, pota sistunt. Vulnera quę inflammationem minantur, intus mescere non sinunt. Ignibus sacris, & tumoribus ex aceto illinuntur.

BARBARICOROLL.

Stratiotes geminus est. Aquaticus: de quo hic agitur. Et Terrestris, Millefolij cognomine, de quo statim post dicitur. Est autem Stratiotes aquaticus, herba Militaris, in Aegypto tantum nata inundatione Nili. Diuersam ab hac Militarem aliā existimo, quam alij eandem quę & Lactoris, aliqui similem dicunt. Est autem Lactoris nota uulgo, ut inquit Plinius, plena lactis: qđ degustatum, uomitiōes concitat. Hęc & Lactaria, & Anabula nunc dicit, Oleæ folio, sed minore: flore luteo. Sed an una aliqua sit hęc ex ijs quę Tithymali nominant, cōsiderandū relinquo.

Pli. li. 24. ca. 4

EX M. VERG. COMM.

In Aegypto & Nili inundatione nasci tantū Stratiotem hanc, testati omnes alij sunt. Hic, qđ non ab re miretur aliquis, in homine qui diu illic fuisset in aquosis, simpliciter prouenire. Nullus etiam, quod hactenus legerim, causam nominis reddidit, aut ratione aliqua indicauit. Nec quomodo a castris & militiā ad herbam id nomen transierit, docere nos audemus. Stratiotes enim græcis miles est. Obseruauimus tamen in antiquis græcorum lexicis, non eadem militi penitus uoce eam scribi, sed in quinta græcorum nominū declinatione & fœminino genere Stratiōida. Quod licet multifaciendum non sit, in re tamen quę legentes suspendere posset, non penitus inutilem hanc etiam fore diligentiam credimus. Descripsit Stratiotem hanc Plinius libro 24. capite. 9. ijsdem fere huic scriptori uerbis. Variant tantum, qđ sanguinis ex renibus fluentis remedio eius ille masculum tus addit. Verba eius sunt. Sanguinem quoq; qui defluit a renibus, pota cum ture masculo, mirifice sanat. Quod negligendū in scriptore hoc non est, præsertim congrua turis ad hanc rem ui: & quod uerisimile est, Pliniū cætera omnia eadem huic scriptori docentem, ex eodem fonte etiam illud hausisse. Nec rarum difficileq; est, scriptoribus a librarijs aliquid aliquando perijisse, & Dioscoridi posse id hac parte deesse.

B

De Stratiote Chiliophyllo. CAP. CIIII.

Stratiotes Chiliophyllos, exiguus frutex, palmi altitudine, aut amplius assurgit. Folijs auicularum pennas imitantibus, breui admodum dissectoq; foliorum exortu. Folia syluestre Cuminum simulant, præsertim breuitate, atq; scabricia, breuiora paulo, densiore umbella, & pleniore. Surculos in cacumine gerit exiguos, & capitula in modū Anethi, flores paruos, candidos. Nascitur in asperis agris, præcipue circa semitas. Eximij usus ad ulcera uetera, recentiaq; profluentem sanguinem, & fistulas.

στρατιώτης, χιλιόφυλλος

EX M. VERG. COMM.

Ostendunt pro Millefolia Stratiote ætatis nostræ herbarij colicolum breuib; & exiguis folijs undiq; uestitum. Respondentq; historię huius omnia, exceptis umbellis illis, quas hic dicit Anethi modo in summo eius esse. Quas em nos uidimus, flores magis longiusculis pediculis

T ij

Cependentes quæ umbellæ sunt: pediculosque illos credimus nos esse quæ hic *ναρπία*, i. festucas vocat, & quibus umbellæ sustineri ait: sed singuli potius flores quæ in umbellam plures congesti sunt. Certe ut diximus, historiæ huius egregie respondent. Nulla est, quod meminerim modo, Stratonem Millefolia hæc Plinio, neque hoc nomine descriptam in eo nos inuenimus. Greci tamen omnes utrumque hoc genus constituerunt, ipsædemque huic scriptori notis discreuerunt, Stratiotem aquaticam, & terrestrem: Millefoliā, s. hanc, frigidamque & humidam priorem illam, posteriorem uero hanc præter humorem & frigus habentem aliquid quod adstringat, describentes.

De Verbasco. CAP. CV.

Phlomon Græci, Latini Verbasco uocant. Differentiam duplicem habet, nigrum, & album: in quo mas, & foemina intelligitur. Foeminæ igitur folia sunt Brassicæ, pilosiora multo, & latiora, candida, caulis albus, cubitalis, aut amplior, subhirsutus, flores albi, aut ex luteo pallefcentes, semen nigrum, radix longa, acerba, crassitudine digitati. Nascitur in campestribus. Verbasco qui mas appellatur, oblongius, albis folijs & angustioribus, tenui caule. Sed nigrum prorsus albo simile esset, nisi nigriore latioreque constaret folio. Syluestre folia fert Saluaria, altas uirgas, & lignosas, & circa eas ramulos quales Marrubium, flores luteos, auri æmulus. Sunt & Phlomidæ duæ hirsutæ, rotundis folijs, humiles. Tertia Lychnitis appellatur, ab alijs autem Thryallis, folijs ternis, aut quaternis, uel paulo pluribus, crassis, pinguibuscque, apta ad lucernarum lumina. Radix priorum duarum adstringit: quare quod magnitudine ludicrum talum æquet, in alui profluuium conuenienter ex uino datur. Decoctum ruptis, conuulsis, fractis, antiquæ tussi auxilium datur. Dentium dolorem collutione mitigat. Verbasco, cui flos aureus, capillos tingit. Et quocumque abijciatur, blattas in se contrahit. Cocta in aqua folia, aduersus tumores, inflammationes oculorum, syderata ulcerata, ex uino & melle illinuntur. Cum aceto quoque uulneribus medentur. Contra scorpionum ictus auxilio est. Syluestris folia, ambustis igni sunt cataplasmata. Aiunt in folijs eius quam foeminam dicimus, aridos ficos omnino non putrescere.

Pli. li. 25. ca. 9.

BARBARI COROLL.

Verbasco, siue Phlomos, siue ut Galenus Plomos, etiam in niue nasci posse creditur. In albo aliqui Marem, in nigro Foeminam uolunt intelligi. Caulis Verbasco erectus, Semen inuile. Tertium porro genus non nisi in syluis inuenitur, cui herba quæ Romæ Blattaria dicitur, rã est similis, ut sæpe fallat pro ea capta. Est autem Blattaria folijs minus candidis, cauliculis pluribus, flore luteo: hinc forte natum, ut Dioscorides Verbasco syluestri Blattas contrahi prodiderit. Medicinæ huius capitis sequenti mentione collocantur.

Phlomidæ, distinguere genera hæc pene superuacuum est, cum sint eiusdem effectus omnia. Thryallida uero & Lychnitis ex argumento appellantur: quoniam ad lucernas conueniunt: proinde ipsa luminum ellychnia Græci, & Phlomos, & Thryallidas quoque uocant: ut inquit Pollux.

VERG.

Vale Verbasco omne sit, & quibus notis torius generis cognosci possint, satis ex historia Dioscoridis patet. Plinius etiam lib. 25. ca. 9. non minus in cognoscendis his præsidij legitibus asseret. Paucis enim mutatis, eadē ambobus oia sunt. Paulus Aegineta etiam post hos multiplex Verbasco esse testatus, & inter ea quam Græci *θυραλλίδα*, i. Thryallim uocant, utriusque decreta uidetur confirmasse. Longius ob eam causam de Verbasco non agemus, præsertim uulgaris & nota omnibus herba: & in cuius genere quæ foemina dicitur, flore candido, aut pallefcente, semine nigro, radice longa, & ut hic ait *σπυγία* est.

De Aethiopide. CAP. CVI.

AEthiopis folia habet Verbasco similia, perq̃ hirsuta, densaq̃ in orbem circa radicem imam redacta: caulem quadrangulum, scabrum, similem Apiastro, aut Arctio, multis concavum alis: semen Erui magnitudine, geminum, in uno conceptaculo: radices numerosas, longas, plenas, glutinosas gustu, quæ siccæ nigrescunt duranturq̃ ut cornua possint uideri. Plurima nascitur in Ida monte Troadis, & in Mesenia. Auxiliatur purulētis excreationibus, Ischiadicis, pleuritidis, arteriæ scabricijs, decocta radix & pota. Quin & cum melle, eclegmatis uicem præbet.

B A R B A R I C O R O L L.

AEthiopis, caulem habet concavum, semen candidū, radices plenas, mollēs. Quæ ex Aethiopia uenit, eximia est, illico proficiens. Colliguntur radices autumnō, siccātur in Sole aliquot diebus, ne situm sentiat.

E X M. V E R G. C O M M.

IN Aethiopia probatissimam nasci Aethiopidem hanc, testati alij sunt. Neq̃ abre forsan, qm̃ consueuerint homines multa simili ratione indicare. Hic tñ non magis in Aethiopia q̃ alibi nasci tradit. Ex eo non male aliq̃ suspicabitur a colore, qui in radicibus eius cum aruerunt uidef, uocari sic potuisse. Sunt enim nigri Aethiopes: quales hic eius radices esse dixit. Hoc nos tantū conijcimus, illud autem testantur ex ueteribus aliquot. Eamq̃ ob causam nos magis illud probamus: quoniam non est par pondus suspicionis & testimonij. Egit de ea Plinius. 27. uolumine, capite tertio, isdemq̃ omnibus notis indicata ab eo est. Videndum in eo tamen, sit ne hæc illi eadem quam. 26. uolumine, ca. 4. inter magicas uanitates Aethiopida parit uocat: monetq̃ polliceri & iactare magos, cōiecta Aethiopide herba, amnes & stagna siccare. Addidimus nos locis in qbus ea nascit, Mesene, s. & Ida, eorū locorū regiōes: ut certius historia eius oīs pateret. Plures em Idæ mōtes sūt, & Plinius ad Idā Trōadis cōtraxit, Mesene aut antiquissima Arcadię ciuitas est, lubrico nomine ad Messanā Sicilię, ideoq̃ certiore indicatione signata a nobis.

Pli. li. 27. ca. 3.
& li. 26. ca. 4.

De Arctio. CAP. CVII.

ARction aliqui potius Arcturon uocant. Similis est Verbasco folijs, nisi quod hirsutiora & rotundiōra sunt, caule longo molli, semine Cumini, paruō, radice tenera, alba, dulciq̃. Decocta cum semine radix in uino, dentium dolorem mulcet, si contineatur ore decoctum. Ambusta, perniōesq̃ fouentur eodem. Bibitur aduersus cōstēdicum dolores, & stranguriā e uino.

B A R B A R I C O R O L L.

ARction nascitur in petrosijs. Ab Vrsō nōmen obtinet: aliud omnino q̃ quæ uulgo Brachia uersina dicitur, ueteribus omīssa, etiam si Ebisci modo suppuratoriū uini habet, folijs tā diuersis, ut singula eorum multa esse uideantur, radice glutinosa, multiplici, subalbida.

E X M. V E R G. C O M M.

ANimaduertit, docuistq̃ iam pridem Nicolaus leonicenus, miscere Plinium uicinitate nominis, ut creditur deceptum, Arction, quam mō uertimus, cum Arcio, quæ uertēda mox erit, Perfonatamq̃ appellare: cum tamen Arcij, non Arctij propria sit Perfonatæ appellatio. Nouis seq̃ id ex scriptoris huius historia facillime omnes possunt. Diuersæ enim plantæ sūt, diuersis notis & uiribus descriptæ. Ideoq̃ græcorum medici & herbarij omnes priuatim, seorsumq̃ utramq̃ descripserunt: & alteram folio Cucurbitæ, alteram Verbasco similem fecerunt.

Pl. li. 27. ca. 3.

Pli. li. 27. ca. 3.

De Perfonata. CAP. CVIII.

ARction alij Profopida, alij Profopion, alij Aparinen. Latini Perfonatam, aut Lappam appellant. Folia habet maiora etiā Cū

Pl. li. 27. ca. 3.

Curbitis, & hirsutiora, nigriora, & crassiora, caulem albicantem, quantū & interdū uidua caule reperiatur, radice intus candida, foris nigra. Hęc drachmæ unius pondere pota, cum pineis nucibus, purulenta & cruenta extussientibus auxiliatur. Trita dolores in artubus, astrictius uinctis illitu sedat. Folia utiliter antiquis ulceribus illinuntur.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 25. ca. 9.

Arcion, siue Prosopites, Personatam quidem in latino sonat, sed pro Petasite tamen capitur a Plinio dicente. Folio Personatę nullum est latius, grandes lappas ferentis: quas non in Arcio, sed in Petasite cernimus. Petasiten interpretor, quam uulgo Bardanam, & Lappam maiorē uocant: Arcion, quę Vngula caballina dicitur. Plinius differentiam in nomine tenuem constituit, Petasiten Personatam, Arcion Persollatam appellādo: Persollatam inquit, quam nemo ignorat, Gręci Arcion uocant: folia habet maiora etiam Cucurbitis, & hirsutiora, nigrioraq; & crassiora, radicem albam & grandem. Quę omnia fere cum Dioscoridis Arcio conueniunt. Nominatur & Persoluta, siue Persolyton a Plinio herbę genus Aegyptiæ, in hortis feri corona mentis solitum duobus generibus, mas, & fœmina: inliberi subdita ea, Venerem uirorū maxime prodendo. Illud cōmonuerim, maiora esse Personatę, hoc est, Petasitę ac Bardangę, q; Persolatę, hoc est, Arcij & Vngulę caballinę folia: radicem Personatę candidam, digitali crassitudine, fastidiendi odoris, Persolatę brachiali, & odoratam, flore in spica purpureo. Galenus & hanc, & superiorem eodem Arcij nomine appellat. Quod autem Personata sit, quam Lucius Columella Personam uocari scribit, ne dubitem, facit, quod utilem pecori, quod Vipera mordet, scarificationi superpositam commemorat: quod & Plinius probat, & propterea a nonnullis Echion, quasi Viperariam tradit appellari.

E X M. V E R G. C O M M.

Personata hac utebantur quondam ad personas tota Gręcia & Italia gentes omnes, quociens in Theatris, alijsue locis, qui cognosci a populo nollent, egisse quidpiam uolebant: facili, sed non toto anno ad eam rem ex incultis & pinguibus locis apparatu. Extrema siquidem hyeme, quo tempore nunc expletis totius anni uoluptatibus, ludis & epulis, a ieiunio & cinere, aliam uitam, & alios mores Christiani auspicantur, amissis per gelicidia folijs nullus potest hic eius usus esse. Maio, Iunioq; mensibus frequentem fuisse palilibus & floralibus uerisimile est: tribus decerptis folijs, quorum uno frontem, duobus alijs utrinq; malas uestirent, relicti inter eorum spacia liberis uidendi, spirandi, loquendiq; meatibus. Est enim foliorum Personatę tanta amplitudo, ut longe maius quā humana facies est, tribus uestiri spacium possit. Neq; immerito hic Cucurbitarum folijs comparauit. Figura enim illis responderet, & si pinguiore loco nascantur, magnitudine etiam superant. Causaq; hæc est, cur gręci etiam ab eodem personarū usu Prosopida, & Prosopion uocauerint. Neq; enim uoces illę aliud q; personam indicant. Fuerūt præterea, ut in hoc scriptore legitur, qui in gręcis Aparinen, in latinis uero Lappam uocauerint: quoniam illi congener est. Nascitur ubiq; Personaria: & quoniam desierunt uti ea ad personas, ob eam quam diximus causam Christiani, nec alios habet in sanitate usus, parum hoc nomine nunc cognoscitur.

De Petasite. CAP. CIX.

MYRTHUS

PETASITES PEDICVLVS cubito maior, crassitudine pollicis, a quo prægrande folium, galeri modo amplum, ceu Fungus dependet. Contra phagedęnas, & ulcera quę cacœthe uocant, efficaciter illinitur.

B A R B A R I C O R O L L.

Petasites, dicta uidetur a Petafo, pileum significante apud Gręcos: unde Petasati, hoc est, pileati. Apud Catullum enim ita Castor & Pollux dicuntur. Nec aliud in Mercurio Petasus est q; galerus: quantū Lactantius grammaticus, & alas & talaria cōtineri credidit. In ea uoce, quasi petasum pro pinna capiant: cum legendum sit non petasum, sed petalon quocunq; loco pinna significatur. Ita enim Gręci etiam frondem uocant, ut est apud Iulium Pollucem. Multo s deceptus corruptus in Plinio locus. Alcamenes inquit Phidias discipulus, æreum petasum fecit: qui uocatur Encrinomenos. Alijs petalon, alijs petasum legentibus: cū legendū sit, pentathlos:

quæ nostri Quinquentione uocant, ut est apud Festum: quod & codices manu scripti, & primis impressi formis habent. Quod genus & Myronis, & aliorum operibus ascribitur: ut eodem capite Plinius indicauit. Petasones porro dicimus, quas Græci Pernas, & nostri Pernas uocant, ut Athenæus inquit. De Petasite multa proxime diximus, credentes hanc latine Personatiam uocari, & Græce a quibusdam Echion, ut ait Plinius: nisi quis non Echion, sed Arcion scribi, propter similitudinem cum Arcio, contenderit: cui non contradico ipse.

EX M. VERG. COMM.

Græca uox Petasus est, Mercurij, & Augusti Cæsaris usu in antiquis scriptoribus celebrata. Vterque enim Petasatus describitur. Sed alter, dum cælo precipitem se mittit, aut similis: Alter, dum per diem in sole est, radiosque eius munito capite Petaso hoc toto anno uitat. Est enim Petasus Galerius, cuius forma inter Græciæ ruinas in Mercurij imaginibus adhuc uidetur, ex Homeri & Maronis uersibus descriptis, antiquitatis studiosis nota. Ornauit eadem uox herbam: uocanturque Græci Petasiten, quasi Galeritam herbam, in qua folium pediculo superpositum non aliter in medio, quam in Fungis passim uidetur hæret.

De Epipactide.

CAP. CX.

Epipactis ab alijs Elleborine, aut Borion uocatur. Parua hærbæ, fruticosa, exiguis folijs. Iocineris uitij utilis, & contra uenena pota.

ἐπιπᾶκτις

BARBARI COROLL.

Epipactis, siue quod idem est, Elleborina inter frutices Asiæ, Græciæque a Plinio reponitur.

EX M. VERG. COMM.

Peregrina Italiæ, auctore Plinio Epipactis est: qui inter Græciæ & Asiæ frutices eam, ut uolumine, capite, 20. numerauit. Non satis ut cognosci nostra ætate possit, nec cur Elleborinen uocauerit eam antiquitas descripta. Si nomen ipsum tantum expendatur, non ab re fuerit Elleboro similem, aut congenerem credere. Si contra Theophrastum aliquis audiat libro. 9. de plantarum historia, pro candido Veratro de ea sic tradentem. *μίσγεται δὲ πρὸς αὐτὸν ὅσιν. ὅπως δὲ καὶ ἐν τῷ τῆς Ἰλλυβορίνης αἵματι. ταῦτο δὲ ἐστὶν ποδῶν.* Quorum sensus est. Miscetur autem in Ellebori poculo, ut uomitiones adiuuet Elleborines semen. Herbula autem hæc est. Si quis inquit hæc dicentem Theophrastum audiat, suspicari poterit, non tam quia Elleboro congener sit Elleborinem dici, sed quod Ellebori uim augeat, coniunctaque illi faciliores uomitiones faciat. Vtraque enim ex Theophrasto colligi causa potest.

Pli. li. 17. ca. 20.
Theoph. li. 9.

De Capno, seu Fumaria.

CAP. CXI.

Capnon, aliqui Corydalion, aut Corion uocant, alij syluestre Corydalion, alij Capnon in hordeis, alij Capniten, alij Marititen, alij Capnogorgion, alij Chelidonion micron, alij Peristerion, alij Cantharida, alij Chalcocri, Romani Fumariam, Aegyptij Tucin. Fruticosa hærbula est, prætenera, Coriandri similis, folijs candidioribus, undique numerosis, cineracei coloris, flore purpureo. Huius succus claritatem facit oculis, delachrymationemque. Vnde nomen traxit. Illitus cum gummi, euulsas palpebras renasci prohibet. Commanducata hærbæ, biliosam urinam trahit.

καπνός

BARBARI COROLL.

Capnos, siue Capnion, hoc est, Fumus, duplex. Alia hic descripta nascens in hortis, & segetibus hordeaceis: alia & nomine & effectu similis, quas pedes Gallinæos uocant. In parietibus & sepibus genita, ramis tenuissimis sparsisque, flore purpureo, ut inquit Plinius: quæ nonnulli modo Cimbalarem uulgo dictam, nescio quæ recte interpretantur, folio Hederæ prætenui: ut in Coryledone communissimus. Hanc autem Capnon, quæ nascitur in sepibus Chelidoniam Phragmitem uocare moris est Actio, ad exinanitiones partium in iocinore curuanti utilem dictam: ut puto, quoniam succo discutit caliginem, ut Chelidonia: & ob id in medicamenta oculorum additur: ut in Collyrium Mareiani, eam Chelidoniam Capnitida cognominantis. Quod si eadem probetur esse cum Cymbalari, ut quidam conijciunt, etiam illa similitudo confluet, quod

Pli. li. 25. ca. 17.

T. iij

C folium Hederæ habuerit, quale Chelidoniō minōri cōtingit. Propterea cōsiderari cupio, nunquid non similis, sed eadem omnino sit Capnos hæc, cum Chelidonio minore. Multa cēte paria comperio. Cæterum ex eo q̄ Capnon Plinius a nostris Pedes gallinæos uocari scribit, magnus plerōsq̄ inuasit error, existimantes Capnon a Dioscoride monstratum non aliud genus esse, q̄ quæ uulgo Sanguinaria, & galli Crus dicitur. Pudenda & pœnitenda inscitia: nisi frons attrita multis esset. Quandoquidem ea quæ galli Crus uocatur, Gramini est, tam similis, ut ab eo forte nōn admodum seiungi possit: nisi quod folio minore cernitur, & fibris potius q̄ radice nititur. Id autem q̄ in utroq̄ summo frutice Trifarīn, gallinacēi Pedis imitationem habet, candidius in hac q̄ in Gramine conspicitur.

E X M. V E R G. C O M M.

Fumarie herbe notissima res Fumus nomen quondam fecit: haud sane, quia triciniorum parietibus eorumq̄ cameris inducta, nigredine noceat: aut quia, ut pœta cecinit, suspensam exploret dureq̄ ad fabricam materiam, sed quoniam uis illi contra hominis oculos lachrymosa sit, qualis in Fumo est: ob quam causam Flaccus lachrymosum in carmine suo Fumum appellauit: & Aristophanis seruus, in scenam redisse se dicebat, Fumo coactum, nec potuisse domi cum cæteris esse, ὅτι ἴδαντι τὰ λαίφαρ' αὐτοῦ, quod est, quoniam eroderet palpebras eius & oculos. Quod maximum a Fumo huic parti tedium est: cui potens idem Fumarie herbe succus a Fumo indicata in græcis fuit. Nec tantum Capnon æquali Fumo appellatione eam uocauerunt, sed Capnitim etiam, id est, Fumariam dixerunt. Quemadmodum a similitudine Coriandrum, quæ uox in scriptore hoc multifariam creuit. Alijs simpliciter Coriandrum, alijs agreste Coriandrum, alijs diminutiua forma Coriandron uocantibus. Nascitur in segete hordeacea ait. Plinius tamen adiecit, & hortis: nec male, quoniam frequentior in hortis, q̄ in segetibus inueniatur.

De Loto urbana.

CAP. CXII.

Λωτός ὕμνος

Lotum urbanam, alijs Triphyllon, alijs Libyon, alijs Tripodion, alijs Tribolion uocant. Nascitur in hortis. Extractus succus, addito melle, oculorum argema, nubeculas, cæterasq̄ caligines discutit.

B A R B A R I C O R O L L.

Lotus satiuus, non nisi post annū ex semine suo nascitur. Est & Lotus syluestris. Itemq̄ Lotus Aegyptia, herbe omnes: de quibus paulo post agendum nobis erit. Nam de Loto arbore iam diximus. Quæ sint in Columellæ horto Lotæ Phrygiæ, luminibus gemmantibus, haud scio reddere. Apud Hesperios Aethiopus nasci tradit herbam Lotum uocatam Artemidorus, qua uescentes, q̄libet stiticulofo & squalenti tractu sitim arceant: ob id & Lotophagi Aethiopes, ut inquit Strabo, nominati sunt.

Strabo. lib. 3.

E X M. V E R G. C O M M.

Diximus primo uolumine de arbore, quam ueteres Romani Celtū uocabant, Loton a græcis dictam: ex cuius materia fistulæ quondam fiebant. Dicendum de herbis hoc loco, quarum prima satiuus Lotos est, in hortis quondam uiuens, & in delitijs habita: quoniam ampliore longiorisq̄ uitæ folio in hortis tota æstate uireret. Plinius foliato caule eam tradidit, & antiquiores pœtæ inter herbas Deorum uoluptati nascentes numerauerunt. Quæ omnia hic uariatione tantum indicauit, in paradisis & hortis nasci dicens. Qui deprehendisse eam se iactant, humilem ostendunt herbam, in pratis nascentē, numeroso folio, Trifolio paulo minus q̄ undiq̄ simili. Discrepat, q̄ in Trifolio longiora, minora, & acuminatiora folia sunt: in Loto tria quidem numero, sed longe maiora: nec in acutū ut in illo desinentia, uerum paulo minus q̄ in orbem circumacta. Quæ si satiuus Lotus sit, uulgaris, & cognitu facilis herba est. Fecit trium foliorum eius numerus, ut Trifolium & Tripodium diceretur.

Λωτός ὕμνος

De syluestri Loto.

CAP. CXIII.

Syluestris Lotus, quæ aliqui Libyon, alijs Triphyllon, Romani Trifolium minus appellant. Plurimum in Libya gignitur, caule cubita li, & sæpe maiore, alis multis, folijs Trifolij pratensis, semine Fœnigraci, multo minore, gustu medicato: Vim calfaciendi & leniter adstringens.

diobinet. Vitia cutis in facie, maculasq; cum melle peruncta expurgat. **A**
 Trita per sese, aut cum Maluæ semine, in uino aut passo bibitur apertissime
 contra dolores, qui uescam male habent.

B A R B A R I C O R O L L.
 Lotus syluestris inter aculeatas (ut puto) constituitur, caule foliato, ut Crepis ab ra-
 dice. Quæ sit Crepis nondum comperi. Crepulam certe dici quæ sit Acanthos topiaria,
 Dioscorides affirmat.

Pli. li. 31. ca. 16.

EX M. VERG. COMM.

Similior communi Trifolio Lotus hæc q̄ antedicta est, facilis inuentu inter nos etiam her-
 ba: & si hic plurimam nasci in Libya testetur, ideoq; Libycam a quibusdam dictam. Longo
 enim & acuminato folio, quali Trifolium passim uidetur hæc est. Ideoq; a Romanis, ut in Dio-
 scoride legitur, Trifolium minus appellata. In qua uoce uitium esse oportet. Quoniam non po-
 test nostrati Trifolio respondere duorum cubitorum altitudo, & minus uocari. Nouimus em̄
 omnes Trifolium: ratiocinariq; facillimum est, falso minus Trifolio nostro dici aliquid quod
 bicubitale sit. Vetusiores Dioscoridis latini codices non minus, sed uirus habent. Quæ uox
 cerum non habet intellectum: nec nos augurari aliquid in ea re uoluimus: ob eam causam
 quale in alijs erat, tale relictum a nobis etiam est. Folia Loto huic Dioscorides ait simpliciter
 pratensi Trifolio similia esse: non ut Barbarus uertit, Loti trifoliæ. Non animaduertit ille,
 quis in uerborum cursus in Dioscoride esset. Neq; enim pratense Trifolium Loto ille uocat,
 sed Loti huius folia pratensi Trifolio similia esse testatur.

De Cytiso.

CAP. CXIII.

Cytisus, quem aliqui Telinen, alij Lotum magnū, alij Triphyl-
 lon, Romani Trifolium maius appellant. Frutex est albus in to-
 tum, ut Rhamnus, ramos spargens cubito longiores, folia Fœnigræci, **B**
 aut Loti trifoliæ, minora, dorso medio prominente. Ea digitis trita, Eru-
 tam olent, gustataq; Cicer sapiunt. Folia refrigerant. Tumores inter ini-
 tia discutiunt, si cum pane trita illinantur. Decoctum potu urinam ciet.
 Nonnulli quod apes alliciat, prope alucaria ferunt.

B A R B A R I C O R O L L.
 Cytisus, siue Cytisum, Hederae modo uincit & strangulat sata. Contra Cytiso pestis Ali-
 mon. Densa Cytiso medulla, Ebumq; prouocans. Non ex alio pabulo lactis maior copia,
 aut meliori: in commodum tamen tantisper dum floret, ut inquit Aristoteles, quoniam sit u-
 rentius. Perq; modica eius herba quadrupedes pinguescunt: ita, ut iumeta etiam ordeum sper-
 nant, nec aliud minoris impendi est. Vel mediocri solo prouenit. Seritur semine & caule. Per-
 scitur triennio. Florere desinit uerno æquinoctio, cum & metitur. Aspectu, si quis breuiter
 exprimere uelit similitudinem, angustioris Trifolij. Frutex hic in Cytho insula inuentus, in-
 de translatus est in omnes Cycladas, mox in urbes Græcas, magno casei prouentu: ut mirum
 sit, rarum esse in Italia: æstus, alioris, grandinum, niuisq; omnis demum iniuriæ sine no-
 xa patiens. Intactum quoq; hostibus, propter nullam gratiam ligni, ab Antinomacho Athe-
 nienfi magnis laudibus extollitur. Apium examina Cytiso eliciuntur: quamq; Democritus
 & Aristomachus eas prædicent, nunquam de flore Cytisi pabulum contingere. Columella
 Cytisum, & Zeas, & Carnicin, & Trifarum uocari scribit. Et esse geminam: hoc est, sati-
 uam, & alteram suæ sponis.

Pli. li. 9. ca. 24.

EX M. VERG. COMM.

Quod tacendum huic scriptori non fuerat, lactis copia est, quā in homine facere Cytisum
 testati omnes sunt. Columella ultimo septimi libri capite, his uerbis ad copiam la-
 ctis Cytisum laudat. Mulieres quidem, si lactis inopia premuntur, Cytisum, in qua macerari
 oportet: & cū tota nocte permauerit, postero die expressi succi ternas seminas permisceri mo-
 dico uino, atq; ita potandū dare. Sic & ipse ualebunt, & pueri abundantia lactis confirmabun-
 tur, Plinius itidem lib. 17, cap. 24, de Cytiso hæc ait, Quin & nutricibus in defectu lactis aridū,

C atq; in aqua decoctum potui cum uino dari iubent, & firmiores, celsioresq; infantes fore. Paulus Aegineta etiam comā Cythi iubet præcordijs prægnantium, contra uomitiones ex uetere uino imponi. Nec minus q̄ Malua discutientis & tepidæ naturæ esse. Notissimus quondā frutex hic omnibus agris conlitus, & quo macrioribus, eo citius eum comprehendētibus. Nunc quod sciam, nullibi in Italia est: aut si sit cognitus, sine honore iacet. Prima eum mortalibus ostendit Cytnus ex Cycladibus una: & ex ea omnem peragravit Græciam & Italiam, ubiq; carus & in honore habitus. Post quod tempus in antiquum & natale sibi solum reuersus, non paruum antiqua amanūbus desyderium sui reliquit.

Λωτός
ἡ γένεια

E St & in Aegypto Lotus, quæ aquis provenit, plana irrigantibus, caule fabæ, flore paruo, candido, Lilio simili: quem trahunt occidente sole comprimi, occludique, ad ortum autem aperiri. Adduntq; caput ipsum uespera aquis condi, & ad exortum solis emergere. Caput quale Papaueris, maximum, & intus grana cęu Milij, quæ Aegyptij exiccant, & in panes cogunt. Radicem Lotos hæc habet, mali Cotonei similitudine, quæ cruda coctaq; manditur. Decoctaq; lutei oui speciem exhibet.

Pli. li. 21. ca. 17.
lib. 12. cap. 21.
lib. 21. cap. 17.

L OTUS herba Aegypto uernacula est, Caule fabaceo & petasato: folijs densa congerie stipatis, breuioribus tantū, gracilioribusq; florēs ei similes, ut Theophrastus ingit, Lilio: ut Dioscorides, hordeo. Librariorū in alterutro culpa, Crinon, pro Crithe, cōtrarie scribentū. Copiosi ij & in se farcti, comprimētes se ad occasum solis, aperientesq; ad ortū per uices, donec perficiantur capita, & flos ipse decidat. Fructus in capite Papaueris incisuris, omniq; alio modo, nisi quod crebriora intus grana, Radicem Corlion uocant, operā nigro cortice, qualis & castaneas tegit: interius candidū corpus: quod decoctū cibo gratius est q̄ crudū, siue aqua, siue pruna. Nec aliūde magis q̄ purgamētis eius sues crassescunt. Illud sciendū, auctore Theophrasto, genera huius plura inueniri, distincta flore, fructu, caule, folio, ut nomē fere tantū cōmune habeant, ratio naturæ tota dissentiat. Loton qui arborem putant tantū esse, de qua uolumine primo diximus, uel Homero coarguitur, qui inter herbas subnascentes, Deorū uoluptati Loton primā nominauerit. Est & Lotometra, quæ fit ex Loro sata: ex cuius semine, simillimo Porri, atq; Milio, panibus in Aegypto pastoralibus maxima aqua, lacteue subactis, negatur quicq; esse salubrius, aut leuius, dum caleant. Refrigeratus maiore negotio concoquitur, fitq; ponderosus. Eos qui uiuāt pane illo, nec Dysenteria, nec Tenasmo, nec alijs in uentre morbis infestari prædicant. Incolæ & capita ipsa Loti acervata putrefaciūt: mox separant a putaminibus, lauant, & siccata tundunt: eoq; pane utuntur. In Euphrate scapus & flos usq; in medias noctes a uespera mergitur, ut ne dimissa quidē manu cōprehendi possit. Vertitur deinde, paulatimq; subrigitur, dehiscēte flore ad solis ortū, ut plane a terra absit alte. Hanc Loton in coronas uenire diximus in Myrto: propterea Cratinus eam Stephanonia uocauit: & si Attici omnia folia cea Stephanomata solent appellare. Antinōias uero dicta ab Antinoo: qui e Bithynia fuisse dicitur, per diui Adriani fere tempora, qui & memoriā uiri coluit. In Aegypto, ab eius nomine uocata, delubris etiā in honorem eius dicatis, apud maritimos in Arcadia, quod crimen inde Bithyniam habuisse crederetur. Ut illud tamen quod diximus aliubi, sciamus, Lotum non quæ ceruleum, sed quæ similem Rosæ florem edat, inuentu rarum, Antinōium proprie uocatum, in assentatiōem Adriani principis, poëta Alexandrino: qui finxisset e leonis cruore, quæ Adrianus crassantem in Libya necasset, editum, & Antinōion dicendum, alimentis annuis ex musæo constitutis. Huius rei partim Athenæum, partim Pausaniam auctores habeo. Diminutiuā in Paulo forma, Lotarium rubens legi ad psoras utile. Nisi quis non de Loro Aegyptia, sed de syluestri potius accipiat. Pasillus est, siue orbiculus apud eundem Paulum Dialotarium uocatus, ad genitalium, sedisq; uitia.

L O T U S. **E X M. V E R G. C O M M.**
Longissime Plinius lib. 12. capite. 7. & 9. supra decimū de Loro egit: nihil tamē non a Theophrasto antea dictū retulit. Cuius longior etiā q̄ Plinij de Aegyp̄tia hæc Loro hīstoria est. Mul-

ta tamē reliquit, quæ nouisse pro Dioscoride necessariū sit. Eamq; ob causam, nos quæ a Theophrasto dicunt, isdem uerbis repetemus, non græcis (longius em̄ id esset) sed qualia in decursu uertere licebit. Ea huiusmodi sunt. Quæ uero Lotus in Aegypto appellatur, plurima in campis nascit, cum inundata fuerit regio. In ea caulū natura eadem quæ Fabæ Aegyptiæ: similiter, & foliorū: quæ ille Petasos, quasi galeros uocat; uerū tamen minora ea, & tenuiora sunt. Nascitur Lotus Aegyptia Fabæ Aegyptiæ similiter. Candidū habet florē. Cuius folia sunt angusta, longitudine liliorū folijs similia. Nascit numerosus, densus, & sibi inuicem conuersus flos ille: cumq; sol occidit, claudit, simulq; uasculū sub aqua condit; mox oriente sole aperitur, & supra aquā emergit; agitq; id, donec uasculum perficiatur, & flos defluerit. Vasculi magnitudo est quāta maximi Papaueris, & eiusdem Papaueris modō incisuris intus diuisum. Verū in Loto crebrius semē est, Milio simile. Ferunt in Euphrate hoc amplius uasculū, & flores uespere usq; in medias noctes mergi, descendereq; altius. Neq; em̄ demissa manu inueniri potest. Cum uero illucescit, rursus surgit, subrigiturq; & ad exortū solis supra aquā apparet, ac florē patefacit: patefactoq; etiamnum exurgit, ut plane absit ab aqua. Coacervant in unū uascula hæc Aegyptij, putrefaciuntq; tum putrefactis, cortice in flumine lauantes, semē auferunt: siccantq; & totum in panē pinunt; eoq; utunt cibo. Corsion uocat Loti radicē hanc: ea rotunda est, magnitudine Coronei mali, cortice nigro, foris uestita quall in castanea nuce est: intus candida: quæ tosta elixaq; utellis ouorū similis sapore est, gustu suauis. Estur eadē & cruda. Et hæc Theophrastus. 4. de plantarū historia pro Aegypto Loto. Ex quibus intelligent facile omnes, male in Dioscoride legi, similit̄ hordeo esse: nec sic, sed Liliū uertendū fuisse, cui manifeste Theophrastus eum comparat. Et Plinius ait. Flos qui cādidus est. &c. quo colore Lilia sunt. Accedit his, quod parū uerisimile est, tam grandis plantæ, & quæ *καλὴ*, id est, papauereum uasculum fert, flores hordeaceis similes esse: qui nulli fere sunt. Barbarus in Corollario suo suspicatus id est: & nihilominus in Dioscoride suspiciōē illam penitus neglexit. Facilis & lubricus in græcis lapsus fuit, a crithe, quod hordeum, ad crinon, quod Liliū significat.

De Millefolio.

CAP. CXVI.

B

MYriophyllon, alij Melphyllon, alij Stratioticon, alij Achillion. Latini Millefolium uocant, aliqui Supercilium Veneris, Galli Beliocandas. Caulis est tener, indiuiduus, unica nixus radice, plurimis folijs, Fœniculo similibus. Vnde nomen accepit. Caulis flauescit, prædensus, ac ueluti ex industria delimatus. Nascitur in palustribus. Vulnera recentia ab inflammatione uindictat: si uel uiride, uel siccum ex aceto oblinatur. Præcipitatis cum aqua & sale datur.

MYriophyllon, q̄q; fere Millefoliam significat, alia tamen uidetur esse ab ea, quæ inter Siderites, Achilleon, & Millefolia cognominatur: itemq; ab ea quam in Ethuria Millefoliam uocari diximus: & ab ea quæ Militaris. Alioqui Græci hanc Myriophyllon, illas uero Chilio phyllon appellare consueuerunt.

Pli. li. 24. ca. 169

EX M. VERG. COMM.

Millefolium Plinius græcam Myriophyllon uocat: haud sane, quia in græcā uocē certa eius numeri uis & significatio sit, sed q̄ aptius non poterat in latinis nomen fingi: nec referebat, in re incerta mille potius q̄ decem milia, infinita uē folia illi tribuisse: quod mutato tantum accentu in græcis *μύρια* significant: Quemadmodum nec male penitus dixerit aliquis, mille, pluribusue, aut infinitis pilis constare hominis supercilium. Ex cuius similitudine Veneris supercilium hæc ipsa etiam uocata a plerisq; fuit: quoniam scilicet quemadmodum minuti, densiq; pili eam hominis partem uestiunt: sic Millefolij huius coliculos, minuta densaq; uestiunt folia. Quæ licet hic Fœniculo comparauerit, non tamen eadem longitudine sunt. Huius enim breuia admodum, Fœniculi uero longiora, & quasi capillata. Quod comparatur, copia & exilitas eorum tantum est. Eadem ratio Stratioten, & Achilleam uocari fecit. Breuib; enim & numerosis illæ etiam folijs describuntur, & sunt. De Stratiote non multo ante dictum in hoc ipso scriptore a nobis fuit: & de Achillea longe prius, repetendaq; legentibus ex illis comparatio ad hanc est.

C De Myrrhide. CAP. CXVII.

MYrrhis, quam alij Myrrham, alij Conilen uocant, simillima est Cicutæ, caule folijsq. Radix ei oblonga, mollis, rotunda, cibo non insuauis. Quæ pota in uino, phalangiorum moribus auxiliatur. Cit mēstrua & partus. Subuenit & phthificis cocta in sorbitione. Aiunt quoq. eandem bis die, terue potam ex uino, in pestilentia salutare esse, & ne morbi contagia sentiantur, obstore.

B A R B A R I C O R O L L.
MYrrhis, & Myrrha, siue Murrha, ut ego arbitror a nostris appellata, nōnulli Smyrin. Florem habet Cicutæ: cui & cætero simillima est, minor tantum & exilior. Hanc sunt qui Chærephyllon, siue Chærefolium modo nominatam, & in hortis passim nascentem intelligant. Plinius Chærefolium aliud uidetur genus accepisse: cum inquit, seri æquinoctio autumnii Chærefolium: quod Pæderota Græci uocant, acerrimum sapore, igneiq. affectus, ac saluberrimum corpori. Quæ uerba hæc postrema de Sinapi dicta uideri possunt, de quo statim auctoridem loquitur. Columella horto suo, breue Chærephyllon appellat. Myrrhis proprie Cicutaria latine dicitur, ut in Geranio testati sumus. Inuenio & Mylam genus herbæ, cuius radix paruo bulbo similis dicitur, cōtrahendi effectū uuluis appositū cum farina Lolij. Miror hanc in Dioscoride nusq. legi, cum tamen & Hippocrates id prodar, & Galenus medicinas eius a Dioscoride accepisse fateatur. Aetius radicem syluestris Lapathi, Mylen appellatam prodit, utilem decocto in mobilitate, & dolore dentium.

E X M. V E R G. C O M M.
DERISIMILE est a Myrrhæ odore Myrrhida, & Myrrham dictā fuisse quondā quā modo tractamus herbā. Nullus tamē, quod hæcenus inuenimus, aperte id testatus in græcis aut latinis est. Odorata tamē radice ab hoc, & a cunctis alijs describitur. Poruitq. illi ab ea nota nomē hoc factū fuisse. Cicutæ similem oēs tradiderūt, Eamq. ob causam crediderūt aliqui Cicutariā nūc eam dici. Purgare eam ἡμυνα καὶ λήχια Dioscorides ait: quæ uoces tā notas in græcis, & in commentationibus his nostris significationes habent, ut longius dixisse de eis nō oporteat. Quod tantū monemus illud est: factū fuisse, dum alter ex interpretibus Plinij nūmis q. in scriptore hoc opus erat amar, & sequit, pro græcorū lochijs, partus uerterit. Plinij uerba sunt. Cit mēstrua, & partus cū uino: cum tñ lochia nihil ad partū pertineant: modo partus, qd in cōmuni significatione æstimatiōe habet significet. Sintq. Lochia secundarij, & deinceps a puerperio seminarū purgationes: quæadmodū, ni fallimur, in Aristolochia diximus. Idē superiore cap. de Millefolio caulē eius indiuiduū uocauit, quē ille μωροφυῶν, non qui diuidi nequeat, sed qui singularis nō numero fusus a radice surgit. Hæc nos leuia quidē, sed interpreti non contemnenda signamus.

C De Myagro. CAP. CXVIII.
MYagron aliqui Melampyron uocant. Herba est surculacea, folijs Rubiæ, pallidis, tripedanea. Semen oleosum, collo simile. Quod contusum igni torrent, perunctisq. uirgis ad lucernarum lumina utunt. Hoc pingui, scabricias corporis lauigari, atq. expoliri constat.

B A R B A R I C O R O L L.
MYagros, siue Melampyros, herba ferulacea, ex cuius semine oleum etiā fit. Paulus Aegineta præter hanc genus aliud facit herbæ, quam Myaron appellat, & Melampycon: eiusdem per omnia cum Myagro naturæ. Vt liberiorū fortasse culpa euenit, Myaron, pro Myagro, & Melampycon, pro Melampyro scribentium.

E X M. V E R G. C O M M.
SI Melampyro eadem Myagros est, quod Græci omnes testantur, binominē herbam facientes, in triticea segete nasci, auctore Theophrasto constituendū est, qui, s. de plantarum historia, uolumine Sicilia Melampyrū priuatim assignat: & contra q. in Avena & Lolio fit innocentē, & Tritico nihil officientem describit: nec uox aliud indicat, q. nigri coloris Triticum. Quemadmodum forte Myagros, quod mures uenatur & perimit: in illo niger, in plarisq. seminibus color rem certam facit. In hoc rarus euentus, præterq. ex historia constitui non potest. Quæ nō

bis nulla est; nec nos nisi ex uocis significatione rei coniecturam hanc facimus.

De Oenagra. CAP. CXIX.

Oenagra, siue Oenothera, aut Onuris. Frutex est arboris instar, prægrandis, amygdalino folio, Lilio non dissimili, flore roseo, magno, radice candida, pusilla, cum siccata est uinum olente. Nasctur in montibus. Aqua in qua radix maduerit, in potu data, feras mitigat, & cicures facit. Illitu quoque tetra ulcera mulcet.

BARBARI COROLL.

Oenagran, & Oenagron, & Oenotherā, & Oenotheram, & Onuthurida, & Oenotheridē uocamus, aliqui Oenar. Sic hæc & quæ dicitur Oenutta, qua corui & canes inebriantur, ut Hecatanus inquit, non affirmarim.

EX M. VERG. COMM.

Discrepant non leuiter in radice Oenagræ historia Theophrastus & Diosc. Candida hic, ille rubentem tradit. In reliquis eadem ambobus omnia. Et Theophrasto huiusmodi sunt. Radix Oenotheræ mitiores & hilariores mores facit in uino pota. Habetque solum Amygdalæ simile, uerumtamen latius. Florem rubentem ceu Rosam. Ipse grandis, ut inter frutices est. Radix illi grandis & rubens, quæ siccata uinum olet. Amat montana loca. Ex his multa in impressis scriptoris huius codicibus emendare licuit. Primumque non γλυκύτερα, id est, dulciora eius folia, sed πλατύτερα, id est, latiora legi oportere. Mox in radice non μικράν, id est, paruum, uerū μακράν, id est, longam. Nomen illi ab euctu factum. Quodque Theophrastus ait, mitiores & hilariores mores facere, eodum pertinet quo hic ait, potu diluto eius leniri ferocientium omnium animalium feritatem. Nomenque id significat, siquidem οἰνάγρα, & οἰνόθηρα, siue οἰνόθηριον ex eadem ui capiendi, tenendi & domandi uoces sunt. Significatque οἰνάγρα quemadmodum & podagra, aliaque huiusmodi, quæ uino capiat, uenetur & domet. ἀγρίων enim in uenatione capere est: nec minus etiam θηρίων, a quibus uerbis Græci transferentes multa huiusmodi finxerunt. Et inter cætera οἰνάγραν hanc, & οἰνόθηραν. Egit de ea Theophrastus cum numeraret quæ diuersis locis uina, aut uinosa alterutram hominis partem, corpus. s. aut animum mouent. Videturque Theophrastus non tantum ad mulcendam brutorum feritatem uini illi esse ostendere, uerum inter homines etiam uelut inducta non ebrietate, sed quam Græci οἰνωσις uocant, tristitiæ ex uino remissione, usum eius quondam fuisse. Hic tamen ad ferocientia tantum animalia contraxit. Neque ab re, quando in iuuenorum domitura Columella præcepit eorum tergora tractare, & respergere mero: quo familiares bubulco fiant. Idemque a mellarijs etiam in apibus seruari. Rationem ex natura uini colligere facile est. Theophrastus etiam quo diximus loco, eā breuiter reddidit. Non male in ferocia & tristitia hominis, sine ebrietate & poculorum sumptu radice Oenagræ huius uteremur, si quemadmodum inuentu, sic cognitu etiam facilis esset.

De Crifio. CAP. CXX.

Crifion aliqui Buglossum magnum uocant, Romani Spinam mollem. Caulis est tener, duorum cubitorum, triangulo similis, anguli spinosi, per interualla molles, folia Buglossio similia, maiora, subcandida, modice hirsuta, partibus extremis aculeata: cacumen caulis orbiculatum, hispidum, in quo capitula purpurea, quæ soluuntur in lanugines. Radicem huius loco laboranti adalligatam, dolores uariæ cum sedare, Andreas scripsit.

BARBARI COROLL.

Crifion potius, quæ ut quidam legunt Crifion, a uaricibus dicta est, quibus utilis existimatur. Ita enim Varices ab Hippocrate dicuntur, quas Aristoteles Ιξίας uocauit. Huic herbe similis est quæ Hircina lingua uulgo dicitur, sed caule tamen rotundo, non anguloso ut Crifion. Nec dissimilis huic uidetur quam Porraginem, siue Borraginem olitores nostri uocant, flore intermixto purpureo, Crifion iuterim ceruleo: quæ si Crifion non est, mirum quam obrem sit indicta ueteribus, quæ sit & uulgarissima, & cibo grauissima: nisi quis Buglossæ generibus contribuat.

A

οἰνάγρα

B

κρίσιον

Pli. li. 27. ca. 8.

C

Anp Atticus

De Astere, seu Inguinali.

CAP. CXXI.

Aster ab aliquibus Bobonion appellatur, ab alijs Astericos, alijs Asterion, quibusdam Hyophthalmion. Romanis Inguinalis, Dacis Rathibis. Cauliculus lignosus, florem in cacumine habens purpureum, lutumue, & in ambitu diuisum Anthemidis modò capitulum, pusilla in eo circa caulem folia, stellæ modò radiata, oblonga, hirsuta. Feruenti stomacho, oculorum inflammationibus, procidua se di, ac inguinibus illitu auxiliatur. Tradunt purpureum florem, si ex aqua bibatur, anginis, et pueris comitiale malum sentientibus opitulari. Inguinum inflammationi recentem illinire conuenit. Si aridus flos sinistra dolentis manu decerpatur, & inguinibus adligetur, dolore liberat. Stellares huius radij noctu splendent: quapropter qui ignari antea non uiderunt, esse inane simulacrum arbitrantur. Medijs faxis & asperis exit. Inuenitur autem ab opilionibus. Crateuas Rhizotomus hæc de ea refert, si uiridis cum axungia uetere tundatur, contra rabioforū morfus, turgentia guttura proderit. Suffitu quoq; serpentes fugat.

BARBARI COROLL.

D

Aster Atticus, siue Inguinaria, folijs oblongis duobus, aut tribus, passim in uepribus nascens, ut Plinius scribit, Argemonion a quibusdam uocari dicens. De hac Galenus bis uidetur scripsisse medicinas, uno loco Astera Atticon uocans, altero Bubonion. Qualis autem Paulina sit herba, quæ in Mycenensi agro ad Iunonis fanum Asterion uocatur, a flumine terram illam rigante, quia in ripis nascitur, cuius folia Iunoni sacra in coronas sibi necunt accolæ, non comperi. Est & alius Aster, nunc uulgo Stella dictus, folio fere Vitis, seu Maluæ potius erraticæ, ad radicem maiore, pluribus, sed minoribus diuisuris: florem fert in modum stellæ, in luteo uiridem, pusillum, & herbæ suæ similem. Ad herniam puerorum, & uulnera commendant hanc. Eius decoctum quæ uirgines uideri uolunt, insident. Veteribus dicta Indicta sit, haud scio.

EX M. VERG. COMM.

Tanta, tamq; presens contra Inguinæ, rorumq; dolores uis Inguinalis herbæ est, ut adalligata solum in eo malo, medicinam faciat. Idq; grauissimi Grecorum medici testati sunt, Galenus, Paulus Aegineta, Plinius etiam, & hic ipse, cui non minus curæ fuit hæc inuenire q; docere. Sit ergo illi Asteris nomen, a foliorum in floribus figura, & situ: sint & Asteriscos, & Asterio. In cunctis enim stellæ uis & significatio est, quam græci astera uocant. Solaq; hæc nominis huius causa habeatur. Non quia noctu & in tenebris stellarum modo fulgeat, ut posteriores græci etiam crediderunt: quorum aliqui inutiliter in extrema capitis huius coronide addiderunt, quæ in alijs interpretibus leguntur ab eo principio. Nascitur autem media inter petras. &c. Omnia enim ex eo loco, usq; ad reliquum caput, ex hac opinione illi accreuerunt. Nos earesecimus, nullibi in antiquissimis & optimis græcis, latinisq; inuenta. Quodq; nec Plinius huiusmodi aliquid non relicturus, nec Paulus Aegineta, nec Serapion, nec antiqua huius scriptoris interpretatio ostendunt. Acceditq; his omnibus, ut cum superstitiosum aliquid, aut qd ad religionem nostram pertineat, in hoc scriptore legitur, persuaderi non possumus, eius esse: ut sæpe alias testati sumus. Aster itaq; id est, stella, ob eam quam prius diximus causam dicta herba Inguinalis est. Adiecerunt illi, ab Atheniensium agro notam ueteres græci, q; illic ob solito tenuitatem frequentior, aut melior forte nasceretur. Bubonios eadem ab istdem græcis deinde dicta est, quoniam Inguinibus, quæ bubonas illi appellant, tam presentis remedio medetur, ut adalligata tantum medicinam in eo malo homini faciat. Hyophthalmos postremo, quasi suis oculis: q; totus eius flos animalis illius oculum referre uideatur. In quo animaduertendū est, quod hic ait, habere Inguinalem herbam purpureum & luteum florem, ad diuersas floris partes referendum esse. Sunt enim in eo purpurei coloris folia. Quod uero medium inter ea folia capitulum est, Chamæmali modò lutescit. Et hæc pro nominum & floris historia satis sint.

De Isopyro. CAP. CXXII.

A

Isopyron aliqui Phasiolon ob similitudinem uocant, quoniam folium, quod est Aniso simile, in pampinos torquet. Capitula sunt in summo caule, tenuia, plena seminis, Melanthij gustum imitantis. Contra tussim, & cætera pectoris uitia, semen ex aqua malsa bibitur. Hepaticis & sanguinem excreantibus utile.

BARBARI COROLL.

Isopyron, & Phasiolos, & Phasilon quoque dicitur. Alia uidetur herba esse quam Theophrastus Ision uocat. Theodorus more suo, Aequum. Duplici fastigio, nigrum, & candidum. Flos, fructusque illis pro ratione discriminis, niger, aut candidus: quancumque & medio inquit colore fructus quandoque cernuntur, & flores in purpuram inclinantes, uirgis & folio tenuioribus atque leuioribus. In Aetio Ision dici herbam quandam uideo, cuius cibo pituita detrahitur: nec satis animaduerto an eadem sit cum Iso. Alexander quoque in problematis, si locus memoria non excidit, Ision herbam inter olera dinumerat.

ισόπυρον

Pli. li. 27. ca. 11.

EX M. VERG. COMM.

Qui Isopyron hanc deprehendisse nostra ætate uideri uolunt, herbam a radice statim folio sam ostendunt, & ex medio surgentem colicolum: in quo antequam in ultimū cacumen definat, quod florem & sub eo plenum seminis uasculum sustinet, utrinque uolutæ duæ se spargunt phaselorum cirris & clauiculis similes: quas hic *ἰσάκας*, ut in uitibus uocat: folijs quadamtenus rubentibus, contractioribusque Plantaginis, sed eadem latitudine, & in aliquibus maiore. Quo fit, ne credamus Isopyron scriptoris huius eam esse: si Dioscoridi, Plinio, graecisque alijs credendum est, qui omnes Anisi folio eam describunt. In cæteris non dissimilis species diligentiam eorum probat. Nobis in neutram partem inclinat animus, & quale a graecis traditur, Isopyron tale reddidit a nobis etiam est.

B

De Viola purpurea. CAP. CXXIII.

Violam purpuream, aliqui Dasypodion, alij Priapcion, alij Ion syluestre, alij Cybelion, Romani Violam purpuream uocant. Folium habet Hedera minus, tenuius, ac nigrius, nec multo dissimile. Cauliculus a radice prodit, in quo flosculus suauiter olens, purpureus. Opacis & asperis nascitur. Refrigerandi naturam habet. Folia per se, & ex polenta illinuntur aptissime stomacho æstuanti, & oculorum inflammationibus, sedique procidenti. Aiunt quod purpureum est in flore, anginis & comitialibus auxiliari, maxime pueris, in aqua potum.

BARBARI COROLL.

Violam, Graeci Ion pro flore, Violarium Ioniam, pro frutice appellant. Nicandee in georgicis Ion uocatam credit Violam, quia nymphae quædam Ionæ, florem eum Ioui primum dedere muneris. Nascitur uitis modo e supernis: quasi e puppi dicas, non prora, ut Ruta, Sisymbrium, Serpillum: eoque omnes Phrygana, hoc est, surculi siue cremia Violæ dicuntur: excepta nigra: quæ hoc capite describitur. Viret hæc perpetuo, & ut quidam ferunt, si certo genere colatur, anno toto. Serit plantis ut olus. Vere floret, post Leucoion, & ante Flammæam. Cui Ion Graeci dicunt, nigræ, seu purpureæ fere intelligunt. Humilis hæc, & latiore folio, statim ab radice multa carnositate exiit, sine ramis: ob id uulgo loripedem Violam uocamus. Hæc nomine a cæteris distinguunt, solè la appellatæ Graecis: ut ab ijs Ianthina uestis, et Viola cea diceretur. Alia Violarum genera in Leucoio reddidimus. Violas farranas, a colore, cum purpureis easdem esse apud Columellam arbitror. Purpureas, Vaccinia et Hyacinthi dici, Seruius grammaticus existimat. Dioscorides quoque Hyacinthi latine Vaccinium appellari scribit. Admonendi sunt qui hæc legunt, purpureas Violas duorum generum haberi. Alias inter Loripedes siue sessiles, de quibus hic agitur: alias inter Leucoia, odoratasque omnes esse. Sed & candidarum quoque gemina hæc discrimina cernuntur. Alias Loripedes: alias Leucoia. Leucoia intelligo, quas Mauritania Cheiri appellat: Loripedes, quæ uulgo Claudæ nominantur, & Maurice Senephigi.

V ij

C Quæ ferrugineos Hyacinthos, & nigra Vaccinia uocari a latinorum poetis fecit nigricans purpura: uel, ut aptius loquamur, in nigro purpureus color: eadem Theophrasto, grecorumq; alijs scriptoribus causa fuit, ut Viola, quæ nunc tractanda a nobis est, nigra dicere tur: tam frequenter, receptoq; passim in ea coloris discrimine huiuscemodi, ut multis locis Theophrasti in plantarum historia nihil certius intelligatur: ubiq; *μύλαν* *ἰόν* dicenti Violam: quæ nigricante purpura, ad murorum radices, hortorum marginibus, & sepibus florens prima, aut cum primis aduentum Veris mortalibus nunciat; nota uulgo, & ubiq; inuentu facilis: quæ toto anno uiuat, & flores tenui quidem, sed longiore coliculo altius a terra inter folia erigat. Quæ hic merito Hedera comparatur: quoniam proximè ad eam figuram accedunt. Muraria Violam a latinis uocari in Dioscoride legitur. Nescimus tamen q̃ uetusta ea uox sit: sed quæ cumq; ea est, naturæ eius respondet: quoniam ut diximus, ad murorum radices, umbrosis locis frequens & speciosa nascitur. Eadem causa fuit, cur syluestris Viola itidem diceretur: quoniam in locis non cultis nascitur: nec uiolaria in hortis ut cæteræ illi cognomines habet. Poruit quendam etiã religione aliqua, & numinis gratia commendari: ideoq; Cybelios Viola ab antiquissima dea Cybele dicta, laudem potius q̃ nomē id intuenisse. Sed nobis nulla est eius nominis certa ratio, aut coniectura. Quemadmodū & reliquæ aliæ penitus ignotæ. Nisi Priapeios non dissimili ratione, q̃ Cybelios ab antiquo ruris & hortorum numine dicta fuerit. Descripsit eam Theophrastus libro sexto de plantarum historia, dixitq; *προερίσθηλλον καὶ ἀνθούλον ἴσιν καὶ ὡς τινος φασὶ διναμένην διόλου φέρειν τὸ ἄνθος τὰν τροπῶν τινὲν θραπύνηται*. Quod est. Exire & uiuere folia eius in radicis capite tantum, perpetuq; uiuere fronde. Id enim uoces illæ duæ significant. Facileq; est uidere foliosum Violæ huius cespitem, nullis caulibus, aut ramulis a terra surgentem, quod cæteræ habent Violæ: neq; æstu anni arescere, aut hyeme, quod aliæ patiunt, sed post amissos flores, uiuentibus folijs medicinæ toto anno etiam inferuire. Adiecit præterea, testari quosdam, posse hanc Violam continuè toto anno florere, si aliqua ratione curetur: quam tamen ille non retulit, nec quibus locis id excoGITauerint homines. Adiecit eodem libro idem scriptor, differe hanc a reliquis Violis in reliqua natura, præcipue autem ὅτι πλατύφυλλος καὶ ὑγρόφυλλος καὶ σαρκώδης ἴσιν, q. f. latiore folio q̃ reliquæ Violæ sit: intelligitq; reliquas Violas Leucoia ab omnibus appellatas: eodēq; folio sit ὑγρὴ, id est, terrestri, quod a terra non surgat: & præter id carnosum & pingui. Quæ omnia longius forte dicta aliquibus uidebuntur. Sed nos rerum certitudini consulentes, obscuriores breuitate nolumus fieri. Quo consilio, in Violæ huius signando colore, a principio statim usi sumus: & contra aliorum interpretum additiones, nigram, nō purpuream Violam proposuimus. Ne si purpuream diceremus, miscerentur diuersi coloris congeneres flores. Sunt enim in Leuciorum genere purpureæ Violæ, quas Columella Sarranas ab eadem purpura, & Sarrano ostro appellat, in censu earū & ordine quæ furculosæ sunt: in parietibusq; & hortis nascuntur, aliter q̃ hæc dispositis in flore folijs, & plures uno pediculo pendentes: quæ proprie & uerius Purpureæ uocantur. In illis enim uera est purpura, quemadmodum in his in nigro purpureus magis color q̃ purpura. Et hæc pro notissimi floris historia satis sint. Quibus adijciemus, mutasse nos titulum capitis huius, & de nigra Viola inscripsisse: quoniam res id exigebat: & in melioribus græcis, aut nulla coloris nota addita fuerat, simpliciterq; de Viola caput inscribatur: aut *ἰόν μύλαν* in aliquibus legebatur.

De Cacalia. CAP. CXXIII.

κακάλια

C A C Alia quæ Leontice uocatur, folia fert magna, alba. E quibus medius caulis emicat, rectus, albus, florem ferens Robori, aut Oleæ similem. Radix in uino madefacta ut tragacantha, delinctu, aut manducatu per se iussibus, scabrics arteriæ medetur. Grana quæ post excussum florem innascuntur, trita, & cū cærato illita, faciem erugant, & cutem extendunt.

Pli. li. 15. ca. 9.

BARBARI COROLL.

C Acaliam putant esse, cuius semen a Plinio margaritis minutis simile reddatur: dependens inter folia grandia, in montibus fere nascentem. Hanc Galenus Cancanon uocauit. Differt ab hac Acalis, item Caucalis: de quibus ante dictum est. Paulus Acaliam, non Cancanum, sed Cancano similem esse tradit.

Cacaliam descripsit Plinius, 25. uolumine, cap. 9. Leonticemq; uocari & ipse ait. Minutis margaritis simile habere semen, inter folia grandia pendens: nataleq; illi plerumq; montes esse: nec ultra in historia eius quicq; tradidit. Nos uero descriptum ab eo florem fuisse optabamus: ut quod in antiquis grecis hoc capite uariat, certius constitueretur. In cunctis enim, uno excepto, q; nobis uetustissimus & probatissimus codex Diosco. est, legitur. *ἄθος ἔχων τοῖκος ἀπὸ ἡ ἰδαία*. Quod si uerbum de uerbo fiat significat, florem habens quercui, aut oleæ similem. Eamq; lectionem secuti cæteri interpretes, Querno, aut Roboris flori simile fecerunt. Nos musco, aut oleæ uertimus, ueterum & meliorum codicum fidem secuti: in quibus ut nos credimus, antiqua & uerior lectio est. *λευκὸν ἄθος ἔχων τοῖκος βρύα ἡ ἰδαία*. Quod est ut nos diximus, flore candido, musco, aut oleæ simili. Sumusq; ad hanc interpretationem, præter grecorum fidem, latinorum etiam, antiquissimis monumentis usi: inter quæ longobardis literis scriptus Diosco. nobis est, in quo manifeste Bryo similis legitur. Est autem grecis Bryon, qui in torrentibus, aut arboribus concreuit muscus. Cui in comparatione respondent oleagini flores, qui passim a cunctis muscosi dicuntur. Quæ ratio etiam nos monuit, muscum magis q; quercum, aut robur hoc loco uertere. Nihil enim muscoso Oleæ flori simile habent querni, aut robustei flores. At contra bene ad terij floris similitudinem alternantur muscus, & oleagini flores.

De Bunio Napi genere.

CAP. CXXV.

BVnion aliqui Aton, alij Acunen, alij Anemosphoron uocant. Magi Paradacry, Aegyptij Ersfonen, Romani Scopam regiam, Aphri Zigar, nonnulli Thepso. Caulem ædit quadrangulum, digiti longitudine, in quo ramuli minutis folijs ac floribus scatent: folia proxime radicem Apio similia, longe tenuiora, coriandrinis proxima: flores Anethi: semen odoratum, Hyoscyamo minus. Vrinam ciet, Excalfacit. Secundas euocat. Lienî, uesicæ, renibus utile. Tam humidi, q; sicci, expressiq; succi caulib. folijs, radicibusq; usus inualuit ex aqua mulsa.

EX M. VERG. COMM.

Alterum, & primum in diuisione Naporum genus Bunion hoc facit: describiturq; a cunctis isdem huic scriptori notis & uiribus. Non tamen in sanitatis usu receptum a gentibus, ut alterum & secundum illud est. Quod sceminiuo genere Buniada greci uocant, secundo uolumine a Rapis statim, quasi eiusdem illis generis, ab hoc scriptore tractatum. Vtriq; radix crassior, sed contra q; in Rapis acuminata longitudinis: huic etiam exilior q; Buniadis, & minor. Egit de eo Plinius lib. 20. cap. 4. cum de reliquo Naporum genere ageret: Nomen ambobus factum aliqui tradiderunt *ἄπο τῶν βουνίων*. Vocant autem greci inter alia Bunos, tumentia, & quæ in amplitudinem creuerunt: quæ Naporum radicis forma est. Cur autem in Diosco. legatur, Scopam regiam Bunion a Romanis dici, ignotum nobis est. nihil enim habet planta hæc quod scopis congruat: non furculosam naturam, non usum, non folia, non aliud quidpiam quod scoparum rationem indicet aliquam. Ignoræ aliæ appellationes etiam. Sola Arction ex similitudine facta est: quam nos Pauli Aeginetæ autoritate instaurauimus. Non legitur in Barbari æditione hoc caput. Nec nos scimus, relictum ne a librarijs imprudenter in exscribendo fuerit: an potius quia de Napis secundo uolumine actum fuerat, ratus abundare, uolens ipse & prudens id reliquerit. Siquidem in Corollario etiam nihil actum de Bunio ab eodẽ est. Verumtamen autoribus grecis omnibus recipiendum, & cum cæteris uertendum fuerat. Qui enim de Pseudobunio agi mox poterat, nisi de uero Bunio actum prius fuisset? Verè enim alicuius oportet falsam & mentientem in plantis esse. Calido temperamento Bunion esse, Paulus Aegineta decreuit: ideoq; urinam, & menses ciere.

De Pseudobunio.

CAP. CXXVI.

Pseudobunio palmi altitudine fruticat, in Creta, folia, ramulosq; Napi ferens, acri gustu. Tormina, atq; stranguriam, laterumq; dolores sanant quaterni rami eius poti in aqua. Illi quoq; cum sa-

D I O S C O R I D I S

C le & uino, tepentes, anginam discutunt.

E X M. V E R G. C O M M.

Q Vale Pseudobunion sit, præter Dioscoridem, Plinium, cunctosq; alios, qui omnes Na-
po similem tradiderunt, nomen ipsum etiam indicat. Neq; enim mentiri ueram Bu-
nion, nec fallere carpentes posset, nisi similis illi esset: eaq; similitudine fallens, falsum & men-
dax Bunion a græcis dictum est. Monere aliud legentes in eo non oportet. Peregrina enim Ita-
licæ herba, & ex Creta repetenda est.

De Chamæcisso. C A P. CXXVII.

C Hamæcissos, alio nomine Chamæleuce, alio Cissos acarpos, aut
terræ Corona, aut Selinitis, Latine Hædera pluuiatica dicitur.
Folio est Hæderæ, tenuiore, longiusculo, ramulis quinis senisue, dodran-
talibus, foliosis, flore Violæ albæ simili, candidiore, ac tenuiore, gustu
supra modum amaro, radice tenui, candida, inutili. Nascitur in culis. Bi-
bunt conuenientissime ischiadici folia, tribus obolis in aqua cyathis tri-
bus, tricenis, quadragenisue diebus. Eodem pota modo senis aut septe-
nis diebus regium morbum purgant.

B A R B A R I C O R O L L.

C Hamæcisson uocant Hæderam, non attollentem se a terra. Spicata est Tritici modo hæc, et
Cissos Epigeos, id est, Hædera terrestris appellatur.

E X M. V E R G. C O M M.

Similem tantum, non congenerem Hæderæ Chamæcisson sua appellatione græci fecerunt:
licetq; terrestre, & humi serpente Hæderæ ea uox significet, non tamen Hæderam intelligere o-
porteret, sed herbam cultis locis nascētem, hederaceis folijs, neq; his tota figura. Fastigiantur em
in longitudinem: quod in Hædera non fit. Spargit per terram ramulos hæc suos, non plures qn
q; aut sex: quemadmodum omnes tradiderunt. Nullos fert corymbos: ideoq; sterilis Hædera a
plurib; dicta quondam fuit. Eadem terræ Corona quondam uocabatur: quoniam ramulos su-
os per eam spargens, folioso ueluti ferto terram coronare uidetur. Eam ob floris colorem Plini-
us ait Violam albam existimari posse, cum floret. Cæteri lutei coloris florem illi assignant. Nec
male forsitan: quando Leucoiorum uox, quibus flores eius hic comparat, nō album magis qm
reliquos eius floris colores indicat. Eamq; ob causam nos, seruata græcorum uoce, uertimus,
Violis quas Leucoia dicunt, similes eius flores esse.

De Chamæleuce. C A P. CXXVIII.

C Hamæleuce lumborum doloribus propicia est, hæba uirens,
incuruis folijs, furculisq; flore rosaceo.

B A R B A R I C O R O L L.

C Hamæpeuce, non Chamæleuce, ut fere habent codices, legendum arbitror: quoniam Cha-
mæleuce Populago sit, & Bechion, Chamæpeuce uero Laricis folio similis ostenditur: unde nō
men quasi Larix pumila.

E X. M. V E R G. C O M M.

Nulli inueniuntur in græcis antiqui scriptoris huius concordēs in hoc capite cōdices, duō
saltem: tam male & infelicitè actū cum illis etiam in bonis artibus, ex multo tempore est. Sed
Chamæleucem alius tractandam in hoc capite proponit: alius pro ea Chamæpeucem habet.
In alijs nullum est hoc caput: in quibusdam cum Buglossō, quæ sequitur, & in extrema eius par-
te Chamæleuce miscetur. Et præter id, alijs breuissime rem, longius alijs absoluunt: tam consu-
so intellectu, & rei inconstantia, ut quid reddendum nobis esset diu dubitauerimus. Accessit
tandem anxius animo Plinius, monuitq; librō utcesimo quarto, capite, scilicet, in anticipi Chamæ-
peucem potius legendum esse: qm quod hic ait πόντι πρὸς ὁσφύας ἀλγύματα ἐν ὕδατι λίαν πινόμενα, il-
le dixerit, lumborū & spinæ doloribus propicia est, eodē rei sensu & uerborum ductu. Veri-
simileq; est, ex his quæ Plinius eadē Dioscoridi reddidit, Chamæpeucem legisse, & hanc fuisse
eius ætate capitis huius sectionem. Chamæleuces enim aliæ uirgēs, & alia remedia sunt. Nec
scripsitq; idem Plinius eodē loco Chamæpeucem Laricis folijs. Suspendit animo nos tan-

tum Paulus Aegineta libro sexto nullibi tractata Chamæpeuce, Chamæleucem describens: eamq; in tertio ordine calefacere, in primo autem siccare dicens: quo fit, ne pro comperto constitutur aliquid audeamus. Multis em̄, iisdemq; magnis indicij, & auctoribus pugnat: nosq; in tanta uarietate id elegimus, quod latini scriptoris, saltem deficientibus, græcis auctoritate tueretur. Id certe non tacebimus, uideri nobis non esse integrum Dioscoridis hoc caput. Quale etiam est quod statim sequitur, Buglossum.

B De Buglossio, seu Lingua bubula. CAP. CXXIX.
Buglossum Magi Aelurigonon, Osthanes Tranochi, Aegyptij Besor, Romani Linguam bubulam, alij Libanium, Poeni Anapha uocant. Nascitur in campestribus & uaporosis. Iulio mense colligitur. Aiunt eam quæ treis thyrsos emittit, cum semine & radice tritam, potamq; , contra tertianos rigores prodesse, quæ quatuor ad quaternos. Ea in uino decoquitur. Hærbam abscessibus utilem esse uolunt. Verbasco simile est, folium in terra sparsum, nigrius, asperum, bubulas imitans linguas. Quod in uinum deiectum, animi uoluptates auget.

B BARBARI COROLL.
Buglosson, & Buglossos, & Buglossa dicitur. Cato Linguam bubulam appellat: util em̄ in fitionibus obregendo cortice, ne imber in librum permanet.

Pli. li. 25. ca. 3. 7

D EX M. VERG. COMM.
Iximus non multo ante in Cirso, quid alij de ea & Buglossio hac nostra ætate sensissent: diximus etiam, quid nobis in ea re magis placeret, & quibus coniecturis mutata inuicem duarum herbarum nomina crederemus. Polliciti præterea sumus, in Buglossio hac addituros esse aliqua. Quæ nulla modo alia sunt, q̄ propensiores continue in eam partem fieri, ut credamus, quam ueteres Buglosson dixerunt, nostræ ætatis Borraginem esse. Vt utiq; ad eam rem hac etiam coniectura: q̄ M. Cato. 40. capite operis sui de re rustica, insitione arborum docens, cum instituisset quatenus, & quomodo furculos inseruissē & circumligasse oporteat, addidit, Insuper Lingua bubula obregito si pluat, ne aqua in librum permanet: eam Linguā insuper librum alligato, ne cadat, &c. Verisimileq; est, in operiendo truncæ & insitæ stirpis rotunda sectione, rotundiore potius q̄ longiore folio uti præcepisse. At Borraginis tale est. Eius uero quæ nunc Buglossus habetur, longa folia sunt: ideoq; operienda rotundæ stirpi minus apta. Scimus quidem, non posse, nec debere rem certā docentes, tā incertis & ambiguis uestigijs niti: potuissēq; antiquos insitores illa etiā uti: quoniā satis esset insitā stirpem quocūq; operimēto a pluuia defendere: & quod primū inferenti se obtulisset, luto, palea, alijsq; huiuscemodi uis. Non tamē neglegendū, qualecūq; id fuerit, ignotæ rei uestigiū. Nec nos alio consilio id retulimus, q̄ ut haberent legentes, hanc etiā eruscandæ ueritatis ausam: scirentq; , antiquæ Buglossi, quā Cato, oēsq; alij a boum Linguis, quas imitat, bubulam Linguā dixerunt, hunc etiam fuisse in rustica re usum. In urbana autē præcipuū, quod in scriptore hoc postremū est, deiecta in uinum Buglossi folia, uoluptates animi, & læticiam augere: neq; ultra hunc usum Buglossio aliud multifaciendum ab antiquis scriptoribus tribui. Plinius. 25. uolumine, capite. 9. sic de ea egit. Iungitur huic Buglossos boum Linguae similis: cui præcipuum, q̄ in uinum deiecta, animi uoluptates auget, & uocatur Euphrosinon. Mox. 16. capite. 12. Buglossio inarescente, si quis medullam e caule eximat: dicatq; ad quem liberandum febre id faciat, & alliget ei septem folia ante accessionem, aiunt a febre liberari. Quod amuleri potius q̄ medicinae rationem haberi Paulus itidem Aegineta in sexto, de Buglossio hæc tantum monet. Βούλυσσον ὑγρόντι καὶ θερμὸν ἐστὶ τῇ κράτει. ὅθεν τοῖς δινοῖς καὶ καλλόδοξοις ὑποροῦντι ποτὶν ἔχεται. Quod est. Humidum calidumq; temperamento Buglossum est. Eamq; ob causam uisio iniectum, læticiam animi facere dicitur. Nec ultra hæc quicquam de Buglossio tradidit. GALENVS etiam nihil dictis ab alijs aliud addidit, quàm uisibus & faucium asperitatibus utilem esse. Nullusque non ex antiquis, læticiæ & uoluptatis spem in Buglossi usu legentibus proponit: quod in Borragine nunc passim fertur. Verisimileq; est, quali per manus traditam seu opinionem, seu famam ad nos peruenisse, & adhuc seruari. Non utimur ad hanc rem populari, omnino sensu, & iudicio plebis: non tamē negligimus penitus. Quodq; nos magis urget, Cirsi historia est, in

V iij

D I O S C O R I D I S

C qua flores ἀκροκόρυμποι, id est, in summo purpurei describuntur: qui color proprius floris eius est quā Buglossum nūc passim uocant. Vrgent longiora folia quæ in Borragine decurtatæ rotunditatis sunt. At dicit aliquis: boum Linguis similior nostræ ætatis Buglossus q̄ Borrage est. Non negamus id. Veruntamen illud etiam monemus, nescire modo nos quæ fuerit antiquis Græcis comparationis huius ratio: & quid nam boum Lingux illi comparauerint: uerbi causa asperitatem, latitudinem, colorem, longitudinemue. Pro nostræ ætatis Buglossio longitudo præcipue & color est: pro Borragine contra tam multa hæcenus numerata indicia, quæ diligentius cæteri etiam excutient. Nos enim pro deprehendenda ueritate, cogitanda alijs hæc tantū proponimus. Nec laboramus pro re (cunctis em̄ nota est) sed pro medicæ materiæ antiquis nominibus & historia: quæ a posterioribus græcis toto hoc capite male habita est. Credimusq; nos, ex obseruatis hæcenus, non esse Dioscoridis quæ a principio capitis longius legunt, usq; ad, Verbasco similia habere folia, &c. Quæcunq; em̄ a Serapione, antiqua scriptoris huius interpretatione, & aliquot græcis Buglossio huic tribuunt, nulla alia sunt, q̄ Verbasco similia habere folia. Folio in terrâ deciduo esse: eodemq; aspero, & uigriore boum Lingux similisq; in uinū coniectum, læticiā augere credi. Cætera nulla in antiquioribus græcorū codicibus & latinis scriptoribus sunt. Et Plinius, quæ nunc in scriptore hoc legunt, dandam esse scilicet Buglossum hanc quæ tres caules protulerit, ad tertianas: quæ uero quatuor, ad quartanas, non Buglossio, sed Cynoglossio tribuit. Verba eius sunt lib. 2. capite. 8. Lungitur & Cynoglossos caninas imitans linguas: aiuntq; quæ tres thyrsos feminis emittat, eius radicem potam ex aqua ad tertianas prodesse: quæ quatuor, ad quartanas. Accedit his etiā carpendi Buglossum hanc Iulio mense præceptum: quæ hic scriptor Romana uoce ἰούλιον uocat: quod in græcis antiquis scriptoribus nunq; aut raro inuenitur. Dico autē antiquos, nondum penitus oblitterata græcorū re: quoniā post Cæsares Romanos, latinis mensiū appellationibus potius, q̄ græcis, suadente id fortuna eius gentis & maiestate, usi oēs sunt. Quodq; coniunctū huic est, non consueuisse Dioscori, tempore notas ex mensibus accipere, sed ex anni tempestatibus: uerbi causa, solstitijs, uere, autūno, hyemeq; & æstate. Scimus medicinæ hæc nihil, aut parū conferre. Sed nos herbariā tractamus: conamurq; in hoc scriptore, minus corruptā saltem latinis eam reddere: quoniā integram in tanta posteriorū incuria & imperitia impossibile est. Effugerat pene nos quod ad Buglossum & Boraginem, earumq; notas adhuc pertinet. Id huiuscemodi est, Cirsij Buglossio hic similia esse folia dixit, mediocriter hirsuta, longioraq; & albescencia, in extremis aculeata: Buglossi autem φύλλον χαμαιπυτίε, τραχύτι καὶ μιλάντιον, quod est, folium in terram deciduum, asperumq; & nigrius. Conferatur nūc cum naturæ exemplaribus utriusq; historia, carptasq; ex horto Buglossum & Boraginem diligentius contemplerur. Mihi sane prior illa Cirsij historia nostræ ætatis Buglossio respondere, posterior autem Borragini undiq; uidetur. Sunt enim Buglossi folia longiora q̄ Borruginis. Albicant illa, hæc contra nigricant. Illa surgūt, & per se stant in altum nitentia: Borruginis in terra iacent. Estq; illi proprium quod hic ait χαμαιπυτίε, id est, humi stratum folium.

D

De Cynoglossio.

C A P. CXXX.

κυνόγλωσσον

CYnoglosson, alij Phytion, alij Caballation, alij Splinicion, alij Scolymon, Romani Linguam canis, aut caninam appellant. Folia latifolia Plantaginis habet, arctiora, minora, lanuginosa. Caule uacat, & humi sternitur. Prouenit in sabuletis. Folia cum suillo adipe ueteri, medentur morsibus canum, alopecijs, & ambustis. Emollit aluū, decoctum herbæ ex uino potum.

BARBARI COROLL.

CYnoglosson, topiarijs operibus gratissima est: dicta, quia caninas imitetur linguas folio. Est ei similis alia, & quæ ferat lappas minutas.

EX M. VERG. COMM.

CANIS Linguam herbam nouit Etrusca omnis rustica plebs. Vtitur enim ad ulcera, & minora uulnera. Ostenditq; eam sine caule, & paulo minus q̄ cunctis isdem huic scriptori notis. Nasctur plerunq; inter uites, uiretq; tota hyeme. Nos eam sæpe uidimus folioso cespite, radice pollicis humani crassitudine, albicante colore, & supercurrente asperitate: quam credi-

mus hominis & comparationis ad caninam linguam caussam fuisse. Est enim cani qualis plarisq; alijs animalibus, Scobinae modo asperior lingua.

De Phyteumate.

CAP. CXXXI.

Phyteuma folia habet Radiculæ, copiosum semen, perforatum, radicem paruum, per summa terræ nitentē. Quam ad amatoria conuenire nonnulli scriptum reliquerunt.

B A R B A R I C O R O L L.

Phyteuma negat se descripturū Plinius, quasi superuacua, & ad amatoria tantū utilem.

De Leontopodio.

CAP. CXXXII.

Leontopodion aliqui Zöonychon uocant, alij Aetonychon, alij Cemos, alij Damnamenē, alij Idiophyton, nonnulli Phytobasilā, alij Crossion, alij Crossophthoon, Magi Sanguinē Crocodili, alij Crocomerion, Aegyptij Daphnōenen, Romani Minerciū, alij Palladiū, alij Flāmulam. Digitalis est hærubula, folia ferens angusta, longitudine ternū quaternūue digitorū, hirsuta. Quæ iuxta radicē spissiore flocco canescūt. Capitula in summo caule, quasi dissecta, flores nigri: semen usq; adeo spissa lanugine inuolutum est, ut sæpe fallat. Radice parua cohæret. Quam tradunt appensam ad amatoria prodesse, & tubercula discutere.

B A R B A R I C O R O L L.

Leontopodion, si amatoris tantū nascitur, diuersum uidetur a Leontopodio, de quo Plinius ita scribit, ut ab eo aluum fisti, bilem purgari prædicet, semine lymphatica fieri somnia, campestri & gracili solo nasci, Litheoron & Coripetron ab aliquibus uocari: nisi de hac loquutus intelligatur, cum dixit, Silebitur a nobis & Cemos: cum sit usus eius inquit ad amatoria dumtaxat. Quandoquidem Leontopodion & Cemos uocari Dioscorides hoc loco testis. Cemos autem uidetur appellata, ex floribus siue calycis figura: quoniam Pyxidécūla Athenis ita nominabatur, per quam suffragia in subiectum uasculum, quod Caddiscum uocabant, demitti consueuerant: quod & Venetijs hodieq; seruatur. Pollux auctor, Leontopodion hanc, & in uerustissimo Dioscoride appictam uidimus: simillimam herbæ quam uulgus ex nostra consuetudine Calendulam appellat, ut eadem omnino esse uideatur: Leonis habere nomen uerissime est, & illam quam ita carmini suo Columella inseruit, Et hiantis sæua Leonis Ora feri. Et alibi. Oscitat & Leo. Nec præterea quid de ipsa prodam, habeo.

E X M. V E R G. C O M M.

Esc Leontopodio eandem Camon, de qua Plinius. 27. uolumine, capi. 9. negauit se quicq; scripturum, quoniam ad amatoria tantū usus eius esset, pro comperto nobis est. Vidimusq; nos antiquissimos & optimos græcorum codices, in quibus non Leontopodion, sed Camos capit huius titulus est. Habemus & uetustissimū longobardis literis scriptum latinum Dioscori, in quo pariter non Leontopodion, sed Camos est: iisdemq; omnibus hoc capite alijs, sola in græcis & latinis tituli capituli, & plantæ appellationis diuersitas est. Magno argumēto, non differre Leontopodion a Camo, nisi sola appellatione. Profuit plantæ huic binominē esse. Perisset enim tota, nisi amissio altero nomine superfuisset alterum quod indicaretur. Infamis amoris ueneficijs ea quondā fuit. Credimusq; nos, Camon dictam, quasi frænū. Est enim *κνυός* græcis inter cætera reticulatum, aut ex utrinque textum fræni genus. De quo quodridie in Plalmo auditur: In camo & fræno maxillas eorum constringet: quo quemadmodū uinciuntur iumentorū: ora, sic in amore amantiū animi retinerētur: eoq; nomine magis q̃ Leontopodij nota ab his qui pro religione, bonisq; moribus amoris ueneficia hæc odissent, exagitata, appellatōnem eam in posterioribus amisit. Seruata tamē illi a diligentioribus altera est, auctusq; nomi-

A

Phyteuma

Leontopodion

Pli. li. 27. ca. 9.
lib. 26. cap. 9.
15. 13.

B

D I O S C O R I D I S

C num eius numerus. Sed cuncta nostra ætate parum certam habent rationem. Nec cur Mineruium, & Paliadiū a Romanis dici Leontopodion in Dioscoride legat, dicere nos audemus.

ἵππογλωσσῆ **H** De Hippoglossō. CAP. CXXXIII.
Ippoglosson aliqui, & id Antirrhinon, alij Anarrhinon, nonnulli Lychnida agriam uocant. Frutex est folia habens Rusci figura, & spinosam comam, & in summo ceu linguas e folijs exeuntes, Capitū dolorem corona ex comis imposita minuit. Malagmatis radix succusq; ammiscetur.

HYPGLOSSON, & Hypoglossa, dicitur, acinos fert rubētes Rusci modo. Vidimus & hanc. Corollæ genus Hypoglossidas uocari diximus in Myrto, aut ex hacherbā, aut e Lauro Alexandrina, quam & Hippoglossida appellabant. Hippoglossis dicitur & morbus linguæ Hippocrati: quoties tumore obduruit, ita ut salua deuorari nequeat.

RUSCI, quæ sylvestris Myrtus est, folia habere Hippoglosson omnes testantur. Ea non adeo grandia sunt, & præter id in cuspidem acuminata desinūt: eamq; ob causam, siue magnitudinem, siue equorū linguæ figurā in ea uoce intelligas, nulla in folijs ratio eius erit. Nec si etiā, ut in Plinio adhuc legitur, græcam præpositionē hippo, coniunctā linguæ, a græcis fuisse credideris, scriptori huius historię respondebit, ἵπ' ἄκρον enim, id est, in summo linguas exire hic ait, παρὰ τοῖς φύλλοις, id est, secus & secundum folia. Quæ hic intelligit in caule suprema: qui desinens non folia profert, sed conferet lanuginis potius q̃ foliosæ comæ in latitudine se apertens inuolucrū: non aliter q̃ in spicatis aliquibus seminibus & floribus fit. Differt tamē a Spicacā: q̃ rotundæ quatuorue plerūq; angulis Spicæ surgunt: in hac q̃d ultimū in caule exit, in latitudine se explicat. Et quoniā humanam linguā imitatur, ideo factō a græcis nomine, Hippoglosson, quasi grandis lingua dicta est, Et hæc nobis origo noīs & causā est. Quæ licet historię Plinij diuersa forte aliquibus uideat (ille em̃ ait. Et in hīs ceu linguas folio paruo exeunte de folijs) meminerint tamen oēs, sequi nos græcos scriptores. p̃cipueq; hunc: & in uertēdis uocibus eius quā debemus fidem illi præstare, qui ἵπ' ἄκρον παρὰ τοῖς φύλλοις prodire linguas ex Hippoglossō dicens, q̃d est, in summo & secundū folia, nō ex folijs, sed ex summo caule, quā parte desinūt folia exire ea dixit. Id enim ἵπ' ἄκρον aperte significat. Cæteræ appellationes ex similitudine ne aliqua, uerū importune illi acceuerunt: ideoq; non tractandæ a nobis.

ἀντίρρινον **A** De Antirrhino. CAP. CXXXIII.
Antirrhinon, alij Anarrhinon, nonnulli Lychnida agriam appellat, hærbam caule & folijs Anagallidi similem, flore albæ Violæ, purpureo. Ideoq; sylvestris Anagallis nominata est, semine uituli narium. Tradunt perunctos ea, cum Cyprino oleo, aut Lilino, uenustiores fieri: nec ullo medicamento lædi posse, si quis appensum gestet.

ANARRHINON, & Anarrhinon, & Antirrhizon, siue Anarrhizon. Similem Lappæ tradunt. Quidam Lino, ut arbitror corrupta lectione, pro Aparina. Radice nulla, siue minima, flore Hyacinthi, Plinio. Galenus hanc & Bucranion, hoc est, bubulum, aut uitulinum Caput dici meminit.

PLURES in græcis Anarrhinon, q̃ Antirrhinon uocant, a uitulorū naribus, quarū figura semen est, factō nomine herbam: quæ folio paulo minus q̃ hederaceo tota figura est: flore qualis Viola purpurei coloris, ut nostræ ætatis herbarij ostendunt: qui deprehendisse nobis eam uident. Multifaciendū, & in honore habendū Anarrhinō hoc erit: si quod hic, Pliniusq;, & ante eos Theophrastus testati sunt, ad gratiā & uenustatē homini proficiat. De eo Theophrastus libro. 9. de plantarū historia his uerbis egit. ἡν κλειαν γάρ φασιν αὐτὸ ποιεῖν τὸ ἀντίρρινον καλούμενον. τοῦτο δὲ θυμὸν ἐστὶν ἀπαριν. ἥσα δὲ οὐχ ὑπὸ τινι ὀδὲ καρπὸς ὥσπερ μόνον ἵνα ἔχῃ τὸν δ' ἀπὸ τοῦτον ἀλυσθῆναι. Quorū sit sensus, Gloriā enim ferunt continue Antirrhinon facere. Aparine simile id

est. Radicem non habet, Semen vituli naribus simile: & qui eo unguntur, ad gloriam proficere. Quae oia ipsdem fere uerbis a Plinio reddita sunt. 25. uolumine, capi. 9. Discrepant tamen Theophrastus & Dioscorides aliquatenus. Ille *πρὸς ὑψηλὴν καὶ ὑψηλὴν* facere Antirrhinon dixit, i. ad gloriam & honorem: hic *ἐπιχρῆν* fieri eo perunctos, qd ad gratiam tantum pertinet. Plinius uenustiores fieri dicens, Dioscoridē potius q̄ Theophrastum secutus hac parte est. Comparauit Plinius etiam Anarrhini flores Hyacintho, non purpureis Leucois: magnitudinē eorum seruat colore indicans. Sunt enim Violis illis minores: ideoq̄ Hyacintho similiores.

De Catianance.

CAP. CXXXV.

Catanance aliquibus Dānamete, alijs Dionysias, alijs Thyrsion, alijs Demos, alijs Cemos, alijs Crotion, Magis Archaras, alijs Arcopus, Romanis hærba Filicula, alijs Datiscā, Dacis Caropithla dicitur. Ex eo genere una folia Coronopi habet longa, radicem lūci modo prætenue, capitula sena, septenaue, in quibus Erui semen inest. Arescens in terrā flectitur, & se contrahit ad speciem unguis milui exanimati. Altera mali paruae magnitudinē explet, radice exigua, colore, figura & magnitudinē Oliuæ: folijs mollibus, diuisis, humi prostratis. Semen ut cicer in ramis dependet, multis foraminibus pertusum. Vtramq̄ narrant in amatoria expeti. Thessalicæ mulieres his uti traduntur.

Catanance, Thessala est herba. Huius secunda specie ab herbarijs nostris inuenitur Bistor. ta nomine.

De Tripolio.

CAP. CXXXVI.

Tripolion aliqui Psychen, alij Merida, alij Potamogitona, alij Stachyten, Romani Callium marem nominant. In marinis nascitur locis, quæ allidit unda, recedensq̄ dimittit, neq̄ in mari, neq̄ in secco. Folio Glasti latiore, arido: palmeo caule, in mucrone diuiso. Eius, ut tradunt, flores colorem ter in die mutant. Mane candidi, meridie purpurei, sero punicei conspiciuntur. Radice alba, odorata, calidi gustus. Quæ drachmis duabus in uino pota, aquam, urināq̄ per aluum extrahit. In medicamenta digeritur, quæ uenena arcet.

Tripolium, ab aliquibus eadem existimatur quæ Polium, errore manifesto, ut ex earū descriptionibus apertissime cognosci potest. Radix crassa Tripolio.

EX M. VERG. COMM.

Anima uertit multo ante nos Nicolaus Leoniceus (cuius diligentia, iudicium & ingenium nunq̄ satis a quoq̄ laudabitur) uicinitate nominis decipit Plinium, Tripolium quod nunc tractamus, cum Polio iampridem dicto miscuisse: & quæ alterius erant, alteri tribuisse. Quod nos modo relinquimus, dictis ab eo id tantum adijcētes, non solum miscuisse ea Plinium, uerum in Theophrasti plantis Gazæ eiusdem lapsus causam & auctorem fuisse. Qui in eo Tripolium legens, plus latino scriptori, quod miretur aliquis, q̄ græco græcus homo detulit. Quodq̄ in Theophrasto erat Tripolium, Polium uertit. Theophrasti. 9. de plantarū historia uolumine ad finē, uerba hæc sunt. *καὶ ὡς δὲ φέρεται τὸ τριπόδιον καὶ ἡριόδιον καὶ μονοῖον ὑπὸ πᾶν πράγμα συνδεδεῖται χρησίμην ἔχει.* &c. Ille autē uertit. Adde Polium, quod Hesiodo & Musæo auctoribus, ad oem rem seriā, magniq̄ faciendā perutile prædicat. Esseq̄ Tripolium, non Polium in Theophrasto legendū, multa indicat: præsertimq̄ qd præcedit de Periapris, & Alexipharmacis. i. amuletis ab eo dictū. Poterat utriq̄ qd dicimus multa ostendere: qd scriptor hic, f. & quod Theophrastus testatū sunt: sed oim euidentissime nōmē. Neq̄ em Tripolij uox aliud, q̄ quod ter uersat, mutaturq̄ significat. Quæ rara, & miraculū instat in eo uis est. Fueratq̄ hoc magis in Theophrasto & alijs optandū, q̄ quod ille ait, *ἀλλὰ τὰ ὑψηλότερα καὶ ἀπιδιώτερα, τὰ, τὶ τῶν περιήλων καὶ ὅλων τῶν ἀλεξι-*

A

κατανάγη

B

τριπόδιον

D I O S C O R I D I S

C Θεμελίον λυγρὸν τοῦ τριπολίου καὶ τοῦ οὐκίου καὶ ὅς ἐστι φασὶ τὸ τριπολίον καὶ τριπολίον καὶ μέγαλον ἐπὶ πᾶν πρᾶγμα ἀποδιδόναι χρῆσιν ἵναί. Διὸ καὶ ὀρθροῦσιν αὐτὸ νύκτωρ σκηνὴν περὶ αὐτοῦ. &c. Quorum sensus est. Illa autē minus credibilia, & fatui hominis erunt, quæ de amuletis, & quæ ueneficis aduersantur, tam corporibus, q̃ domibus alligata & apposita. Quemadmodum auctoribus Hesiodo & Musæo, dicunt Tripolium ad omnia quæ digna studio sunt, utile esse. Eamq; ob causam, noctu erecto prope tabernaculo, effodiunt. Et hæc Theophrastus quo diximus loco. Coloris autē mutationem, cuius causam docuisse decebat, ad eas referri causas, ut credimus oportet, quæ ab eodem de conuersione foliorum, claudentibusq; se & dehiscenibus floribus quibusdā referuntur. Quorum omnium una in sole causa est: ab eoq; credendum, fieri in Tripolio tertiam per diem coloris mutationem. Quo enim plus, minusue humoris impetu solis ex flore exsuctum fuerit, eo obscuriore, dilutioreue colore fieri credendum est: mixtionibus enim, exceptis primis, cæteri colores constant.

De Adianto. **C A P. CXXXVII.**

ἀδίατρον

Adianton, alij Polytrichon, alij Callitrichon, alij Trichomanes, alij Hebenotrichon, alij Argion, alij Corion enygron, Aegyptij Epier, Romani Cincinalem, alij terræ Capillum, alij Supercilium terræ, Daci Phithophthethela uocāt. Pusillagerit folia, similia Coriandri, serrata. Cauliculi quibus exoriuntur, nigro colore nitent, pretenues, palmum alti, folijs filicis, admodū exilibus, radice superuacua. Neq; caulem, neq; fructum, neq; florem profert. Decoctum hærbæ potū prodest, spirandi difficultati, suspiriosis, lienī, & felle suffusus, & urine difficili. Calculos frangit. Aluum sistit. Serpentū morsibus auxilio est. Contra stomachi fluctus ones in uino bibitur. Secundas ciet & menstrua. Sanguinis reiectiones inhibet. Contra serpentū morsus crudū illinitur. Alopecias densat. Strumas discutit, furfures in facie, & manantia capitis ulcera ex lixiuio emendat. Descentes capillos continet, cum ladanō & myrrino, & fusino, aut hyssopo, uinoq; . Decoctum eius cum lixiuio & uino infusum, idem præstat. Coturnices, & Gallinaceos pugnatiores facit, in cibos eorum additum. Seritur gratia utilitatis pecorum. In speluncis, umbrosis, & palustribus, circa parietum aspergines, & fontium specus enascitur.

Theoph. li. 7.
de plār. ca. 13.

BARBARI COROLL.
Adianton, Capillus Veneris a Theodoro dicitur, frutex topiarius. Aestate uiret, bruma non marcescit. Nomen ei ab euentu, q̃ folium eius persusum mersumq; aqua, simile tamen sicco uideatur. Radice tam parua, ut possit nulla existimari. Locis opacis prouenit. Perdices in bellum armantur, huius herbæ cibo. Callitrichon, & Polytrichon a capillo dicitur, quem tingit, crispum, densumq; faciens. Dicitur & Saxifragum: non tam quia nascitur in saxis, q̃ calculos mire frangit: sed nigrum magis: quod & breuius est: & Trichomanes priuatiū appellatur: de quo statim indicabitur. Adianton candidum est, & maius nigro, & Polytrichon proprie cognominatur, & ab Hippocrate Calliphyton. Etiam si est ubi Calliphylon scribatur. Folia utriusq; Filicis inferiora, aspera, ac fusca sunt, contrario inter se posita frequentia. Umbrosas petras, specus, & manantia saxa diligit.

EX M. VERG. COMM.
Coronat interiores puteorū parietes, & fontū margines Adiantum: & quasi fidens, quas tamē odit & respuit, pronus quarit aquas. Non aliter q̃ qui opes sedulus continue quarit, & inuētis miser abstinet. Miraculū in eo Plinius id iactat: quasi non multa alia passim uideantur, quæ naturali corporū dissociatione, misceri simul quacunq; etiā illata ui nequeunt. Ex eo nominis illi causa est, quā duobus uersiculis in Theriacis suis Nicander tradidit. Ea est huiusmodi, ἀχαλὸς ἐπ' ἀδίατρον ὃν οὐκ ὁμῶς ποιοῦσιν ὅτι, ἀπὸ τοῦ πύπνου καὶ τοῦ πετάλου ἐκείνου. Quod est, Purumq; Adiantum, in quo nec descendente imbre, minimū e cælo cadens stillicidium folijs

insidet. Docuit idem Theophrastus .s. de plantarum historia. τὸ τε ἐπὶ τοῦ ἀδiantοῦ συμβαίνειν ἐνδὲ γὰρ ὑγραίνεται τὸ φύλλον βρεχόμενον, οὐδ' ἐπίδυνον ἐστὶ, διὰ τὸ τὴν ὅτιαν μὴ ἐπιμένειν ὄθιν καὶ ἡ προσηγορία. Quorum sensus est. Et quod in Adianto accidit. Neq; enim madet folium eius aqua cōspersum, neq; humoris aliquid in eo uestigium remanet. Vnde & nōmen illi factum est. Plinius etiam. 22. uolumine, ca. 21. Aliud Adianto miraculum. Aestate uiret, Brumia non marcescit, Aquas respuit persusum; mersumq; sicco simile est: tanta dissociatio deprehendit: unde & nōmen a Græcis. Omnium græcorum, latinorumq; eadem in nominis origine ratio & sententia est. Vox ipsa etiam indicat. Neq; enim Adiantum aliud est, q̄ quod ὀν διαινεται, id est, nōn madescit. Testatus idem Plinius est Polytrichon, & Callitrichon Adiantum dici: sed diuersa ratio. Polytrichon quidem, quia capilli defluuia explet. Callitrichō autem, quia eos tingit, & speciosiores reddit: utrunq; enim effectum habet. Theophrastus nihil ultra, q̄ χρῆσιμα ἵναι ἀμφότερα πρὸς ἑαυτοὺς κεφαλῆς τριχῶν ἐν ἰλαίῳ τριβόμενα. Quod est. Vtilia ambo genera eius esse ad explendum capillo caput ex oleo inuncta. Sequitur appellationes has Trichomanes, quæ secundo generi, de quo mox agendum erit, priuatum competit. Succedit illi etiam quæ in cunctis græcis pariter legitur, Ebenotrichon: ex qua nos credimus in latinis factum nomen, quod in cōmuni usū est Capillus Veneris. Id in antiquioribus inuentum hæcenus a me nō est. Dico autem antiquiores, Theophrastum, hunc ipsum, Plinium, & his æquales alios. Ideoq; oborta suspicio est, ex corrupta uoce illa Ebenotrichon, Veneris Capillum factam fuisse. Bē enim syllabam, græci, uepronunciant. Facilisq; potuit lapsus esse ab audito Euenotricho, in Veneris trichas, id est, capillum. Suspicionem tamen hanc, non decretum uolumus esse. Alioquin ex Ebena, quæ nigro colore est, factum id nomen fuit: & ad Adianti Trichomanisq; nigros colículos translātū. Neq; enim aliud Ebenotrichon q̄ Ebeni capillum, id est, nigrum, & quali colore Ebenus est, significat. Cæteræ Adianti appellationes quæ in Diosco. leguntur, satis certam habent causam & originem: ideoq; a nobis relinquuntur. Sed non relinquenda quæ Theophrastus eodem libro retulit, γίνεσθαι αὐτοῦ δύο, τὸ ἰσὺ λευκόν, τὸ δὲ μέλαν. χρῆσιμα δ' ἀμφότερα πρὸς ἑαυτοὺς κεφαλῆς τριχῶν ἐν ἰλαίῳ τριβόμενα. οὐδεὶς δὲ μάστις πρὸς τὰ ὑδατὰ, ὅς δὲ οἰονταί τινος, καὶ πρὸς τραχυρίαν τὸ τριχομανὲς ποιεῖν, ἔχον δὲ τὸν κανλὸν οὐδὲν τὸ ἀδiantόν, τὸ μέλαν. φύλλα δὲ μικρά, φέδρα καὶ πυκνά καὶ πυκνότερα κατ' ἀντικρὺ ἀλλήλων, ὥστε δὲ οὐχ ὕπερ, χωρία δὲ φύλλοι συμρά. Quorum summa hæc est. Genera autem eius duo. Alterum quidem candidum, alterum nigrum. Vtrunq; tamē explendis in capite capillis utilem quem usum ex oleo conficitur. Nascuntur aquosis locis, & ut opinantur multi, facit ad uesticæ stillicidia quod Trichomanes uocatur: habetq; caulem nigro Adianto similem: folia parua, densaq; contrarijs inter se pediculis pendentia. Radix illi nulla est: amarq; umbrosa loca. Et hæc pro Adianto & Trichomane Theophrastus: quæ a Plinio iisdem fere uerbis reddita sunt quo diximus loco, longe diuersa ab his quæ Diosco. tradit: qui Adiantum Coriandri folio describit: neq; in eo candidum aliquod genus numerat, sed nigris coliculis & hoc & Trichomanes describit. Sed nec Theophrastus etiam in qua parte candidum id genus sit, retulit. Verumtamen ut obseruasse licuit, & ex his quæ Theophrastus indicat, totius generis nomen Adiantum est. Idq; statim diuiditur in candidum, & nigrum. Vocaueruntq; candidum, quod comparatum alteri albicantibus folijs sit. Quod enim ad colículos pertinet, totum genus nigros habet: in candido tamen argenteis se coliculis continue minus nigrescunt, defluuntq; in summo colore uiridi. Sed certius discrimen in folijs est, quæ in nigro minora, pennata, & Filicis modo disposita sunt: in candido qualia in Coriandro, incertis interuallis prodeuntia, et in extremitatibus incisuris diuisa. Longius itidem candidum nigro est. Hancq; rationem secutus Plinius ait. Duo genera eius, candidius, & nigrum breuiusq;. Id quod breuius est, Polytrichon, aliqui Trichomanes uocant. Quæ tota est huius scriptoris historia: qui primo candidum hoc Adianti appellatione, mox nigrum Trichomanis indicat. Non est difficile utruq; inuenisse. Sed quoniam frequentius illud nascitur, habetq; easdem huic uires, ideo notius & in frequentiore usu: idq; tantum Veneris capillum nunc uocant. Facillime in Diosco. omnia intelligit, qui oculatus testis, fide sensus ad ea utetur. Neq; enim dubitare poterit, qualia in Adianto Coriandri folia dicantur: & quomō ἐπ' ἄκρον ἱερισμῶνα, quæ alij interpretes serrata & cacuminibus diuisa dixerunt. Cum tamen impares foliorum incisuræ sint, & aliter sectæ q̄ in serrantes: neq; in cacuminibus tantum, sed undiq; per extremitates diuidantur. Credimusq; nos, qd in Adianti folijs legit, Filici similia abundare, & ex altero genere ad historiā huius translātū esse: ideoq; uirij nota eo loco adiecta est. Nihil enim Filicis folio Adiantum hoc simile habet: neq; si tota folia, aut earum segmenta inuicem compares. Fuerat ob eam causam animus, duas resue illas uoces tanq̄ inutiles relinquere: sed in cunctis græcis latinisq; inuentas seruauimus.

C presertim dicere Plinio, Vtriq; ramuli nigro colore nitet folijs Filicis. Verumtū, ut pauloante pramonstrauimus, non possunt simul Coriandro & Filici eiusdem plantę folia cōparari. Suspi-
cati; sumus, & adhuc suspicamur, nō esse integrā primā huius capitis partem; perijisset; uoces
aliquas, quę certiorē totius Adianti historīā facerent; & quę nunc tam incerta leguntur; reli-
quias illius esse: quę truncę intellectum miscerent, coguntq; legentes incertis animis inter Adia-
tum & Trichomanes esse. Sed qualē nos diximus pauloante, ut credimus, utriusq; historia est.
Adianti appellatione in toto hoc gnē antiqua medicina usa semper est; & q; generis ea uox est,
& q; omnis Adianti eedem uires ad omnia sunt. Paulusq; Aegineta cum de Adianto egisset, de
Trichomane nihil tradidit, præfatus, in Adianto dictum de eo fuisse.

τριχομανίς
ἀδιάντων

T De Fidicula seu Trichomane. CAP. CXXXVIII.
Richomanes aliqui Pterion, alij Opteron, Romani Capilla-
rem, alij Pinulam, alij Fidiculam, nonnulli & eam Adianton
appellant. Nascitur eisdem in locis quibus Adianton, Filici simile, sed
exilius, folijs Lenticulę, tenuibus, in ordinem utrinq; digestis, aduersis
in se, ramulis acerbis, fusco colore splendentibus. Eadem quę & Adi-
anton præstare posse, constat.

T RICHOMANES ADIANTUM. BARBARI COROLL.
Richomanes Adianti genus alterum, Calytrichi cognomine, breuius & nigrius, tenuissi-
mis iuncis, radice minima, gustatu feruens. Primum uero genus Adiantum Polytrichon uo-
catum iuncos albos habet, & folia plura, maioraq; frutice quoq; maior est, ut prædiximus.

S VSPICARI EX TRICHOMANIS HISTORIA FACILE DILIGENTIORIBUS ERIT, quod pauloante dicebamus,
credere nos in Adianto uisum esse, relictasq; a librarijs uoces, membrumue aliquod, quo ille
Theophrasti exemplo totum Adiantum diuideret, Trichomanesq; hoc non illud Filici similia
habere folia diceret. Huius enim, non illius iudice sensu similitudo ea est: ideoq; Pterion, quasi
Filiculam a quibusdam dici Diose, ait. Pterin enim gręci Filicem uocant; cui folia similia, parti-
terq; in ramulis nascentia hoc genus habet. Eupteron alij itidem dixerunt: quoniam pennatū
solum eius sit, nec aliter q; in alis auium pennę folia deinceps in eo sint. Eas omnes uoces imi-
tati Romani, Capillarem, quę Trichomani responderet; Pinulam, quę Eupterio; Filiculam, quę
Pterio responderet dixerunt. Gręci hoc genus a ui sua Trichomanes uocauerūt, q; rara cute
fluentem capillum explet, & subnasci facit. μανὴν enim ea gens rarum uocat.

ξανθίων
φασγάνων

X De Xanthio, & Lappa. CAP. CXXXIX.
Anthion aliqui Phasganon, alij Antithesion, alij Chascanon,
alij Choeradolethron, alij & hanc Aparinam nominant. Latini
Lappā. Nascitur læto & pingui solo, & lacubus exiccatis, caule cu-
bitali, anguloso, pingui, prodeuntibus ex eo crebris alis. Folia Attriplicis
habet infecta, Nasturtium odore imitantia, fructum grandis Oliuę
modo rotundum, & ut Platani pilula spinosum, qui contactu uestibus
adhærescit. Is ante collectus q; perfecte siccescat, tunditur, & fictili uase
reconditur. Flauos autem facit capillos, si acetabuli instar tepida aqua
madescat, mox caput nitro ante perfrictum illinatur. Alij in uino tun-
dunt, & ita asseruant. Semen aptissime tumoribus imponitur.

X ANTHION, & PHASGANION UOCATUR A GALENO & PAULO, PHASGANON A DIOSCORIDE, PHILAN-
THROPOS AB ACTIO, nunc Lappa in uersa, & minor a nostris. Non uidetur quibusdam Xanthi-
on ab Aparina superius descripta differre. Sed cur obsecro Dioscorides & Galenus & ceteri
diuersas habuere duobus locis seorsum de ijs prodentes? Quid q; in omnibus gręcis exem-
plaribus, Aparina ex interuallo stellata pingitur quasi Rubia: Xanthium multo aliter ostendē-
tur folio Attriplicis, uel ut quidam scribunt, etiam Solani.

EX M. VERG. COMM.

Plura Lapparum genera, folio, semine & natali solo diuersa: obseruatumq; a nobis est, quæ cumq; hamatis uncis, aculeatisq; & uestium tenacibus feminibus plantæ sunt, in græcis & latinis eodem aliquando nomine indicari: in illis Aparines, in nostris Lappæ. Quæ ueluti generis uox omnibus his est. Inter eas & Xanthion hæc est, numeratis ab hoc scriptore notis satis cognoscenda: sic dicta a græcis ὅτι ξανθὸν τρίχας ποιεῖ, id est, flauum capillum facit. Habet & alias appellatiões, sed nobis parum certas, & ob id alijs relictas. Circa rusticas domos, pingui ut hic ait, sed frequentius humido solo nascitur. Idq; est quod hic ait, arscētibus paludibus. Paludes enim appellat loca etiam, in quibus per hyemem aqua fuerit, æstate uero aruerint. Omnium autem notarum quæ Xanthio huic a Diosco. tribuuntur, nulla certior fructu eius est. Dico autem fructum Lappam, in qua semen est: quem figura grandis Oliuæ, & aculeatū hic describens, facillimam eius deprehensionem fecit. Sed nihil frequentius præmonstratis nascitur locis.

De Avena. CAP. CXL.

Aegilops aliquibus Sitospelos, alijs Siphon, alijs Bromos, Romanis Avena dicitur. Hærbula folia Tritici habens, sed molliora, in summo capite semina bina, ternaue, rubra, quibus aristæ quasi capillaceæ exeunt. Illita cum farina hærbæ ægilopijs medetur. Duricius as discuit. Succus farinæ ammixtus, siccatur, & eorundem gratia reponitur.

BARBARI COROLL.

Aegilops necat hordeum: in quo maxime nasci amat. Festucago a Gaza dicitur. Plinius Auenam græcam uocauit. Hæc non nisi post annum, ex semine suo gignitur. Vere pilosum ei folium ut Lolio, non tamen ut illi pingue, limmitis aspectu, solum emaciat. Radice, culmoq; multiplici, melius in culto erumpit. Remedium, ut arua biennium quiescant: tum plane luxuriantem admissum pecus obrerat & consumat.

EX M. VERG. COMM.

Equi uocæ in græcis ad Auenam cunctis notam & ubiq; nascentem frugem, & eam quam modo tractamus herbam Aegylops appellatio, latinis aliquot, ut uidetur, præsertimq; Plinio & posterioribus græcis, miscendi causa fuit, quæ alioquin separanda, & in diuerso genere constituenta fuerant. Idq; non leui periculo usus, & turpi rerum incertitudine factum est. Qui enim poterit pro Avena fruge modo cognosci, quæ hoc capite a Diosco. describitur Aegylops, duobus, tribusue feminibus in summo rubentibus, & inter ea exeuntibus aristarum modo capillis, quæ secundo uolumine ab hoc ipso scriptore Bromos dicta descriptaq; est: pendentibus in summo paruulis ueluti locustis, duplici cruore diuaticatis, in quibus semen: quæ tota Auenæ frugis pictura, & præfens imago est? Qui etiam poterit idem utriusq; usus esse: cum huius ad oculorum fistulas, quas Aegylopos dicunt, præcipuus usus tradatur: illius ad pulres, quæ tussitentibus inferuiant? Qui etiam poterit non imperitus medicæ materiæ haberi Paulus Aegineta, antiquus & medicinæ grauis autor, seorsum de utraq; agens? Bromonq; similem Hordeo uiribus tradens, Aegylopē uero discutiendi uim habere: Pluraq; alia, quæ longius repetenda modo non sunt. Satis enim est, ut diuersæ sint, & constituantur plantæ Aegylops, & Bromos historia, & autoritate eius scriptoris intellexisse. Quemadmodum in hoc ipso uidere facillimum est: qui inter fruges Auenam describens, Bromon eam uocauit: inter herbas autem Aegylopa hoc loco numerans, diuersam ab Auenâ herbam, non frugem descripsit. Qualis autem Auenâ inter fruges sit, facile est secundo uolumine uolentibus cognoscere: qualis autem Aegylops, hoc loco cognoscenda erit: in cuius descriptione nihil est quod ad Auenam frugem pertineat. At Theophrasto Aegylops multis locis nulla alia q̃ Auenâ est: & quæ ab eo illi traduntur, frugis, non herbæ competere uidentur. Nolumus nunc nos in ambigua re tanq; de cōperta agere. Quæ enim de Aegylope ab eo octauo de historia & quinto de causis plantarum dicuntur, huiusmodi sunt, ἄλλ' ἴδον τοῦτο τοῦ βολεοῦ λίγεται, τὸ μὴ ἀπὸ πάντων βλαστάνειν ἅμα τῶν σπέρματων, ἀλλὰ τοῦ μὲν ἀντοῦτος, τοῦ δὲ ἕτερου κατὰ πρὸς τὸν ἀγρίωπα φασὶ καὶ τὸν λυτὸν. Quorum sensus est. Sed proprium hoc Bulbi est, non nasci simul ex totis feminibus, sed alteram eius partem eodem, alteram sequenti anno: qualem Aegylopem dicunt, & Lotum. Quod Plinius. 21. uolumine, capite. 17. reddidit. Mirum, Loton herbam & Aegylopa non nisi post annum e semine suo nasci: qd

X ij

A

ἀγρίωπα

The. li. 8. ca. 10
Pli. li. 21. ca. 27

B

Virgilinus Auenam
sterilem uocat,
uolentem in de
gustum.folio 112: Libro secundum
de Dioscoridis, capite
107.

C aliqui, rusticaque præsertim plebs Auenæ frugis proprium credunt esse. Idem Theophrastus quoque de plantarum causis, cum ageret de pestibus & iniurijs frugum, ait, καὶ ὅσα δὴ συγγινῶται καὶ ἕκαστον αὐτῶν ἐῖον αἰεὶ καὶ ἀγρίως ἐν πυροῖς καὶ κριθαῖς. Quod est. Et quæcunque singulis feminibus conuascuntur, ueluti Lolium & Aegylops in triticea & hordeacea segete. Qui locus a Plinio etiam libro decimo octauo, capite decimo septimo his uerbis redditus est. Triticum simili modo æra, & hordeum festuca, quæ uocatur Aegylops. Quam feliciter autem ab eo uersum id fuerit, poterunt uolentes collatis Theophrasti græcis uocibus cum latinis eius uidere. Nos illud monemus, festucam, non frugem Aegylopa a Plinio nunc Auenam dici; quæ nihilominus paulo ante Auenam ab eodem dicta fuerat. Videturque uagus in græcorum Aegylope, nunc frugem, nunc herbam describere. Suspicietur merito aliquis etiam Aegylopa frugem Auenam esse, Galenum primo de alimentis dicentem audiens: in triticea & hordeacea fruge cum impedimento aliquo infelicitate egerit, in Lolium alterum, alterum in Aegyloperem sæpe mutari: quod passim in re rustica & agrorum disciplina iactatur. His, multisque alijs ueterum scriptorum decretis & autoritatibus facile receptum est, Aegylopa inter fruges Auenam indicare. Nec nos in re, quæ iam pridem tantopere inoleuit, contra niti decreuimus: & si non desint quibus probare id liceret. Sed quod pro Dioscoridis Auenæ & Aegylope dicimus, huiusmodi est, Auenam frugem Bromon illi esse: traditumque de ea iam pridem secundo nolumine fuisse. Aegyloperem uero herbam omnibus facile cognoscendam esse, si in naturæ contemplatione diligentiores fuerimus: & quas hic illi tribuit feminis in summo coliculus, numeri & coloris notas obseruauerimus. Cubitali se re altitudine coliculus ex folijs, quæ in summa radice sunt, exit Aegylops: primumque florem in candido rubentem profert: mox cum defloruit, capillamenta potius quam aristas molles, prociadumque mittit inter grana seminis prodeuntes, duo triaue ut hic ait, sed frequentius tria cum maturescunt rubentia: maiorum locustarum corneis oculis similia semina illa sunt: nec minus nitent: quoque in punice grana contactu hærent, eodem & in capitulo Aegylopis semina illa. Nascitur macro terreni genere, frequentissima in uineis. Inuenitur tamen & in triticea hordeacea segete: quæ causa etiam fuit, ut eodem nomine & hæc, & Auenam indicatæ fuerint. Inuenitur tamen & in triticea hordeacea segete: quæ causa etiam fuit, ut eodem nomine & hæc, & Auenam indicatæ fuerint. Plinius post ea quæ alijs locis dixerat, & ex Theophrasto uerterat uicesimo quinto uolumine, capite. n. ex hoc scriptore totam his uerbis descripsit. Et Aegylopos sanat eodem nomine herba, quæ in hordeo nascitur tritici folio, semine contrito cum farina permixta, imposita: uel succo. Exprimatur hic e caulibus folijsque prægnantibus, dempta spica, & in trimestri farina digeritur in pastillos. Et hæc de Aegylope obseruata a nobis in græcis & latinis sunt. Relinquimus autem cogitandum legentibus, an satis ad constituendam inter fruges Aegyloperem Auenamque existimandam Theophrasti de ea historia sit. Quod enim ad Plinium pertinet, manifesteprehenditur, frugem in Theophrasto Aegyloperem existimasse: in Dioscorido autem herbam paulo ante a nobis descriptam. Non esse autem Dioscorido Aegylopa Auenam, historia eius apertissime indicat. Quæ enim in summo eius duo triaue grana rubentia, & inter grana illa exeuntes ueluti aristas habet, neque sunt in Auenam, neque esse possunt. At in Dioscorido legitur Bromon dici, & a Romanis Auenam. Impitiorum additameta illa sunt, ab his huic scriptori adiecta, quæ alteram illam Aegylopis significatio nem cum hac miscuerint, & ubique eandem esse crediderint: præterea, quod hic ait Tritici folio esse Aegyloperem, & Theophrastus ea tradiderit quæ paulo ante longius dicta a nobis fuerunt.

De Bromo Auenæ genere. CAP. CXLI.

Bromos

Bromos hæra quæ aliqui Siphonion, alij Acrospelon uocant, Auenæ similis est, exiccatoriâ uim habens. Decoquitur cum sua radice in aqua ad tertias, et iuri colato par modus mellis adijci, rursus incoquitur, dum liquidi mellis crassitudo fiat. Linteum eo humore imbutum, & naribus inditum, contra graueolentiam ulcerum efficax est. Alij tritam Aloem addunt, & eo modo utuntur. Cum iicis rosis cocta in uino, grauem oris halitum emendat.

BARBARI COROLL.

Bromos & hæc Auenam est, syluestri fere habitu ut Aegylops. Nascitur inter uitia segetis, spicam ferens. Radice copiosa & multiplici, culmo sparsa. De hac & inter fruges, leguminaque secundo libro diximus.

Si descripta hoc capite Bromos herba in frugū genere Auena est, ut in Diosc. legitur bis, nec suo loco actum ab eō de ea fuerit: quod in scriptore hoc absurdum, & historia medicinaq; eius indignum, si in herbarum genere equiuoca frugi est, non dissimulabo, ignorare me eam palam fateri. Barbarus in Corollario suo syluestris fere habitus hanc esse dixit, multoq; ante inter fruges secundo uolumine dixerat: illic de grano & semine, hic autem de herba tradi: discrimenq; obseruasse in prima eius nominis syllaba ait: quoniam nūc per, nunc per, scriberetur. Nos in ignota re, fidem penes autorem uolumus esse. Non tamen tacebimus, non legi hoc caput in antiquioribus & melioribus græcis. Nec qui nobis est uetustissimus latinus Diosc. hoc habet. Obseruauimusq; nos, eiusdem fidei, concordescq; in cunctis & hunc & illos esse magno argumento, nulla quondam in Diosc. fuisse quæ hoc capite leguntur. Nō uerebimur & illud addere, si diligentius capitis huius phrasis expendatur, ab ingenio & usu uocum Diosc. longissime abesse uidebitur. Quinetiam Paulus Aegineta omnem ex hoc scriptore medicam materiam percurrentes, unam tantum Bromon, & eam frugē numerauit. Ob quæ inclinatur animus nobis, ut credamus adulterinum esse hoc caput, & a posteriore aliquo huic scriptori additum. Scio fore, ut audacior multis in censura hac uidear: & contra aliorum omnium placita, & codicum fidem petulantius de his censere: sed nihil timere nos persuadet studiū huius nostri fides, & conscientia; quæ sine aliorum criminatioe, & rerum iactura, suspicionibus saltem (quoniam forte alia ratione non potest) prodesse conatur.

De Glauce.

CAP. CXLII.

Glaux Cytiso & Lenticulæ folijs similis, quæ superne uirent, a uersaq; candidiora spectantur. Ramuli a terra exiliunt quini seniue, tenues, ab radice dodrantem alti. Flores ceu Violæ albæ purpurei exeunt. Nascitur iuxta mare. Coquitur cum hordeacea farina, sale & oleo in forbitione, ad reuocandam extincti lactis ubertatem.

B A R B A R I C O R O L L.

Glaux olim Eugalacon ex facto uocabatur. Rami serpunt in terram. Est a quibus non Glaux, sed Glax, & Galax, ut a lacte nominata pronuncientur. Hac descriptione inuenitur herba in nostris littoribus, ad Medocacum omnino similis: nisi quod florem habet aureum, non purpureum.

Pli. li. 27. ca. 9.

E X. M. V E R G. C O M M.

Eugalacon, a copia lactis quam facit, uocasse ueteres græcos Glaucem hanc testatus Plinius est, hīdem, aut parum diuersis notis eam. 37. uolumine, capite. 9. describens. Nec alia figura nostræ ætatis herbarij eam ostendunt. Relictum in historia eius id tantum ab hoc scriptore est, qd folia in ramulis deinceps disposita sunt bina: contrarijs pediculis, & exiguis interuallis penata. Legebatur in hoc capite corrupte κλόνια ἢ ἀπό γλαύ. &c. Quod est, ut ceteri interpretes uerterunt, Ramuli a terra. Id nos ueterum græcorum fide adiuti, & rei necessitate admoniti, ἐπὶ γλαύ; quod est, per terram, mutauimus. Fecimusq; id primum autorem Plinio, qd ait. Rami in terram serpunt: sed multo magis, qd inconcinnum erat, bis idem dixisse: primum a terra, mox a radice ramos exire. Satis enim alterum est: nec differt dixisse a terra, & a radice aliquid surgere.

De Polygala.

CAP. CXLIII.

Polygala palmi altitudinem petit. Folijs Lenticulæ, gustu adstricto, quæ pota lactis abundantiam facit.

E X. M. V E R G. C O M M.

Polygalon, & Polygala dicitur. In caule summo folia, ut diximus, Lenticule, gustu adstricto.

E X. M. V E R G. C O M M.

Quam habet solam potestatem Polygalon herba, ipsum statim indicat nomen, in quo sola est multi lactis significatio. Breuissime & hanc Plinius eodem libro, sed capite duodecimo descripsit. Breuis herba ea est, singulari caule: in q bina folia deinceps figura Lentis, uerum maiora, paruis interuallis prodeunt. In summo ueluti spicatum foliosum cacumen est.

X iij

D I O S C O R I D I S

C De Oſyri. CAP. CXLIII.

OSyris frutex eſt niger, lentus, ramulos ferens tenues, & in his folia quaterna, quina ſenaue, ceu Lini, nigra in initio, dein colore mutato rubefcentia. Decoctum eius potum iuuat arquatos.

BARBARI COROLL.

OSyris, & Oſyrias, ramulos habet nigros, & folia item nigra Plinio. Semen quoq; primo nigrum, poſt rubefcens, cognita mulieribus Smegmate, quod a Galeno, & Paulo, & Aetio Corema, ſiue a populis, Corema dici putant.

EX M. VERG. COMM.

Laxandi iecur in medicina uires habere Oſyrim, ueteres graecorum medici teſtati ſolū ſunt: in reliquo uitae uſu mulieribus cognitam herbam dixerunt, quae ad exterendam leuigandamq; cutem ea utebatur. Nominis cauſam & originem nos ignoramus. Nec ſcimus unde ex Aegyptio, in qua gente priuatim Oſyris, non contemnendum tunc numen, colebatur, ad herbam tranſiit. Oſtendunt hanc etiam herbarij, modo uera Oſyris ea ſit: intelligiturq; facile quae hinc ait, folia a principio nigra, mutato deinde colore rubere maturitate, & quaſi ſiccitate eum contrahere colorem: quoniam ſuperiora cōtinue nigro colore uiuent, inferiora autem quaſi hinc deſtituta rubente colore illo uidentur.

C De aſpera Smilace. CAP. CXLV

Smilax aſpera ab alijs Epatitis, alijs Lycanthemon, alijs Cynofbaton, alijs Aniceton, alijs Heliophyton, alijs Anatolicon, alijs Dyſicon, alijs Helide, Aegyptijs Lyſte, Romanis Mergina, Etrurſcis Radia appellatur. Folia habet Periclimeni, ſarmentra tenuia, multa, Rubi modo, aut Paliuri aculeata. Arborea ſcandit, ſe conuoluens eis. Fert racemos exiles, qui maturi rubefcunt, guſtumq; leniter mordent. Naſcitur in paluſtribus et aſperis, radice dura craſſaq;. Folia, et acini & ante & poſt epoti, uenenorum antidota ſunt. Tradunt, ſi infantibus nuper in lucem æditis, quid ex his tritum propinetur, nulla poſtmodum uenena nocitura.

BARBARI COROLL.

Theo. lib. 3.
de planta. hi.
cap. 16.

Smilax trachea, hoc eſt, aſpera, Milax a Galeno dicitur, ut a Smilace p Taxo differat. Ergo Smilax Hederæ genus eſt, Cilicia cognomine, importata em ex ea terra eſt in Græciā, folio in acumē piſſato qdē, ſed & in angulū depiſſo, nec tñ anguloſo, hederaceo, paruo, & ubi pediculo adalligat fere madido, mediū callū ſpinæ mō tenuē habente: ſtaminaq; non porrecta ex eo, ut in ceteris ſolijs, ſed circa eū cōacta in orbē, ab annexu pediculi, ex q̄ & iulus quidā gracilis, & cōuolutus pampini mō emittit, flore candido, Liliū olente, fructu Solani, aut Melothri, aut etiamnū Labruſcæ, racemis ut Hederæ pendentibus, aut Vuæ potius. qm̄ ab eodē limite pediculi acinorū exeant: acinis colos ruber, cōplexis nucleos binos, maioribus ternos, minimis ſingulos. Nigri ſunt nuclei, atq; duri. Peculiare habent racemī, q̄ latera caulū ſepiūt, q̄q; unus omnīū grā diſſimus propendet ſumō caule: ut in Rhamno, atq; Rubo. Flore huius coronarij urunt, quanq̄ ſylueſtri, ut & ſpinæ acutæ. Haecenus Theophrasti de Smilace ſententia. Plinius, Folia ingit Smilacis & Hederæ in coronamentū ſe dedere. Smilacē hāc, & Autophorō, & aſperam cognominari uideo penes eū. Coronā ex ea factā impari foliorum numero capitis doloribus mederi. Quidā ingit duo gñā Smilacis dixere. Alterum imortalitati proximū, in conuallibus opacis ſcandentem arborea, comantibus acinorum corymbis, contra uenenata omnia efficaciffimis. Huius lignum ad aures ſeuem ſonū reddere. Alterū genus culta amare, & in his gigni, nullius effectus, ut mox dicitur. Inſauſta Smilax omnibus ſacris, & coronis, qm̄ ſit lugubris: uirgine eius nominis, ppter amorē iuuenis Croci, mutata in hunc fruticem. Id uulguſ ignorās, plerūq; feſta ſua polluit, Hederā exiſtimando, ſicut in pōeris, aut Libero patre, aut Sileno, q̄ oino neſcit qbus coronet. E Smilace Codicilli quoq; ſiūt, Plurima hęc in ipſis Tēpe uiret, ſaxa opica cōſpicio nitore, oculos tenēs, ut Helianus ingit. Quāq; de Smilace quæ Dolichos ſit, uideri poſſet.

est Helianus dixisse. Est autē Dolichos, quam Plinius Siliquam sylvestrem uocauit, id quod tribus Auctoris eius locis inter se collatis, autumo. Vnus est libro eius. 18. Siliqua inquit omnis dira adhaerendo. Alius. 17. & circa inquit. Tempe Thessalica, quae Polypodion uocatur, & quae Dolichos. Tertius libro. 11. Circa Thessalica inquit Tempe mirū Siliqua sylvestris amplecti radicibus fontem eum dicitur, semper florens purpura. Vitruuius tamen hanc, quae circa Thessalica Tempe nascitur, non herbam, sed arborem intelligit. In Thessalia inquit fons est profluens, ex quo nec pecus ullum gustat, nec beluae: genus ullum propius accedit: ad quem fontem proxime est arbor, florens purpureo colore.

E X M. V E R G. C O M M.

TRactata in Croco fabulosa Smilacis historia a nobis est. Fueruntque tunc ex antiquis alijs scriptoribus repetita, quae in Plinij & Nasonis lectione nouisse pro Smilace hac oēs oporteret. Eo labore nunc, & ut poeta ait, falce leuati, nec habentes quod illi aliud adjiciamus, omnia enim ex Theophrasto, & Plinio Barbarus in Corollario suo coaceruauit, breuiores in commentatione eius erimus. Praesertim nascente ubique inter stirpes, & in sepibus Smilace, cunctisque ob eam causam noto sarmentoso frutice, cuius flos candidus est, & egregie odoratus. Quae duae eius notae in Dioscoride non leguntur, in deprehendendo stirpe non minus tot alijs ab eo numeratis necessariae: quae aut forte in hoc scriptore perierunt, aut in uulgari stirpe neglectae ab eo fuerunt. Nihil pro cognoscenda Smilace certius Theophrasti historia est, quam multis toto opere locis, sed longissime ad finem tertij de planta, hysto. uoluminis tractauit.

De leui Smilace.

CAP. CXLVI.

LAeuis Smilacis folia Hederæ similitudinem habent, molliora, lauiora, tenuiora. Huius sarmenta nullis horrent spinis. Conuoluitur arboribus ut prior. Fructum parit Lupini modo nigrum, exiguum, floribus in cacumine perpetuis, multis, rotundis. Hac Smilace quadam topiariorum arte tentoria contra aestus molestiam faciuntur. Folia per autumnū decidua. Semine cum Doricnio poto, ternis singulorum obolis, uaria & tumultuosa in somnis obseruari traduntur.

B A R B A R I C O R O L L.

SMilax, siue Milax lia, hoc est, leuis. Diuersa est ab ea, ut praemonui, quae Smilax Cepea, hoc est, hortensiana dicitur: de qua & alio loco demonstratum est. Leuem Plinius amare culta, & in his gigni scribit: sed nullius effectus esse. Galenus similes eam uires habere praedicat, quas aspera.

E X M. V E R G. C O M M.

QUatuor in scriptore hoc, & in reliquis graecis Smilacis genera numerantur. Verum duo haec primo, per se, & uere Smilaces dicunt. Quae enim secundo uolumine a Dioscoride tradita & hortensis dicta ab eo & ab alijs est, ex eadem ui uestiendi sepes murosque, & ut hic ait, sepnas faciendi, in censum & nomē harū uenit. Licetque hederaceo folio illa etiā describatur, fructu tamē & semine penitus diuerso est. Haec enim Lupinis, illa Foenogreco comparat. Praeterea in censu medicae materiae, quae a Paulo Aegineta sexto sui operis uolumine tractat, quatuor eodē nomine Smilaces numerantur. Aspera haec, & sine aculeis altera: quas Galeni exemplo Milaces, non Smilaces & ipse uocat: quemadmodū in Croco nos etiā diximus. Tertiā hortensem illā, cuius fructus lobia, id est, siliquas uocari, & hic, & ille ait. Quartā postremo Taxū arborem: quā aliqui per, y, discriminis causa scribi uoluerūt. De qua dictū a nobis hoc ipso uolumine fuit: totaque Smilactū omnium in antiquis graecis historia haec est. Nec contra codicū omnium fidem, ueterūque medicorū auctoritatē nouare aliquid nos audemus. Non tamē credimus, legentibus fore inutile, monere eos, dubitasse nos, & adhuc animo pendere: hortensem illā, leuemque & sine aculeis eandē hanc esse, & pro una duas in hoc scriptore legi. Vt utrumque ad hanc dubitationē his coniecturis. Vtraque hederaceo folio describit. Illa graciles caules & clauiculas, quibus propinquis fruticibus se implicet: haec uiticulas eiusdē rei significatione habere dicit. Illa multo incrementō auget, eousque, ut scaenas & tabernacula faciat: idē & haec facere tradit. Illa semen habet ανόσμηρον, id est, insomniosum: haec ανήνια πολλά καὶ τὰ παραχύδην, id est, multa & tumultuosa insomnia facere dicit. His nos coniecturis & observationibus mōniti, dubitauimus eandē esse, & pro una duas numerari. Sed tūc apud nos meritis est ueterū medicorū auctoritas.

D I O S C O R I D I S

C ut eos sequi potius q̃ solus importune sapere uoluerim: p̃sertim uocante Plinio aliquot locis hortensem illā gr̃ecorum exēplo Siliquā. Dico autē gr̃ecorū exemplo, quonīa illi discernentes eam ab alijs, Smilacē quidem proponūt: sed statim addūt, cuius fructus Siliqua uocat. Verisimileq̃ est, hortensem illā in Smilacū nomen, ut diximus, sola similitudine transisse. Et hæc pro Smilace omni satis dicta hæcenus sint: meminerintq̃ legentes, quā nos modo tractamus, frequentiore esse, & in usu coronarū quondam ob floris speciem & odorem fuisse.

¶ De Rusco.

C A P. CXVII.

Myrtus

SYLVESTRIS Myrtus aliquibus, Græcis Myrtacantha, alijs Hieromyrton, alijs Oxymyr sine, alijs Myacantha, alijs Agonon, alijs Scincos, alijs Mintha, alijs Catangelos, alijs Anangelos, alijs Acaron, alijs Ocneron, alijs Cnicem, alijs Lychene alijs Chamæpitys, alijs Chamæmyrte, Beotis Gyrenia, Magis Herculis genitura, Latinis Ruscum appellatur. Foliū fert Myrti, latius, in formā lanceę mucronatū. Baccæ per maturitatem rubescunt, rotundæ, a medio folio dependentes, osleo intus nucleo. Cubitales ramuli ab radice exeunt, uiriliū modo lenzti, fractu contumaces, foliosi. Radice Graminis simili, acerbæ, & subamaræ. Folia & baccæ in uino potæ, urinā cient. Menses pellūt. Vesicæ calculos frangūt. Stillicidio urinæ medentur. Dolores capitis sanant, & regiū morbum. In asperis & præcipitibus locis enascitur. Decoctum radices in uino potū, eodem præbet effectus. Cauliculi recentes asparagorū uice, in cibo sumuntur. Amari autem sunt, sed urinam mouent.

Myrtus arbor uiridis, hinc de Italia, qui carcas habet odori, feras, ex quib. u. m. m. conficitur, quod Myrtus d.

D

Pli. li. 23. ca. 9.

BARBARI COROLL. Myrtus sylvestris, differt a satia, baccis rubentibus, breuitateq̃, ideo & Chamæmyrsine uocatur. Eadem & Oxymyr sine, atq̃ Rusco, siue Brusco uulgo: sed corrupte. Inter herbas sponte nascentes, idoneas cibo numerat, & ex qua sunt rursus scopæ. Ruscum inquit Verrius apud Festū, amplius paulo herba est, exilis uirgulto, fructibus non dissimile lunco. Huius colore mulieres uti solitas, Carō meminit. Hanc & Acoron idē Plinius, sed Dioscorides Acaron uocari scribit. Scio fructū huius Cubebas Maurice uocatas credi: quod q̃ uerum sit, diligenter animaduerti cupio, p̃sertim ab ijs dissentiens qui hoc assument. Galenus certe id quod Cubebas medici appellant, ipse Carpesiū uocauit, duorū generum. Ponticum, & Laertium, a montibus Pamphylia: ubi frequens est ita dictū. Inueniri hoc & in Sida copiosum tradit: oppidū id est Pamphylia. Naturam, & effectum ei reddit, quales ipsi Phu: gustum quoq̃ simile, tenui oris etiānum, hoc est, subtilioris substantiæ: propterea & plus uirium in eo esse purgandis, & exterendis intestinis, quæ sint occlusa: non tamē par uirtute penetrandi Casia, nedum Cinnamon, etiam si Quinto inquit ita uidebatur. Urinam cit, & renes calculis laborantes liberat: quo argumento Mauri sylvestris Myrti baccas Carpesium, & Cubebas esse putauerunt: præcipue, cum nec Dioscorides Carpesium, nec Galenus Myrtum sylvestrem usquā nominent. Est autē odoratum semen Carpesiū, hoc est, Cubeba. Fortē sylvestris Myrti baccæ, dum recētes sunt, ossea in ijs duricia. In Carpesio nihil tale. Superuacui existimo, in re confessa quidem, sed a nobis primū comperta, longiorē moram ducere. Illud in transcurso dixerim. Carpesium si ore condineatur, claram uocem facere pronunciantibus: ob id Bernardus Iustinianus, homo in primis doctus, & eloquens, nunq̃ sine hoc semine concionabatur. Sed & illam dorem prædicant: maiore in coitu uoluptatē sentiri ab ijs, qui habeant id in ore: quasi non satis sit in ea titillatione mens cōmota, nisi doceamur, quemadmodū nōs Venus adminiculator, & uiolentior transuersos auferat. Paulus, & Carpesiam uocauit quādoq̃. Nam Opocarpasum, hoc est, lac e Carpatho, siue Carpatho, ut Dioscorides appellat, siue Carpatha, interim, & Carpesia, ut Paulus, ex eodem sit genere, an diuersum non constat. Illud certum est, inter delibutoria uenena poni eum succum, libro huius operis supremo. Est & Carpasium lini genus: quod ut Paulus ait, solum ex omnibus igni non corripitur.

Carpe in non duo, rum generum. Veneri Myrtus conserua, ta to, uel quod hoc ar, bar gaudet. Hinc: & u, m. e mari de peruata, mol quod est. Medicorum indicant libri, hoc arbor apta q̃ mulierum sup, uisitatibus plurimis.

E X M. V E R G. C O M M.

Ruscum nouisse omnibus facile erit, tam certas in scriptore hoc eius notas ruri inter sepes

& rupes obseruantibus. Potuit cuspidatus magis q̄ spinosus frutex in usu medicinæ aliquo & fanitatis quondam, ut hic ait, fuisse. Nunc in nullo honore est. Aliquibus locis tamē scopæ ad purganda pauimēta ex eo fiunt. Pueri etiā rubentes baccas ex folijs eius decerpentes, ceu corallijs perludū se illis ornāt. Rustica postremo plebs in carnario suspendit: tuerurq; eo a murū iniurijs pernas, & casei sui fiscellas, neq; em̄ acuminata in cuspidē folioꝝ eius cacumina, penetrare animalia illa audent. Quā ob causam Myacanthā, i. Murinā spinam dictā fuisse etiā credimus. Myrtus quare dicitur sit Myacantha. Ethruria certe modo non aliunde factō noīe appellat. Theophrastus etiā præter hæc lib. 3. de plantarum historia κερμαῖον, id est, cuspidatam Myrtum uocauit.

De Lauro Alexandrina. CAP. CXLVIII.

Laurus Alexandrina, quā aliqui Idæam, alij Danaën, alij Hypoglotton, alij Zaliam, alij Stephanen, alij Daphnon, alij Samothracicen, alij Metirion, alij Hypoglossion uocant. Folio est maiore quam Rusci, molliore, & candidiore, semine inter folia rubro, Ciceris magnitudinē. Ramos spargit in terra, dodrantes, interdum longiores. Radice syluestri Myrto simili, molliore, odorata. Inuenitur in montosis. Difficiles partus accelerat, radice pota sex drachmarum pondere in uino dulci. Et stillicidio urinæ auxiliatur. Sed sanguinem extrahit.

BARBARI COROLL.

Laurus Alexandrina, Carpophyllos quoq; dicitur, quoniam super dorsum folij fructificat. Propria nascitur circa Idam: unde cognomen Idææ. Plurima & circa Heracleam Ponti. Frutex topiarij, & coronarij est operis.

EX M. VERG. COMM.

Habet Laurus Alexandrina integrę quantitatis folio supernatum a superiore parte paulo supra longitudinis dimidium minus aliud folium, quod ueluti monstrum aliquod in eo super nascitur & uiuit, eiusdem excæpta magnitudine per totum figuræ. Neq; ab re hic utrunq; hoc folium Rusci folijs comparauit: acuminata enim sunt: solaq; ut hic ait, magnitudine, mollicieq; & candore differunt. Habet præterea Alexandrina Laurus hæc aliud, quod Rusco simile sit. ἐπιφύλλοκαρπος enim ut Theophrastus ait, id est, in folijs contra aliarum stirpium naturā fructum fert. Quod hic breuius indicauit, dicens. καρπὸς δὲ ἐν μέσσοις. &c. Nosq; uertimus, fructum fert in medijs folijs. In quo animaduertendum est, fructum ferre Alexandrinam hanc Laurum, in medio quidem folio, quemadmodum & Ruscus: non tamen simpliciter ut ille, sed in geniculo alterius eius folij, quod nos maiori folio supernasci diximus. Illic enim hæret fructus: eamq; ob causam potuit hic scripor ἐν μέσσοις dicens, non media folia, sed inter folia medium nasci fructum testari. Quemadmodum Theophrastus libro primo de plantarum historia his uerbis indicauit. καὶ ἕνα καρποφόρα μεταξὺ περιελκόμενα τὸν καρπὸν, ὥσπερ ἡ ἀλεξανδρινὰ Λάφνη. Quod est. Sunt & folia quædam fructum ferentia, & inter se fructum amplexa, qualis Alexandrina Laurus est. Inter se fructum amplexa ait, paucis quod dicimus manifeste indicans. Esse autem Alexandrinam Laurum ἐπιφύλλοκαρπον, id est, in folijs ferre fructum, pluribus locis testatur Theophrastus idem: præsertimq; tertio de plantarum historia uolumine. Idæa Laurus etiā dicta hæc, ab Ida monte est, quo loco speciosior & copiosior forte nascitur. Stephanon iudem, id est, coronam, q̄ pro Lauro ad coronas forte uterentur. Creditur musq; nos, Alexandrinam Laurum dictam, q̄ Alexander uictor ea usus fuerit: & si Plinius Daphnoidi id tribuat. Scienidum illud etiā, inueniri aliquādo in ea simplicia folia, quæ superna sci alterū illud folium fructus causa. Hypoglotton, & Hypoglossidion uocari a quibusdā eandem hic ait. Idē monuit & Plinius. Factūq; id nomen a lingua est: nec aliud significat, q̄ quod sub lingua habetur, aut huiuscemodi quodpiam. In quo non facile persuaferit mihi aliquis, a similitudine humanæ linguæ dictam fuisse. Acuminatō enim mucrone folia eius sunt: a qua figura longe humana lingua abest. Quo fit ut credamus, potuisse quondam sic dici, quoniam ad siccandam linguæ nimiam humiditatem in pueris forte uterentur. Est enim illi acri-

A
ut in Italia.

Myrtus quare dicitur
sit Myacantha.

Λάφνη ἀλεξάνδρι-
νη
Idæa
Danaën
ἐπιφύλλοκαρπος

B

Laurus quare
dicta sit Alexan-
drina.

D I O S C O R I D I S

C monia, & calefaciendi uis. Id tamen in antiquis hæcenus inuentum a nobis non est. Verum-
tamen scimus, Insu- bres, aliasq; gentes aliquas in balbutientibus pueris uti ea: iuberiq; sublin-
gua habere, mares duplex eius folium & focūdum, simplex uero & sterile illud foeminas. Ve-
rum tamen ut diximus, in græcis nullum eius usus habemus auctorem.

De Daphnoide.

C A P. CXLIX.

Daphnoide

D Aphnoides Alypo simile, flos ut Nymphææ, cuius medium
nuci Cypressi non dissimile, in quo semen. Aliqui Chamæ-
daphnen, alij Peplion, alij Eupetalon uocant. Cubiti altitudine fruti-
cat, ramis flexilibus, multis inde sursum uersus foliosis. Cortex supra
modum uiscosus ramos uestit. Folia Lauri, graciliora, & molliora, fra-
ctu contumacia, quorum gustatu os & fauces incenduntur. Flores can-
didi, bacca cum ematuruit, magna, radix inutilis. Nasctur in monto-
sis. Pituitas extrahit folium recens, uel aridum in potu. Menses ciet &
uomit. Caput inanit commanducatum. Sternutamenta mouet. Bac-
cæ quindecim potæ aluum resoluunt.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 24. ca. 15.

D Aphnoides & ipsa Laurus est syluestris, baccis e nigro ruffis, sed alij eam Pelasgon. Alij
Cephalon, siue Stephanon Alexandri uocant. Herbarij nostri Laureolam, & hanc & sequen-
tem. Folia huius crassiora Plinio q̃ Laurus, graciliora Dioscoridi. Nec illud præteribo, Dio-
scoridis mihi uerba non uideri, quibus dicitur, Alypo simile hanc herbam esse floribus Nym-
phææ. Inuenio & qui Alypoides hanc uocent.

E X M. V E R G. C O M M.

D Non Laurum, sed Lauri formā & spēm: neq; eam toto corpore, uerū in folijs & fructu tan-
tum habentē herbam Græci Daphnoides dixerunt. Plinius præter nomina quæ in Dioscoride
leguntur, Stephanon, id est, coronā Alexandri uocari etiā dixit. Nostræ ætatis peritiores her-
barij, hanc priuatim Laureolam uocant: ostenduntq; Laurinis folijs surgentē a terra, furculo-
sum fruticem, cōferētis, coacervatisq; sub folijs seminibus, quæ laurinarum baccarum figura
sunt, nigris ut hic etiā ait, in maturitate. Florem uidere non licuit. Eamq; ob causam nihil pro
comperito de eo testatur: sed respondentibus naturæ cæteris notis, uerisimile est, responsuros
etiā & flores. In quibus damnauimus nos, & explosimus quod a capitis principio statim lege-
batur, Alypo simile Daphnoides, & florem Nymphææ habere: & quod sequit, in medio floris
esse cono simile quiddā, in quo semen: quoniā non responderent Daphnoidis historia, & nulli
bi in antiquissimis græcis & latinis ea legerent: & paulo post de flore eius legitimo loco agere-
tur. Nasci multum Daphnoides hoc Theophrastus in Arcadia testatus est. Numeraturq; ab eo
inter ea quæ præcipuam purgandi uim habent. Quod hic etiā indicat, monens per aluū pitui-
tas ducere, uomitiones ciere, mensesq; , & commanducatum pituitas oris purgare: quin etiam
sternutamenta facere: quæ omnia eiusdem potestatis sunt.

De Chamædaphne.

C A P. CL.

Chamædaphne

C Hamædaphnen aliqui & hanc Alexandrinam appellarunt, æ-
lij Daphniten, alij Hydragogon, Romani Laureolam, alij La-
ctaginem, Galli Vsubim. Virgas emittit cubitales singulari ramulo
constantes, rectas, tenues, læues, folia Lauri similitudine, læuora mul-
to, ac uiridiora, semen rotundum, rubens, annexum folijs. Illinuntur
capitis doloribus trita folia. Stomachi ardores mulcent. Ad sedanda tor-
mina cum uino bibuntur. Potus cum uino succus, menses & urinam
ciet. Idem facit pello appositus.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 21. ca. 27.

C Hamædaphne folio tenui, eadē quibusdā & Vincaperuina est, herba Topiaria, semper
uirens, in modū lineæ folijs geniculatim circūdata, ueteribus inopiā florū supplere solita, cuius

& comedunt asparagi. Porro mihi alia uidetur esse Vincaperuinca, q̄ Chamædaphne: q̄ Vincaperuinca non attollitur, sed serpit, ac se in modum lineæ, ut prædixi, porrigit, flore in purpureo: Chamædaphne affurgit in cubitalem altitudinē, ut Dioscorides, & Plinius confirmāt. Potest tamen etiā Chamædaphne dici Vincaperuinca, id q̄d & Plinio placet. Sed ut testatum sit tamē, aliud, nō idem oīno genus esse. Alioquin & medicina quocq̄ nōnihil uariant. Hydropicis, & auribus, & aluinis prodesse Vincaperuinca dicitur, Chamædaphne capitis doloribus, urinæ, mensibus ciendis, ardoribus stomachi, torminibus.

HVMilis & terrestris Laurus Chamædaphne est, sola foliorū similitudine græcorū adoptione in nomē Lauri & honorē adscita: topiaria herba, si Plinio credimus, & a latinis herbæ suæ ætate Vincaperuinca appellata. Quæ si ea est quam Ethruria nunc Vincam herbā uocat, quæ defunctæ uirginis in gente nostra ad sepulturam coronatæ efferuntur: & quæ familiæ apud nos aliquæ, gentili iure suo, primū ingredientem urbem Archiepiscopum coronatæ, ad portā excipiunt, stipantq̄, & per urbem comitantur, cognitu facillima est: in hortis passim nascens, tenuissimis uiticulis potius per terram serpens q̄ uirgis, ut Dioscorides ait, a terra se extollens: folijsq̄ oleaginis magis q̄ laurinis similibus. Verum a Dioscoridis Chamædaphnes historia longe ea differt, ob eas quas paulo ante numerauimus, & plerasq̄ alias notas, quas uolentibus obseruasse facillimū erit. Meminit Theophrastus Chamædaphnes ad extremū tercij de plantarum historia uolumen: sed tam breuiter, ut nihil possit ab eo aliud intelligi, q̄ ferre Chamædaphnem fructum folijs adnatum: quod a nostræ ætatis Vinca longissime abest. Ea etiam in nullo ciborū usu modo est, quod ueteres græcorū medici in Chamædaphne fuisse, quondam testantur. Siquidem Paulus Aegineta in sexto de ea agens ait, & καὶ ἡδισταί. Quod est. Hæc etiā comeditur. Præterea libro primo quo capite docet de omnīū olerum asparagis, cum longius de pluribus egisset, subiecit, παραπλησίως δὲ καὶ ὁ τῆς χαμαὶ δάφνης ἀσπράγος, id est, Nutrit similiter etiam & Chamædaphnes asparagus. His nos indicijs, auctoribusq̄ persuademur, non esse Chamædaphnem Ethruriæ Vincam herbā. Et nihilominus quæ a Plinio Vincaperuinca, uolumine, capite undecimo describit, nostræ gentis Vincæ satis respondet. Siquidem Vincaperuinca ait semper uirere in modum lineæ, folijs geniculatim circumdatam, topiariam herbam, & inopiam florum aliquando supplere. Quæ omnia nostræ huic competunt: in Chamædaphne autem inueniri nequeunt. Quærendum itaq̄, qualis Chamædaphne sit, folio Lauri, cubitalibus uirgis, fructu rotundo rubenteq̄, & folijs adnato, cuius asparagus in ciborum usu esse possit.

A

VERG.

B

De albo Veratro.

CAP. CLI.

Elleborum album aliqui Ascida uocant, alij Atomon, alij Pignato Exarin, Magi sanguinem Herculis, alij Polyidos, alij Anaphyston, Aegyptij Somphiam, alij Oure, Latini Veratrum album, Galli Laginum, aliqui Anepsa. Fert folia Plantaginis, aut Betæ syluestris similia, sed breuiora, & nigriora, rubescentia, caulem cauum, quadrantalem, tunicis conuolutum cum arescere cœpit. Radicibus nititur multis, tenuibus, ab oblongo capite exeuntibus, Caparum modo fibratis. Nascitur in montibus & asperis. Radices messibus colligendæ. Optimū habetur candidum, friabile, carnosum, modice extentū, nec tamen lunci modo mucronatum, quod frangēdo puluerem emittit, & tenuem habet medullā, gustu non admodū feruens, neq̄ saluā subinde ciens. Huiusce modi aut strangulat. Primatū Cyrenaicum tenet, Galaticū aut & Capadocicum, candidiora, & puluere quodam obsita, celerius strangulatus mouent. Vomitione autem uarios extrahit humores. Collyrijs ammiscetur, quæ caliginem oculorum discutiunt. Partus impositum necat. Menses pellit. Sternutamenta excitat. Mures interficit, cum melle & polenta subactū. Absumit carnes, si coquat una. Datur per se ieiunis, & cum Sea

Dall'Aglio

D I O S C O R I D I S

C sama, aut pisanæ succo, aut halicæ, aut lentis cremore, cum aqua mulsâ, aut pulte, aut quauis alia sorbitione. Cogitur cum pane, & ita inassatur. Preparatio corporum, ac uictus ratio diligenter tradita est, cum ab his qui de medica eius potione scriptarunt, tum maxime a Philonide Siculo Ennensi, cui nunc assentimur. Quippe longum nimis esset in hac præsertim ædificatione, de materia, simul medicam uiuendi rationem exponere. Dant nonnulli in pulte, aut halicæ sorbitione, aut paucum antea cibum dari præcipientes, statim Veratrum offerunt, ijs præsertim, quibus nulla strangulationis suspicio imminet, si nulla ualerudo corpus infirmat. Si quidem dum hæc ita contingunt, deiectio nihil periculi minatur, quod non intempestiue medicamentum corporibus offeratur. Vomitiones concitant subditæ ex eo balani, cum aceto.

Theoph. li. 9.
cap. 10. 11.

Pli. li. 25. ca. 5.
D

B A R B A R I C O R O L L.
Elleborum candidum, hoc est, Veratrum, frigidis gaudet. In Anticyra commodissime purgari fructu eius, quod Sesamæ habet similitudinem, Theophrastus tradidit. Sed hoc Sesamoides uocatur. Coruhicibus semen Ellebori gratissimum, scribit Aristoteles: quâ ob causam antiqui eas damna uere mensis, nunc quaeruntur. Nigrum a candido radice tantum differre arbitrantur plerique. Alij etiam folijs, quæ candidum continuo radici annexa, et humi sparsa habeat, caule ferulaceo, breuioreque: quæ Albuci, Plurimum nascitur in Oeta monte, & optimum uno eius loco circa Pyram. Secundus locus Pontico. Tertius Heleatico: quod in uitis gigni ferunt. Quartus Parnasio, quod adulterant Etolico, ex uicino. Sunt qui & Massileoticum inter hæc laudent. Album cum succidit, caput aggregat. Ideoque celeriter effodi præcipiunt, & Allium præsumi, & uinum sorberi: quod Dioscorides & in nigro seruat. Leguntur autem tenuissimæ radices, breuesque: ac uelut decurtatæ etiam hæc. Nam summa, quæ est crassissima, Cepis similis, canibus tantum purgandis idonea est. Veteres radices, corticeque carnosissimum eligeant: quo tenuior eximeret medulla, hanc humidis spongijs operatam, turgescentemque, in longitudinem sindebant, deinde fila in umbra siccabant, ijs utentes: nunc ramulos a radice sua grauissimi corticis ita dantes. Incidit forficulis Elleborum, & cribratur. Cortex remanet. Hoc submoto, medulla cadit. Album optimum, & quod celerrime mouet sternutamenta. Sed multo terribilius quæ nigrum. Durare uim utriusque triginta annis putant. Necantur albo melle trito, & cum lacte sparsa. Galli sagittas in uenatu tingunt Elleboro, circuncisique uulneribus tencrorem sentiri carnem prædicant. Herophilus, Elleborum fortissimo duci æquabat. Concitatis enim intus oibus, ipsum imprimis exire. Ideo errauisse antiquos, parcius id præbendo, cum celerius erumperet, quod largius daretur. Reddi post quatuor fere horas incipit, totum opus septenis absoluitur. Nigrum equi, boues, fuesque cauent, cum impune candido uescantur.

E X M. V E R G. C O M M.
Quibus hæcenus nihil auditum de Veratro fuerit, pigeatque Plinium & Theophrastum legisse, paratus cunctis Barbarus erit, collectis, & in Corollarium suum reuocatis, omnibus antiquorum de Veratro observationibus & dictis. Esti tam nota medicinarum res modo men abundat, nec difficile cognitu est: discrimen coloris in radice præsertim.

ἐλλέβορος μέλας

De Veratro nigro. C A P. CLII.
Elleborum nigrum, aliqui Melampodion uocant, alij Ecstomon, alij Polyrhysion, alij Protion, alij Melanorrhizon, alij Cyranion, Magi Zomarition, Aegyptij Isæam, alij Elaphine, alij Cemeleg, Latini Veratrum nigrum, alij Saraca, Daci prodiorna. Appellatur Melampodion, quoniam caprarum pastor nomine Melampus, furces in se Proceris filias, primus purgasse, & sanasse fertur. Folia ei uiridia, Platani similia, minora, folijs Sphondylii proxima, subaspera, pluribus diuisuris incisa:

caulis asper, flores purpurei, racematim coherentes, semen Cnici, quod in Anticyra Sesamoides uocant. Quo deiectiones moluntur. Radicibus coheret nigris, tenuibus, a capitulo Capæ simili confibratis. Quarum est usus. In collibus, asperis, & sitientibus locis enascitur. Optimū est quod ex quibuscūq; petitur terris, ut ex Anticyra. Nigrum inibi probatissimum gignitur. Eligi debet corpulentum & plenum, in quo tenuis sit medulla, acre gustu, feruensq; Cuiusmodi est Elicone, Parnaso, & Aetolia natum. Attamen Eliconium præcellit. Veratrum nigrum purgat uentrem. Detrahit bilem, pituitasq; datum per se, aut cum scamonis, & tribus obolis, siue drachma salis. Decoquitur cum lente & iusculis, quæ purgationis causa sumptantur. Prodest morbis comitialibus, melancholicis, insanientibus, articularijs doloribus & resolutis. Menses inditum trahit. Partus necat. Purgat fistulas impositum, & tertio die detractum. Item cōtra grauitatem auditus in aurem demittitur, ibiq; in alterum, aut etiam tertium diem esse finitur. Scabiem sanat, illitum cum thure, aut cęra & pice, & cedrino oleo. Vitiliginibus, lepris, impetiginibus ex aceto medetur. Dentium dolorem collutione mitigat. Erodentibus medicamentis commiscetur. Hydropicorum uentri utilissime imponitur, factum ex eo farina hordeacea, & uino cataplasmata. Confitum proxime radices uitium, uinum purgandi facultate donat. Huius resparfu domos expiari arbitratur. Quare inter fodiendum stantes, Apollinem, Aesculapiumq; precantur: ac uitant Aquilę uolatus. Aduolare enim non sine periculo tradunt. Namq; si auis effossionem Ellebori conspexerit, moriturum qui succidit, augurium est. Celeriter effodiatur oportet. Quoniam odore caput aggrauat. Quapropter ad id arcendum fossuri, Allium præsumere, & uinum bibere consueuerunt. Nulli ita noxæ opportuni reddunt. Veratri albi mō emedullat.

BARBARI COROLL.

Elleborum nigrum sunt qui Ectomon Melampodion uocent. Hippocrates certe haud aliter fere q̃ Ectomon appellat Veratrum ipsum, præcipueq; nigrum. Porro Melampodion idcirco dicitur, quia Melampodem inuentorem habeat: quem alij diuinationis peritum, alij pastorem fuisse tradunt: & furentes Præti filias Elegē, & Celænen dato caprarum lacte, quas Elleboro purgatas animaduertisset, sanasse in Arcadia, prope fontē Clitorium. Caulis ei similis cādidō. Folia, ut Theophrastus quodam loco tradit, etiam Laurinis similia. Vbiq; provenit. Religiōse hoc colligitur. Nam & gladio circumscribit, & ad ortū spectat q̃ eruit, precat, ut id liceat sibi concedentibus Dijs facere. Veratū & nigrū, & candidū ex Anticyra cōmendant scriptores, & poætæ. Anticyra uero hæc in Locride, siue Phocide sita est, ut scribunt Pausanias & Strabo, Nam & aliubi legit Anticyra, hoc est finu Maliaco, & prope montem Oetam: ubi Elleborus quidem præstantissimum, sed in Phocidis Anticyra melius paratur admistione, ut inq̃t Strabo, Sesamoidis, de quo statim dicemus. Propterea in Phocidis Anticyram, non in Oetæam Elleborum poturi secedebant.

EX M. VERG. COMM.

Quæ in extremo capite fabulosa, & ad augendam rei admirationem potius q̃ medicinæ aut historiæ Veratri necessaria a Diosc. referuntur, omnia ex Theophrasti, de plantarum historia uolumine, paucis mutatis reperiuntur. Et si ab eo in ista, id est, adiecta, & ob id falsa uideri omnia hæc dicantur. Longiores in opere hoc nostro, præsertimq; in re nota er-

Y

Pli. li. 25. ca. 6.
The. li. 9. ca. 10
& u.

Strabo. lib. 9.

D I O S C O R I D I S

Cmus, si ex eo scriptore cōmentationibus his nostris addere ea uoluerimus. Satis sit græcarum literarum peritis locum in Theophrasto signasse: ignaris uero Plinium lib. 25. capite quinto au-
dire, eadem illa omnia iisdem fere uerbis narrantem. Quæ licet plura, nec penitus eadem huic
scriptori uideantur, non ideo tamen ex uarietate uitium suspicari oportebit. Aliter em̄ hic her-
bariam, q̄ illi fabulosam historiam docet.

De Sesamoide magno. CAP. CLIII.
Sesamoides magnum, aliqui Sesamiten, alij Sesamin, alij Lycoscyta-
lion, alij Anticyricon appellant, quoniam in Anticyra albo Vera-
tro in purgationibus misceatur. Simile est Senetionii, aut Ruræ, longo
folio, flore candido, radice gracili, ignaua, gustu amaro, cætera Sesamæ
simile. Ventrem purgat. Datur tritum ad bilis pituitæque deiectione-
nes, quātum tribus digitis capitur, addito Veratri albi sesquiobolo ex
aqua mulsa.

BARBARI COROLL.
Sesamoides maius, a similitudine nomen accipit. Hoc nascitur in Anticyra, nec alibi, quod
inuenerim. Hoc & Elleborum a Theophrasto dicitur: ut in candido notauimus.

EX. M. VERG. COMM.
Sesamoidi quemadmodum uox, & præter uocem hic ipse scriptor, Pliniusq; testatur, nome-
Sesami similitudo fecit. Neq; enim Sesamoides aliud, q̄ quod Sesami speciem & figurā habet
significat. Pliniusq; Sesamoides a similitudine nomen accepisse ait: & hic *σάριμα ὁ μοιον ἐνομάσω*,
id est, semen Sesamo simile habere. Duorum generum præter Diosc. autore eodem Plinio, & in
græcis Paulo Aegineta, planta hæc est. Siquidem Plinius cum primum descripsisset genus li-
bro. 22. cap. 25. subiecit statim. Est etiamnum aliud Sesamoides. & c. Paulus uero Aegineta co-
lore candido alterum indicans, suas illi uires assignauit: mox alterum maius appellans Vera-
trum passim uocari ait. Nec dubitandum, tam certa ueterum scriptorum testimonia sunt, duo
Sesamoides esse. Vtq; hoc constat, sic contra parum certum est, sint ne eorū in colore, an in ma-
gnitudine discrimina. Antiquissimi græcorum codices, quos uidere licuit, colore discernunt:
uocantq; prius hoc *μύλαν*, id est, nigrum, posterius *λευκόν*, id est, candidum. Qui uero passim cir-
cumferuntur, a magnitudine & breuitate notas & discrimina eorum ostendunt, *μύλα καὶ μικρόν*,
id est, magnum & paruum appellantes. Paulus Aegineta alterum *λευκόν*, id est, candidum: alter
um *μύλα* id est, grande & maius uocat. Contrariorum tamen ratio exigebat, ut si candido colo-
re alterum signaretur, nigro alterum e diuerso indicaretur: quemadmodum in quantitate faciū
in alijs codicibus est: in quibus grande primū, mox breue Sesamoides describitur. Pendemus
q; nos in ea re animo: tam facilis & lubricus lapsus in græcis est, unius tantum literæ mutatio
ex nigro ad magnum: et ediuerso, *μύλαν* nigrum, *μύλα* grande græcis significat. Receptoq; in pri-
mo Sesamoide semel huiusmodi uitio, facilis in secundo error fuit. Potuitq; hoc & in Dio-
sc. & in Paulo Aegineta pariter fieri. Egre enim persuademur, proposito candido, non reddē-
dum illi fuisse nigrum. Et si recipienda a colore discrimina hæc fuerint, ratiocinari tunc oportet
bit, qua parte colores illi in alterutro Sesamoide inueniendi sint. Quod difficillimum erit. Ob
eam causam inclinatur animus nobis in alteram partem: probamusq; ex magnitudine magis q̄
ex colore in Sesamoide sumi discrimina. Duplicem enim colorem illum, Veratri exemplo tri-
butum Sesamoidi fuisse ex eo opinamur: quod quemadmodum duplex Veratrum est, candi-
dū. s. & nigrū, pmiscueq; Sesamoides Veratru, & Veratru Sesamoides, ob eā quā mox dice-
mus causam, quondam diceretur: sic etiam ab imperitis rei, creditū fuerit, candidum & nigrū
oportere Sesamoides dici: Non quatenus diuersa a Veratro herba Sesamoides est, sed quod
illi ob promiscuum ex usu nomen eadem esse credebatur. Fuisseq; usum Sesamoidis in purga-
tionibus Veratro coniunctum, indicant fere omnes. Hic primum dicens. *ὅτι δὲ ἐν ἀντικύρῳ ἰλλεῖ-
ρον καλοῦσι διὰ τὸ μίγνυσθαι ἐν ταῖς καθάρσεσι τοῦ λευκοῦ ἰλλεῖρόν*. Quod est. Qui autem Anticyram in-
colunt, Elleborum Sesamoides, q̄ in purgationibus candido Elleboro misceatur, appellat. Idē
testatus & Plinius est li. 25. cap. 6. In Anticyra insula tutissime sumitur: qm̄ ut diximus, Sesamoi-
des admiscet. Testatus & Strabo. 9. suæ geographicæ uolumine, in descriptione Thessaliæ, pri-
uatimq; Anticyræ, quo loco sic de Elleboro agit. Postea Anticyra, quo nomine & alia est ad si-
num latens Maleacum & Oetam montem, illhic mitem Elleborum nasci ferunt. Hic aut opti-

me preparatur. Quo circa frequentes huc aduenæ conflunt, purgationis & curationis gratia. A
Etenim in Laconica pharmacum nasci quoddam Sesamoides semini perq̃ simile, cui permixtū preparant ceterū Elleborū. Paulus Aegineta tñ certiorē eius rei causam in. 6. attulit. Cuius uerba hæc sunt. *εσσαμοιδίον τὸ μίγα ὅπιν καὶ κοτινὸν ἰλλιθερον ὀνόμασι διὰ τὸ ὁμοίως ἰλλιθερῶν καθαίρειν αὐτοῦ τὸ σπέρμα.* Qd̃ est. Sesamoides maius, qd̃ palā Elleborus nominat: q̃a semen eius pariter Ellebo-
ro purgat. Ex his ratiocinari facile est, diuersam a Veratro Sesamoides herbam esse: & quia misceretur illi in purgationibus, aut easdem habet vires, Elleborum creditam a multis fuisse: ideoq; nigri & candidi, utriusq; Veratri modo discrimina ab imperitis inuenisse: sui generis tamen herbam, & quia Sesamo simili semine sit, Sesamoides appellatam.

¶ De Sesamoide paruo. CAP. CLIIII.

S Sesamoides paruum, aliqui Coronion, alij Sesamon syluestre uo-
cant. Cauliculi ei sunt dodrantales, folia Coronopi, minora, hirsu-
tiora, & in cauliculorum cacumine capitula florum pene purpureorū,
medio eorum albo. Semen Sesamē fuluum, amarum, radix tenuis. De-
trahit bilem, pituitasq; semē ex aqua mulsa potum dimidio acetabulo.
Illitum ex aqua, tumores ac tubercula discutit. Nascitur in asperis.

ARBARI COROLL.

S Sesamoides minus, folio minore q̃ Sesami. Nascitur in glareosis. Hoc & Sesamoides candi-
dum, a Galeno dicitur.

EX M. VERG. COMM.

SVperest pro Sesamoide dicendum quod superiore capite imprudenter relictū a nobis est. B
Nasci Sesamoides in Anticyra. Ideoq; ut hic, & Plinius dixerunt Anticyricon uocari. Quæ eti-
am causa fuit, ut in rei æstimatione misceretur ab imperitis Veratrum, & Sesamoides: qm̃ id-
em natale solum haberent. In quo uidendum diligentius erit, quoniam duæ Anticyræ quon-
dam fuerunt: altera Phocidis urbs, altera in Maleaco sinu insula, utrobi Sesamoides hoc nasca-
tur. Ex antiquis enim scriptoribus plures ad purgationes Veratro faciendas insulā magis lau-
dauerūt in Maleaco sinu, q̃ in Phocide urbem. Alj in Phocidis Anticyra tutius sumi Veratrū
dixerunt: quoniam Sesamoides hoc illi admisceretur: manifesto argumēto, in hac, non illa An-
ticyra nasci Sesamoides. Animaduertendum & illud, miscere Plinū utriusq; Sesamoidis histo-
riam & medicinam: & quæ alterius sunt, alteri tribuere. Quod nominis similitudo, & æquiuo-
ca eorum appellatio uidetur fecisse. Locus est. 22. uolumine, capite. 25. In cuius rei indicatione lo-
cus in eo scriptore corruptus adhuc est, granum Sesamæ dari dicens in uino dulci, ad detractio-
nes quantum trinis digitis capiatur. Sesamoidis enim, non Sesamæ legendum autore Dioscori
de illic est: a quo cuncta illa Plinius accepta latinis reddidit. Poterunt uolentes utriusq; scripto-
ris dicta inter se conferre.

¶ De syluestri Cucumere. CAP. CLV.

S Y L V E S T R E M Cucumin, aliq̃ Elateriō uocant, *ελενὸν ἄγριον*
alij Grynion, alij Balin, alij Syncrisin, alij Bubalion, alij Scorpion,
alij Pherombron, alij Peucedanon, alij Notion, Romani Ancetum, alij
Agrestem, Poeni Cusimezar. Fructu solo distat a satiuo Cucumere, lō-
ge minorem pariens fructum, oblongis glandibus non dissimilem. Fo-
lia atque farnerta satiuū refert, radice candida, magna. Nascitur in sa-
buletis, & prope domicilia, frutice in totum amaro. Instillatus folio-
rum succus, aurium dolori conuenit. Illita ex polenta radix, ueterem tu-
morem discutit. Imposita cum resina terebinthina, tubercula rumpit.
Ischadicis infunditur. Podagras discutit, decocta ex aceto & illita. Eius
decocto dētes in dolore colluuntur. Aridæ farina impetiginem, lepras,
& uirilgines abstergit. Nigris cicatricibus colorem reddit. Et in facie
Y ἦ

D I O S C O R I D I S

C maculas expurgat. Radicis succus sesquiboli pondere, & item cortex acetabuli quarta parte, bilem pituitamq; deiiciunt, præsertim in hydro-
piciis. Deiectiones autem citra stomachi iniuriam mouet. Radicis seli-
bra, præsertim in uini Libyci hemina conteritur, danturq; ex eo terni
cyathi triduo, dum tumor abunde deprimi cernatur.

B A R B A R I C O R O L L.

DE Cucumere syluestri, siue anguino, & erratico dictū in satiuo est. Illud hoc loco memine-
rimus, Balidem a quibusdam uocari, ut inquit Dioscorides, anguinum Cucumerem. Ego Ba-
lin, & Balidem lego dici florem quandam, & alio nomine Ballithum: qui mortuos uitæ restitu-
at: ut & de Arione fabulantur. Photionem habeo grammaticum, qui hoc affirmet post Pliniū,
demonstratam a dracone, qui ea herba catulum sibi occisum reddidit saluti. Cucumerem syl-
uestrem Bubaliō quoq; dici, autores sunt Dioscorides, & Hippocrates. Est ubi Caprificum ita
dici legas: errore nato, q; Caprificus agria, Hyce appelletur. Syluestris uero Cucumis Agrioli-
cys. Alius q; flos habetur, Bellis nomine, pratenlis, & candidus, & quadatenus rubēs, aduer-
sus strumas efficax: ut Plinio uidet. Sit autē Bellis idē, q; & Bellius, siue Bellio, & ipse flos praten-
sis, quem Plinius quinquagenis qnis barbulis pastillicantibus Coronatum scribit, animaduertē
dū puro. Quanc; em luteus uidet a Plinio describi Bellio, uolumine primo, & 20. Bellis uero cā-
didus sexto & uigesimo, non tñ ita in omnibus Plinianis codicibus luteū eū esse legimus. Qui-
dā luteū ei semen, nō ipsum florē audiūt; & Paralyfin uulgo dictā interpretant: q; & primus ueris
flos, & Margarita cognominatur: & hyeme q; tora nascit, ex occidente, ut qdā existimant, in
Italiā conuectus. Quinquagenas tñ ei ternas, non gnas barbulas inuenio. Laudat ad paralyfin,
a quo & nomen: itēq; ad podagras, & Ischiada. Paralyfi uocatæ florem habet simile, pauciori-
bus tñ barbulis. Flos, qui qm a lōginquo conspicuus est, Paradelos uulgo dicitur: folio em nō

D admodū diuerso: nisi q; ferratū est hūc, non Paralyfi. Sunt q; Bupthalmō, & Bouis oculū ap-
pellent, nam q; Antipatrē uulgo dictū renē eū esse, ligdo fallunt: cū sit Antipater furculosus, &
flore luteo, quasi Cunilaginis minore. Folia Roris marini latiora, minusq; longa; Christophori
anā, & Oculū Consulis nōnulli uocant. Huius illa pprietas, q; flores post nascentes altius tol-
lunt, q; prius nati. De cuius rei argumento uideri posset aliquibus, hanc herbā esse quam Plinius
Impiā nocari tradit. Herba inqt Impiā uocatur incana, Roris marini aspectu, thyrsi nō uestita, et
capitata. Inde alij ramuli assurgunt, sua capitula gerētes. Ob id Impiā appellauere: qm liberi su-
pra parentem extollant. Alij potius ita appellatā, q; nullū animal eā attingat, existimauere. Hęc
inquit inter duos lapides trita seruet, p̄cipuo aduersus anginas succo. Nec tentari unq; eo mor-
bo qui gustauerint: itaque & suis dari. Quæque medicamentū id noluerint haurire, eo mor-
bo interire. Sunt qui & in auiū nidis inferi aliquid ex ea putent: atq; ita non strangulati pullos
auidius deuorantes. Hęc Plinius. Cæterū quanc; similitudo in ea proprietate sit, multa sunt in
ter utrāq; discrimina. Primum, q; Impiā, incana est herba: Antipater non est. Alterum, q; trita
non seruet. Tertium, q; nec capitula, nec thyrso gerit, sed flores dumtaxat.

De Elaterio. CAP. CLVI.

Antipater

E Fructu huiusce Cucumeris, fit medicamentum quod Elaterium
uocatur, ad hunc modum. Decerpti Cucumeres, qui tacti proti-
nus exiliunt, seruantur nocte una. Postridie imposito supra craterem ra-
riore cribro, utrisq; manibus præhenso, sigillatim supino cultro sursum
uersus aciem habente finduntur, atq; per cribrum humor in subiectū
uas exprimitur. Simulq; carnosum quod hæsit cribro, quo facilius ex-
cidat eliditur, quod ita pressum est, residere finitur, atq; in uicinam pel-
uim demittitur. Coaceruata autem in cribro segmina, dulci aqua per-
funduntur, & denuo pressa, abijciuntur. Humor in pelui agitatur, & lin-
teo opertus, soli exponitur. Dumq; steterit, tota supernatans aqua, cum
humore concreto effunditur. Hoc uero identidem fieri solet, donec ex-

istens aqua liquecat: qua stillatim exhausta sedimentum mortario suscipitur, & conterendo cogitur in pastillos. Sunt qui ad hauriendam p̄tinus succi abundantiam, cribratos cineres humi inspargāt, & mediū cauātes, triplicatum linteū obtendant, per qđ Elateriū cum sua humiditate diffundūt, siccātūq; in pila ut dictū est, cōterūt. Aliq; p̄ dulci aqua marinam perfundētes, ita eluūt. Alij in nouissima lotiōe, mulsam aquā respergunt. Elateriū optimū esse constat lēue, nō pōderosum, cū cādore leniter humectū, gustu amarissimum, quodq; lucernarū luminibus obiectum, facile flagret. Porraceum tamen, scabrumq; si turbidum spectetur, atq; erui cinerisq; plenum sit, graue & uitiosum esse solet. Nec desunt qui Cucumis succo amyllum immisceant, ut candorem ipsum & leuitatem imitentur. A binatu ad decennium deiectionibus utile est. Integer modus obolus est, minimus semiobolus, pueris chalci duo. Si quidem copiosius, periculum adfert. Bilem ac pituitam aliterutra parte extrahit. Optima suspensio est purgatio. Quod si in animo sit deiectionem moliri, adiectio salis duplo, & stibij, quod colorare sufficiat, ex aqua erui magnitudine catapotia dato: postea cyathus unus aquæ tepidæ sorbeat. Ad citandas tamen uomitiones, aqua diluens Elaterium, subiectas linguæ partes penitissime pinna oblinito. Quod si quisq; difficiliter euomat, oleo, aut unguento irino resoluito. Somnum inhibeto. Porro his qui eximie uacuantur, continue uinum & oleum dari conuenit. Etenim uomendo restituantur. Quod si uomitiones non finiantur, aqua frigida, polenta, posca, poma, & quæ stomachum densando corroborant, offerenda sunt. Ciet Elaterium menses. Partus enecat in pello subditum. Morbo regio medetur, cum lacte naribus infusum. Diurnis capitis doloribus liberat. Efficax anginarum unguentum est, cum uetere oleo, melle, aut felle taurino.

BARBARI COROLL.

Elaterium, Theodorus Agitatorium conuertit. Nullum medicamentum longiore æuo durat. Ducentum enim aņos uim eius pollere Theophrastus asserit. Melius, quo uetustius usq; ad quinquagesimum. Lucernas adhibitum extinguit. hoc enim ueri probatio est: si prius q̄ restinguat, scintillare sursum, ac deorsum cogat. Pallidum præstantius, ac leuiter amarum. Huius causa maturius secatur. Alioquin semen exilit, oculorum etiam periculo. Harūdiue ueteres incidebant. Tradūt hoc succo tactis radicibus uidum, non attingi uuas ab auibus. Ad hunc succum Cucumis Anguinus autumnō carpitur.

Pli. li. 10. ca. 1.

De Satiuo Cucumere. CAP. CLVII.

Satiui Cucumeris trita radix, & drachmæ unius pondere pota in Hydromelite, uomitus ciet. Si quis facile secundum cœnam uomere uelit, binis obolis sit contentus.

De Staphide agria. CAP. CLVIII.

Staphida agriam, alij Triphyllon, alij Stesion, alij Astaphida, alij Phthiroctonon, alij Phthirion, alij Apanthropon, alij Polyides, alij Pseudopathes, alij Arsenoten, Aegyptij Ibsacæden, Romani hærbā

staphis agria

Y ij

C Pediculariam uocant. Folia habet Labruscæ, diuisa, et cauliculos rectos, molles, nigrosq;. Fert florem Glasti, & folliculos uirides, similes Ciceri, & in his nucleum triangulum, scabrum, ex nigro subfuluescentem, intus album, gustu acrem. Grana quina denaue, si trita in aqua mulsâ detur, crassum humorem per uomitum purgant. Sed qui hauserunt, ambulare debent. Prudenter tamen attendere oportet, & aquam mulsam potui dare. Quoniam pericula strangulationis inferunt, & fauces adurunt. Trita, & ex oleo illita, phthiriali prodest. Item prurigini et psoris. Cit plurimâ pituitâ cõmanducata. Decocta in aceto, dentium dolori coluto ore subuenit. Rheumatismum gingiuarû sistit. Vlcera oris manantia, cum melle sanat. Vrentibus malagmatis imponitur.

Pli. li. 23. ca. 2.

BARBARI COROLL.

Staphis, siue Astaphis agria hæc est, quæ Pituitaria quoq; dicitur. Cornelius Celsus uuam Taminiam intelligit falso. Maturescit enim semen huius cum uindemia, nigrescitq; cum Taminia acini rubescant, & in apricis nascatur: & Ampelos agria sit, non Staphis agria. Hæc non nisi in opacis. Paulus Galenus secutus, duplex genus facit Staphidis, Satiuû, et Syluestre: ut Satiuum sit, quâ nos Vuam passam uocamus, quanto uolumine reddendâ. Astaphin, qui Attice loquuntur, Ostaphin uocabant: sicut Ominthâ pro Mintha, siue Mètha: & Ostacû, p Astaco. Est aut Astacus is, quem nos Gamarum quoq; dicimus. Porro est locus in Aetio ubi legas, Stephanida agriâ mendose, ut suspicor, pro Staphide agria: quâ ad uitia, psorasq; capitis cõmendat eâ. Nisi quis Stephanida putet esse, quam a nostris Coroneolam uocari diximus, hoc est, Cynobaton: utiq; si hæc, ut Rubi manantibus in capite præsidio esse potest.

VERG. D

Quam græci agrian Staphida, syluestre passam Vuâ sua uoce intelligentes dixerunt, Romani Taminâ uuâ, Pedicularê herbâ, Pituitariâq; uocauerunt. Et si Plinius contra Celsum alia a græcorum Staphidagria Taminiam latinorum uuâ esse testatus bis fuerit. Est sane græcis Staphis, & ut Athenienses dicere cõsueuerat Astaphis passa Vuâ. Ex cuius similitudine hæc syluestri tñ habitu ab ea discretâ est. Vocaturq; latini Pituitariâ, Pedicularêq; ex uirib. quas habet. Feruore enim suo cõmanducata multâ pituitâ trahit: & erupentibus e corpore pediculis, ex oleo inuncta aduersat. Quinetiâ, ut Plinius ait, in aceto decocta, etiâ uestes eo tedio liberat. Facilis cognita herba, tã certis notis a Dios. describit: partiq; a græca uoce deflexa appellatiõe, græcos nostris adhuc eâ indicat. Folia habet plerûq; septē, aliqui tñ pluribus, nonnunq; etiâ pauciorib. incisuris diuisa. Vtebant ea ueteres græcorum medici in alia in his q; Venerē exercere nō ualerēt, ex adipe, cui uuâ huius admixtū semē fuisset, genitalia inungi iubētes. Vtebant & in purgâdo capite, cõmanducandâ dantes: eaq; ratiõe pituitas eius partis p os trahentes. efficacissime em acrimoniæ est. Plinius, quẽadmodum pmonstrauimus, falso Taminâ uuâ. 2. uolum. ca. 1. his uerbis uocari ait, Astaphis agria, siue Staphis, quâ aliq; uuâ Taminâ uocât falso. Sui em genus habet. &c. Idē. 16. ca. 14. Taminie uuę uires describēs, quę Staphidagrie sūt palâ illi tribuit. Verba eius sūt. Itē Phthiriasi, qua Sylla dictator cõsumptus est. Nascunt q; in sanguine ipso hominis animalia, exesura corpus. Resistit uuę Taminie succo, aut Veratri cū oleo perunctis corporibus. Taminia qdem in aceto decocta, etiâ uestes eo tedio liberat: quę oia ex ui Staphidagrie huius dicta sunt: qua pediculos enecantē, & Pedicularē dici in Dios. legit. Monere legentes hoc tñ uoluimus, ut inuenisse & ipsi conent, an de eadē uuâ Taminia a Plinio duob. locis diuerse traditū fuerit. Cur aut Staphida potius, i. passam Vuâ, q; Staphylē, i. simplici uuâ ueteres græci dixerint, folliculorū figura fecit: qui rugosam uuam magis q; integros uuarum acinos referunt. Ob quâ causam & Plinius ait, folliculos magis q; acinos eam ferre.

De Thapsia. CA p. CLIX.

Thapsia aliqui Hypopion uocant, aliq; Pancranion, aliq; Scammion, aliq; Thelyterin, Romani Ferulaginem, aliq; Ferulam syluestrem, Pœni Bœden. Nomen ideo accipit, quod in Thapso eiusdē nominis insula, primū inuenta sit. Tota uero natura Ferulæ similis est,

graciliore caule, folijs Foeniculi, umbella Anethi in cacumine a singulis **A**
 furculis erumpente, flore luteo. Semen quale Ferulae, latum, sed aliquan-
 to minus, radix nigra, intus candida, longa, acris, crassiore libro uestita.
 Lactis extrahendi ratio haec est. Facto in ambitu scrobe, cortices incidun-
 tur, aut radix in fornicis speciem excavata, cooperitur quo merus succus
 confluat. Oportet illuc sequenti die se conferre, & congestum succum ex-
 trahere. Tunditur etiam radix in pila, & succus organo per quallum ex-
 pressus, fictili crasso insolatur. Aliqui folium una terunt. Sed inualidior
 huiusmodi succus. Hoc autem interest. Quoniam qui ab radice manas-
 uit grauius olet, & humidus permanet. E folijs autem extractus exiccatur,
 atque teredinum iniuriam sentit. Qui succum colligit, stare debet non obuersus
 uento, cum dies apricus est, & a flatu filet. Quoniam ob uaporis acrimo-
 niam facies uehementer intumescit, nudaeque corpora inuadunt pustulae.
 Ob id prius liquidum carato, & adstringente, nudas partes illinunt, & ita
 muniti accedunt. Tam cortex radicis, quam succus, purgandi uim habent.
 Lacteus succus in aqua mulsa potus, utrinque bilem extrahit. Radicis mo-
 dus quaterni oboli, cum tribus seminibus Anethi drachmis, succi terni obo-
 li, lactis obolus unus. Quod eo amplius assumitur, periculosum est. Huius-
 iusmodi purgatio conuenit suspiriosis, & diuturnis laterum doloribus,
 reiectionibusque. Datur in cibis, aut obsonio, quibus difficile sit uomere. **B**
 Tam radix, quam succus, omnium maxime quae pares cum eis uires adepta sunt,
 uim habent transconcretiuam, ubi ex imo aliquid euocandum est, aut mea-
 tum laxitas alio transferenda est. Unde succus illitione, & radix recens
 affricu, alopecias explent. Radix, succusque cum aquis ceterae thurisque por-
 tionibus, sugillata liuoresque tollunt. Sed non plus binis horis dimittan-
 tur. Locus deinde aqua maris calida foueatur. Vitia cutis in facie emenda-
 dat, cum melle illitus. Lepras tollit. Tubercula discutit, perunctus cum
 sulphure. Succus in diuturnis pulmonum, laterum, pedum, articularumque
 uoletudinibus utiliter illinitur. Valet ad integendam colic glandem, his
 qui natura, non circuncisione curti sunt. Tumorem enim excitat, qui pin-
 guum fotu emollitus, in pene iacturam refarcit.

T **B A R B A R I C O R O L L.**
 Thapsiae liquor expressus, efficacior quam semen. In Africa uehementissima haec est. Semen
 Ferulae, Thapsiam aliqui uolebant esse falso. Suum enim genus est inani caule, nec excedente
 baculi longitudine. Thapsia ob humoris abundantiam opus suum, ut Galenus auctor est,
 sero perficit. Facile corrumpitur. In Theocrito poeta Thapsos legitur, genus herbarum, tingendis
 lanis utile: qua & capillus flauescat. Hanc & Xylon Scythicon, hoc est, lignum Scythicum, a
 Sappho dici putant, uulgo Chrysoxylon. Diuersum porro, an idem sit Thapsos quod Tha-
 psia, iudicandum relinquo. In Aristotelis tertio Rhetorico. Hypopion, sunt e Graecis, qui pro
 Thapsia, uel alia herba capiant rubente. Nos pro sugillatione uertimus.

Pli. li. 19, ca. 9.

C **E X M. V E R G. C O M M.**
 Cognomines diuersis locis Thapsi urbes, insulae, Chersonesique aliquot Thapsiae huius quae
 modo tractamus ab earum aliqua primo quondam sic appellatae, diuersos natales & diuersas bo-
 nitates laudis fecisse uidentur. Nicander in Theriacis suis ex Sicilia Thapsiam in primis contra
 Y iij

uenata laudauit, τὸν δ' ἄνθρωπον, ἡνίκα μετα νόσον ἀκτινία λίξας, θινράριον μὲν ῥίαν ἰλὺν συνάλαβεν βάσαν μίαν, &c. Quod est, Nunc age, composita te malorum remedia docebo. Trinacriam sumito Thapsi radicem, quæ corpori medetur, &c. Plinius contra, 13. uolumine, capite, 122. Thapsiam in Africâ uehementissimâ esse ait. Hic scriptor, quæ plures alii secuti sunt, in Thapso insula primū inuentâ fuisse ait: nec bonitatis, maiorisq; in ea efficacîæ discrimina aliqua numerauit. Ex eo fit, ut credamus primâ Thapsiæ inuentiōem Thapso, quæ una ex Sporadibus insulis est, deberi: & in ea herbario Crateæ, qui primos illic plantauit, & eius uires obseruasse dictus est: potuisset alios ex alijs locis eam potius laudare, q̃ natale solum Africam, Siciliamue, aut alia loca illi assignare. Hanc ueteres Græci Hypopion uocant: ancipiti (nisi uitium in Theophrasto sit) & rei, & nominis significatione. Pro qua intelligendum est, significare græcis Hypopion, cui in ultima syllaba, i, non, y, fit, sanguinis exiitū fuisse, aut iniuriā aliqua aliā, in quampiam corporis partem concursum, integræq; cutē in eo loco cessantem, & q̃ extra uenas sit, quasi mortuum. Audiatq; Hypopii huius uoce, nihil aliud Græci intelligunt, q̃ cessante sanguine nigrescentem cutem. Nec dubium est his mederi Thapsiam: & ab eo remedium nomen id factum illi esse. Si quidem hic ait, ὑπόπια τὴ ἔρι καὶ πηλώματα. Quod est, Hypopia & liuores deleat. Et Plinius rem augens, eodem libro & capite ait, Nero Cæsar claritatē ei dedit initio Imperij, & postuē nites grassationibus uerberatâ faciem illens sibi cum tueret caræq; & sequenti die contra famam cutem syncerâ circumferens. Solus Theophrastus libro, 9. de plantarū historia aliter Hypopia quibus ea medetur intellexisse creditur. Verba eius sunt: ἢ δὲ τῶ βασίλει ἱμνικῇ, ἰὺν δὲ τὸ κατὰ γῆν καθαίρει καὶ ἄνω καὶ κάτω, λύματα δὲ καὶ τὰ πηλώματα ἱεραίνει, ὑπόπια δὲ ποιεῖ, ἀλλὰ ἰλυνκε. Quomodo sensus est, Thapsiæ aut uomitioria uis est. Quod si quis eam retineat, per inferna pariter & superna purgat. Facit & Hypopia, uerūtamen candida. Ex his (nisi uitium in eo scriptore sit) maculas quæ in cutē albicāt, Hypopia intellexisse oportet. Neq; em̃ significare aliud potest, q̃d dicit, Facit & Hypopia, uerūtamen cādidā. Estq; hoc q̃d paulo ante diximus ancipiti, id est, ad utraq; partem significatione Thapsiæ uocari Thapsiā potuisse. Et si recipiendū in Theophrasto id est, ad aliā Thapsiæ naturā referenda res erit, ad pallorē scilicet a quo Thapsinus color in Phocione a Plutarcho dictus est. Et a Theocrito in Pharmaceutria, καὶ μὲν χρῶς μὲν οὐκ οὐκ ἔστιν το πολλὰν βασίλιν. Quod est, Et corpus meū Thapso simile factū est; nulla aliā q̃d palloris significatione, qui color Thapsia fiebat. Consequenterq; ueteres, ad excusandā ualitudinem corporisq; morbos, non aliter, nec aliō euctū q̃ cymino Thapsia se inungere. Potuitq; Theophrastus Hypopia candida pallores Thapsia factos indicare. Quod legitibus significasse satis fit. Et si sciamus Theocriti interpretes, & alios græcorū scriptores Thapson Chrysoxylon, id est, aurei coloris lignū, non herbā hanc interpretari solitos. Scāmoniū uocari ab aliquibus Thapsiam in Dioscoride legit. Verūtamen non potuit ad Thapsiam Scāmoniū, nisi ex pari in purgandō ut trahi. Romani ex totius plantæ similitudine, quoniā ut Plinius ait, Thapsia sine dubio Ferula est, ferulaginē & syluestrē Ferulā eam uocauerūt. Fœniculi folia habere eā Theophrastus dixit: uerūtā latoriā: caule ferulaceū, radicē candidā, liquorē eius efficaciorē esse, per superna pariter & inferna purgare. Seminis nullū esse usum. Nascitq; Thapsiam alibi quidē, sed in Attica. Non uesci ea indigenas pecudes: peregrinas aut uesci ea q̃dē, sed aut perire, aut diarrhŷia texari. Barbarus in colligendō Thapsiæ liquore, quorundā codicū, quos & nos uidimus, fidē secutus, q̃d in Dioscoride passim & uerius legit, ἀναρίθμητον τὸν συλλεγμένον ὕδρον uertit, succidit eam & tollunt: καὶ ut in illis legit, id est, radicē, non ὕδρον, id est, liquorē interpretatus. Nobis cōmunis lectio uerior & aptior uisa est: quoniā nulla est ad colligendū liquorem succidendā & auferendē radicis necessitas. Præterea non semel tantū, sed sæpius uerisimile est colligi posse liquorē eam: & si colligendus est, ex uiuente adhuc in radice sua planta colligendū esse. Idem q̃d erat uerisimile, si fecum uertit, a quo & fiscella dicta est. Nec male quidē: nisi Fisci uox nostra ætate ad alterius rei æstimationē trāslata penitus imprudē esset. Monemus id, ne quis discrepare nos puter. Nulla em̃ rei, sola uocis inter nos differentia est. Quodq; organis illi ait exprimens radicis Thapsiæ succū, scriptoris huius uoces secutus, prælum, torcularue in ea uoce intellexisse oportet.

Spartion aliqui Lygon, alij Lobon appellant. Frutex est longas ferrens uirgas, sine folijs, firmas, fractu contumaces, quibus uites uinciuntur, semen lenticulæ in folliculis phasiolorum modo nascens, florem ut albæ Violæ, luteum. Purgant per superna Ellebori uice, citra pericu-

lum flores & semina, quinis obolis in aqua mulsa pota. Semen deiectionem mouet. Ramis in aqua maceratis, mox tuis extractus succus, ischiadicis & angina laborantibus auxiliatur, si cyathi modum ieiuni bibant. Quidam marina aqua macerare malunt, & infundere ischiadicis clystere. Strigmenta autem elicit cruenta.

BARBARI COROLL.

Spartum, siue Spartion Genistā nostri uocāt: fortasse quia genu modo flexilis ad nexus sit, uel quia genibus medeatur dolentibus, multiplici tunicarū cortice, sponte nascens, & quā seri nequeat: propriē aridi soli iuncus, & terrā uictū: quia nihil ibi seri, aut nasci possit, noxiū animalibus, prāterq; cacuminū teneritate. In Hispania Spartum & pro fune ipso capitur: ut Merinthus, Merindusq; a poetis. Sint duo Sparti gēa: Vnum quod Genistam uocamus, Alterū quod in Hispania, & Africa funibus nascit, leucea, siue lygea potius dictū ab Athenæo, dubitauit ante nos & Plinius. Dioscorides certe cum Sparton dixit, Genistā uidetur intelligere: cuius florē in coronas addebant, Apibus gratissimū. Semen quoq; ipsum, Græci Sparton eodem nomine appellant. Asia e Genista facit lina piscatoria, egregie durantiā, frutice madefacto decem diebus: hac & uites alligat, ut Galenus inquit. Sparti quidē usus, multis post Homerū seculis institutus uidetur: quoniam cum Sparta dissoluta dixit, significauerit potius, lata. In agro Thebano copiosa: ut Varroni, Plinio, & Gellio quoq; placet. Nec ante Pœnoꝝ arma, quæ primum Hispaniæ intulerūt, & cū fuitiles fierent naues: uel Loro, ut in Liburnia: uel Canabo, & Struppa, ut in Græcia, non Sparto futas esse constat. Serilla certe, nauigiū est histricū ac liburnicū, a conferendo nomē habens: quia Lino Spartoq; stipas, ut Pacuuius cum dixit, Sparteis futa serillibus,

Pli. li. 24. ca. 9.
lib. 19. cap. 21

funiculos intellexerit, qui Sparto cōserant, auctor Pompeius Festus. Idē Napuras, funiculos ex stramētis uocari tradit. In Africa exigui, & inuile gignit. Carthaginēsis Hispaniæ citerioris portio nō tota, sed quatehū parit, mōtes quoq; Sparto operit. Hinc strata rusticis eorū. Hinc ignes facesq;. Hinc calceamina, & pastoz uestis. Ad reliqs usus laboriose uellit in hyemē uix. Facillimē tamē ab Idibus Māijs in Iunias. Hoc maturitatis tēpus. Ager unde colligit, minus tri ginta passū in latitudinē patet, a litore Carthaginis nouā, minusq; in longitudinē. Longius em uehī prohibent impendia. Ideo Spartū aliter etiā diuulsum, natura interpolatur, rursusq; q; libeat uctutū, nouo misceat. Sparto nihil fere uilius nauū armamētis, machinis ædificatiōrū, alijsq; desiderijs uitæ: in uictū in aquis, & mari: sicut in sicco, fuitis e Canabe.

EX M. VERG. COMM.

Vlgarem Genistam passim & incultis locis nascentē, cuiusq; in re rustica ad nexus quotidianus usus est, nō Hispaniæ Spartum descripsisse hoc capite Dioscorides uidetur. Quas em Sparto huic breues, sine folijs uirgas, & natiuo lentore infragiles, quas in ligandis uineis usus sit, phaselorū figuras siliquas, & in his lenticulæ semen, luteumq; leucoiorū colore florem scriptor hic tribuit, integrā Genistarū quas diximus, & iconiam imaginē ostendunt. Nec nos in re alioquin ex scriptoris huius descriptione satis certa suspicari, miscereue aliquid audemus. Et si sciamus, a Plinio. 19. uolumine, capite. 2. Spartum aliter descriptum: & medicinā remediāq; omnia, quæ hoc capite a Dioscoride docentur, Sparto, non Genistæ, cui debebantur. 24. uolumine, capite nono ab eodem tributa fuisse. Res enim nos sequimur, & quæ in antiquis scriptoribus uagæ aut ambigua sunt, ad certam, quatenus licet, significationem contrahere conamur. Credimusq; ex his quæ in græcis latinisq; diu obseruauimus, monere tuto legentes posse, duo fuisse græcis Sparti genera: quæ tamen alicuius notæ adiectione distinguerentur. Quod em in Dioscoride nunc forma diminutiua legitur, nouū discrimen est: ideòq; a nobis non seruatiū. Alterum quod in Hispania nasceretur. 19. uolumine, capite. 2. a Plinio descriptū: alterum quod Genistæ appellatione a cunctis latinis censei. Indicantq; qd dicimus hic ipse primū scriptor: qui intelligēs alterū esse Sparton, nullius (quod hæcenus iuenerim) in medicina usus, ut certius cognosceretur, ait, quo uites ligant: eandemq; rationē secutus in. 6. Paulus Aegineta, eandem & ipse adiecit discriminis notam, dicens, ἀσπράς ὁ τὰς ἀμυλῶνας ἀλοιῆς, quod est, Spartus, quo uites uinciunt: nulla addendæ eius notæ necessitate, nisi alterum esset, quod æquiuoca appellatione fallere audientes posset. Estq; ex communi omnium usu adiecta discriminis nota illa. Neq; enim Hispaniæ Sparto uti omnes possunt: at Sparto quo uites ligantur, uti omnes possunt. Vbiq; em nascuntur Genistæ, & eundem inter ruris utilia ubiq; usum habent.

B

D I O S C O R I D I S

C Quod Plinius in Hispanienſis Sparti hiſtoria nuſquā teſtatus eſt. Quodq̃ illi præcipuū ab eo tribuitur, ad funes pertinet. Totāq; habet Hiſpaniæ Spartus, ne longiores ſimus, diuerſam penitus a Geniſta hiſtoriam. Eſſeq; Sparton Geniſtam præter hæcenus dicta indicat cū Theophræſtus primo de plantarū hiſtoria, Linospartum inter Polylopa numerans.

¶ De Silybo.

CAP. CLXI.

Silybum lata ſpina eſt, folia ferens Chamæleonis albi. Hæc recens cum ſale oleoq; cocta eſtur. Radicis ſuccus drachmæ pondere potius uomitiones ciet.

B A R B A R I C O R O L L.

Silybon, aut Silybos ſpinofa, perinde, ut albus Chamæleon, cui eſt ſimilis, ne in Cilicia quidem, aut Syria, aut Phœnice ubi naſcit, coquere tanti eſt: ita oſoſa eius culina tradit. In medicina nullum Plinio uſum habet.

E X M. V E R G. C O M M.

Negauit Plinius Silybi huius eſſe aliquē in medicina uſum: maiore tñ q̃ hic apparatus adhibere coqui indicauit. Siq̃dem cū oleo & ſale elixā comedi Dioſ. ait: ille uero ne in Cilicia quidem, aut Syria, aut Phœnice ubi naſcit, coquere tanti eſt: ita oſoſa eius culina tradit. Ex quibus rōcinari illud facile eſt, peregrinā Italiæ herbā Silybum eſſe, & diligentiore cura et opera coqui ſolitā. Qui deſcripſerunt eam poſteriores, laiſſimis folijs, & in folijs per extremitates latiſ ſpinis eam tradunt. Nos in peregrino frutice, quod aliud moneamus, non habemus.

¶ De Vomitorio Bulbo.

CAP. CLXII.

βαλκων μυρι-
φικα

Bulbus, quem Vomitorium uocant, folia habet lentiora & multo longiora cibario Bulbo, radicem conſimilem, cortice nigro uſtitā. Vomitiōes concitat, ſi per ſe comedaſ, aut eius decoctū ebibatur.

¶ De unguentaria Glande.

CAP. CLXIII.

D**G**lans unguentaria, fructus eſt arboris Myricæ ſimilis, magnitudine Auellanae nucis, cuius nucleus græcarum nucum more tritus, humorem reddit, quo ad præcioſa unguenta pro oleo utuntur. Naſcitur in Aethiopia, Aegypto, Arabia, & Petra oppido Iudææ. Præfert plenā, recens, candida, quæ facile delibretur. Ea drachmæ pondere pota leuēnem abſumit. Cum Erui farina, & aqua mulſa, podagricis illiniſ. Pſoras lepraſq; decocta in aceto, uutiligines & nigras cicatrices cum nitro emendat. Et cum lotio lentigines, uaros & papulas in facie, & cutis uitia tollit. Vomitiones mouet. Aluū cum hydromelite reſoluit. Stomacho aduerſatur. Oleū quod ea exprimitur, aluū potu ciet. Cortex eius magis adſtringit. Verum tuſa & expreſſa recrementum abſtergentibus medicamentis adiicitur, quæ aduerſus pruriges, & ſcabricias idonea ſunt.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. ii. ca. 22.

Balanus Myrepſica, ſiue ut Plinius, et Aetius appellat, Myrobalanos, hoc eſt, Glans unguentaria, ex arbore fit cui foliū, ut inquit Plinius, Heliotropij: ut Theophræſtus (niſi librarius corrupit) Myrti: ut Dioſcorides, Myricæ, diſtaxat oblongius. Arbor grandis, incorruptaq; ſed contorta. Unguentarij corticem glandis eius premūt, odoris gratia. Medici nucleos tundunt, aſuſa paulatim calida aqua, etiamſi Theophræſtus inutiles eſſe dixit. Galenus unguentarios uſcribit, expreſſa carnis ſucco, medicis quoq; utilem eſſe, carnē eius pro uomitorio ſumentibus affirmās. Glans ea magnitudine, & aſpectu Cappari, aut nuci potius Auellanae ſimilis. Lignū robuſtū, uſu præcipue nauali, in Arabia naſcens. Syriaca dicit, & eſt candida. Contra in Thebaide nigra. Præfert illa bonitate olei, quod exprimit, ſed copia Thebaica. Inter hæc Troglody

etica utilissima est. Sunt qui Aethiopicam his præponant, glandem nigram, nec pinguem, nucleoque gracili, sed liquore, qui exprimitur, odoratiore: nascentem in campestribus. Aegyptiam, cuius & Hippocrates ipse meminit, pinguiorem esse, & crassiori cortice rubentem, & quis in palustribus nascatur, breuiorē, siccioremque. Ediuerso Arabicam uiridem, ac tenuiorem: & quoniam sit montana, densiorem. Longe autem optimā Petream, ex oppido quod uocant Petram. Plinius, & alij nigro cortice, nucleo candido. Differt a glande unguetaria: quæ nux Odorata, siue Muscata uulgo dicitur, incognita ueteribus (ut existimo) de qua in Macher.

EX M. VERG. COM M.

CAppari magnitudine figuræ unguentaria hanc glandem comparauit Theophrastus. 4. de plantarū historia uolumine: utique ea unguentarios, & ipse testatur est. Eamque ob causam Plinius libro. 12. capite. 22. Myrobalanon uocauit, eadem eiusdem rei significatione cum scriptore hoc: qui Myrepsicon Balanon eam inscripsit, quod scilicet unguentis tantum inferuiat. Diximus primo uolumine de Palmulis agentes, quod ad Balanos græcamque Balanorū uocem pertineret, ideoque relinquendum hoc loco quod dictum semel est, ne totiens idem repetat. Quod pro re ipsa etiam dicendum fuerat, a Barbaro undique collectum in Corollario eius expositum omnibus est. Iisdem enim uerbis, ut erat in cunctis diligens, ex Theophrasto, Plinioque omnia de unguentaria hac glande reddidit: signauitque diligenter, in quibus antiqui scriptores illi in eius historia discreperunt. Nobis monuisse tantum superest, augere uateque aliquo opus esse, ut intelligamus, quo nam modo unguetaria hæc Glans a priore libro, qui proprius illi inter unguenta aut aromata locus erat, in quartum, & ad uulgares herbas transierit: quod conijcere hactenus nobis non licuit.

De Narcisso.

CAP. CLXIII.

Narcissum, aliqui Narcissum Anydron, alij Autogenes, alij Bulbon emeticon, alij Lirion, Romani Bulbum morbitarium. Sunt & qui ut Lilium, Lirium appellarint. Folia porro similia, tenuia, multo minora, & angustiora, caulis uacuuus & sine folijs supra dodrantem attolitur. Flos albus in medio, intus croceus, in quibusdam purpureus, radix intus alba, rotunda, bulbosa, semen uelut in tunica, nigrum, longum. Probatissimum nascitur in montibus, suauis odore. Cetera porrum imitatur, atque herbaceum uirus olet. Radix cocta siue estur, siue bibitur, uomitoria est. Ambustis igni prodest cum exiguo melle trita. Præcisos neruos illitu glutinat. Luxatis maleolis, diuturnisque articulorum doloribus, trita ex melle & imposta subuenit. Vitia cutis in facie, uirilignesque cum semine urticæ & aceto emaculat. Cum eruo & melle ulcerum fordes expurgat. Abscessus rumpit concoctioni repugnantes. Infixa corpori extrahit, illita cum lolij farina & melle.

Narcisso, foliū Albuci, terræ proximū, sed latius, ut Lilio pingue, frequens, angustum caule sine folijs herbaceo. Flos in cacumine, post Arcturū, & circa æquinoctiū, ac uere, item post Lilium, & Violam, Flammæam uocatā, membrana inclusus ceu uasculo, ampliusculus, nigricans, oblongus: qui defluens, sponte germinet: præsertimque defixus in terrā, manu seritur & radice ampla, rotunda, carnosa. Caulis, & cum eo flos erumpit, ut in Croco, antequam folium: quod non antequam reflorescat, cernit. Caulis cum flore suo emoritur. Radix Bulbo assimilis, nisi quod non est squamata. Narcissus ter florendo, tria sætionū tempora demonstrat. In coronamenta flore ueniens, a narce, hoc est, torpore dictus, quoniam caput grauatur, non ut fabulæ a puero. Plinius duo genera herbaceum. Omnes inquit serotini, post arcturum enim florent, ac per æquinoctium autumni. Duo hæc inquit genera medici præcipiunt, quasi & alia sint, quæ non recipiant, hoc est (ut arbitror) genus illud quod uere, aut æstate nascitur: ut ex Theophrasto dici legimus, non de flore ipso, quæ candidum esse cōuenit, intelligi, sed de semine: quod & membrana contegi, & nigrum, ac prælongum esse constat, quo in terrā cadente, propagat se, atque serit Narcissum, Eumachus cyrenæus in Rhī

A

vāpiatop

B

Theoph. li. 3.

*Narcissum, Amaranthi
filium, & genus Iris,
huius, ex Iosaba Sideria
inhibetur, scribitur ab
Eupo eius amator:
ex cuius sanguine na-
ta fuit herba, quae flo-
res signat eiusdem no-
minis. Floribus nar-
cissi feruntur primum
coronatas Eriunyas
& parvas: quare poëta
continuo tale quid
ma. sanatiis tribuit
re. p.*

Czotomico, etiā Crotalon & Acacalida Narcissum uocari tradidit. Nā Crotos in Hippocrate, ad ulcera uetera, & uulnera recentia pbata, qd aliud sit q̄ Narcissus, nō uideo. Nisi quis Crotū pro Crotone, hoc est, Cici capiat in eo. Julius Pollux auctor est, Theophrasti morē fuisse, Liriū pro Narcisso dicere. Homerū uero Lirij appellatione complecti, florū omne genus. Narcissum ab adolescente suimet amore capto, & in eum florē conuerso, natū in Boētia Thespientes gariunt, fontē Donaca monstrātes, ubi se specularē puer stultissimus: qui umbrā suam a fenesciret distinguere. Coarguit hanc fabulā uetustissimus poëta Pamphilus, qui Proserpinā multis annis antequā Narcissus esset, captam a Plutone cecinit, carpentem Narcissos.

EX M. VERG. COMM.

Lilio congenerē Narcissum antiquiores oēs faciunt, a Lilio statim continuata historia de eo agens. ō dē nārkissos ἢ τὸ λήριον, οἱ μὲν γὰρ τοῦτο οἱ δ' ἑκείνο καλεοῦν. Quod est. Narcissus autē aut Lirion. Sunt eī qui hoc, & qui illo noīe appellent. Manifesto argumēto, congenerē, aut si milem saltem Lilio Narcissum esse. Ex quo Lirion, qua uoce Lilia ueteres appellauerūt, & ipse quondā dici poterat: & si ex antiquis græcis testati aliquot fuerint, Lirion priuatim Narcissum indicare. Quemadmodū Crinon solū Lilium. Addiderūt quidam, etiā ab Homero flores oēs una Lirij appellatione indicari. Quod & Aristophanes in Comœdia etiā seruasse creditur. Sed quemadmodū nos in scriptore hoc, & in alijs obseruauimus, naga hæc noīa, similitudo, & pe ne eadē natura fecit. Vocariq̄ solitū Lilium a græcis Lirion, manifeste hic scriptor ostendit, cū ait. Quidam etiā quemadmodū Lilium Liriū Narcissum uocāt. Videnturq̄ Latini una tantū mutata litera, & ut balbutientes solent pueri, pro, r, l, pronūciasse: sicq̄ ex græcor. Lirio suū Li liū fecisse: eodē modo quo lepidissimus græcor. comicus in Equitibus suis blefa lingua in con cione loquentē Alcibiadem finxit, ὁλῶς βίωλος κεφαλὴν κόλασος ἔχει. Cum tñ in eo qd intelligi uo lebat, ubi, l, litera audirē intelligenda, r, erat, ὁρῶς βίωρος κεφαλὴν κόλασος ἔχει. Sed ut rem nostrā agamus, p cōpto sit, congenerē Lilio, aut illi penitus similē Narcissum esse: & quonā dolores & torpidas capitis grauitates faciat, a narce, q̄ uoce græci torporē indicant, nō a fabuloso pu ero, ut poëta finxerit, Narcissum græcis dictū fuisse. Testes in eo noīe rōnis eius sunt. Plinius 11. uolumine, capi. 19. & Sympolij sui. 3. cōmentario, capi. 1. Plutarchus. Cuius obiter de Nar- cisso uerba hæc sunt, καὶ τὸν νάρκισσον ὡς ἀμειλίχοντα τὰ νύκτα, καὶ βαρύντα τας ἱμνοῦντας νερκίδας. ὁ δὲ καὶ σοφοκλῆς αὐτὸν ἀρχαῖον μὲγαν θῆαν τοῦτο τῶν χερνείων σφάνωμα προσέοριεν. Quod est. Et Nar- cissum appellauerunt, quasi neruos hebetantē, & torpidas facientē grauitates. Quapropter & Sophocles magnor. Deorum, id est, subterrancorū coronamentū eum uocauit: q̄ scilicet de- functi & morte torpidi, torpido flore merito coronarent. Anydron uocasse quosdam Narcis- sum etiā in Dioscoride legitur: idq̄ nos factū illi nomē credimus, q̄ longe ab aquis in monta- nis floret. Quod etiā illi adiectū est Autogenes, quæ uox a seipso genitū, uel per se nascens signi ficat rationē eam habet, quā Theophrastus his uerbis indicauit. οὗτος δ' ἐκ πίπλων ποτὶ βλάσκειν αὐτόματον, de flore & semine dicta ea sunt, significantq̄. Hic autē decidens sponte sua germinat & nascit. Et si idem scriptor statim testetur, colligi semen eius, seriq̄ opere humano, nec minus etiā, ut in cæteris Bulbis plantari radicem. Vocari a quibusdam etiā Vomitorium Bulbum in Dioscoride audimus: haud fane, quia idem Vomitorio Bulbo sit, qui. 1. uolumine descriptus est, sed quia Bulbosq̄ radices, simulq̄ Vomitorius ut ille est: quē in antiqua medicina habet p̄cipuū usum. Serebat quondā in hortis ad coronamēta Narcissus: nūc montanis locis, in qbus nascit, quærendus est, non difficilis inuētū, si diligentius quærat. Totam em̄ excepta caulis ali- tudine, & calathi ambitu, quæ duo minora, q̄ in Lilio sunt, Lilior. speciem referte cum testati oēs sunt. Et præter id serotinus flos (post arcturū enim Augusto mense, & ad Autumni æqui- noctiū floret) inter Lilia floresq̄ alios, qui fere oēs tunc defecerūt, latere nō potest. Habet & ali as in scriptore hoc notas, qbus deprehendi possit: Folia porracea: quæ Plinius in radice esse illi ait, minora tñ & angustiora: Concauū caulem, & sine folijs dodrantali altitudine: Postremoq̄ florem candidū, in medio crocū: & quod alteri eius generi competat, necesse est, in aliquibus purpureū. In qua descriptione, nisi in cunctis græcis, q̄s hæcenus uidere licuit, uisū sit, ratioci nari oportet, duplicem esse Narcissum. Quod Plinius sane manifeste indicat duobus locis. Pri- mum. 11. uolumine. capite. 5. in Liliorū historia, dicens. Narcissum uocant, huius alterū genus candido flore, calice purpureo. Mox eiusdem libri, capite. 19. Narcissi duo genera in usu medi- ci recipiunt. Vnū purpureo flore: & alterū herbaceum. Non leui, ut uidetur in docendis his ua rietatē. Siquidē in priore illa descriptione, alterū Narcissum flore candido, & calice purpureo: in posteriore alterum purpureo flore, alterum uero herbaceum esse dixit. Theophrastus quod

hactenus in eo obseruauerim, cum sapius Narcissi meminerit, nulla huiusmodi generum diuisione usus est: semperq; tanq; unus Narcissus sit de eo docet, nunc folia, nunc florendi tēpus, nunc caulem describens: a quo credimus Plinium alterum genus herbaceum uocasse. Si quidem in eius historia inter cætera auditur, τὸν δὲ καυλὸν ἄφυλλον ἰδοὺ πρὸς δὲ δὲ. Quod est. Caulem quidem sine folijs, uerumtamen herbaceum. Ex quo potuit Plinius non a flore herbaceum alterum id genus appellare. Non ideo tamen non recipiendum duplicem Narcissum esse. Hoc enim a Dioscoride Plinioq; & ab alijs traditur. Sed quæ eorum discrimina in flore docentur, non satis & in scriptore hoc & in Plinio certa sunt. Cætera quidem, ut ex Theophrasto patet, eandem habent historiae ueritatem. Ille enim. s. de plantarum historia Narcissum his uerbis descripsit. Narcissus uero, aut Lirium (sunt enim qui hoc, & qui illo nomine appellant) folium Asphodeli figura terræ proximum habet: latius tamen q; Asphodeli, & quasi liliaceum. Caulem nudum q; dem folijs, uerumtamen herbaceum: in summo cuius flos est. Semen ueluti in uasculo membrana quadam clausum, grande, nigrum, & figura oblongum. Id decidens sponte sua germinat. Verumtamen id colligentes, etiam in terra depangunt. Serunt & radicem, quā rotundam, carnosam & grandem habet. Serotinus flos est. Post arcturum enim & circa æquinoctium floret. Idem eodem libro in foliorum disciplina ait, Narcissum angusto, numeroso, & pingui folio esse. Nec multo post de caulibus plantarū agens ait. Mirabile aut in cūctis quod in Scylla & Narcisso accidit. In alijs enim & quæ a principio cōserunt, et per se regerminant, uere folia primum prodeunt, dein caulis: in his autem, id est, Scylla & Narcisso caulis præcedit, & in Narcisso foliorum tantum caulis. Post quæ cum longius descripsisset Scyllæ caulis & floris ortum, subiecit. Cū autem caulis hic consenuerit, tunc post aliquot dies folia prodeunt. Similiterq; & in Narcisso sit, πλὴν οὗτοι καυλὸν ἴτερον ἔχει παρὰ τὸν τοῦ ἄνθους ὥσπερ ἱπποῖδον. οὗτοι καρπὸν φανερόν ἄλλὰ καὶ αὐτὸ τὸ ἄνθος ἅμα τῷ καυλῷ καταφθίνει καὶ οὐκ ἀνακινεῖ τότε τὰ φύλλα ἀνατίλλει, id est, Verumtamen nullū aliū caulem præterq; floris causa prolatum, ut præmonstrauimus, Narcissus habet. Manifestum itidem non habet semen. Flos autem ipse una cum caule arescit, & cum aruerit, tunc folia emergunt. Præterea florere prius Scyllā, postea uero Narcissum, idem paulo post testatur scriptor. Nosq; tam multa ex eo collegimus, ut facilius & certius deprehendi possit tanti nominis in antiquorum coronamentis flos. Quæ enim Plinius diuersis locis de eo tradidit, ex Theophrasto quidem deflexa sunt: sed tanta breuitate ab eo tractata, ut obscuriora legentibus aliquādo sint: & ut respondere sibi inuicem Theophrastus & Diosc. uideantur. Cuncta enim de folijs, caulibus, & semine ambobus eadem sunt. Floris color, & coloris discrimen in Theophrasto tantum desideratur: idq; obseruasse & discreuisse legentes oportet: præsertimq; quod hic croceū & purpureum in medio describit: quod Plinius florem appellat, non satis certo intellectu, totum ne florem sic uocet, an quæ crocata in eo sunt & purpurea, ut hic manifeste docet. Potest enim utraq; pars flos dici: quemadmodum in Viola nigra de duplicis floris ex disciplina Theophrasti floribus diximus. Nos in Apenninis montibus his nostris, frequentem uidimus florem Augusto & Septembri mensibus florentē, figura Lilijs, dodrā tali altitudine: folijs qualia in Narcisso hoc describuntur: singulari caule, hīdemq; alijs omnibus, excepto colore, qui nec candidus, nec purpureus ut Plinius docet sit, sed inter candidum & luteum colorem nullius, aut exigui odoris. Vidimus & in mitioribus collibus natum, sed non tam speciosum, & magis albicantem: diuq; credidimus Narcissum eum esse: neq; ab opinione ea longius adhuc discedimus. Inclinat enim animus, potuisse antiquis uagum Narcissi nomen esse: & ut in plantarum disciplina sæpe alias testati sumus, congeneribus, similibusq; multis cōmunem eam appellationem fuisse. Tantūq; abest, ut constituamus luteo colore Narcissum esse: ut inueniendum hunc florem legentibus relinquamus, q; candido colore sit, croceis intus staminibus, & in aliquibus purpureis: quod unū in colore eius a Diosc. discrimen tradit. Nobis enim hactenus uidere non licuit candidos Liliorum figura flores, capillamentis, aut staminibus intus purpureis. Relinquimus etiam peritioribus cogitandum, probauerit ne hic scriptor Narcissum simpliciter montanis locis nascētem, ut a satiuo & hortenſi secerneret: an desiderari ultra aliqd possit, quale scilicet Plinius ait probatissimum nasci in Lyciæ montibus: in quam partem propensiores trahimur. Superlatiuum enim illud κάλλιστον, certiores sibi nescio quomodo natales locos exigere uidetur: & præpositiuus ille articulus eodem sensu rem etiam indicare credi potest. Suspicio tamen hæc sit, non decreta. Qualis etiā est in uerbo παρὰ τὸν, quod statim sequitur, significet ne uirescere, & herbaceo colore esse: an potius a Porro uerbum factum fuerit, significetq; Porri odore sentiri. Quod tamen nullibi inuentum in antiquis a nobis est. Quæ omnia diligentius obseruanda & constituenda alijs relinquuntur.

ἵπποφαίς

Hippophæes, alij Hippophyes, alij Hippophanes, alij Hippion, alij Echinion, alij Pelecinō, Romani Lappaginem uocāt, quo fullones uestes interpolant. In sabulosis maritimisq; nascitur, sureulas ceo frutice, denso & largo, folijs Oleę longioribus, mollioribusq; inter quę candicantes spinę emicant, siccę, angulosę, interstitio quodam distantes. Flores Hederę corymbis similes, racematim cohærent, minusculi tamen, & molles, candidi, ex parte rubescentes. Radix lacteo succo madet, crassa, mollis, amara gustanti, ex qua perinde ac Thapsia succus eximitur: qui cum Erui farina subactus siccatur, & ad usum reconditur. Pituitas, bilēq; detrahit oboli pondere cum mulso & quatuor obolis Erui farine. Frutex cum radicibus siccatus tunditur, & cum aquę mulsę dimidia hemina tritus datur. Radice liquamentum depromitur, uti in Thapsia. Huius in purgationibus modus est drachma.

B A R B A R I C O R O L L.

Hippophæes, siue Hippophyes, & Hippopheon Hippocrati. Galenus hanc & Gnaphon, & Stybon, & Styben quoq; dici putat. Nomen uidetur accepisse, quoniam forte accommodata sit eorum naturę: quemadmodum & ea, quę Hippophæston uocatur, post hanc dicenda. Sunt em̄ unius fere generis, in binas diuisi species. Vtrūq; nostri Lappaginem (ut arbitror) appellauere. Similis inq; Plinius Anagallidi Lappago uidet̄, nisi esset ramosior, pluribus folijs, graui odore. Quę talis est, Mollugo dicitur, quę uero asperioribus folijs, Asperugo. Neruorū qdē causis utilem Hippophæston Diosco. affirmat. Plinius Lappaginē, quę dicatur Mollugo. Vnde colligunt nonnulli eandem esse Hippophæston, & Molluginem.

D

E X M. V E R G. C O M M.

Sciendum primo est, spinosum fruticem esse Hippophæes: neq; a Diosco. tantum hoc habitu describi, uerum a Theophrasto, Plinioq; etiam: quorum alter spinis albis esse dixit, alter *ἐν τῷ τῶν φύλλων* descripsit, id est, nullas habere in folijs, sed ut hic ait, inter folia spinas: quales ab eodem plures alię numerantur. Idq; in eius historia tam manifeste patet, ut nihil de spinis dubitandum sit. Mox ope spinarum quas habet, ad usum uestium translatus a ueteribus fuisse: nec aliud significare Diosco. cum ait, *ὅτι γυμνοῦσι τὰ ἱμάτια*, id est, ut nos uertimus, quo uestes uellicando poliunt. Id enim est *γυμνῶν*, & ut Athenienses dicere consueuerant *γυμνῶν*, id est, *κατελείψαντες*, quod uellicando expolire significat. Quę autem uestium expolitio hęc spinis facta esset, facillimam habet coniecturam: eandem, scilicet aut illi similem, quam carduis, aut hamis ferreis ætas nostra in nouis & obsoletis uestibus querit, iacentem, aut longo usu atritum pilum erigēs: & si in textura flocci, festuacę, aut alterius coloris aliquid inhererit, ope spinarum illarum extrahēs. Eamq; ob causam Galenus Hippophæes hoc Gnaphon etiam uocat: Græcorumq; grammadici eam exponentes uocem, dicunt *ἐν ἁπλῇ ἐκένθησι*, *ἢ ἐν ἀμύπτῳ τῷ τῶν ἱματίων*, id est, Gnaphæe spingunt, quibus expoliuntur uestes: quasi non sola hęc spina eum quondam haberet usum, sed plures honoris eius prerogatiua gauderent. Sic etiam *καμπτόμενα χαλκόμενα* dixerunt, id est, quę uellicantur. Galenus tamen, ut diximus, priuatim Hippophæes hoc Gnaphō appellauit. Quę causa etiam fuit, ut quemadmodum in Diosco. nunc legitur, Romani Lappaginem id dicerent. Nec aliud significasse nobis Plinius uidetur, cum ait lib. 27. cap. 10. Hippophæston nascitur in spinis, ex quibus fiunt æneę fullonię. Aeneas enim, ut credimus, uocauit ad eūdem usum æneum instrumentum aliquod hamatum, forficulatumue: quod primo ex ære factum, nomen in spinis postea seruauerit: auditoq; ænearum nomine, instrumentum, additis deinde fullonijs materia & usus intelligeretur. Credimus fore, ut uideantur aliquibus nostra hęc duriora, praesertim cum fulloniam, & fullones receperint iampridem in latina re omnes, per his q; uestes purgant: & loturę, aut infectione candorem illis, aliumue aliquem colorem acquirunt. Quod nos non negamus: neq; his quę nos, per Hippophæe hoc dicimus aduersantur, quę illi de fullonibus dicunt. Potest enim utrumq; ab hīsdem tractari: nec repugnat, posse eum qui uestes lauet, aut in

friciat, eadem qua diximus ratione expolire. Nos enim antiquæ uocis rationem & ueterum autoritatem secuti, quales *κναφίς* quondam fuerint, & quæ uerbi *κναφίς* significatio sit, demonstrauimus: quæ nulla alia est quæ, ut græce loquamur, τοῦ ἀποφάνειν καὶ ἀποφάνειν, id est, deradendo expolire uellicareque: & si id patiuntur grammatici, expilare. Nasci fruticem hunc Plinius ait fabulosis, maritimisque locis, scriptorem hunc secutus. Theophrastus fabuloso quidem, sed tenui folio: quæ propter ea quæ paulo ante ab eo accepta diximus, querendas cognoscendasque facile notas has illi tribuit, μονόφυλλον δὲ ἱπποφάστον ἐπίγειον καὶ χαμαίκανλον, βλαστάνει δὲ καὶ ἀνθὶ τοῦ θέρους καὶ διαμένει τὸ φύλλον χλωρόν ἄχρι πλειάδος. χαίρει ὑδάμοις καὶ λεπτόγλοις χωρίοις: λίγεται δὲ ὡς ἐν τοῖς ἱγασίμοις οὐδέποτε φύσθαι καὶ ταῦτα πρὶ τῇ ἄκῃ καὶ ἐν ἐνυλίοις τόποις φνομίην. Quorum sensus est. Singularem radice nititur in terra Hippophæes: terrestre est, & caules per terram spargit: per æstatem germinat & florere: permanetque uiridi folio usque ad pleiadem autumni. Sabulosum & tenue solum amat: diciturque locis cultis nasci nolle, cum tamen circa oppida & apricis locis nascatur. Hæ Hippophæis notæ a Theophrasto numerantur: quæ ideo a nobis repetitæ sunt, ut pluribus ueluti testibus deprehendi lateris frutex possit, & cuius non satis certa nominis origo est. Plinius cōpositum ab equo nomen opinatus, ait. Debent (de Hippophæe & Hippophæsto sermo illi est) ac commodatæ esse equorum naturæ, neque ex alijs causis nomen accepisse. Quippe quædam animalium remedia nascuntur, locupleti diuinitate ad gerenda remedia. &c. Quod si recipiatur, poterunt eandem cætera quæ pariter composita in græcis fuerint habere rationem.

De Hippophæsto. CAP. CLXVI.

Hippophæston, id quod aliqui Hippophæes appellant, nascitur eisdem locis quibus Hippophæes, estque spinæ fulloniæ genus, humilis herba, sine cauliculo, sine flore, inanibus tantum capitulis, folijs paruis, spinosis, radículas habens albas, molles, crassas. Succus radice et folijs exprimitur, & exiccatur. Datus cui uoles tribus obolis in aqua mullâ, aquam pituitasque detrahit. Priuatim comitialibus morbis, neruorum uitij, & orthopnœæ conuenit huiuscemodi purgatio.

BARBARICOROLL.

Hippophæston, hæc uidetur quam Plinius Hippophyes, Theophrastum sequutus appellauit, tributam ei proprietatem scribendo, quæ fructum spinosum habeat. Nascitur in spinis, ex quibus fiunt ænæ, ut idem inquit, fulloniæ, capitulis inanibus, folijs multis herbacei coloris, radiculis candidis, quarum succus exprimitur æstate. Idem Plinius sextodecimo uolumine, hanc non Hippophyes, sed plane, ut Dioscorides, Hippophæston nominat, inter herbas quæ fructicibus alijs circumuoluunt sese: quod notatur inquit, & in spinâ fulloniâ Hippophæsto, caliculis inanibus, folijs paruis, radice alba, cuius succus ad detractiões in comitiali morbo uti lissimus habetur. Qui locus in Plinio, deprauate legebatur ante nos, ita ut ne intelligi quidem posset a peritis. Paulus non Hippophæston per, i, sed Hypophæstō p, y, scribendum putauit.

Miscuerunt in græcis & in latinis alijs, quod p̄monstratū mō est Hippophæes, & quod nunc tractamus Hippophæston, nominis similitudine decepti. Persualisseque id eis uidentur hîdē amborum natales, & in artibus usus. Vtraque enim fulloniâ spinâ, eadēque in morbis utriusque plurâ remedia sunt. Veritū seorsum a peritiōribus actū de utraque est. Neque enim oīa penitus eadē utriusque in historia & medicina sunt. Quinetiā Paulus Aegin. li. 6. cū de Hippophæe primū egisset, non multo post de Hippophæsto agit. Nec ut Hippophæes cōposito a uoce hippo nomie scribit, sed a p̄positione ὑπό Hypophæstō. Quā rationē secutus etiā lib. 27. ca. 8, Plinius est: quāuis antea lib. 22. cap. 12. & hanc, & Hippophæes dixisset, debere equorum naturæ accommodatas esse. Nos ut illius, sic etiā huius nominis rationē ignoramus. Oportet tū & hanc aculeatā intelligere: ex quâ hic ait, & hanc fulloniæ spinæ genus esse. Ratiocinarique facile erit, ut superiore capite p̄monstrauimus, omnes quibus possent uestes qua ratione diximus expoliri, cōsueuisse ueteres *κναφίς*, & *κναφικὸς ἀκάνθας*, id est, fullonias spinas appellare: & ex earum censu hanc etiā esse, quæ non difficilis inuentu erit, tam certis notis ab hoc scriptore describitur.

De Ricino. CAP. CLXVII.

Cici, aut Croton aliqui Sefamon syluestre uocant, alij Sefeli Cyp̄prion, alij Crotona. Aegyptij Sifstamna, aliqui Trixin, Magi

A

ἱπποφάστον
ἱπποφάισ

B

Pli. li. 27. ca. 8.
lib. 22. cap. 12.

VERG.

κίσις κρότον
σεφάμον ἄγρον

Z ij

D I O S C O R I D I S

C Sanguinem febris, Latini Ricinum, alijs Lupam. Id nomen accepit, a Ricini animalis similitudine. Arbor provenit parvæ Ficus altitudine, folio Platani, maiore, læuiore & nigriore, ramis caudicibusq; cauis in arundinis morem. Semine in uvis asperis, quod corticibus exutum, Ricinū animal representat: ex quo oleum nomine Ricinum exprimitur, cibis foedum, lucernis emplastrisq; utile. Grana triginta numero purgata, potu pituitas, bilem, aquamq; per aluum extrahunt. Vomitiones mouet. Sed iniucūda admodum est, & molesta purgatio. Siquidem stomachū uehementer subuertit. Tusa & imposita, vitia cutis in facie, uarosq; expurgat. Folia cum polenta trita, inflammationes oculorum tumoresq; leniunt. Turgentes māsas cohibent, Eadem ex aceto illita, ignes sacros restingunt.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 23. ca. 5.
lib. 15. ca. 7.

C Ici ab ea differt quæ Cucī a Plinio, & Cuciphoron a Theophrasto dicit. Cucī folio & caudice in Aegypto Palmæ similis; quando & eius folijs utuntur ad textilia. Differt, q; Palma indiuidua est, Achæ cum adolefcit, in brachia ramorum spargitur: quæ pari modo & ipsa finduntur, uirgis breuib; neq; multis. Pomo rotunditas, quæ manum impleat, colos fuluus, commendabili succo, ex austero & dulci, nec congestio ut Palmitilæ, sed discreto: lignum intus grandis, firmeq; duricie: ex quo stragulares annulos detornant, ut Theophrastus inquit: aut uelares, ut Plinius. In eo nucleus dulcis dum recens est. Siccatus durefcit ad infinitum, ut mandi nō possit, nisi pluribus diebus aqua maceratus. Materies nō ut Palmæ rara, nervosa, uirens: sed spissa, carnosā, grauis, dura, crispioris elegantij. Et ob id in magno honore Persis, usulq; ad lædæpides. Hæc a Theophrasto & Persicā textilē uocari. Thebaica p̄fectura copiosam, si q; arbitrant, coniecturam potius, q̄ rationem sequunt. At Cici arbor, quam Herodotus Sillocypriū uocauit, Ricinus a nostris dicitur, ut ipsum quoq; animal, canibus præcipue infestum, qd & Cynoraista græce dicit, & Croton: quanq; Theodorus Crotonas rediūs cōuertit, non ricinos. Ferri ni etiāmiū hodie, ut ex Didymo zenotele accepimus, q nobis a secretis est, & Anagnosies, uer naculo uocabulo Rhaistas canum uocant. Dicunt & Cynomys, a quibusdā. Sed & outbus molestos esse Ricinos testis est Carō. Vulgus ipsū eos græco nomine appellat Cica, Galenus Cici dicit uult etiam bestiolas quæ frumentū corrodūt, quartū cœtus Cion dicitur. Is uernis etiam Cīs uocatur: ut infra quoq; diximus. Hippocrates hanc arborē uidetur intellexisse, cū Crotoni deos radicem in medicinas quasdam adhiberi commonet. Aliqui non solum Cici, sed Ciceam quoq; nominant. Ab hac arbore conficta iurium uocabula, Cicilendrum, & Cecimandrum, in Plautina fabula, si dixerim, diuinare potius q̄ docere uidear.

Herod. i Eut.
libro. 2.

E X M. V E R G. C O M M.

C Opifus in Aegypto quondam nasci Ricinus hic dicebatur. Idq; uerisimile est: quoniam luminum necessitas, sine quibus uitæ nullus est per tenebras usus, faciendis lucernarum funiculis, & oleo aptum deficiente alio omni, oprabilem genti illi fruticem fecerat. Etsi Plinius lib. 15. cap. 5. testetur Elychnia qdem ex eo fieri claritatis præcipue, ex oleo tamen ppter nimiam pinguitudinem lumen obscurum. Nec aliud hic idem scriptor primo uolumine significauit, dicēs Aegyptios multum indigere, & copiose uti Ricinino oleo. Cogebatur enim quod comicus ait, si non possent quod uellent, id uelle quod possent. Plinius. 15. uolumine, capite. 7. altitudine Oleæ in Aegypto & Hispania provenire ait, caule ferulaceo, folio uitium, semine uuarum gracili um pallidarumq; quas hic βότρυς τραχὺς dixit, id est, racemos asperos. Theophrastus duobus locis, primo de historia, mox secundo de causis plātarum nihil æque in eo admiratus est, q̄ ut ille ait, foliorum ἀνομοιότητα καὶ μεταχρηματισμὸν, id est, inæqualitatem, siue dissimilitudinē & trāsformationem. Numerauitq; primum inter ea quorum folia diuersis temporibus diuersa figura uidentur: uerbi causa, a principio rotunda, mox cum creuerint angulosa, aut ediuerso: qualia ostendunt Hedera, Populus alba, & Ricinus hic. Suntq; de eo scriptoris eius hæc uerba. τὰ δὲ φύλλα τῶν μὲν ἄλλων δένδρων ὁμοία πάντων ἀντὰ ἑαυτοῖς. τῆς δὲ λίνκου καὶ τοῦ κινττοῦ καὶ τοῦ καλονομένου κρότωνος ἀνόμοια, καὶ ἑτεροχρήματα, τὰ μὲν γὰρ νῆα περιφυγῖ τὰ δὲ πάλαιότερα γωνυδία, καὶ ἴσο τεσσὶν ἢ μεταξὺ πάντων. Rursusq; ὁ δὲ τὰ φύλλον μεταχρηματισμὸς καὶ ἰσίων κίνεσι, ἐπὶ καὶ τὰ τοῦ κρότωνος π-

πρὸς τὴν φύσιν τὴν ἀρχὴν ὑπερὶ ἀπογενεῶν τε καὶ καθάπερ ἀναδιαστροφῶν. Quorum sensus est. Aliarum uero omnium arborum folia ipsa sibiipsis similia sunt: Populi uero albæ, Hederæ, & eius quæ uocant Ricinum dissimilia, & alterius figuræ. Noua enim & a principio circinata; adultiora deinde angulosa. Et omnium mutatio talis est. &c. Rursus. Foliorum uero transformatio & alijs cõmunis est: quoniam eius qui Ricinus nominatur, a principio nascentia folia circinata sunt: tẽpore deinde angulosa fiunt: quasi dearticulenter. Quarta rationem ex Theophrasto a cæteris relictam addere placuit: ut hæc nota etiam deprehendi Ricinus possit. Etsi uulgaris iam pridem hic frutex sit, seraturq; passim in hortis ad spectaculum. Neq; enim ætate hæc nostrâ alium, quem sciamus in medicina, aut reliquâ uita usum habet. Vocatq; Ethruria Phaselum Romanum. Diximus de eo etiam in Ricinino oleo: eamq; ob causam non erimus in descriptione eius longiores. Id tm̃ testamur, uerâ esse quæ hic ait, Vomitiones eiere, & per inferna laboriosa purgatione purgare. Scimus enim pueros aliquando deuoratis incaute seminibus eius aliquot, integrum eum sua nocte dñem paulominus q̃ ad mortem eo cibo periclitatos.

T De Tithymalorum generibus. CAP. CLXVIII.

Tithymali genera septem, quorum masculus Characias appellatur, ab aliquibus Cometes, aut Amygdaloides, uel Cobios. Alter Myrthites, qui fœmina existimatur, eũq; Myrsynitem, aut Carty itẽ uocant. Tertius Paralius, quem Tithymalida appellarunt. Alius Helioscopius. Quintus Cyparyssias. Sextus Dẽdrosdes. Septimus Platyphyllos dicitur.

T BARBARI COROLL.

Tithymalum, & Tithymalus penultima producta, Meconion a quibusdam uocatur. Non sibi Lactucam appellant caprinam, marinamq;. Aliqui Lactariam, quia & Græci Galaetida nunc cupare soleant. Lactẽ Tithymali inscripto corpore, cum inauerit, sic cinis inspergatur, narrant apparere literas: & ita quidam adulteras alloqui maluerunt, q̃ codicillis. Vfus iam & in castra, & obfessas urbes transit.

Pli. li. 26. ca. 16
lib. 20. ca. 19. et
26. cap. 8.

C De Characia appellato. CAP. CLXIX.

Characiæ caules supra cubiti altitudinem attolluntur, rubri. Lacteo succo, atq; acri madent. Folijs Oleę circum ramos, angustioribus & longioribus, radice dura, lignosa. Pendet in cacuminibus caulium coma iunci, & calyculati folliculi, aliquantum caui. In quibus semen continetur. Nascentur in asperis & montibus. Succus aluum purgat. Trahit pituitam bilemque, binis obolis in posca sumptis. Et cum aqua mulla uomitiones mouet. Appetente uindemiæ tempore, succus congestis ramulis, mox decisis, & uase reclusis excipitur. Aliqui adijciunt farinam Erui, & in pastillos digerunt, qui Erui magnitudinem impleant. Alij in aridas ficos ternas, quaternasue guttas instillant, ut cum his inarescant. Quas ad usus recondunt. Per se etiã tusus in pila, & in pastillos cõactus reponitur. Porro cum extrahitur lac, neq; quo uentus aspiet stare quenq;, neq; manus oculis admouere conuenit, sed ante eius collectionem, corpus, præsertim, faciem, collum, scrotumq; genitalis, adipe, aut oleo cum uino perungere. Fauces autem exasperat. Quapropter catapocia, cæra, aut decocto melle oblini par est, & hoc modo dari. Binas tamen, ternasue ficos, purgationis gratia sumplisse satis est. Recens lac ex oleo, peruncios in sole capillos euellit. Renascentesq; flauos

χαράκιον

Z in

D I O S C O R I D I S

C & exiles efficit. Deniq; omnes destruit. Dentium cauernis inclusum, leuat dolores. Sed cæra dentes oblinendi, ne suo delapsu, fauces & linguam uitiet. Tollit illitu impetigines, formicantes uerrucas, pensiles, & quæ Thymi florem representant. Valet aduersus pterygia, carbunculos, phagedænas ulceru, gangrænas, fistulasq;. Legitur semen autumnò, & siccatum sole leuiter tunditur, feruefactumq; loco mundo reponitur. Folia item siccantur. Semen & folia lactei succi effectum præbent, dimidio acetabulo pota. Sunt qui cõdiant admisto cum lacte lepidio, & castæo confuso. Radix drachmæ pondere in hydromelite pota, per inferna trahit. Decocta cum aceto, dentium dolori auxiliatur, colluto ore.

B A R B A R I C O R O L L.

C Haracias ramos habet digitali crassitudine quinq;, aut sex. Semen legitur autumnò cum coma, succus incipiente pomorum lanugine. Tam feruentis hoc naturæ, ut per se extra corpori impositum, pustulas ignium modo faciat, & pro caustico in usu sit. Nascitur & in maritimis. Alia omnino est Characias, quam uulgaris sermo Charanciam appellat: quoniã septi modo, in hortis fenestrisq; per cancellos, opere topiario digeritur. De qua ne uerbū quidem apud Euthuria, folio uitis minore, pampinis item uitū, turbinato utrinq; fructu, uisēda cute, carnosa, uerrucosaq; per uersus: cucumeris pusilli, & Bucini marini quadam similitudine, malo uerius ac tubere, q; grandi bacca, aut folliculo puniceus, maturo colore, sanguineo quoq; succo. Inanitas contracto. Semina intus aliquot lenticulæ figura continet rubentia, ex quibus oleum exprimitur, ad uulnera præcipuum.

¶ De Fœmina. C A P. CLXX.

μυρσινίτη
καρύτη

Fœmina quam Myrsiniten, aut Caryiten uocant, similis suapte natura Daphnoidi. Folijs Myrti, sed maioribus, in cacumine acutis, & pungentibus. Ramulos ab radice mittit dodrantes. Fructū fert post annum nuci similem, mordaci gustu. Nascitur in asperis. Succus, radix, semen, folia, consimilem antedicto sortiuntur facultatem. Sed ad citandas uomitiones inualidior est.

B A R B A R I C O R O L L.

Tithymalus Myrsinites, a Theodoro Myrtaria cõuertitur, mollioribus folijs q; Myrti. Colliguntur comæ huius hordeo crassescente. Fructus demecitur cum messium maturitate. Hic nō pariter maturefcit, sed pars sequenti anno, & nux uocatur. Inde cognomen dedere Græci Caryitin. Est ubi Theophrastus Clematiam, hoc est, Sarmenulam uocat, folijs humisparfam, palmi longitudine. Nisi quis corruptum locum putet, legendumq; non Clematiam, sed Carytiam censeat.

¶ De Paralio. C A P. CLXXI.

παράλιον

Aliud Tithymali genus dicitur Paralios, quem Tithymalida, aut Mechona aliqui appellauere. Nascitur in maritimis, ramis rubentibus, palmum altis, quinis, senisue a radice exeuntibus. Folijs lini, angustis, paruis, oblongis, in uersus quosdam digestis, capite in cacumine orbiculato. In quo semen ut Eruum, uario colore emicat. Flos albus. Frutex totus cū radice lacteo succo turget. Similes ad usus recodit.

B A R B A R I C O R O L L.

Tithymalus Paralios, a Theophrasto Cocco appellatur, folio rotundo, semine candido, quo uua incipiente stringitur.

De Helioscopio.

CAP. CLXXII.

Aliud genus Helioscopius dicitur, folijs Portulacæ, rotundioribus, ramulis prodeuntibus a radice, quatuor aut quinque, rubentibus, dodrantali altitudine, tenuibus, lactis copiosi plenis, capite Anethi, semine in capitulis incluso. Helioscopij nomen accipit, quoniam comas cum sole circumagat. Circa oppida nascitur, potissimum in ruderibus. Colligitur succus, semenque ut aliorum. Eadem quæ superioribus tiores, non tamen usqueadeo ualidæ.

TITHYMALUM Helioscopium, semine albo, columbis gratissimo; quod colligitur nigrescente uua. Nomen accipit, quoniam capita cum sole circumagat.

De Cyparyssia.

CAP. CLXXIII.

CYPARYSSIAS in caulem exit dodrantalem, uel maiorem, subrubrum, ex quo folia Picæ similitudine exoriuntur, molliora tamen, & tenuiora. Et in totum nascentem Picæ amulatur. Vnde nomen traxit. Candido succo mader. Cui eadem uis quæ superioribus.

TITHYMALUS Cyparyssias, caule gemino, aut triplici. Nascitur in campestribus.

De Petræo Tithymalo.

CAP. CLXXIII.

GENVS TITHYMALI in petris nascens, Dendroides cognominant, in cacumine largam spargens comam, succo lacteo prægnans, cauliculis rubentibus, folijs Myrti tenuioris, fructu Characiæ. Eiusdem effectus cuius superiores, similique modo reconditur.

TITHYMALUS Dendroides, aliqui Leptophyllon cognominant, maxime cauliculis rubentibus, & semine copiosissimum.

De Platyphylllo.

CAP. CLXXV.

PLATYPHYLLOS Verbasco similis est. Radix, succus & folia per inferna trahunt aquas. Pisces necat, tufus & aquæ insparsus. Reliqua Tithymalorum genera, quæ supra scribuntur, eadem efficiunt.

TITHYMALUM Platyphyllon alij Corymbiten, alij Amygdaliten a similitudine appellant; nec ullius longiora sunt folia.

EX M. VERG. COMM.

Satis uno uersiculo, & in eo una tantum uoce in Theriacis suis monuit Nicander, quod commune Tithymalis omnibus esset, & unde potuerint posteriores latini nomen illis apre & feliciter facere. Is autem est. *σάμψυλον κνίδιον τε καὶ ὑγλαρίας θυμάλιδας*. Id est. Sampsucum, Cyrtumque, & copioso lacte plenas Tithymalidas. γλῶσσο enim eius gentis poetæ lac aliquando appellant. Eamque rationem secuti ueteres Romani, Lactariam herbam communem appellatione, ob commune omnibus lac, uniuersum hoc genus uocauerunt. Mox, ut plerumque in his fit, qui parum didicerunt, quantopere undique communia esse oporteat quibus constituendum genus aliquod est, uidentes aliqui non aliter quam ex Lactuca secta Tithymalis lac fluere, Lactucam uocare incæperunt; cum tamen nullius Tithymali folium ad eius similitudinem accedat. Licetque

Z iij

C Lactuca a lacte, quod secto eius caule defluit, nomen inuenierit, non ideo tamen hac una in re tantum illi similes plantæ aliæ eodem illi nomine indicandæ fuerant. Nullus enim audita Lactuca, non foliorum eius similitudinem quæret: quæ inueniri in Tithymalo aliqua non poterit. Nec refert, addiderit ne illi quispiam ex re aliqua discrimen, caprinamq; aut marinā uocauerit. Semper enim audito Lactucæ nomine, similem folijs illi herbam aliquis cogitabit. Idq; sentiens Celsus libro. 5. capite. 7. cum Lactucam marinā appellasset, adiecit statim, quæ Tithymalos a Græcis nominatur. Intelligebat enim q; late pateret Lactucæ nomen, & quatenus fallere quærentes Tithymalum id nomen posset. Multa enim ad mare nascuntur: nec si Lactuca etiam uocari Tithymalus possit, totum genus ea uox indicabit. Quæ enim a Græcis Paralios nominatur, sola ad mare nascitur, & sola uerè marina dici potest. Cæteræ enim montibus, campetribus locis, inter rudera, & circa oppida nascuntur. Verisimileq; est, fuisse id nomen tantum in usu his, qui aut nullam aliam Tithymalum apud se nascentem haberent: aut medicorum, qui ea tantum ad remedia uterentur. Eadem, aut non dissimilis in caprinæ Lactucæ nomine ratio est. Vescuntur enim capræ, non Tithymalis his tantum, uerum infinitis pene alijs: nec facile erat ex eius animalis cibo tam multiplicem herbam deprehendere. Eamq; ob causam nos, auctore Plinio, multoq; magis suadente id ratione, ne Tithymalis aliæ misceretur plantæ, ex toralijs eius appellationibus Lactariam herbam elegimus: quæ tam multis eius generibus inseruiret, & communem omnibus haberet ex communi omnibus lacte indicationem. Et hæc pro Lactariæ herbæ appellatione satis dicta hæcenus sint. Quibus adderem, doceremq; longius, quæ priuatim per singulas species fecerit illi nomina antiquitas: nisi qualicui breuitate obiter interpres ea docuisssem, Vallaremq; primum eius genus uocari dixissem, non aliter q; & Harundinis genus quoddam Characiam, Plinius etiam uocauit: q; uallaciam hic etiam uocari ait, altitudine ut hic inquit, supra cubitum: ut plariq; autem alijs, bicubitali, & crassitudine digitali: quæ tota quantitas erigendis uallis satis est. In cæteris ex historia eorum per se ratio nominis patet. Nec nos aliud habemus quod ad eā rem certius afferre ualeamus. Eamq; ob causam relictis huiuscemodi, ex Theophrasto monēbimus, Lactariæ herbæ tria tantū genera ab eo describi. Eam scilicet, quæ prima ab hoc numeratur Characiam, siue marem; Myrsinitem mox, aut fœminam: postremamq; Paralium, quæ tertia Dioscoridi. Cuius descriptionis quoniā multa erit pro scriptoris huius historia utilitas, nō pigebit longius isdem uerbis ex eo omnia repetere. Quæ huiuscemodi sunt. Tithymalorum autem maritimus qui Cocco uocatur, circi nata habet folia. Caulē, totamq; plantā altitudine fere dodrantali. Semen candidum. Demetit cum primū incaperit uua maturitate nigrescere. Daturq; siccum semen & tritum tertia fere acetabuli parte. Qui deinde mas Tithymalus dicitur, oleaginum habet foliū: tota est planta bicubitalis: lac ex eo in uindemia colligunt, & cū id cura uerint, utuntur. Purgat aut magis per inferna. Qui etiā Myrsites uocatur Tithymalus, colore candido, foliū habet Myrto simile, sed in summo aculeatū. Spargit hic per terrā uiticulas longidine fere dodrantales, quæ annuū fructum alternant: aliæ scilicet nunc, aliæ uero sequenti anno ab eadem radice exeuntes. Montana amat loco Tithymalus hic. Vocaturq; fructus eius caryon, id est, nux. Demetit cum ad plenā crassitudinem horde in spica maturuerint. Cumq; siccauerint, purgauerintq; semē eius, aqua lauant. Siccaturq; rursus dant bibendum, additis nigri papaueris partibus duabus, ita ut sit totū unius acetabuli pondus. Purgat autem per inferna pituitam. Si uero nucem ipsam dederint tritam, in uino dulci bibendam, aut in frixo Sesamo comedendam dant. Hæc sunt quæ Theophrastus de tribus Tithymalorū generibus quod diximus loco docuit, longius ideo a nobis repetita, ut ex eius historia, tantiq; auctoris testimonio plæræq; in Dioscoride certius cognosci possint: collatisq; simul duorum scriptorum decretis, uideant legentes, si qua aliter ab alijs reddita a nobis fuerunt, auctore Theophrasto, & antiquorum græcorum ope reddita fuisse. Quale est, quod in secundo genere fœminam Myrsinitem, & Caryitem diximus Laureolæ, quam Daphnoides uocant, gustu similem esse, colore albicante. Qui color, quoniam in impresso, alijsq; aliquot non legitur, relictus ab alijs est: & quod ad Daphnoides pertinebat, non plene expressum. Legitur enim in antiquissimis, τὰ δαφνοειδέα τῇ γένει καὶ τὰ ἴδιαι λευκά. Quod est: ut nos uertimus: Laureolæ, quam Daphnoides uocant, gustu similis, colore albicante. Fecimusq; id confidentius Theophrasto adiuuante, qui in Tithymali huius historia ait, ὁ δὲ μυρτίτης καλεῖσθαι τὸ θυμάλος λευκός. Quod est, Qui autem Myrsites dicitur, candidus Tithymalus. Declarat idem Theophrastus etiam quid in Dioscoride, & in secundo Tithymali genere est. τὸν δὲ καρπὸν φέρει παρ' ἑαυτὸν.

Quod alter ex nouissimis interpretibus uertit, Fructum fert alternis annis similem nuci. Alter, Fructum fert post annum nuci similem. Nos autem annuū fructum inuicem alternantes. Manifeste enim id docet Theophrastus. Cuius in ea re uerba sunt, κλημάτων δ' ἀφίσιν ἐπὶ γὰρ ὡς αἰμαῖα. ταῦτα δ' οὐχ ἀμαφίρι τὸν καρπὸν ἀλλ' παρ' ἑτῶν τὰ μὲν γὰρ τὰ δὲ ἕως νύκτα. Quibus nihil certius audiri potest. Viticulas autem per terram spargit dodrantali fere longitudine. Hæ autem non simul ferunt fructum, sed annua temporum uicissitudine, aliæ quidem nunc, aliæ uero sequenti anno. Sentiens enim Theophrastus non satis intelligi illud παρ' ἑτῶν, ut certiores faceret, addidit: alias quidem nunc ferre, alias sequenti anno. Idemque est Dioscoridi παρ' ἑνὲν, quod Theophrasto παρ' ἑτῶν. Græcæ præpositionis uis id facit, quæ carentes latini, non possunt una uoce id exprimere. Plinius ex Theophrasto locum interpretatus libro uigesimo sexto, capite octauo, ait. Fructus non pariter maturescit, sed pars anno sequente. Cum tamen Theophrasti uerba ea sint, quæ nos proposuimus: neque ex communi uocum illarum æstimatione, ut nobis uidetur, locus ille aliter intelligi poterit. Idem etiam Paralion, id est, maritimum. Tithymalum Coccon uocari ait. Quod forte ex Dioscoride perijt. Est autem græcis Coccus non simpliciter omne granum, sed quod rotundum est: etsi non semper in laudatis scriptoribus ea ratio seruetur. Pertinet ea appellatio ad capituli, aut seminis in Tithymalo hoc figuram, quam in altero Dioscoride περιφερῆ, id est, circinatam, in altero δὲ ὀρεῖον, id est, Erui figura & magnitudine ostendit. Sunt alia etiam quæ Theophrasto & huic scriptori non penitus eadem sint, & quæ in medicina aliter doceantur. Ea cognitu legentibus facilia erunt. Tria ut uidetur Tithymali genera tantum Theophrastus cognouit. Eaque sunt, quæ prima a Dioscoride numerantur. Cætera nec illi, neque herbarijs antiquis in hoc censu fuerunt. Siquidem Crateias, & Mison antiquissimi herbarij, quemadmodum Nicandri interpretes testatur, primū genus masculum dixerunt: appellarique Cobium, fruticem exiguum, rubentibus uirgis. Secundum Myrthinem. Et tertium Tithymalida, qui Paralios est. Cætera enim solo lacte, quo abundant, a posterioribus in censum Tithymalorum recepta fuerunt. Paulus Aegineta scriptorem hunc secutus, totidem illi genera numerauit. Discreuitque quibus uiribus, & qua natura communiter priuatimque singula sunt. Quæ omnia quoniam non erit inutile audisse, ex eo ipsius uerbis tradentur. Quæ huiusmodi sunt. Prædominantem alijs uiribus acrimoniā habent Lactariæ herbæ omnes. Inest eis etiam ualida amaritudo. Primas habet partes lac: tum semen: mox folia. Particeps & radix earum qualitatū. Eamque ob causam in aceto elixa, exesorum dentium dolores sedat. Lac uero cauis eorum inditur. Quod si os tetigerit, quæ primum urendo exulcerat: ideoque cæra id antea inuoluunt. Secundi enim ordinis in calefaciendo est, quem causticum esse dicunt. Eadem ratione defluunt lacte Tithymalorum inuncti capilli: sed quoniam uehementius est, oleo miscetur. Et si sæpius radices capillorum aliquis inunxerit, exiitque penitus pereunt, glabrumque relinquunt locum. Eadem potestate prerygia, formicas, uerrucas, & thymos tollunt. Quinetiam scabies, impetigines, carbunculantia, phagedenica, & cancrentia sanant. Omnium Tithymalorum efficacissimas maximasque habet uires: qui Characias, id est, Vallaris dicitur: quem etiam marem uocant. Foemina in idem: qui & Myrfinites uocatur. Quinetiam in petris nascens & arborecens. Post hos qui Verbasco similis est, Cyparissias, & maritimus. Postremus omnium Solisequus est. Proportione his omnibus respondet eorum cinis, & lixiuius cinis. Hæc sunt antiquorum medicorum de omni Tithymalo decreta.

De Pityusa.

CAP. CLXXVI.

PITYVSA M aliqui Clema, alij Crambion, alij Paralion, alij Canopicon uocant. Hanc specie a Cyparissia differre constat, etsi Tithymalorum generi assignetur. Caulis supra cubiti altitudinem assurgit, geniculatus, folijs Piceæ, acutis, exilibus, flore paruo, purpureo, semine instar Lenticulæ, lato, radice crassa, candida, succo referta. Quibusdam in locis frutex hic prægrandis inuenitur. Detrahit per aluum radix, drachimis duabus data in aqua mulsæ. Item seminis drachma. Succum cum farina subacti cochlearium, in cataportio datur. Modus foliorum drachmæ tres.

πύτυσα
κράμβιον

D I O S C O R I D I S

E X M. V E R G. C O M M.

C Inter arbores libro. 24. capite. 6. Pityusae meminit Plinius, & a Picea statim brevissime quam ille credit facis fore omnē eius historiam & medicinā profectus est: nulla alia q̄ nominis occasione fretus. Neq̄ enim Pityi, quā Piceam uocauimus, congener Pityusa est. Frutex siquidē hāc, illa uero arbor, totoq̄ gñe inter se diuersae. Ille tñ ne cognata a congeneribus suis separare uideret, cognomines potius q̄ congeneres plantas simul & continuata historia descripsit. Hic eōtra, naturā magis q̄ noīa secutus, Lactarijs alijs herbis eam statim subiecit: quoniā parem laetis ubertatē, & simile in purgando uim habet, nec tanti folia eius Piceae similia fecit, ut reliquā naturā negligeret. Quod em̄ Pityusa Piceae simile habet, foliū tantū est: cetera Lactariae herbae similiorem & congenerē faciunt. Ideoq̄ ait a quibusdā inter Tithymalog: species & hanc numerari: foliaq̄ specie a Cyparissia Lactaria herba differre. Animaduertit hoc ante nos etiā Nicolaus Leoniceus, longiusq̄ de rota hac re in cōmentariolo suo egit. Eam uocari a quibusdā hic Clema ait, id est, uiticulam & sarmentū: quoniā forte quos habet caules, aliarū modo quae uiticulas habent, per terram spargit. Paralium uero, quoniā Tithymalo ob lactis copiam similis sit, Quod deinde ceteri interpretes in radice dixerunt uocari eam Turpet, adiectū Dioscoridi a posterioribus fuit. Id enim in nullis ueteribus grācis aut latinis legitur: nec legi etiam debet, quādo barbara ea uox est, & a posterioribus medicis quaecunq̄ ea sit sic appellata. Ob quas causas, nos libenter & merito ex hoc scriptore eam eiecimus.

De Lathyri.

C A P. CLXXVII.

Lathyris

LATHYRIS, quam aliqui Tithymalum appellant, eamq̄ Tithymalorum numero adscribunt, caulem emittit cubiti altitudinis, & digitali crassitudine, in panem. Gignuntur in cacumine alae, & folia in caule oblonga, amygdalinis proxima, latiora, & latiora. Quae autem in summis ramulis exierunt, minora conspiciuntur, Aristolochiae, aut oblongae Hederae figura. In cacumine fructum summis surculis gerit, triplici conceptaculo insignem, rotundum, ceu Capparin, in quo grana intercurrentibus membranis distincta continentur. Eruiis citiora, rotunda, quae dum corticibus exuuntur, candida sunt, & gustu dulcia. Nullus radicis usus. Totus frutex lacteo succo turget, uti Tithymalus. Grana sex, aut septem in catapotio, aut cum ficis, aut palmulis deuorata, aluum purgant. Sed aqua frigida postea sorbenda. Trahunt autem bilem, pituitam & aquas. Succus Tithymali modo exceptus, eundem effectum praebet. In gallinaceo iure, aut oleribus folia decoquuntur ad eisdem effectus.

Pli. li. 27. ca. 11.

B A R B A R I C O R O L L.

Lathyris, folia habet multa Lactucae similia, tenuiora, ut Plinius tradit, germinibus crebris. semina Piperis magnitudine, facilia purgati.

E X M. V E R G. C O M M.

Demonstratam paulo ante Pityusam, & quā modo tractamus Lathyrim ob eandem Lactucae notā, & purgandi uim, Paulus Aegineta in. 6. Tithymalis alijs adnumerauit. Suntq̄ de Pityusa eius haec uerba. Et hanc aliqui Tithymali speciem dicunt: quoniā simile lac habet, & utile purgat, de Lathyri autē quae sequuntur. Priuatim hanc quidam Tithymalū uocant: quoniā pariter illi lac eius purgat: etsi in Lathyri praecipuā purgandi uim semen habet. In qua descriptione animaduertendū in primis illud est: quod dicitur, priuatim quosdam Lathyrim Tithymalum uocare, eo pertinere, quasi non Lathyris, sed certiore Tithymali nomine ab illis indicetur. Credimusq̄ nos ex hac descriptione, posteriorumq̄ temporū usu, Cataputiam minorem a nostrae aetatis medicis Lathyrim appellatam fuisse. Nihil de Lathyri hac, quod hactenus in eo intenerim, Theophrastus. Masculino tamen genere Lathyron inter legumina libro octauo de plantarum historia numerauit. Veritq̄ Gaza, Cicerculam: quae nihil ad Lathyrim hanc pertinet, Plinius uigesimo septimo uolumine, capite undecimo, Lathyrim diuersa penitus ab

hoc scriptore historia tradidit: præsertimque in folijs, quæ hic Amygdalæ, ille Lactucæ similia fecit: magno ut uideatur figuræ discrimine inter Lactucæ, & Amygdalæ folia. Sunt præter hæc & alia, quæ poterunt uolentes inuicem conferre, Nobis satis sit locum signasse.

¶ De Peplo.

CAP. CLXXIX.

Peplos, quem aliqui Sycen, alij Mecona Aphrodem uocant, fruticulus est lactei succi plenus, folijs Rutæ, paulo latioribus, rotunda coma, dodrantali, humi resperfa, semine sub folijs rotundo, minore quæ candidi Papaueris. Pluribus scater auxilijs. Vnicam radicem habet, superuacuam, ex qua fruticat. Nascitur inter uites, & in hortis. Colligitur messibus. Siccatur in umbra, & continue uersatur. Fructus rufus, & feruefactus reconditur. Bilis ac pituita detrahitur, acetabulo eius in hydromelitis cyathopotio, Obsonijs insperfa conturbat aluum. Muria conditur.

BARBARI COROLL.

Peplos, ex una tenui radice fruticat. Hanc & Meconion, & Meconitin ab Hippocrate uocari, Galenus auctor.

Pli. li. 27. ca. 13.

EX M. VERG. COMM.

Meconion, Meconitumque, id est, Papauer, aut Papaueraceam herbam uocasse Peplon hanc Hippocratem, testis est Galenus. Idem & Dioscorides testatur, spumeum Papauer ab aliquibus dici affirmans: postque hos omnes Plinius libro. 27. capite. 12. Quod non aliunde, quæ ex seminis similitudine factum est: quod omnes albi Papaueris esse dixerunt. Paulus Aegineta præter id habere Peplon lac etiam ait, Tithymalorumque modo purgare. Omnes itidem Sycen uocari dixerunt. Quæ uox græcis Ficum significat: & quoniam lacte arbor ea abundet, ideo Lactariæ herbæ communicasse suum potuit nomen. Plinius quo diximus loco ipsam notis descriptam facile cognoscendam diligentioribus reliquit.

¶ De Peplidæ.

CAP. CLXXX.

Peplos, quæ aliqui syluestrem Portulacæm uocant, Hippocrates Peplion, in maritimis nascitur, largo frutice, candidi succi pleno, folijs satiuæ Portulacæ, rotundis, inferne rubentibus, semine sub folijs rotundo, uti in Peplo, feruente gustu, radice singulari, superuacua, tenui. Colligi & reponi solet. Datur uti Peplos, & conditur. Easdem habet uires.

BARBARI COROLL.

Portulacas syluestres uocari herbas tris inuenio. Vnam quæ sit Aizoi species. Alteram cognomine Telephion. Tertiâ Peplin, siue Peplion; de qua præsens mentio. Quid autem sit Diplion Aetio, qui ad auctorem id refert Aretæum, haud scio. Terendum cum aqua inquit in anginæ morbo Diplum, & subiecto linamento, imponendum pectori, quoties præuocatio timetur. Sunt apud Græcos, inter quos Isacijs, qui Peplium, pro Senna modo appellata intelligant. Ego diuersum puto genus: cum Senna siliquis, & in his semine ferat, Peplis non ferat. Alia est & Sennicula, siue Sanicula uocata, trāsalpina herba, folio Vitis, aut Aprij rubentibus, in fine sectionum maculis quibusdam, surculis quoque rubris ad radicem: quæ multis ei fibris subest, capitulis in summo frutice pusillis subnigrisque: huius succum uulneratis in potum commendant.

EX M. VERG. COMM.

Neutrò genere, sed eadē diminutiuâ forma Galenus Peplion Peplidâ hanc uocat, & ad ducendam pituitâ & bilem semine eius commendat: auctoremque Hippocratem, disciendis inflationibus uti lem prædicauit. Paulus Aegineta a decretis scriptoris huius non discedens, feruidi saporis semen habere Peplidâ hanc ait, Peploque pariter purgare. Quâ ob causam eandem Peplio esse aliqui crediderunt, foliisque in declinatione nominis discrimen esse. Veritamen certis discriminibus duæ inter se plantæ differunt: præsertimque foliorum, quæ in altera Rutæ, in altera Portulacæ sunt. Ex quo

D I O S C O R I D I S

C factum est, ut tertium genus sylvestris Portulacæ hæc credita fuerit. Et sane similis illi paulo minus quæ tota figura est: adeo, ut facile pro Portulacâ fallere legentes possit.

De Chamæsyce.

C A P. CLXXXI.

χαμηλὴ

Chamæsyce aliqui Syce, alij spumofum Papauer uocitant. Ramos emittit quaternū digitorum, teretes, succosos, in terram deiectos, folia Lentis, parua, Peplum plane referētia, tenuia, quæ a terra non attolluntur, semine sub folijs rotundo, ut in Peplo. Neque caulem, neque florem promit. Radice firmatur tenui, superuacanea. Rami ex uino triti uulua dolores sedant, in pefso appofiti. Tollūt tumores, ac uerrucas omnium generū illiti. Decoctorū cibo, alius refoluitur. Succus fimili effectu prodest. Illitus contra fcorpionis iclum auxiliatur. Aduerfus caligines oculorum utilis, & hebetudines, incipientes fuffufiones, nubeculas, cicatrices, cum melle inunctus. In squallidis petrofisq; nascitur.

B A R B A R I C O R O L L.

Chamæsyce, pumila Ficus est, quali terræ Ficum significans.

E X M. V E R G. C O M M.

Quæ a Lactarijs herbis deinceps a fcriptore hoc numeratæ, tractatæq; sunt Pityufa, Lathyris, Peplos, & Peplis, uno, quæ cætera defint, lactis liquore, quæ fectæ oēs defillant, facile congeneres, nulla intercedente herba, fruticeue alio, coniunctâ merito descriptione in eo habuerunt. Nec aliunde humilis, iacensq; in terra terrestris Ficus hæc, quæ tota Chamæsyces græcis significatio est, in ordinem & numerū illarum uenit: foloq; lacte, quod Fieis simile habet, honestiorem quæ decebat ab arbore appellationem inuenit. Neque enim ramos, folia, fructusue ficulneos habet. Quod Fico comune habet, lac tantū est. Quæ ob cauffam parū proprie pumilâ Ficum, quod aliqui fecerunt, eam aliquis dixerit. Aliud enim est pumilam Platanū, & Cerafum dicere coactæ breuitatis arbores: & aliud quas Græci Chamæsyce, Chamæcifon, & alia huiusmodi. Illæ siquidem fuū genus feruantes, fola breuitate ab alijs differunt: hæc fimilitudine aliqua tantū, & alicuius folum partis in alio genere conftitutæ, deficiente omni alio nomine, ab arbore, plantaue alia, cui in ea parte fimiles funt, id impetrarunt. Quod facillime in Chamæsyce hæc deprehendit: quæ ramulos fuos per terrâ fpargit, & folia Lentis habet parua, ut hic ait, tenuiaq; & in terra iacentia; quæ longiffime a Fico arbore abfunt: nec relinquunt, unde fic uocari debuerit, quæ lactis liquor, quo multis oculorū uitijs & morbis medetur.

De Scammonia.

C A P. CLXXXII.

σκᾶμνιον

Scammonia aliquibus Scambonia radix, alijs Colophonia, alijs Dactylion, Romanis Colophonium, Magis Apopleumonos, Aegyptijs Sanilum dicitur. Ramos ab una radice emittit trium cubitorum, multos, pingues, & qui nonnihil crassitudinis præ se ferant, folijs Helxinæ, aut hederaceis, mollioribus tamen, densis, & triangularibus. Flore candido, rotundo, in calathi modum cauo, graueolente: radice prælonga, crassitudine cubitali, candida, graui odore, succo grauida. Legitur ad hunc modum succus. Capite exempto, radix in testudinis speciem cultro excauatur: quo fit ut in cauum confluat succus, qui conchis demum excipitur. Alij scrobes in terra concamerato sinu fodiunt, in quos subiectis Iuglandium folijs, profundunt succum, siccatumq; extrahunt. Laudatur autem Scammonium læue, nitidum, rarum, & colore quæ simillimum taurino glutini, fungosum, tenuibus fistulis, quale ex Mysia regione Asiæ contermina deportatur. Nec attendere

folum par est, si linguæ tactu albescat. Hoc enim euenit adulterato, qđ A
admisso fit Tithymali lacte. Sed longe magis antea narratis. Item si nō
uehementer linguam exurat. Id quod misti Tithymali argumentū est.
Natione autem Syriacum, & Iudaicum deterrima habentur, grauiā, dē
sa, Erui farina, & Tithymalo uitiata. Succus drachmæ unius, aut qua-
ternum obolorum pondere haustus, ex aqua pura, uel mulsa, per infer-
na bilem & pituitam extrahit. Ad resoluendam aluum binos obolos
cum Sesāma, alioiue semine, sumpsisse satis est. Dantur efficacioris pur-
gationis causa, succi quaterni oboli cum duobus Veratri nigri, & Alo-
es drachma una. Fiunt purgatorij sales drachmis uiginti succi Scāmo-
niæ, in senos salis cyathos adiectis. Horum modus proportionē uiri-
um. Integer quidem tria cochlearia, medius duo, minimus unum. Radi-
cis drachma una, aut altera purgat, cum ijs quæ retulimus. Nonnulli
decoctum radicis ebibunt. Coquitur in aceto, & cum hordeacea farina
teritur, cataplasmate ischiadicis utili. Partus enecat, succus uulua in la-
na subditus. Tubercula discutit cum melle, aut oleo illitus. Decoctio in B
aceto perunfæ lepræ abiguntur. Diuturni capitis dolores ex aceto &
rosaceo perfunduntur.

BARBARI COROLL.

Scāmonia, siue ut Cicero, & Plinius quandoq; appellant Scāmonium: quanq; Scāmoniū p
succo eius quoq; capitur. Frigida amat loca, pingui tamen & arido solo nascens. Lachrymā e
radice sua fundit, folijs albis, pinguibus, radice nauseosa. Circa canis orrum succus excipitur.
Adulterant Tithymali marini succo, maxime in Iudæa: quod etiam strangulat sumptum. Vis
bimo, nec ante, nec postea. Laudatur natione Colophonium, Mysium, Priennense, specie autē
nitidū, cito liquefens, uirus redolens, somniosum, linguæ tactu lactescēs, & cū diluit albescēs.

Pli. li. 26. ca. 8

EX. M. VERG. COMM.

Erimus ueterum & iuniorum exemplo in Scāmoniæ & Scāmonij cōmentatione breuiiores.
Quotidiani enim in medicina usus res est: nullusq; non audito alterius nomine, intelligit qđ ad
purgationes præsentem, & maximam uim habet: noueruntq; omnes quem uendunt officinæ,
concretum ex radice herbæ liquorem. Quæ multis quidem locis provenit. Probatissima autem
transmarinis regionibus, præsertimq; Asia, & toto Colophonio agro. Ex qua regione factum
illi aliquando fuisse nomen hic a gentibus testatur. Quæ dum probatissimum Scammonium quæ
runt, & ex Colophone Asiæ id petunt, paulatim fecerunt, ut quæ bonitatis nota erat, in nomē
& appellationem transferit. Verum tamen facile id nomen perijt: seruato ubiq; quod primū
et aptius illi fuerat a principio factum: quod nos credimus rationem a fossura habere: quā hic
ad excipiendum liquorem fieri docet. σκάπτειν enim græcis fodere est. Vocauitq; gens illa for-
minino genere Scammoniam herbam: masculino autem, aut neutro, exceptum ex secta radi-
ce eius σκόν, aut σκισμα, id est, liquorem. Fecitq; usus, qui plerumq; liquoris eius est, ut miscerē-
tur quondam, & adhuc misceantur in appellationibus simul, liquor, & planta. Probatores tā-
en græci neutro genere semper Scāmonium liquorem uocauerunt. Sic Plutarchus in commen-
tario, quo docet quibus notis fecernendus ab amico adulator sit, cum moneret, non esse in ca-
lamitate & infortunio castigandum hominem: quoniam non aliter reiecturus tunc præcepta
illa esset, qđ si ægroto assidens medicus diceret, ob præteriti temporis uoluptates, nimiam uene-
rem, lōgiore cœnas, & quotidianam ebrietatem omnia illi ea mala adesse. Fieri enim, ut respō-
deat dolens, iratusq; παρασκευάσει ταί μοι κατόριον καὶ σκαμμώνιον, οὗ δὲ νευθετῆς καὶ φιλοσοφῆς. Quod
est. Preparatur mihi Castorium & Scammonium, tu autem mones & philosopharis. Protulit
q; genere neutro Scammonium, σκισμα, id est, collectum & seruatum in medicinæ usum radicis
Scammonia: liquorem intelligens. Descripsit lōgiore historia Plinius Scammonium & Scam-
moniam lib. 26. ca. 8. Hortamurq; nos bonarum literarum studiosos, omnia eius scriptoris di-

Aa

D I O S C O R I D I S

Cetera, singulasque voces cum Dioscoride confetre. Neque enim erit ad utramque partem negligendum operæ precium. Siquidem intelligent in radice descriptione, quam hic ait *βαρυσσμον*, quæ uox græcis graueolentem simpliciter significat, ab eo nauseosam dici; & quam hic *ὑποῦ μυσίν*, id est, liquore abundantem, madidam: multaque alia quæ Barbarus Plinium imitatus, ab aliquibus forte longius a scriptoris huius sensu discessisse uidebitur: madidam enim & ille uertit. Nos quoque niam post tot secula sentimus mutatam in multis uocibus antiquam significationis æstimationem, aut si ea adhuc seruetur, apertiore tamen docendi rationem in eundem in his esse, uertimus graueolentem, & multo liquore abundantem: iisdem uocum uestigijs huic scriptori per plantas eius ingredientibus.

De Chamelæa. CAP. CLXXXII.

χαμελαία

Chamelæam aliqui Pyros agnen, alij Heracleon, alij Bdelyram, alij Coccon gnidion, Romani Citocacium, nonnulli Oleaginē, quidam Oleastellum uocant. Surculosa fruticat, ramis dodrantalibus. Folia Oleæ similitudinem habent, tenuiora & amara, quæ gustata linguam mordent, & arteriam deradunt. Detrahit pituitam bilemque, folijs præsertim in catapotio deuoratis. Namque duæ Absinthij partes, adiecta Chamelææ una, hydromelite excipiuntur, & in catapocia coguntur. Ea autem in uentre non liquefcunt. Siquidem quot fucere deuorata, regerunt. Folijs cum melle tritis sordida ulcera & crustosa repurgant.

BARBARICOROLL.

Pli. li. 15. ca. 7

D

Chamelæa, frutex est petrosus. Sunt ei (ut quidam habent codices) mora odorata Plinio. Quidam folia ei amara & odorata scribunt. Simillimum huic oleum inest, ut Oleastro: cuius & baccas quoque similes habet, ob id a quibusdam Oleastellum, & Olea cilibraca uocatur, auro re Columella, Sirapam inde condi soliam scribente. Sunt qui succum in Gallia, aut Italia nascentis, eundem esse cum Euphorbio putauerint. Sed hic multum infra illum est. Ex hac & granum Cocci plerique falso nasci existimauere. Nostri & hanc, & Thymelæam præcipue Cassia uidentur appellasse. Theophrastus Cneoron: Igino id apud nos Cassia interpretare. Cuius duo genera feruntur. Candidæ, cui folium cutis modo quadamtenus oleagineum. Nigræ carnosum, Tamarici similius, siue ut in Theophrasto quidam (quos probo) legunt, Myrto. Candida magis humi se spargit, & odorata est, Nigra sine odore. Radix ambabus alta, pgrandis, rami copiosi, crassi, surculosi, ab terra protinus aut paulo supra emicant, admodum lenti, ut quibus ad uincic dū p iunco utant. Veneri in coronamenta folio. Post Aequinoctium autumni germinant, atque florem mittunt, qui diutius eis est. Hæc tota de Cneoro siue Cassia Theophrasti sententia est. Dioscorid. Cestron, & Cneoron uocari Thymelæam prodit. At ego non Cestron, sed Cnestro legendū arbitror, Hippocratis, & Galeni, & codicum uetustiorū fretus autoritate. Hoc ipso nomine Cultellus appellatur quo casei scabunt: quanquam & Tyrognestis, & Cobelis quæ is dicat Poluci. Liparonis herbæ meminit Aetius, & Alexandria sic uocante: quam aliqui Cnestron inquit ne a Thymelæa, siue Cneoro diuersam, an eandem putarit. Recentiores, ut plerique omnia, Chamelæam, & Thymelæam cum Daphnoide ruspiter confundunt.

EX M. VERG. COMM.

Non ausim ego dicere, quod fecisse uidentur aliqui, pro comperto mihi esse, græcorū Chamelæam capite hoc a Dioscor. tractatam, Columellæ Cilibracam oleam esse, quam. u. uolumine, capite. 49. scriptor ille, propter similitudinem Oleastellum a quibusdam uocari ait. Quæ enim numerantur ab eo illic ad Sirapæ confectioem Oliuarum genera, ex arboribus, non fruticibus legi præcipiuntur, posæ, liciniæ, & culminiæ, omnes in Oliuarum censu inter primas laudatæ: quibus uerisimile est, connumerari debuisse eam quæ egregiæ bonitatis pariter esset; præsertim dicente eodem Columella. Verumtamen habetur præcipua in hos usus olea Cilibraca: quam quidam propter similitudinem Oleastellum uocant. Ratiocinari enim ex his oportet, meliorem præbentemque Cilibracā oleam præmonstratis illis esse: quod parū uerisimile est in Bacca, Oliuæ: illa quæ sola similitudine, non quæ cōgener oleis sit, in censum earum uenerit. Nec obstat dicere Columellā, propter similitudinem Oleastellū uocari. Potest enim ad totius arboris formā id re

ferri. At Plinius. 17. uolumine cap. 7. oleum ex Chamelæa fieri testat, expressio ex oleastris simillimum. Scimus id quidem; & nisi aliud doceatur, ex oliuis oleum etiam exprimi, oportere; si exprimendum ex Chamelæa oleum sit, oliuas baccasue in ea intelligi: quod tamen hic in Chamelææ historia non testatur: & si Plinius aperte id dicat, non constituimus ob eam causam Cilibracam Columellæ oleam: etsi Oleastellum uocari a quibusdam ille dicat Dioscoridis Chamelæam omnino esse. Siquidem oportet ad conficiendam Sirapam (sic enim ab eo appellatur, oliuarum cōditurū antiquum genus) meliores probatioresq; oliuas eligi: quæ si in Chamelæa sint, quemadmodum ex Plinio ratiocinari licet, immaturas, asperasq; & quales in Oleastris sunt intelligere oportet. Non enim Olea Chamelæa est, sed a foliorū similitudine furculosus, & dodrantalis frutex sic appellatus. Eamq; ob causam, si baccas, aut oliuas fert, quales diximus esse, eas uerisimile est. Patetq; id ex eodem Plinio quo diximus loco, dicente post descriptum ex oleastro oleum, Simillimū huic est ex Chamelæa frutice, folijs Oleastri, baccisq; frutice saxoso, nō altiore palmo. Quæ tota descriptio longe a scriptoris huius historia diuerſa est. His nos rationibus usi, quod in Diosco. legitur, aliqui uero Citocatist Chamelæam uocant, nō mutauimus; & si ea uox nihil modo nobis significet: sed qualis in cunctis græcis est, seruata a nobis fuit. Barbarus literarum prima uestigia secutus, Cilibracum ex Columella interpretatus est. Neq; aliam ob causam longius dicta hæc a nobis sunt, q̃ ut diuersitatis huius, & seruata a nobis cōmunis lectionis ratio omnibus pateret. Heracliam mox, id est, Herculeam uocari etiam Chamelæam in Diosco. legitur. Credimusq; nos factum id nomen ex antiqua fabula fuisse, quam ex Pindaro in Oleastro primo uolumine retulimus: q̃ scilicet Hercules ex Scythia coronatus Oleastro in Græciam redierit; & quoniam similis Chamelææ Oleaster sit, & Oleastro Chamelæa, ideo similitudine decepti aliqui, non Oleastrum, sed Chamelæam Herculeam uocauerint fruticem & coronam. Reliquimus etiam contra aliorū interpretum rationem quod inter has appellationes auditur, *ἡ χαμηλαία μέλαινα*. Quod est, aliqui autem Chamelæam nigram. Error enim id eorum est, qui græcarum uocum similitudine decepti, Chamelæonem cum Chamelæa miscuerunt. Neq; enim nigredo Chamelææ competit. Qui colore nigro a candido discernitur, Chamelæon est. Et quoniam nihil in Chamelæa id causæ haberet, inutiles eas uoces expunximus. Errasse autem in duabus his plantis non græci tantum, sed latini, & hi quidem inter medicos probatissimi Auicenna, & Serapion uidentur. Qui Mezerion, quæ Chamelæa hæc barbaris est describentes, multa quæ Chamelæoni debentur illi tribuerunt; & ediuerso. Poteruntq; uolentes id certius in Chamelæone, & Mezerion posteriorum scriptorum uidere. Sunt Chamelææ huius appellationes aliæ, uerum tamen improprie, & ex alijs plantis importune ad hanc relatae. Quemadmodum in Tymelæa quæ mox sequitur patebit. Ea enim proprie Pyrosachne, & Cnidium granum uocatur, si Plinio & antiquis græcis credendum est.

De Thymelæa. CAP. CLXXXIII.

Thymelæam alij Ghamelæam, alij Pyros agnen, alij Cestron aut Cneoron uocant. Ex qua Granum cnidium, quod est Thymelææ fructus, colligitur. Hoc Syri Apollinū, alij Linum appellant. Quoniam satiui Lini frutex suapte natura similitudinē referat. Virgas edit perpulchras, tenues, tripedaneas, folijs Chamelææ, angustioribus, & pinguioribus, uiscosiss, gummosissq; si mordeantur: flore candido, fructu Myrti in modum rotundo, qui inter initia uiret, & tandem rubescit, pulpa fructus dura, foris nigra, intus alba, quæ per inferna bilem, pituitam, aquasq; detrahit, si uiginti granorum pars interna bibatur. Verum fauces adurit. Itaq; cum farina, aut polenta, aut in uuæ acino dari debet, aut melle cocto obducta deuorari. Qui ægre desudant, trito semine cū nitro & aceto inunguntur. Folia quæ peculiariter Cneorum appellantur, per messes colligi debent, & siccata in umbra recondi. Quibus dare libeat, antea tundere, & neruos eximere cōuenit. Illitū

A a ij

θυμelaία
χαμηλαία

D I O S C O R I D I S

Cacetabuli modo cum diluta potione, aquam extrahit. Mediocris purgat, addita Lente cocta, aut contritis oleribus. Thymelææ farina uua æcerbæ succo excipitur, & in pastillos diuiditur. Herba stomacho infesta, Partus imposita necat. Nascitur in montibus & asperis. Hallucinatur qui Coccon Cnidium fructum esse Chamelææ existimant. Falluntur enim quadam foliorum similitudine.

Pli. li. 13. ca. 21

B A R B A R I C O R O L L.

DE Thymelæa, granum, siue Coccon Cnidium enasci constat, Myrti magnitudine, colore & specie foris, autore Dioscoride, non farris, ut in Plinianis codicibus deprauate legitur. De Thymelæa nonnihil & superiore protinus mentione diximus.

E X M. V E R G. C O M M I.

Antiquæ, & antiquorum scriptorum autoritate receptæ appellationes omnes, Thymelææ scriptori adiectæ sunt. Quandoquidem Plinius. 13. uolumine, capite. 21. his uerbis de Thymelæa egit. Fruticem uero Thymelæam alij Chamæleam, alij Pyrosachnen, alij Cnestren, alij Cneoron. Qui uocum & nominum numerus idem huic scriptori est. Theophrastus itidem primo de plantarum historia de foliorum diuersitate agens, Cneoron Thymelæam uocauit. Eius uerbahæc sunt. τὰ δὲ ὅντων σκευήματα τὴν δὲ ὡς τὴν σαρκοῦς ἔχει τὸ πᾶν ὅντων κνέροντος μυρὶν καλῶν. τῶν δὲ φρυγανικῶν κνέροντος σείβη, τῶν δὲ ποσειδῶν ἐνίστων. &c. Quod est. Carnosi folij quædam etiā: & id quidem, quoniam carnosum id habent qualis Cupressus, Myrice, & Malus est. In furculo so itidem genere Cneoros & Stæbe, & in herbaceo Sedum. Quæ ex scriptore illo repetita: & cōmentationibus his nostris addita sunt: ut qualis Thymelæa hæc sit certius adhuc cognoscatur. Surculosi generis herba, & carnosii folij: quæ in Diosc. cōscienda magis, q̃ manifeste intelligenda sunt. Siquidem uirgas in ea dixit, & Lino comparauit, & folia pinguis gummosaq; descripsit. Quod totum Plinius ex Theophrasto acceptum eodem loco retulit, simile Oleastro Thymelæam faciens: folijs angustioribus, gummosis si mordeantur, Myrti magnitudine. &c. In quo laudandus etiam Theophrastus, qui folium Thymelææ describens, Cneoron eā uocauit: quæ si sciret & ipse quod Diosc. testatur, folia tantum ea uoce censeret. In. 9. deinde remedia & uires eius tractaturus, Cnidium granum uocauit, easdemq; huic scriptori uires illi assignauit. ὅ δὲ κνίδιον κόκκος στρογγύλον ἰσχυρόν τῇ χρυσῇ μύσῃ δὲ τοῦ πεπύρωστος ἰσχυρότερον δὲ πολὺ τῇ θερμότητι, διὸ καὶ ὅταν διδύσκειν κατὰ ποτὸν, διδύσκειν γὰρ πρὸς κοιλίᾳ λίσιν ἐν ἔρῳ ἢ σίκατι περιπλάττονται, καὶ γὰρ ἄλλως τὴν φάρμακον. Quod est. Cnidium uero granum rotundum, coloreq; rubens, semen fert Pipe re maius, multoq; ad calefaciendum Pipere ualidius. Quam ob causam cum dant (datur autē ad soluendam aluum) in pane, aut adipe inuolutum dant: alioquin fauces urit. Et hæc nomina diuersitas in Theophrasti Thymelæa est. Quibus addiderunt alij alia: uocaruntq; aliqui Pyrosachnem, ab urendi uī quam habet. Pyrenim græci ignem uocāt. Nec aliud Pyrosachne, compositum ex igne & tenui stipula nomen indicat, q̃ quod egregie urit. Chamelæa eadem dicta fuit, quoniam ut Plinius ait, Oleastro similis sit: ut hic scriptor autem, quoniam Chamelææ, quæ superiore capite præmonstrata est, folia similia habet: quod totum eodem redit. Quod enim simili simile est, eandem similitudinis causam & principium habere oportet. Cnestro postremo eandem hanc Thymelæam uocarunt probatissimi græcorum scriptores Hippocrates, Galenus, & pleriq; alij. Nobis tamē ignota uocis eius origo & causa. Comparauit eam Diosc. λίνω σάρατι: neq; aliud uoces illæ in cōmuni significationis æstimatione significant q̃ satium Linum. Quærendum tam & eruscandum diligentius opinamur, Lino nesci uo simpliciter, an furculoso frutici, quem Sparton omnes uocant, & hic eodem hoc libro descripsit, similem Thymelæam dixerit. Nobis in hanc partem inclinatur animus: & si aliorum interpretum modo & nos satium Linum uerterimus. Genistæ enī similior, q̃ Lino ex historia, descriptioneq; eius uideri potest. Vniuersæ plantæ nomen factum uidetur ab Olea cui similis est, & a Thyma herba cuius habet flores. Paulus Aegineta præter ea quæ nunc in Diosc. leguntur, radicē eius contra sanguinis p̃fluuiā cōmendauit, uiribus, saporeq; acerbis: eiq; malo prodesse potā & foris impositam.

De Sabuco. C A P. CLXXXIII.

Acten aliqui Dendron arctu, alij Hemeron, Latini Sabucum, Galli Scobiem, Daci Sebam uocant. Ex eo genere quædam in

arborem assurgit, furculos spargens arundinaceos, teretes, cauos, candidi-
cantes, proceros. Folia luglandis terna, quaternauc, ex interuallis circa
ramos exeūt, grauiā odore, minutim in ambitu secta, & in ramulorum
cacuminibus cauliculisq; circinatae umbellae, quae florem candidum pa-
riunt, mox fructum Terebintho similem, in nigredine subpurpureū,
acinosum, succo madentem, uinosumq;.

BARBARI COROLL.

SAbucum medulla carere aiunt nonnulli. Theophrastus Carnosam ei adiungit. Fruticosa
uirgis arbor: quae anniculæ, donec folia deciderint in longitudinem crescant. In sena maxime
cubita: post id tempus in crassitudinem fundantur. Lignum fungosum, & cum inaruit leuissi-
mum: medulla molli: quæ tota uirgulis eximitur baculorum usu. Siccatum durat, inoffensum
q; aquis redditur, etiam decorticatum; quod ei sponte arido contingit. Caudici crassitudo ga-
lex. Cortex levis, tenuis, spissus: quem uocant Canopum, cuius a Graecis in Iuliani Oxy-
mete fit mentio. Radices tellure summa, nec multas, nec grædes agit. Folium minus, quod quidē
pars est maioris, molle oblongumq; habet; ut laurus latifolia, maiusculum tamen, latiusculumq;
subtus & situ medio rotundius, exacutum, serratumq;. Folium uero maius, qd ex illis minori-
bus quasi coalescit, pediculo uno crasso & neruoso geritur, ceu ramulus, folijs utrinq; genicu-
latim & ordine iugatis, uno in uerticibus relicto singulari. Subruffa hæc, & fungosa, & de sin-
gulis petiolis uniuersa collabuntur. Sunt & in ramis nouellis internodia, sed quasi rudia, intar-
ticulataq;. Flos candidus, ex flosculis minatis, faui specie congestus, e pediculi fissura, graui o-
dore, quanq; Lilij. Fructus quoq; racematim pediculo unico dependet, Actio uocatus, qui
cum ematurus, nigrescat. Immaturus eolor uix acidæ, paulo maior q; Eruum, humore lento.
Manus capillumq; inficit, Grana intus sesamacea, non ingrata turdis, sturnisq;. Locis potissi-
mum opacis, & iuxta aquas gignitur. Differt a ferulaceo genere, q; plus ligni ac succi habet, q; **B**
Ferula. E Sabuco magis canoram buccinam tubamq; credit pastor, ibi cæsa ubi gallorum can-
tum frutex ille non exaudiat. Dictam puto arborem, a Sambuca musico instrumento, quod
alii Pectida uocant, alij Magadin: ut in arundine notauimus. Sambuca porro, ab autore uide-
tur appellata: cui nomen Sambyx fuerit. Vtam tamen ea primam omnium Sibyllā perhibent.
Arbor utiq; ipsa non Sambucus, sed Sabucus dicenda est; si Serenio Quinro credimus.

Pli. li. 16. ca. 19
26. 40.
lib. 14. cap. 5.

De Ebulo. CAP. CLXXXV.

ALTERVM genus Chamæactæ uocatur, alijs Helio-
factæ, alijs Agria actæ, alijs Euboica, Romanis Ebulum, Gallis
Ducone, Dacis Oliua. Ebulum longe humilius est, magisq; hærbaceo
generi assignandum, caule quadrangulo, geniculato, folijs Amygdalæ,
ex interuallo longioribus, geniculatim distributis in uersus, graueolen-
tibus, in ambitu serratis, muscario Sabuci flore, & acino eiusdem. Radi-
ce nitē lōga, crassitudine digitali. Eadē utriusq; uis & usus, refrigerās, et
exiccans, aluo detrahens aquam, stomacho inutilis. Folia, olerum mo-
re coquuntur ad pituitam bilemq; detrahendam. Caulēs teneri in pas-
tinis cocti, eadem efficiunt. Radix in uino decocta & in cibis data, hy-
dropicos adiuuat. Prodest uiperarum moribus, eodem pota modo.
Vulvas emollit infidentium decocto. Laxat earum spiracula, & uitia
corrigit. Acini in uino potj eodem funguntur munere. Denigrant ca-
pillis illiti. Folia si prætenera ac mollia ex polenta illinantur, inflam-
mationem mitigant. Ambustis, & canis moribus illitu profunt. Vlce-
ra quæ dehiscunt in fistulam, agglutinant. Iis qui podagra tentatur, cu-

χαμαίαντη

Aa iij

D I O S C O R I D I S

C seuo hircino profunt illita folia.

Pli. li. 25. ca. 10
lib. 26. cap. 3.

BARBARI COROLL.

EBuli, siue Chamæactes, hoc est, Sabuci pumilæ foliorum decocto, mulsæ necantur. nam & colibuli macerantur aqua, ut ea sparsa culices abigantur. Baccas, flores uel Ebuli, aut Sabuci uidetur intellexisse Plautus cum dixit in Captiuis, Laridum, Atq; Ehebular foveri focolis feruentibus. Nisi quis herbulas in eo uersu lectitare malit: aut qd' propius est uero, epulas. Ouidius, Epulisq; foci miscere calentes.

Aut hanc, aut ualde similem esse puto, quam Plinius Actæan uocauit uigesimo septimo uolumine. Actæa inquit, graui foliorum odore, caulibus Anisi geniculatis, semine nigro ut Hederae baccis mollibus. Nascitur in opacis, & asperis, & aquosis, datur acetabulo pleno, interioribus sceminarum morbis. Pro eo quod Dioscorides in caulibus umbellæ, & capitula Chamæacten habere scribit, Plinius caules Anisi reddit ei: quancq; non caulibus Anisi, sed asperis in plerisque legitur codicibus. Sed exemplaria quædam uetusta legunt Anisi, non asperis.

πυκνόκομον

De Pycnocomo. CAP. CLXXXVI.

PYCNOCOMON constat Erucæ folijs, acrioribus, scabris, & crassis, caule quadrangulo, flore Ocimi, semine Marrubij, radice nigra, rotunda, lutei coloris, exigui Mali figura, terram redolente. Inuenitur in saxosis locis. Semen graui somnia & tumultuosa facit, drachmæ instar potum. Tumores discutit, illitum cum polenta. Spicula, adactosq; corpori aculeos extrahit. Folia illitu tubercula, panosq; discutunt. Radix eius in aqua mulsæ duum drachmarum pondere, aluum et bilem extrahit.

Pli. li. 26. ca. 3.

BARBARI COROLL.

EX M. VERG. COMM.

Sunt Plinio, & scriptori huic nostro de Pycnocomo omnia eadem: tantumq; non hîsdẽ uerbis cuncta latinus scriptor ex græco genti suæ reddidit. Locus est. 26. uoluminis. 3. capite. A foliorum confecta densitate nomen illi fecerunt græci. Neq; enim aliud Pycnocomon indicat, q̃ quod densa & confecta coma est. Herbarum autem comæ folia sunt, quæ hic a Plinio relicta aspera constituit. Ille enim crassiora tantum & actiora q̃ Erucæ sint dixit. Non indicauit etiam Plinius, quale semen Pycnocomi sit: non dico autem quale uiribus, sed figura & specie. Dedyderauimusq; nos id magnopere, hoc agentes, ut uariam in græcis lectionem teste & autore eotutius eligeremus. Sunt enim in quibus Marrubij, in quibus Porri seminibus comparetur Pycnocomi semen, una id discrimen faciente litera. Ceteri interpretes communem secuti lectionẽ, Marrubio simile fecerunt: nos probatiorẽ & uetustiorẽ græcos, & quẽ habemus egregiæ antiquitatis latinum Dioscoridem secuti, Porro comparauimus: uolumus tamen incertæ nobis rei fidem penes naturam esse. Discrepant in radice colore Plinius & Dioscorides, ille lutei coloris tantum; hic nigrum primum, mox λεπν, id est, pallidam, quod idem luteo colori est, descripsit. Suspiciari multa in uarietate hac licet: aut deesse Plinio, aut abundare huic nigrum colorem, aut foris nigram, intus uero lutei coloris intelligi oportere, Pliniumq; alterum colorem tantum indicasse: quod suspiciari ab re forte non fuerit. Nigram tantum tradit quem antiquissimũ habemus latinus Diosco. Quotquot autem græcos uidimus, omnes nigrum & luteum colorem illi assignat. Eamq; ob causam inclinatur animus nobis, ut credamus diuersos colores illos, ad diuersas referri oportere partes. Legentibus tamen hoc liberum sit, donec, ut in semine paulo ante diximus, natura & res cognita, tam multas difficultates extricauerint. Animaduertendum illud etiam in uiribus & potestate radice, dicere Plinium exinanire eam aluum, bilem, & pituitiam: hunc autem & reliquos græcorum medicos, bilem tantum: & inter eos præsertim Paulũ Aeginetam, qui Pycnocomi radicem, semen, & folia discutiendi & extrahendi uim habere ait: & semẽ, quia ualidius sit, infixæ corpori etiam extrahere. πικρὰ δὲ γὰρ ὅτις ὕπαι καθαρὰν. Quod est, Radicem uero flauam purgare bilem. Id Barbarus extenuare dixit, non satis apto ad eam uim uerbo, ut nouisse omnes facile possunt.

A De Apio, seu Radice syluestri. CAP. CLXXXVII. **A**
 Apion nonnulli Ischiada, alij Camabalanam agriam, alij Linozo
 stin, Latini Radicem syluestrem, Pœni Thorphathsadæ appella-
 lant. Iuncos duos, siue tres spargit, rubros, tenues. Qui a terra parum at-
 tolluntur. Folijs Rutæ, oblongioribus tamen, & angustioribus, hæba-
 ceis, semine paruo, radice Hastulæ regię, in formam Pyri turbinata, succi
 fœcūda. Intus habet succum candidum. Extra, corticēs nigros. Superior
 pars eius uomitione bilem pituitasq; extrahit. Inferior per aluum, Tota
 utrinq; purgationes mouet. Succum si libet eximere, tusa radix in fictili
 mergitur, & agitata aqua quod supernatat pinna selectū, exiccatur. Pur-
 gat utraq; parte is succus sesquiobolo potus.

D E B A R B A R I C O R O L L.
 DE Apio herba, cognomento Ischas, quæ Raphani syluestris genus est, uolumine secun-
 do locuti sumus. Vbi omnia hæc ad uerbū fere uidentur esse repetita. Plinius, Oposcillam uo-
 cauit (ut arbitror) corrupte, pro Apios Ischas.

H E X M. V E R G. C O M M.
 Hæc est Apios illa solo nomine, sed ab imperitis facta, notissima cunctis Raphano con-
 gener existimata. De qua longius secundo uolumine in Rhaphano egimus: polliciti sumus,
 iterum hoc loco de ea dicendum nobis esse: haud sane quia superfuert tunc aliqua, quibus
 nunc dictis secemenda hæc ab illa esset, sed q̄ inuenienda hoc loco, ueluti ex aliena possessione,
 ob eas quas tunc longius percurrimus causas, efficienda ex illo erat, tractandaq; cum cæteris,
 quæ efficaciorē in purgando uim habent. Quales multæ descriptæ hoc libro hætenus, & de
 scribendæ adhuc plantæ sunt, syluestres omnes, montibus & incultis locis nascētes: non qua-
 lis satia in hortis, aut syluestris in campis Rhaphanus nascitur: quæ nihil huic simile æquale-
 ue, aut idem habet, non ramulos, non folia, non semen, nec radicem etiā. Siquidem in Rha-
 phanis longiores, in Apio hac rotundiores & pyri similes radices sunt. Quinetiam præter to-
 tam speciem obstat color, qui in nulla Rhaphano foris, ut in Apio hac niger conspicitur. Sunt
 aliæ plures etiā diuersitatis notæ, quas breuitati consulentes expendendas legentibus relin-
 quimus. Apion a radicis forma Græci herbā appellauerūt. Est autē græcis Apion in pomorū ge-
 nere Pyrum. Et quoniam pyri forma radix eius sit, contractior tamen rotundiorq; ideo nomen
 hoc illi ea gens fecit. Antiquum sane, & quō scribente Theophrasto plantarū historiam, Græ-
 cia passim utebatur. Neq; hoc tantum, uerum eo etiā quod secundo loco in hoc scriptore illi
 adijcitur. Verba eius nono de plantarum historia uolumine hæc sunt. τὸ δὲ τῆς ἀντὶς ῥίζης τὰ
 ἄνω ἂν τὰ δὲ κάτω καθάριον θανασιώτερον διὲν τῆς τι θαλάσσης καὶ τῆς ἰχθύος, οὐδ' ἄπὸν καλοῦσι. Quod
 est. Purgare autē in eadem radice alias partes per superna, alias per inferna, magis mirabile: qua-
 les Thapsiæ sunt & Ischiadis, quā Apion aliqui appellant. Testis, ut uidetur, utriusq; appella-
 tionis Theophrastus est. Vtq; alterius appellatiōis Apij, scilicet manifesta est ex forma radicis
 ratio, sic ignota nobis alterius: nec quā ob causam a coxendice, coxendicisue dolore, nisi hoc
 loco Ischias aliud significet, nōmē id inuenerit ratio cinari licet. Est quidem omnibus in prom-
 ptu, facillimūq; ratio cinari, quia purget, & purgando dolores coxendicis leuet, sic forte appel-
 lata fuisse: sed nimis cōmune id est: neq; hic, aut Theophrastus quicq; pro coxēdicis dolore pa-
 lam illi tribuerūt. Quo fit, ut nos & si in cōmuni græcorū omniū lectione nihil mutare ausi sim-
 us, credamus non Ischiada, quæ uox coxendicem & eius dolores, sed Ischada, quæ Caricam
 significat, non absurde penitus existimasse quosdam dici Apion hanc oportere. Similis enim,
 & turbinata figura non aliter q̄ Pyrum Carica est. In Theophrasto quidem Ischas passim legi-
 tur, non Ischias. Quō fit, ne demstremur, qui in eo Caricam uerterunt. Quemadmodum
 non constituimus, scriptoris huius codicibus magis, quā Theophrasti credendum esse:
 Plinius nec Pyro, nec Caricæ radicem eius comparauit, sed Cepæ: ampliorem tamen q̄ Cepa
 sit, eam describens. Legitur paulo post in scriptorē hoc, Chamēbalanōn dici etiā Apion hanc.
 Ea uox terrestrem significat glādem, quasi latentem & obrutam terra glādis forma radicem:
 oportetq; non glādis simpliciter intelligere, sed ut Græci Balanorū cōmuni appellatione loa

D I O S C O R I D I S

Ciores fructus indicant. Cur deinde agrestis, aut montana Raphanus dicta eadem fuerit, satis secundo volumine in Raphano, & hoc loco dictum a nobis est. Radicem eius, ut fere in cunctis graecis legitur, Spondylion herbæ hic comparauit. Respondetq; id naturæ, quoniā & hæc, & Spondylion tertio volumine tractata, Raphani radice describitur: oportetq; inuicem similia esse, quæ alteri pariter similia sunt. Vidimus tamen nos, in quibus non radix Spondylion similis legitur, sed Asphodelo, & his quidem probatissimis, & antiquæ fidei, quod ab re penitus non est. Siquidem Asphodeli bulbosæ radices illæ, non penitus dissimilē huic speciem habent. Secuti tamen communem lectionem & nos sumus, ob eam præsertim causam, q̃ hic in Spondylion radicem eius Raphano comparauit: & hæc ob eandem causam syluestris, & montana Raphanus a multis credita & dicta est.

κολοκύνθη

C De Colocynthide. CAP. CLXXXVIII.
Colocynthis aliquibus Colocyntha ægos, alijs Sicya picra, alijs Alexadrina Colocyntha, Zoroastri Tymbra, Ostani Autogenes, Romanis Cucurbita syluatica, Dacis Tustrata dicitur. Sarmenta foliaq; satiuæ Cucurbitæ emittit, per terram repentiā, diuisa: fructum in speciem mediocris pilæ conglomeratū, uehementer amarum, quem legere oportet, cum ceperit in luteum colorem permutari. Medulla fructus purgatoriam uim habet, si quatuor oboli melle cocto Myrrha & Nitro excipiantur, & cogantur in catapotium. Arefactæ pilæ teruntur; & infusæ clysteribus profunt, neruorum resolutioni, coxendicum doloribus, & coli uitij, ut quæ bilem, pituitam & strimenta, interdum etiam cruorem eliciant. Fæctus admotæ enecant. Dentium dolorem tollunt, si una repurgentur, & luto oblita cum aceto & nitro inferuescat, hocq; iure decocti dentes colluantur. Si aqua mulsa, aut passum incoquatur, & sub diuo refrigescat, potu crassum humorem & strigmēta alui detrahet. Stomacho supra modum aduersatur. Subdita ex ea balanō, alui excrementa eiiciuntur. Vis renti succo utilissime ischiadici perfricantur.

Pli. li. 20. ca. 3.

B A R B A R I C O R O L L.
Colocynthis, Cucurbita est syluestris, plena ipsa, nec inanis, ut Somphos, minor q̃ satiuæ. Primo herbacea, mox pallida, quæ & utilior est, quando eius sunt medicina. Hippocrates syluestrem Cucurbitā Sicyonem, & quæ fundo careat, & specie globosa & uniformi sit. Sicyan ἄτμυτον, hoc est, insectilem appellat: interiore uero partem eius, spongiam.

E X M. V E R G. C O M M.
Cucurbitulam Græcorū exēplo non male aliquis Colocynthida inter latinos dixisset. Cur enim, si licuit diminutō a Colocyntha, quæ illis Cucurbita est, nomine, syluestrem & amaram hanc Colocynthida dicere: nō liceat & nobis a latinorū Cucurbita, Cucurbitulā facere, æqualemq; illis æstimatione & uocis compositione, rei passim notæ appellationem ad medicinā afferre? Nos sane in eam partē trahebamur. Fuitq; diu nobis animus, Cucurbitulam huic capitūtiq; facere: sed reuocauit nos ab eo consilio, recepta iam pridem a medicis oibus, & officinis græca uox: multoq; magis, ne æqui uoca appellatione miscerentur simul planta hæc, & quas latini scriptores omnes ad aliū medicinæ usum transfulerunt, Cucurbitulas eas uocantes, quæ spiritus, & præcocitæ flammæ uī corporibus nostris impactæ in superiorē partem & extimā cutē sanguinē, & q̃ alia opus fuerint, trahūt. Eāq; ob cām seruata græca appellatiōe, de Colocynthide, q̃ syluestris Cucurbita est, caput inscripsimus. Alioq; Colocynthidis parua Cucurbita est. Fecerūtq; eā Cucurbitis alijs congenerē Viticulæ folia & fructus: ideoq; tā multas ab eadē Cucurbita appellationes alias inuenit. Credimusq; nos, qd in Diosco. legitur, ὅτι δὲ καὶ λουάνθη ἀγρὸς, quæ uoces nihil significāt aliud q̃ capræ Cucurbitam, & a cunctis ex eo caprina Cucurbita reddita est, potuisse q̃ndā legi ὅτι δὲ καὶ κολοκύνθη ἀγρὸς, qd est, syluestris Cucurbita. Nolumus nūc querere, uescant ne ea capræ, an nō: amaritudinēq; eius in cibo sentiat: & an qd ho-

mini nocet, possit alijs animalibus nō nocere. Quotidianum enim id est. Fitq; pāssim quod Lucretius cecinit, ut non sit idem nobis & brutis multarū rerum sensus. Quippe uidere licet, pinguescere sēpe Cicuta barbigeras pecudes, homini quæ est acre uenenum. Verum quod suspicari hoc nos coegit, plantę genus est, quæ ab omnibus in syluestriū censu numeratur: omnesq; Colocynthida describentes, syluestrem Cucurbitam uocant. Et omniū maxime Plinius lib. 20. capite. 3. Quod a scriptore sioc relinquendū fuisse uerisimile non est. Monere id uoluimus, & si non multifaciendum forte aliquibus uideatur. Fecit amaritudo, quę Colocynthidi maxima est, & omnibus tam manifesta, ut qui plantam, & rem ignorat, solo Colocynthidis audito nomine, amaritudinem intelligant, ut amara Cucurbita a quibusdam etiam diceretur. Quemadmodum quoniā copiosa in Aegypto nascitur, cuius rei testes etiam sacre hebræorum literę sunt, Alexandrina Cucurbita. Et hæc pro Colocynthidis appellatiōibus dicta hætenus sint.

¶ De Epithymo. CAP. CLXXXIX.

Epithymum Romani Inuolucruū uocant. Flos est e Thymo du-
riore, Satureię similis. Capitula habet tenuia & leuia, & in eis fi-
bras, quasi capillamenta. Potum cum melle detrahit pituitam, bilemque
atram per inferna. Priuatim prodest melancholicis, & inflatis, acetabu-
li mensura, ad quattuor drachmas, cum melle, sale & aceti exiguo. Plu-
rimum in Cappadocia & Pamphylia gignitur.

BARBARI COROLL.

Epithymum, flos est Thymi, sed non omnis. Differentia, q; hic herbaceus, alterius Thymi
candidus. Aliqui eum Hippopheon uocant. Quidam aliter Epithymum tradunt, sine radice
nasci tenui, similitudine Pallioli rubens.

ἐπίθυμον

Pli. li. 26. ca. 9.
li. 21. ca. 10.

EX M. VERG. COMM.

Quod in Italia nascens nostre ætatis herbarij Epithymon ostendunt, id nobis uidet quod
Plinius. 26. uolumine capite. 8. de Epithymo agens aliter ab illo & his uerbis descri-
psit. Quidam aliter Epithymū tradū, sine radice nasci, tenui, similitudine Pallioli rubens. &c.
Tenuissimis quasi capillamentis in glomerem conuolutis, & his rubentibus Epithymon hoc
uidetur: Floribus minimis, candidisq; Thymo similibus: nullis uirile ait radicibus: eaq; for-
ma, ut lanæ, stuppæ glomerem uidere te credas. Quam ob causam, non male crediderit ali-
quis, potuisse hoc genus a posterioribus Inuolucrum dici. Quod enim ab hoc describitur, &
copiosum in Cappadocia & Pamphylia nasci traditur: diuersum, ut ex historia eius patet, et ali-
ud a nostrate hoc est: simile tamen, aut coniunctum Thymo aliquid habere nomen indicat
aut alterum forte Thymi genus esse a Theophrasto & Plinio descriptum, nigro colore: quod
tertio uolumine inter appellationes Thymi numeratum ab hoc scriptore est. Theophrastus
quidem palam id docet quinto de plantarum historia dicens, καὶ ὁμοῦν τὸ μὲν λευκόν, τὸ δὲ μέλαν.
Quod est, Et Thymon candidum alterum, alterum nigrum. Et Plinius. 21. capite. 10. Tori-
dem & Thymi species, candidum, ac nigricans. Neq; hic aliud indicat, dicens Epithymum
Thymi esse florem durioris & Thymbre similis, quasi alterum sit Thymi genus, mollius, nec
Thymbre simile. Quocunq; autem modo se habet, si non alterum Thymi genus sit, coniun-
ctum Thymo aliquid esse oportet. Id em ea uox significat, quod in Thymo est scilicet. Et Pau-
lus Aegineta lib. 6. de eo agens, ait in tertio ordine siccare, calefacereq; Epithymum, & Thy-
mo efficacius esse. Quod ductu & conceptu uocum quod diximus ratiocinari facile est. Nihil
autem in eam partem magis nos trahit, q; nominis ratio, qua ut diximus, quod in Thymo sit,
nascaturue, intelligi oportet. Vtut eo idem Paulus, ut hic ait, in melancholicorum purgatio-
ne: nec minus etiam in ducenda simpliciter aluo. In quem usum bibi in uino iubet.

B

¶ De Alypo.

CAP. CXC.

Alypon surculosa herba est, subrubra, latis ramulis, tenuibus fo-
lijs, flore molli, copioso, radice Betæ, tenui, referta acri succo, se-
mine Epithymi. Gignitur in maritimis. Hac pleraq; Libyæ loca sca-
tent. Semen atram bilem deiecit, si mensura Epithymo pari cum sale
& aceto sumatur. Verum interanea leniter exulcerat.

ἀλῦπον

D I O S C O R I D I S

C A P. B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 27. ca. 4.

Alypon, & Alypea, & ut Paulo placet, Alypias, cauliculus est molli capite, non absimilis Betæ: ut inquit Plinius, acre gustatu ac lentum, mordensque uehementer & accendens. Caput, id est, radicem eius, Betæ similem intelligo, non folia: quippe quæ minuta ei sint: ut Dioscorides affirmat. Deprauatæ in Plinij uigesimo septimo libro Aliphon, pro Alypo legebatur, antequam ipsi locum indicarem.

E X M. V E R G. C O M M.

Semel tantum, & id etiam breuissime Alypi. 27. uolumine capite. 4. meminit Plinius. Nihil etiam Paulus Aegineta dictis decretisque scriptoris huius addidit. Vtinamque omnes non multo breuius & incertius, quam hic de eo tradidissent. Verba enim Plinij sunt. Alypon cauliculus est, molli capite, non dissimilis betæ: acre gustu, ac lentum: mordensque uehementer & accendens. Aluum soluit in aqua multa, addito sale modico. Minima portio duarum drachmarum, media quatuor, maxima sex, ea purgatione quibus datur e gallinaceo. Horum nihil, aut unum, alterumue in Dioscoridis legitur: cætera aut ab alijs accepta, aut aliter cognita Plinio fuerunt. Paulus Aegineta hisdem uerbis Dioscoridis subscripsit, Alypi dicens semen per inferna nigra purgare bilem, pari Epithymo mensura sumptum, additis aceto & sale. Veruntamen leuiter intestina exulcerare. Quæ tota est in scriptore hoc Alypi medicina. Qui deprehendisse nostra ætate Alypon se credunt, furculosam, ut hic ait, herbam: sed non ultra duos, tresue furculos in ea ostendunt: in quibus per interualla bina sunt folia rubentia, & in summo lutei floris umbella. Quæ posset Alypon credi, nisi radix quæ in scriptore hoc gracilis & quantitate betæ traditur, in ea longe crassior inueniretur. Potuicilli a ui sua nomen fieri: & quoniam nigram bilem purget, qua purgata animi tristitia in melancholicis pellitur, eaque pulsa adest statim lætitia humani animi naturalis habitus, sic dici. Est enim græcis Alypon, quod tristitia, doloreque caret, aut liberat.

De Empetro, seu Calcifraga. C A P. CXCI.

Εμπετρον

D

EM PETRON aliqui Phacoides uocant. Nascitur in montibus & maritimis, falso gustu. Sed quo propius terreno fuerit, amarior sentitur. Trahit bilem, pituitam, & aquam, si bibatur in iure aliquo, aut hydromelite.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 27. ca. 9.

Empetron hoc Phacoides a Dioscoride, Prasoides a Galeno & Paulo cognominatur. Fere in saxo nascitur. Recenti uires sunt, uetustate perdit eas. Lapillos qui sufferuere, una rumpi affirmat, quod & in Saxifraga quoque diximus ex Plinij sententia, ut qui nihil differre ab ea iudicaret: quandoquidem medicinas, quas seorsum in utraque mentione Dioscorides enumerat, ipse uniuersas Empetro huic assignat. Aut igitur ita sentiendum est: aut Plinium errasse confitendum. Paulus certe Dioscoridem secutus, mentiones duas habet, quasi duorum generum. Galenus unicum, Empetron Actius etiam Epipetron, uocari solitum affirmat.

E X M. V E R G. C O M M.

Nasci in petris Empetron satis indicat nomen. Epipetron eadem significatione ex antiquioribus aliqui etiam uocauerunt. Nec solū, quia Lentis figurā & spem refert Phacoides, sed Martubio similē Prasoides etiam. Plinius Saxifragā a latinis uocari ait: miscetque cum ea quæ priuatim & seorsum a Dioscoride Saxifraga hoc ipso uolumine descripta est. Ex quo iterū suspicari cogimur, quod in Saxifraga dictum hoc ipso uolumine a nobis est, non esse illud in hoc scriptore eo nomine recipiendum: aut si sit, quod uerisimile tamē non est, uariantibus historia & medicina, bis de eadem actum fuisse non multo ante sub titulo Saxifragæ: quæ latina, & iterū nunc sub Empetri, quæ tota græca uox est. Paulus quidem Aegineta, qui totum in. 6. suæ medicinæ Dioscoridem multa breuitate exscripsisse uidetur, Empetri manifeste meminit: Saxifragæ autem nusquam: quod non relinquendum ab eo fuerat, si tunc in Dioscoride Saxifraga legeretur, aut ipse pro diuersa eam recepisset. Crederemus nos, etiam eadem Saxifragam & Empetron esse, nisi diuersa penitus utriusque historia & medicina esset. Ob eam causam peritioribus hoc relinquimus, certius de Saxifraga inuenturis, quod recipiendum, constituendumque sit.

De Clematide. CAP. CXCI.

Clematidem aliqui Epigerin, Aegyptij Philacum, Romani Ambuxum nominant. Viticulis constat subrubris, folio uehementer acri gustu, & exulcerante. Vicinis inuoluitur arboribus ut Smilax, Tritum senien, & ex aqua, aut hydromelite potū, bilem pituitamq; detrahit. Illita folia lepras eximunt. Cum lepidio conditur ad esum.

De Labrusca. CAP. CXCI.

Labrusca sarmenta Vitis modo praelonga emittit, aspera, lignosa, rimoso cortice, folijs hortensij Solani, longioribus ac latioribus, muscoso flore, & capillaceo, fructu exiguis uuis simili, post maturitatē rubente. Rotunda est acinorum facies. Feruefacta radix in aqua, & in cyathis duobus uini aqua marina diluti pota, humorem alui ciet. Ideo hydropicis datur. Vuæ eius, uitia cutis in facie, & maculas omnes expurgant. Enascentes ramuli cibi gratia condiuntur.

BARBARI COROLL.

Ampelos agria, hoc est, Vitis syluestris, cæditur horis omnibus, sed præcipue autumno. Ra dice acri, ut Theophrastus scribit, folio spisso, candicante, geniculata, rimoso cortice, uuis rubentibus Cocci modo, ut Plinius. 23. uolumine. Hæc & pro Amuleto, cuius sit propria uua Taminia. Radix & acini, coria perficiunt, gelidissimaq; eorum est natura. Ut errauerit Theodorus, qui uerba illa in Theophrasto φιλοῖσι τῷ καρπῷ τὰ δέρματα interpretus ita sit, Fructu defoliant arbores: cum legere debuerit, non dendra, hoc est, arbores, sed derma, hoc est, corium: nec de foliant, sed depiant & subigunt. Pars acinorum æstu moritur, priusq; reliqua: qui & folstitiales dicuntur. Vniuersi nunq; māturescunt: & si prius q̃ tota uua maturescat, detur cibo. Generi gallinaceo fastidium gignit uuas appetendi. Flos huius in racemis candidus pendet Solani per initia, post diuiditur in uitis fere imaginem, sed oblongam. Est ei similis, sed in salictis nascens, ad eisdem usus quæ Salicastrum uocatur, contra hominum & quadrupedū scabiem. Plinius. 27. ita descripsit. Folio duro, cineracei coloris, uiticulis callofis, rubentibus qualiter flos quem Iouis flammam appellamus in Violis, ferens semen punici mali simi se in acinis, ad eisdem effectus. Propterea recentioribus fuisse, qui hanc & flammulam, & Iouis quoq; flammam uocarunt. Est & Labrusca uitis syluestris una species, Oenanthen ferens, duorum generum, albi & nigri, ut Dioscorides post docebit: Neu quemq; decipiat Pliniana lectio, Labrusca inquit Oenanthen fert satis dictam, quæ a Græcis Ampelos agria appellatur, spissis & candicantibus folijs, geniculata, rimoso cortice, fert uuas rubentes, cocci modo, & reliqua. His uerbis Plinius. 23. uolumine duos frutices, non unum designat, Labruscam, & quæ Ampelos agria uocatur.

EX M. VERG. COMM.

Non est syluestris hæc Vitis quam Romani Labruscam dixerunt. Illa enim sola confitionis priuatione à reliquo uitium genere differt: hæc uiticularū, & racemosi fructus, quæ fert, similitudine inter Vites numeratur. Eamq; ob causam, duobus locis ab hoc scriptore, hoc scilicet, & a quinti uoluminis principio statim de syluestri Vite agitur. Hæc inter herbas, illa inter Vites: hæc folio hortensij Solani describitur, illa uirgineo folio intelligēda est. Et nihilominus, quod raro in ea gente fit, utriusq; idem nomen auditur: & utraq; Ampelos agria uocatur. Fuitq; hæc Plinio causa, nominum magis aliquando q̃ rerum rationē sequenti: ut bis diuersis locis de eadem syluestri hac Vite importune ageret. Primum. 23. uolumine capite. 2. inter Vites. Mox iterum. 27. capite. 7. inter herbas. Poterunt uolentes certius in eo quod dicimus cognoscere: legentesq; palam deprehendere, paulo minus q̃ totam duobus locis eiusdem plantæ historiam & medicinam esse. Quæ enim folia. 23. uolumine candicantia ab eo dicuntur. 27. deinde cineracei coloris uocantur: nullo discrimine inter candicans, & quod cineracei coloris sit. Quodq; priore illo loco in medicina decernitur, Radix decocta in aqua, & in uini Cōi cyathis duobus, humorem alui ciet, ideo hydropicis datur: in posteriore pariter docetur, Radix eius decocta in aquæ cyathis ternis, additis uini Cōi cyathis duobus, aluum soluit leniter: &

A

κλῆματτις

ἀμπέλος ἀγρία

Pli. li. 23. ca. 2
lib. 27. ca. 7.

B

D I O S C O R I D I S

C deo hydropicis datur. Quæ ex multis monstrasse satis fit: ne dubitent qui in Pliniana lectio-
ne occupantur, quales in eo sylvestres duæ Vites sint. Vna tamen tantum est, & inutiliter uerū
ab eo repetita, neq; apte inter Vites tractata: quoniam herba sit, & in herbarum censu seruan-
da fuerit. Nominis ut diximus ratio magis, q̃ rei misceri in eo hæc fecit. Theophrastus. 9. de
plantarum historia breuiter, & his uerbis de radice agrestis Vitis egit. *θεραντικὸν δὲ καὶ διρμὸ καὶ
τὸ ἀμπέλου τὸ ἀγρίον ἢ βίβα, διὸ καὶ ἡ φήσιν χρῆσιν καὶ ἰσχυρίαν ἀπέρειν. τὸ δὲ κερπὶ φέρεται
τὰ διρμὰτα, τρέφεται δὲ πᾶσαν ὥραν ὁ πόρος δὲ μέλινα.* Quod est. Calefacit, acrisq; est, & sylvestris
Vitis radix. Eamq; ob causam depilando est, & cutis aspredines exte-rit. Fructu depilantur co-
ria. Ceditur quocunq; tempore, sed autūno præcipue. Dictum a nobis hoc etiā est, quoniā &
a Theophrasto inter herbas Peucedanū, Daucum, Dracunculūq; non inter arbores sylvestris
hæc Vitis numeratur: multoq; magis ob diuersitatē remedij ex ea contra cutis asperitates: qd
hic in fructu & acinis, Theophrastus in radice cōstituit. Videndū tamē, an sylvestris hæc Theo-
phrastū Vitis ea sit, de qua nunc agimus: an quæ statim ab hac tractanda erit: ex quo depilare
fructū eius dicit: quod a Dioscoride albæ Viti, quæ nrox dicitur, tribuitur. Sit ergo inter her-
bas sylvestris Vitis, inter arbores autem Labrusca, suisq; notis utraq; quærēibus se ostendat:
illa, ut passim omnes nouerūt: hæc, ut a Dioscoride & alijs traditur, satui Solani folio a prin-
cipio, paulatim deinde in uirginei figuram transeunte: uiticulis longis, & quales in Vite sunt
lignosis, asperis, rimosi corticis, acinis paruis, rotundis, in maturitate rubescētibus: quibus ob
seruatis notis, non erit difficile inter fruteta eam, et in sepibus inuenire. Et si non adeo frequens
nascatur. Nos qualem hic descripsit aliquando uidimus.

ἀμπέλος λευκή

V I T E M A L B A . C A P . C X I I I .

V I T E M A L B A M. aliqui Bryoniam, alij Ophiocephalon,
alij Chelidonium, aut Melothron, aut Psilothron, aut Arche-
zostin, aut Agrostin, aut Cedrostin appellant. Folijs sarmentis, pam-
pinisq; satiuam Vitem imitatur, sed hirsutiora sunt omnia. Ea quos
D prope se nacta sit frutices, suis clauiculis complectitur. Fructus rubens
in uua dependet, quo coria pilis spoliantur. Ex ea asparagi, qui pri-
ma germinatione exeunt, decocti in cibo, aluum & urinam cient. Fo-
lia, fructus, radix, acrem uim sortiuntur. Itaq; ulcerum phagedænis,
gangrænis, chironijs, putrentium tibiærum tedio, efficaciter ex sale illi-
nuntur. Radix corpus abstergit, & cutem erugat. Vitia cutis in facie,
uarosq; lentigines, & cicatrices nigras emendat, cum eruo, creta chia,
& scenograceo. Eodem effectū prodest decocta in oleo, usquedum li-
quescat. Sugillata tollit. Reduuias committit. Inflammationes discu-
tit illita ex uino. Suppurationes rumpit. Medicamento apte immisce-
tur, quod carnem exest. Infracta ossa extrahit, trita & imposita. Da-
tur comitialibus in potu, drachmæ pondere cotidie anno toto. Prodest
attonitis & uertigine laborantibus, consimiliter assumpta. Contra ui-
perarum ictus pota drachmis duabus auxiliatur. Partus necat. Mentem
interdum suburbat. Cit urinam pota. Eclegma ex ea fit cum melle, diffi-
cile spirantibus, strangulatu oppressis, tussientibus, uulsis, ruptis, & la-
terum doloribus. Lienem ternis obolis pota ex aceto triginta diebus con-
sumit. Illinit ad eadem cum fico. Ad muliebres infessus decoquit. Siqui-
dem uulvas purgat, sed abortū facit. Succus e radice uere exprimit, qui
trahit pituitā cū aqua mulsa potus. Ad psoras & lepras semē efficaciter illi-
nit. Lactis abundantia facit succus eius, si cū tritico decoctio forbeat.

BARBARI COROLL.

Ampelos leuce, hoc est, Vitis alba, quæ & Bryonia & Bryonias a Columella, & Madon ab aliquibus vocat, Echelos ab Hippocrate, Melothron (ut putat) a Theophrasto, in coronas folio admissa. Quidam Psilothrum dicunt: quia pelles confici huius acinis, quemadmodum & Labruscæ possint. Huius sarmenta, longis & exilibus internodijs geniculata scandunt. Folia pampinosa, ad magnitudinem Hederæ diuiduntur, ut Vitium. Radix alba, gradis, Raphano similis. Semen in uua, raris acinis dependet, succo rubente, postea crocino. Succus radices colligi debet ante maturitatem seminis.

A

Pli. li. 23. ca. 2.

EX M. VERG. COMM.

Quod poterat a legētibz in scriptoris huius Bryonia desiderari, quos scilicet natales habear, & quibus locis inuenienda sit, Columella Romanus scriptor in carmine suo expleuit dicens. Quæq; ruas audax imitatur Nyx uites, Nec metuit sentes: nam uepribus improba surgens Achradas, indomitasq; Bryonias alligat ulmos. Bacchi uicibus similem, & in sepibus spinas, & aculeatos frutices alligantem describens: quæ tota fere est candida in hoc scriptore Bryoniæ historia. Monuit illud obiter etiam Romanus ille auctor, consueuisse ueteres ob quotidianum & multiplicem eius ad uitæ remedia usum, syluestrem alioquin stirpem in hortis conferere: ne cogerentur incultis locis, & inter sepes quærere, quod non in morbis tantum utile esset, sed in sanitatis usu simplex, & sale seruatum etiam placeret. Quod hic primum indicat, dicens comedi e terra primum prodeunt Bryoniæ asparagos. Mox etiam in primo Paulus Aegineta de omnibus asparagis agens. Et inter latinos Columella lib. 13. capite. 7. multarum herbarum cum floribus & coliculis suis condituram docens. Quæ omnia a posterioribus neglecta, dubium nobis modo urriusq; Bryoniæ nomen & historiam faciunt. Cum tamen nihil ubiq; notius, & medicina etiā nostri temporis, barbaris uocibus in his utens, cognita re, Bryoniam non satis cognoscit. Laudauit magnopere Bryoniæ asparagos quo diximus loco Paulus Aegineta his uerbis. καὶ οἱ ἀπὸ τῆς βρυονίας ἀσπαραγοὶ ὑπόμαχοι μὲν καὶ διουρητικοὶ ἐλγὸν τροφοὶ δὲ πικρόθυνοι δὲ μέλλον τρέφουσι τὸν ἀπὸ τῶν λαχάνων. Egerat eo loco is scriptor de his, qui nunc priuatim asparagi dicuntur: mox ea subiecit. Et Bryoniæ asparagi stomacho quidem accommodati sunt, & urinam cient: parum tamen nutriunt: & si cum concoquantur, olerum asparagis in nutriendo efficaciores sunt. Quod totum ad sanitatis usum pertinet. Nam in medicina præter has aliæ ab eodem in sexto uires utriq; Bryoniæ assignantur. Omnes tamen ex hoc scriptore acceptæ, in quibus minus efficacem candida nigram, de qua mox dicitur, tradit. Nec aliud in remediōrū usu discrimē inter eas tradidit. Quibus autē notis & partibus inter se differant, facile erit ex scriptoris huius historia cognoscere: præsertimq; ex foliorum figura, & fructus colore. Sunt enim in alba satiuæ uiti similia folia, pilosiora tamen: in nigra hederæ, priuatimq; Smilaci: fructus in utraq; quidem acinosus, sed in candida πύρρος rufus scilicet, in nigra ante maturitatem uiridis, cum maturuit niger. Habet nigra etiā radices certas notas ab hoc scriptore traditas, quibus facillime discerni ab aliā possit. Non erit, ut diximus, difficile in sepibus, & inter fruteta quærentibus utramq; Bryoniam deprehendere: ubiq; enim nascuntur: & cum deprehenderit aliquis, si uoluerit antiquorum exemplo earū asparagis in sanitate uti poterit: sin minus, medicinæ seruare. Numerauit Plinius. 23. uolumine capite. 2. Bryoniæ albæ easdem huic scriptori appellationes Ophio-staphylem, Melothrum, Psilothrum, Archezostim, Cedrostim, & Nadon. Verum ultima hæc Dios. nulla est: nisi quæ in eo Chelidion legitur, Nadon legi debuerit: aut ediuerso legi in Plinio oporteat. Omnium huiusmodi nulla satis certa origo est: præterq; Psilothrum, quæ a depilandis corijs, quem usum habent acini eius, facta est. Ex quo potuit etiam & Melothron fieri. Siquidē græci μέλοθρα dixerunt βάμματα & καλλωπισματα, id est, colorum infectiones & concinnationes. Quod corijs forte ex Bryoniæ albæ fructu accederet. Sed in hoc scriptore per, ω, Melothron, in illis per, ο, scribitur. Potuit etiam Ophio-staphyle dici, quasi anguina uua. Id enim ea uox græcis indicat. In sepibus enim uirgineo folio, & acinoso fructu nascitur: in quibus & angues plerumq; latent: quasi crediderint aliqui, ut ex satius uitis uua homini debentur, sic anguibz natura illas eo loco seruauerit.

B

De Vite nigra.

CAP. CXC.

Nigra Vitis quam aliqui nigrā Bryoniam uocāt, alij Ghironion ampelon, alij Bucranion, Romani Oblameniam, alij Britanum, alij Betisalcam, Daci Priadelam, alij Pegrinam, Aphri Lauothen.

αμπέλος μέλαινα

Bb

D I O S C O R I D I S

C Folia fert Hedere, sed maiora, simlaccis, pxima, caules etiam cognatos. Capreolis suis arbores quasi adminicula cōprehēdit. Fructus racemati coherēt, qui inter principia uirēt, & post maturitatē nigrescunt. Radix foris nigra, intus buxco colore nitet. Caules qui primo germinū partu erumpunt, in olera recipiuntur. Menses pellunt. Vrinās cient. Lienem absumunt. Vertiginosis, comitialibus, neruorum resolutione tentatis profunt. Radix eadē quæ Vitis alba præstat, sed inefficacius. Folia cum uino exulceratis iumentorum ceruicibus commodissime illi nuntur. Luxatis itidem imponuntur.

BARBARI COROLL.

Ampelos melena, id est, Vitis nigra, quam proprie Bryoniam uocant, alij Gynecanthen, aut Aproniam, similem priori, præterq̃ colore, ut Plinius existimat. Sunt & in folio discrimina, ut Dioscorides, & ipsa quoq̃ res demonstrat. Huius semen nigrum, Asparago simile. In fructis, & arundinetis maxime nascitur. Aiunt, si quis in uilla eam extruxerit, fugere accipitres, tutaq̃ fieri aues uillaticas. Hanc etiam Tannum, siue Tamum quidam uocari putant: & uulgo Tamarum. **Q.** Columella, Lubrica iam Lapatos, iam Tami sponte utrescunt. Sunt qui Thamnum quoq̃ scribant, non Tamum, aut Tanum.

EX M. VERG. COMM.

R Arrior inuentu, ideoq̃ cognitu difficilior nigra q̃ alba Bryonia est: inuenta tamen, totam ueterum scriptorum historiam confirmat. Sunt illi per interualla cum folijs dispositi racemi: & qui non ultra octo, decemue acinos ostendunt: multo minore q̃ in punice magnitudine: & colore ante & post maturitatem quo ab hoc describuntur. Quos tamen hic caules uocat, nos potius uiticulas dixerimus: earum enim speciem magis q̃ caulium habent. Maturescunt acini eius extrema æstate: & ubi minus calet, umbrosiq̃ locis autumnis. Nascitur & hæc, ut in alba diximus, in sepibus, & inter fruteta, propinquas stirpes ascendens, & alligans. Minor hæc q̃ alba est, nec tam late ut illa uiticulas suas spargit. Pares utriusq̃ uires antiqui omnes esse tradiderunt: ideoq̃ sine discrimine uti alterutra iusserunt. Licetq̃ id in Paulo Aegineta cognoscere: qui contra nigras cicatrices, utriusq̃ ope his uerbis utitur. οὐλὰς μελαίνας αἴρει βρυονίας ῥίζην λευκὴν καὶ μελαίνην ἐφαθείσας ἐν ἰατρῷ ἀγριχολώσας τὸ ἰατρικὸν ἐπιτελεῖσθαι. Quod est. Nigras cicatrices delet Bryoniae radice alba & nigra in oleo decocta. &c. De eius appellationibus non est quod dicamus, præterq̃ Chironiam uitem uocari potuisse: aut q̃ Chiron medicina & herbarum in Thessalia peritissimus, ulceribus iumentorum & hominum ex ea primus remedium inuenierit: aut q̃ Chironijs ulceribus ea ueteres mederentur. Quod autem in scriptore hoc legitur, uua Taminiam dici a Romanis, falsum est. Alia enim a Bryonia Taminia uua est: quemadmodum Latini antiquiores omnes docuerunt.

De Filice CAP. CXCVI.

PTerin Græcorum alij Pterineon, alij Dacidonon, alij Anaspheon, alij Blechnon, alij Polyrhizon uocant. Magi Hermubain, Romani Filicam, alij Laculem, alij Filifanariam, Aegyptij Asini sanguinem. Folia sine caule, sine fructu, sine flore, ex uno pediculo, cubitali longitudine exeunt, multifida & lateribus pinnata, subgrauis odore, radice per summa cespitum nigra, oblonga, multis capillamentis fibrata, subadstringente gustu. Nascitur in montibus & saxosis. Radix latas tineas excutit, sumpta drachmis quatuor ex aqua mulsâ. Melius si cum Scamoniae, aut Veratri nigri totidem obolis detur. Sed qui sumunt, ætia prægustare debent. Laborantes lienis incremento recreat. Radix & potu & illitu prodest ijs qui arundinibus cæsi sunt. Probatum maxime,

quæ in arundinetis proueniat & locis Pulegio scatentibus.

BARBARI COROLL.

PTeris, hoc est, Filix, marcescit fimo infecto, & ob id pecoris incubitu: quod & in Medica herba nonnulli tradunt. Nullus Filici incisæ succus. Radici gustus est dulcis astringens. Vna hæc est, & ex ea Filices exeunt, bina etiam cubita excedentes longitudine, hanc mærem existimant. A Filicibus Filecta, ut a Caricibus Carecta dicimus. Est autem Carex e qua molliissimæ texuntur cathedræ. Folio fere arundinis, uliginoso, & palustri solo plurima. Seruius Caricem describit acutam, & durissimam, Sparto similem. A Filice Felicones dictos existimant; quos ueteres pro malis & inutilibus accipiebant. Dicebantur & Felicati calices a Filice.

EX M. VERG. COMM.

Inuisam Maro in Georgicis suis, contra in Buccolicis ἀπαλὴν, id est, mollem, & ex eo amabilem Theopritus Filicem, dari rerum omnium peritiâ poetæ duo dixerunt. Neuter tamen simpliciter, sed alter aratris & frumentario agro, alter pastoribus & pecori: eadem fortuna qua tota fere natura est, quæ benigna semper & utilis, quod alijs importune abstulit, aut in quo nocuit alijs liberaliter dedit & profuit. Sterilitatis, aut parû foecundi ad fruges agri, indicium Filix est: & præter id obliquis & longis radicibus terram amplexa, bubulcos & boues longioris laboris tedio arantes remoratur. Contra, in montibus, incultisq; locis nascens, grata pecori & pastoribus quæsitâ: his cubilia & tomenta per hyemē sicca præbens, illi utroq; tempore cibos. Inutilis homini & infelix, nisi eiusdem naturæ benignitatis malorum remedijs & medicinæ ipsa etiam se miscuisset: nataq; in nobis uentris animalia enecaret, & perimeret. Quod nō tantum hic docet, sed multo certius Theophrastus ad extremū nonum de plantarū historia uolumen. Cuius de Filicis potestate & ui uerba hæc sunt. ἡ δὲ τῆς πτίριδος ῥίζα μόνον τῷ χυλῷ γλυκύσφυρος ἐλμύνει δὲ πλατύνει ἐν βάλανι, σπέρμα δὲ οὐκ ἔχει οὐδὲ ὄπὸν. τίμνισθαι δὲ ὠραίαν μετοπώρων φασίν. Quod est. Radix uero Filicis sola, sapore dulci simul & acerbō est. Latos lumbricos pellit. Non semen, non liquorē habet. Ferunt tempestiuā autumnō secari. Pluribus in scriptore hoc appellationibus Filix indicatur: pluresq; earum ab alis auium, quarum speciem in ramulis disposita eius folia referunt, factæ a gentibus fuerunt. Pennatus enim & pennatis folijs frutex Filix est. Quæ quoniam numerosa & confercta in pilosis ramulis eius sunt, ideo etiam a quibusdam Dasylonos dicta est, δασύς enim hirsutum, pilosum, & asperum græcis significat. Quod deinde in eodē scriptore hoc passim, & in cunctis græcis legitur, uocari a quibusdam Filicē βλάχων, id est, ut nos uertimus, Blachnon, parum certam nobis habet rationem. Nec scimus, an ex Pulegio, quod βλάχωνα ueteres aliqui nominauerunt, ad Filicem male & importune deflexa appellatio ea fuerit. Siquidē nihil Pulegio & Filici simile, comuneue est. Nec legisse meminimus, gustatam pecori primū Filicem, quod Pulegio omnes tribuerunt. Balatū in toto grege excitare: ideoq; sic uocatam fuisse. Et nihilominus, ut paulo ante testati sumus, quotquot uidimus græcorum codices, Blachnon uocari Filicem indicant. Solus Nicander in Theriacis suis, nisi alia Filicis in eo ea uox sit, aut male in eo id legatur, aliter appellationem hanc protulit. Versiculus eius est. ἐν δὲ πολλὰς χιτῆας βλάχων περιβάλλει χάριτι. Blethrum ille, nō Blachnon Filicem in multa folia diuisam uocauit. Quiq; interpretatus est eum græcus scriptor, Blethrum ait Filicē dici, quæ etiam Blachnon nominetur. Ex quo si recipiendum sit hominis testimonium, colligere oportebit, utroq; modo & Blachnon, & Blethrū Filicem quondam dictam fuisse. Eamq; ob causam nos nihil mutantes, Blachnon uocari eam a quibusdam uertimus. Folia hic sine caule Filicem merito, & ex re uocauit. Sunt enim sibi folia non minuta illa, quæ numerosa & pene infinita totis ramulis disposita sunt, sed quæ uno pediculo cubitali, ut hic ait, longitudine a terra statim, aut ex stipite eius exeunt in plura & minora alia illa foliola diuisa. Nullos habet caules Filix. Si quid enim in ea supra terram extollitur, pediculi foliorum, non caulis ratio nem habet: quoniam negato illi semine, merito caulem natura etiam negauit. Propter semen enim plarumq; caulis est. Sterilem, & sine semine omnes Filicem dixerunt. Falsumq; est quod iactant aliqui, una solstitiali nocte florere Filicem: eademq; hora cum defloruit, maturum in terram semē cadere: ideoq; nisi aliquis tunc adfuerit, nec uideri florem, nec colligi semen posse. Quæ omnia Agyrtarum cōmenta sunt, humanæ ignorantix ad quæstum tam impudenter illudentium. Neq; hoc mendaciū genere contenti, ne quid fraudi corū & sceleri deesset, religionem etiam cōmentis suis addiderunt. Natali nocte eius, quo (ut sacræ Christianorū literæ testantur) inter natos mulierum maior alius non surrexit, cuncta illa fieri & obseruari præcipientes. Nec sentiunt, quo dierum numero natalis ea nox, & solstitialis illa nunc inter se distent.

Bb ij

A

Pli. li. 27. ca. 9.

B

✱

D I O S C O R I D I S

C Sterilis, ut rem nostram agamus, priuataq; semine Filix est. Quodq; a natura sibi ea non inuenit, homini etiam inuider. Siquidem quod in scriptore hoc non legitur, ueteres graecorum medici & herbarij, posse Filicem dixerunt uiuentes in utero animantium foetus enecare, et enecios pellere. Quod ab hac statim dicenda Thelypteridi a Dioscoride tribuitur. Cuius & Filicis pares paulominus q; omnino uires sunt.

θηλυπτερίς

¶ De Filice foemina. CAP. CXCVII.

Thelypterin, aliqui Nymphæam Pterin nominant, Romani Linguam ceruinam, folijs Filicis, furculosis & quæ non singulari ut illa pediculo fulciantur, radicibus longis, pluribus, latis, quæ ex nigro in luteum flauescunt. Aliquæ etiamnum rubræ inueniuntur. Pelunt lata interaneorum animalia, cum melle eclegmate sumpto. Potæ cum uino drachmis tribus teretes tineas efficiunt. Datæ foeminis sterilitatem faciunt, & prægnantibus abortum, si supergrediantur. Farina humidis ulceribus, & cicatrici repugnantibus inspargitur. lumentorū ceruicibus medetur. Folia recentia in oleribus cocta manduntur, ut uetrem emolliant.

BARBARI COROLL.

Thelypterin alterum Filicis genus, foeminam appellant. Folijs hæc brauior, mollior, densior, canaliculata. Vtriusq; radicibus suæ pinguescunt: quæ sunt eis longæ, obliquæ, nigrae, præcipue cum inaruer. Siccant eas sole, Virgilij occidentibus effolas. Nascuntur ubiq; sed maxime frigido solo. Vtriusq; lateribus pinnata; unde Græci nomen imposuere. His cimices necantur. Serpentem non recipiunt. Vfus radicis in trimatu tantum, nec ulla, nec citra, Laudant in utroq; sexu Macedonicam; deinde Cassiopeam.

EX M. VERG. COMM.

COpiosior, & pluribus locis Filix q; Thelypteris nascitur: ideoq; rusticæ & urbanae plebi notior: & quatenus homini inutilis planta, in minore honore est. Alioquin eosdē natales, easdēq; uires utraq; habet: specie etiam adeo similes, ut imperitos inuicem sæpe fallant. Quod autē maxime simile habent, pinnata folia sunt, eodem ordine & magnitudine in utraq; disposita. Quod contra discrepat inter eas, ramuli, & ramulorum color est: qui fruticosi in hac ab uno principio ex terra oriuntur, & quo colore radices hic esse ait, in nigro ruffo, & aliquando rubente uidentur. Discrepat & illud, qd Filix ubiq; fere nascitur, & contumax agricolæ repugnat, post confitos etiam agros regerminans: Hæc locis incultis, frigidis, umbrosis, & humentibus semper inuenitur. Quā ob causam Nymphæa Pteris, id est, Nymphæa Filix dicta est: qd nymphas. s. id est solitudines, nemora, & aquas amet. Foeminā Filicem græci eam nominauerunt, non sexus diuersitate aliqua, sed ut ea ratione qualia in plantis & medica materia pleraq; alia sunt, a priore illa discernere. Plinius, & graecorum herbarij alij, & medici simul, continuatq; historia de utraq; egerunt: hic tamen seorsum. Eumq; nos secuti, duobus capitibus, duas descripsimus plantas. Alioquin non male forsan coniunxisset eas aliquis: tanta inter eas similitudo, & tam commune genus, paresq; uires sunt. Legebantur in hoc capite contra qd oporteret duo. Alterum Barbarus ex Plinio emendauit, in radicum historia. s. in qua male in græcis legitur πλατῖαι, quæ uox latitudinem significat: cum tamen nulla sit radicibus his latitudo. Vnius literæ uirium & lapsus id fecit. πλατῖαι enim, id est, obliquæ, legi oportet. Plinius de his agens ait. Radices utriq; longæ in obliquum, nigrae, &c. Alterum ambo interpretes ex eodem Plinio emendari posse non animaduertuerunt. Est autem ad ultimum capite, quo loco hic ait, καὶ ἔχουσιν διαβῆναι, &c. quarum uocum sensus quidem est, ut illi crediderūt, Et si prægnans supergrediatur, &c. Verum non διαβῆναι, quod supergredi significat, sed λαβῆναι, quod est, sumat, legi oportebat. Sic qui uetustissimus & probatissimæ fidei apud nos est græcus Diosc. habet. Sic ratio etiam ostendit: & Plinius confirmat dicens, Neutra danda foeminis: quoniam grauidis abortum, cæteris sterilitatem facit. Plinio etiam antiquior Theophrastus lib. 9. de plantarum historia de Thelypteride hac his uerbis docuit. ἡ δὲ θηλυπτερίς χρησίμη πρὸς τὰς ἑλμινθας τὰς τι πλατῖας καὶ τὰς λεπτάς, πρὸς δὲ τὰς πλατῖας ἀκαθαρσίαν μίλητι. πρὸς δὲ τὰς λεπτάς ἐν οἷον γλυκὺ, καὶ ἀλφίτων ἀποδοῖν. γυναικὶ δὲ ἰὰν γαστρί, ἰὰν δὲ ἑλμῶνι ἐν βάλανι φασὶν ἰὰν δὲ μὴ, τὸ ὅλον ἄτην γίνεσθαι. Quorum sensus est. Vtilis autem contra

lumbricos uentris Thelypteris, & latos, & graciles. Contra latos quidem cum melle, cōtra grāciles autē in uino dulci cum polenta. Quinetiam si mulieri detur, pręgnanti quidem abortū, simpliciter autem fœminis sterilitatem facere dicitur. Et hęc Theophrastus eadē cunctis alijs. Oēs, ut uidet, cibo potuue Thelypteridis sterilesce fœminas, grauidas uero abortū facere affirmāt. Nullus autē, si grauida Filicem hanc suppegrediāt, fieri abortum testatur. Eamq; ob causam, totte stūi concordī fide & autoritate, aliter q̄ ceteri locum, & ut legitur intrepide uertimus.

De Filicula.

CAP. CXCVIII.

Polypodion aliqui Scolopendrion, alij Pterin, alij Polyrhizon, Latini Filiculam uocant. Nascitur in muscosis petris, & uetustis arborum caudicibus, pręsertim Quercuum, palmi altitudine, Filici si milis, subhirsuta, non tenui perinde diuisura. Radix pilosa, in qua continentur cirri, ceu poliporum, crassitudine digiti minimi, coloris intus hęrbacei, austeri aliquantum, & gustu subdulcis. Purgādi uim habet. Coquitur cum gallina, aut piscibus, aut Beta, aut Malua, ad aluum soluentendam. Aridę farina aquę mulsę insparsa, detrahīt bilem & pituitā. Trita luxatis efficaciter illinitur, & aduersus digitorum fissuras.

Polypodion, nostri, ut Theodorus putat, Filiculam appellant, in Plinio ita legens. Ego Filiculam dicendum arbitror, cum ex Dioscoride, tum ex Filicis similitudine: tum ex Catone, q̄ Filiculam uocauit, ad deiciendam aluum pręberi iubens eam. Eodem modo & Columella nominauit. Vnde uinum Polypodites quoq; ad eundem usum fit, pręcipuum in Phœnice oppido eius Byblo: ut inquit Aetius, Post imbres semper emicat hęc herba, floret, & semen non fert.

EX M. VERG. COMM.

Folia Romanis Filiculā, Gręcis pilosę cauernosęq; acetabulorum modo radices Polypodium fecerunt: exigua herbam, ideoq; diminuto nomine ab utraq; gente appellatam. Folia enim (quod hic Theophrastus, Plinius, latiniq; & gręci fere omnes testantur) Filici similia habet: radices autem pilosas, minimi digiti crassitudine. Sed quod marinis Polypis cognominem plantam fecit, per longitudinem certis interuallis dispositi concaui tumores, eadem specie et natura usu quo in polypis acetabula uidentur, fuerunt. Neq; enim a multitudine pedū, quos nullo habet ut polypum, Polypodium gręci herbam nominauerunt, sed quoniam polypo, qua diximus nota similis est, sic quondam uocata fuit: nulla alia q̄ exigui polypi significatione. Diminutum siquidem a polypo nomen Polypodium est. Facile intelligit quod dicimus, qui oculatus testis radicis eius fuerit. Videbit enim qualem nos diximus crassitudine, & uillostitate radice: mōx in ea apertos & concauos tumores quosdam, quibus n̄titur & hæret: non aliter q̄ in mari polypī acetabulis suis hærent, sugunt, & quę cōperunt tenent. Qualia autem Acetabula sint, & unde ad multas naturę partes id nomen transierit, in Acetabulo herba, & alibi longius diximus. Idque est quod Plinius uicelimo sexto uolumine ait. Radix crassitudine digiti minimi, acetabulis cauernosa, ceu poliporum cirri. Felici descriptione usus, rei quam antecum Theophrastus, & hic scriptor h̄isdem fere uerbis tradiderant. Theophrasti uerba libro nono de plantarum historia sunt, quo loco de radicum diuersitate agit, hęc. ἡ δὲ τοῦ πολυπόδιου διαστῆα καὶ ἔχουσα κοτυληδόναν, ὥσπερ αἱ τοῦ πολυπόδου πικτάναι, καθάρει δὲ καὶ τὸν φύλλον ἔχει ὅμοιον τῇ πτερίδι τῇ μεγάλῃ καὶ φύεται ἐν ταῖς πέτραις. Quorū sensus est. Pilosa autē Polypodij radix, acetabula habens, qualia polyporū cirri habent: purgat per inferna. Foliū maiori Filici simile habet, & in petris nascitur. Hic non tam manifeste rem descripsit: sed cum dixisset habere Polypodij radicem cirros polypo similes, cogitanda legentibus reliquit acetabula: quę necessario eos sequuntur, & sine quibus in polypis cirri esse nō possunt. Alioquin differunt a Cirris Acetabula. Illi enim tota polyporum flagella sunt: hęc autem in flagellis & cirris his cauernosę concauitates, quibus id animal n̄titur, apprehendit, & apprehensa exsugit. Et hęc tota Polypodij nominis ratio in gręcis, & causa fuit. Romani, quę certius & in aperto magis erant folia contemplati, Filiculam uocauerūt. Testaturq; id Plinius, eodem loco dicens. Detrahīt bilem Polypodium, quam nostri Filiculam uocant, Similis enim Filici est, Sed multo certius ante eum, M. Cato operis sui

Bb iij

πολυπόδιον

Pl. li. 16. ca. 8.
& 12.

B

D I O S C O R I D I S

C de rerustica capite centesimo quinquagesimo octauo, qui cum familiam rusticam doceret, quo modo aluum deicere oporteat, plura simul coqui iubebat: frustum de perna Brassicae, & betae, cum radice sua coliculos: tum Filiculæ paulum, Polypodium hanc intelligens: cui, testantibus id cunctis alijs, egregia in purgando uis est. Polyrhizon, id est, multiradicem uocari hic etiam ait, ut paulo ante diximus, a copia radicum: quod nomen accreuisse nos illi credimus ex pilositate eius. Nasci in petris tantum Theophrastus ait, Omnes alij tamen ultra petras in arborum, præsertimque quercuum truncis prouenire etiam tradiderunt. Probantque officina, ex quercu magis, quæ ex petris, aut alijs arboribus. Plinius sub arboribus uetustis nasci ait. Cæteri uero in, non sub arboribus. Addidit ille tamen uetustatem necessariam Polypodij natalibus. Inter corticis enim rimas nascitur, quas uetustiores tamen arbores amisso iuuentutis humore & leuore ducit.

Δρυοπτερίς

D **De Dryopteris.** CAP. CXCIX.
R Y O P terin aliqui Pterion, alij Nymphæam Pterin nominant. Nascitur in ueterum roborum musco, Filici similis, multo minore foliorum incisura, radicibus inuicem implexis, hirsutis, gustu acerbis, in dulcedinem uergentibus. Psilothrum est cum radicibus trita. Illinitur enim primum usque dum sudorem euocet: mox sudor abluatur, & recens imponitur.

Pli. li. 27. ca. 9.

B A R B A R I C O R O L L.
D Ryopteris, folio subdulci diuersa huic, sed similis est, Dryophonō a Plinio uocata, cauliculis tenuibus, cubitalibus, circumdatis utrinque folijs, Pollicari amplitudine: qualibus Oxymyrine, sed candidioribus, mollioribusque, flore candido Sabuci. Edunt cauliculos eius decoctos: semine uero pro Pipere utuntur.

E X M. V E R G. C O M M.
Q Verna Filix Dryopteris est: id enim græcis ea uox significat. Eamque ob causam ex Filice pleraque illi nomina accreuerunt. Polypodio similis eousque Dryopteris est, ut sæpe carpentes fallat. Filici enim similis ut illud, & in uetustis quercubus pariter nascitur. Quod discrepat, radix est, & in natalibus muscosque arborum illarum partes. Sapor in utraque idem, sed ad medicinam uires diuersæ. Breuissime de ea antiquiores omnes egerunt. Nosque eos secuti, nihil ultra de ea monemus, quæ oportere in carpendo diligentiores herbarios esse: ne si legentes similitudo fefellerit, nullas Polypodij uires esse utentibus credendum relinquat.

κνίκος

C **De Cnico.** CAP. CC.
Nicus folijs constat oblongis, asperis spinosis, caule sesquipedali, capitulo magnitudine grandis oliuæ, flore Croci, semine candido, alioqui ruffo, longo, anguloso. Huius flore in obsonijs utuntur. Seminis tursi succus adiectis amygdalis, nitro, aneto, & melle decocto, cogitur in placentulas, quæ aluum emolliunt. Hæc in frusta quatuor finduntur, quæ nucis Iuglandis magnitudinem impleant. E quibus ante cenam duo uel tria sumpsisse satis est. Ratio temperandi hæc est. Cnici candidi sextarius, amygdalorum tostorum & delibatorum cyathi tres, anesi sextarius unus, aphronitri drachma una, cum carnibus triginta caricarum. Seminis succus lac cogit, & magis ipsum resoluendæ alui facultate donat.

Pli. li. 21. ca. 15.

B A R B A R I C O R O L L.
C Necos, a Theodoro Cartamum sermone uulgi dicitur. Multis caulibus, ramisque spargit. Desyluestri diximus in Atractylide. In Cneco peculiare illud a Theophrasto redditur: quæ syluestre tenerius, leuius, & semine copiosius habetur: Satium durius, spinosius. Cnicon Italicæ ignotam, ut Plinius scribit, Aegyptus maxime celebrat, oleo, non cibo gratam. Hoc faciunt

ex semine eius, quo & psitaci nunc aluntur. Cnecos melius q̄ Cnicos dicitur. Nam & Cnicon, a seminis colore Theocritus pro candido, siue flauo usurpar. Democritus, & omnino chymici florem Cnici Echumenion appellant. Iidem Elydrion herbam nominant; nec quæ sit ea docent, præterq̄, q̄ lutei sit coloris. Inuenio tamen in Opisthographis medicinalibus quibusdam, pro Chelidonio minore acceptam Elydrion.

EX M. VERG. COMM.

Agyptiam ubiq̄ in historia sua, & Italiæ ignotam Plinius Cnicon suam facit: conficiq̄ in ea gente ex eius semine oleum. Theophrastus, aliq̄ omnes, non magis in Aegypto q̄ Græcia & alijs locis nasci decreuisse uidentur: simpliciter de ea agentes, nullumq̄ huiusmodi discrimen in ea indicantes. Eorum nos, priuatimq̄ scriptoris huius historiam secuti, quam nouerūt rura omnia aculeatam herbam intelligimus. Cuius flore ad coloranda obsonia, pro croco rustica plebs passim nūc etiam utitur. Crocumq̄ sarracenum totus Ethruscus ager uocat. Congruunt enim omnes illi quæ a scriptore hoc notæ illi tribuuntur. Foliorum modica longitudo, incisio, asperitas, aculei, cubitalis caulis, & in eo capitulum: flos itidem Croco similis: posserumq̄ omnium candidum, oblongum, & angulosum semen: eamq̄ ob causam uulgarem, & quotidiani pro Croco usus herbam intelligimus: quam diligentius etiam rura ob eā utilitatem serere consueuerunt. Nolumus, ut factū ab alijs est, quomodo ab agresti fuso Cnicos differat docere, & an congener illi, diuersaue sit. Ex Theophrasto enim libro. 6. de plantarum historia nouisse huiusmodi aliquid forte diligentior quispiam poterit. Qui duo genera Cnici constituens, syluestre, & satiuum, in altero potuit hanc, in altero illam numerare. Locus in eo nobis non satis integer uidetur. Eamq̄ ob causam nihil ultra ex eo constituimus.

Mercuriali.

CAP. CCI.

Linozostin marem, e Græcis aliqui Parthenion, alijs Argyron, alijs Aritrillin, alijs Chrysitin, Aegyptij Aphlopho, aliqui Hermu botanion, Latini Mercurialem masculam, alijs Tesculatam. Aphri Asurmes uocant. Folijs constat Ocimi minoribus, Helxinæ cognatis, ramulis duplici geniculorum nodo cinctis, alarum cauis multis: fructu in fœmina copioso, quandam racemorum speciem præbente: mari e foliorum sinu dependente, paruo, rotundo, ceu binis testiculis una coherentibus. Frutice dodrantali, aut maiore. Vtraq̄ in oleribus manditur, ad aluum ciendam. Cocta in aqua, epoto iure, bilem aquamq̄ detrahit. Constat ut mares gignantur, hunc facere, ut fœminæ illam, si a purgatione bibantur, & trita folia genitalibus admoueantur.

BARBARI COROLL.

Linozostis, siue Parthenion a Mercurio inuentus est. Ideo apud Græcos Hermupooan, & Hermubotanen multi uocant. Caule utriusq̄ generis cubitali interdum, sed ramofo in cacumine, geniculis densis. Semen in geniculis dependens. Fœminæ solutum & candidum, mari iuxta genicula stans, breue, rarius, contortū. Folia Ocimo angustiora, sed maribus nigriora, fœminis uero candidiora. Radix superuacua, prætenuis. Nasctur in campestribus cultis.

EX M. VERG. COMM.

Com mendat se statim diuino noīe Mercurialis herba, uulgaris alioquin, uinetisq̄ & campis fere omnibus nasceus: aliquibus locis tam copiosa & efficax, ut sapore suo uina etiā inficiat, & bibentibus ingrata reddat. Vna, præcipuaq̄ illi in deſcienda aluo naturæ uis est, & a cunctis in medicinæ usu recepta. Numerauit, quo diximus in Polypodio capite. M. Cato & hanc inter ea quæ familiā rusticam ad deſciendam aluū docebat, monens non multū ex ea accipiendū esse. Quæ uis quoniā cōmunis illi cum pluribus alijs est, non uidetur diuino nōmine ornare eam debuisse. Credimusq̄ nos, quod in extremo capite ex aliorū fide a Dioscoride, & a Plinio. 25. uolumine, capite. 5. traditū est, diuini eius nominis causam illi fuisse. Id enim magis Deum hominibus ostendisse decuit, rarum, incognitū, multisq̄ omnibus sæculis optatum: qui aut dum agere ferunt, plures sibi nasci filias: uxorūq̄ suarū in eo sexu fecunditatē calamitosam sibi fore aniauerunt; aut dum nominis sui memoriā, generis subsiditū, hæredes sa-

Bb iij

A

B

B

Pli. li. 25. ca. 5.

D I O S C O R I D I S

C milia, & Reipub. ciues post se quotidianis uictimis & precibus reliquisse optant. Qua ratione alia prestare id sibi possent, a Deo cognouerunt. Factumq; ex eo est, ut Græci ἱεροῦ πόναν, id est, Mercurij herbam, latini Mercurialem uocauerint: notam uulgo, ut diximus, & quæ ob nimiam soluendi uim, quam habet, pro maledicto in gente nostra etiam nunc sit.

αυνία **C** De Cynocrambe. C A P. CCII.
Ynia, aut Cynocrambe, aliquibus Linozostis, Aphris Armas, alijs Asumellabon dicitur. Cauliculum binum palmorum altitudine emittit, mollem, subalbidum, folia Mercuriali, aut Hederæ similia, certis interstitijs subalbida. Semen folijs adhæret, paruum, rotundum. Folia cum caulibus pota aluum cient. Oleribus commendantur. Ius decocti & pituitam, & bilem, aquamq; detrahit.

B A R B A R I C O R O L L.
C Ynia non est ea, quam Theodorus Canariam interpretatus est, ut in Culice docuimus. E X M. V E R G. C O M M.

Q Valis canina hæc Brassica sit, non satis nobis constat. Si nomen solum expendatur, eadem Apocyno, quæ non multo ante hoc ipso uolumine tractata est, uidebitur. Si uires, & quæ posse traditur, Mercurialis esse merito credetur: præsertim ipsdem penitus uerbis in hoc scriptore tractata. Quæ enim de ea feruntur, semen eam secus folia habere exiguum, rotundumq; potam præterea, aluum soluere: & olerum modo coctam, bilem & aquas corporis trahere: omnia paulo ante dictæ Mercurialis herbæ sunt. Quod autem nos maxime suspenderit, & in ancipiti turbauit, uetustissimorum græcorum codicum, & latinorum fides est: in quibus non legitur hoc caput. Nec Plinius (quod hætenus deprehenderim) aut Theophrastus de ea alicubi agentes. Inclinat ideo animus nobis, adulterinū scriptoris huius esse hoc caput, & alterius Mercurialis herbæ traditam ab aliquo sub hoc titulo historiam esse. Censebunt de ea peritiores. Nos enim quod ignoramus fateri pudebit.

ἡλιότροπον τὸ μέγα **D** De Heliotropio magno. C A P. CCIII.
Heliotropium magnum aliqui Scorpiuron uocant, alij Heliotropon, alij Dialion, alij Heliopon, alij Scorpioctonon, alij Sesifamon agrion, alij Scorpij uran. Flos ei est effigie scorpionis caudæ. Vnde Scorpiuro ei nomen. Et quoniam folia cum sole circumagat, Heliotropion dicitur. Folia Ocimi habet, hirsutiora & candidiora, & maiora. Ramuli a radice terni, quaterni, aut sæpe quini exiliunt, multis alis concaui: flos in cacumine candidus, aut subfuluus. Incuruatur ut scorpionis cauda. Radix tenuis est, & inutilis. Nascitur in asperis. Decocta ex aqua fasciculo manus plenæ, pituitā, bilēq; per aluū extrahit. Contra scorpionū ictus & potu & illitu prodest. Ad alligat, ut conceptū adiuuet. Aiunt per horā unam ante accessiones, seminis grana quatuor, quartanas finire, tria uero, tertianas. Illitum semen formicæ uerrucas, pensilesq; & thymi florem representantes, & epynictidas exiccat. Folia infantium destillationibus, quas syriacis uocāt, podagris, luxatisq; utilissime illinuntur. Menses cient. Partus trita & imposita pellunt.

B A R B A. **H** Eliotropium a Cornelio Celso Solaris herba dicitur, æterno folio. Particulatim ut Ocimum floret: ideoq; per ædiū. Incipiens ab imo per solstitiū circūagitur se cum sole, ut nomē indicat, ut ortum eius mane spectet, et eius iter ad occasum usq; persequatur. Sed & nubilo die. Noctū uelut syderis desiderio contrahit ceruleum, ut Plinius ait, florem: album, subrufumq; ut Dioscorides. Genera eius duo. Maius Heliotrophon cognominatum. Et minus. Quæ utrunq; semipedalem altitudinem non excedit. Semen in folliculis messibus colligitur. Nasci-

tur nō nisi in pingui solo, cultoque maxime. Colōs Heliotropij, unus est e tribus fastigijs, in quæ conchilium diuisere ueteres; nostri Verrucariam appellauere; ut ualentem contra uerrucas. Si terram furculo huius circumscribat aliquis, negant scorpionem egredi. Imposita uero herba, aut inde omnino respersum, protinus mori. Formicas certe agri efficacissime necari Heliotropio monstratum est, opilatis herba earum foraminibus. Succum huius excipiunt ætate hora sexta, miscenque cum uino, ut sit firmior. Multa Magi de ea, sicut de cognomine quoque gemma polliceantur. Sed hæc propositi nostri haud sunt.

V E X M. V E R G. C O M M.

Varro rerum rusticarum primo uolumine capite. 46. Heliotropium describens, sic uocari ait, quod solis ortum mane spectat, & eius iter ita sequitur ad occasum, ut semper cum spectet. In Malua ex Theophrasto omnium huiusmodi causa reddita a nobis fuit. Scorpionum mox, & Scorpionij cauda a floribus, uel ut nos certius dici credimus, seminis inflexione, quæ Scorpionum caudæ, ut hic ait, speciem refert, dictum Heliotropium fuit. Scorpionæ non autem, a uiribus quas contra Scorpionum ictus efficacissimas habet: & quia scorpiones enecet, ideo Scorpionæ non dictum etiam est. In reliquis non tam certa ratio est, ut doceri a nobis possint. Solarem latini priuatimque Celsus uocauerunt, grecorum imitatione, qui a sole eam indicauerunt. Fuerunt præterea qui Verrucariam uocauerint, quoniam tam multis Verrucarum generibus, quæ ab hoc numerantur, medetur. Numerauit Heliotropium Theophrastus inter ea quæ particulatim florent: ab inferiore parte sumpto principis, mox inter ea quæ perpetuo folio sunt. Ex quibus tam multis notis, facile erit multi nominis quondam & usus herbam & florem deprehendere. Vtebantur enim Solari hac uerba passim ueteres grecorum medici in his naturæ uicij & morbis, quibus mederi scriptor hic eam testatur: quæ nec numero pauca, nec periculo leuia, negligenda uel sunt.

De Heliotropio paruō. C A P. C C I I I I.

Heliotropion paruum, quod & aliqui Scorpionum uocant, nascitur in palustribus iuxta lacus, folijs antedicto proximis, rotundioribus, semine acrochordonum uerrucarum modo, pensili, rotundo. Herba cum suo semine pota, adiectio nitro, hyssopo, nasturtio & aqua, latas tineas teretisque excutit. Pensiles uerrucas, quæ acrochordones uocantur, cum sale illita tollit.

ἡλιότροπον τὸ μικρόν

B

B A R B A R I C O R O L L.

Heliotropium minus, Tricoccum priuatim appellatur. Vbiq; prouenit, folijs non solum minoribus, sed etiam in terram uergentibus. Semen & huic effigie scorpionis caudæ: de quo & Scorpionum ei nomen est.

V E X M. V E R G. C O M M.

Duo esse Heliotropia, maius scilicet & minus, quo diximus in maiore loco Varro testatur. Verba eius sunt. Nec minus admirandum quod sit in floribus quos uocant Heliotropia. Idem & Paulus Aegineta lib. 6. confirmat, seorsum priuatimque de utroque agens. Quibus autem notis inter se differant, hic satis docuit: nec minus quibus etiam uiribus discrepent. Quod tamen hic additis nitro, hyssopo, nasturtio, & aqua ait. &c. Paulus Aegineta pro Nasturtio (nisi uictum in eo sit) Cardamomum numerat, frequenti in scriptore hoc & alijs, a Cardamo, quæ uox Nasturtium grecis significat, ad Cardamomum lapsu & mutatione.

De Scorpioide. C A P. C C V.

Scorpioides hærbula est, folijs exiguis, semine caudæ scorpionis effigie. Illita, scorpionum ictibus præsentaneo est auxilio.

σκορπιουειδής

B A R B A R I C O R O L.

Scorpioides a Plinio Scorpis uocatur, ex argumento nomine accepto. Est & alia eiusdem nominis effectusque Asparagi cognomine: sed in totum spina, nullum enim folium habet, caule Asparagi, cacumine aculeato.

D I O S C O R I D I S

C E X M. V E R G. C O M M.

Scorpionē Plinius uocare hanc aliquot locis uidet. Non satis tñ nobis constat, an ubiq; hāc intelligat. Theophrastus em̄ lib. 9. de plantarū historia Scorpion a radicis, non seminis figura dictā aperte offendit. Verba eius sunt. ὅτι δὲ σκορπίον καλοῦσιν διὰ τὸ πλὴν ῥίζαν ἔχειν ὁμοίαν σκορπίῳ. Quod est. Alij autē Scorpion uocant, quia scorpioni similem habet radicem. Hic autē seminis eam figuram dicit esse, Cogitandum itaq; quarendumq; qualis Scorpioides hæc sit.

¶ Finis LIB. Quarti.

P E D A C I I

D I O S C O R I D I S

De Medicinali materia. LIB. Quintus.

IO. R V E L L I O interprete.



V P E R I O R I B V S quatuor libris amicissime Ari, tradidimus de aromatibus, oleis, unguentis, arboribus, & earūdem lachrymis ac fructibus, itē animalibus, melle, lacte, adipe, frumētis, oleribus. Nec non de omni radicū, hærbarum, succorū, seminūq;

D ratione: In hoc autem totius operis Quinto differemus de uinis, & metallicis, & a Vite nostram cōmentationem auspicabimur.

¶ De uinifera Vite.

C A P. I.

ἡμπελον δινόςφω-
50

Folia Vitiū, & triti capreoli, capitis dolores illitu mitigant, & inflā-
mationē stomachi ardorēq; cum polenta. Folia etiā per se, ut quæ refrigerēt & adstringāt, imponi solēt. Potus eorū succus dysentericis, san-
guinē excreātibus, stomachicis, & grauidarū malaciæ medet̄. Eadem effi-
ciunt madefacti in aqua capreoli & poti. Lachryma Vitiū quæ uelut gū-
mi in caudicibus concreuit, ex uino pota calculos pellit. Illita lichenas &
pforas, leprasq; nitro prius perfrietas sanat. Eadē cum oleo sepius pilis il-
litis, psilothri effectū habet, maxieq; sanies, quā accensa sarmēta Vitiū ex-
udarunt. Qua & peruncā uerrucarū informicationes extrahunt. Cinis
sarmentorū et uinaceorum erūpentibus in sede condylomatis & thymijs
illitus ex aceto medet̄. Prodest luxatis & uiperarū moribus. Contra lie-
nis inflammationē illinitur, cum rosaceo & ruta & aceto.

H E R M O L A I B A R B A R I

Patricij Veneti, & Aquileiē, Patriachæ Co-
rollariorum LIB. Quintus.

V I T I S S A T I V A.



Pli. li. 14. ca. 13.

I T E M satiuam, Græci ampelon Hemeron, & Oenoen, & Oenophoron, id est,
urbanam, & uinum ferentem uocant. Item Clematida, & Clemacem, interim &
Oenanthen: ut placet Iulio polluci. Superuacuum genera eius psequi, quia totidem Vitium
affirmantur esse, quot foli. Nasctur passim, & in alto Vitis, & propinqua littori. Durare Vi-
tem ad infinitū, resubili fœcūditate perhibent, culturæ quodam genere, Theophrasto auctore,

ad Elephantinē: ut idem scribit, & Varro mutuatur. Non decidunt Viti folia, neq; circa Meni-
phin. Ad Deltam quoq; Nili, fere tota uiuet semper. Quod & alijs quōq; satis accidit. Capnīa
uocatur unum Vitis genus, quæ uuam nigram ex candida, & candidam ex nigra sine prodī-
gio ullo ferat. Infanæ Vites appellantur, quæ ad florem usq; perducunt. Quinetiam est ubi Plī-
nius Infanas Vites Triferas appellet: quoniam in his aliq; maturefcunt, aliq; turgescunt, aliq; flo-
rēt, Smyrnæ Triferam a se uisam. M. Varrone etiam prodente. Vitis candida melius reddit,
quo lætius fuit germen: quod quidē & huic, & Fico proprium. Vitibus Capreoli tribuuntur,
& Vitiq; quos & Clauiculas, & Pampinos uocamus, Græci Helicas. Is est coliculus, ut Varro
inquit, Viteus, intortus ut Cincinnus, a capiēdo dictus, quoniam ad locum capiendū fur-
sum uersus serpat. Sicut Vitis dicta primo, quoniam inuitatur ad uuas pariendas: & a parien-
do Parilema, deinde Palma, literis immutatis. Est autem Palma maior flagellus, unde nascun-
tur uuæ. Dalma, unius inuersione literæ a uenti flatu dicta: ut idem Varro inquit. Eadem Vi-
tis Caprea nominatur: quia Capreolum pareret. Vitia & pabuli genus est, a uinciēdo appel-
lata, q̄ item Capreolos habet ut Vitis, & ad scapum lupini, aliumue calamum ad quē hreat,
id solet uincire: unde Vititalia, pro pabularibus e Vitia dicuntur. Vitia tamen duplex, semina-
ris, & pabularis uocata. Recentiores Græci Biciā appellant, a nostris (ut puto) mutuati. Con-
sistit in Vitibus lachryma largior incisis, paulo ante germinatum, partior autumno: & hyemis
initio, minus fecundæ crebrioribus oculis gēantur, solidioresq; feruntur. Ipes appellamus,
uermes in Vitibus nascentes, austrinis flatibus. Peculiaris Viti morbus Tragos, hoc est, Hir-
culus importuno uento germinibus abscessis: uel imperitia colentiū oblectis. Theodorus Arti-
culationē uocauit. Hircelcere porro Vites dicuntur, cum infecundæ sunt: quoniam & Hircus
animal, ut inquit Aristoteles, sterile scit pinguedine. Vuæ ipsæ, & pampini laborant Crambo,
qui similis rubigini est, sole post humores longos insequuto uehementi. Est & Niuatio, siue Ro-
ratio, quoties uua deflorente uiuerit. Præterea Exacnatio, quā Theodorus Exuperantiā ap-
pellat. Græci citrosin, quoties acinæ racemis defluunt. Sine granis interioribus uuas arte nasci,
auctores Græci posse docuerunt, Agigarton id genus uocantes. Vites arbusciæ sunt, & sim-
plices. Arbusciuas Græci Anadendridas, & Dendritidas appellant. Arbusci uero ipsa, siue
ignobiliori uoce arboreta idem Græci, Anadendradas, & Amynixidas, & Amamaxidas, Epi-
charmus, & Sappho. Nam & Arbusculæ testudinū (instrumenti nomen id bellici est) Amaxa
podes uocantur: in quibus rotarum uersantur axiculi: ut Vitruuius Pollioni placet. Quamq;
nō defunt, qui genus Vitis Amyxidas, & Amamaxidas accipiant. Alij uuam Bumastion, aliq;
Hesperion uocatam interpretantur. Auroschas Parthenio Vitem significat: Eratostheni, ra-
mus eius cum racemo dicitur: Apollodoro Vitis Elinos, quo nomine Philetas, & Nicander
ramum eius, non Vitem ipsam capiunt. In Hircania, feracissimam esse Vitem, mirati sunt scri-
ptores: cum sit Aquilonibus exposita. Nam in Carmanis, & Margianis, Arianisq; crassitudo
tanta caudicis est, ut bini homines plerumq; amplecti nequeant, bicubitalibus racemis. Vitem
Boetij Thebis primum natam putant: qua & Liber pater.

EX M. VERG. COMM.

Quæ a rusticæ rei scriptoribus in conferenda uinea tam multæ numerantur Vites, Ami-
næ, Pfythiæ, Verrunculæ, Bumasthi, & pleræq; aliæ, omnes quocunq; colore ma-
turefcunt, uindemiamue, aut rusticā penum explent, una uiniferæ appellatione a Diosco. collī-
guntur. Omnium enim in medicina eadē uis, paresq; in earum partibus ad remedia uires huic
scriptori sunt: & si posteriores aliqui in plerisq; Vitis candido colore uuam maturantis folia,
palmites, & capreolos magis probauerint. Quodq; uiniferæ discrimen additum illi ab eo est,
nō aliā habet causam, q̄ ut ea nota satiuā omnis Vitis ab alijs, quæ superiore uolumine cogno-
mines illi tractatæ sunt, separetur. Hæc enim ad uindemiam, & sanitatis usum ubiq; fere conse-
ritur & excolitur: illæ sponte sua nascentes, nulla hominis cultura, medicinæ tantū inseruiunt.
Hæc passim & omnibus nota, illæ medicam materiam tantum tractantibus, solaq; similitudi-
ne aliq; gentium adoptione in nomen Vitium receptæ. De quibus dixisse tunc quæ oportebat
satis sit: quemadmodū nunc in quotidiana & notissima re nullū opæ precium laborasse fuerit.

De syluestri Vite.

CAP. II.

Syluestris Vitis duorum generum est. Alterius uua non mature-
scit, sed floretenus Oenanthen nominatam perducit. Altera ad fru-
gem peruenit, paruis acinis, nigra, & adstringens. Folia, caules & cla-
uæ

καπυλλος ἀγρία

D I O S C O R I D I S

C uiculae, quibus repunt, uim habent cultae Viti similem.

B A R B A R I C O R O L L.

DE Vite syluestri, superiore libro diximus.

E X M. V E R G. C O M M.

Alia est syluestris Vitis haec ab ea, quae superiore uolumine Ampelos agria, i. syluestris Vitis dicta etiam a Diosco. & tractata fuit. Haec enim satiuæ congener, syluestri habitu tantum diuersa: illa sola racemosi fructus similitudine sic appellata. Eamque ob causam illa syluestris, haec Labrusca uitis sit. Nota ubique, et cuius flores nunc etiam condiendis & odorandis uinis, quo tempore pubescit, diligentius leguntur. Dicimus autem pubescere, Vites florere, poetæ nostri exprolo: qui felici translatione a pubertate hominis usus, ait, Tunc largo pubescit uinea sactu, florē Vitis intelligēs: qui flauo colore lanuginosus, primae in homine pubertatis spem ostendit. Graeci a flore *ἀνθη* uocant. Quid autem Oenanthe graecis sit, primo uolumine in Oenanthini unguenti confectio- ne diximus, & ab hoc loco non multo post etiam dicemus.

De Vua.

C A P. III.

σταφυλή

Vae recentes aluum turbant, & stomachum inflant. Innocen-
tiores quae decerpunt diu pependere: ideo, quod in eis copia hu-
moris exsiccat. Vilesque fiunt stomacho agrisque, atque cibi auaritatem
excitant. Vinaceis, aut uinario uase seruatae, ori & stomacho gratae sunt.
Aluum sistunt, sed uesticam & caput tentant. Et sanguinem excreanti-
bus conueniunt. Similesque quae in musto fuere. Sapa, aut musto con-
ditae, stomachum magis infestant. At quae solem prius passae, in aqua
coelesti conduntur, minus uinosae sunt, siticulosas, ardentibus, & longis
febris salubres. Reconditi uinacei, inflammatis mammis, turgentibus
D bus ac praeduris, cum sale illinuntur. Decoctura eorum dysentericos, coe-
liacos, & foeminas fluctuante uulua laborantes iuuat infusa. Ad defessio-
nes ac fetus assumitur. Nuclei acinorum adstringendi uim obtinent.
Stomacho utiles sunt. Inspargitur farina tostorum polentae modo, dysen-
tericis & coeliacis & solutis stomacho.

B A R B A R I C O R O L L.

Vam, Graeci Staphylen, a Staphylo Liberi patris filio, ut Prolomaeus uoluit, appellant.
Lenida etiam poetæ. Nam & Lenæus dicitur is Deus. Alia porro Vua eliquescit in portu, alia
eligitur ad uescendum: haec aut in corbulam secernitur, ut inde addatur in ollulas: quae in do-
lia plena uinaceorum trudentur: alia in piscinam picatis amphoris demittitur: alia in haram
Carnario suspenditur. Vuam Amineam minuscule, & maiorem, & Apiciam, commodissi-
me in ollis condidit Cato. Eiusdem generis in Sapa, & Mulso rectissime seruantur. Du-
racinas, & Amineas, Scancianas, affirmant opportunissimas esse quae pendeant: quod genus
omnes Conditaneas, & Condituias appellamus. Vuae in palea seruatae, pensilibus proximae
dicuntur. Vuae uehementiores nigrae. Ideoque uinum ex his minus iocundum. Suauiores albæ,
quoniam aere translucido facilius accipitur. Est & Vua Theriace uocata: quod contra morsum o-
mnium bestiarum proficiat: cuius ratione ferenda Palladius instituit. Florem Vuae, in cibis dari
gallinaceis precipiunt, ut praeterea non attingant uuas: quod & in Labrusca diximus.

Vinaceus, Graece Stemphyton uocatur. Dicimus & Vinacea neutro genere, Palladius etiam
foeminino Vinaceam. Haec & Flores appellantur, sicut in Oliua Flores, atque Fraces. Vi-
naceos, poetæ sunt qui Brycia, & Brytea quoque appellant, quod & pro fratribus Oliuarum su-
muntur. Stemphyta, in Aristotelis Rhetorico, secundo. Gellius faciem ipsam e Vinaceis, &
oliuiis expressam, Flores, & Fraces dici scribit.

Gel.li.ii.ca.7.

Nuclei acinorum Vuae, a Graecis Gigarta dicuntur, Palladius excrementa, & semina, &
grana uuae interiora nominauit. Ab acinis, Acinaticum dici uinum existimo Veronenfis agri: ut
scribit Cassiodorus, alumnū, odoris, saporisque suauissimi, colore purpureo, ineffabili dulce-
dine, tactu quoque densum, atque pingue: ut carneus liquor, aut potio esculenta uideri possit. Lau

dantur ex eodem agro & Rhætica ueteribus, in montanis Rhætorū, qui supra Veronam sunt, nascentia: ut inquit Strabo. Ipsos acinos, Cato acina, Catullus acinas, pronunciant.

E X M. V E R G. C O M M.
 Stillud ante omnia sciendum, a patientia Passis uitis, & uino nomē quondam factum fuisse, si Plinio credimus. 14. uolumine, capite primo dicenti. Quin & a patientia nomen acinis datur passis. Qualis autem ea sit, quantaq; 15. uolumine, capite. 16. docuit Columella, iubens ad passas eligi maxime albas, dulcissimi saporis, maximis acinis & raris: fieriq; id oportere Lūna decrecente, sereno, & sicco cœlo, circa meridiem: lectasq; uuas has in tabulis paulisper porrigi, ne inter se pressæ suo pondere collidantur: mox in aheno, aut fictili aliquo nouo amplo ex sarmentorum cinere factam lixiuiam, usq; ad feruorem calefacere: & cum feruebit, aliquid putri & optimi olei adijcere, simulq; miscere: tum racemos uuarum pro magnitudine binos, uel ternos simul colligatos in ahenum illud feruens demittere: tam diuq; illic habere dum decolorentur, non tamen excoquantur: in qua re agenda moderatione temperamentoq; opus erit. Exemptas dein ex aheno uuas in crate disponi idem iubet, rarius q̃ ut altera alteram cōtingat. Singulas deinde post tres horas insolatas conuerti. Neq; ubi prius fuerant reponendas: ne relictō illic humore corrumpantur: noctibus etiam tegi, ne irrorentur, aut imbre madeant. Post aliquot postea dies cum modice aruerint, in uasa noua cōdi precipit. &c. Et hæc scriptoris eius Passæ uitæ sunt. Palladij alia ratio est: quam in Octobri mense his uerbis monstrauit, non ut scilicet, sed ut Græcia conficere consueuerat. Vuam passam græcam sic facies. Melioris acini, & dulcis, & lucidi botriones in ipsa uite torquebis, & patieris sponte sua inarescere: deinde sublatos in umbra suspendis, & uuam districtam componis in uaseulis: substernis pampinos, sicco algore frigentes. &c. Diuersa hæc a Romana Passæ Vuæ confectio est: quemadmodum & eius conditura fuerunt. Quæ quoniam longius a Columella eodem capite docentur, non reddentur a nobis. Poterunt enim ab illo uolentes omnia certius audire. Interini autem nos docebimus, primum qua ratione Columella, tum qua Palladius Passum, & uterq; suum conficiant. A Columella. 15. uolumine, capite trigelimonouo ex Magonis Africani præcepto (nam eius gentis primum Passi confectio, & maxime usus fuit) sic fieri Passum præcipitur. Vuam præcoquam, bene maturā legere oportet: acinā aridā, aut uitiosa reijcere: furcas mox palosue qui cannas sustineant, inter quaternos pedes figere, & perticis iugare: tum insuper cannas ponere, & in sole pandere uuas: noctibus uero regere, ne irrorentur. Cum deinde exaruerint, acina decerpere, & in dolum cōijcere. Eodem mustum q̃ optimum, sic ut acinis superferret, adijcere. Vbi combiberint uuæ, seq; impleuerint, sexto die in fiscellam conferre, & prælo premere, Passumq; tollere. Et hæc conficiendi Passi disciplina ueteribus fuit: & si aliæ etiam rationes ab eo eodem loco numerentur. Palladius non dissimilem huic confectioem Octobri mense sua ætate fieri docuit. Ante uindemiam enim Passum fieri iubet uniuersæ Africæ more pingue atq; iocundum. Leguntur Vuæ Passæ q̃ plurimæ, & in fiscellis clausæ iunco factis aliquatenus rariore contextu, uirgis primo fortiter uerberantur. Deinde ubi uuarum corpus uis cōtusionis exsoluerit, cochleæ supposita sporta comprimuntur. Hinc Passum est quicquid effluxerit, & conditum uaseculo mellis modo seruatur. Breuior sane hæc ratio, sed non dissimilis priori. Siquidem quæ a Palladio Passæ Vuæ legi iubentur præcoques illæ, & sole arefactæ Columellæ sunt. Et quas ille musto implet ut succum reddant, hic uirgis flagellat, & lentescere cogit: quamq; hic cochleam, ille prælum: & quam fiscellam Columella, hic sportam uocat. Fuit quondam Passum quotidiani usus: eratq; in sanitate & ualitudine homini pro melle, sine inflationis periculo, ut diximus, quam mel præcipue facit. Exoleuerunt nostra ætate omnia huiuscemodi: ideoq; qualia hæc quondam fiebant, repetita a nobis longius fuerūt: ut cognoscant, intelligantq; omnes, quantopere in Passis Vuis, & Passo a ueterum disciplina & moribus discesserimus: multoq; magis in tam multis Vuarum condituris, quæ illis pene infinitæ fuerunt, ex Columella, alijsq; rei rusticæ scriptoribus cognoscendæ: ut certius intelligant legentes, quas hic in uinaceis, in ollis, in sapa, & musto, & in cœlesti aqua seruatas dicit. Cuncta em̃ ab eo traduntur eodem operis sui uolumine, capite. 43. Nos enim tam multis obseruationibus commentationes has nostras augere nolumus. Erit etiam ex lectione scriptoris illius aliud operæ precium. Intelliget enim qui id ager, quas hic Passas antea factas Vuas in cœlesti aqua componi iubet, addiditq; *ἐν ὀλίγῳ τὰς τοὺς αὐτὰς γίνεσθαι ὀινώδους*, eam habere rationem quam nos locum illum uerrentes indicauimus, exiguo scilicet uino, ut trinosæ fiant, conspergi oportere. Ex Passi enim confectioe tota ea ratio fluxit, in quo iubet ille uuas in musto demergi ut uinum combibant, Necessarium enim est, ut qui sole natiuus humor in eis aruit, nouo &

Cc

D I O S C O R I D I S

Congenerem liquore aliquo iterum uescat. Idque nos præcipi a Dioscoride credimus: & si alij aliter locum interpretati sint: quos non damnamus, sed interpretationis nostræ quam debemus causam indicamus. Quemadmodum a principio capitis huius contra quod Plinius & alij dixerint locum ipsi etiam uertimus, *πρὸς τοὺς ἀεθινοὺς*. Quas uoces Plinius, 23. uolumine, capite, 2. uertens, ait. Innocentiores, quæ decerpæ diu pependere, qua uentilatione etiam utiles fiunt, *σπομάχο, ἀγρίσκι*. Aegros appellans quos hic *ἀεθινοὺς*. Plinium secuti interpretes alij, *ἀγρίσκι* pdesse & ipsi dixerunt. Nobis, quibus infirmum corpus est, magis uertere placuit: non ob aliam sane causam, quam ut certiore intellectu res nunc pateret.

V **De Vua passa.** **CAP. IIII.**
sepius Vua passa alba adstringentior est. Prodest esitata caro earum tum si, renibus, ac uesicæ. Estur in dysenteria per se cum nucleis. Et decocta in patinis cum melle, admixta milij ac hordei farina & ouo, ualeat ad purgandum caput. Eiusdem gratia cum pipere commandatur. Testium inflammationes sedat, illita cum lomento fabarum, aut cumini farina. Fauos, epynictidas, carbunculos, enatas in articulis putredines, & gangrænas, sine nucleis trita, & cum ruta imposita, sanat. Podagræ conuenienter cum opoponace illinitur. Mobiles ungues illita extrahit.

V **BARBARI COROLL.**
D Vua passa Græce Staphis, & Astaphis Hemetos, hoc est, fatiua dicitur. Cæterum Apameas inuenio celebrari passulas.

O **De Oenanthæ.** **CAP. V.**
breuiter Oenanthæ uocatur Vitis syluestris fructus, cum floret. Recondi debet sicili non picato, collectaque substrato linteo in umbra sicatur. Laudatissima in Syria, & Cilicia, & Phœnice. Vis ei adstrictoria. Quare pota, stomacho ac ciundæ urinæ utilis. Aluum sistit, ac sanguinis excreationes. Contra fastidia & acorem stomachi, sicca & illita efficacis est. Capitis doloribus tam uiridis quam sicca ex aceto & rosaceo perfunditur. Sanguinolenta uulnera cataplasmate, & incipientes ægilopas, cicatrices in ore, & genitalium nomas, trita cum melle, croco, myrrha, & rosaceo, ab inflammatione uindicat. Pessis miscetur ad sistendum sanguinem. Contra oculorum delachrymationem, & stomachi ardores, cum polline polentæ, & uino illinitur. Crematæ carbonibus cinis facit ad oculorum medicamentum. Rediuiuis, paronychia, abscedentes gingiuas, cruentasque cum melle sanat.

*Pli. li. 12. ca. 29.
& lib. 23. ca. 11.*

V **BARBARI COROLL.**
 Vua Oenanthæ, quam Vites syluestres, hoc est Labruscæ ferunt, laudatissima est in Syria, maxime circa Antiochiæ, & Laodiceæ montes. Item ex alba Labrusca. Sunt qui principatum in unguentis dent in Parapotamia nascenti: deinde in Antiochia: & Laodicea Syriæ. Tertiū locum ex montibus Medicis, quæ & utilior medicinæ. Quidam omnibus istis præferunt Cypri. Vitis ea quæ Massaris in Africa uocatur, nunc medicis, hunc odoribus tantum gigni Plinius affirmat. Nascitur in Africa & Vitis quam Vbolima uocant accolæ, oliua in uites insita, utriusque fructum arboris ferentem: hanc Græci & Eleostaphylon appellant, Vnum Oenanthium, sit duabus libris florum, in musti cado maceratis, qui post triginta dies mutantur. Oenanthem & a uitis dulce uinum ferentibus arbutiuis maxime colligi quidam præcipiunt, non syluestri tantum. Labruscam dici putant, quod in marginibus terræ seu labris quibusdam sere nascatur. Vnum Anthosmias, ab odore floris dicitur, nec idem cum Oenanthino uino est. Pro precioso sa

ne capitur a Græcis. Eius mentio est apud Aristophanem, & Hippocratem, & alios uel promi-
sua. Hippocrates certe hoc etiam Anthinē uocauit. Aliq Anthinē, pro Anethino capiunt: ut
Galenus inquit. Nam uinum cognomento Hippocraticum, Gallijs maxime transalpinis gra-
tissimum, fictici generis est, facili ratione. Cinamomum, Saccarū, et Carpehiū teruntur in fuscū:
ex eo uinum liquatur, ut transeundo qualitates eas cōbibat. Datur hoc epulis principalibus,
cū Escharite pane bellariorū uice, qui mos, sed in alio uino, peculiaris Atheniēsis fuisse legi-
t.

EX M. VERG. COMM.

Labruscæ uitis tantum Oenanthe medicis flos est, neq; ad medicinam ex alia uite utuntur.
Cæteris satiuæ etiam flos, & prima uitium omnium pubertas Oenanthe dicitur. Numerauit in-
ter aues etiam Plinius hoc noītinē, quæ statos latebræ dies habet, exorientes surto, occultata ab
occasu eius progrediens. Sic sorte dicta, quæ cum uitium prima pubertate hac prodeat. Nec ul-
tra quicq; de ea tradidit: diligens alioquin in Oenantes huius historia & medicina: quarum al-
teram. 12. uolumine, capite. 25. alteram. 22. capite. i. longius profecurus est. Ex eo multa quæ in
Diosc. non leguntur, Barbarus additioni suæ miscuit: quæ poterunt uolentes facile in eo depre-
hendere. Nobis toridem quatenus licuit & iisdem uerbis omnia reddere placuit. Eademq; fide
monemus, scribere in. 6. suæ medicinæ Paulum Aeginetam, plurimū quidem ex Labrusca Oe-
nantes usum esse: quoniam egregie adstringit, stomachumq; & aluum maxime firmat: uerū
ramen traditis his idem statim subiicit. *ὁ δὲ Διοσκορίδης ὑπερὶ τῆς ὑπογράφου ταύτης ἰσχυρίαν τὴν δύναμιν
ἔχουσαν, ὅθεν ἄλλοις φασὶ καὶ πρᾶγμα ἴσθαι καὶ ἴκτερον ἴσθαι.* Quod est. Dioscorides autem aliam de
scribit Oenanthem contrarias huic uires habentem: ideoq; secūdis, stillicidio uesticæ, & fellis suæ
fusionibus eam mederi ait. Quorum nihil in capite hoc legitur: neq; in scriptore hoc alibi legi-
se me memini: & nihilominus non negligenda Aeginetæ autoritas & testimoniū est, quæ crede-
re oportet uera, & quæ aliqui legisset restari. Nobis nihil est qd adijcere aliud his ualeamus. Rem
tū signauimus: ut si forte laxandi uires habere Oenanthem aliqui alijs inuenerit, autoritate scri-
ptoris eius sciat, aliam ab hac illam esse: alteriusq; uitis quærendum cum florebit fructum, q cō-
trarias huic uires habeat. Qualis autem ea sit, non ausim ego dicere.

De Omphacio. CAP. VI.

Omphacion succus est acerbæ uuæ, nondū maturescens e Tha-
sia uite, aut Amminæa. Oportet autem ante canis ortum, ex-
pressam melliginem in cyprio uase linteo cōoperto insolare, usq; dum
cogatur. Semperq; quod ceruici uasis concretum hæsit, reliquo humo-
ri permiscere. Noctu sub dialibus locis auferre. Quādoquidem noctur-
ni rores ipsum concrefcere non sinunt. Eligendum est flauum, friabile,
uehementer adstringens & linguā mordens. Sunt qui coquendo mel-
liginem cogant. Prodest contra tonsillas, uuam, ulcera oris, humida gin-
giuarum uitia, purulentas aureis cum melle aut passo. Item ad fistulas,
uetera ulcera, nomasq; ex aceto. Dysentericis & mulieribus fluctione
uulvæ laborantibus clystere infunditur. Oculorum claritati & scabriz-
ciæ, & erosionibus angulorum conuenit. Bibitur ad recentem sangui-
nis excreationem, etiamsi rupta parte aliqua contingat, sed pauco & a-
quatiore est utendum. Valde siquidem exurit. Idem adstringit. Prodest
stomacho qui cibi tenax non est, aut tardius cibum concoquit. Item ijs
qui ilei dolore conflctantur. Conuenit in grauidarum malacia. Sorptū
auxiliari constat, cum populatim grassatur pestifera lues. Huiuscemodī
omphacium non nisi post annos multos bibi potest.

BARBARI COROLL.

Omphaciū, siue Omphax, idem, acor, siue acremētum uuæ, ab immatura uite dicit, quæ
Omphax a Græcis uocatur. Est & oleum Omphaciū, de quo inter unguenta diximus. E Tha-
sia, ut Dioscoridi uidetur, uua; e Plytia, ut Plinio, probatur acor. Cum sunt acini ciceris magni

Cc ij

ὀμφάκιον

Pli. li. 14. ca. 14

D I O S C O R I D I S

C tudine, ante canis ortum incipiente pubertate. Precium in librās sex. Solet & aliter fieri, uuam imaturam terendo in mortarijs: siccataq; in sole, postea digeritur in pastillos.

E X M. V E R G. C O M M.

N On animaduertunt Diosc. Omphacium uertentes interpretes alij, infortinē, nec reliquo corpori congruēt in extremis clunibus caudam illi reliquisse: nec aliter q̄ Flaccus cecinit, qd ille fingebat monstrum, turpiter in atrum piscem desinere, ex Omphacio Omphacite uinum fecisse. Quod em̄ in extremo capite in eorum æditionibus legitur, uis succo adstrictoria, &c. uel ut alter ex eis eam incipit partem, idem adstringit, prodest stomacho qui cibi tenax nō sit: et ab his quod totum legitur usq; ad integram capitis huius clausuram, totum ex historia & medicina uinorum, quæ statim sequitur, in Omphacium irrepsit: in qua hic idem ait, ὁ δὲ καλοῦντο οὐ φακίτις. &c. Mox, συνηκὴν δὲ ἔχει τὴν δύναμιν καὶ τὸν ὄμαχον, καὶ κισσῶδες καὶ τοῖς δυσώπεισι καὶ ἰσχυροῖσι τὴν σόμαχον ἀρμόσσαν. δοκίμῳ δὲ καὶ λοιμικαῖς διαβάσει βοθητὴν. &c. Nelongius q̄ decet tam multa reperantur, omnia, ut uidetur, duobus locis eadem, & importune ab aliquo ex uino ad Omphacium translata: qui Omphacite id uinum uocari sentiens, Omphacio coniungi debere credidit. Verumtamen longo intervallo Omphacium, ab Omphacite uino differt, ut mox in confectioe eius legentibus patebit. Debuerant hoc illi animaduertere: nec præterita tantū, sed inuenienda posthac etiam in scriptore hoc cognouisse. Caltantis enim Homericī maxima illa fuit, & omnium integra semper laus erit, Præterita meminisse, præsentia intelligere, & futura coniungere: cognitisq; his, apte omnia constituere. Nos eam reliquimus partem inutilem hoc loco, non multo post apposite tractandam. Indicaruntq; id nobis antiquioris fidei codices, in quibus nihil huiusmodi legitur, sed multo magis res ipsa suis locis docens tractanda singula: nec diuersa simul miscenda rerum genera esse: importuneq; bis aliquid nulla urgente necessitate tractari non debere. Discrepant nobis etiam cum alijs interpretibus pleraq; alia, & si forte nō multum, quas græci notissima cunctis uoce Omphacas uocant, acidas dixit: quod priuatum ad saporem pertinet, potestq; in maturitate etiam sentiri. Neque enim acidum ὄμαξ græcis simpliciter significat, sed acerbum: in quo poterit acidus, poterunt & alij sapores esse: utq; priuatum acidū dicimus qd sapore suo acescit, sic acerbis omnibus cōmunis Omphacis uox est: neq; uuā magis q̄ oliuas, Lauri baccas, & innumera alia nondum matura græci ea uoce indicant: non ex sapore Omphacite oleum, sed ab imaturitate oluarum appellātes. Eamq; ob causam, cōmunem eius uocis æstimationem nos secuti, acerbam uertimus. Nec dissimili ratione, quod hic scriptor μῆπω πικρὰς οἶνος ait: uertitq; idem, nondum nigrescentis: nos, nondum maturefcentis, diximus: cōmuniore in uuis eius uerbi significatione usi. Est enim græcis πικρὰς/ιν μαλανίσσαι, id est, nigrescere: est itidem, ποικίλλασθαι, id est, uariari: est postremo παλαιῖν/εσθαι, id est, maturari, & maturitate mitius fieri. Fecimusq; id: ne quod hic non decernit, ex albis uuis fieri posse Omphacium negaremus: quod contracta ad nigredinem uuarum maturitate necessario futurum erat. Sunt quidem leuia hæc, uerumtamen non negligenda penitus, in his quæ ad artes & uitam pertinent, in quibus nulla satis fides, aut diligentia hominis unq; fuerit. Quales autem Aminæ uites, quas hic cæteris anteposit in disciplina ruris sint, copiosissime docebunt Columella quarto operis sui cōmentario capite, 2. & 14. uolumine, cap. 2. Plinius. Breuissimeq; omnium felicissime in Georgicis suis Maro, cum cecinit. Sunt & Aminæ uites, firmissima uina. Quæ una firmitatis laus causa antiquis scriptoribus tam græcis q̄ latinis fuit, ut ad medicinam ex hac uite materiā, uuā, omphacium, & uinum præ cunctis alijs laudauerint semper, & amauerint. Idemq; de Thasijs constituendum est, quarum idem Maro honeste itidem eodem loco meminit. Quod deinde a Diosc. dici ἢ καλῶματι ἔρυσσῶ, id est, rubete æneo uase, ad genus æris pertinet, qd eo colore in hoc usu probabatur. Id Cyprium uas alter ex interpretibus uertit, relicto legentibus desiderio, ex qua materiā querendū id uas sit. Scimus qdem ante ferri cūctis alijs in medicina Cyprii æs, & in Plinio Cyprium uas, pro æneo ex ea gente intelligi aliqui oportere. Verum nō erat nostra ætate tam obscure dicendum, quod a Diosc. apertissime ostendebatur: præsertim nihil de Cyprio magis q̄ de quo uoluerit aliquis alio ære hæc docente.

De Vinī natura. CAP. VII.

V Ino uetere nerui læduntur, & reliqui sensus, gustu quod suauis est. Quare cauendum ijs qui internam alicuius partis imbecillitatem sentiunt. Attamen in secunda ualitudine, paucum, aqua di-

lutum, innoxie sumitur, Nouum inflat. Aegre coquitur. Insomnia parit. Et urinam ciet. Aetate medium utraq; uitia fugit. Quare ad uictus sanorum agrorumq; usurpatur. Album, tenue, stomacho utile est, ac facile in membra distribuitur. Nigrum uero, crassum est, & cōcoctu difficile. Carnem alit. Et ebrietatem creat. Giluum, utpote quod medium est, medias inter utrumq; uires habet. In secunda tamē & sinistra ualetudine, cum primis laudatur albū. Quin & uina qualitate distant. Siquidem dulce crassis partibus constat. Et difficilius a corpore discutitur. Stomachū inflat. Aluum & interanea ut multū turbat, sed minus inebriat. Renibus & uesicæ aptissimū. Austerū per urinā celerius transit, sed capita dolore tentat, & temulentia gignit. Acerbum ad ciborū per membra digestionē accommodatissimū. Aluum & ceteras fluxiones cohibet. Nouū, neruos minus tentat. Vinū aqua marina factū, stomacho aduersatur. Sitim stimulat. Neruos infestat. Aluo aptū. A ualetudine se recolligentibus inutile. Passum quod uuis sole siccatis in arca, aut in farmento adustis exprimitur, Creticum cognomine, aut Pramnion, aut Protopon, & Sapa, quæ fit musto igni decocto, Græci syrion, aut Hepsema appellant: quodq; Melas dicit, aut Melampsythiū, crassa sunt, & corpora multū alunt. Candidū tenuius, & medium medias sortitur uires. Omnia tamē adstringunt, & pulsus reuocāt. Faciūt aduersus uenena, quæ exulcerando necant ex oleo pota, & uomitionibus reddita. Contra cicutas, meconiū, uenenum, toxica, & concretū lac. Item contra renū B ac uesicę pruritus, rosiones, exulcerationesq; Inflan tamē, & stomacho aduersantur. Priuatim prodest Melampsythium, si uenter rheumatismū sentiat. Album magis ceteris emollit aluum. Gipsō conditū neruis officit, caput aggrauat & incendit, ac uesicæ aduersatur. Contra uenena ceteris aptius. Picaca, aut resinata, exallfaciūt, cōcoquūt. Sanguinē excrementibus inimica. Quæ uero Parachyta uocant, admistā Sapam recipiūt, caput implent. Temulentia gignunt. Aegrius a corpore discutuntur. Stomachū male habent. Inter Italica uina Falernū principē locū obtinet, quod inueteratū perq; facile coquitur. Languidos pulsus exuscitat. Aluum abstringit. Stomacho utile. Sed uesicę nocet. Atq; ijs qui uisus hebetudinē sentiunt, & ad potus crebros minime idoneū. Albana crassioribus constant partibus. Dulcia stomachū inflant, Ventrem emolliunt. Sed concoctionē non æque adiuuant, & neruosa minus infestāt. Vetustate eadē, austerum saporē concipiūt. Cecubū dulce est, & Albano crassius. Corpus & colorē alit. Aegre tamē coquitur. Surrentinū satis austerū est. Quare intestinorū & stomachi fluxiones cohibet. Et cum tenue sit, caput minus tentat. Inueteratū suauius redditur, & stomacho utile. Adrianiū, & Mamertianū in Sicilia æque crassis partibus gignuntur. Modice adstringunt, & ocysime inueterantur, minusq; ob-

D I O S C O R I D I S

C suam tenuitatem nervos tentant. Paretypianum, & qd ex Adriatico si-
nu deferatur, odoratū ac leuius est. Quare multus epōtus fallit. Diu ser-
uat ebrietatē, et soporē adfert. Istricū Paretypiano simile ē, sed urinā ue-
hemētius pellit. Chiū tñ antedictis mollius, et aptū potui ē. Bene alit, &
minus inebriat. Fluctiōnes cohibet. Oculorū medicamētis utile. Lesbīū
facile mēbra subit, Chio leuius, & alio idoneū. Ephesiū eandē uim ha-
bet. Empygela, et Etinolo Asiae, Mesogites nomine, capitis dolores ciet,
& nervos lēdit. Cōm uero, & Clazomeniū, qm multam sibi maris a-
quam uendicāt, facile corrumpunt. Flatus mouent. Aluū turbant, ner-
uis officiunt. Vinū omne, ut reliqua in cōmune dicantur, merū, ac syn-
cerum, et sua natura austerū, excalfacit. Facile in mēbra distribuitur.
Stomachum adiuuat. Appetentiā ciborum inuitat. Vires alit, ac robur
auget. Somnum conciliat. Et cōmendat colorē. Potū liberalius, auxilio
est contra assumptā cicutam, coriandrum, pharicum, ixiā, meconium,
argenti spumā, taxum, aconitā, fungosue. Contra serpentium morsus, et
omniū ictus quē refrigerando necant, aut stomachū in uomitiones ef-
fundunt. Facit ad longas inflationes, rosionesq; praeordiorū, ac disten-
siones & stomachi singultum, & si uenter aut interanea rheumatismum
D sentiant. Conueniunt sudatoribus, et quibus corpus immodico sudore di-
geritur (Diaphorumenos uocant) maxime alba, uetera, & odorata. Quae
tamen uetustate dulcescunt, renibus ac uescicā accommodatiora reddū-
tur. Vlceribus, inflammationibusq; in succida lana imponuntur. Tetra-
ulcera, & phagedanica, & fluctiōibus obnoxia commode perfundū-
tur. Marina austera, & alba, ad sanorum uictus usurpantur. Iis praestat
Italica, salernum, surentinum, cecubum, signinum, & permulta Campa-
nię, & paratypianum ab Adriatico sinu, & siculum, quod mamertia-
num appellatur. Ex grecis chiū, lesbium in Phygela, & Epheso nas-
cens. Crassa uero & nigra, stomacho negocium exhibent. Inflationem
pariunt. Corpus augent. Tenuia tamen & austera stomacho profunt,
et minus carnes alunt. Vetera ualde tenuia, & candida, uehementius ur-
inam ciunt, & dolores capitis mouent. Nervosq; largius pota tentant.
In media aetate, ut a septimo aēo, potui saluberrima sunt. Modus autē
em pro aetate, & tempore anni, & consuetudine, & qualitate uini defi-
niatur. Non sitire, & modice cibos prolui, optimum est praecceptum.
Nocet ebrietas omnis, et maxime assidua. Siquidē obsessos nervos quo-
tidie relaxat. Largiorq; potus, acutorum morborum adfert initia. Modi-
ce tñ inebriari, aliqt diebus, maxime post aquae potus, utile. Namq; ex-
purgans sensuum excrementa transfert, et per caeca corporis spiramen-
ta discutit. Sed aquam post ebrietatē bibere oportet. Namq; a cura cō-
stitis temulētis quendā auxiliij modū inducit. Omphacites nomine pe-
culiariter fit in Lesbo, siccata sole acri uua, pauloātē maturitatē decerpta,

triduo, aut quatrduo, donec racemi in rugas cōtrahantur. expressumq; **A** uinū cadis insolatur. Vim adstringendi habet. Prodest dissolutis stomacho, & ilei dolore laborantibus. Item pręgnantiū malicię, & crudis. In pestilentia quoq; sōrptū auxiliari dicitur. Huiusmodi uina non nisi post multos annos bibi possunt. Lora, quam Deuteriam, alij Potimon appellant, fieri solet, adiectis metretis tribus aquę, in uinacea, quibus triginta uini metretę extractę fuerint: calcatis uinaceis, expressoq; decocto ad tertias parteis, & additis in singulos congios binis salis sextarijs. Post hyemę transfunditur in uasa. Lora post annū utendum. Etenim celeriter exolefcit. Conuenit agris quibus timemus noxam uini, coactū sape desyderijs eorū obtemperare. Item a longa uoletudine se recolligentibus. Fit & uinum quod Adynamon uocant, Lorę uires habens, hoc modo. Pares aquę & musti mensurę coquuntur molli igne, donec absumatur aqua: quod ubi refrixerit, elutriatum, picato uase reconditur. Alij marinę & cęlestis aquę, mellis, & musti pares miscent portiones, & quadraginta diebus insolant, quo post annū utuntur. Vinum e syluestri uua nigrum adstringit. Prodestalui & stomachi fluctuationibus, & ceteris quibus contractione & contractione opus est.

Vinum Oenos Gręce dicitur. Cratinus Maronē uocat. Philalethen puerbia: quale illud est. Vinum, & ueritas. Item illud. Non habere uinū temones. Pittacus, ut æs frontis, ita uinū mentis esse speculū. Aristophanes Vinum loco Veneris appellat. Poetę uinū etiā πιδός dicunt, quasi uibrare mentem faciat. Vnde Crapula inquit Phorion, dicitur πιδός. Folia Vitis priuatim Oenaria uocant a poetis, & Sarmenta Oenaridos. Ipsa porro lites, ab Hippocrate nominatur Oenarion. Tenuissimū est id qđ celerrime inueteratur. Nam cui fumī amaritudine accescit ætas, insaluberrimū putatur. Quo generosius uinū est, hoc magis uetustate crassescit, & in amaritudinē corpori minime utilem cōit. Saluberrimū Campanię, quodeuncq; tenuissimū, utilissimū cuiq; uiribus edomitis facco. Vinum alit uires, sanguinē, colorē, sicut lactis potus, ossa, frugū, neruos, aquę carnes. Simias & quadrupedes digitatas, negant crescere assuetas uini potu. Vnum de dando uino uolumē Asclepiades cōdidit, ab eo cognominatū, in quo utilitatem eius uix Deorū potentia æquari posse ꝑnunciauit. Vinū succus est, qui seruendo uires emisso sibi fecerit. Mustum Gręci Gleucos, & Gleucinē uocant aliquando. Vinū omne, aut Mustum est, aut uetus, ut in puerbio sit. Vinum medium pro aqua: quod & pīandit caninū dicitur, apud Varronem, & Gellium. In Plauti Cassina, mendosus est senarius.

Pli. li. 27, ca. 1.

B

Adibo, caninam scæuam spero mellorem fore. Scribendum est, non scæuam, sed cœnam caninā, hoc est, abstemiā. In Latino agro, & Campano ad montē Vesuuiū, qui Sumani dicitur, uires modo habentur Gręce appellatę, uino inde presso, qđ Gręci non ante dicitur, qđ anno post calcatas uuas actō. Vilius, qđ diu annicuit est: pīndeq; Viannū, quasi, uinū anni eius, hoc est, Ornū uulgo Tabernę ꝑdicant uēdentiū.

VINI QV ALITAS. De qualitate, & ætate Vini dictū mōx est. Vinū porro tenerū Gręci Apalon, Cato, Lene uocat: cui cōtrarium sit asperū: ut idem auctor appellat, hoc est, Scleron, siue Durum. Nam & Muria, quę aspera esset, durā cognominabat Columellę, Celsoq;. Nisi quis durā Muria, sicut durā Picem, nō pro aspera, sed ꝑ densa spissaq; accipiat, & utiq; ꝑ Garo. Quandoquidē Celsus eā dysentericis cōmendat, sicut Garū Dios. De uino temperando, quod Lympharū, & Dilutū dicūt, alij alia ꝑcipiunt. Hesiodus tres partes aquę in unā Vini miscet. Ceteri meracius fecere, hoc est, ut quinq; in duas adderent. Vnde natū prouerbiū. ἢ πινε πινον, ἢ τρία, ἢ μὴ τέτταρα. Quod Plautus poeta festiuissimus significat, cum de cantione gręca loquitur, in Stichō. Vide inquit, quorū cyathos hos bibimus. Tum ille. Quod digiti sunt tibi in manu.

Cc iij

D I O S C O R I D I S

C Cantio est græca, ἡ πύρα πύρα, ἡ πύρα πύρα μὴ τίτταρα. Est autē sensus: ut aut duas uini partes, ad quatuor laticis, aut unā ad tres bibere oporteat, ad quatuor non oporteat: seu futurum sit dilutius, quæ sanitatis usus exigit. Anacreon, ut Vinarius poeta, unā uini, duabus aquæ tempat. Alij aliter, proprio suo quisque ingenio. Vinū modice incoctū, ut Aristoteli placet, minus officit ebrietatē uitantibus. Temulētæ sunt & animatēs aliq̃t, præter hominem. Sues uinaceis, Corui & Canes herba quā Oenuttā Græci uocāt. Simia & elephātū, uino. Vinū, cui nomē Samagōnio, qd tradidit Aristoteles, tribus heminis, & quidē lymphatis, qdraginta uiros inebriare dicit. Ebrietatē Plato nunq̃, nisi semel anno liberalibus pmisit in legibus. Ante decimū & octauū porro ætatis annū, uino ipandū penitus existimat: ut ne gustet quidē. Mnesitheus Atheniēsis medicus, inebriari nunq̃, sed statis tñ diebus hilarescere pmisit: qd genus Cōthōnismōn a calicis noīe uocauit: ut dilutū nihilominus, & sine bellariōz comitatu bibere. Ac prima quidē potio in cōuiuijs, qā meracā erat, cum p̃fatione ὑπαὶ δαίμονος, in honorē uidelicet Liberi patris, nec tñ tota, sed quasi p̃gustāda p̃bebat. Postrema uero quoniam diluta esset, & salutaris, cum p̃fatione Iouis liberatoris hauriebat. Vinū aqua misceat Staphylus Siteni filius instituit: ob id græcū uulgus non aliter uinū modo noīat q̃ Crasin, hoc est, mixtū.

P A S S V M, E T V I N V M P R O-

tropōn, siue Creticum, siue Pramnon.

Pli. li. 14. ca. 16.

Passum, hoc est, Glycy, gñā habet laudata, P̃sythiū: & a colore appellatū nīgro. Melamp̃sythiū, quæ suū saporem, non uini p̃ferant. Nam in qd additū est Defrutū, Glyxis appellat Aithenarō. Sapa, quā Nonius scribit uulgo dictā suo t̃pore Mellaciū, sit musto ad tertiā partē mensurā decoctō: sicut Epsēma, siue ut Hippocrates Epsēton, hoc est, Defrutū, ad dimidiā: & Calenū, ad partes e tribus duas redactō, Passum probat, Ciliciū, & Africū: & in Italiā, ut qd Neapolitanū uocat, a Columella redditū, prouincijsq̃ finitimis. Oīaq̃ hæc, ut Plinij uerbis utar, post Græcū. Fieri certū est ex uua, quā Græci Sticam uocāt, nō Apianā, q̃ apes cā impopulari gaudeant. Hanc sunt qui Muscatulā uulgo dictā inter p̃rent. Item Venicula, siue ut Cāpani dicūt, Stircula: q̃ et Stacula, & Numisiana appellat, passis. & diutius in uite sole adustis uuis, Straphidion (ut arbitror) uocatū ab Hippocrate, aut seruētē oleo. Quidā e quacūq̃ dulci, dū p̃recoctā. Qz si, quantū uuis exp̃sere, adijciāt uinaceis aquæ puteanæ, secundariū Passum facient. Protropos accipit etiā pro musto, qd sponte defluit anteq̃ calcenī Vuæ, ut est apud Iulij Pollucē. Hoc protinus diffusum, lagenis suis deferuere patiunt: postea in sole quadraginta diebus torrent, ætatis securæ ipso canis ortu. Habetur & Protropiū inter transmarina uinū: quod Athenæus in Lesbo nasci dulce scribit, etiā Prodromon uocatū ab aliquibus. At Pramnon, siue Pramnion Hippocrates, & prior Homērus celebrauit. Premebat hoc Smyrne regio, ut Alciphron Mæandrius scriptū reliquit, Montano uico Latonæ prius dicatō, postea Latorix, nomē id Amazonis. Extabatq̃ id etiānum Plinio prodente, iuxta delubrū matris Deum. Nigri Galenus fuisse uoluit, Athenæus quoq̃ nō crassum, aut dulce, sed durū, austerūq̃: ob id eo Athenienses minime delectari scribit Aristophanes: hoc tñ non Smyrne, sed in insula primū Icaro natū putat Seuius, in petra, quo nomen Pramno. Sed & Pharmaciū dici hoc ipsum quādoq̃ tradit. Pro ueneno est Sapa, si qs ieiunus a balneis bibat eam. Polybius auctor est, Romanas mulieres nō uinū, sed Passum bibere solitas, ad restringendā sitim. Passum uero dictū, quia ex uuis passis, siue quas in uite passis sunt aduri sole, premitt, simile Cretico, & Aegosiēni uocatis. Plautus, Murrinam, inquit, Passum, Defrutum, Mellinam.

D Nonius Murinulum, siue Murinulā uocat, quā alijs Murrinā, nisi uitū in exēplari sit. Varro, mulieres inquit, natu grādiōres, aut Loram, aut Garū, aut Defrutū, aut Passum bibebant, quā Murrinā Plauto appellari putat. Est & Murrina idem qd & Myratū uocant aliqui. Non utiq̃ a Myrtha, sed a Myro, qd est odoramentū: ut post docebimus. Gellius mulieres inq̃t Romanas Lauream, Passum, Murrinā potasse: lauream pro lora capiens. Meminit Varro & potionis genus fuisse Miricā. Nonius duas facit Loras: alterā, quæ sit Deuteria, alterā, quæ Lora constat. Lora uinū dulce, potōis, inq̃t, erat cōfectū, mulieribus grāda uis aptū: qd in q̃busdā codicibus lotā, nōn lorā scriptū inuenio, distinctionis forte gratiā. Laudat a Græcis inter uina dulciā Scybelites: & natū in Arcadia Thyraū. De Cilicio uino mentionē hoc capite habuimus. Forte aut hoc sit, qd e Pisidia medicinæ usu cōmendabatur Anibladēi cognomine, ab oppido: ut Strabo boni placet. Vino autē Aegosiēni, de quo supra diximus, nomen datū quidem uidet ab oppido Aegosthene, qd in Attica terra est. Caterū affirmare non ausim: quādoquidem Carystiū ex Euboia quoq̃ posset existimari, Carysto ibi celebrata scriptoribus. E Laconia tantū uenit Carysto uilla id ferente, quod & Aleman poeta celebrauit, Laconicum uidetur fuisse initio: &

qd Monobasites dicitur, etiam si Creticum hoc nomine intelligimus, corrupte uulgo id uocabatur & uocante Maluasium. Moueor, qd locus ubi Tænarum in Laconia monstratur, Monobasia dicitur hoc tempore, ditionis Veneris id oppidum est, unde in Creta directo fere cursu nauigatur. Forteq Monobasites uino datum nomen fuerit, non qd ibi nascere, sed qd illud primum e Creta cõportaret. Aetate nostra celeberrimum est qd Achaicum uulgo quoq dicitur: fortasse id qd ex Phliunte, oppido quondam Achaiae, Phliasium ab Antiphane praedicatum est: etiam si nunc aliubi quoq seritur.

VINVM GYPSATVM.

Vinum Gypsatum, a Gypso dicitur, sicut a Calce calcatum, a marmore marmoratum. VINVM PICATVM, SIVE RESINATVM.

A Vino Resinato dicta inquit Plinius est Crapula: siue quia caput tentet, quasi lucta eius: siue qd ipsa quoq resina, & flos eius crudus, qui uinis ad excitandam lenitatem additur, Crapula quoq nominari solet. Pugnacibus inquit Plinius mustis, plus Crapulae inditur, lenibus parcius: a quo & uehementia uini, atq feritas crapulae significatur uocabulo. Photionis de crapula interpretationem aliam superius explicui.

VINVM PARACHYTON.

Vinum Parachyton, siue ut Plinius uocat, Diachyton, si modo id est, sit uinis in sole siccatis, loco clauso per dies septem in cratibus, totidem pedibus a terra alte noctibus a rore defensis, s. die calcatis: optimi odoris, saporisq inter dulcia. Etenim Parachyma, Graeci Desfrutū quicq apellant. Vnde uinum originale, hoc est, sine fuce, & sine dulci Aparachyton, & Autiten uocatur. Quamq & alia significatio Autitae uini est: ut aliubi monuimus. Timachidas rhodius uini genus passim dulce Hypochyton in Rhodo uocari tradit. Nam uinum Autoceras hoc dicitur, qd ita est exile, ut dilui non debeat, ut inquit Pollux. Porro nostri, dulcia uina, Liberi patris Bellaria uocabant.

PHALERNUM.

Phalerum, quod Graeci Phalerinum uocant, nec in nouitate, nec in nimia uetustate corpori salubre. Prima eius aetas a decimo, media a quintodecimo anno incipit. A uigesimo capiti, & neruis est noxium. Duo eius genera. Austerum, cui rufus color: & dulce: quod tunc demum accedit, cum sub ipsam uindemiam austri flauerint: quo & nigrius efficitur. Athenaeus, & Galenus auctores. Phalerum Statinum simile est, tantum leuius. Simile & Venaphrantum.

Albani quoq duo sunt discrimina, subacribum, & dulce. Vfus eque a quintodecimo aetatis anno. Inter Albanum, Phalerumq Labicano gloria: quod est dulce, ac pingue gustui feritur. A decimo placere incipiente. Buxentinum Albano simile est, utiq acerbo.

CECVBVM.

Cecubum iam non gignitur, frequens olim in Terracina, fundisq: sicut & Setia. Parum a superioribus Statana non longo fuerunt intervallo. Nam Signinum nomen celebre alio sistenda, in sexennium uetustate melius.

SVRENTINVM.

Surentinum, ueteres maxime probauerunt. Sequens aetas, Albanum, aut Phalerum. Deinde alia alij. Virium plus Surentino, austeritatis Albano, uehementius minus Phalerino. Surentinum a. 22. anno poculentum facit: quoniam macilentum, & aridum cum sit, acre concoquitur, nec nisi uetustate castigatum utentibus prodest; qd & Tripholino accedit. Simile est & Aequanum. Celebrantur a medicis & Rheginum, Surentino pinguius, eoq celerius ad bibendum utile. Item Priuerinum Rheginum tenuius: & Phormianum Priuernum simile, duntaxat crassius. Tiburtino tenuitas receditur: idq a decimo anno bibitur. Praenestinum Tiburtino pinguius. Gaurano praestantiam paucitas quoq ipsa facit: ualidum hoc, & praerassum. Marsicum austerum. Austerum & Barbinum Athenaeo: qd Balbinum dicitur, Balbiae proueniens Plinio. E Campania, ppe Cumas, Vluanum commendat: quinto demum anno poculentum, leue. Iam Calienum, quod & Phalerum praefert, ad utilitates stomachi. Fundanum plus iusto alit: ideo parcius erat conuiuijs: qd & caput, & stomachum tentabat. Sabinum leuitate praeponebatur omnibus. Vsum eius a septimo ad quintumdecimum aetatis annum probabant. Nomentanum a quinto anno incipit: nec leue, nec admodum suauis. Spolentinum suauis, coloris aurei. Caulinum prope Capuam, fortasse id quod eo loco tradit Polybius Anadendritum uocari, praeratum omnibus. Circa Neapolim Trebellicum. Herbulo color niger, non multos post annos candidus: delicatum hoc, & per se leue. Tarentina, & quaecumq illo tractu habentur, tenera sunt, & dulcia, & amica stomacho: cuiusmodi Lagaria, non procul Grumentum nascentia, Messalae potus, & salute, ut Plinius retulit, insignia. Beneuenti fiebat Infumatum, quod Graece Capnia dicitur, a Platone comico, quentadmodum & uuae fabrorum ferariorum, maxime fornacibus ex Africa, praecipua Tiberij Caesaris cura.

A

Pli. li. 4. ca. 5.

B

D I O S C O R I D I S

A D R I A N V M.

Pli. li. 14. ca. 6.
per omnia.

CAdriana optima, ex intimo sinu Adriatici maris: quæ Pucina, a loco ibi sito dicta sunt: & a Græcis Pyctana, medicamentis aptissima: quibus Liuius Augusti octauaginta duos quibus uixit annos, retulit acceptos, non aquosis. Haud procul a Timæi fonte, saxeo colle, maritimo afflatu, paucas coquente amphoras, Britannorū regi adeo gratū, ut quotannis deferendū sibi curaret, Mamertinū uero, a colonis eius loci, non Messenū, ut inquit Strabo dicitur, etiā circa Messanā in Sicilia proueniat. Hoc & Italicū quoq; dicitur, etiā extra Italiā, ut Athenæus inquit, nascit. Siculū est, & Potulanū ab auctore dictū, qua proxima est Italiæ Sicilia. In eadem prouincia & Taurominitanis honoris lagenis, pro Mamertino plarumq; subiectis.

P R A E T V C I V M.

Praetucia ex supero mari, sicut & Ancone nascētia, & quæ a palma uua forte enata. Palmae ita appellant: ut Plinio placet. Cassiodorus, Vinū quoddā inquit Brutū appellauit, Palmatia nūm laudare cupiens antiquitas. Nos Stylin, asperū, sed gratū suauitate. Nā licet inquit, inter uina Brutia uideat extremū factum, tū est bene gñali opinione p̄cipuū. Est em̄ suauī pinguedine molliter crassum, uiuacitate firmū, nari uiolenti, candore perspicuū, qd ita redolet ore tractatū, ut merito illi a palma uideat nomē impositū. Viscere defecta cōstringit, uulnera madida desiccant, lassum pectus reficit. Praetuciū multo p̄cipue cōuenire dicit, sicut Apamenū Syriæ. In ter externa Syriacū est: & qd reges Persarū bibebant, Chalyboniū uocatū: ut Straboni placet. Hoc Possidonius in Damasco Syriæ nasci tradit, eorūdem regum cura satum.

H I S T R I A N V M.

Histriano p̄ximū natione Liburnicū fuit, ex Issa insula, qd Agatharchides p̄fert oībus.

C H I V M.

Chium, & Chiothes dicitur, hoc & Thasium. E uinis trāsmaria ueteribus fuisse in summa gloria. Theophrastus Thasium, quod magistratus bibebant, antepōnit omnibus. Tertio loco habebatur Clazomeniū, postq; parcius mari condere cōperūt, utiq; post homericā illa, Pram-nion, & Maronites, siue, quod idem est, Maronæum, in Thraciæ maritima parte genitum, uiti-ties tantum addito aquæ miscendum Homerus censuit. Vinū eius ad Plinium durasse legimus, prodentem sextarios singulos, octogenis aquæ diluit: nigrum colore, & odoratum, & uetusta-te pinguescens. Hinc (ut arbitror) Cratinus, uinum ipsum appellabat Maronem. Nam Mo-narites aliud uini genus est, Cappadociæ Melitena eius parte nascens, non postferendum no-stratibus præstantia. Maronæum, a Marone filio Euanthis, satum publicatumq; Philostratus in heroicis suis testatur. Pram-nion, a uite Primna dictum uolunt, aliqui a mansuetudine: qui-dam a caudicis crassitudine, quasi distinguatur a Crucio uocato. Est autē Crucium e uitis altissimis, q̄les Aricinæ sunt, acerbiusculū, & asperū. Porro Thracia putant & Ismarici a Pol-luce, Biblinū ab Homero notatū: siue q; Biblina ea terra dicere, q̄ nūc Tifara, & Oesyma noia-tur: siue ut Epicharmo placet, a Biblinis Thraciæ mōtibus uocatis. Seruius Naxiū id existiat, qd Archilochus nectari cōparatū scribit a Bimblino, siue Biblo amne. Hoc i Sicilia Polū, siue Polgum appellari, qm̄ a Polide sicyonio, siue Rhegino, qui Syraculis regnauit translātū eo sit. Quidā a uite Biblia, q̄ in Italia uisat dicat. Nā Byelos p, y, oppidū est i Phœnice uetustissimū: ut qd a Saturno conditū putet: ubi uinū quoq; medicamētolum ex herba fidicula cōficiū: ut di-ximus. Differt a Maronæo Mareoticū in Aegypto, a Maria lacu dictū, ubi nascit, ad uetustatē quoq; diffundi solitū. Nā uicinū ei Libycū appellatū, p̄fertimq; ad Antiphras notū: improbat uel adagio, qm̄ minus uini, q̄ maris habeat. Alexādræ id uulgo bibūt præcrude ac Zythū: ut Strabo inq; etiā nō Zythos, sed Zygon interps in eo legerit, & ad pōdera uti uino eo Alexā-drinos ineptissime cōuerterit: in quē errorē & Domitius Veronēsis p̄nus corruit, in Propem-pico Papini, qd incipit, Si quibus audaces amor est seruare carinas.

Oīa porro trāsmarina septē, in sex annis ad uetustatē mediā peruenire existimant. Vino Chio ueteres in oculorū uitiis uti solitos, nomen ipsum indicat Collyriorum quorundā, quæ Græci Chiaca cognouant. Hoc uinū & Ariusia, a loco, & optimū qd esset Aristem uocabant, Iulius Pollux auctor. Nigrū uinū in Chio primū fuisse Theopompus auctor est. Nam et uicē ferere in eadē insula, repertū putant ab Oenopione Liberi patris filio: qui & urbē in ea condidit.

Lesbium, sponte naturæ suæ mare sapit. Hoc & Protropū dicitur quotiens dulce est, itemq; Prodromon, Athenæus auctor. Querat aliquis in Vidruuio, quis sit uerborū sensus, cum dicit. Sed animaduertimus insulam Lesbos, uinum protitum, maloniam, catacecaumenen, Item Lydiā molliton. Corrupta lectio: quæ sic restituēda est. Sed animaduertimus insulam Lesbos Protropon, Mxoniam, Catacecaumeniten; Lydiā, Tmolitē dare, De Protropo di-

etum est superius, de Tmolite statim fiet mentio, de Catacecaumene Strabo. Catacecaumene inquit regio est, quam alij Mysiam, alij Mozoniam appellant. Dictam uero ita, quod nihil in ea præter uinum gignatur: idque nobilissimum, ambusta uelut igni terra.

E P H E S I V M.

Ephesium Defruto, & mari conditur: ideo insalubre. Phygelites appellatur ab oppido propinquo, quod Phygela Plinius, Pygellam plerique noiauerunt. In nomine sunt & transmarina, & Leucadii, & Sapia, & Thasium: quibus principatum dat Hermippus in oppido Opunte: quod et Plautus in Penulo demonstrat, sumptum ab Eubulo. Item ex Euboica Sciatho, et e Peparetho insulis. Quod postremum hoc, multi sunt qui dantur. Iam e Syria Phoeniciu uocatum quadoque Cycli: cuius & Xenophon in ascensu meminit. Laudatur & Magneticu, & ut alibi diximus, Mendacum. Præterea ex Acantho urbe. Nam Cirimphiu asperum continetur. Troezeni, ut ait Aristoteles, Anthedonidiu, & Hyperandiū cōmendant, auctores suorum nominibus, Hypero, & Anthē: quæadmodum & Althephiadiū ab Althebio: quod ex Alphei nepotibus fuit. Apyru quoque uinum ab Alcmane poeta memoratur. Est autem Apyron, quodcumque non est coctum. Laconica sunt Penatophiū a quinque collibus, ubi nascitur uocatur: item Denthiadiū, siue Denthis: & Oenuntiu, & Onoglis, & Stachiniū, a locis omnia, quæ iuxta Pytanem sunt oppidū eius terræ. Theophrastus Erythæum molle falsumque: idem Heracleoticu tradit odoratu, atque durum.

M E S S O G I T E S.

Messogites, & Tmolitu, aut quod idem est Tmolites, duo sunt uini genera, nomine a montibus Lydiae imposito, qui Tmolus, & Messogis appellantur. Messogites uero nobilissimu a loco Aro-meum nomine, correpta secunda syllaba, ut Straboni placet. Tmolio per se gratia, ut uinum non est, sed cuius dulci admixto, reliquorum duricia suauitatem accipiat simul, & ætatem. Ex eadem Lydia & Metropolitē uinum cōmendant, ab oppido eius uho Metropoli uocato.

V I N V M I N C O M M V N E.

De uino Incōmuni, non nihil & in mentione Annosi diximus. Nunc illud adiicio. Vinum omne in infantia dulce est, tum uidelicet cum Mustum dicitur. Vbi autem pubescit, suauius efficitur, quod dulcius. Dulcedo enim feruendo adimitur Vinis. Vinum porro, aut uetus, aut nouum est, Media ætas a medicis introducta est. Vulgo nescitur. Vnde notum prouerbiū Varroni, Medium uinum, prandiu caninum esse: hoc est, quia nullum tale uinum habeatur. Vt uelut asininum Aristophani, pro eo, quod nescit sit.

V I N V M O M P H A C I T E S.

Vinum Omphacites, siue Omphacitu, uidetur idem esse, quod & Bixon Græci appellauerunt: quodque marinam ei aqua largiorem misceri adiungunt, Cetero cōueniunt. Medicinæ item congruunt. Vt errare uideantur, qui non Bixon, sed Bion, quasi a uita deriuatum nomen scripserunt: cum Plinius, a festinatione, quasi uolenter fiat, uocari prodiderit.

V I N V M D E V T E R I A.

Deuterias nostri Loras, siue Loreas, ut Cato, & secundaria, & operaria uilla nominant, Lora, quod lora acina fiat, uocatur. Inter Deuterias, & Fecatum Cato appellat facibus uini expressum, quod a Columella Fecinum dici puto, a Polluce Trygephanion. Plinius Tortium inquit, nouissime expressum intelligo: quod Cato Mustis tingendi gratia, ut pigmentum aliud quod adijciendum præcipit. Græci hoc uulgo Thamnam uocant, apud quos Autites uinum, pro Deuteria sunt qui capiant. Alij pro syncero, alij pro nostrate, hoc est, non alienigena, sed patrio Galeno. Galenus in Hippocrate Autiten interpretatur, quasi autoctenem, hoc est, anniculum, siue ornum. Est & Tornij uini mentio apud Hippocratem, ad pulmonum præsidia. Vtiosum uinum Græci Tropian, & Ectropian, & Oxynon dicunt. Genus uini est & quod Grapianam uocant, subasperu. Nulli ex his plusquam anno usus. Erant & quæ Spurca dicebantur uinæ: sed apud Pontifices, hoc est, quæ sacris adhiberi uetabantur: ut Defrutu, & Dilutu: & igni tantum: sed & Mustu quoque, antequam deferuere. Vinu porro malum, Amphigraece dicitur a Sofirate, quasi dubiu: ita enim uocauimus & nos, auctore Plinio Fugacia. Præliganea uocatur & quæ ad operarios, ut Cato inquit, ex miscellis uuis premuntur. Circumcidanea uero, siue ut Varro, Circumcisa uina dicimus, cum calcatis uuis scopi earu, siue scopia, ut Cato, cum folliculis prælo subiiciuntur iteru: hoc est, ubi desit fluere circumcisis extremis: non dissimile Tortino, quod Græci Boftrichitin (ut puto) uocant. Tortinu enim Columella dicit esse Mustum, quod post primam pressuram uinaceoru circumciso pede exprimitur.

V I N V M A D Y N A M O N.

Adynamon ratio facienti uaria, sed omnibus fere cognita.

A

B

Pli. li. 14. ca. 10.

D I O S C O R I D I S

E X M. V E R G. C O M M.

C Descendentibus quondā ex Sicilia in Italiam Troianis, quæ uniuersæ classi & genti satis forent uina, bonus subinde cadis onerarat Acestes: Carthaginensis regina etiā, exceptis a naufragio ipsidem cum rege suo, centū instituerat famulas, totidemq; pares ætate ministros: qui dapibus onerarent mensas, & pocula cunctis deinceps ponerent. Ipsa etiā cum laticum in mensam libasset honorem, Bitiaq; poculū increpitans dedisset, tanta copia diffundi uinū iussit, ut cum pleno ille se proluisset auro, post alij omnes biberent procures. Tantus præterea, & eouq; uini laudator in suo carmine Homerus quibusdam uisus est, ut una hac suspiciōe, uinosus facile creditus fuerit. Fuerunt & in alijs cœnarū apparatibus numerata a poetis, præsertimq; a Flacco in carminibus suis, tam multa & generosa uina, ut naturæ copiam, & hominum pro uita & uoluptatibus studium & artem merito aliquis in uino admiretur. Nullus tamen, toto orbe nascentibus uinis, & quibus tunc gentes maxime uterentur, plures, certioresq; ad salutem & noxam scriptore hoc notas assignauit, nec aliunde, ad utramq; fortunā, ex uini usu maior homini, q̃ ex eo occasio est. In cæteris enim uinis, aut alterius horæ uoluptas in cōuiuio quæ sita uino est: laudauitq; unusquisq; aut quod maxime apud se natū nouisset, aut quod ingenio, naturæq; suæ apuissimū sentiret: in hoc longiore historia, cunctoꝝ habitā rōne, singulorūq; in natura decretis uiribus, nihil desyderandū legentibus relinquit: siue ad uoluptatē cœnas, siue ad honorem cōuiuia & epulas, siue ad ebrietatem cōmessationes, siue in quotidiano usu pocula, siue ad medicinā remedia parasse aliquis sibi uelit. Magna sane in multiplici hoc bono, & liberalior naturæ uarietas: nō minor tamē scriptoris huius diligentia, qui obseruatis toto orbe per se nascentis, & humano artificio exculti uini potestate & uiribus: a principio statim uetustatē in eo, damnare incipiens, uariato librarioꝝ incuria sermonis ductu, dubitandū legentibus relinquit, simpliciter ne, uitanda foris & intus uetusta uina sint, his qui uitiosa & infirma interiore aliqua parte sint: an uitanda intus tantū his, qui infirma & uitiosa interiore aliqua parte sint. Dubitationi huic, & si non multifacienda sit, causam dedit, q̃ in antiquis græcis diuerso loco librarij dictiones eas pupugerunt. Sunt enim in quibus legitur, ἀσθίνῃσι μίρον ἔχοντων ἴδιον παραπαι-
τητόν, &c. Quod est. His quibus uitiosa & infirma interior aliqua pars sit, uitanda esse hæc uina. In aliquibus autem, ἀσθίνῃσι μίρον ἔχοντων ἴδιον παραπαιτητόν, &c. Quod est. Vitanda his intus uina hæc esse, id est, non bibenda, qui infirmā aliquam partē habent, non interiorem magis q̃ exteriorem: quasi intus damnandus, foris autē concedendus eorū usus sit. Nos in ambiguo com muniore lectionem secuti, & ex potiore, frequentioreq; uini usu, grauioreq; eius noxa rem do cuimus, uitanda his uetusta uina p̃cipientes, qui interiore aliqua parte infirma sint.

D

De Melitide uino.

C A P. VIII.

οἶνον μελιτίδα

Melitides datur in longis febribus, quæ stomachum infirmarunt. Namq; aluū emollit. Vrinam ciēt. Stomachum expurgat. Prodest articulario morbo, renibus, imbecillo capiti, & mulieribus abstemiis. Odoratum siquidem est, & corpus alit. Distat a mulso quod sit e uino uetere, austero, & melle exiguo. Melitides autē adiecto ad quinq; con gios austeri musti, mellis congio, & salis cyatho, cortinis magnis, quo ma gis ad effluuiscēdum locus pateat, fieri oportet, sensim asperso sale. Cūq; effluere desierit, in alia uasa transfunditur.

Pli. li. 14. ca. 9.

B A R B A R I C O R O L L.

D Vlci e genere est Melitites, sed austerrum seculis. Iam fieri desisse Plinius existimat. Sit autem Melitites id, quod in Pseudulo uocat Plautus Mellinam illo uersu, Murrinam, Passum, Defrutum, Mellinam, in medio relinquimus.

E X M. V E R G. C O M M.

Deserat, quo tempore naturalē historiam suā Plinius cōmentabat, multoq; antea in usu esse Melitite hoc uinū: quoniā inflationes faceret, damnatū: & nihilominus confectiōe eius, et ipse docet. 14. uolumine, capite. 9. eandē huic scriptori, aut paulo diuersam, medicināq; itidem 22. capite. 24. Quo minus miretur aliquis, nunc in nullo honore esse, uicq; in medicina nomen eius audiri. Antiquiores tamen oēs, ad explendā totius uini historiā de eo cum cæteris uini ge-

neribus tradiderunt; non inuiti penitus, sed quod posset medicinā & ipsum augere, & humā-
næ salutis aliquando adesse: præsertimq; ut hic ait, *γυναικὶν ὑδρὸ ποτοῦ αἰσ*. Quod cæteri interpre-
tes mulieribus uini abstemijs, ex Plinio uerterunt, nos simplicius, aquā bibentibus: haud sanè
quā non id. pbemus, sed q̄ nescimus, an uini abstemias simpliciter mulieres hic dicat: an in fœ-
tūra uinum fastidientes, ideoq; aquā bibentes. Ex quo em̄ hic uini huius usum ad mulieres pri-
uatim contraxit, certā etiam priuatimq; in fœminis cognoscendam causam intelligi uoluisse ui-
detur. Si em̄ simpliciter uini abstemijs dandum hoc uinū sit, non magis fœminis q̄ uiris dandū
erit. In utroq; enim sexu abstemijs uini passim uidemus. Quodq; in fœminis, idem in uiris
etiā hoc uinum pōterit. Credimus ideo nos sic intelligi locū oportere: fastidientibusq; in fœtu-
ra uinum mulieribus Melitide dandū. Eamq; ob causam, quoniā latius patet abstemijs uox, bi-
bentes aquā mulieres nos diximus. Eoq; pertinere uidet̄ quod statim sequitur, Odoratum em̄
est, & nutrit. Quorum alterū pertinet ad discutienda fastidia: alterū ad uitæ nutrimentum, quo
tunc maxime ad incrementū & firmitatem fœtus prægnantes indigent. Quod etiā a Dios. con-
stituitur *νεφριτικόν*, id est, cum urinæ malo aliquo renum doloribus prodesse, in melioribus gre-
cis non legitur. Nos tamē comunem secuti lectionē, eam seruauimus uocem, medicis diligent-
ius excutiendum relinquentes, quo modo huic malo prodesse Melitide hoc uinū possit. Adj-
cimus illud etiam, quoniā neruorum infirmitati omnes utile tradiderunt, & inter latinos Plini-
us, etiā non male suspicaturum aliquem, quoniā idem in grecis renum & neruorū uotis prin-
cipium est, uocatq; ea gens renes *νεφροί*, neruos autem *νεύρα*, potuisse eas librarum imperi-
ria uoces commutari, & pro neruis renes scribi. Medicinæ quidem id certius responderet: in
qua præcipitur, uitanda omnibus uina esse quibus uitio aliquo laborant nerui: turoq; his pro
uino Melitide hoc dari. Coniecturas tamen hæc nos, non detrecta esse uolumus.

De Mulso.

CAP. IX.

Mulsum e uetere uino austeroq; & bono melle factum præfer-
tur. Minus enim inflat, ac celeriter id genus uigorē adipiscit̄.
Vetus corpus alit. Mediā ætate, aluo prodest. Vrinā pellit. Ab ultimo
cibo sumptū nocet. Et inter initia potum implet. Dein appetendi aui-
ditatē reuocat. Fit mulsum duabus uini metretis, ammixta una mellis.
Aliqui quo celerius præberi possit, mel cum uino coquūt, & ita trans-
fundunt. Alij utilitatis gratia, ad sextarios sex musti feruentis, unum
mellis adijciunt, & ubi ferbuerit, uase recondūt. Dulce aut̄ permanet.

BARBARI COROLL.

Oenomeli, hoc est, uinum Mulsum: quamq; nostri sine uini mentione hoc intelligūt, Mul-
sum dicentes. Vinum hoc facillime cum melle cōcorporatur, quod in dulci nunq̄ euenit. Mul-
sum in Thracia primus Aristeus comperit. Multi senectam longam instinctu Mulsi tolerauere,
neq; alio ullo cibo. Regium morbū Varro cognominatum aquatorium tradit, quoniā cure-
tur Mulso. Cissibiles genus uini est, in Galatia nascens, & Balincium in Sicilia, quæ saporem
Mulsi, non uini præbeant. Ex musto, quod fit Mulsum, Græci Nectar uocant.

EX M. VERG. COMM.

Fuit quondam in honore & dignitate Mulsum, uulgaris res, et quotidianus homini potus:
qui rusticas & urbanas cellas pariter augeret: nec aliter q̄ cætera uina, cum opus esset, ad usum
familie seruarietur. Nunc mutatis moribus, & faciendæ homini medicinæ rationibus solū eius
auditur nomē. Idq; inmerito, modo uera sint quæ Plinius tradidit, interrogatū Pollionem Ro-
mulum Cæsarīs hospitem, centesimū annū excedentē, qua nam ratione maxime uigorē illū
animi corporisq; custodisset? Respōdisse, foris oleo, intus Mulso. Egregia sane utriusq; laude;
sed eo Mulsi maiore q̄ olei, quo meliora, uitalioraq; hominis intus q̄ foris principia & uires
sunt. Quo magis demiremur, exoleuisse penitus Mulsi usum: qui multus antiquis ideo fuit, q̄
psuaderentur, omne animę asperitatem dulcoribus succis mitigari, spiritus leniri, transitū, &
molliores fieri meatus, experimentaq; in se ipso cuiq; esse. Quando omnis animi impetus ci-
bo & potu mollietur: eoq; præsertim, qui non solum corporum medicinam, sed & morum eti-
am habeat. In quo genere Mulsum præcipue laudauerunt ueteres. Cuncta tamen hæc bona
præfens inflationis periculū & noxa inuitia homini fecit: desieruntq; uti eo homines: nocere

Dd

D I O S C O R I D I S

Cibi ea ratione sentientes: paulatimq; cum usu confectionis ratio etiam perijt. Nos tamen si cui nouisse eam gratum sit, ex Palladio qualis scribente eo erat docebimus. Qui. 12. libro in Octobri mense de Mulsi confectione sic docuit. Mustum de maioribus & egregijs uitibus post. 10. dies q; leuatum fuerit, ex lacu quantum uolueris sumis; & ei mellis non despumati optimi quintam partem prius tritam fortiter donec albescat admisces: & agitabis ex canna uehementer. Moebis autem sic per dies. 40. continuos, uel quod est melius quinquaginta: ita, ut cum moueris mundo linteo tegas, per quod facile confectio aestuanda suspiret. Post dies ergo quinquaginta munda manu purgas quodcunq; supernabit, & in uasculo gypso diligenter includis, & ad uetustatem referuas; melius tamen si in minora & picata uascula proximo uere trasfundas: & gypsata diligenter operies, & in terrena & frigida cella recondes, uel harenis fluuialibus, uel eodem solo uascula ex aliqua parte submergas. Hoc nulla uitiatur ætate si diligenter effeceris. Et hæc de confectione Mulsi satis modo dicta sint. Quibus in scriptore hoc addendum fuerat: quidnam, & qua ratione hic dicar simpliciter implere Mulsum: nisi id medicis constituendum relinquere mus, qui ex uini mellisq; natura quid, & quo modo Mulsum impleat facile intelligunt.

μυλίσκρον

De Aquâ mulsa. CAP. X.

Aqua mulsa easdem quas Mulsum uires possidet. Decocta utimur, cum moliri defectionem, aut uomitionem incitare uoluimus, ut ijs qui uenena hauserunt ex oleo. Decocta datur imbecillis, & hominibus elanguescentis pulsus, quos illi dixere Microsphyctos, tussientibus, peripneumonicis, & ijs qui immodico sudore digeruntur, latiparatum repositumq; quod aliqui hydromeli pprie uocant, media ætate Adynamo uino, aut Loræ correspondet, & similem uim adipiscitur. Quare inflammationibus alicuius membri plus q; Lora prodest. Intuere rati tamen usus damnatur, inflammationis, aut constrictis. Sed laboranti stomacho, aut cibum fastidienti, sudatoribusue conuenit. Fit duabus pluuiæ aque ueteris ad unam mellis partem additis, & insolatis. Alij fontanam aquam adijciunt, & ad tertias partis decoquunt, & ita recondunt. Nec defunt qui hydromeli appellent, qd a melle elutis aqua fauis confici soleat. Sed meracius facere conuenit. Aliqui id coquunt. Aegrotantibus noxium est: qm plurimam sibi floris cerei partem uendicat.

MELICRATON. BARBARI COROLL.

Meliceraton, & mixtum mel, & aqua mulsa dicitur interim, & dulcis aqua. Rationes aquæ mulsæ conficiendæ plures sunt apud rei rusticæ scriptores. Alia res est Metaceras apud Hippocratem, quæ uox egelidum, siue quod idem est, tepidum mixtum significat, hoc est, Galactodes syncrama. Iulius Pollux nescio q; recte, Meliceratum inquit est, quod nunc Oenomeli uocamus. Cæteri magno hæc discrimine separauerunt. In Aethiopia Troglodytæ Meliceratum e cuiusdam herbæ floribus conficiunt, proceribus bibendū uini loco, sicut dilutū Paliuri, populo, q; Hydromeli, secundum Aquæ mulsæ genus est, saporem uini uetustate assequitur: nusq; magis laudatū, q; in Phrygia, ex imbre quidem puro, & melle: damnatum multis annis, q; idem ut ijs quibus uinum, nec iisdem utilitatibus.

EX M. VERG. COMM.

Requens, & nullo nō fere capite repetita μυλίσκρον, et ὁρομίδιες huic scriptori uox est, tam exiguo rei discrimine, si substantia & usus æstimeretur, ut totam nominis, nullam autem rei differentiam fuisse antiquis in ea merito quispiam crediderit. Vtræq; enim melle, & aqua constat: & idem fere Plinio & alijs utriusq; usus sunt. Quod differre in eis uidetur, sola confectionis ratio est. Quam pleriq; non tanti faciunt, ut diuersi generis ob id eas faciant. Hic tamen, et post eū Plinius, omnesq; alij seorsum de utraq; agentes, diuersas merito constituisse creduntur. Eamq; ob causam diuersis nominibus in scriptore hæc indicatas, diuersis & nos appellationibus eas indicauimus, dulcem alteram, mulsam aquā alteram appellantes. Fuitq; nobis dulcis aquæ au-

Astor Columella, qui postremum Hydromelis genus, quod maceratis aqua fauis fieret, a Dios. proprio, & uero Hydromeli additum dulcem, 13. uolumine, capite. 11. aqua nominauit; inscrip- pro etiā de dulcis aque confectione capitis titulo: ut diuersis uocibus in opere hoc, diuersa sal- tem confectione Hydromelis ab aqua Mulsā ostenderetur. Et si quod maxime inter eas differt, so- la ætas est: dicente Plinio, Mulsæ aque genera duo, subitæ, ac recentis alterū; inueteratæ alterum. Nec Plinio tm̄, sed hoc ipso scriptore etiam: qui cum Melicratum, quam nos Mulsam aquā in- terpretati sumus, proposuisset, subitā & recentem illā Plinij intelligēs, subiicit statim, τὸ δὲ πρὸν- τὸν ἡδὺ ἀπὸ δέπνου. Quod est, ut nos uertimus, Quæ aut maior apparatu inueterata seruatur. &c. In qua descriptione Hydromel, id est, dulcem aquā a nobis dictam intelligi tantū uoluit; preser- tim cum adiecit, quā priuatim quidā Hydromel uocant. Congeneres em̄, & eiusdem substan- tiæ dulcis, & Mulsā aque sunt, & sola uetustatis ratione inter se differūt. Eamq; ob causam pro- miscuum in medicina usum habuerūt; præterq; in quibus nouitas, aut uetustas eius priuatim exigeretur. Quod nos ignorantes, seruatis ubiq; scriptoris huius uocibus, isdemq; uestigijs eū secuti: ubi Hydromel erat, dulcem; ubi Melicratū, Mulsam aquā semper reddidimus: ne si hoc magis q̄ illud exigeretur genus, uocū earū uarietate, & inconstantia, grauiore periculo morbo- rum remedia misceretur. Quotidianus, ut uidetur, cōmunisq; utriusq; huius aque quondam fuit usus. Indicantq; id rei rusticæ Romani scriptores: qui nisi ad usum familiæ confici, & serua- ri consueuisset, nunq; in ruris disciplina de cōfectione eius tam certe docuissent. In quo monu- isse illud uolumus: a Columella lib. 13. capite. 12. Mulsam appellari aquā utrumq; hoc genus: a Palladio contra in Iulio mense Hydromel: quoniā, ut diximus, facile miscebantur, quæ tan- topere inter se similia erant: præsertimq; ab his, qui non ut in medicina oportet, certū illud & ex- actum quærerent. Docuit Hydromelis confectionem Plinius lib. 14. capite. 17. uinumq; ap- pellauit, ob eam quæ mox patebit causam. Verba eius sunt. Fit uinum ex aqua ac melle tantū. Quinquennio ad hoc seruari cœlestē iubent prudentiores aliqui. Alij statim ad tertias partes decoquunt, & tertā mellis ueteris adijciunt: deinde quadraginta diebus canis ortu in sole ha- bent. Alij diffusa ita decimo die obturant. Vocatur hoc Hydromel, & uetustate saporem uini assequitur. Sapore uini uetustate assequi Hydromel Plinius ait: eamq; ob causam uinum uo- cari: cum tamen nihil uini admixtum habeat. Hic non saporem uini, sed uires asseq dixit, Lo- ræq; pares habere uires: utile instaurandis in ualitudine ægrotorum uinibus: q̄ apperentibus his uinum innocenter potu daretur. Diximus ex Plinio, quale Hydromel quondam fuerit: di- cemus nūc ex Columella, qualis Mulsā aqua fuerit: ut utriusq; certior ratio pateat. Verba eius sunt. Hæc aut non uno modo componitur. Nam quidam ante multos annos cœlestem aquā ualis includunt, & sub dio in sole habent. Deinde cum sæpius eam in alia uasa transfuderint, & eliquauerint (nam quotiens etiā per longum tempus diffunditur, aliquid crassamenti in imo simile feci reperitur) ueteris aquæ sextarium cum libra mellis miscent. Nonnulli tamen cum austeriorem uolunt efficere gustū, sextarium aquæ cum dodrante pondo mellis diluunt: & ea portione repletā lagenam, gypsatamq; patiuntur per caniculæ ortū in sole quadraginta diebus esse: tum dein in tabulatum quod sumū accipiat reponunt. Nonnulli, quibus non fuit curæ cœlestem inueterare aquā, recentem sumunt, eamq; usq; in quartā partem decoquunt: deinde cum refrixerit, si dulciore Mulsam facere uolunt, duobus aquæ sextarijs sextarium mellis pro- miscent: si uero austeriorem, sextario aque dodrantē mellis adijciunt: & his portiōibus factā in lagenam diffundunt, eamq; sicut supra dixi. 40. diebus in solatam in tabulatum postea quod suffumigetur reponunt. Et hæc quidem Columella: cui non dissimilia Palladius insinuit quo diximus loco. Docet præterea Columella alterius dulcis aquæ confectionem, quæ maceratis aqua fauis, & fauorū ceris fieret: quā Dios. in postremo capite numerat. Eam poterunt uolen- tes in eo scriptore uidere, 11. tertij decimi uoluminis capite: quæ in medicinæ usu damnata ab eo est: quoniā stomachi, & præcordiorum inflationes faceret: confectionē tamen eius monstrauit, quoniā condituris oliuarum, aliarūq; huiusmodi rerum pro Desfruto utilis esset, & cibariū saporē haberet. Prodesse Mulsam aquam, dariq; decoctā Dios. ait. τὸ μικρὸν φύντος καὶ ἀσθενείαν, quod est, ut nos uertimus, his qui pusillis uenarū pulsibus & multa corporis infirmitate sint. Plinius tamen aliter docere rem uidetur. Vigesimo em̄ secundo uolumine, capite. 24. ait. In- uenio etiā apud auctores hunc potum bibendū aliosis. Item animi humilis & præparci, quos il- li dixere Micropsychos. Videturq; Micropsychos & humilis & præparci animi eos appellare, quos hic μικροψύχτος, & ἀσθενὴς uocat. Quæ omnes uoces ad corpus, non ad animū referendæ sunt. Monuisse id placuit, quoniā diuersa penitus Mulsæ aquæ tribuisse auctores hi uidentur. Nobis in scriptoris huius sententiā magis inclinatur animus. Relinquamusq; peritioribus cogitandū

Dd ij

C quale sit quod a Plinio dicitur. Sunt autem pusillae uenae: pulsibus huic scriptori homines, quibus ut Galenus in diffinitionibus suis docuit, exigui uenarum pulsus sentiuntur ad minimam longitudinem, altitudinemque & latitudinem extollente se & insurgente arteria.

De Aqua. CAP. XI.

Aquam in uniuersum, propter locorum proprietates & peculiares naturas, coelum, & alia pleraque, difficile est experiri. Magna tamen ex parte optima est dulcis, syncera, nullius omnino qualitatis particeps. Et quae ne minimo quidem tempore in praecordiis commoratur. Ad haec, quae & facili uia fertur, & citra molestiam. Si nec inflatio nes creet, nec corruptioni cedat.

BARBARI COROLL.

Aqua profluens, utilior existimatur stagnante, ac pigra. Tum putealis quaerenda. Cisternarum ab alijs laudatur, argumento subtilitatis: ut quae subire in coelum, ac pendere potuerit. Ab alijs damnatur: ut quibus sordium, & limi, & animalium quoque plurimum inesse sentiat, cuius simumque ideo calefiat aqua pluvia, computrescatque, minime durans in nauigatione. Grandinis quidem potus, in confesso pestilentissimus. De niue, & glacie dissident sententiae: alijs subtilissimas eius elementi partes arbitrantibus, quia pendeant in sublimi: alijs crassissimus, atque iccirco insaluberrimus inde haustus, quoniam exinanitum sit quicquid tenuissimum in his erat. Liquor omnis congelatione minuitur: & rore nimio scabies fit, pruina uredines. Aqua septies putrefacta, purgataque, non putrescit amplius. Amnica non statim utilissima, sicut nec torrentium. Palustres, pluribus locis salubres. Parthorum reges & Choaspes, & Eufrates amnibus in bibunt: ex quauis in longinqua comitantur illos. Salubritatis argumentum est, anguillis scatere amnes, sicut uitis limum, & frugum ris in fontibus tineas: ut quae uulgo nominantur Lampredae, quasi lampyrides, aut Lampetrae, a lambedis petris, in cibos admittit lautioris uitae: interim anguillarum amplitudine, parte plurima digiti minimi crassitudine, palmi longitudine: cetero anguillis pusillis, & murenulis simillimae: nisi quod septem habent a capite in collum foramina. Aquae ante omnia improbantur amarae, & quae scrobem statim impleant. Fontes, Graeci nymphas: & altrices Liberi patris cognominant, in sacris uinalibus, quae ipsi Leneae dicunt: quia uinum addenti, modum eius augeant: siue quia, ut Theophrastus inquit, uites percipiunt, aquam reddunt, & illachrymant. Est & coelestis aqua, siue potius diuina, chrymistaru: quam et Democritus, et Mercurius Trimegistus nouere, modo uisum, modo scythicum laticem appellantes, modo Pnuma, hoc est, spiritum ex aetheris natura, & essentia rerum quanta: unde aurum poculentum, & iactatus ille, nec dum inuentus philosophorum lapis, & fabulum constet. Hinc & arti datum nomen, Psammurgicen, & Mysticen, & Hamophysia, & sacra & maximam uocando, seu literas quasdam seclusas habeat, & a quibus profanum uulgus arceri conueniat. Hoc genus laticis (ut arbitror) significat epigramma nuperrime in agro Parauino, iuxta oppidulum Aeteste inibi terram, corrupto: cuius memoria ne pereat, uerba praeteximus.

Plutoni sacrum munus, ne attingite fures:

Ignotum est uobis hoc, quod in orbe later.

Namque elementa graui claudit digesta labore,

Vase sub hoc modico maximus Olybius.

Adsit fecundo custos sibi copia cornu,

Ne precium tanti depereat laticis.

Abite hinc pessimi fures. Vos quid uultis cum uostreis oculis emissicis?

Abite hic uostro cum Mercurio petasato, caduceatoque.

MAXVMVS

MAXVMVM DONVM PLUTONI HOC SACRVM FACIT.

Tertium discrimen aquae mulsae, Apomeli dicitur.

EX M. VERG. COMM.

Aπομελι, ut graecorum uoce utamur, probatur aqua. Dico autem, & απομελι, quasi sequelem, id est, qualitate omni carentem: quae nihil odoris, colorisue aut saporis habet, & friget. Si enim ex terra emergens, calebit metalli aliquius, aut subterranei ignis contagio per quod transierit, medica

mentosa & infecta plerumque erit: quales diuersis locis medicinæ tantum utiles inueniuntur, a medicis per tempora deinceps cognoscendæ, & ex infectionis calorisque sui natura, ad sanitatis & morborum remedia transferendæ. Vt quæ sulphureosæ fuerint, nervis medeantur: quæ caluminosæ, sanguinis reiectionibus, & non suo tempore & ordine purgantibus se foeminis: quæ nitrosæ & salis, capiti: quæ ferratæ, stomacho & lieni prosint, alijsque vitij & morbis alijs potestibus altæ. In quo non tantum bonitates, viresque earum ad sanitatem, sed vitia etiam ad morbos cognouisse oportebit. Quæ tota res quoniam longior est, tractari hoc loco nec debet, nec potest. Illud tantum meminisse semper oportebit: quoniam multus & quotidianus aquæ homini & pecori usus est, nihil diligentius curandum homini esse: neque id tantum quod Socrates precipiebat, non agendum his locis nobis esse, in quibus nec iusticia, nec profluens aqua perennis erit, sed et citissime & longius fugisse illinc, ubi vitio aliquo infectæ aquæ uarios subinde faciant morbos: quales multis locis fuisse quondam audiuius, & esse adhuc quotidiana experientia cognoscimus. Pro qua re satis huic scriptori fuit monere, qualis oporteat quæsisse & probasse aquam. *ἀμύτοχον*, ut inquit, *οὐ ἀσθηποτόν ποτόντος*. Quod est, ut nos uertimus, cuiuscunque qualitatis expertem. In quo subscribentes sibi habet posteriores omnes græcorum medicos, *ἄριστον ἴδιον λήγοντας ἢ ἀποιότατον καὶ κατὰ γύσειν καὶ κατὰ ὁσμὴν*, id est, probatissimam esse aquam, quæ omni penitus in gustu & odore qualitate carebit. Quin etiam adiecerunt, aspectu & oculis purissimam esse oportere: hæcque bibentibus utilissimam fore, & suauissimam. Licetque hic probari puram, dulcemque dicat, non tamen intelligenda aquæ dulcedo est qualis in cæteris rebus dulcis sapor sentitur & est: sed quod hic ait *γλυκὴ*, quæ uox in cōmuni significationis æstimatione, dulce significat, pro suauis, & in potu amabili recipiendum est. Sic enim Paulus Aegineta *ἴδιον* in hac ipsa re uocauit. Siquidem ad aquæ suauitatem satis est, ut sine odore, saporeque, & aspectu pura solo frigore cōmenderetur. Et hæc dulcedo eius est, quæ hic cōmuni dulcedinis uoce indicauit. Cætera huic & alijs cōmunia sunt. Sed longe plura ab alijs quæ a Diosco. de tota ratione Aquarum dicuntur. Quæ in Plinio, Vitruius, rei rusticæ scriptoribus, mille alijs græcis, latinisque auctoribus cognoscenda uolentibus relinquimus. Longior enim & numerosa uarietatis ea disciplina est. Quodque hic, quoniam multiplex erat, professoribus cognoscendum deinceps reliquit, tractari ob eandem causam a nobis non debet.

De Aqua marina.

CAP. XII.

B

θαλάσσιον ὕδωρ

Aqua maris calida est, & acris. Stomacho aduersatur. Aluum em conturbat. Pituita expellit. Si uero calida ad foras adhibeatur, elicit, & discutit. Neruorum vitij, & pernionibus ante ulcera prodest. Miscetur cataplasmatibus ex hordeacea farina, & emplastris, & discutientibus malagmatis. Ad mouendas deiectiones tepefacta infunditur. Ad tormina calida, pforas, pruritus, impetigines, & mammas turgentes foueri utile est. Liuios suffitu discutit. Ad uenenatos ictus qui tremorem & refrigerationem adferunt, salutaris intelligitur, maxime scorpionum, phalangiorum, aspidumque. Etiam si quis in calidam descēdat auxiliatur. Et malo habitu cōfectis iamdiu corporibus, neruisque, balneæ ex ea utiles. Hydropicos, capitis dolores, aurium grauitates feruentis uapor leuat. Syncra, & sine potabilis aquæ mistione reposita, uirus deponit. Sunt qui etiam præcoquant, & ita recondant. Datur ad purganda corpora per se, aut ex posca, aut cum uino, aut melle. Verum post deiectionem, dant gallinæ, aut piscium iuscula, ad domandam morsus acrimoniam.

B A R B A R I C O R O L L.

Aquam maris, hoc est, hydor thalassion, probant ex alto haustam, nullaque dulciū mixtura. Hæc rubiginem ferro exterit celerrime. Dulcescit enim argilla percolata. In mari expansa circa nauim uellera madescunt halitu maris: qui postea dulcis exprimit. Demisse reticulis in mari cōcaue e cera pile, aut uasa inania obrurata, dulce intra se colligit humorē. Vetusstate uirus deponit. Cōdunt aquæ rosas, & Rosacæ uocant, hydorrhodina, & hydrosorosa Græci appellant.

De iij

D I O S C O R I D I S

E X M. V E R G. C O M M.

C Poterunt quibus procul a mari agentibus marinam aquam, & remedia eius negavit natura, maris aquam non multo sumptu laboreq; ex ueterum disciplina sibi facere. Præcepit hi, quatuor aq; sextarijs, salis sextariū misceri: hisq; utriusq; rei portionibus, salissimi maris uim & naturam impleri. Moderatissimum tamen putari, supradictam aq; mensuram octonis cyathis salis temperari: quoniam ita & nervos calefaciat, & corpus non exasperet. In quo mirum est, quantopere saluti hominis natura cauit, modo uera sint quæ illi retulerunt, si plus q; sextarij us salis cum aq; sextarijs quatuor mergatur, uinci aquam, salemq; non liquari. Intelligens enim nociturum quod nimis fuerit, certam incuriæ & ignorantiae hominum legem huiusmodi natura præscripsit. Poterunt itaq; procul a mari agentes, marina aqua morbos, uitiaq; corporum suorum hac ratione curare. Quæ ut certius cognoscatur, non pigebit aliqua hoc loco signare, quæ aut mutata a nobis, aut cum alijs eadem nobis non sunt. Quorum illud primum est: dixisse nos purgare marinam aquam pituitam, & præter pituitam bilem: quoniam utraq; in uetustioribus & melioribus græcis legebatur: & Plinius lib. 31. cap. 5. dixerit, bibi non sine iniuria stomachi ad purganda corpora, bilemq; atram: alioquin in cōmuni lectione pituitam tantum purgari indicatur: & posteriores græcorum medici pituitæ utilem tantum dixerunt. Signamus nos rem, & diuersitatis nostræ causam reddimus.

De Thalassomelite. C A P. XIII.

Θαλασσομίλη

Quod Thalassomeli uocatur, uehemēter purgare constat. Tēperat aut aq; portiōibus maris, mellis, & imbris ex alto, defecatis, et picato uase per canis æstus insolatis. Alij ad binas marine coctæ sigulas mellis adiiciūt, et uase cōdūt, moderatius aq; marina, et mitius.

E X M. V E R G. C O M M.

D Nil certius in Plinio Thalassomellis huius confectione est. Eam, 31. uolumine, capite quinto docuit scriptor ille. Sed qui alter ex scriptoris huius interpretibus eo duce usus est, uertitq; confici Thalassomel æquis portionibus maris, mellis, & imbris ex alto: qui totus uerborū Plinij in hac ipsa re ductus est, quod in Dioscoride non legitur addidit, & quod a Plinio dicitur im portune, nec suo loco reddit. Quod enim Plinius ex alto dicit, non ad imbrem in eo pertinet, sed alterius membri principium est. In quo cum dixisset, melle, mari & imbre confici Thalassomel: sumpto iterum sermonis principio, ex alto, & ad hunc usum aduehi, non imbrem, sed maris aquam dixit: nec littoralem, ideoq; lutulentam, aut dulci aqua mixtam, sed ex alto, id est, longinquiore mari petendam esse: quod in celesti aqua & imbre dici non potest, qui ex altiore parte cœli repeti nequit, sed dum decidat expectandus, & cum deciderit colligendus est. Non animaduertit, pungendas in Plinio uoces eas esse, anteq; ex alto, & ad hunc usum aduehi iubere. Facile præterea erat meminisse in poetis, altum passim mare, non cœlum, aut aerem dici: & Columellam lib. 11. cap. 16. marinam aquam ad muricæ confectionem de alto peti iubere. Verba eius sunt. Quod si ager maritimus est, silentibus uentis de alto q̄quietissime mari fumenda est aqua. Pertinet hoc ad huiusmodi confectionum disciplinam. Semperq; non nisi ex alto procul a litore, ob eas quas diximus causas, petenda est maris aqua. Quod forte in scriptore hoc desyderauerit quispiam. Ideoq; a nobis longius repetitum id est.

De Aceto. C A P. XIII.

ἄξιον

Acetum refrigerat, & adstringit. Stomacho utile. Appetentiam sistit. Prodest alui fluxionibus coctum cum cibis. Cruentis uulneribus inflammationes arceat, in succidis lanis, aut spongia impositum. Reprimat procidentia sedis, uuluaq;. Item abscedentes gingiuas, & sanguine manantes. Ad nomas, & ignem sacrum, ulcera quæ serpunt, lepras, impetigines, prerygia, cum aliquo conuenienti efficax est. Phagedænas ulcerum, nomasq; fotu continuo cohibet. Podagricis calido fotu cū sulfure auxiliatur. Sugillationes rapit, cum melle illitum. Contra capitis

ardores cum rosaceo in succidis uelleribus, aut spongia imponitur. Ad A
 aquam intercutem, grauitatem aurium & sonitus, sibilosq; feruentis ua-
 por proficit. Instillatum quoq; aurium uermes necat. Panos cōcercet te-
 pidi fatus, aut si imbuta aceto spongia admoueat. Pruritus permul-
 cet. Contra uenenatos morsus, qui refrigerando nocent, calidum com-
 mode fouetur. Et frigidum ijs, quæ exurens uirus ei aculantur. Calidū
 potum, atq; uomitionibus redditum, aduersus omnia uenena efficacē
 est, præsertim contra meconium & haustam cicutam. Conglobatum in
 uentre sanguinem, lac coagulatum, fungos, ixiā, taxumq; cum sale.
 Haustu uoratas hirudines si sorbeatur eicit. Tussim ueterem mitigat,
 & recentem laceffit. In orthopnoea calidum commode sorbetur. Gut-
 turis fluctiones gargarizatum inhibet. Anginis, & iacenti uia conue-
 nit. Contra dentium dolorem calidum colluitur.

BARBRAI COROLL.

A Cetum, id est, Oxos, uini quidē uitium est. Sed ad luxuriā cessit hominibus; tot ad usus
 expetitū, sine quibus uita, ut inquit ille, minor exigi non posset. Est & Vapda uitium uini, sed
 nulla ex cōmendatione. Quin probrosa quoq; res, uel hominū conuitio, quorū degenerauit
 animus. Fit aut Vappa, cum iterū sponte multa feruent. Infusum terræ acetum, spumat, saxa
 rumpit, quæ non ruperit ignis antecedens. Cibos quidē & sapores, non alius magis succus cō-
 mendat & excitat. Compescitur eius asperitas, tosto pane, aut uino, aut sale. Contra iners, ac-
 cenditur pipere, aut lasere. Acetum fit etiam non ex uino cōmentitium multis modis: sicut ui-
 num & oleum, sine uuis & oliuis. Acetum aliud non esse q̃ culpatum uinum, quis nesciat? Mē-
 xtum oleo Græci Oxelaon, sicut aqua Oxycratum, nos Poscā, Puscāmue dicimus. Ipsi quoq;
 Græci Phuscām, ut Paulus & Aetius. Infubres & Ligures Padani, uinum fecatum, siue Loram
 uulgo fere Poscam nominant. Nam acetum rosaceum, Oxyrhodinon græce dicitur. Acetum
 natura frigidum comprobat Galenus. Calidissimum Theophrastus existimauit.

EX M. VERG. COMM.

Q Vale homini uinum natura dedit ex aceto, quod uitii eius est, facillime ratio cinabitur
 aliquis. Intellet enim, omnium bonorū eius quæ tam multa numero usq; necessa-
 ria & grata homini sunt, id maximū merito esse, cuius labes & uitium, tam multas medicō salu-
 tis, patri uero familias uitæ occasiones affert. Cibos quidē & sapores nō alius magis succus cō-
 mendat, aut excitat: nullus etiā tam efficacī remedio contra tot mala pugnat. Neq; ausim ego
 dicere, utrobi liberalior humano generi omniū parens natura fuerit. Id certe omnes sine inui-
 dia fatebimur: esse quidem multorū, quæ sponte sua uitata, bonitatē suā amiserint. In fanita-
 te & morbis aliquē usum: esse itidem, quæ uitari & corrumpi ob easdē causas a nobis cogant:
 sed nihil frequentiore opera, maioreq; diligentia, q̃ uinum in quotidianos uitæ usus ad contra-
 riam aceti fortunam transfertur. Cogiturq; deficiente aceto, acescere uinum, tantū naturæ mu-
 nus: ut omnem domesticā rem nihilo minore q̃ uinum gratia ad cibos, & ciborū condituras
 instruat. Rara, & quæ uni Diogeni inter sapientes cōtingerat laude. Vt enim ille paupertate sua in-
 ter gentes clauit, quotidianamq; ex infelicitate laudē inuenit: non dissimili ratione ex uitio
 gratiā sibi acetum fecit: nec quicq; in uitiorū naturæ censu tam multos habuit semp, & æthue
 habet usus: ex quorū numero hic tantū eos tradidit, quibus aliquando ad salutē medicīnā indi-
 get. In eis satis certa omnia sunt, nec quicq; est quod legentes monere longius oporteat. Quod
 inter Barbarū & nos unum discrepat tantū significabimus: idq; ad uenena pertinet, quæ ille ue-
 nenata nominauit. Verba Dios. sunt, ποτὶ τοῦ πρὸ τὰ θανάτῃα, quæ qualia sint ipse statim nu-
 merat: opium, cicutam, concretum in grumos sanguinem, & lac, fungos, ixiā, & taxum:
 quorum nullum rite uenenatum dicitur. Venena enim ipsa sunt, Venenata autem quæ uiuen-
 tia animalia parem uenenis illis noxam ictu, morsuue illatam relinquunt. Suntq; primum in
 natura uenena, mox eiusdem maleficij communicatione uenenata: ideoq; in diuerso genere
 constituenda, nec simul miscenda: præsertimq; in hoc usu in quo bibendum acetum est: tum
 uomitionibus reddendum. Quod in uenenis quotidianum est. In uenenatis autem fieri ne-

Dd iij

D I O S C O R I D I S

C quit, quæ foris nocuerunt, non hausta nocent: ideoq; uomitionibus reddi non possunt.

¶ De Aceto mulso.

C A P. XV.

ὀξύμυλ

ACetum mulsum, quod Oxymel uocant, hoc modo temperatur. Aceti heminas quinque, salis marini pondo, mellis minas decem, aquæ sextarios quinque pariter coquito, decies efferuescente cortina, atq; ubi refrixerit diffundito. Sumptum crassos humores extrahere, & ischia- dicitis, comitialibus, & articulorum morbo conflictatis prodesse creditur. Contra morsum eius uiperæ quam Sepa uocant, haustum meconium, ixiamue, auxilio est. Anginis utiliter gargarizatur.

Pli. li. 14. ca. 17
lib. 23. cap. 3.

OXymeli a Themisone, & Asclepiade medicis damnatum prædicant, Acetum mulsum latine dici potest. Nam mixtū cum saccharo pro melle, Oxyfachar appellatur.

E X M. V E R G. C O M M.

DOcuit duobus locis Aceti mulsi confectiōem Plinius, primum. 14. uolumine, capite. 17. tum. 23. capite. 3. alterā simpliciter, alterā ex Dieuce antiquissimi medici auctoritate: nec eodem modo utrāq;. Siquidem in alterius confectiōe celestem, in alterius marinā aquā sumi iubet. Ex eo non importune suspicari aliquis possit, deesse huic scriptori in oxymellis confectiōe aquæ genus. Neq; em̄ uerisimile est, qd non eodē modo a gentibus tunc fieret, incertū ab eo relictū fuisse. Locus in Plinio primū est lib. 14. cap. 17. Suntq; de Oxymelle eius hæc uerba. Quin- etiam acetū melle temperabat: adeo nihil intentatū in uita fuit. Oxymel hoc uocauerūt: mel- lis decem libris, aceti ueteris heminis quinque, salis marini libra, aquæ pluuiæ sextarijs quinque, suffruesfactis decies: mox obturatis, atq; inueteratis. Et hæc prima Plinio Oxymellis confectio fuit. Alterā deinde. 23. uolumine, capite. 3. idem his uerbis tradidit. Oxymel antiqui, ut Dieu- ces tradit, hoc modo temperabant. Mellis heminas decem, aceti ueteris heminas quinque, salis marini pondo, thymbræ quadrante, aquæ marinæ sextarijs quinque pariter coquebāt, decies de feruescente cortina: atq; diffundebant, inueterabātq;. Quæ omnia præterq; in genere aquæ ea- dem huic scriptori sunt: desyderariq; ut diximus, in eo id tantū potest. Veritamen ut nos in medicinæ scriptoribus alijs, Galenoq; præsertim quarto lib. de his quæ faciunt sanitatem obser- uauimus: quemadmodū non erat una conficiendi Oxymellis ratio, sic etiā non unum, idemq; placuit diuersis eius auctoribus aquæ genus: uerū celestis aliq, marina aliq usi sunt, pluresq; sim- pliciter potabili. Neq; omnes antea melli & aceto mixtā inueterabant, sed in ipso usu aquā, sta- tim Oxymelli non aliter q; in uino fit, miscebant. Testis eius rei, quo diximus loco Galenus est, qui despumato præcedente coctura melli aceti tantū misceri iubet, quod gustanti nec acidum, nec dulce nimis sentiat. Cumq; duo hæc miscuerit, iterum coqui ambo simul præcipit, usq; dum diuersi liquores inuicem penitus se miscuerint, nec crudum bibentibus acetum sentiat. Ex quo tempore cum exiger usus, misceri aquā præcipit, eodem temperamēto quo ad potum uina aquis temperantur, nullo aquæ discreto genere. Quo fit, ut potabilem simpliciter intelli- gi oporteat. Et hæc pro Oxymelle dicta hæcenus satis sint.

¶ De acida Muria.

C A P. XVI.

ὀξύμυλ

ACIDA MURIA, quam Græci Oxalmen uocant, Contra Anomas fotu, putrida ulcera, canum morsus, & uenenatos ictus auxiliatur. Sanguinis fluctiones post excisos calculos sistit, si statim ca- lida in uulnus iniiciatur. Prociduam sedem reprimat. Dysentericis si no- mas sentiant, infunditur. Oportet autem eam ex lacte instillare. Hirudi- nes sorbitione, aut gargarizatu necat. Furfures & manantia capitis ul- cera extergit.

B A R B A R I C O R O L L.

OXalme dicta, qd ex aceto & sale fiat, quasi acetū salsum efficaciter, si sit recens acetū.

Mixtis simul aceto & iuria, quemadmodū in Galla primo volumine dictum iam pridē a nobis est, Oxhalme quondam fiebat. Indicatq; id nomen etiam: quā illi ad ea excogitauerunt, in quibus sale & aceto opus esset. Præferebantq; inueteratam: quoniam recentibus aceto & sale efficacior erat. Quos aut priuatim in medicina usus quondā habuerit, hic satis docuit: eamq; ob causam ad Thymoxalme, cognatam ei rem, sermonem nostrum nos transferemus.

¶ De Thymoxalme. CAP. XVII.

Thymoxalme uetēres utebantur, dabantq; laborantibus imbecillitate stomachi, ternos quaternosue cyathos, aqua calida dilutos, in articularibus morbis, & inflationibus. Crassos humores, atrosq; trahit. Hoc modo facitatur. Thymi triti acetabulū, salis idem modus, rutæ, pulegij, polentæ, singulorum exiguæ portiones in uas coniunguntur, aquæ terni sextarij, & aceti terni cyathi infunduntur, & circumposito linteo sub dio madescunt.

BARBARI COROLL.

Thymoxalme, quasi thymata falsilago dicitur.

EX M. VERG. COMM.

Rara hæc in antiquis medicinæ scriptoribus auditur uox: nō multi ideo fuisse usus aliquis Thymoxalme credat. Ad explendam tamen historiam, quoniam nihil interitatum uita sibi reliquit, confectionem eius hic docuit: quæ Oxalme eadem esset, nisi ex horto adiectæ illi herbæ paulo ante numeratæ fuissent, quæ ex uiribus suis in diuersis corporum nostrorum uitijs eam commendarent. Fuisseq; usum eius in ducenda per aluum pituita, testis hic ipse in Thymo herba est. Siquidem habere Thymum ait *ἀνταμιν πινόμενον μετὰ ὕδωρ καὶ ὄξος ἄνιν φλεγμώδεις κατὰ κοιλίαν*. Quod est, Potum cum sale & aceto pituitosa per aluum ducere. Quo genere remedij Thymoxalme hanc indicasse palam uidetur: quæ Thymo, aceto, & sale præcipue conficiebatur. Testatus in Pulegio etiā hic ipse est, multis ex ea herba remedij efficaciam uirum societate acetū addi. Qua ratione Thymoxalme quæ inter cætera aceto etiā constat, nunc Pulegiū additur.

¶ De Scyllino aceto. CAP. XVIII.

Scyllinum acetum hoc modo fit. Scylla quæ candida fuerit expurgata conciditur, traiectaq; lino segmenta modicis interuallis, ne se contingant, siccantur in umbra quadraginta diebus. Mina eorū in acetū boni sextarios duodecim immergitur, & uasē diligenter operto, septenis diebus in sole madescit. Post eum numerū dierū Scylla eximitur, & expressa abijcitur. Defecatū acetū transfunditur & reponitur. Aliq; Scyllæ minā, quinque aceti sextarijs miscet. Alij citra exiccationē repurgantes, parē mensurā adijciunt, & senis mensibus macerari patiunt. Id multo magis humorū lēticias digerit. Gingiuas humore pregnātes collusione stringit. Et moros dentes firmat. Putredines oris, & graues halitus tollit. Durat fauces, & callosas facit. Vocē expedit, & limpidā canorū reddit. Datur stomachicis, egre cibū cōcoquētibz, melancholicis, comitialibus, uertiginosis, mente captis. Itē uuluarū strangulationibus, lienis incremēto laborantibus, ischiadicisq;. Imbecillos admodū recreat. Corpus sanū reddit, & bonū colorē præstat. Oculorū aciem exacuat. Tarditatem quoq; aurium infusione purgat. In summa, ad oīa efficax. Cauēdū tamen intestinis exulcerationibus, in capitis dolore, aut neruorū uis

D I O S C O R I D I S

Ctjjs. Datur quotidie ieiunis sorbendū, inter initia exigū, paulatim adau-
gendo ad cyathum usq;. Nonnulli binos dant cyathos, aut largius.

Pli. li. 20. ca. 9. **A** C E T U M S C I L L I T I C U M, & S C I L L I N U M, & S C I L L A R U M q u o q; d i c i t u r, & S c i l l i t e s g r æ c e.

E X M. V E R G. C O M M.

Vulgarem fuisse quondā Scyllitici aceti confectiōē, & ex ea quotidianū in familia usum, qui eam docuerūt tam multi ex ueteribus indicant Plinius, Columella, Palladius, & in græcis quicūq; ad sanitatē & ualitudinem humanā rem aliquādo instruxerūt. Nouerant enim, q̄ mul-
tas utroq; tempore acetū id utilitates habet. Earumq; studio nullus nō propria, familiæq; suæ saluti consulens paterfamilias, Scyllite acetū per æstatem a se confectū domi seruabat. Mon-
strauerūt priuatim suas confectiōes singuli: quas ne longiores simus, repetere hoc loco consi-
lium nobis non est. Locos tantū in latinis signabimus: eritq; uolentibus hæc nouisse legendū
Plinius lib. 20. capite. 9. Columella lib. 13. capite. 34. Palladius in Iulio mense, capite. 8. Hi enim
omnes prædictis locis suas Scyllite aceti confectiōes docuerunt. Suntq; illis omnia eadē, aut
parum diuersa: præterq; in numero dierū, quibus insolandū acetum hoc est. Plinius enim quā-
draginta & octo diebus id agendū esse præcipit, Palladius. 40. quod hic septem tantū diebus fie-
ri iubet. Ex eo suspicati sumus. 40. dierum numerū, quo hic monet sicandā in umbra esse Scyl-
lam, pertinere ad insolationem potuisse: aut septem diebus illis, quo spacio iubetur insolari a-
cetū hoc, deesse quadraginta numeri notā: nec septem, sed quadraginta septem, aut octo die-
bus oportere id agi. Verba Plinij sunt. Gypso deinde oblitus cadus ponitur sub regulis totius
diei solem accipientibus: post eum numerū dierum tollitur uas. Intelligitq; numerū. 40. & 80.
dierū, quem nō multo ante proposuerat, Palladij autē, Et. 40. diebus patieris esse sub sole. Ob-
seruauimusq; nos quadragenariū hunc numerū in medicina, confectiōibusq; his ueluti de-
cretoriū esse. Eamq; ob causā inclināt animus, ut credamus non septem, sed quadraginta &
septem, octoue amplius diebus insolandū acetum hoc esse anteq; in uasa disfundatur, & serue-
tur. In cōmuni tamen græcorū omniū lectiōe nihil mutare ausi sumus. Quemadmodum non

D procul a fine totius capitis etiā, quo loco hic ait, In uniuersum ad omnia uim habere Scyllite
acetum. Cauendū tamen in interioribus exulcerationibus, capitis doloribus, & neruorū infir-
mitati. Qualia illic erant, omnia seruauimus: quibus quæ ultima duo sunt, coniungi præcedenti-
bus non possint: multoq; minus, ut in cunctis græcis leguntur, per se stare: modo uera sint quæ
Plinius & alij tradiderunt. Hic enim dolorem capitis, & neruorū infirmitatem excipit: iubetq;
caueri in exulceratis interaneis, dolore capitis, & neruorū infirmitatibus: Plinius autē de capi-
tis dolore quidem nihil agit, sed neruis infirmis perq; utile ait esse. Quod intelligēs Barbarus,
mutata dicendi forma, capitis doloribus, neruis infirmis quotidie ieiunis bibendū esse uertit.
Nobis qua decet interpretem fide, nihil in scriptore hoc mutare placuit. Vitium tamen, aut ui-
tij suspiciōem saltem signauimus: monemusq; iterum, male sequacem habere, quæ eo loco
sunt uoces intellectum: ideoq; medicis diligentius omnia illic expendenda esse. Credimusq;
nos, deesse eo loco aliquid, quo iuberetur in capitis dolore, & infirmis neruis bibendum iei-
unis Scyllite acetum esse: uerum ut diximus, nihil addi, interponiue ab interprete debuit. Fuit
etiam satis nobis a principio, purgatam tantum Scyllam dicere: quoniā nihil aliud q̄ καὶ ὁ καθα-
ρὰ in Dioscoride legeretur. Quæ autem ab alijs multa addita sunt: direptis, duris, & extrinsecus
positis, &c. omnia ex Plinio huic scriptori addita fuerunt.

De uino Scyllino.

C A P. XIX.

ΣΚΥΛΛΙΝΟΥ

Scyllinū uinum fit hoc modo. Dissectam uti dictū est scyllam, & sole
siccatam contundito: minam eius tenui cribro incernito, & linteo
illigatam, in uicenos sextarios musti recentis ac boni demergito. Vbi tri-
meltri spacio maduerit, elutriatum uinum obstructo diligenter uase re-
condito. Licet quoq; sic humida Scylla uti. In orbiculos Rapi modo
dissectam duplicato pondere, quadraginta diebus insolari oportet, & in-
ueterascere. Alia parādi ratio. Scyllæ dissectæ & repurgatæ tres minas, in
Italicam metretā musti demittito, & senos menses in uase obstructo mace

rari finito. Post id tempus excolatū uinum recondito. Vtile est contra **A** cruditates, & ciborū corruptiones. Item ijs qui reuomunt cibū, & si pituita in uentre, aut stomacho cōierit. Prodest lienosis, male habitis corporibus, aquae inter cutē, regio morbo, difficili urinae, torminosi, inflationibus, resolutioni neruorum, rigoribus longis, uertiginosis, & uulsis. Menfes pellit. Minime neruos infestat. Hoc uinum uetustate fit melius, Cauendus in febre usus, aut si interanea ulcus sentiant.

EX M. VERG. COMM.

Svas etiam Scyllitae uini Columella & Palladius, quibus paulo antelocis diximus, confectiones docuerunt, huic scriptori in eo, quod mox dicemus, tantopere contrarias, ut uitium in altero non suspicari, sed constituere oporteat. Dico autem alterum, quoniam concordēs sibi in uicem Columella & Palladius, alterā contrarietatis huius ambo faciunt partem. Ea huiusce modi est, suber ad uini huius confectionem Dios. sectam in sole sicari Scyllam, *ἡ σκύλλα ἐν ἡλίῳ*, quod est, siccatō eam in sole: illi autem contra in umbra sicari praecipunt. Columellae in ea re uerba sunt. Taleolasque sectas suspende in umbra, ut adsiccantur. Palladij, Scyllam de montanis, aut maritimis locis sub ortu caniculae procul a sole sicamus. Nec quicquam omnibus in eo quod docent certius est, tam aperto sensu a singulis conceptae uoces suae sunt: eo fit, ut nullae in contraria re partes nostrae sint, quae rem simpliciter signasse. Grauis enim scriptoris huius aestimatio, dignitas, & fides: graues etiam in re latina scriptores illi sunt, praesertimque Columellae, quem ego nunquam crediderim in uulgari re, & quae quotidianum haberet usum, decipi debuisse: & nihilominus, ut uidetur, contraria huic illi docent. Relinquemus ob causam de tota hac re peritioribus censendum: illud tantum monentes, duorum fide, contra unius auctoritatem certare: certiorēque habere rationem, ut in umbra potius quam in sole arescat Scylla: quoniam ui suā exsuctam, omnique humore citius exhaustam, inutilem, aut saltem minus efficacem sol faciet: quod contra in umbra fit, in qua paulatim arescens, nihil, aut parum ex uiribus suis amittet. Et praeter haec in scyllite Aceto, cuius eandem merito in ea re aliquis credat esse rationem, ab hoc ipso scriptore praecipitur, in umbra sicari Scyllam: admittendamque potius eam rationem, in qua hic alij, & huic alij cōueniant, quam eam in qua hic nec sibi, nec alij. Quod deinde dictum a Diosco. est, secandam raporū modo Scyllam esse, ex Columella repetendum nouisse id uolentibus est. Is enim. 13. uolumine, capite. 11. de Raporum conditura haec docuit. Raporum quae rotundissima sumito: eaque si sunt lutuosa, detergito, & summam cutem nouacula decerpito. Deinde, sicut consueuerunt salgamarij, decussatim ferramento lunato incidito: sed caueo ne usque ad imum praecidas Rapum. Salem inter incisuras Raporum, non nimium, minus aspergito, &c. Hic incidendi Rapa modus est: quo in incidenda Scylla Diosco. uti iubet: ut positam in tabula, scilicet integrā Scyllam, cultello decussatim incidas, ita tamen, ne usque ad imum praecidas. Quid autem decussare sit, & decussatim incidere, mathematici primum, tum rei rusticae auctores, & in architectura & fabrica periti facile ostendunt: qui omnes decussis, & in decussim ductas lineas appellant, quae non ad rectos angulos, sed quadamtenus transversae cadentes, & in alias lineas incurrentes graecae literae. x. Romanae autem. X. faciunt: quae quoniam denarij numeri, quemadmodum nunc etiam est, quondam nota fuit, ab eo numero decussis, & decussare uerbum latinis fecit. Ex rusticorum salgamorum disciplina itaque, secanda duabus transversis, & in decussis incisuris Scylla, ut nos credimus, erit.

De Vinis marinis.

CAP. XX.

Marina uarie factitantur. Aliqui enim statim quam decerptae sunt *οἱ θαλάσσιοι οἶνοι* uuae aqua maris ammiscent. Alij in area uuas sole siccant: qui bus calcatis, marinā adijciunt. Alij passas prius uuas in dolijs marina aqua macerant, mox calcatas exprimunt. Id magis Passi generibus adscribitur. Quae tamen austeriore gustu temperantur, contra febrium aduentantium indicia ualent, si modo meliora non adsint. Aluum subducunt. Profunt purulenta extussentibus, aut si dura aluus exerceat.

C Quæ ex Aminæis uinis fiunt, caput tentant. Stomacho aduerfantur, flatus creant. Verū quo plenior habeatur historia, ijs qui huius studio teneantur, non inutile existimamus uarias uinorum compositiones adferre. Non quod frequēs corū, aut necessarius existat usus, sed ne quid omisisse uideremur, quod ad corū rationem attineret. Sunt aut quædam ex ijs facticia, minoris curæ ac impendij, quæ cadunt in usus. Vt quæ ex coto-

neis malis, pyris, siliquis, item myrti baccis componuntur.

Vinum Terthalassomenon, hoc est, marina aqua factum, duo fere habet genera. Bixon, de quo dictum est. Alterum Leucoënon, aut etiā Leucochran, marina in album mustum confusa. In alijs autē gentibus Terthalassomenon, id est, mari conditum uocatur, a serui furto origine accepta, sic mensuram explentis. Habetur & Thalassites, uasis musti deiectis in mare: quo modo Cato præcipit, quadriennio Secundus, Rhodiū Coo simile est. Phorineum falsius Coo. Medicinas aliquot ex uino marina aqua facto legas, & ubi Dioscorides de qualitate uini loquitur. In hunc usum quidā ex alto peti mare iubent, seruariq; ab æquinoctio uerno, aut certe nocte solstitio, Aquilone flante. Hauriri autē circa uindemiam: si hauriatur, decoquit.

Vinum facti-
tium Incom-
mune.

Nillum uinum factitium, præterq; quæ specierum uetustate fiant, plus anno durare putant: & plura ne tricenis quidem diebus. Vinum ex siliqua, Ceratites, hoc est, siliquatium appellatur. Præstantissimum ex syriaca. Factitium uinum Græci Oenon Sceuation appellant. Quidam Propomata: quæ quidem ut sua quoq; sponte nascantur ex uitibus, ratio a Græcis inuenta traditur. Condebant & nitro uina. Item marmore. Item sulphure, ac cinere: quod miremur. Veteres e uitis maxime sarmentis, aut quercu.

E X M. V E R G. C O M M.

Poterant, auctore Celso, uina omnia hæc simpliciter Salsa a nobis appellari. Is enim, 6. primi uoluminis capite, inter solutæ alui remedia, negat falsum bibendū homini uinū. Habetq; id manifestā ex decretis ab hoc scriptore rationē: qui deijciendæ aluo, & his qui dura aluo erunt utilia ea esse docens, facile post se alios monuit, non esse augendā falsi uini potu alui solutionem. Sed ancipitē uocis eius intellectū fugientes, nolimus dubitari a legentibus, posse qualia uina hæc quondā fuerint, & an satis esset illis salem miscuisse. Diximus id, quoniā poterant alij inter pretes, si erat illis animus, in titulo capitis huius a rei substantia discedere, ex Celso honestiorem titulū uinis his præferre. Aptius enim Salsa, a sapore simpliciter, q; marina, aut græca uoce Terthalassomena dicta ab eis fuissent, præsentī legentiū dubitatione, quæ nam adiectæ uocis eius causa & ratio esset. Tradiderunt præter scriptorem hunc falsi uini huius confectiōē, etsi non penitus eandē, non tamen oīno dissimilē. Plinius quidē, 14. uolumine, capite, 8. quo loco ait. Salsi uini huius originē, a furto serui ortam, marina aqua explētis, quod subtractū in dies fuerat, Columella autē, 13. uolumine, capite, 22. & 6. Quos poterunt uolentes audire, & ex eorum decretis etiā falsi uini confectiōes discere. Nos interim ad reliquas uinorum confectiōes interpretationem & cōmentationem hanc nostram transferemus.

De uino Cydonite.

C A P. XXI.

κυδωνίτης
μηλίτης

CYdonites, nomine alio Melites appellatur, & ita fieri consuevit. Mala cotonea exēptis seminibus, frustatim rapi modo scinduntur, & duodecim minarū pondō, in musti metretā triginta diebus demerguntur. Postea defæcatū uinum reponit. Alia faciendā ratio. Oportet ad singulos mellis sextarios, denos succi cotoneorum tusorum, pressorumq; adijcere, & ita recondere. Vinum hoc adstringit. Prodest stomacho, dysentericis, hepaticis, renum uitijs, & urinæ difficultati.

E X M. V E R G. C O M M.

Coniunximus ex meliorū in græcis codicū lectione Cydonitē uini & mellis confectiōem. Continuata enim historia in illis duo hæc capita leguntur. Habetq; id ex uirium utriusq; similitudine rōnem. Cydonitē uini confectiōē monstrauit Palladius in Octobri mense, capite, 36.

sed tam diuersam, & scriptoris huius disciplinæ adeo contrariam, ut utilius nihil de ea egisse fuerit. Malomellis autem cōfectionem Columella. 13. uolumine, capite. 45. tam manifeste tradidit, ut cōmentationibus his nostris eam addidisse inutile non fuerit. Post traditam ab eo scriptore longius seruandorum pomorum, præsertimq; cydoneorum in melle disciplinam, huiuscemodi leguntur. Hæc ratio non solum ipsa mala custodit, sed etiam mulsi saporis liquorem præbet, q sine noxa possit intra annum dari febricitantibus: itq; uocatur Melomeli. Quæ omnia huic scriptori eadem sunt: præterq; q Columella intra annum uti eo cōcedit, hic post annum mitius fieri ostendit. Sed locus in hoc claudicat, & ideo utij nota signatus est.

¶ De Melomelite. CAP. XXII.

Melomeli, quod & Cydonomeli nominant, sic fit. Cotonea mela seminibus suis castrata, in q plurimum mellis, quo demergi possint coniiciuntur. Id post annum mitescit, mulso non dissimile. Præstat eadem quæ superior compositio.

¶ De Hydromelo. CAP. XXIII.

Fit Hydromelon duabus mensuris aquæ coctæ, & sub caniculæ si-
dus insolatæ, additis ad unam Melomelitis facti ex cotoneis. Vis huius eadem est.

BARBARI COROLL.

Hydromelon, aliud est q Hydromeli, ut constat, alioquin & sine melle fingitur quandoq; ut Paulus existimat. Laudabatur in Græcia quod e Cibyra fistilibus pusillis austerum, uino sumq; solebat inuehi.

EX M. VERG. COMM.

Nillum, quod hæcenus inuenerim, hoc nomine in relatina Hydromalum est. Factū illi ex aqua & Malomelle, quibus constat, nomen est. Fuisse autem græcis usum eius quæ tradit con-
ficiendi disciplina, & eius gentis medici aperte ostendunt.

¶ De Omphacomelite. CAP. XXIII.

Omphacomelitis faciendi ratio hæc est. Acerbæ uuæ immaturæ & tribus diebus insolatæ exprimuntur, & ad ternas succi partes, mellis optimi despumati singulæ partes adijciuntur, & insolatum in uasa transfunditur. Vim adstringendi ac refrigerandi habet. Stomachicis, coeliacisq; conuenit. Vfus post annum est.

BARBARI COROLL.

Omphacomeli, hoc est, mel acerbum, siue acidum.

EX M. VERG. COMM.

Docet in Augusto mēse Omphacomellis etiam cōfectionem Palladius. Ea neq; omnino diuersa, nec penitus eadem huic scriptori est. Quæ potiora in ea sunt, ambobus eadem sunt. Quam hic tradit, ex antedictis nouisse facile est. Palladius suam his uerbis docet. In uuæ semiacerbæ succi sextarios sex, mellis triti fortiter duos sextarios debebis infundere: & sub solis radijs diebus quadraginta decoquere. Vocat Palladius semiacerbæ uuas, quas hic ait μηπω πικραίνουσας, id est, nondum integra maturitate nigrescentes. Et quod hic simpliciter iussit, insolandum esse eum succum, Palladius, 40. diebus fieri id præcipit. Cætera paulo minus q eadem ambobus sunt.

¶ De uino Apjste. CAP. XXV.

Fit e pyris perinde atq; cotoneis uinū Apjstes nomine, sed ita ut pyra non magnopere maturescant. Ex filiquis etiam, mespilis, forbis simili modo temperatur. Omnia hæc genera acerbæ sunt, & adstringunt, atq; intestinas fluxiones cohibent.

D I O S C O R I D I S

C V **BARBARI COROLL.**
inum e Pyro, Sorbo, Mespilo, Siliqua, Ceraunia. Differt porro Apijtes, ab eo quod Apia
ros etiam graece dicitur: q̄ illud e Pyro fit, hoc ex Apio.

EX M. VERG. COMM.
Longē aliter e pyris uinū cōfici in Februario mense Palladius p̄cipit. Et qm̄ qd̄ ille instituit,
aliud ab hoc penitus esse credimus, nihil ex eo ad hūc scriptorē afferimus. Quāq̄ breuitate Plī
nius lib. 14. cap. 16. uinū ex siliqua Syriaca & e pyris, malorumq̄ omnibus generibus fieri do-
cuit, eadem nos in scriptore hoc uina eadem primo uertimus, & nunc cōmentamur.

De uino Oenanthino. CAP. XXVI.
E Labrusca fit, hoc est, uite syluestri, quod uocatur Oenanthinum.
Sicci flores minis duabus musti metreta macerati, post triginta di-
es mutantur, mox colatum uinum recōditur. Facit aduersus stomachi
imbecillitatem, cibi fastidia, coeliacos & dysentericos.

BARBARI COROLL.
Vinum Oenanthinum, quasi labruscatum conuertas. De hoc in Oenanthē dictum.
EX M. VERG. COMM.
Nihil ab hoc scriptore in Oenanthini uini cōfectiōe Plinius mutauit, elabrusca, i. syluestri ul-
re fieri dicens: floris eius duabus libris in musti cado maceratis, & post. 30. dies mutatis. Qualē
autē legere florē eū oporteat, ex Palladij disciplina dictū in Oenanthino unguento a nobis est.

De uino Rhōite. CAP. XXVII.
D **F**it e punicis malis maturis quod Rhōitē nominant, succo expres-
so ab acinis eorum, quibus lignosus nucleus abest, Apyrina uo-
cant, aut decocto ad tertias, & ita reposito. Efficax est contra fluxiones
internas, & febrim cum alui profluuiū exortam. Stomacho utile. Ad-
stringit aluum, & urinam mouet.

BARBARI COROLL.
Rhōites, & uinum dicitur, & mel, quo punica mala condiuntur.
EX M. VERG. COMM.
In medicina quotidianus ex punicis expressi uini usus est. Certa etiam in scriptore hoc eius
confectio. Nihil ob eam causam de eo ultra agendum.

De uino Rhodite. CAP. I. XXVIII.
Rhodites sic fit, Rosarum siccarum tusarumq̄ minam linteolo
deligatam in sextarios octo musti demergito. Et post tres men-
ses, defæcatū uinum transfundens, recondito. Vtile ijs qui febris carent,
& ad stomachi cōctiones, & dolores in fine potum, & contra humidas
aluos, & dysenterias. Fit quoq̄ ex succo rosarū, addito melle qd̄ Rhō-
domeli uocant, quod arteriæ scabricijs conuenit.

BARBARI COROLL.
Rosaceum uinum est hoc, siue ut Palladius, Rosatum.
Rhodomeli, hoc est mel rosaceum, aut rosatum. A Paulo etiam Rhodostactō dicitur. Nam
Rhodomelon ex rosīs & cotoneis malis conficitur.

EX M. VERG. COMM.
Rosatū uini genus hoc Palladius in Maio mense appellat. Cōfectionēq̄ eius qualis sua æra
te erat, his uerbis docet. Quinq̄ libras rosę pridie purgatę, in uini ueteris decē sextarios mergis.
Post. 30. dies despumati mellis librā adjicis, & uteris. Nec multo post Rhodomel suū idem eū
docet, quod huiuscemodi est. In succi rosę sextarijs singulis libras singulas mellis admiscēs, &
40. diebus sub sole suspendis. Docuit præterea in Octobri mense deficientibus rosīs, qua ratiōe
uinum quod idem rosaceo posset, conficeretur. Ea cōfectio huiuscemodi est, Folia citri uiridia

in sporta palinea missa in musti nondum seruētis uasa deponēs, & claudēs: exemptisq; his post
40. dies, addito melle ad modum rosati cum placebit uteris.

De uino Myrtite. CAP. XXIX.
MYRTITES sic baccis nigris post maturitatem tuis, & organo ex-
pressis. Aliqui ad tertias coquunt. Alij baccas prius sole tor-
rent, & quaternis sextarijs contusarum, ternas aquæ heminas adiiciunt,
& uini ueteris parem modum. Postea exprimunt et seruant. Magnopere
adstringit. Stomacho utile. Fluxionibus uētris ac stomachi prodest,
& contra intestinās ulcerationes & profluuiā. Denigrat capillos.

BARBARI COROLL.
Vinum Myrtites, hoc est, myrtatum, Cato docuit fieri e nigra: postea compertum ex alba.
Genus uini Plinio est & Myrtidatum, ab ipso nominatum, e syluestris Myrti baccis: quo & ma-
nus tingunt, Myrtidatum Dioscoridi frutex est, non uinum, ut diximus. Aliud genus uini est
Myrtatum: unde Myrata porio, non a myrrha, sed a Myro, id est, odoramento: quod & Iulius
Pollux Myrinem uinum appellauit, nostri Murinam. Quamquam inquit sunt, qui Myrinem etiam
pro dulci capiunt: quod et Plinio placet ex Lelii Senile Capitonisq; sententia. In comœdia certe
noua, Myrines, hoc est, odoratum uinum, Trimmer dicebatur. De hoc & in Lora diximus. Nā
Myrrha conditum amarissimum sit oportet: quippe quod in cruce Domino sit prebitum, non
oblectamenti, sed cruciatu propositum: idq; non tam Myrtatum, q̃ Myrrhatum scribere oportet.
Est & Myrtites pro melle myrrato acceptum quandoq;.

EX M. VERG. COMM.
MYRTITÆ uini confectionem in latinis rei rusticæ scriptores omnes quam noticerant & exer-
cebant sua tempora tradiderunt M. Cato operis sui de re rustica cap. 25. Palladius in Ianuario
mense cap. 17. Columella, 11. uolumine, cap. 39. Postq; hos omnes Plinius, 14. uolumine, cap. 16.
Omnes, excepto Catone, & Columella, simpliciter tuis myrti baccis, &c. fieri uinum hoc tra-
diderunt. Duo illi ad certum fruticis eius genus rem contraxerunt, nigræ myrti baccis fieri præ-
cipientes: & ex duobus generibus in hoc usu nigram tantum probantes. Catonis uerba sunt,
Myrtam nigram arefacito in umbra. &c. Columellæ uero. Nigri generis baccæ cum sunt mātū-
ræ, &c. Eo fit, ut credamus quod a principio capitis huius legitur, *μύρτα μέλαινα παραμύσσητα δια-
βόνη*, &c. quod est, Sumito nigras myrti baccas cum iam maturitate sita dilabuntur, non ad
nigrum in maturitate baccarum colorem simpliciter referendum esse, sed ad alterum myrti ge-
nus, quod priuatim nigrum ab antiquioribus uocatum est. Quod enim ad maturitatem perti-
nebat, in uoce *παραμύσσητα* indicabatur. Duobusq; illis autoribus redditus a nobis locus est,
& ad nigræ myrti baccas contractus. Fecimusq; id confidentius: quoniam in omni medicinæ u-
su prælata candida nigra myrtus semper est. Non erit inutilis labor, antiquiorum mores in his
cognouisse cupientibus, quæ a Columella longius quo diximus loco de myrtitæ huius uini cō-
fectione præcipiuntur legisse. Diligens enim, & pro hominis uita ubiq; operosus homo, diligen-
ter id etiam gentem suam & posteros docuit.

De uino Myrsinite. CAP. XXX.
MYRSINITES sic temperat. Rami nigræ myrti cū suis baccis et fo-
lijs tuis, decē minarū pōdo, in tribus musti cōgijs feruescūt, do-
nec duo supersint, aut certe sesq; congius relinquat. Id uinū colatū ad u-
sus recōdit. Cōtra furfures, ulcera ī capite manātia, eruptiōes papularū,
gingiuas, tōssillas, & purulētās aureis efficax est. Sudores sistit.

EX M. VERG. COMM.
Altera hæc ex Myrto uini confectio est. Differt a priore: q̃ illa baccis tm̃, hæc ramulis, folijs
& baccis myrti cōstat. Indicatq; in græcis manifeste utrāq; nomē. Quod em̃ myrtite ab illis dicit̃,
ex baccis quæ gens illa myrta uocat, factū est. Quod uero myrsinite, ex toto frutice quæ myrsi-
nē iudem græci appellant; eamq; ob causam alterum nos Myrtite græcor; & latinor; mō, alter;
Myrte latina tm̃ cōformatiōe diximus. Fuit ppria græcor; altera cōfectio hæc, si Plin. credimus;
Ec ij

A

μυρτίτης

Plin. li. 14. ca. 16

B

μυρσινίτης

C lib. 14. cap. 16. dicenti. Græci uero & alio mō teneris cum suis folijs in albo musto decoctis. &c.

L De uino Lētiscino, et Therebinthino. C A P. XXXI.
 Lētiscinū similiter ut Myrsinites temperatur. Nec secus Terebinthinum. Namq; bacciferi eorum rami sumi debent. Similes in sunt uires. Adstringunt. Stomacho accommodantur, & defluctionibus intestinorum, uescicæ, & stomachi, & sanguinis profluuiū. Vlcerā omnia fluctionibus obnoxia, fotu ad cicatricem perducunt. Fluctiones uulvæ ac sedis, in fessione cohibent.

S BARBARI COROLL.
 Schininum uinū, hoc est, Lētiscinum, siue Lētiscatū dicitur. Si mastichen uero capiat, Mastichites uocabitur. Utuntur in hoc cum pice diligentiores, ut inquit Plinius, nigra mastiche, quam in Ponto similem bitumini prouenire tradunt, radice Iridis, oleoq; additis.

P De uino Palmeo. C A P. XXXII.
 Palmulas maturas, quas uocant Chydæas, in urseolum imo per tūsum, & obstructum, picata arundine demittito: lino foramen sit obturatum, & quadragenis sextarijs ternos aquæ congios infundito. Quod si ipsum ita dulce esse non libeat, quinq; congios infudisse satis est. Post decem dies detracto ab arundine linteo, assumito uinū cras sum & dulce, & reponito. Suaue illud quidē, sed capiti noxium. Cōtra fluctiōes ppter adstrictoriā uim efficax. Stomachicis, coeliacis, sanguinē expuentibus conuenit. Aliquī idem addita aqua iterum capiunt, & tertio, quarto, quinto, sextoue faciunt: quod tandem acore uitiatur.

P BARBARI COROLL.
 Almeo uino Parthi & Indi utuntur, & oriens totus. Phœnicites appellatur, quod ex triuiali palma constat. Id autem quod ex abiete palma fit, Spathites, & Elatites quoq; dici pōt.

T EX M. VERG. COMM.
 Ora, ut sic loquamur, diametro in Palmei uini confectioe distat ab hoc scriptore Plinius. Ille em. 14. uolumine, capite. 16. palmularum modio iubet aquæ tres infundi congios, hic decē modijs eam mensuram infundi pariter præcipit. Magna inter hos scriptores mensuræ eius diuersitate, & cuius causam nos ignoramus. Nisi in alterutro mensuræ illius nota eam fecerit. In græcis omnibus, quas hætenus uidere licuit, nulla est nunc numeri alicuius nota, sed integra uox *Alia*, id est, decem. Qui itidem nobis est uetustissimus, & longobardis literis scriptus latinus Diosco. decem, manifeste ostendit. Pliniani contra codices omnes eodem modo, & his uerbis leguntur. Maturarum, quas uocāt chydæas, modio in aquæ congijis tribus macerato. &c. Quod autem nos diximus, potuisse mensuræ eius notam diuersitatis huius causam facere, huius cemo di est. Græci denarium numerum decimæ, ut illi constituerunt in aliarum ordine literæ suæ nota, quæ iota est, indicant. Signantq; illam, ut uidere passim licet, eadem figura qua latini suum, i, Latini ediuerso unitates suas in numerorum incremento eodem illo, i, signant. Concurrentq; in eandem formam græcorum denarij numeri, & latinorum unitatis notæ. Potuit ex eo diuersitas hæc fieri, & quod decem in Diosco. legendum erat, unū a Plinio intelligi, non ex græcæ, sed ex latinæ notæ illius indicatione. Credimusq; nos ueriores scriptoris huius, q̃ Plinii historiam esse. Exigua enim mensura modius est, nec futura satis ad transferendum in tres aquæ congios uini saporem: multoq; minus in quinq; ut hic etiam iubet.

C De Vino Catorchite. C A P. XXXIII.
 Catorchites aliquibus Sycites uocatur. In Cypro fit, ita ut Palmeum. Sed hoc interest, quoniam pro aqua tantundem humoris adiiciūt, in quo recenter pressa uinacea maduerint. Caricæ quæ chelidonix, aut phœnicæ appellantur, præsertim nigre, macerantur, uti di-

imus, & post decem dies humor excipitur. Atque iterum aut tertio, **A** idem modus aquæ in aqua uinacea maduerint, infunditur. Simili modo intercedente spacio, quarto aut quinto assumitur. Demaceratarum liquor non secus acorem contrahit, & aceti usum præbet. Id tenue est. Flatus gignit. Stomacho aduersatur. Fastidium parit. Aluo tamen prodest. Vrinam ciēt. Menfes trahit. Lactis ubertatem facit. Vitiosum sanguinem creat, & elephantiasin adfert, ut potio quam Zethon appellamus. Aliqui sex amphoris, decem salis sextarios adijciunt. Alij muriæ amphoram, quod non facile uitatur, & aluo idoneum fore censent. Alij Thymum & fœniculum imo subiiciunt, & caricas superponunt, & ita uicissim, donec uas expleuerint.

BARBARI COROLL.

Sycites uinum, aliqui Palmiprunum, siue Palmiprimum uocant. Nam eius quod Sycinum appellauere, sicut & Ithacomeliæ, & Lectispagitiæ, oblitterata iam ratio est.

E. X. M. V E R G. C O M M.

Sycatum non male aliquis hoc uinum dixerit. Honeſta enim, & quotidiani usus in animalium iecore aliquando ea uox in re latina fuit: neq; ab re. Cur enim liceat græcis Sicytē uinum hoc a ficis, quas ea gens ſyca appellat, dicere; Latinis autem a ficis Ficatū dixiſſe turpe ſit. Infelicius bonas artes proſtentur, qui ſic uerſtatem amant, ut nihil ſuo tempore nouum oriri poſſe exiſtiment. Nobis ſemper placuit quod Flaccus ait, licuiſſe indies, licereq; ſignatū preſente nota producere nomen. Ideoq; titulo capitis eam nos uocem addidimus, quam placere legentibus optamus. Satis in ſcriptore hoc Ficatū uini per ſe conſectio patet, nihil ideo de ea agimus. Quod deſyderari a legentibus poſſit tantum monemus: quas hic chelidonias ad uini huius cōfectionem exigit, in ficorum cenſu ab antiquis ſcriptoribus inter primas numerari. Laudauit eas Athenus in tertio ſui Dipnoſophiſtæ, campeſtribus locis conſeri præcipiens. Laudauit Columella in carmine ſuo, Purpureq; Chelidonix. Laudauit, ut cæteros omittamus. ſ. uolumine, capite. ſ. Plinius, nouiſſimam ſub hyeme maturari Chelidoniam dicens. Eam nos credimus a Chelidonij in Illyrico gente dictam fuiſſe. Neq; ab re eſt, nouiſſimam ſub hyeme maturari quæ in frigidiſſima regiōe primū puenerit. Oēs colore eā deſcribūt nigricātis purpure. Neq; em̄ Colu. aliud ſignificauit dicēs, Purpureq; Chelidonix; et hic phœnicas, i. colore palmularū uocari, et nigras eſſe teſtatur, eodē cæteris colore deſcribit. Facile ex his notis erit Chelidonix ſicū uolentibus cognoscere, colore nigricantis purpure, & poſtremq; oīm aliarū maturitatis.

De uino Sycomorite.

CAP. XXXIII.

Fit & e Sycomoris eodem modo uinum. Sed in acetum acre de- σικωμορίτης generat: quoniā nominata præualeat uis eorum, ut fluentis liquoris dulcedinem retinere poſſit.

BARBARI COROLL.

Vinum e fico Aegyptia, siue Alexandrina, item ex Cypria, cuius acetum Alexandrino melius est, Sycomoriten Græci uocant.

De uino Resinato.

CAP. XXXV.

Resinatum uinum populatim factitari solet. Copiosum in Galatia. quoniam uinum illic cōaceſcat, uua non matureſcente. Ideoq; refrigerat, niſi picea reſina temperetur. Reſina autem cum cortice tūditur, & amphoræ, dimidiata hemina permiscetur. Aliqui ubi efferbu- ρεσινάτης it excolant, ſeparantes reſinam. Alij relinquunt. Hæc uina uetustate dulceſcunt. Omnia capitis dolorem & uertigines faciunt. Concoctionem tamen adiuuant. Vrinam ciēt. Tuſſientibus ac deſtillatione uexatis cō-

Ec iij

Cueniunt. Item coeliacis, dysentericis, mulierum mensibus, & hydropicis, & feminis fluctatione uuluae laborantibus. Altis exulcerationibus infunditur. In hoc autem genere nigricans magis albo constringit.

Pli, li, 14, ca, 16

Vinum Rhetinites, hoc est, resinaturn, de quo & in Pissite, id est, Picaro dictum.

B A R B A R I C O R O L L.

E X M. V E R G. C O M M.

Haec sunt Resinata uina illa quae Martialis in Epigramate suo dicebat, relictis Phalernis importune bibere hominem: quoniam potu illa delectarent, haec plerumque amarescerent: quo gustu nunc etiam aliquot locis in Graecia bibuntur. Neque enim conditurae eius ratio penitus exoleuit. Quondam tam communis condiendi hac ratione uina in gentibus disciplina erat, ut hic Resinatui uini nota & titulo simpliciter contentus, nec quicquam ultra hoc testatus desiderare legentes modo cogat, quo Resinae genere uina haec condirentur. Barbarus ex Larice addidit: cum tamen in scriptore hoc non magis Larigna, quam quicquam alias intelligi resina possit. Resinaturn enim tamen hic ait, & nihilominus multiplex resina est. Dubitandum etiam, quam intelligi Galatiam oporteat: eam ne quae in Asia, an quae ultra Alpes ad Septentrionem est. Verum cum hic dixerit, non maturefcere illic ob gelu uiam, &c. aptius de ea quae ad Septentrionem ultra Alpes est intellexisse fuerit. Esi nusquam legisse me memini, consueuisse Gallos resina condire sua uina.

εποχίτης

De uino Strobilite C A P. XXXVI.

Strobilites fit maceratis in musto nucibus pineis, recentibus, fractisque. Praebetque resinati effectus, si quis madefactas nuces pini musto decoquat. Potum conuenit ijs qui tabitudine conficiuntur.

B A R B A R I C O R O L L.

DHoc uinum Hippocrates Coniam uidetur dixisse, quod arbor, e qua nux pineae funduntur, Conos, & Strobilos uocetur: ut alio loco docui. Galenus Coniam, pro Pissite cepit.

E X M. V E R G. C O M M.

Nucleis Pineis, non nucibus condit hoc uinum Barbarus: nos contra nucibus, non nucleis. Anceps ad totam nucem, & nucleos eius in graecis uox diuersitati causam dedit. Secutus ille Plinium est lib. 14. cap. 16. dicentem. Fit nucleis Pineis: hi musto madidi exprimuntur. &c. Nos in ambiguo, quae scriptoris huius decretis responderent, potius elegimus. Primo enim uolumine, capite de pino, nucibusque & nucleis eius manifeste monuit, totas nuxes ab arbore decerpitas, contusas, in mustoque decoctas, uetustique tustis & tabidis prodesse. Quod totum idem hoc loco auditur. Nisi forte in prima capitis huius parte de nucleis, in secunda de nucibus agi dicatur: quod tamen parum uerisimile est: cum hic dixerit recentes strobilos, & cotusos, quod nucibus magis quam nucleis congruit. Praeterea remedium tota uis in resina est, quae multa foris in nucibus, nulla in nucleis haeret.

De Vino Cedrina. C A P. XXXVII.

Cedrinum, Iuniperinum, Cupressinum, Laurinum, Pineum, aut Abiegnum simili ratione fiunt. Diuisos recenter ramos cum fructu aedunt, aut soli, aut balneo, aut igni, ad mouere oportet, uti desudet, congioque uini minam unam permiscere, & post duos menses transfundere. Et antequam recondantur insolare. Facticiorum uinorum uasa impleri debent. Namque non plenis uasis, uina in acorem corrumpuntur. Medicata autem uina, recte ualentibus insalubria. Omnia exalfaciunt. Vrinam citius, & substringunt. Laurinum tamen uehementius exalfacit. Fit quoque e fructu Cedri maioris uinum, congio musti, adiecta tusarum baccarum selibra. Diebus quadraginta insolari debet, & defaecatum in uasa transferri.

De uino Iuniperino. C A P. XXXVIII.

Fit etiam uinum e baccis Iuniperi, non aliis quam cedrites, et ad eadem ualens.

κεδρίνης 'h ap-
κινδίνος 'h κν-
παρίανος 'h
λάδρινος 'h
πιτύνος 'h
λάτινος

επεκινδίνος

E X M. V E R G. C O M M.

Differt, ut uidetur, reprimi, mox nomine etiā quod ex eadem Cedro, sed non hīsdem eius partibus fit uinum. Quod enim ex materia eius conficitur, Cedrinum: quod ex liquore, Cedrite ab antiquis græcis dictum est. hīsdem & nos nominibus duo discreuimus genera: licetq; in pluribus græcorum, tribus capitibus seorsum hæc docerentur, nos tamen naturæ in arboribus his similitudinem, & parium coniunctionem, mox meliorum græcorum fidem secuti paulo minus q̄ congeneres plantas, & earum partes uno eodemq; capite claufimus: reddidimusq; singulis, qua licuit certitudine, quæ sua erant.

De Vino Cedrite.

CAP. XXXIX.

Cedrites hoc modo fit. Cedriam dulci aqua lauant, & singulas amphoras singulis cyathis diluunt. Et ita musto replent. Hoc genus uini excalfacit, extenuat. Tussi utile sine febre, pectoris, laterumq; doloribus, uentris & interancorum ulceribus, purulentis excreationibus, mulieribus uulua malo opportunis, hydropicisq;. Facit aduersus uentris tinea & rigores. Contra uenenatos ictus auxiliatur. Serpentes necat. Aurium doloribus instillatum medetur.

B A R B A R I C O R O L L.

Vinum Cedrites, a Cedrino differt: q̄ Cedrites e Cedria fit, Cedrinum ex Assulis Cedri, aut fructu.

E X M. V E R G. C O M M.

Debuerat resinato coniungi statim Picatum uinum: quoniam nihil aliud q̄ combustæ resinæ fluxus Pix est. Hic tamen plura ex arboribus his confecta ante numerauit uina, quæ aut resinam ipse ferrent: aut resinæ pares haberent uires: nec nisi post eas Picatum docuit uinum. De quo eadem huic omnia Plinius tradidit libro. 13. capite secundo, ex quo poterunt uolentes multa intelligendo huic scriptori necessaria audire.

De Vino Picato.

CAP. XL.

Picatum ex liquida Pice, & musto temperatur. Picem autem primum marina, aut muria tantisper eluere oportet, dum inalbuerit, & syncera maris aqua defluat. Mox aqua dulci proluenda. Congijs octo musti, uncia Picis una aut altera adijcitur. Vbi efferbuerit & constiterit, in uasa diffunditur. Hoc genus uini excalfacit, concoquit, purgat, abstergit. Vtile doloribus pectoris, iocineris, lienis & uulua, si sine febre sint, ueteri rheumatismo, exulcerationibus in altum recedentibus, tussi, suspirijs, concoctionibus tardis, inflationibus, & luxatis, præsertim in succida lana impositum.

B A R B A R I C O R O L L.

Diximus de Pissite, id est, Picino, aut Picato etiā superius.

De Vino Absinthite.

CAP. XLI.

Absinthite faciendi ratio euariat. Aliqui enim duodequinquaginta sextarijs Italicarum amphorarum, ammistam Absinthij Pontici libram decoquunt ad tertias partes, & ubi infuderint nonaginta acetī sextarios, & Absinthij selibram, ac diligenter permiscuerint, diffundunt in uas, dumq; conquieuerit defæcant. Alij absinthij minā in amphorā demittunt, tufamq; & raro linteo deligatā, in decem congijis musti macerant, binis mensibus. Alij absinthij quadrantē, alij tridentē, & Nardi Syriacæ, Cinnamomi, calia, floris iunci odorati, calami, elata, palmarū,

Ec iij

C singulos sextantes iniiciunt in metretam musti, & tundentes prius pila, obstructo uasis spiraculo, binis ternisue mensibus dimittunt. Postea defæcatum uinum transfundunt ad usus. Alij addunt in musti cadum, celticæ Nardi drachmas quatuordecim, & Absinthij drachmas quadraginta lintheo inuolutas, & post quadragesimum diem elutriant. Alij in uiginti sextarios musti, absinthij libram, & siccæ pini resinæ sextan-tem immittunt, & post decem dies excolant, & recondunt. Vtile est stomacho. Vrinam cit. Tardam concoctionem accelerat. Hepaticis, re-gio morbo, & renū uitij auxiliatur. Fastidia discutit. Iis prodest quibus stomachus negociū exhibet. Valet cōtra longā præcordiorū distentionē & inflatiōes, teretesq; uentris tineas, & remoratos menses. Contra hau-
sta ixiæ uenena q̄ plurimū potum, & uomitionibus redditū auxiliat.

V **B A R B A R I C O R O L L.**
Inum Absinthites fit & alio modo circa radices uitium conficit, sicut Elleborites.

Sacris Romanæ gentis celebratū quondam Absinthiū est. Siquidem latinæ ferijs certanti-bus in Capitolio quadrigis, uictor Absinthiū bibebat: sanitatem, ut par est, præmio dari hono-rifice tunc existimantibus Romanis, cuius seruadæ, restituendæq; non parua merito inter olera laus Absinthio debetur: tam multiplex uis eius est, & in firmando stomacho tam efficax. Ob quod sapor eius in uina transferi. Fitq; Absinthite uinū toto hoc capite a Dioscoride longius descriptū: ne deesset gentibus tractandæ Absinthio medicinæ ratio hæc etiā: quā docuit & Co-lumella. 3. sui operis uolumine, capite. 35. his uerbis. Vinū Absinthite sic condire oportet. Pon-tici Absinthij pondo librā cum musti sextarijs. 4. decoque usq; ad quartam. Reliquū quod erit frigidū, adde in musti amminci urnā. &c. Simplex, ut uidet, Absinthite uini huius Columellæ conditura est. Dioscorides operosior: neq; una, aut altera, sed pluribus rōnibus instituta. Quæ omnes sauis per se patent: tractariq; hoc tempore etiam possent, nisi quæ Absinthij, aliarumq; rerum pondera & uini mensuræ nunc in Dioscoride leguntur, suspecta nobis essent: non tam quia uarie in antiquis græcis leguntur, q̄ quia alicubi maiora, alicubi minora, q̄ rei usus exigit esse nobis uidetur. Nos nihil mutauimus, communem lectionem in cunctis secuti. Monemus tamē, sicubi conficiendi Absinthite uini studium aliquando fuerit, quod ad pondera & men-suras in eo pertinet, diligentius expendendum illi prius esse.

De Vino Hyssopite. **C A P. XLII.**
HYSSOPITES e Cilicio Hyssopo maxime laudatur. Fitq; similiter fo-liorum Hyssopi tusorum libra in amphorā musti coniecta. Lin-theolo raro cum quibusdam lapillis folia inuoluuntur, ut degrauius pon-dusculo fasciculus sidat. Vinum post quadraginta dies defæcatum elutri-atur. Contra pectoris, laterum & pulmonis uitia, ueterem tussim, & suspi-ria prodest. Vrinam cit. Torminibus & rigoribus febriū circūitu repen-tibus auxiliatur. Menses mouet.

V **B A R B A R I C O R O L L.**
Inum Hyssopites, potest & iuxta radices factū uinum fieri, ut Absinthites.

Non est Hyssopite uini nostri orbis gentibus desperanda penitus confectio. Et si hic, Plini usq; ex Cilicia tantū Hyssopo probatissimū fieri dicunt. Columella em̄ quo diximus in Absin-thite loco, nulla aliunde petita Hyssopo Hyssopite suū conficit. Poterūtq; uolētes suæ regionis Hyssopo uinū condire, si non omniū aliæ, probatissima ea saltem quæ in uilis oīno non sit.

De Vino Chamædryite. **C A P. XLIII.**
Simili modo Chamædryites fieri solet. Excalfacit, discutit. Con-

uulsis, regio morbo, uulua inflationibus, tardae concoctioni, incipienti aquae inter cutem, subuenit. Inueterascens melius redditur. **A**

¶ De Vīno Stichadite.

CAP. XLIII.

Stichadites non secus temperatur. Congijs sex stichadis minam addere oportet. Crassiciem, inflationes, laterum, neruorumque cruciatibus, & perfrictiones discutit. Comitialibus commode datur, cum Pyrethro & Sagapenio. *stichadites*

¶ De Aceto Stichadico.

CAP. XLV.

Fit ad eadem Acetum e Stichade herba, ut paulo ante diximus, acetato macerata. Quod eisdem implet effectus. *acetato*

¶ De Vīno Cestrite.

CAP. XLVI.

Fit Vīnū e Betonica, quā Cestron psychotrophon appellant. Hærbam semine maturo prægnantē, cū suis ramulis minæ pondo, congijis duobus musti macerant, & post septimum mensem transfundunt. Ad multa interaneorum uitia, ut frutex ipse pollet. Et ut in uniuersum dicatur, facticia uina, sibi misturarum uires adsciscunt. Quare non difficile fuerit, ijs qui illarum naturas norint, uinorum uires coniectura quadam consequi. Verumtamen uinorum usus febricitantibus abdicandus. Fit etiamnum e Betonica Acetum ad eadem uitia utile. *cestrite*

¶ De Tragoriganite uino.

CAP. XLVII.

Tragoriganites fit quaternis Tragorigani drachmis, in quater-
nos musti sextarios coniectis, & post tertium mensem transfusis. Prodest torminibus, uulsis, ruptis, laterum doloribus, spirituum discursationi, ægris concoctionibus. **B**

¶ De Vīno Bunite.

CAP. XLVIII.

ENapis fit uinum nomine Bunites, drachmis duabus tusi Napi in sextarios duos musti additis, & cæteris eodem modo factis. Prodest stomachicis, & dimicatione, aut longo equitatu fatigatis. *bunites*

EX M. VERG. COMM.

Napis inter cætera condiri uinum hic scriptor ait: prodesseque armorum, & equitandi labore defatigatis: neque haberet a reliquorum disciplina diuersum aliquid conditura eius, si esset Naporum contra lassitudines priuatim uis aliqua. Aut si ratiocinari liceret, cur magis laboribus illis duobus, quæ tot alijs cursus itineris, pilæ, remigij, saltusque proposit. Omnium enim idem euentus est, & ob eam causam eadem constituenda remedia sunt. Testatur tamē id Dioscorides. Fuisseque id ab antiquissimis Græcis obseruatum & institutum. 21. uolumine, capite secundo Plinius etiam confirmat: & si in græcorum ostentationem totam huiusmodi ille reiiciat rem. Eius uerba sunt. Et alias modum excesserat medicorum in his ostentatio: ueluti e Napis uinum utile esse ab armorum, equitatusue lassitudine præcipientium. &c. Nos ex tam multis hoc signauimus, ut scrupulum legentibus inijceremus, quo cogerentur & ipsi remedium eius ex uini & Naporum uiribus causam inuenire. Docuit præterea hic scriptor, Marthubio notissima omnibus herba condiri uinum. Certiorem tamen eius condituram decimotertio uolumine, capite. 32. tradidit Colu mella. Ea huiusmodi est. Vinum Marthubij multum utile putant ad omnia intestina uitia, & maxie ad tussim. Cum uindemiā facies, Marthubij caules teneros, maxie de locis incul-

D I O S C O R I D I S

Cus & macris legito; eosq; in sole siccato; deinde fasciculos facito, & tomice palmea, aut iunceā ligato: & in seriam mittito, ita ut uinculum extet. In musti dulcis sextarios ducentos Marrhubij pondo libras octo adjecto, ut simul cum musto deferuecat. Postea eximito Marrhubium, & purgatum uinum diligenter oblinito.

δυνταμνίτης **D** **¶** De Vino Dictamnite. **CAP. XLIX.**
DICTAMNI drachmas quatuor macerato quaternis musti sextarijs. Facit aduersus stomachi fastidia. Menses & purgamentum a partu subducit.

πρασίτης οίνος **M** **¶** De Vino Prasijte. **CAP. L.**
Marrhubij adulti folia tundito, & sextarios octo in musti metretam demittito, et reliqua consimiliter facito. Conuenit hoc uinum pectoris uitijs, & omnibus quibus Marrhubium.

θυμίτης **T** **¶** De Vino Thymite. **CAP. LI.**
Thymi tusi & cribrati uncias duas lintheo colligatas, in amphorā musti adjecto. Valet contra aegras coctiones, fastidia, dysenteriam, neruorum & praecordiorū dolores, hybernos horrores, & uenenata animalia, quorū morsum frigus insequitur, aut putrescit locus.

θυμβρίτης **S** **¶** De Vino Thymbrite. **CAP. LII.**
Simili modo e saturcia uinū fit, quod eadē quae Thymites praestat.

ορίανίτης **S** **¶** De Vino Origanite. **CAP. LIII.**
Sic quoq; Origanites ex Heraclotico Origano conficitur. Facit eadem quae Thymites.

καλαμίνιτης γλυχανίτης **E** **¶** De Calaminthite, & Abrotonite uinis. **CAP. LIIII.**
Calamintha, Pulegio, Abrotono uina fiunt eodem quo Thymites modo. Profunt stomachicis, cibum fastidientibus, et regio morbo: q; urinam moueant.

κοκύνιτης **F** **¶** De Vino Conyzite. **CAP. LV.**
It & item e Conyza uinū, contra uenenata ante alia efficax.

αρωματίτης **A** **¶** De Vino Aromatite. **CAP. LVI.**
Aromatites ita fit. Palmae, Aspalathi, Calami, Nardi gallici, singulorum quatuor sextarios sumito, Postq; contriueris musto subigito, coactis ingentibus offis, & in sextarios duodecim austeri musti deiectis, operculato uase, quadraginta diebus quiescere finito. Deinde ubi faece expurgatum fuerit, recondito. Alia eius ratio. Calami uncia, Phu drachmae septem, Costi drachmae duae, Nardi Syriaci drachmae sex, casie uncia, croci drachmae quatuor, Ammomi drachmae qnq;, Asari drachmae quatuor, omnia simul trita, & lintheo colligata in caddū musti demergunt. Et postq; uinum deferbuerit, transfunditur. Facit ad pectoris, & laterum, & pulmonis dolores. Difficili urinæ, rigoribus, retardatis mensibus, atq; ijs qui per frigora iter faciunt, potum conuenit. Pituitæ crassiciem extenuat, Colorem alit, Somnum conciliat, Dolorem finit, Renum & uesicae uitijs auxiliatur.

B A R B A R I C O R O L L.

A

V Inū Aromatites, hoc est, odoratū, parabilius, & simplicius Catoni e ferta, lunco, Palma. Athenæus auctor est, ut in Myrtite diximus, potiōis genus ex aromatis confectū, q̄ ueteres uterent, appellari Trimma. Diximus & de alio Aromatite, qd Hippocraticū recētiōes uocāt.

E X M. V E R G. C O M M.

A B Aromatis, quæ odoramēta sunt, Aromatite uino nomen grēci fecerūt. Neq̄ ab re tam multis odoramētis condit. Nota in conditura eius oīa sunt, & nisi in ponderū, & mensurarum notis uitū in grēcis fuerit, qd fere suspicamur, certa in reliquis ratio erit.

De Vino e Pipere, Myrrha, & Iride. C A P. LVII.

F It & Vinum ad destillationes, cruditates, tussim, inflationes, & si humor in stomacho coijt, Myrrhæ duæ drachmę, Piperis candidi drachma una, Iridis drachmę sex, Anisi drachmę tres. Omnia plenius tusa & linteolo inuoluta in sex uini sextarios coniiciuntur. Vinum post triiduum colatur, et in lagena reconditur. Datur post deambulationem mēraculum cyathi unius mensura.

De Nectarite uino.

C A P. LVIII.

F It quoq̄ Nectarites ex Helenio hærba, quā alij Medicā, alij Symphyton, alij Idæon Phlomon, alij Orestion, alij Nectarion uocāt. Radice sicca pondo quinq̄ drachmarum linteolo colligata, & in congiōs sex musti addita, & post tres menses effusa. Facit ad stomachi & pectōris uitia. Vrinam pellit.

vinapitro

De Vino e Syriaca Nardo celtica, & Malabathro.

C A P. LIX.

E Syriaca Nardo & celtica, Malabathroq̄ uinum faciūtur hac ratione. Singulorum selibram in binos musti congiōs mittito. Post menses duos colato. Datur cyathus unus cum tribus aquæ. Hoc Vinum efficax est contra uitia renum, hepaticos, regium morbum, & urinæ difficultatem. Prodest stomachicis, atq̄ ijs quos pallor decolorat. Alij bessēm, aut sextantem acori, & celticæ Nardi quadrantem, in musti amphoram adijciunt.

B

H Vic uino pipere & melle addito, sunt quæ alij Condita, alij Piperata appellant. Acetum quoq̄ piperatum fieri solebat.

De Asarite uino.

C A P. LX.

A Sfari quadrantem in senos musti sextarios itidem demittito. Id uini genus urinam ciet. Hydropicis, & regio morbo laborantibus, hepaticis, ischiadicisq̄ conuenit.

vinapitro

De Vino e syluestri Nardo.

C A P. LXI.

R Adicis syluestris Nardi recētis & trite, cribrataq̄ bessēm, in congiū musti coniicito. Duos menses quiescere finito. Vtile est hepaticis, difficili urinæ, inflationibus, stomachicis.

De Daucitate uino.

C A P. LXII.

R Adicis Dauci contusæ drachmas sex in musti amphoram im-

daucitro

D I O S C O R I D I S

Cponito, & similiter transfundito. Facit ad dolores thoracis, præcordiorum, & uulnæ. Menfes pellit. Ructus ciet, & urinam. Prodest tussi, ruptis, uulsisq̃.

ἐλισσαφαιή **S**Aluæ unciam in musti amphoram, quod idem cum ceramio est, mittito. Valet contra renum, uesicæ, & laterum dolores, reiectiones sanguinis, tussim, rupta, uulsa, & suppressos menses.

B A R B A R I C O R O L L.
SAluiatum uinum, a Saluia dici nouimus. Saluiatum uero quo ueterinarij utuntur, positionis genus est. Poron Græci uocant ex ordeacea, aut triticea farina & sale: a quo fortasse Saluiatum. Quidam in Columella Saluiatum, aut Salinatum legere malunt. Ab eo salinare uerbum deducitur.

πανακίτης **P**Anacis unciam in musti congium mittito, & transfundito. Prodest ruptis, uulsis, fractis, orthopnææ. Lienis crassiciem extenuat. Contra tormina, coxendicum dolores efficax est. Tardas concoctiões accelerat. Menfes & partus extrahit. A quæ inter cutem, & serpentium ictibus auxiliatur.

ἀκορίτης **V**Ina ex acoro & dulci radice consimili modo fiunt. Oportet enim singulorū uncias in senos congios mittere, tribus mensibus macerare, mox in uas transferre. Faciunt ad pectus & latera. Et urinā mouet.

σελινίτης **S**eminis apij recentis, maturi, & cribrati drachmæ nouem in musti amphoram demittantur. Appetitum excitat. Stomachicis & difficili urinae auxiliatur. Oris halitum commendat.

μαραθρίτης καὶ ἀνιθίνος **E**X Fœniculo, Anetho, & Petroselino, uina eodem modo fiunt, & ad eadem efficacia.

FIt & e flore salis uinum multo ad purgandum efficacius, q̃ uinum aqua marina temperatum. Fauces, uesicam, renes, & stomachum infestat. Quare neq̃ in secunda, neq̃ aduersa ualitudine prodest. Fit etiam uinum quod Phthorion uocant, quoniam partus necat, & abortus facit. Veratro aut scammonia, aut syluestri cucumere, iuxta radices uitium fato. Siquidem uires sibi illorum uires adsciscunt. Id uinum partus enecat. Datur ieiunis mulieribus quæ ante uomuerunt, cyathorum octo mensura dilutum.

B A R B A R I C O R O L L.
VInum e salis flore, Halosanthiten Græci appellant.

θυμιαίνης **R**Amorum Thymelææ cum suis folijs, & fructu triginta dra-

chmas mittito in congios tres musti, & leui igne coquito, donec con- **A**
gij duo supersint, defæcatumq; recondito. Aquosa purgat excremen-
ta, & lienem absumit.

Vinum Phthorion, aliqui Eßromaticon appellat, ex Elleboro in Thaso fit, ibi & uinū con- **Vinū Phtho**
di perhibent, alterū ad sopōrem, alterū ad uigilias. Cato Ellebori radices in pila contundi præ- **tion.**
cipit, circū uitē dandas. Vile id uinum fore ad mouendam aluum, sine periculo. Theopha-
stus in Arcadiæ oppido Heræa, uinum tradit esse, cuius potu foeminae pariant: uiri mente com-
moueantur. In Achaia saltu Ceryniensi uinum & uitē nasci, quæ foeminis gustata faciant ab-
ortum, in Troezenē steriles. Idem auctor, uina quædam scribit Ethica uocari: Theodorus uer-
tit, moralia: etiā si mendose scriptū est, molaria quandoq;. Laudantur, q; celeriter purgāt se, ac
cōsistunt, quoniā tenuia sunt, & mixturæ immunia, ob id Ethica dici potuere, quasi castigata.

¶ De Vīno e Chamælæa. CAP. LXX.
Chamælæa dum floret, cū folijs tusa, & cribrata decem drachma **χαμαιλαίτης**
rum pondere, in musti congiū additur. Post duos menses
uinum in uas transfertur. Aquæ inter cutem, hepaticis, & lassitudine
contractis efficax est. Item mulieribus quæ a partu ægre purgantur.

¶ De Vīno Chamæpityīno. CAP. LXXI.
Chamæpityinum simili modo fit, ad eadem conueniens. Vri- **χαμαιπιτύϊνον**
nam quoq; ciet.

¶ De Vīno Mandragorite. CAP. LXXII.
Librum radices concidito. Segmenta lino trañcito, quod selibram **μανδραγορίτης**
læquat in musti congios decē demittito. Ibiq; esse finito ad men- **B**
ses treis. Media potio hemina dimidium, bibitur, passo in duplum ad
dito. Aiunt hemina uini congiō mistam, potu sapore adferre. Cyathus
unus cū sextario uini potus, enecat. Mediocris usus eius, doloris sen-
sum aufert, Fluxiones incrassat. Olfactu, instillatu, potuq; idē præstat.

¶ De Vīno Elleborite. CAP. LXXIII.
IN congiū musti aqua marina diluti, drachmas duodecim nigri **ιλλεβορίτης**
ueratri triti in linteo mundo, mittito. Dumq; efferbuerit, in mari-
næ aquæ congios quatuordecim aut quindecim transfundito. Et ubi
pleniūscule fregeris, inñcito. Post aliquot dies colato, & utitor. Dato
cyathum unum ex aqua in potu ad aluum soluendam ijs qui euomue-
runt a cœna, Alia ratio. Veratri drachmas uiginti, iunci odorati uncias
as duodecim, spicæ syriacæ uncias tredecim, cribratas & linteo colliga-
tas in septem uini cōi sextarios, diebus quadraginta macerandas indi-
to. Postmodum colato. Dabis in potu sesquiheminam. Aliter. Deco-
ctæ marinæ aquæ ex pelago petite sextarios duodecim, ueratri candi-
di libras sex, quadragesimo die q; madefeceris, colato, & utitor. Alia ra-
tio. Veratri drachmas duodenas, & aphronitri quaternas in senis mu-
sti sextarijs diebus quinīs denīs macerato, mox colato, & semestri ex-
acto, utitor. Id uini genus abortus facit, & partus necat. Aut uas in

D · I · O · S · C · O · R · I · D · I · S

C se se siccatas imponito in musti metretam (implet autem metreta congi-
os decem) & gypsum in uinum mittito pondo drachmarū uiginti, et bi-
duo residere finito: conijcito ueratri nigri uncias triginta, iunci odorati,
calami, singulorum drachmas triginta, baccarum iuniperi sextarios du-
os & heminam, myrrhæ & croci singulorum drachmam, inuoluens lin-
teolo diebus quadraginta appendito: postea colato, dabis heminas treis
aut duas dilutas. Purgat a partu & abortu scēminas. Menses extrahit.
Contra strangulatus uulua efficax.

BARBARI COROLL.
De altero Elleborite, dictum est in Phthorio.

SCAMMONITES **De Vino Scammonite. CAP. LXXIII.**
S CAMMONITES sic fit. Radicis scammonia per menses ef-
fossæ, trita & linteo colligata drachmas quinq; in uini congiū
mittito, ad dies triginta. Aluum purgat. Bilem & pituitam extrahit.

BARBARI COROLL.
De altero Scammonite legitur in Phthorio.

EX M. VERG. COMM.

S Ais per se parent quæ fictitij Vini tam multa gña supiore capite collecta a nobis sunt. Ni-
hil ob eam causam ultra de eis agemus: sed festinantes ad reliqua, quæ uerēda in scriptore hoc
alia supersunt, interpretationis, cōmentationisq; nostræ laborem transferemus.

D
radix

EX CADMIA **De oibus metallicis, et primū de Cadmia. CAP. LXXV.**
E X Cadmia generibus optima est Cypria, Botrytis nomine, den-
sa, modice grauis, et in leuitatem magis declinans, racemosa facie,
colore spodij: quæ fracta cinerulenta est, & eruginosa. Proxima habetur
foris cærulea, intus candidior, internatis segminibus, onychitæ lapidi si-
milis. Cuiusmodi sunt quæ e ueteribus metallis effodiuntur. Quædam
etiam Placodes, id est, crustosa dicitur, lineis quibusdam perinde quasi
zonis cincta: ob quod cam Zonitin appellauere. Alia Ostracitis nomi-
natur, gracilis, & magna ex parte nigra. Sed quæ testaceam faciem ha-
bet, terram amplexa est. Improbatur candida. Oculorum medicamentis
Botrytis nomine, & Onychitis, utiles. Reliquæ ad emplastra, & farinas
quæ cicatricibus inducendis insperguntur. Ad eadem Cypria prodest.
Ex Macedonia uero, Thracia, & Hispania delata, improbantur. Cad-
miæ effectus adstringere, caua explere, sordes expurgare, exiccare, cor-
poris meatus inficere, excrecentia in carne coercere, crustas creare, &
ulcera quæ cacœthe uocantur, ad cicatricem perducere. Gignitur Cad-
mia ex are in fornacibus candente, fuligine egesta flatu, & lateribus ca-
merisq; fornacum applicata. Prægrandes autē ac ferreae sunt fornaces,
ab officinis appellatae Acestides, per summa nullo spiraculo relicto, cō-
camerate: ut quæ ab are iactantur sursum corpuscula cohæreant, & in
ibi detineant: quæ cū spissius insidēt, in corpus conerescunt, & modo
genus unum eius, modo alterū, mō omnia perficiūt. Extrahitur & Cad-
mia cremato lapide cui Pyritæ cognomiē est, mōi sole supereminente.

In quo etiā quædam quasi uenæ, chalcitis, myrios, foreos, melantheriæ **A**
 cærulei, chrysocollæ, atramenti futorij, diphrygisq; inueniunt. Nec des-
 sunt qui Cadmiam in lapidū fodinis inueniri tradant: falsi quadā lapi-
 dum cognatione. Reperitur & apud Cumas lapis nullā sui uim osten-
 dens. In eo deprehenduntur, q̄ sunt Cadmia leuiore, nullumq; alienū
 mandentibus sapore exhibent. Cōmanducatus aut lapis, dentes offen-
 dit, Cadmia, utpote cum cedat, esum nō respuit. Alio aut discerni pos-
 sunt argumento. Cadmia in farinā detrita, & aceto subacta, in sole se cō-
 primit. Quod in lapide nunq̄ accidit. Item tritus, & igni appositus la-
 pis, prosilit, & fumū igni similem ei aculatur: Cadmia uero quieta ma-
 net, fulginemq; luteo colore, aut æreo splendentem expuit, uario zona-
 rum discursu. Insuper lapis ignē expertus, atq; refrigeratus, colorē mu-
 tabit, ac leuior multo fiet: sed Cadmia nihil euariat, nisi quis eā aliquot
 diebus cremauerit. Fit & in argenti fornacibus cādidior, ac minus pon-
 derosa, sed uiribus nequaq; comparanda ærariæ. Vritur Cadmia super
 ior carbonibus obruta, donec translucida spectetur, & ferrei stercoris
 modo bullet: mox extinguitur uino aminnæo. Sed quæ ad p̄forarum
 medicamenta præparatur, aceto. Alij hoc modo. Exustam cōterunt in
 uino, rursumq; fictili crudo torrent, donec pumicosa uideat. Iterumq; **B**
 tritam ex uino, urunt donec in cinerem redigatur, nihil scabriciæ reti-
 nens. Hac spodiij uice utuntur. Lauatur in mortario trita, effusa subin-
 de aqua, dum sordidū nihil emergat. Dein coacta in pastillos reponit.

BARBARIA COROLL.

Cadmiam uocant & lapidem quendam erosum, ex quo fit æs, fusuris necessarium, medici-
 næ inutile: quamq; Galenus lapidosam Cadmiam circa Solos in Cypro insula nascentē, forna-
 cariæ prælatam ætate sua meminit, inuentu raram. Possidonius quoq; lapidem Cadmiam ex
 Cyprio tantum ære fieri commemorat. Fit aut Cadmia, de qua hic loquimur, etiam in argenti
 fornacibus, candidior ac minus grauis, sed minime cōparanda ærariæ. Plinius Capnitin, hoc
 est, Fumariam appellat eam, quæ sit tenuissima, in ipso fornacium ore inuenta: qua flammæ
 eluctantur exusta, & nimia leuitate similis fauillæ. Secunda Botryitin, hoc est, Racemariam:
 quia interior sit, & cameris dependeat: cui prima dignatio tribuitur, grauior priore, leuior se-
 quentibus. Duo huius colores, cinerius, & puniceus, qui & melior. Friabilis hæc, oculorumq;
 medicamentis utilissima. Tertium genus Placitis, aut Placodes: & ipsa ex argumento, quoniā
 crusta sit uerius q̄ pumex. Ponderosissima hæc, & intus uaria. E lateribus fornacis fluunt ex
 ea duo genera, Onychitis extra pene cerulea. Intus Onychite, modo maculosa, Ostracitis tota
 nigra, & cæterarum durissima: unde nomen.

EX M. VERG. COMM.

Non poterunt metalla etiā, & si naturæ solidissimæ sunt, pares iniurias temporū, & libra-
 riorum incuriā, duas bonarū artium, & antiquorū scriptorum maximas calamitates & pestes,
 euadere. Habet em hoc etiam caput, quod suspicemur aliter quondā legi potuisse, quod in an-
 tiquis exemplaribus uariet, & quod duobus locis necessario desideretur. Quod suspicamur
 eo loco est quo legitur. Vocatur & Ostracitis, alia concretionē sua *ixvi*. Quam uocem nescio
 quomodo gracilem, nos etiā alios imitati diximus. Neq; em Cadmiæ gracilitas congruit. Si
 enim minore crassitudine describenda erat Cadmia hæc, tenuem, nō gracilem dici oportebat.
 Per latitudinem em Cadmia extenditur: potestq; tenuis, aut contra crassior concrefcere: & ni-
 hilominus *ixvii* hic dicit: quæ uox per longitudinem subtile, & gracile significat. Eapropter
 dubitauimus eum uertentes locū, non *ixvii*, quod est gracilem, sed *ixviii*, id est, ualidam & effi-
 cacem legi potuisse: ut non ad habitum & figuram, sed ad potestatem & uires referenda ea uox

Ff ij

C fuerit. In quo non tam persuasit suspicari id, facili ob literarum & soni uicinitatem ex altera in aliteram uocem & significationem lapsus, q̄ Plinius de hac ipsa Cadmia agēs lib. 35. cap. 10. fortissimam ceterarum eam esse dicens: quasi ἰχθυῖν, non ἰχθυῖν ipse tunc legisset. Cōmunis ramen gręcorum omnium ea lectio est. Et qui latini scriptoris huius codices circumferuntur, his uerbis eam deferibunt. Est & alia quę Ostracitis dicitur tenuis, & nigra, eadem fere tenuitatis & gracilitatis significatione: eamq; ob causam nihil nos ex cōmuni lectione mutauimus, contenti suspicionem hanc nostram legentibus indicasse. Quod deinde in scriptoris huius exemplaribus uariat, coniunctum his statim sequitur: habentq; uetustiores gręci, & quibus nos magis deferimus, hæc uerba. γὰρ δὲ δὴ ἡ ὀστράκωδὸς καὶ ἰχθυῖν ἰσχυρῶς, coniuncto scilicet cum superioribus sensu. Qui sit, ut nos uertimus, uocari Cadmiam aliquam testaceam, gracilem, plerumque nigram, terrestri, testaceae superficiei: quasi rationem & causam hic scriptor redderet, cur testacea Cadmia hæc appellaretur, quoniam terrestri, aut marinis testis simili superficiei sit. Qui uero impressi codices passim circumferuntur, alium, & qui forte a uero non discrepet his uerbis indicant sensum. γὰρ δὲ δὴ ἡ ὀστράκωδὸς καὶ ἰχθυῖν ἰσχυρῶς, qui scilicet sit, terrestrem esse Cadmiam, quę testacea superficiei sit: ideoque in medicina minus utilem. Nos antiquiores gręcos & latinos secuti, terrestri, testaceae superficiei Cadmiam illam esse descripsimus. Nec eo secius audisse hoc legentes inutile penitus nō fuerit. Quemadmodum contra pro comperto his esse illud oportet, perisse huic scriptori aliqua quo loco hic ait; adhærente parietibus & cameris eius fauilla, &c. Quę enim statim sequuntur, Grandes hæc, ferreæq; sunt ab ærarijs acestidas appellatę, in summis fornacium cameris compactę, &c. integro & apto sensu coniungi nequeunt. Ceteri ininterpretes nihil deesse hoc loco suspicati, ad fornaces re detorserunt: uerteruntq; grandes, ferreæq; fornaces eas esse, & ab ærarijs acestidas uocari. Nō animaduertentes, si sic legatur, contra eius artis leges & obseruationes fieri ex metallo in eū usum fornaces: quę eodam igne candentes & ipsę fluent, aut liquefacto ari concorporabuntur: nec ab ærarijs in eo usu tractari aliqua ratione poterunt. Quod præterea sequitur, ut rerineant, confidantq; in eis quę ab ære sursum feruntur, ad cameras & earum conuexitatem simpliciter referri non posse: neq; fornaces a gręcis acestidas uocari: sed ex quo hic ait, ab ærarijs acestidas uocari, oportere aliud quidpiam ea uoce significatum suspicari. Quibus ueluti impedimentis nos admoniti, suspicati uitium primum sumus: mox ex antiqua scriptoris huius interpretatio ne id manifeste deprehendimus. Seruant enim adhuc in ea uerę lectionis exigua uestigia aliqua. Quę huiuscemodi sunt. Multi uero ponunt ferreās hastas, & longas, &c. Ex quibus ratio cinari facile est, consueuisse qui Cadmiam quærerent, ferreās uirgas ueluti axes transuerfas in summa fornacis camera in eum quem hic docet usum suspendere. Eritq; sequax hic sermonis ductus, ut cum dixerit Diosc. Fit Cadmia ex ære in fornacibus accenso, adhærente fornacium parietibus, & cameris eius fauilla: interim solere ærarios, ut aptius hæreat & confidat Cadmia, in summa fornacis camera transuerfos axes, aut regulas componere: esseq; has grandes ferreæq; & ab ærarijs acestidas uocari. Qua uoce gręci ab Acesta Sicilię ciuitate plostelli gentis huiuscemodi axibus compactum uocabant. Non longe postremo a fine necessario desiderat, quod tamen restitui facillime potest. Locus est ubi de cremanda Cadmia agitur: in quo cum in cunctis gręcis legatur, post eius cocturam, tum uino amineo restinguitur: sequaturq; statim: quę uero ad scabiem aceto, &c. necessario deesse aliquid constituendum est. Dicendi enim modus hic gręcis pariter & latinis parum congruus. Nec habet sequacem sermonis ductum aduersatiua particula illa quę sequitur, quę uero ad scabiem aceto, &c. Nisi præcesserit aliud a quo quod sequitur separaretur. Nec sane decebat hunc scriptorem, aliam restinguendi crematam Cadmiam rationem docere, priuatimq; ad scabies eius usum cōtrahere, nisi diuersam in diuerso usu restinguendi rationem antea docuisset. Habendę Plinio hoc loco ingentes gratię. Ostendit enim. 34. uolumine, cap. 10. quibus additis et insertis in integrum restitui locus hic posset. Verba eius sunt, & ut nos credimus a scriptore hoc accepta. Restinguitur uino amineo, quę ad emplastrum præparatur: quę uero ad pforas, aceto. Vocauitq; ille pforas quas nos scabies cutis. si alpe ritate omnes. Nihil itaq; certius hoc loco erit: respondebuntq; sibi omnia, si quis post Cadmię cocturam legat: restinguitur uino amineo, quę ad emplastrum præparatur: quę autem ad scabies, aceto. Fecit id Barbarus ex Plinio acceptum, ut diximus. Verum tamē in gręcis pars ea nō legitur: nec nos addere huic scriptori eam uoluimus, satis fore rati locum signasse. Volumus legentes in eo etiam monere, quod a principio capitis huius non est nobis cum cæteris interpretibus idem: maluisse nos rubiginosum dicere, q̄ eruginosum, quod in scriptore hoc idem est. Scimus quidem in metallicis æruginem plarumq; esse, ab ære dictam, quę metallo illo &

humoris alicuius, præsertimq; acetæ habitu, quemadmodū non multo post hic describet, fiat. cuius in medicina multus est usus, uiridi semper colore. Nouimus etiam hunc scripto rem in eā significationis æstimatione hac uoce plerumq; uti. Veruntamen scientes duos in Cadmia ab antiquis græcorū medicis laudari colores, cinereum, & puniceum; nec posse æruginem quia uiridis sit, cinereo, aut puniceo colore describi ex altera græcæ illius uocis significatione, nam & rubiginem id græci aliquando dicunt, rubiginosam diximus, in quā uoce puniceus color sit. A rubore enim, rubigo dicta est, & scabries quæ igne semper fit: quorum nullum in æruginē dici poterat, quæ uiret, & humoris alicuius aspergine, non igne conficitur.

De Pompholygē.

CAP. LXXVI.

Pompholyx specie sola, non genere a Spodio distat. Siquidem pompholyx Spodios nigricat, & plerumq; ponderosior est, palcarum, pilorumq; plena; quasi deraſum quiddam, ac detractum ab ærariarum officinarum pauimentis, fornacibusq; uideatur. Pompholyx uero pinguis est, & candida, usq; adeo leuis, ut in auras euolare possit. Cuius duo fluxerunt genera. Vnum ad æris colorem uergens, suppingue. Alterum magnopere candidum, summamq; leuitatem nactum. Candida fit Pompholyx, quoties in perficiundo arte, fabri præstantiorem facere uolentes, detritam Cadmiam cumulatiuſ inſparſerint. Namq; tenuissima fauilla quæ effertur, in Pompholygē cōit. Cæterum Pompholyx nō ex aris modō materia & fabrilī industria facitatur, sed ex Cadmia B quoq; ad gignendā ipsam eximie proſlata. Cuius faciundę ratio hæc est. In domo binis tectis operta, fornax extruitur: iuxta quam mediocris fenestra uersus tabulatum a supernis partibus pateat. Domicilij paries fornaci proximius, tenui foramine ad fornacem usq; perforetur, ad excipiendam follis narem. Ostium mediocre habeat, pro exitu ingressuq; artificis fabricatum. Domuncula altera cōiuncta sit, in qua & folles & flator suo munere fungantur. Deinde carbonibus in camino succensis, assidens artifex, Cadmiam particulatim fractā inſpargit, a locis supra fornacis caput extructis. Idem negociū obit artificis minister, simulq; carbonēs adiicit, usq; dum indita Cadmiæ copia prorsus absumatur. Itaq; egesta suffitu, tenuis pars & leuis materię in summā domū euolat, & parietibus tectisq; adhærescit: conflatū inde corpus, inter initia erumpentibus aquarū bullis simile prodit: postea maius incrementum capescens, elaboratis lanis simile redditur. Ponderosius autem in subiecta pedibus loca se recipit. Sed hoc fornacibus offunditur, illud domus pauimento cohæret. Quod tenuiore deterius existimandū est, ideo q; multum terrę collegerit, & spurcicia in aceruatiōe referciatur. Sunt qui hoc modo tantum fieri Spodium arbitrantur, de qua ante dictum est. Optima creditur Cypria, quæ accepto aceto odorem æris præstat, colore aliquantum piceo, sapore luti horrido: & si fraudem nō experta, flagranti carbone inferuescit, æreum colorem contrahit. Antedictis autem notis, diligenter attendendum est. Siquidem a nonnullis

Ff ii

D I O S C O R I D I S

C adulteratur taurino glutino, ouillo pulmone, aut marino, aut crematis grossis, & quibusdam consimilibus. Quod facile cognitu fuerit. Quippe nihil in his probandis inuenietur eorum quæ antedicta sunt. Pompholygem ita lauari oportet. Ligatam linteo mundo, modiceq; raram, aut siccam, aut aqua respersam in labellum demittito, quod imbrem cōtineat, & huc atq; illuc fasciculum deferens, immergito. Ita enim limosa pars eius ac dulcis effluet, et omne crassamentum in linteolo remanebit. Postea residere sinens, aquam cum cinere colis incernito, & nouam infundens, agitato, & effundito, mutata tantisper aqua & colata, dum arenosi nihil fidat. Demum aquam exprimito, & siccatum cinerem recondito. Alij quantum maxime fieri potest siccant, et manibus in aqua conterunt, dum mellis crassamentum imitetur. Deinde linteo faucibus excepturi uasis obtento, aut laxius illigato, colant: & quò facilius transeat, infusa per linteum largiore aqua, cinerem conturbant; mox spumum quod traiectum est & supernatat uasi, concha excipiunt, & fictili nouo ad usus recondunt. Quod uero resedit, et sensim cribratum, in aliud uas transfundunt, relicto harenoso quod pessum ierat. Rursus lapidosa sidere patiuntur, & in uas aliud excolant. Hoc identidem faciunt, donec cinis merus & harenæ expers inueniatur. Alij paulatim integram in aqua respergunt, arbitrati arenas lapillosq; suo pondusculo degrauatos, pessum ire. Pilos autem & paleas leuitate sua in sublime at tolli. Cæterum cinerem medium separant, & in pilam coniectū ut Cadmiam eluunt. Quinetiam lauatur uino Chio marina aqua diluto, morbis quos supra diximus. Et ita redditur adstringentior, q̃ aquis elota. Vis Pompholygis adstringere, refrigerare, explere, purgare, obstruere, & aliquantum exiccare. Inter medicamenta numeratur quæ sensim cruftas obducunt. Quod si Spodium torrere libet, diligenter tritam & irrigatam aqua, colliges in pastillos: fictiliq; nouo, subiectis leuibus prunis orbiculos continuo uersabis, dum assicati fuluescāt. Neq; ignorandum, ex auro, argēto, plumbocq; fieri Spodion. Verum post Cypriam Plumbea maxime commendatur.

B A R B A R I C O R O L L.

DE Pompholyge, ac Spodio, cōmuni usu hic agitur: differentia, ut aliqui existimant, q̃ Pompholyx paratur lotura: Spodion, siue Spodos illota est. Quidam id quod candidum sit, leuissimumq; Pompholygen dixere, & esse æris & cadmiæ fauillam, & ut nomen indicat ampullam: qualis est bullantiū aquarū. Spodiō uero nigriore, ponderosiorēq; mixtis scintillis aliqñ et carbonibus. Optimā e Cyprio: p̃pterea Hippo. Melancypriō, quasi atramentū cypriū uocatā inter p̃stant aliq. Nam Possidonius e Cyprio tm̃ ære fieri Spodiō existimauit, ut Straboni placet: fieri q̃ liquescentibus Cadmiā ærario lapide leuissimā. Hęc euolās e fornacib. & teētis adhærescēs, a fuligine distat cādore: q̃d minus cādidiū ex ea fuerit, infaturq; fornacis argumētū est, hoc qdā Pōpholygē uocat. Qd̃ uero rubicūdius ex his inuenit, acriorē uim habet: exulceratq; adeo ut cū lauat, si attingat oculos, excēcet. Est & mellei coloris Spodos, in qua plurimū æris intelligit: sed qd̃cūq; genus lauādo fit uilius. Habet & i argēti fornacibus Spodos, quā uocat Laurionin, forsasse quā Illyriōtin Hippo. nescio an corrupte. Lauriō certe locus erat in Attica, ubi Argēū fodi

ne quōdā fuere, ut inquit Pausanias. Vtilissima hæc oculis, quæ fiat i aurarijs. Spodiō & ex plābo fit, eodē modo quo ex ære Cyprio mōstrauimus. Fit Pompholyx et ex sola quoq; Cadmia, ut Galenus testatur. Actius inuentu inquit rara est Pōpholyx, & adulterari facilis. Laudatur uero non candida, sed quæ subliuet, quæq; carbonibus inspersa, flammā ignis auream uideri faciat.

EX M. VERG. COMM.

P Ræfatus a principio statim hic scriptor, specie solam, genere nullā habere diuersitatem in metallicis Bullam & Cinerulā, promiscuum in medicina monuit utriusq; cum opus erit fore usum: simulq; ueniam dari sibi a legentibus petijt, si mutatis inuicem nominibus his confectio nem, loturamq; & usum toto hoc capite utriusq; docuisset. Quod em̄ in eis differt, color, pondus, & puritas tantum est. Substantia eadē, & uires in utraq; pares: tantūq; abest, ut rei discrimen aliquod antiquitas fecerit: ut Bullam sola lotura differre a Cinerula aliqui testati fuerint. Hic tamē certius rem docens, certas utriusq; notas reddidit. Quæ deinceps ab eo traditæ, repetendæ inutiliter a nobis modo non sunt: indicantibus præsertim earū etiam nominibus, nō rei, sed partium diuersitatem. Pompholyx em̄, quæ a nobis Bullæ nomine reddita est, Bullarum in aqua similitudine cōcrescens, eademq; figura quasi clauso intra se spiritu, ut in offensa aqua fit, tumens, indeq; inuento nomine ui flammæ egesta, & hærens ex materia æris, quod leuissimum purissimumq; erat secū detulit. Contra autē Spodion, quā Cinerulam uertimus, grauiore pondere, sordidioreq; non aliter q̄ cinis extincto igne mixtis carbonum reliquijs subsedit. Accessit etiam utriq; color, qui in altera ob eam causam nigricans, in altera candidus, partium itidem, nō substantiæ diuersitatem ostendit. Eoq; pertinet quod in Cinerula hic ait, esse eam ueluti fornacum purgamentū, & quasi quod scopis uerritur. Non aliter q̄ infimi, & pro re rustica stercoreis generibus græci *εὐματίτιν κόπρον* uocant, id scilicet, quod undiq; scopis in unū collectum fuerint: quale in purgandis triclinijs, totaq; domo quotidie in certum aliquem conueritur locum. *εὐμα* enim, qua uoce hic usus est, nihil indicat aliud. Quemadmodum & *σποδός*, siue *σποδόν*, non simpliciter cinerem, sed sordidum, & in quo extinctorum carbonum reliquiæ supersint aliquæ. Id enim nos obseruauimus inter *σποδόν*, & *σποδόν* græcorum discrimen. Neq; hic aliquando *σποδοσποδόν* dicens aliud, q̄ feruentem cinerem eumq; in quo ardentium adhuc carbonū exiguæ reliquiæ sunt intelligi uult. Cognouerunt discrimen hoc latini etiam, si Columellæ credimus lib. 1. capite. 15. de generibus stercoreis agentī: in quorum censu prodesse etiam satis ait cinerem, & fauillam: in altero rem notam significans: in altera cineri mixtos carbonēs, & eorum quas diximus reliquias.

De Antispodo.

CAP. LXXVII.

Q V O N I A M Spodos sæpenumero desyderatur, necesse est ostendere, quæ simili uirtute polleant, ut in Spodij locū suffici possint, Antispoda uocant, quo q̄ modo sumi debent. Folia itaq; myrti, cum floribus & baccis immaturis, in fictili crudum coniecta, inditoq; operculo continua foramina habente uruntur fornacibus, donec figlinum percoquatur. Iterum in fictile aliud crudū transferuntur: quod ubi perassatum fuerit, exempta lauatur ad usus. Idem quoq; fit e termite syluestris oliuæ, si habeatur: sin secus, satiuæ cum suis floribus, aut malis cotoneis dissectis, & detractis ossibus, aut gallis, aut laceratis linteolis. Item ex moris immaturis, id est, candidis, in sole prius arefactis, aut terebintho, aut lentisco, oenanthe, aut mollibus rubi folijs, uel e buxi coma, uel pseudocypero cum flore. Alij ficus in sole antea siccatas, eodem modo parant. Alij taurinum gluten. Alij succidas lanas asperas, pice, aut melle irrigatas. Quæ omnia in Spodij uicem usurpantur.

BARBRAI COROLL.

A Ntispodion est & cinis fici, caprificiq; ac lentisci: e buxi quoq; coma est, pseudo Cypert, & Terebinthi, & Oenanthæ.

CAP. LXXVIII.

C
μακρυμίνος
χαλκός

AEsustum probatur rubrum, quod contritu colore Cinnabarim imitetur. Nigrum uero plus q̄ deceat exustum est. Fit autē e clavis solutarum nauium, fictili crudo compositis, subsperso sulphure, cum sale pari: omnibus uicissim insparfis, fictile circumlito figulari creta spiramento, fornacibus inditur, donec figlinum percoquatur. Quidam pro sulphure & sale alumen inspargunt. Alij sine sulphure ac sale fictili, alia quot dies urunt. Alij sulphure solo utuntur, fuliginem tamen excutunt. Alij oblitos scissili alumine clauos, cū sulphure & aceto, fictili crudo cremant. Alij in aenea olla aceto resperfos, urunt, & iterum aut tertio idem efficiunt: postea recondunt. Principem locum tenet in Memphide combustum: proximum in Cypro. Adstringit, exiccat, reprimit, extenuat, attrahit. Vlcera purgat, & ad cicatricem perducit. Vitia oculorum emendat. Excrecentia in carne consumit. Nomas cohibet. Vomitus ciet, cum Hydromelite potum, aut cum melle delinctū, illitumue. Lauatur ut Cadmia, mutata quater in die aqua, donec nulla prorsus sordes emergat. Aeris cremētum, stercusue, quam scoriam uocant, eodem modo lauatur, & eandem uim, sed imbecilliolem habet.

B A R B A R I C O R O L L.

AEsustum, Græci Calchon cecaumenon uocāt: Celsus uero cum Cinerem q̄ priū uocat, aut Cypriū æs, crematū, aut Spodion cypriā intelligit. Aegyptus collyrii modo teri in couculis. Fuligo æris, siue ut Actius appellat, ærariorū fabrorum, Ephestia græce dicitur.

D

Scoriam metallorum, Græci, & Scoriam, & Cibdelin uocant: ut Photioni placet.

E X M. V E R G. C O M M.

Plinium secutus Barbarus, colorem in cremato ære probauit, qui ad Minij speciem accederet: rubentis quidē, eodemq̄, aut non dissimili Cinnabari colore fulgentis: non tamen, ut hic paulo post docebit, re & substantia eiusdem: cum alterū ex Hispania, alterū ex Libya quondā affereret: uulgareq̄ Minium & copiosum, Cinnabari autem exigū & rarum esset: & quo tantum in uariandis lineis pictores uterent. Ex eo quoniam in consimili genere poterant Cinnabari & Minium diuerso colore esse, alterūq̄ profundiore, alterum dilutiore rubore uideri, a uocibus scriptoris huius discere longius ipsi noluimus. Et quoniam in cremato ære colorem hic probauerat, eundem nos etiā probauimus: nec aliter q̄ hic Cinnabaris colore in attritu crematū fieri descripsimus. In cuius confectione non est quod miretur aliquis, probare hunc clauos solutarum nauium. Fuit enim æris quondā largior, q̄ ferri copia: eousq̄, ut arma etiā quibus ad bellum uterent ex hoc metallo fierent: si græcorū poetis, præsertimq̄ Homero credimus. Erat in fabrica quotidianus itidem æris usus: in qua prælatū diu ferro id est, non ob copiam tantū, quæ maior ferri aliquādo fuit, q̄ quia nulla rubigine perit æs, & in quotidiano attritu contumacius durat. Ea q̄ est causa, cur hic æreos clauos in nauigijs dixerit. Cur autē ex solutis nauibus potius, q̄ nouos quæri præceperit, aliā habet rationē: quoniam scilicet aptius in eo usu æs illud sit, quod attritu domitū, & consuetudine laboris ueluti mansuescētū erit. Multa em̄ sunt quæ in nouitate sua minorem, q̄ in uetustate, ob nimias vires, utilitatē habent. Nec aliūde factum fuisse nos credimus, ut uetusti æris & in clauos iam pridem conformati, multoq̄ labore edomiti, ad hanc rem usus esset. Potuit etiam ex nauigijs magis, q̄ ex ædificijs quæri: quoniam ex mari, saleq̄ eius aliquid bonitatis ad hunc usum æri accreuisset: quod antiquiores illi experti, posteris sua fide recipiendū tradiderunt. Satis cætera in hoc capite patent.

ἄλλος χαλκός

CAP. LXXIX.

Flos Aeris, quem nonnulli clauorum ueterum Psegrma, quasi ramentū, noīarunt, optimus est, friabilis, in attritu fuluescens, milij

effigie, brevis, ponderosus, modice splendens, atq; constringens, qui de A
limatam æris scobem nō recepit, qua sæpe adulteratur. Sed id facile de
prehenditur cum dentiū illisū dilatantur ramenta. Fit aut, cum æs for-
nacibus fustum, in receptacula delabatur, per cola fistularū ad ea perti-
nentiū. Circa eas em̄ occupatī, sordes expurgantes, aquā clarissimam in-
fundunt, refrigerare uolentes. Itaq; repētino concretu, ac addensatione,
expuit, & scatet antedictus flos. Adstringit, & excreſcentia coercet.
Offusam oculis caliginem emēdat, sed magnopere mordet. Quaternū
obolorū pondere datus, crassum humorē extrahit. Carnosa narium ui-
tia absomit. Eruptiones papularum cum uino cohibet. Contra diutur-
nas aurium grauitates tritus, in eas per fistulam flatu impellit. Vuam,
consillasq; reprimi, farina eius cum melle admota.

BARBARI COROLL.

Flos æris, hoc est, Chalcianthos, differt a Chalcantho, quod atramentum est futuri. Dif-
fert & a Squama, quæ uī atq; iſtibus clauis & panibus æreis excutitur: Flos uero ex iſdem ca-
dit sponte. Fit aut in æriis officinis, iam fuſo ære atq; percocto, additis etiamnū carbonibus,
paulatimq; accensis. Tum repente uehementiori flatu expuitur æris Pala quædā (ut Plinij uer-
bis utar) quod Pſegna, Floremq; uocat. Est aut Pala proprie, ut inquit Strabō, purgatoris au-
ri gleba semilibras: a quo translatus id nomē est & ad alia. Plinius alio loco Palacas in Hispa-
nia dici massas auri scribit, in puteis repertas, decullis pondere: quas & Palacranas uocant: ſi-
cut minutum quod est, Balancē. Democritij chymiſtæ aphrodites ſperma, hoc est, Veneris ſe-
men. Nā & ipſum æs nō alio q̄ Veneris uocabulo pnunciant. Idem Aſcion chalcō, pro æris
flore accipiunt, hoc est, quasi exumbratū æs interpret. Sunt qui Florē diuerſum intelligāt a
Pſegmate, sed ratio faciendi eadem. In utroq; ſolū quo Pſegma excipitur, stratum eſſe iubent.

De Squama æris.

CAP. LXXX.

SQVAMA æris excussa clauis cyprio ære fabricatis, crassa qui-
dem ipsa. Bona est quæ Helitis nominatur. Sed ex malo ære, aut
candido, uitiosa intelligitur. Quam utpote tenuem & inualidam dam-
namus, maxime approbantes crassam, ruffam, præsertim si acetī resper-
ſu rubiginem contrahat. Vim habet adstrictoriam, extenuantem, res-
primentē, & erodentem. Nomas cōercet. Vlcera ad cicatricē perducit.
Pota ex aqua mulsā aquam trahit. Aliqui farina subactam, dant in ca-
tapotio. Additur ad oculorum medicamenta. Genarum scabriciam ab-
sumit, & fluctiones exiccat. Lauatur hoc modo. Siccæ æris squamæ ex
purgatæ ſelibra, cum nitida aqua in mortario manu diligenter contur-
batur, quousq; pessus ierit. Abijcitur quod emerſit, & effusa aqua, hæ-
mina cœlestis hymbris adiicitur, & distenta manu, squama quasi exic-
canda sit, uehementer confricatur. Dumq; lentorem emittere cœperit,
aqua sensim ad sex heminas usq; superinfundit, terendo ualide. Squa-
ma ad latus mortarij colligitur, ibiq; apprimitur. Quo facto, expressus
humor pixide ex ære rubro facta, excipitur. Hoc est enim uelut flos
Squamæ, ualens uiribus, & ad ocularia medicamenta cumprimis effi-
cax. Inutile quod superest. Lauatur, donec nullam prorsus lenticiam
excernat, & linteo opertum biduo conquiescere ſinitur, effusaq; extan-

D I O S C O R I D I S

Cte aqua, ubi ficcatum erit, reconditur pixidicula. Alij ut Cadmiam lauant, & reponunt.

B A R B A R I C O R O L L.

SQuama, hoc est, lepis, etiam e ferro in usu est, ex acie, aut mucronibus maxime simili, sed acriore vi, q̄ rubigo. Cyprios clauos, de quibus hic habet mentio, Palladius cuprinos clauos: & cuprinū æs, pro cyprio ære appellat. Aeris inquit Celsus, duæ species sunt: alia tantū æris: alia rubri æris. Veteres ipsum æs rude impolitūq; dicebant Raudū, siue Rodū: unde porta Romæ, q̄ ærata esset Raudera, et Rauduscula, siue Raudusculana uocaret. Quid si pomi genus in cetea, q̄d Rantiū uulgo dicit, ab æris colore quasi Raudiū uocaris? hoc est, fuluū. Est em̄ fuluū æs; ut inquit Ennius. Q̄q; & a Neratio fortassis inuentore, Neratiū dici potuit. Nisi quis non Rantiū, sed Arantiū, quasi Ariantū, id est, Persicū, a gente uelit appellatū. Est enim Aria, ut inquit Hellanicus, & si recte memini, etiā Herodotus, & Plinius, & ceteri, Persica quæ dā regio. Quid item si malū Arantium, ab Arantia oppido Achaia dictū conijcias? q̄d & pomis fertile scribunt fuisse: a quo effectu, posteri Phliunta noīauere, ut inquit Stephanus; proinde Lacedæmonij mēsem, in quo terra fructibus abundat, Phliasion appellat. Accedit, q̄ Herculem mala Hesperidū, Arantiam primū tulisse credunt, auctore Pausania. Sed uereor, ne quis me alias inuidia obnoxii, etiam nimio iuuandi rem latinā studio, lapsus prædicet.

E X M. V E R G. C O M M.

Quæ tria ex uno eodemq; ære in medicina usu deinceps a scriptore hoc numerata habentur fuerunt, æs, ærisq; flos, & Squama, non aliter q̄ de bulla & cinerula non multo ante hic dixit, specie tantū inter se differunt, genere nullā habent differentia. Ex eadem em̄ materia, eisdem fere usus & effectus præstant. Nec aliter de his ueteres tradiderunt, q̄ ut æris partes haberi tria hæc uellent. Longius de his docuit Plinius uolumine. 14. capite. 11. Qui licet aliter a scriptore hoc de his tradere uideatur, re tamen eadem omnia docet. Nec aliud esse discrimen ostendit, q̄ q̄ Squama excutitur istibus, flos sponte cadit; alteriq; illud Squamæ genus, quod Stomoma dicunt, subtilius esse, ex summa scilicet lanugine decussum. Est em̄ græcis Stomoma ferri acies: & uerbum illis στομόν aciem in ferro trahere significat: cum in cote ductū, reductūq; acuitur, & acuendo exterritur. A quo euentu quæ subtilissima ex ære detrita est, Squama. Stomoma dicta ab ea gente est: quasi in trahenda acie in cote detrita. Squamā æris probauit hic, quæ in Cyprijs ærarijs, &c. Damnauit contra, quæ ἐν τοῦ φαιδίου χαλκοῦ ἢ ἐν τοῦ λευκοῦ de cussa fuisset: non ex malo ære, promiscuoue, ut alij interpretes uerterunt, sed uulgari & uili. Neq; enim malum, promiscuumue æs ea uoce indicatur, sed uulgare, quod omnibus locis inuenitur: ideoq; Cyprio comparatum, nullius, aut exiguae dignitatis & æstimationis. Sequitur ab hoc loco statim in probatione Squamæ huius participium ἰονύκων. Quod alter ex interpretibus ad rubiginē retulit: cum tamen iudicio nostro ad Aeruginem, quæ propria æris est, contrahenda uox illa fuerit. Communis enim metallis omnibus rubigo est, quia rubet sic dicta. Quæ autem in ære concreuit, aceti, aut alterius etiam humoris aspergine, aut halitu, ærugo uiret. Quemadmodum in confectioe eius mox dicitur.

De Squama ex acie decussa. C A P. LXXXI.

στομόν σκουμα

SQuamæ ex acie, aut mucronibus decussæ, quam uocant Stomoma, eadem uis. Lauatur modo simili, & reconditur. Sed ad molien-
dam alui deiectionem inefficacior est.

B A R B A R I C O R O L L.

STomoma, genus est Squamæ subtilius, ex summa uidelicet lanugine decussum.

De Aerugine rasa. C A P. LXXXII.

ἰόν ἔρσον

AERUGO rasa fit ijs modis. Super doliolum, aut aliud consimile uas aceti q̄ acerrimi, æneum uas, præsertim concameratum, sin minus, planum uersetur: sitq; exterius, nullumq; habeat spiramentū. Exempto uase quo doliolum obturaueris, decimo quoq; die insidens Aerugo deraditur. Aut æris lamina in cadis super acetum ita suspen-

ditur, ne attingat: & totidem post dies raditur. Aut massulae aeris, aut **A** laminæ, uinaceis iam accrescentibus conduntur, & simili modo uersantur. Quinetiâ ex delimata aeris scobe æruginem facere licet. Nec nō e laminis, quibus bractee auri conclusæ malleo ducuntur. Si quis eas aceto respargat, & ter aut quater uerset, donec æruginem contrahant. Tradunt æruginē in Cyprijs metallis gigni, lapidibus quibuscūq; nonnihil aeris habentibus, quibus ærugo efflorescit. Adduntq; nōnunq; per caniculæ æstus e quodā specu manare. Sed hoc exiguum, & optimū esse: illud speluncis effluens, copiosum quidē, & boni coloris, sed uitiosum, quod lapides multos collegerit. Pluribus autē modis adulterant. Alij pumice, alij marmore, alij atramento futorio. Sed deprehēdemus pumicem, aut marmor, pollice sinistrae manus madefacto, & æruginis portunculā in alterū atterente. Siquidē eam diffundī constat. Marmoris autē pumicisq; partes cōeunt non dissipatę, demumq; tractationē crebra & humoris complexu dealbescunt. Quin et dentū appressu. Siquidē synœra cedit: leuis, sine asperitate. Atramentū uerō futoriū, igne coarguitur. Namq; si fictile, aut lamina, adulterata ærugine illinatur, & feruenti cinere, aut carbonibus incalascit, mutabit colorem. Atramentū futorium rubescit, quod uisum suapte naturā talem sortitur colorem.

B A R B A R I C O R O L L.

AErugo rasilis, quā Græci uocant Ion xystron, minus probatur e squamis. Oculisime con- **B** trahit æruginem coronarium æs. Aeruginem maxime Rhodiam adulterant marmore. Deprehendit papyro, galla prius macerato. Nigrescit enim statim ærugine illita. Deprehenditur & uisu, maligne uirēs. Aerugo aeris, a Columella est ubi ænea rubigo dicta sit. A Vitruuio Eruca nominatur, eadem quæ rasilis a specie uermiculi eius, ut consilio, qualis Rhodo fingebatur. Ob id & genus alterum æruginis, ut mox liquebit, Scolex appellabatur. Nam & morbus quidam arborum, nunc Rubigo, ut Plinius, nunc Aerugo appellatus est, ut Hieronymus, quem Græci Erythron, Rhodij Erethibon uocant, a colore, ut nos Rubiginem: a quo & Robur dictū sit, quia plurimas huius coloris, quasi uenas habeat.

De Aerugine Scolecia. C A P. LXXXIII.

AEruginis quam uocant Scoleciā, duo sunt genera. Quædam **ioy σκώληκος** fossilis est. Altera facticia. In mortario cyprii aeris dimidiam heminā aceti albi acrisq; pistillo cupreo conterito, donec strigmenti crassitudinem imitetur. Deinde aluminis rotundi, salis fossitij, translucen- tis, aut marini spalbissimi, solidiq; drachmam unam, aut certe cum nitri pari pondere terito in sole, æstuosissimis diebus, sub sidus caniculæ, donec colore ærugineum, & coagulmēto strigmētosum fiat. Vbi autē se in uermiculorū speciem contraxerit, recondito. Efficax & boni coloris redditur, si duas partes urinæ ueteris, cum una aceti adieceris, & alia quæ dicta sunt peregeris. Sunt qui æruginem rasilē, quæ in apparatu non respondit, gummi misto digerant in formas, & ita uendāt. Quod genus, ut uitiosum improbat. Fit & quædam ærugo ab aurificibus, mortatio & pistillo cyprii aeris, cum urina pueri impubis, quæ aurū fer-

C ruminant. Antedicta aeruginum genera, usto ari correspondent. Sed magis effectu ualent. Sciendum fossilem Scoleciam præstantissimam esse. Derasam sequi. Postremo loco facticiam. Mordacissima tamen est, & magis adstringens. Aurificum autem Aerugo rasæ correspondet. Aerugines omnes adstringunt, extenuant, excalfaciunt. Oculorum cicatrices emendant. Lachrymas cient. Nomas sistunt. Vulnura ab inflammatione tuentur. Ulcera ex oleo, cæraque ad cicatricem perducunt. Callos & sordida ulcera purgant, cum melle coctæ. Callum fistularum erodunt, cum ammoniaco, collyrij modo in eas adactæ. Ad gingiuarum autem excrecentias, & extuberationem utiles. Magnopere extenuant genarum crassiciem, cum melle illitæ. Verum post illitionem spongia ex aqua calida locus fouendus est. Resina terebinthina exceptæ cum are & nitro lepras abigunt, Vritur particulatim fracta, in fictili patina, flagrantibus prunis superposita. Versaturque donec se mutet, & colore subcinereascat. Postea refrigerata reponitur. Sunt qui cruda olla eam urant, uti dictum est, sed non prorsus eundem colorem cremata contrahit.

B A R B A R I C O R O L.

Scolecia Aerugo fit & per se rasa, ex ærario lapide quem Chalcithin uocant. Nominatur autem Scolecia, siue Scolex, uel quia se contrahat in uermiculos sponte, uel quia fingatur in eos arte. Aristoteles, In Cypro inquit insula, ærarij fornacibus, ubi Chalcites lapis pluribus diebus uritur, uermiculi medio igne quadrupedes, & pennati nascuntur, paulo muscis grandibus maiores, qui per ignem ambulent, & saliant quamdiu ibi sunt, uiuentes: cum euasere longius paulo, moriuntur. Pyralides, siue Pyroti nominantur, uel ut in quibusdam Plinianis codicibus, Pyraustæ.

D Aerugo aurificum, hoc est, Santerna, quæ a Græcis Ios Chrysochoon, & Chryfocolla dicitur, gluten est & ferrumen auri eius, quod argentosum uocant. Signumque est, si addita ea, nitescit. E diuerso ærosus contrahit se, hebetaturque, & difficile annectitur. Fit autem id glutinum præter ea quæ a Dioscoride scribuntur, etiam auro & spuma argenti additis, unaque contritis. Vtrum uero Santerna hæc, an alterum genus intelligatur a Theophrasto, chytos argyros, hoc est, argentum fusile, quum dicat, & mortario, & pistillo æris terendo confici & aceto, nondum liquet. In Santerna certe sola, quod quidem sciam, mortarium & pistillum ex ære cyprio desyderant, sed cum urina impuberis, non aceto. Inuenio & Argentum mentitum, hoc est, Pseudargyron uocari, quod ex lapide quodam usto fiat Anderis, in Troade: itemque in Lydia prope Tmolium: huic æs addendo mixtura prouenit, Orichalcum a quibusdam appellata, ut Straboni placet. Cæterum Chryfocolla dicitur & panificij quoddam genus, ut in Tritico docuimus. Santernam forrasse dictam putæ, quasi Xanthernam: quippe cum legamus Aeruginem hanc a Græcis quædam dici Xanthesin, a colore flauo: qualis aureus est. Ob id & Latex diuinus ille, tingendo auro chymistis tantopere quæsitus, plerumque Ios Xystos, & Aerugo nominatur.

Aerugo ferri, hoc est, rubigo, deraditur humido ferro, clauis ueteribus. Hac Telephum Achilles sanasse proditur: quæque id quidam ex ærea cuspidis factum interpretantur.

E X M. V E R G. C O M M.

Monstrauit Vitruius suæ Architecturæ libro septimo cum de coloribus ageret, Aeruginis unam tantum confectiorem, eam scilicet quæ secunda huic scriptori est: suntque eius post conficiendam Cerussæ disciplinam hæc uerba. Eadem ratione lamellas æreas collocantes efficiunt Aeruginem, quæ Eruca appellatur. &c. Vocaturque insecti, & uermis nomine Erucam, quam cæteri omnes Aeruginem dixerunt. Nec nos scimus, quæ integra in eo scriptore ea uox sit. Aliqui quoniam insecti, quod Græci Campem dicunt, ea appellatio est, Vermicularem illam Aeruginem ex similitudine ab antiquis Romanis dictam eo nomine fuisse existimant: nos tamen, quoniam quam Vitruius Erucam appellari ait, a uermiculari distat, nec aliquid illi simile, aut commune habet, uerum ut diximus, secundum huic scriptori genus facit, confirmare id non audent: dul-

bitamusq; in Vitruius male Erucam forsitan legi: uerumq; lectionem, æneam, aut æream esse: quoniam latini scriptores aliqui æruginem nominantes, æneam, aut æream semper addiderunt: ut ex quo metallo æruginem dicerent, certius indicarent. Neq; ab re: quando ut in græcis *ἰὸν κομῆς* ad æruginem & rubiginem uox est: sic forte in latinis aliquando fuerit, promiscueq; ærugo in cunctis metallis diceretur, & si priuatim in ære ea uox in usu postea esse tantum coeperit. Coniicimus hæc, non decernimus: eamq; ob causam poterunt arbitrio suo de his legentes sentire. Quo loco deinde hic scriptor ait, fieri iidem æruginem ex delimita æris scobe, laminisue illis *ἢ πρὶν χόμην τὰ χρυσὰ πταλά λαύνεται*. &c. nosq; uertimus, quibus inclusa aurea coronarum folia extenduntur: adiecimus nos coronas, quæ nullæ tamē in Diosc. sunt: propterea, q; de his necessario agebatur: nec poterant aurea folia illa aliter, q; in coronis intelligi. Quod græci aliquot indicant de coronis agentes: breuissimeq; Plinius dicens. Ocyssime uero contrahit coronarium æs æruginem: illud intelligens, quod in extendendis ex auro bratteolis in foliorum figuram, in usu ea tempestate esset. Quod nunc alia ratione fit. Vitium non multo post signauimus, quo loco scilicet de deprehendendo rasilis æruginis adulterio agitur. Male enim sequax illic sermo est: nec satis (aliòquin certa res) patet. Docet enim pumice, aut marmore adulteratam æruginem humore & attritu deprehendi: quorum altero deluit, altero albescit ærugo. Quod in sincera nō fit. Numerantur deinde inter alias uermicularis æruginis uires a Diosc. *ἀδερνὸν ἄγινον* quod est, lachrymas ciere, trahere & ducere: idq; tam manifeste, ut in scriptore hoc intelligi aliter res nequeat. Nescimus tñ nos, q; integer locus ille sit: non tam quia Plinius de æruginis rasilis, cui uermicularis non adeo dissimilis est, lib. 3. cap. 11. ait. Vis eius collyrijs oculorū aptissima, & delachrymationibus mordendo. pficiens: q; quia in oculorum medicina compefcuntur, nō pritantur delachrymationes. Erit id medicis diligentius animaduertendum.

R De Rubigine ferri. CAP. LXXXIII.
Vbigo ferri restingit. Sistit sceminarum profluuiā admota. Potuq; præstat ne concipiant. Illita ex aceto, ignibus sacris, & papularum eruptionibus medetur. Perq; utilis ad scabrias genarum, paronychia digitorum, & reduuias. Condylomatīs prodest. Gīngiuas firmat. Podagras illita lenit. Alopecias replet. Vinum aquaue, in qua cādens ferrum sit restinctum, potu coeliacis, dysentericis, lienosis, cholera laborantibus, & dissolutis stomacho auxiliatur.

FERRUM Græce sideros appellatur: candens hoc, nisi duretur ignibus, corrumpitur. Rubens inhabile est tundendo, neq; anteq; albescere incipiat aceto, & alumine illitū sit æri simile. A rubigine uindicatur Cerussa, & Gypso, et Pice liquida. Hæc est temperatura a Græcis Antipathia dicta. Ferunt quidam & religione quadam id fieri.

MALUIMUS in Ferro ob colorem Rubiginem, q; æruginem dicere, ob eas quas non multo ante tradidimus causas. Alioquin idem uitiosus in cunctis metallis euentus est, communiq; uoce a græcis omnium metallorum læuori contraria scabrides uocata est. *ἰὸν* enim in cunctis metallis uocant, quod uetustate, humore, cessatione uel asperitatis & mali coloris illis accreuit. Habent etiam *ἰρυσίναν* qua rubiginem indicent: sed ut nos obseruauimus, in frugibus potius q; in metallis. Legentes illud etiam in capite hoc monemus, uidisse nos in græcis, nec negligendæ si dei codicibus, in quibus nulla erat extrema eius pars illa, qua iubetur demergi aqua, uino uel cādens igne ferrum. &c. Nos tamen ut erat seruauimus, ex quotidiano rei usu, & ex eo quod Celsus monuit lib. 4. capite. 9. inter lienosorum remedia: pro quibus ait, & post cibum aqua a ferrario fabro petitur, in qua candens ferrum subinde tinctum sit.

S De Stercore ferri. CAP. XXXV.
STERCVS ferri, quam Scoriam uocant, eadem potest quæ rubigo, sed inefficacius. Aconito ex hydromelite potum opitulatur.

D I O S C O R I D I S

C EX M. VERG. COMM.

Metallorum spurciciam ueteres græci Scoriā uocauerunt: Romani, autōre Celso, lib. 1. capite. 1. Recrementum eam dixerunt. Neq; in metallis modo, uerum in multis alijs recrement uoce uſi ſunt: ut primo uolumine in Crocomagmate dictū a nobis etiā eſt, Græci in metallis priuatim Scoriā ſuā ſeruarunt.

πλυνίος
μοις

De Plumbo eloto. CAP. LXXXVI.

Lotura Plumbi ſic fit. In mortarium plumbeum aquam iūiſciens, piſtillo plumbeo terito, donec nigreſcat aqua, & ſucci modo craſſeſcat, aut cœnoſa reddatur. Linteolo deinde colato, aquam infundens: quo facilius quidquid eſt reſolutum incerni poſſit. Hoc facito uſq; dum ſatis habuiſſe uidearis. Vbi confederit, priorem aquam effundens, nouamq; adiſciens, ut Cadmiā lauato, donec nulla extet nigricia. Poſtea in paſtillos cogens reponito. Quidā ſcobem mundi Plumbi lima quæſitam, mortario lapideo, piſtilloq; terunt: aut manibus cum aqua paulatim adiecta fricant, donec nigreſcat. Mox ubi craſſamentum peſſum ierit, colligunt in paſtillos. Nam tritum uehementer, ceruſſæ ſimile redditur. Alij elimatē ſcobi modicā plumbaginē adiſciunt. Afſirmantes ita elotum Plumbum præſtantius eſſe. Poſteſt refrigerare, adſtringere, obſtruere, mollire, explere caua, Siſtere oculorum fluctiones, & ulcerum excreſcentia. Sanguinem ſupprimi. Prodeſt contra ſedis ulcerā, condylomata, & hæmorrhoidas ex roſaceo. Item ad ea quæ ægre cicatricem ducunt. Et in totum ſpodij effectus præbet. Niſi q; non obducit cruſtas. Integrum Plumbum affricſtu, marini ſcorpionis, draconisq; plagis auxiliatur.

D

EX M. VERG. COMM.

Loturam Plumbi Plinius etiā inter latinōs. 14. uolumine, cap. 19. adeo ſimilem huic ſcriptori docet, ut alieni decreti potius interpres q; ſui autor uideri poſſit. Niſi aliqua addidiſſet, quibus non uariari rem, ſed certius & aptius tractari aliquis credat. Quale ſtatim eſt quod in eo legitur, cœleſtem exigī aquam: quæ in plumbeum mortarium conſiſcienda erit, ut plumbeo piſtillo circumacta, mutuo mortarij & piſtilli attritu, plūbi ſubſtantia nigreſcat & craſſeſcat. Quæ duo tantum ille dixit, non ut cæteri interpretes addiderūt, donec ſucci modo craſſeſcat, aut cœnoſa reddatur: non animaduertentes quod a Dioſcoride dicitur, unum tantum eſſe χρυδαίον, id eſt, in limum craſſeſcat: quæ uero ſequuntur, ἢ χρυδαίον ἢ πλωδαίον, gloſſemata & interpretationes illius fuiſſe, Dioſc. codicibus ab aliquo adiectas, dum uult certius indicare quid χρυδαίον ſit: quæ deinde ab imperitijs librarijs in Dioſc. coaluerint. Idem enim omnes ſignificant: nec Plinius ut diximus, aliud q; donec craſſeſcat, inquit. Quale etiā non multo poſt quo loco hic ait. Quidam purum plumbum lima deterentes in lapideo mortario, lapideo piſtillo terunt, addidit ille, Thebaico, lapideo. ſ. mortario: ſed ex ea gente lapide, ex qua ad uſum medicinæ mortaria, ut idem Plinius teſtatur, præcipue probabantur. Quod & ſi non multifaciendū forte alicui uideatur, non tamen inutile penitus nouiſſe fuerit. Quemadmodum maiorem diligentiam exigit, qui ſtatim in Dioſc. ſequitur male ſequax, nec certo ſenſu locus: in quo ſpaciūm, & in ſpacio uſitū nota reliſtū a nobis eſt. Cæteri quod uerſimile erat, & rei neceſſitatem ſecuti, locum iudicio ſuo magis q; ex uocibus quæ illic modo legantur expleuerunt. Quod poterunt græca intelligentes uidere. Nobis non uſum eſt alienis noſtra miſcere.

πλυνίος
μοις

De Plumbo uſto. CAP. LXXXVII.

Vſitur Plumbum ſic. Super q̄tenuiſſimas Plumbi laminas, fiſtili nouo inditas, ſulphur inſpargito, additiſq; rursus laminis,

interiecto semper sulphure, usq[ue] dum uas expleueris, succendito. Flagra te autem Plumbō, ferrea rude uersato, donec perfecte redigatur in cinerem, nihilq[ue] non uisum hæserit. Tum demum obstructis naribus, eximito. Alioquin halitus Plumbi noxius sentitur. Aut climatam scobem in olla cum sulphure urito. Alij laminas in fictili crudo, ut dictum est, imponunt fornaci, aut foco, et circumlinentes operculum, dato exili spiramento urunt. Alij pro sulphure cerussam, aut hordeum inspargunt. Alij integras laminas imponentes, acri igne utuntur, & rudicula ferrea continue mouent, dum in cinerem soluantur. Sed difficilis huiusmodi uisio: & si uehementius uratur, contrahit spumæ argenti colorem. Magis placet nobis prima. Plumbum uisum lauatur ut cadmia, & reconditur. Eosdem effectus habet, quos plumbum elotum, sed multo acriores.

BARBARI COROLL.

Plumbi halitus combusti, canes ocysime interficit, sicut omnium metallorum muscas, & culices; q[ui] obrem non sunt ea tedia in metallis. Plumbum crematum, cui cerussa sit admixta pari portione, aut hordeum, Spodio cyprio a medicis præfertur. Retosum Plumbum est, quando uocetur a chymistis Helcysina. Laminis Plumbi ad lumborum renumq[ue] partes adaligatis, fomina Veneris inhiberi prædicant: quod & Caluus orator, & Franciscus Barbarus auus meus fecere. Athletas Galenus eo remedio uti solitos affirmat. Plumbum græci Molibdon uocant. Multum aeris in Plumbo esse argumentum est, quod in statu aspicitur. Plumbū em q[uo]d pedes earum lapidibus ferruminat, & annectit, ita plerumq[ue] intumescit, ut ex ijs lapidibus crystalli modo pendeant uerrucæ. Multa Plumbi genera connumerant chymistæ græci. Marinum fordet, & asperum est. Sabyesium, & Dalmatense nitet, ac molle dicitur. In Sardiano teneritas, & ærolitas aspicitur.

EX M. VERG. COMM.

Erit opere precium certior adhuc Plumbi cōcturam nouisse cupientibus, Plinium. 34. uo lumine, cap. 18. audire. Multa enim quæ desiderari posse nunc uidentur, certius ab eo traduntur. Qualia sunt, cum sulphuri quod Plumbi lamellis inspergendum est, minutum adijcit: iubetq[ue] trito sulphure ad eam rem uti: & cum, non naribus tantum oclusis Plumbi cinerem tolli, sed spiritus foraminibus: ut os etiam complecteretur, per quod respiratione poterat eadem contrahi noxa. Et cum in fornacem coniectum fictile, in quo Plumbi delimita scobs erit, tam diu coqui uult, donec percoquatur figlinum. Et cum ferro misceri præcipit, præter ferrum, ferulaceis rudibus idem fieri etiam indicans. Nec minus cum cerussam, aut hordea pro sulphure inspergenda pari pondere cum plumbo sumi monet. Multaq[ue] alia eodem modo docet, quibus poterit cōctura Plumbi certius tractari.

De Recremento Plumbi. CAP. LXXXVIII.

Recrementum Plumbi, quod Scoriam uocant, optimum est desum, fractu contumax, cerussam plane representans, nihil plumbosi habens, quod ad mali colorem accedit, & uitri splendorem imitatur. Eadem quæ plumbum exustum potest, sed magis adstringit. Lauatur in mortarijs infusa aqua, & refusa summa aquæ parte, quæ luteum colorem duxit. Idq[ue] sæpius, dum recrementum absumatur. Dein quod subsidit crassamentum, aqua effusa, digeritur in pastillos.

EX M. VERG. COMM.

Monstrante id Celsi Romani sermonis candido autore, græcorum Scoriā Recrementū diximus. Locus in eo est quinto suæ medicinæ libro capite, 18. cum ait. Plumbi recrementum Scoriam molibdu græci uocant. Quid autem in metallis scoria & recrementum sit, satis non multo ante in Ferro dictum a nobis fuit, Plinius eodem quo in cōctura plumbi diximus loco

Gg ij

C de Scoria, sed angustius q̄ hic agit.

modi Coloudit
nibor

¶ De Molibdoide lapide. CAP. LXXXIX.
Molibdoides lapis a plumbi similitudine dictus. Corresponden-
tem recremento uim habet, & eodem modo lauatur.

BARBARI COROLL.
Lapis plumbarius, hoc est, Moliboides, differt a Molibdœna, hoc est, Plumbagine, ut statim
constabit.

¶ De Stibio. CAP. XC.
Stimmi optimum quod splendidissimum est, modocq̄ nitedularum
Semicat, contractu crustosum, nihil terræ aut sordidi habens, friabi-
le, quod Stibi appellant, alij Platyophthalmion, alij Larbason, alij Gy-
næcion, alij Chalcedonion. Vis eius adstringere, obstruere, refrigerare,
excreſcentia in carne cohibere, ulcera ad cicatricem perducere, sordes et
ulcera oculorum expurgare. Sistit & sanguinem e cerebri membrana
profluentem. Et ut in uniuersum dicatur, uis usto plumbo similis est.
Priuatim ambusta igni, in crustas erumpere non patitur, cum adipe re-
centi illitum. Crustosas exulcerationes ad cicatricem perducit, cum cæ-
ra & exigua cerussa. Torretur adipe circumlitum & carbonibus obru-
tum, donec carbunculetur adeps. Exemptumq̄ restinguat mulieris la-
cete, quæ marem peperit, aut uetere uino. Vritur etiam carbonibus suc-
censis efflatum, quoad flagret. Si enim paulo magis concremetur, plum-
bum fit. Lauatur ut cadmia, & æs. Sunt qui ut plumbi recrementum
eluant.

Pli, li, 33, ca. 6.

BARBARI COROLL.
Stimmi, nos Stibium, & Stibi dicimus, in argenti metallis inuenitur, spumæ lapidis candidæ
nitentisq̄, non tamen translucentis. Aliqui Alabastrum uocant, Alabandum, & Alabandi-
cum Actius. Duo eius genera. Mas horridior, scabriorq̄, & minus ponderosus, minusq̄ radi-
ans: & arenosior foemina, quam magis probant: nitet friabilis scissurisque, non globis dehiscens:
Platyophthalmion uocatur, quia dilatat oculos. Gynæcion, quia mulieribus obseruiat, cilia tin-
gentibus, semiorbesq̄ pingentibus. Vnde scitum illud, geometriam exercere foeminas in ci-
lio, præsertim in Hispania. Hippocrates certe Stibium significat, ut Galeno placet: aut crustas
in eo inuentas, q̄ties Tetragonum in medicina nominat. Democritus Stibium nisi locis distin-
guat, Italicum, & Chalcedonium prodendo. Quidam non adipe utuntur coquentes, sed simo
bubulo. Habetur & Stimmi cognomento Regis Alexandri: sed cōpositio medicamēti ea est ad
oculos. Rhyadas, hoc est, qui delachrymationem arcere non possunt, qn̄ per maxillas defluat.

EX M. VERG. COMM.
Stibium hoc est, quod in medicinæ usum a ueteribus inuentum, corruptis moribus paula-
tim ad formæ lenocinium concessit: cum natiuo decore non contentæ mulieres, ad fucum &
amoris illecebras abuti eo inceperunt. Auditur pro muliebri fucō ea uox aliquando in sacris
hebræorū literis, cum præcipitur, ne stibio depinxerit aliquis oculos suos. Quam uocem igno-
rantes aliqui, a stoebe, quæ huic scriptori herba est, Stibium dici & fieri crediderunt: cum tamen
in Plinio, & Celso nihil aque notum sit: tradideritq̄ Plinius. 33. uolumine, cap. 6. principalem il-
li usum circa oculos esse: ideoq̄ Platyophthalmion uocari, quoniam eos dilatat, eorumq̄ flucti-
ones & lippitudines inhibeat. Et quoniam in cura decoris & formæ eo mulieres utebantur, 31.
requisitior, id est, muliebri etiam dici: & si adiectiuo illi potuisse quondam coniungi substantiuum
aliquod nomen, suspicari aliquis possit: Verbi causa, fucū, pigmentum uel, aut simile aliud qd-
piam. Possunt desiderari alia etiam, quæ multa Plinius quo diximus loco longius tradit, uo-
lentibus in eo scriptore cognoscenda.

¶ De Molibdena, siue Plumbagine. CAP. XCI. A

Molibdena optima est flaua, argenteæ spumæ æmula, modice splendens, cum teritur ruffa. Cocta cum oleo iocineris colore trahit. Vitiosa est quæ aërem, aut colorem plumbeum refert. Gignitur ex auro & argento. Est etiam quædam fossilis, iuxta Sebastiam & Corycum inuenta. Quo in genere probatur quæ lapidosa non sit, aut recementosa, sed nitens & flaua. Vim habet spumæ argenti, aut cremæto plumbi similem. Vritur, lauaturq; eodem modo. Miscetur conuenientissime medicamentis, quæ Liparas uocant, atq; emplastris minime mordentibus. Carnem recreat, & ulcera ad cicatricem perducit. Glutinantibus tamen medicamentis, aut abstergentibus non conuenit.

BARBARI COROLL.

Molibdena, hoc est, Plumbago, quam & Galenam uocamus, communis est plumbi, & argenti uena. Commendantur friabiles, & modice ponderosæ. Quæ sint fossiles, metallicas appellant. Laudatissimæ quæ in Zephyrio fiant. Sunt qui Molibdenam inter spumas argenti collocent. Fossilis Molibdena est, & ad uicem Ergasteriam uocatum, inter Cyzicum, & Pergamum octo & quinquaginta millibus a Pergamo distantem. Nominatur & Molibdena, id est, Plumbago herba Plinio, contra serpentes, etiam in aruo, folio lapathi, crassa radice, hispida: quæ cōmanducata, si oculis subinde religetur, Plumbum, quod est, genus uitæ, ex oculis tollit.

EX M. VERG. COMM.

Galenam his terue trigefimotertio & quarto suæ historiæ uoluminibus græcorum, metallicam Molybdenam Plinius uocauit: nō tam ut a Molybdena Plumbagineq; sui generis herba, quam. 25. eiusdem historiæ uolumine, cap. ii. priuatim Plumbaginem dixerat, alia appellatio ne fecerneret: quia scribente eo suam historiam, hæc erat priuatim metallicæ Plumbaginis appellatio, ab Hispaniæ Galecia, ut credimus, facta, in qua celeberrimæ quondam metallorum ferre omnium fodinæ fuerunt. Quæ quoniam nostrâ ætate nulla est, nec habet ea uox aliquā nūc significationis æstimationem, impune, & sine inuidia relicta a nobis fuit: præsertim in re quæ ex substantia suâ certius indicanda erat. Plumbago ob eam causam Molybdena hæc dicta: & ne cū herba misceretur, ex metallo nota illi adiecta est. Herbam quo diximus loco Plinius manifeste Plumbaginem uocauit: causamq; addidit: quoniam si commanducata oculis subinde religet, Plumbum quod est in ea parte uitæ genus, tollat. Metallum toto hoc capite Diosc. nihil simile communeue cum herba habens, quæ in Plumbi nomen & honorem ex usu tantum recepta est: id autem ex plumbi substantia iustius Plumbaginis nomen inuenit. Gigni hæc ex auro & argento hic scriptor ait: quale autem id sit Plinius ostender, adherescere dicens argenti & auri fornacibus. Ostendit itidem plumbi uenam esse Plumbaginem: multa q; alia, quæ nos breuitati cōsulentes, relinquimus in eo scriptore nouisse ea uolentibus exposita. Fit quod nouerunt metallici, Plumbago alterius metalli, argentiq; præsertim coctura: quodq; excrementum ex his plumbosum fuerit, Plumbago ueteribus fuit. Verumtamen fossilis eadem quondam inueniebatur ad Coryci, ut nos uertimus, Sebastiam, in Asia tunc notissimam regionem: cui Corycum hic adiecit, ut a reliquis quæ diuersis regionibus Sebastię urbes & oppida tunc audiebantur, separaret. Fuit enim frequens id quondam nomen: numerabaturq; in Armenia Sebaste ciuitas, numerabatur in Iudæa, numerabantur & alijs locis aliæ: omnes in Romanorum Caesarum gratiam sic dictæ. Quas enim Augustas Germania, & Hispania nominauerunt, eas græci Sebastas, & Sebastias dixerunt. Est enim Sebaston græcis idem quod Romanis Augustum. Intelligitq; hic scriptor κατὰ σέβασταν καὶ κόρυκον ὑπὸ τὴν κομίνην dicens, Coryci Cherfonesum hoc nomine quodam in Asia sic appellatam.

¶ De Recremento argenti. CAP. XCII.

Recrementum argenti, quod Scoriam uocant, aut Helcysina, aut Encauma, molibdenæ uim habet. Quare emplastris quæ phlegmas appellant, additur, ac medicamentis quæ cicatricem obducunt, ut potest.

Gg ij

C te cum adstringat, extrahatq;

EX M. VERG. COMM.

Coniunctum natalibus plumbagini argenti recrementum est; ideoq; paulominus q̄ cōtinuata historia a Diosc. docet. Fit em̄ ex argento utrūq;. In scoris metallicisq; recrementis omnium genere, solum argenti recrementum priuatim Helcysma græcis dictum est. Testatur id Plinius, 33. uo lumine, cap. 6. his uerbis. Scoriā in argento græci uocant Helcysma. Testantur idem græci latiniq; omnes; nec aliunde q̄ ab extrahendi ui quam habet, factum illi nomen est.

αυθδργγορ

De Spuma argenti.

CAP. XCIII.

Spuma argenti quædam gignitur ex harena, quam Molibditin uocant, in fornacibus conflata, donec perfecte incandescat. Altera ex argento. Tertia ex Plumbo. Probatissima est Attica. Secunda Hispaniensis. Has sequitur quæ fit Dicæarchiæ, id est, Puteolis, Baijs, in Campania, & Sicilia. Plurima enim hisce locis e flagrantibus laminis plumbeis gignitur. Quæ flauo colore splendet, Chrystitis appellatur, melior cæteris. Quæ in Sicilia, Argyritis. Quæ ex argento, Calabritis, Vis autem adstringere, mollire, explere caua, excrescentia in carne reprimere, ad cicatricem ducere, refrigerare, & occludere. Viritur Argenti Spuma, confractis partibus ad magnitudinem iuglandium, ita accensa foliibus. Abstergitur infidens spurcicia, & reconditur. Aliqui quater aceto, aut uino restinguentes, iterum urunt & eadem prosequuti, reponunt. Lauat ut cadmia: ut Argyritidi nominatæ, aut si desideret, alteri cædor detur, ea in parteis magnitudine fabarum confracta, chœnicis atticæ mensura, fictili nouo superfusa aqua, adiectis candidi tritici quatuor sextarijs, priuatimq; pugillo hordei, linteolo raro auribus uasis alligato, coquitur, donec hordeum fractum dehiscat. Deinde omnia in nouum craterem oris ampli transfunduntur. Triticum abiicitur. Spuma argenti uehementer manibus affricando, aqua lauatur, assiccataq; in thebaico mortario teritur, affusa feruente aqua, donec dissoluatur. Excolata aqua, iterum tota die teritur, & uesperis infusa calida aqua sinitur. Mane colis excernitur. Alia infunditur, atq; ter die excolatur. Id septem diebus fieri solet. Postea additis ad singulas minas Spumæ argenti, quinis salis fossilis drachmis, infusaq; calida aqua, ter in die teritur, & addita aqua excolatur. Cumque inalbuerit, calida infunditur, dum nullam prorsus falsedinem resipiat. Demum ardentissimo sole siccata, eiectione prius humore, reconditur. Sin minus, mina Spumæ Argyritidis diligenter teritur, addito sale fossili trito, triplicato pondere, in fictile notium conicitur. Aqua infunditur, ita ut superemineat. Mouetur quotidie mane & uesperis, aquaq; superinfunditur, priore nequaquā effusa. Hoc fit triginta diebus. Namq; nisi moueatur, crassescit usq; in duriciæ teste. Post hæc effusa leniter muria, in thebaico mortario Spuma argenti teritur: cōiectaq; in fictile aquam continens, manibus diligenter agitur, mutata subinde aqua, donec nullum falsedinis indicium præbeat. Deinde quod

A ex argenti Spuma candidum apparet, in uas aliud transfertur, & redactum in pastillos, plumbea pixide conditur. Alij Spumam argenti in fabarum magnitudines contractam, in uentre suillo crudo ex aqua coquant, dum uiscus eliquecat, exemptamq; cum sale pari terunt, & ut supra dictum est, lauant. Sunt qui salis libram unam, & Spumæ argenti tantundem in sole terant, aqua continue mutata, dum candor ei detur. Alia ratio. Sumito quantamuis Argenti Spumam, ubi lana candida inuolueris, fictili nouo indita aqua, cum pugillo fabarum recentium, repurgatarumq; decoquito. Cumq; fabæ disruptæ fuerint, lanæq; dealbuerit, exemptam Argenti Spumam, & altera lana inuolutam, iterum coquito, cyathum aquæ & parem fabarum modum adiiciens. Eadem tertio quæ supra, facito. In summa, tantisper dum lana iam non inficiatur. Insuper transfundens in mortacium, ad singulas salis fossicij libras adjicito octogenas Spumæ Argenti drachmas atticas, & terito, intermittensq; nitri q̄p albißimi cum aqua diuisi, drachmas quadraginta septem indito. Iterum terito, donec satis candoris contraxisse uideatur. Ita autem fundens eam ex alto in fictile oris ampli, adiecta largiore aqua, ubi confidere desierit, colato. Vicissim eadem prosequere, dum pura aqua dulcisq; effluat, & nullam falsedinem præ se ferat. Postremo in fictile nouum translata, colato sensim omni humore, soli quadraginta diebus, sub caniculæ sydus exponito, & siccata utitor. Elotam autem constat ad oculorum collyria prodesse, & ad cicatricum sceditates tollendas, ad rugosas facies, & cicatricosas, laceratasq; & macularum plenas.

BARBARI COROLL.

Spuma argenti, hoc est, Lithargyros, distat a Scoria, quo a sece spuma. Lithargyros, purgantissimæ materiæ uisum est, Scoria purgatæ. Tria Spumæ huius gēna nostri habent. Chrysitin: quæ fit ex ipsa uena, & est optima. Secundam Argyritin ex argento. Tertiam Molibdiin, plumbi ipsius rufura, quæ fit pureolis: & plerūq; omnes hi colores, in eisdem tubulis inueniuntur. Quidam duo genera eius nouerūt, quæ uocant Stelerythida, & Peumnen, tertium Molibdenam: de qua diximus. Omnis autē Spuma, fit ex cocta sua materia, ex superiore catino defluens in inferiorem: eo sublata uerruculis ferreis in ipsa flamma conuoluitur uerruculo, ut sit modici ponderis. Est autē, ut ex ipso nomine intelligi potest, feruescentis, & futuræ materiæ Spuma: flet Argyrolithos a Lithargyro, ut in lapide Selenite diximus.

Pli. li. iii. ca. 6.

EX M. VERG. COMM.

Operosa græcis, ut uidetur Lithargyri sui confectio fuit: licetq; præter argentū ex plumbō etiā fieret, a meliōre tamē metallo nomen seruauit. Compositaq; ex argento & lapide appellatione, ex qua præcipue fieret, substantiā græci indicauerunt, Lapidem, uenam eius metalli intelligentes: quæ conflata igne, ut in coctura omni fit, eam ueluti Spumā redderet. Latini cocturæ eius euentū, & quod ex ea fieret contemplati, eiusdem metalli seruatō nomine, Spumam argenti uocauerunt. Fuitq; non Plinio tantū, sed cunctis alijs Romani sermonis primis auctoribus, in indicanda re hac propria & quotidiana ea uox. Nec dubitandum alicui est, non esse latini argenti Spumam, quæ græcis Lithargyros est. Vnusq; satis in ostendenda re Plinius erit, qui, 3. suæ historiæ uolumine, capite. 6. omnem Spumæ huius confectiōem, discrimina, appellationes, cocturam, loturamq; & usum similiter huic docuit, Argenti Spumam semper appellans. Eritq; scriptorem eum legētib; in tota hac re non parū operæ precium. Multa enim angustius ab hoc scriptore dicta certius audient: & ex his quæ aliter ab eo traduntur, suspicari in Dioscoride male forsitan legi aliqua poterunt.

Gg iij

C

Cerussa fit hoc modo. Infuso in urseum oris lati, aut fictile labellū cōacerrimo aceto, laminam plumbeam supra fictilis spiraculū, subiecta prius arundinea tegete, firmato: superiectisq; uelaminibus, ne halitum expiret acetum, ubi resoluta fuerit, defluensq; deciderit, humor purum ad summa delatum colato. Crassamentumq; transfundito. *Debet quoq; siccare in sole, mox trusculi mola teri, alioquin tritum cribrari.* Postea quod superest duri, in tenues partes redigendum, cribrandumq;. Vicissim eadem tertio, quartoq; facienda. Melior quæ primo cribrata est, & medicamentis oculorum assumenda. Secundum locum tenet sequens, & reliquæ suo ordine. Nec defunt qui ligneam rudem in medio uase appendant, & supra cratem plumbum imponant, ita ut acetum non contingat, inditocq; operculo circumlinentes dimittunt. Post dies aliquot, laxato obturamento uisunt. Cumq; resoluta materia fuerit, reliqua ut supra diximus exequentur. Si autem quis in pastillos uelit digerere, aceto acri subacta diuiditur in pastillos, qui in sole siccantur. Aestate tamen supradictum opus obeundum est. Ita enim candida atq; efficax redditur. Quinetiam hyeme paratur, urseis supra furnos, balnea, aut fornaces impositis. Ascendens enim calor, idem quod sol præstat. Laudatissimam fieri putant Rhodi, & Corinthi, aut Lacedemone. Proximā Puteolis. Torret hoc modo. Flagrantibus igni carbonibus, fictili nouo, maxime attico, tritam Cerussam imponito, & assidue uersato. Cumq; cinerum colorē traxit, eximēs refrigerato, & utitor. Est & aliud uerendi genus. Trita patinis supra prunas imponitur, & ferulacea rude mouetur, donec similis sandarachæ fiat. Extractaq; ad usus ministratur. Quæ uero ita parata est, Sandyx a quibusdam dicitur. Lauatur Cerussa cadmiæ modo. Vis ei adstringere, occludere, emollire & explere. Insuper ex crescentiâ reprimere, & ad cicatricem perducere. Miscetur cæratīs & emplastris quæ liparæ uocantur, pastillisq;. Est autem lætalis eius potus.

Pli. li. 74. ca. 19.

B A R B A R I C O R O L L.
Cerussa, hoc est, Psymithion, colos est e candidis. Fuit & terra per se in Theodoti fundo Smyrnæ, ad nauium picturas ueteribus: de qua tamen in terra Melina differendum nobis est. Nunc omnis Cerussa ex plumbo & aceto fit. Sandyx uero ex Cerussa, si torreatur æqua portione rubrica admixta. Quæ Virgilius herbam uidetur intellexisse uersu illo, Sponte sua Sandyx, pascentes uestiet agnos. Si Plinio, et Seruio grāmatico credamus, qui herbā dicit esse Sandycem, ex qua Sandycinus color fiat. Quidam pro colore ipso acceptā a poeta Sandycem existimant. Preciū Sandycis in libras asses bini, & semis, hoc est, dimidiū eius quod Sandarachæ. Paulus Sandycē, et Siricon, & Sericon uocari scribit. Syricon Aetius, & Plinius; hinc hodieq; Mauritanī Sarcon eam nominant, Syricū inquit Plinius, facticius est colos, ex Sinopide ac Sandyce mixtis, quo Miniū sublinis, adulteraturq;. Nam Seyricū, aliud genus est, ut in Ceruleo noiauius.

E X M. V E R G. C O M M.
Dant gentibus Cerussam plumbariæ officinæ. Conficiuntq; eam huic scriptori eodē modo Plinius & Vitruuius: alter historiæ naturalis, 74. uolumine, capite. 18. alter suæ architecturæ, 7. cōmentario, Laudantq; ambo, & cunctis alijs præferunt Rhodiam: non tamen bonita-

tis eius censum per gentes ultra faciūt. Hic diligentior, & humanæ salutis certius, & ex professo consulens, post Rhodiam Corinthiam & Lacedæmoniam, & ab his quæ Campaniæ Dicæarchia conficiebat, numerauit. Nec aliquid legentibus in Cerussæ confectione desiderandū reliquit, quæ dierum numerū, quo operculatum & circumlitū uas illud dimittendum sit. In prima si quidem confectione, donec solutū fuerit plumbum. In secundā, *ἡμερῶν ἀραιουμένων*. &c. Quā partem deficiente dierū numero, post aliquot dies, nos uertimus. Poruit quidem numerus ille huic scriptori librorum incuria perisse. Verumtamen Viétruuſus etiā nullo temporis certo decreto spacio (post certū enim tempus tantū ait) quæ a Dioscoride incerta relinquuntur confirmasse uidetur: esseque tempus id, cum solutū fuerit plumbū. Plinius rem certius tractans, *his uerbis rem docet. Fit & alio modo, addito in urceos aceti plumbo obturatos per decem dies*. Credimusque nos, & paulominus quæ pro comperto testamur, diebus scriptoris huius adijciendum esse denarium Plinij numerum. Inconcinnus enim, & scriptore hoc indignus sermonis ductus ille est. Neque enim *ἡμερῶν* aliud, quæ post dies, significat. Quæque a nobis, & ab alijs indefiniti numeri uox, aliquot, addita est, ad concinniorē sensum, & maiorem rei certitudinem addita est. Quemadmodum a principio capitis etiam, cum diximus (uentricoli id uasis genus est) græcorum Gastram certius indicantes, & uasis in medio tumentis formam ostendentes, quæ olearij urcei nostra ætate passim uidentur. Quod Plinius intelligēs, urceos in hoc ipso usu sæpe appellauit. Quā deinde hic *μακροτέρων πλινθίων* imponendam uasis ori dixit, Barbarus communem eius uocis æstimationem secutus, laterem plumbeum imponi iussit. Alter aptius, laminam plumbeam. Nos tegulam, cetiore adhuc, ut credimus similitudine, & græcæ uocis seruata significatione. Si quidem *πλινθίων* appellatione laterem quidem plerumque, aliquando tamen omnē in ædificio necessariam siglinam, lateres scilicet, imbrices, tegulas, & si qua in hoc genere alia sunt antiquiores Græci uocauerunt: & ex tegularum similitudine hic plumbeam Plinthus dixit uasi huic superponendam esse, cuius patentius os lateris unius latitudine totū tegi non poterit. Quinetiam in columnis architecti Plinthus nominauerunt, quod in earum basi spiris subiaceret. Vtque in superiore capitulo Abacus, sic in inferiore basi Plinthus est, ex æquata latitudine ueluti tabula. Sunt & alia his similia in reliquo capite, quæ nobis & alijs eadem non sunt, legentium diligentia & censura relicta.

De Chrysocolle.

CAP. XCV.

B

Χρυσocolle

CHRYSOCOLLA laudatissima Armeniaca, colorem Porri quæ simillime reddens. Secundum locum sibi uendicat Macedonica: & proximum Cypria. Quo in genere præfertur pura. Damnatur quæ terram, aut calculos collegerit. Ratio lauandi hæc est. Tufam infusa aqua, mortario ex passa manu ad pilam uehementè fricato, & statim quæ confederit colato. Alteram infundens aquam, rursum terito. Hæc uicissim prosequere, donec pura, syncæraque spectetur. Dein siccato in sole, & ad usus recondito. Quod si urere uolueris, ex ea terens quod satis esse uidebitur, patinis supra carbones adponito, & alia facito quæ supra diximus. Dos Chrysocolle ad purgandas cicatrices. Excreſcentem carnem coercet. Adstringit, purgat, excalfacit, & modice corpus mordendo exest. Inter medicamenta intelligitur, quæ uomitiones concitant, & necem inferre possunt.

BARBARI COROLL.

Chrysocolle, humor est in puteorum scrobibus, per uenā auri canaliensis defluens, crassescens limo rigoribus hybernis, usque in duriciā puniceis. Laudatiorē eandem in ærarijs metallis, & proximā in argentarijs fieri compertum est. Inuenitur & in plumbarijs, utilior etiam auraria. Macedonicam Democritus æris similem ærugini describit. In omnibus autem ijs metallis fit, & cura multum infra naturalem illam, immixtis in uenam aquis leuiter hyeme tota, usque in Iunium mensem: dein siccatis Iunio, & Iulio: ut plane intelligatur nihil aliud Chrysocolle, quæ uena putris. Natiua duricia maxime distinguit, Vuam uocant: & tamen illa quoque herba quam Luteam appellant, tingitur. Natiua est, quæ lino, lanæue ad succum bibendum tundi-

Pli. li. 53. ca. 7.

D I O S C O R I D I S

Cur in pila: deinde tenui cribro cernit: postea molitur. Demū tenuius sic cribratū, quicquid non transmeat, repetit in pila: & iterū molitur: puluis semper in catinos digerit, ex aceto macerandus, ut omnis duricia soluat, ac rursus tundit, dein lauat in concis, siccaturq;. Tum tingit Alu- mine fissili & herba supradicta, pingiturq; anteq; pingat, nisi rapiat colorem. Addunt & Scy- rum, & Turbystū. Ita uocant medicamenta forbere cogentia. Cum tinxere pictores, Turesobi- tin uocāt, Medici Aceffin, quæ non sit tincta. Duo eius genera: pictoribus luteæ, quæ seruat in lomenta: & liquide; globulis sudore resolutis. Vtrūq; in Cypro fit. Alij tribus eam gñibus di- stinguunt. Asperam, quæ taxat in libras septem. Mediā, quæ denarijs quinq;. Attritam, quā & Herbaceā uocant, quæ tredecim. Luteam porro dictā putant, ab herba cognomine, a qua etiā adulterat. Et eū Ceruleo uiridiue subtilit, & pro Chrysocolle inducūt, uilissimū gñis, fallacissi- mūq;. Creta æstimat festerijs in libras. Nouitius est & anularius, sed candidus, quo mulieres picturæ illuminant ex Creta, & ipse admixtis uitreis gñis ex uulgi annulis, unde & nomen. Chrysocolleam in Hispania copiosissimā haberi narrat. Sublinunt aut arenosam, priusq; indu- cant attramēto, & paretonio. Hæc sunt tenacia eius, & colore blanda. Paretoniū quoniā est na- tura pinguis, & propter seuorē tenacissimū, attramēto inspergit: ne paretonij candor pal- lorem Chrysocolleæ afferat. Strauit Chrysocolleæ spectaculis circi arenā princeps Nero.

E X M. V E R G. C O M M.

Dvplex antiquis Chrysocolle fuit, si Plinio in latinis, in græcis uero eius gñis medicis cre- dendū est: Altera, quæ in cunctis fere metallis, laudatior tamē in ærarijs inueniret. Altera, quæ ut græcorum scriptores docent, rubro ære, & impubis pueri urina: ut autem Plinius monuit, Cypria æruginē, & eiusdem pueri urina addito nitro temperaretur. Hanc aurū operibus indu- centes, agglutinando auro necessariam sibi uendicauerunt, ab hoc usu nominatā existimanti- bus cunctis. Siquidem nihil Chrysocolleæ uox aliud, q̃ auri glutinū indicat. Metallicam cōtra illam medici sibi seruauit. Naturalem, per uenas auri defluentem, crassecente limo hybernis fri- goribus usq; in duriciem pumicis, de qua tantū hoc capite agitur: indeq; facto nomine. Quā- uis ut antiquiores omnes testant, laudatior in ærarijs metallis fluere: proximaq; illi in argen- tarijs: postrema aut in plumbarijs, quæ auraria priore illa uiliore etiā esset: & nihilominus no- men illi ex auro factum est: ob preciū, bonitatesq; alias, deferentibus auro hunc etiā, ut credi- mus, honorē gentibus. Nihil metallicam Chrysocolleam peritiores aliud esse tradiderūt, q̃ hu- more per puteos metallorū defluentē, qui frigore, ut præmonstratū est, in pumicis duriciem du- ret. Nec minus cura etiā fiat, sed multo infra naturālē illū, immixtis per metallorū uenas aquis leuiter tota hyeme usq; in Iuniū mensem: dein eo tēpore siccatis, ut plane intelligatur, putrē me- talli uenā esse Chrysocolleā, colore uiridi: ob quā causā hic primū laudauit, τὴ χρυα κατακόρως παραϊουσαν. quod redditū a nobis est, usq; ad satietatem uirentē. Satietatē intelligētib; q̃d ab undet, & ex copia facto fastidio minus placeat. Nec ultra id quicq; adiecimus, eodē huic scri- ptori uerbis rem ostendētes. Cæteri interpretes quæ ab eo non dicunt, plerāq; addiderūt. Al- ter ad Porri colorē contracta re, ratus παραϊου uerbū, quoniā græcis παραον Porri sit, eius ole- ris colorē tantū indicare: cum tamen oēm uiredinē eo uerbo græci indicent: hoc uno ut cætera omittamus, indicio, q̃ παραον in hortis uocat ea gens, cōfitas oleribus, ideoq; uirentes areas. Alter ex Plinio longius, q̃ oportebat rem describit: qui. 33. uolumine, capite. 7. Chrysocolleæ huius bonitatē indicans, ait. Summa cōmendationis est, ut colorem herbæ segetis letæ uiren- tis, q̃ simillime reddat. Quæ tota, τοῦ κατακόρως παραϊου in scriptore hoc summa est. Potuit ille sui auctor, non alieni operis interpret, qua magis placuit rōne, quod scribebat docere. Interpre- tem contra auctoris sui uestigijs inhære oportuit: ne frustra cogere aliquādo herbā, & uiren- tes letas segetes, quæ nullæ in scriptore hoc sunt, aliq; querere. Hæc est Chrysocolle illa, qua Ro- manæ historiæ scriptores, stratum a Nerone circū maximum dixerunt, qua die concolori pan- no aurigaturus esset. Bonitatis Chrysocolleæ censum per nationes aliter Plinius, quo diximus loco tradidit. Reliquit enim Cypriam: & pro ea largissimā in Hispania inueniri ait. Viētruius septimo suæ architecturæ libro, pingendis parietibus, forte utiliore solā Macedonicā lau- dauit. Verba eius sunt. Chrysocolleā apportatur a Macedonia. Foditur autē ex his locis, qui sunt proximi ærarijs metallis. Quotidianus & multus fuit quondā in pingendis tridinijs, cu- biculis, & porticibus Chrysocolleæ usus: quoniā sylvarum, & uirentis agri modo oculis color eius blādiret: quemadmodū nūc etiā, sed alio colore, uiridi scilicet creta, passim fieri uidemus. Quod superest, unū adhuc monebimus: contra aliorū æditiones a nobis redditum, quo loco scilicet hic ait, habere Chrysocolleā ἀναμιν σμικτικόν, ut fere in cunctis legitur, δὺλον, quæ uox ci- catricū, significat. Ideoq; ab illis, Valet cicatrices exterere, et ad purgandas cicatrices, locus red-

ditus est. A nobis autē, ad extergenda ulcera, cōtracta res fuit. Habuimusq; in ea diuersitate au-
ctores, ueterū primo & meliorē codicū fidem; in qbus ὑλκων, id est, ulcerū, non δολων, id est, ci-
catricū legitur. Mox Paulū Aeginetam. s. suā medicinā libro restatū, ὑλκωσιν κακοῦθασιν ἀρμόσθιν,
id est, dolosis et maleficis ulceribus accommodatam esse. Et si recipiendū sit, quod quadamtenus
simile fuerit, Pliniū etiam qui eodem loco ait. Vfus Chrysocolle, & in medicina est ad purgan-
da uulnera, non adeo dissimili ulcerum & uulnerum natura euentuq; : ut non possit hoc etiam
ueluti teste, quod dicimus confirmari. Adijciemus præterea, ne suspiciones nostras etiam relin-
quamus : non penitus ab re forsitan fore cicatrices legi, non tamen simpliciter, sed oculorum.
Quoniam idem eodem loco Plinius dixerit, Miscetur & collyrijs ad oculorū cicatrices. Quod
si recipiendum sit, perisse oculorum uocem eo loco constituendum erit. Verumtamen nulli-
bi in græcis inuentis oculorum cicatricibus aliquibus, & in probatoris fidei inuentis ulceri-
bus, accedente Pauli testimonio, in ancipiti illud elegimus.

De Armenio lapide.

CAP. XCVI.

AR M E N I V S lapis præfertur læuis, colore ceruleo, percū-
pæquabilis, calculo carens, & friabilis. Eadem quæ Chrysocol-
la præstat, sed inefficacius. Quinetiam usum habet ad pilos in palpe-
bris alendos.

BARBARI COROLL.

ARmenius, siue lapis Armenius, & Armeniacus, inter colores floridos uocatos deponitur.
Sunt autē Colores floridi, q̄s dominus fingenti p̄stat, Minius, Cinnabaris, Chrysocolle, Indici,
Purpurissum. Ideo em̄ q̄ preciosi sunt, legibus excipitur, ut a domino, non a redēptore repræ-
sentent. Ceteri austeri nominant. Armenia hūc mittit. Lapis est Chrysocolle modo infectus :
optimūq; est quod maxime uirer, cōmunicato colore cum Ceruleo, in libras tricenis quondā
numis. Nunc inuenta per Hispaniā arena, quæ similem curā recipiat, ad denarios senos uilitas
redijt. Distat a Ceruleo candore modico, qui teneriorē Armenio colorem efficit. Differt sine
dubio ab Armenio, ea gleba quā Bolon armeniam uocamus, dicendam inter Cretas.

EX M. VERG. COMM.

Mittebat quondā Armenia sui nominis lapidem hūc. Chrysocolle modo is infectus erat,
colore maxime uiridi, sed cum Ceruleo cōmunicato. Idq; est qd̄ hic ait, καὶ τὸ χρῶμα κυανὸν ἐ-
μαλόντι. Vertimusq; nos, in quo ceruleus color aliquis est, & æqualiter cōmunicato sibi eo co-
lore splendet. Meminit Armenij Vitruius etiam libro septimo, sed ut doceret tantū, quem
in architectura, & pingendis parietibus usum quondam habuerit.

De Cæruleo.

CAP. XCVII.

Cærulei origo ex ærarijs metallis in Cyp̄o. Copiosius ex ha-
rena littorali, secundum quosdam sub cauatos specus maris in-
uenitur, quod magis probatur. Eligi debet merum. Vritur ut Chalcitis.
Lauatur ut Cadmia. Vim habet reprimentem, & modice erodentem.
Crustas gignit, & exulcerat.

BARBARI COROLL.

Ceruleum, siue lapis Ceruleus, hoc est, Cyaneus a Theophrasto, Galenoq; Cyanos maf-
culino & feminino genere pronunciat. In argenti & auri metallis fit, sicut & Sil: de quo prius
ut agatur, cōmodius est. Color Sili, ut Ochreæ luteus : qui tamē cremato Sile marmoroso, ace-
toq; restincto, abit in purpureum: quod nos experti sumus, & testantur Vitruius, atq; Plini-
us. Optimū Sil, quod Atticiū uocatur. Preciū in pondolibræ. 22. Proximū Marmorosum, quo
tantū utuntur ad abacos: quoniam marmor in eo resistit amaritudinī calcis. Hoc subdimidio
Attici precio est. Tertium genus est pressum: quod alij Scyricum uocant, ex insula Scȳro, iam
quidem & ex Achaia, quo utunt ad picturę umbras. Cuius preciū sextertij bini, uel octoni. At
quod uocatur Lucidū, uenit e Gallia, precio Scyrici dupondijs detractis, quo & Attico utun-
tur ad lumina. Effoditur & ad uigesimū ab urbe lapidem in montibus: quod quidem crematū
adulterū est pressi. Deprenditur amaritudine, & quoniam resolutū est in puluerem. At Cæru-
leum non limus, sed lapis, & harena est. Huius genera tria ueteribus fuerunt. Aegyptiū, quod
ad syncera, meracq; lomenta maxime probaretur, Scythicum, ad dilutiora : & enim hoc di-

A

ἐρμύριον λίθος

Pli. li. 35, ca. 6.

B

κυανός

Pli. li. 37, ca. 19.

Cui facile. Cumq; teritur, in quatuor colores mutatur, candidiorem, nigriorem, crassio rem, tenuiorem. Qz q; hoc Ceruleo in commune Theophrastus, non Scythico solū tribuit. Tertiū quod & præferebat Scythico, Cyprium. Adulteratur autē Aegyptium, ut idem Theophrastus ait, quodā genere, idq; in gloriā regis Aegyptij adscribit, qui primus tinxit. Alio loco Plinius hæc tria Cerulei, siue Cyanei fastigia, Aegyptiū, Scythicum, et Cypriū, inter gemmas, nescio q; recte collocauit, ut in castigatione Pliniana indicauimus. Etenim scire oportet, Cyanon etiam gemmā esse proximam, & germanā laspidi. Ea uero, de qua hic agitur, metallicam & arrosam esse. Ea res peperit errorem scribentibus, ut utriq; genus pro uno eū obliiti confunderent. Accellit his Puteolanū, & Hispaniense, harena similiter sibi coapta confici. Viſtruuus Ceruleū ait fieri, harena cum niri flore in farinā cōtrita, & æris Cyprij scobe admixta factis orbiculis: qui siccati urceo fictili condunt in fornace, ut confudent, atq; ita Ceruleū colorem præferūt. Tingitur autē omne Ceruleū, & in sua coquit herba, bibitq; succū. Reliqua curatio eadem, quæ Chrysocolle. Ex Ceruleo fit quod uocatur Lomentū. Perficitur id lauando, terendoue. Et hoc est Ceruleo candidius. Precia eius. 2. in libras. Cerulei. 18. Vſus in Creta, calcis impatiēs. Nouissimē superuenit Nestorianū, ab auctore Puteolis id curante. Fit ex Aegyptij leuissima parte. Preciū. 40. in libras. Idem & Puteolani uſus, præterq; ad fenestras. Vocant Cyllon. Est & subtilissimū genus Lomēti, quinis assibus taxatū, qd Atticū uocant, hoc est, ut puro λιωμα. Qz q; Lomentū ipsum a Theophrasto λιωμα dici uideo. Cerulei sinceri experimentū, in carbone ut flagret. Fraudat uiola arida decocta in aqua, succoq; per lintheū expressū in cretā erethriam. Sile primi instituere pingere Polygnotus & Mycon Artēo dūtaxar. Hoc secuta ætas ad lumina est uſa. Ad umbras autē Scythico, & Lydio. Lydiū Sardis emebat: qd nūc, ut ait Plinius, obmutuit. Difficillime terit Sil. Ab hoc, arbitrantur aliqui, Silatum uinū: quod & Sil uocat, & Silaceus color. Sil & Ausonius potat. Latiaris, an peregrina sit uox addubians. De uino Sil, Cornelius mentionē habet. Auctore Festus. Ob id Græci Dianestimon, & Acrasima id appellabant. Sunt qui a Sefeli, quod Tordilon & Sile dicitur, Silatum uinum deriuent. Sed auctorem nec ij ullum habent. Erat autem ientaculum, ut Athenæus tradit, buccia ex uino: quod genus barbari, a uino & pane Vippam uocant.

E X M. V E R G. C O M M.

DColorum duplex quondam, quemadmodum & nostræ ætate, ratio fuit. Nascuntur enim aliqui, & exigua aut nulla hominis opera ad temperaturam indigent. Finguntur contra aliqui, & sine hominis opera nulli sunt. Nascuntur Ochra, Minium, Chrysocolle, & pleriq; alij. Fingebantur autem quondam atramentum, ærugo, hyalos, pluresq; alij, quibus similes nostræ ætatis pictura, nunc etiam multos alios fingit. Facileq; erit uolentibus antiquorum in his temperaturas, confectionesq; omnes a Plinio & Viſtruuio audire. Ceruleum in utroq; genere quondam fuit. Nascebatur enim & fingebatur. Illud in metallorum fodinis, præsertimq; æris: in quo genere Cyprium hic ceteris anteponit: Hoc littoralis harena, nitro, æreque, ui ignis excoctis eisdem in pictura habebat uſus. Fuitq; ut fere omnium in natura rerum fortuna est, multiplex Cerulei bonitas, ex nationibus confectionisq; temperatura ab antiquioribus obseruata. Quæ omnia a duobus illis scriptoribus certius docent: ab altero naturalis historia. 3. uolumine, cap. 11. ab altero. 7. suæ architecturæ cōmentario. Quæ potuissent, debuissentq; a nobis repeti hoc loco, nisi iisdē uerbis cuncta illa in Corollario suo Barbarus collegisset. Nec eo secius nostra hæc legentes hortamur, historia pigmentorumq; disciplinæ huius magistros sibi antiquos scriptores illos potius fecisse. Intelligent enim certius, quid nam in Ceruleo hic dixerit. Nasci in Cypro, in ærarijs fodinis, & ex littoralis harena copiosissimum fieri Ceruleum: quod in toto hoc capite præcipuum est.

De Indico.

CAP. XCVIII.

Indici duo genera. Vnum sua sponte nascitur, tanquā spuma germinatione, Indici harundinibus exiens. Alterum insectoriæ dant officinæ. Et est spuma purpurea innatans cortinis, quam detractam artifices siccant. Optimū existimatur, quod Cærulei speciem præbet, succosum, & læue. Inter medicamenta est quæ uelociter adstringunt, & inflammationes, tumoresq; rumpunt. Purgat & reprimat ulcera.

BARBARI COROLL.

A

Indicum Ceruleo proximum est, ex India nō pridem, ut Plinius inquit, apportari cœptum: cuius precium in libras. 17. alibi denarios uiginti reddit, inexploratē sibi hoc inuentionis fuisse tradens, & inter Cerulei genera constituens. Ratio in pictura, ad incisuras, hoc est, umbras diuidendas ab lumine. Quod ex India inquit uelitur, harundinū spuma est, adhærescente limo, cum teritur nigrū. At in diluendo mixturā purpuræ, Ceruleq; mirabilē præsentat. Alterū spuma est purpuræ. Adulcerant uero Indicum, stercora columbiā, uel cretā selinusiam, uel anulā riam uitro insicientes, ut Vitruius ac Plinius testantur. Probatum carbone. Reddit em̄ sincerū flammā, excellentis purpuræ, & dū fumat, sapit mare: ob id quidā ex scopulis id colligi putāt.

EX M. VERG. COMM.

VNum tantum Indici genus ostendi nūc potest; neq; antiquum forte illud quod ab Indis in quibus nascitur nomen sibi fecit. Alterum ex quo desit tingi purpura, nullum inter gentes est. Nouerunt nunc omnes Indicum, quem nostra ætas habet, eamq; ob causam in uulgari re nihil ultra nobis laborandum.

De Ochra.

CAP. XCIX.

Ochram leuissimam, & uehementer luteam eligere oportet, meram, & aliena materia uacantem, non lapidosam, friabilem, natione Atticam. Vritur hæc, & lauatur cadmiæ modo. Vis eius adstringere, erodere, collectiones & tubercula dissipare, Excreſcentia in carne reprimi. Caua cum cæato explet. Et articulorum tofos comminuit.

BARBARI COROLL.

Ochram, Luba tradit in insula rubri maris Topazono gigni. Sed inde non peruehitur ad nos, inquit Plinius. Ochram si quis interpretari cupiat, Luteam aptissime conuerterit. Nisi Lutea ut herbarum & Chrysocolle genus esset. Exoleuit inquit Attica Ochra Vitruius. Inueniebatur autem tum multis locis etiam in Italia.

EX M. VERG. COMM.

Apallore nomen Ochrae antiquitas fecit. Terra ea est quæ quondā in Attica laudatissima fodiebatur. Vtq; illi precium & honor in pictura maximus fuit, sic nostræ & uulgari multiplex & sine honore aliquo usus est. Quos habuit & habet in medicina usus hic docuit: quos autem in pictura, pictores tam pridem quotidiana tractatione nouerunt.

De Cinnabari.

CAP. C.

Hallucinantur qui Cinnabarin Minio eandem esse existimant. Minium em̄ in Hispanijs ex lapide quodam argenteæ harenæ permisto, temperari solet. Alioqui non dignoscitur. Fornacibus autē in florentissimum flagrantissimumq; colorem permutatur. In metallis uero strangulantem halitū eructat. Itaq; facies incolæ uescis obuelant, ut per illas spectent, nec respirando noxiū ærem attrahant. Ea pictores ad sumptuosa parietū honestamenta utuntur. Cinnabaris, quæ ex Aphrica deferret, magno constat. Hactenus inuenitur, ut uix uersicoloribus pictorum lineis satisficiat. Densum, nec dilutum colorem reddit. Quare quidā sanguinē esse draconis existimauerunt. Vim habet Cinnabaris Hæmatitæ lapillo eandē, uerum efficaciorē. Conuenit ad oculorum mendicamenta. Magis em̄ adstringit, & sanguinē cohibet. Ambustis igni, & papularum eruptionibus cæato excepta medetur.

BARBARI COROLL.

Cinnabari ueteres usi sunt ad monochromata, hoc est, ad ea quæ coloribus singulis pingebantur. Adulteratur sorbis tritis, aut caprino sanguine. Preciū sinceræ nummi quinquaginta.

Hh

xp4

Pli. li. 35. ca. 6.

B

xiv669

Pli. li. 33. ca. 17.

D I O S C O R I D S

C Est autem Cinnabari, siue Cinnabaris, uera sanies draconis elisi, elephātorum in pugna com-
morientium, pondere permixto utriusq; animalis cruore. Necq; alius est color qui in picturis p-
prie sanguinem referre possit. Pinxerunt & ephesio Minio; ubi primum id reperiunt est, autore
Theophrasto, ac Vitruiuo. Vtrumq; omisum est, inquit Plinius: quia nimis acre existimaba-
tur. Tum quia curatio magni operis erat, ideoq; transire ad Rubricam, & Sinopidē. Minium
sane inter pigmenta magnæ autoritatis fuit: quando & Iouis ipsius simulachri faciem, festis di-
ebus miniandam censores locabant. Triumphantium quoq; corpora, Minio lini solita legun-
tur. Ideo & in unguenta triumphalis cœnæ addebatur. In Aethiopia & totos tingi proceres, &
Deos, hoc colore moris fuit. Inuentū Theophrastus tradit, hanc multo ante se a Callia athenien-
se, initio sperante, aurum posse excoqui harena rubente in metallis argenti. Reperiebatur tamē
inquit, iam tum in Hiberia (malo enim ita q̃ in Hispania conuerrere, ut in castigatione Pliniana
diximus) sed durum & harenosum. Item apud Colchos in rupe inaccessa, decutiendum sagita-
tis. Sed id esse adulterum. Optimum autem supra Ephesum. Clibianis agris Iliba Minium scri-
psit nasci, & in Carmania & Aethiopia Harenā illam Ephesi, quam diximus Cocci colorem ha-
buille, prædicant. Hanc teri solitam: dein lauari, & quod sublidat, iterum lauari. Differentiam
artis esse: qua aliq; Minium faciunt prima lotura, apud alios dilutius id esse: proptereaq; Plysma
dici: sequentis autem loturæ optimum. Minij uenæ Romam ex Hispania signatæ perfereban-
tur, ad dena milia fere pondō annua. Romæq; lauabantur, statuto lege precio, septuaginta in li-
bras, officinis eius, inter ædem Floræ & Quirini positis. Atq; hoc uerum erat Minium. Quod
uero Dioscorides commemorat, adulterinum ac deterius. Namq; est alterum genus, in omni-
bus fere argentarijs, & plumbarijs metallis, quod fit exusto lapide uenis permixto. Non ex il-
lo, cuius uomicam liquoris æterni Argentum uiuum nominant, sed alijs simul repertis, qui ste-
riles etiam sunt plumbi: nedum argenti. Tales cremati tunduntur in farinam: & hoc est secun-
darium Minium, perq; paucis notum, multum infra naturale illud sabulum. Hoc ergo adulte-
ratur Minium in officinis: unde præda societati. Item Syrico. Sublimi autem Syrico Minium,
compendij ratio monstrauit, & alio modo furtis opportunum erat: pictoribus plenos subinde
penicillos abluentibus. Sidit enim in aqua Minium, constatq; furantibus. Sincero Cocci nitor.
Secundarij autem splendor in parietibus sentire debet imaginem: quamq; hoc rubigo quadam
metalli est. Sisapontensibus autem miniarijs in Betica, unde ad nos nec aliud fere inuehebatur,
suæ uenæ. Harena excoquitur, sine argētoq; eæ, contra quam alijs regionibus. Idq; celeberrimum
auri modo probatur ferro, & melius auro candente: fucatum quod est, nigrescit. Sincero res-
tinet miniatum colorem. Inuenio & calce adulterari. Solis atq; Lunę contactus inimicus. Vin-
dicatur ab hac iniuria, si parieti siccat, cera punica cum oleo liquefacta candens, fetis induca-
tur. Iterumq; ad motis gallæ carbonibus, aduratur ad carbonem usq; postea candelis subiga-
tur: ac deinde linteis puris, quo modo & signa nuda marmorea nitescunt: quæ Loricatio græ-
ce appellat Coniasis. Autor Vitruius, Minij in uoluminū q̃q; scriptura usurpat, clarioreq;
literas, uel in auro, uel in marmore etiā in sepulchris facit. Int uenena esse Minij nemo dubitat.

E X M. V E R G. C O M M.

C Redidit Plinius contra q̃ hic testatur, saniem draconis elisi elephātorum morientium pō-
dere, permixto utriusq; animalis sanguine Cinnabarim esse. Nec solus credidisse id uidetur: cū
hic plures idem sibi etiam persuasisse testetur. Quod ex grauiore Cinnabaris precio factum fu-
isse uerisimile est, dum nouitate & miraculo aliquo mercium suarum precia augere n:ercatorē
conantur. Verumtamen arguendo tam impudenti eorum mēdacio satis unus hic scriptor sit,
qui totius naturæ peritissimus, qualis uera Cinnabaris sit, optime cognouisset, & salutē huma-
næ consulens, non id tantum monuerit, sed falso etiam existimari Minio eandem Cinnabarim
esse. In quo decēptos quondam fuisse, & decipi adhuc posse homines non adeo difficile fuit &
erit. Rubent enim ambo, & in pictura eundem tunc habebant usum. Discrepant tamen, ut hic
docet, nationibus: q̃ altera ex Libya, alterum ex Hispania quondam afferebatur: & illa in me-
dicinæ usum, hōc inter uenena, aut ueneni saltem maleficium habentia receptum fuerat. Vtri-
usq; seruantur nostra ætate nomina. Habetq; gens nostra quo passim utitur, uerbum miniare,
a Minij colore factum: quo pingi, uariariq; libros, & librorum titulos eo colore dicat. Habent
Cinnabaris nomen omnes in nostro orbe fere gentes: quo non rem, sed colorem illum indicēt.
Qui enim nunc ruber color eum habet usum, ex argento uiuo conficitur: quemadmodum ex
Minio argentum uiuum. Quod totum nouerunt qui hæc tractant: ideoq; a nobis aliud agentī
bus relinquenda huiusmodi sunt. Satis enim legentibus erit, ex scriptore hoc didicisse, quale
utrumq; fuerit, & qua ratione inter se differant: tamq; nunc ueram Cinnabarim uidisse hominē

difficile esse, quod quondā Minium facile erat: cuius quotidianus usus & tractatio Romæ quondā fuit, ex Hispania per redemptores eius metalli, ut illic curaretur, allati. Relictum in Cinnabaris & Minij huius historia non procul a principio spacium a nobis est, utiq; nota signatus locus: quoniam male sequax uerborum & rei ductus illic esset: exigeretq; sibi aliquid, quod ad discernendam a Minio Cinnabarim antea dictum pertineret: a quo statim hic inferret, aliter nō posse cognosci. Siquis autē totam Minij confectiōē, temperaturam, uitia, bonitates, & usum audire optauerit, Plinium & Vitruium auctores habebit: quorū alter. 33. suæ historiæ uolumine, capite. 17. alter suæ architecturæ cōmentario. 7. longius omnia illa profecuti sunt.

De Argento uiuo.

CAP. CI.

Argentum uiuum fit ex Minio, quod abusiue Cinnabaris dicitur. Patinis fictilibus, imposita ferrea concha Cinnabarim continente, & calice cooperta, argilla superlita, carbonibus succendunt. Si quidem deterfa fuligo, quæ calici insidet, refrigerata in Argentum uiuum cōit. Quinetiam inuenitur in argenti fodinarum tectis, stillatim concretū. Alij per sese in metallis inueniri tradunt. Seruatur in uitreis, aut plumbeis, aut stagnis, aut argenteis uasis. Siquidem aliam materiā omnem exedit, & defluere facit. Potum uim perniciousam habet. Suo enī pondere interna exest. Remedio est lac multū subinde potum, & uomitionibus reiectum, aut uinum cum absinthio, aut apij decoctum, aut semen ormini, aut origanum, uel hyssopum cum uino. Auri limata scobs, id est, ramentum q̄tenuissimum epotum, mirabili est auxilio.

BARBARI COROLL.

Hydargyros, siue Hydargyron, ex Minio fit tantum secundario. Apospermatisimū Draconis non desunt qui uocent in arte chymica Hydargyrum: ut fel Draconis Hydargyrum, quod e stanno fit, & quod ex auro Discū solis. Fit & ex marmore, ut Vitruius refert Argentumq; id uiuum nominat. Sudor calici deterfus in confectura Hydargyri liquorem aquæ habet, argenteo colore: unde nomen Hydargyro. Idem guttis facile diuiditur, & lubrico humore confluit. Hydargyro quemadmodum & Argento uiuo argentum inauratur solum, nunc prope. Cum & in æra simili modo aurum duci legitimum quondam fuerit. Sed alia ratio inuenta est e uiliori materia, ut paulo post dicemus. Quæ autē hic de noxa Hydargyri a Dioscoride scribuntur, Plinius Argento uiuo tribuit. Credo Hydargyri genus haberi duplex, Factitium, quod proprie Hydargyron dicatur: & Metallicum, cui sit Argenti uiui nuncupatio dicata. Est autē Argentum uiuum, argentei liquoris uomica: qui in lapide in uenis Argenti reperto, inuenitur: qui & ipse in Argentū excōquitur, & Achrosyalon priuatim uocatur a Chymistis. Quamq; & pro Scitherie lapide Aphrosyalos ab ijs accipitur. Venenū rebus omnibus est Argentum uiuum. Omnia ei innatant, præter aurum. Id unum ad se trahit mere: ideo & optime purgat, ceteras eius fosdes expuens crebro iactatu fictilibus in uasis. Ita uitij eius abiectis, ut & ipsum ab auro discedat, in pelles subactas effunditur, perq; eas sudoris uice defluens, purum relinquit Aurum. Ergo & hoc cum æra inaurantur, sublitum bratteis, pertinacissime retinet: uerum pallore detegit simplicies earum, aut prætenues: qua propter id furtim quærentes, oui liquore candido usum cum adulterant: mox & Hydargyro. Inaurandum uero æs cruciatur ignibus, accensumq; restinguitur sale, aceto, alumine: postea exarenatur, an satis recoctum sit splendore deprēdente. Iterūq; exhalatur igni: ut edomitū, mixtis pumice, alumine, Argento uiuo indutas bratteas accipiat. Argentum uiuum non large inueniri solitum affirmant. Candidum id, & fugaci corpore, nec usq; consistens. Omne tamē corpus fusile recipiens atq; in se contrahens. Qui Metallicas species adulterant, & Chymistæ a fundendo appellantur, siue a succis quos herbarū maxime conquirunt, immutant rebus nomina: siue ut alijs maligne occultent, in quibus ipsi hallucinantur: siue ut præstigias suas uelut quædam mysteria uenerabiliiores faciant. Argentum uiuum Hermem, hoc est, Mercurium appellant. Sed aliter quam Græci Aurum Solem, Argentum Lunam, & alia fere ad hunc modum omnia. Multos huc

Hh ij

D I O S C O R I D I S

C Auaricia sola compulit frustra, nondum inuento, qui non oleum et impensam perdidit: ut de his iure dici possit quod Demetrius Phalereus in eos cauillatus est, qui aurum per cauernas scrutantur, & in ea spe patrimonium suum conferunt & absumunt. *α μὴ καὶ λαδὸν οὐκ ἔλαβον, ἀλλ' ὅτι χρὸν ἀπὸ τῆς λαῖας.* hoc est, quæ capere debuerant, non exeperunt: quæ possidebant, amisierunt, ut Athenaeus, et ante ipsum Strabo meminit. Argentum eos uiuum precipue torquet, indignantes tam proximam argenti probi spem elabi manibus, nec spissari, aut inhiberi motum eius ullo fere modo posse. Argentum quidem iam tingitur tam simili colore auri, ut nec maculo, nec cotricula, nec pondere, nec alio quod lateris & ignium argumento deprehendatur. Quæ probatio Comentitia & Cupellaria uocari solet: quoniam commentum illud laterculis, hoc est, in cuppa uratur. Malum hoc iam late patet: nec Auaricia solum, aut Luxuria censenda, sed puerilis quædam uanitas, & ostentatio diuitiarum ludicra, totis abacis ex hoc adulterio, uel principum epulas ornantibus. Hinc passim moneta falsa creditur, præsertim Veneta: maiore furto, quia nullum sit aurum, uel argentum Veneto sincerum. Prefertur omnibus numis orbe toto Venerus. Huic crimini, Decemuiralis potestas, non aliter quam aut lesæ maiestatis, aut uiolatæ religionis obiecta est. Nihil fere tamen, aut graues poenæ fontibus constitutæ, aut imensa præmia deferentibus proposita iuuere. Non erat prius cautum, ne cui liceret metalla cruciare. Monetarios tantum leges oderant, Chymistas esse patiebantur. Hoc ipso anno quo hæc prodimus, Chymistas quoque ipsos capitales fecerunt: simul ut occasionem sceleris adimerent: simul, ne quis ætatem suam tereret in follibus & ustrinis et capunculis futilibus, quæ iam conuicio desidia: Choridiola, siue Scoridiola græce nominantur.

E X M. V E R G. C O M M.

S Tare loco nescit, micat, trematque, & suo pondere hac & illac facile fertur Argentum uiuum. Vndeque hanc rationem in eo contemplati ueteres Romani, insensibili alioquin rei, uitæ sensum Argento huic tribuerunt, uiuum uocantes. Græci ediuerso non motum, sed fluidum & aquosum eius habitum admirati, Hydrargyron, quasi aquosum argentum nominauerunt. Omnes tamen communi consensu in Argenti censu id constituerunt: uel quod candore suo simile argento sit: uel quod magis uerisimile est, quoniam in argentariis metallis cum argento inuenitur: uel quod priuatim & per se similem argento uenam & uomicam habet. Fuit enim hoc primum Argentum uiuum in metallis natum, & a natura gentibus datum. Quo deficiente, ut fuit semper urgente necessitate aliqua ingeniosa humana gens, fingi coepit, et ex alijs metallis artificiose confectum. In quotidianos uitæ usus pro illo concessit. Quo magis miretur aliquis scriptorem hunc, a fictitio historiam Argenti uiui incipisse, quam Plinius a naturali. *in uolumine, cap. 6. auspiciatus fuerit his uerbis.* Est & lapis in his uenis, cuius uomica liquoris æterni Argenti uiuum appellatur. &c. Et cum longius de eo egisset, fictitium ex Minio eiusdem uoluminis, cap. 6. docuerit, hic tamen artem naturæ anteposuit: nec scimus, an bonitatem, efficacioris: in fictitio quæ in nativo uires hac ratione monstrare uoluerit: habereque in artibus & medicina fictitium aptioris nativo usum. Duplex ex his quæ præmonstrata sunt Plinio Argenti uiui genus est, huic uero triplex. Fictitium ex Minio, quod in fossura argenti inuenitur. Et quod per se metallum est, perpetua liquoris uomica a Plinio fluere dictum. Est præter hæc quartum etiam genus, eodem fere quo ex Minio modo ex marmoris fragmentis & assulis quæ marmorarij disticiunt, factum. Docet id a Vitruiuo quo paulo ante diximus loco. Quæ consiciendi id ratio quoniam multiplex est, & longa rerum serie tractatur a nobis, legenda in eo scriptore uolentibus relinquitur.

μίνιον σινωπικόν

De Rubrica, seu Minio sinopico. CAP. CII.

M inium sinopicum maxime probatur graue, densum, ad iocine ris imaginem uergens, calculorum expers, concolor, in resolutione succosum. Effoditur in Cappadocia speluncis quibusdam, expurgatumque defertur in Sinopen urbem, in qua uenditur. Vnde cognomen tum accepit. Vim habet exiccatoriam, quasi inducendo obstruentem, & adstrictoriam. Quapropter uulnerarijs emplastris, & pastillis exiccantibus, & adstrictorijs commisceri solet. Aluum sistit, in ouo sumptum, aut clystere infusum. Datur iocineris uitio laborantibus.

BARBARI COROLL.

R ubrica Sinopis, quam Celsus Minium Sinopicum appellat, inuenta primum in Ponto

Pl. li. ii. ca. 7.

dicū. Nascitur Rubrica & in Aegypto, & Balearibus, & Africa; sed optima in Lemno & Capadocia: ut in mentionibus duabus proximis indicabitur. Species Sinopidis, aut Sinopicae tres. Rubra. Et minus rubens. Et inter has media, quæ præfertur omnibus: quia minus adlute retur, ob id & Autarcen uocari Theophrastus eam prodidit. Preciū optimæ in libras. 12. denarij. Vfus ad penicillū, aut si lignū colorate libeat. quæ plus rubet, utilior est abacis. Idem preciū eius, quæ Pressior uocatur, & est maxime fusca. Vfus eius ad bases abacorum. In medicina quoque blandus emplastris & malagmaris, quæ dicuntur Phæa. Troianis etiā temporibus, Rubrica hoc est, Miltos in honore fuit, Homero teste: qui naues Miltoparias cōmendandi gratia uocauit. Alioq̃ rarus in picturis. Rubrica & in ferrarijs metallis nascitur, picturis apta. Fit & ex Ochra, ut dicemus. Quid sit apud Columellā in apum curā lutum punicum, nisi sit Rubrica, non satis uideo. Legitur sane Rubricam ex Africa uenire, quā Cicerculum uocabant, cuius precium octoni asses, Legitur & Lutum ueneritū abluendis maculis quæsitum; de quo & Martialis poeta meminit. Nisi quis hanc intelligat, quam dixi Pressiorem uocari, & maxime fuscā esse.

E X M. V E R G. C O M M.

Quod in Sinopide Rubrica maxime optauerit nouisse aliquis, eadem ipsa est: ut optima, & quæ ueteribus cognita tam multis remedijs medicinam instruxit, uti ætate hac non straliceret. Cætera enim quæ de ea a Diosco. docentur, in hoc ipso, & in Plinio satis per se patent. Eamq̃ ob causam relictis omnibus alijs, illud tantum monēbimus: ob coloris similitudinem, & hanc, & Fabrilē, & Lemniā Rubricam Minium sæpe appellasse ueteres aliquos: non tamen simpliciter, sed adiecto semper gentis, aut usus cognomine aliquo: uerbi causa, Sinopicum Lemnium, & Fabrilē, Minium nominantes. Sic Celsus aliquando, sic plures alij usi sunt. Cætera quæ de omni Rubrica dici poterant, ab alijs ex antiquis scriptoribus collecta, si ne legentium desyderio a nobis relinquuntur.

De Rubrica fabrilī. C A P. CIII.

Rubrica fabrilis, ad omnia Sinopide inferior est. Optima Aegyptia, & Carthaginensis. lapidū expers, friabilis. Gignitur in lberia quæ ad occidentē spectat, Ochra exusta, & degenerante in Rubricā.

B A R B A R I C O R O L L.

Rubrica fabrilis, hoc est, Miltos tectonice, utilissima fabris est: quæ in Aegypto nascitur & Africana: quoniam maxime sorbetur. Hæc & in Lemno fit, diuerso genere ab ea quæ Sphragis appellatur. Sicut & qua linearij, fullonesq̃ utuntur, in lauando extergendoq̃ utribus præcipua. Galenus auctor. Ochra excoquitur in Rubricam, ollis nouis luto circumlitis. Commentus hoc esse dicitur Cydus quidam, incensis casu officinis. Quo magis arsit in caminis, hoc melior, quia nigrior, & carboni similis efficitur. Vt cumq̃, talis Rubrica deterior q̃ natua semper, ut Theophrastus inquit.

E X M. V E R G. C O M M.

Licebit uolentibus ex Plinio fabris aptæ Rubricæ huius historiā, bonitatem, natales, temperaturā, omnemq̃ usum. 35. uoluminis, capite. 6. certius intelligere: ideoq̃ nos parato omnibus eo scriptore, nihil cōmentatiōibus his nostris in re aliquā nota adiiciemus. Factū Rubricæ huic cognomē a fabrica est, in qua dirigendis lineis, colorandoq̃ ligno multus temp̃ fuit eius usus.

De Lemniā terra. C A P. CIIII.

Lemnīa terra, cuniculoso in specu nata e Lemno insula, palustri loco defertur, inibi electa, & caprino sanguini permista. Quam incolæ cogunt in pastillos, & imagine capræ signant. Vnde & Sphragida appellauere. Vim antidoti habet, contra pernicioſa uenena singularem. Pota cum uino, & præsumpta, euomi uenena cogit. Contra icūs morsusq̃ animalium, quæ exitiale uirus ei aculantur, prodest. Antidotis familiaris. Sunt qui hac ad sacrificia utantur. Est & dysentericæ utilis.

B A R B A R I C O R O L L.

Rubrica, siue terra Lemniā, quā Celsus Minij Glebam uocat. Palmam huic dedere M.

Hh iij

μύλτος τεκτονική

B

Pli. li. 35. ca. 6.

λεμνία γῆ

Pli. li. 35. ca. 6.

D I O S C O R I D I S

C nio proximam. Hæc est antiquis multum celebrata, cum insula sua, in qua nascitur. Hæc Minium sublinuit, adulteratq; qualis & in Cappodocia effodit speluncis: quæ faxis adhaesit, excellere existimat. Glebis suis color, extra masculosus: hac usi sunt ueteres ad splendorem. At Sphragis uocatur inquit Galenus, quoniam Dianæ signum habeat a Sacerdote impressum: nec animalium sanguinem misceri, sed tritum & hordeum piamenti gratia, illi terræ dari. Rubet ambusti modo tumulus in Lemno: ubi hæc legitur, prope oppidum Ephesiada cognominatum: quod in eum locum Vulcanus ceciderit, quo orientem spectat insula. Ibi nihil iuxta nasci, aut uirere. Sicari Lemniam, nec remollescere sub digito protinus tactam, ut Rubrica. Philostrem fatatum ea ex Hydri morsu, Philostratus scribit: ob eamq; rem nouum insulæ nomen inditum, ut pro Lemno diceref Acefa. Huius insulæ uestigia senatus populuscq; Roman. concessit Atheniensibus fouendo.

E X M. V E R G. C O M M.

Non est cæteris græcor. scriptoribus, præsertimq; Galeno eadem huic scriptori Lemniæ rubricæ, seu terræ historia. Hic enim ex cuniculoso specu, palustribuscq; eius insulæ locis afferri ait: illi in ea insula montem esse dixerunt, ambustorum modo rubentem, sterilem, in quem poëta: e coelo pulsum cecidisse Vulcanum ferunt: ex quo terra hæc legitur, non procul ab Ephesiade eius insulæ oppido: signariq; Dianæ, non capræ signo a sacerdote eius hanc terram: nec sanguinem illi caprarum misceri, sed fruges alias, piamenti causa monti illi defodere incoles: pluracq; alia, quæ huic scriptori non conueniunt. Quinetiam nihil ab eis dictum est quale a Diosco, dicitur, uti ad religionem & initiationes quosdam hac terra.

De Atramento sutorio. C A P. C V.

χαλκάνθη

Atramentum sutorium genere quidem unum & idem est, molle & concretum, sed in specie differentias treis habet. Vnum namq; humoribus stillatim in cuniculos quosdam colatis, concreuit. Quare ab ijs qui Cypriæ metalla perficiunt, Stalactis appellatur. Petesius ipsum Pinarion uocat, alij Stalacticon, id est, stillaticium: alij Pecton, Ephthon, Aracton, Lonchoton. Alterum simpliciter ratione fit in speluncis. Postea transfusum in excauatos scrobes, concrementum capessit. Quod Pecton, id est, Cöcreticium proprie nominatur. Tertium dicitur Coctile, & i Hispania fieri solet, sed inutile, ac inualidissimum esse constat. Ratio parandi hæc est. Aqua madefactum decoquunt: mox in piscinas transfundunt, & residere patiuntur. Hoc certis diebus coalescit, in complureis formulas digestum, tesserarum speciem reddentes, quæ racematim inter se cohærescunt. Optimum esse creditur, caruleum, graue, concretum, translucens. Cuiusmodi Stillaticium est. Ab alijs Lonchoton nominatur. Proximum Concreticiu. Coctile uero ad insectus & denigratio nes aptius cæteris esse compertum est. Sed ad medicinæ usum inualidius esse, experimenta docet. Valet adstringere, calfacere, & crustas inducere. Latas uentris tineas necat, drachmæ pondere deuoratur, aut cum melle linctum. Vomitus ciet. Aduersus hausta fungorum uenena, ex aqua potum auxiliatur. Purgat caput aqua dilutum, & in uellere naribus instillatum. Vritur, ut paulo post in mentione chalcitis ostendemus.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 34. ca. 13

Chalcanthum, aut Chalcanthos, aut Chalcates, ut Strabo appellat, a Cornelio Celfo Atramentum sutorium fere semper conuertitur, cognationem æris græci nomine fecerunt. Fit in Hispania, e puteis stagnisq; id genus aquæ habitibus. Decoquitur ea, admixta dulci pari mensura, & in ligneas cortinas funditur. Imobilibus super has transitis dependet resites lapillis extrictis,

quibus adhærescens limus, vitreis atinīs, imaginem quandam uix reddit. Exemptum ita sic-
 carur diebus. 30. Hoc Ephthon uocāt, quod sit & salis modo flagrantissimo sole, admissas dul-
 ces aquas cogente. Color est ferrugineus, siue ceruleus, perq̃ spectabili nitore, utrumq̃ esse
 creditur. Diluendo fit Atramentū, tingendis corijs. Fit & pluribus modis, genere eo terræ, in
 scrobibus cauato: ut Dioscorides tradit. Purissimū est, qd Stalactida, siue Stalagmiā, hoc est,
 Stillaicium uocant. Sed ex eo candidum colore uiolam sentiente, Leucoion nominant, cetera
 tiolacea. Fit aut̃ quod Pecton uocatur, & in saxorum catinīs pluuiā aqua corruato limo gela-
 scente: a quo & nomen habet. Factitium pallidius est q̃ fossile: quantum colore, tantū & boni-
 tate iunctur. Maxime probant Cyprium in medicinæ usu, quod & solum Possidonius esse cre-
 didit. Chalcanthum Galenus in Chalcitin lapidē mutari tempore, incipiens a superficie, testa-
 tus est. In harena Vrsorū & Leonum ora Chalcantho aspergi solita dicuntur: tantaq̃ erat uis
 in astringendo, ut mordere non possent. Differt Chalcu anthos, id est, æris flos, a Chalcanthio
 lauius q̃ ut monendū sit: etiam si Democritus in chymicis florem æris dicendo Chalcanthum
 intellexisse uideatur: ut Chalcanthū nominando, luteum oui significare uoluerit. Atramentū
 est & quod Melanuriam Græci dicunt, explicandum suo loco. Itemq̃ Melan. Differt Cala-
 canthum a Chalcantho: quod illud herbæ genus est, muscas, muresq̃ necans, nec aliud de ea
 prodicium inuenio: quamq̃ Græci uulgo Calacanthum accipiunt pro Chalcanthio.

EX M. VERG. COMM.

Aeri cognata res est Chalcanthum. In ærarijs eī metallis, ut metallici docent, plerumq̃
 concresecit. Indicatq̃ id in græcis nomen: in quo ærimum æs intelligitur. Romani, quoniā eo
 tingendis corijs gentes uterentur, a nigro colore quē reddebat, Atramentū: & a futrinis in qui-
 bus coria tractantur, futorium nominauerūt. Genera, confectioneq̃ eiu. satis hic de cur. Nec
 nos parum laborauimus in restituenda capiti huic antiqua integritate. Qualis aut̃ ea sit, & qui-
 bus ablatis, mutatisue factum id a nobis fuerit, collatis cum nostra aliorum æditionibus, faci-
 le uolentes intelligant. Poterunt a Plinio etiam Atramenti huius futorij easdem confectiones,
 genera, & nomina intelligere historix suæ, 34. uolumine; capite. 12. Eadem enim omnia huic
 & illi sunt. Quod in medicina, & remedijs monere uolumus, illud est. Quod hic Atramentum
 futorium contra fungos cum aqua bibi ait, non multo post cum ex professo de fungorum ma-
 lesicio agetur, cum aceto bibendum in eo periculo præcipitur: ut tunc certius docebitur.

De Chalcite.

CAP. CVI.

Chalcitis præfertur similis æri, friabilis, nec lapidosa, nec inuete-
 rata, intercurfantibus oblongis uenis, splendentibusq̃. Huic ab-
 sterforia uis inest, excalfaciens, & crustas ulceribus obducens. Purgat
 quæ oculis & eorundem angulis hærent. Ad ignem sacrum, & ulcera
 quæ serpunt, efficax est. Sanguinem e uulua & naribus erumpentem,
 cum succo porri sistit. Carunculā gingiuis enatam, depascentia ulcera,
 tonsillalq̃, eius farina compescit. Vsta, & cum melle trita, oculorū me-
 dicamentis longe utilior redditur. Callum genarum & scabriciam ab-
 sumit, abstergitq̃. Fistulas tollit, collyrij modo in eas adacta.

BARBARI COROLL.

Chalcitis, hoc est, lapis ærarius, ita dicitur, quoniā ex ipso Aes coquitur. Distat a Cadmia
 fossili, quod illa ex subdialibus perris ceditur, hic ex obrutis. Item q̃ Chalcitis friat se statim, na-
 tura mollis, ut uideatur lanugo concreta. Est & alia distinctio: q̃ Chalcitis tria præter se genera
 complectitur, Aes, Misy, & Sory. Habet aut̃ æris uenas oblongas. Probatum mellei coloris,
 gracili uenarum discursu. Putant & recentem meliorem esse, quoniā uetustate Sory fiat. Mace-
 ratur aut̃ in fistilibus ex aceto circumlitis fimo diebus. 40. & colorem Croci trahit. Chalcitis
 inueterata, ut Galenus inquit, etiam in Misy transit, a summa cūte incipiens.

EX M. VERG. COMM.

Chalcitim uocant metallici lapidem ex quo æs coquitur. Habet is plures, ut illi uocant, di-
 stinctiones, nō repetendas hoc loco: quoniā ex Plinio cunctas alij suis Corollaris inseruerint.
 Et si uetustiores aliquis amet auctores, tō tam unus Plinius rem lib. 34, capite. 12. docebit.

Hh iij

A

B

B

χαλκίτης

Pli. li. 34. ca. 12

C
Pſoricon

FIt ex ea medicamentum, quod Pſoricon uocant, duabus Chalcitis partibus, cum una Cadmiæ additis, & ex aceto tritis. Oportet autem in fictili obruere fimo, diebus quadraginta per caniculæ ardore: ſic enim fit acius. Idem quod Chalcitis poteſt. Alij pares utriuſq; portiones in uino terunt. Vritur Chalcitis fictili nouo, uiuis carbonibus ſuperpoſito. Modus autem uſtionis in humidioribus eſt, dum ipſa Chalcitis bullas excitare deſierit, & perfecte inaruerit. In reliquis uero, dum mutata in floridum colorem fuerit, & ſanguineum, aut miniatum colorem contraxerit, tum demum eximenda eſt. Inſidens autem ſpurcicia ſtatu expellenda. Mox reponenda. Torretur etiamnum perſatis carbonibus, uſq; dum luteo colore palleſcat. Aut fictili ſubditis candentibus prunis, ſubinde uerſata, donec conflagret, & colorem mutet.

E X M. V E R G. C O M M.

Coniunxerunt Chalcitidi Pſoricon hoc aliqui: nec ſine cauſa penitus. Ex ea enim, ut præmonſtratum eſt, fingitur, fictitium enim, non natium: nec ſimplex, ſed compoſitum eſt. Nos tamen ueterum græcorum rationem ſecuti, qui ſeorſum a Chalcitide de Pſorico egerunt, diuiſa hiſtoria, & alio capite a Chalcitide, ſtaum Pſoricum proſecuti ſumus. Medicamentum id eſt, ſic dictum, quoniam contra ſcabricies & aſperitates cutis, quas Græci Pſoras, dicunt uim & uſum quondam haberet. Quæ autem ſit huic ſcriptori eius conſectio, ſatis ex eo patet. Cæteri tantum græcorum medici ad conſectionem eius non Cadmia, ſed Spuma argenti uſi ſunt: neq; ex uiribus eius minus aptam forte uim contra cutis aſperitates Pſoricum habebit. Cætera huic, & alijs omnia eadem ſunt: qui fimo obrui, & 40. diebus ſub ſole habendum omnes præceperunt: quoniam ea ratione maiores in ſiccando uires acquireret: ipſum magis extenuaretur, & in erodendo mitius Chalcitide fieret. Eſt illud in medio capite certius cognoſcendum: in cocturæ ſpacio, et q̄diu coqui metallici aliquid oporteat, quæ nam hic πρὸς ὕδατος id eſt, humore abundantia, quorum cocturæ finis ſit, cum bullas agere deſierint, & aruerint, dicat: & quæ reliqua intelligi ibidem oporteat, quorum cocturæ finis ſit in ſpecioſiore colorem mutatio: in uno ne Pſorico conſtituendum id ſit, an in cunctis metallicis: decreueritq; hic, & appellauerit humore abundantia Pſorica, quæ copioſo aceto, aut uino temperata fuerint, reliqua uero quæ aridiora: an ſimpliciter de cunctis metallicis, omniumq; coctura intelligere id oporteat. In quam partem inclinat animus nobis, non tam ex conceptis illic uerbis, quæ in hunc ſenſum facile legentes ducunt, q̄ quia non uidetur, quò referenda reliqua illa ſint, cum de uno tantum Pſorico agatur. Eamq; rationem nos ſecuti, de cunctisq; præcipi eo loco opinati, ad omniũ metallicorũ cocturam rem contraximus. Plinius. 34. uolumine, capite. 12. de eodem Pſorico hoc, ſed nõ eodem penitus huic modo egit. Prius enim fimo in ſole obruit, q̄ Cadmiæ illi miſceat. Cætera huic & illi eadem fere omnia ſunt.

D

¶ De Miſy.

CAP. CVIII.

Miſy

Mify aſſumendũ natione Cyprium, auri ſimile, durũ, quod friando auri colorem imitatur, & ſtellæ modo ſplendet. Vim habet, & uſtionem cum Chalcitide eandem, citra Pſorici compoſitionẽ, exceſſu defectuq; differens. Aegyptium aut cæteris præſtat, ut pote quod efficaciꝯ habeat. Sed ad ocularia medicamẽta multo ſupradictõ inferius.

Pli. li. 34. ca. 12

B A R B A R I C O R O L L.

Mify, quidam putauere fieri exuſto lapide, in ſcrobibus, flore eius luteo, miſcente ſeligni pinea ſauilla. Re uera autem ex Chalciti fit lapide, concretum natura, diſcretumq; optimũ cum teritur: arenosa qualitas, ſiue terrea, ſimilis Chalcitidi. Hoc miſcent, aurum purgant. Lapidioſius eſt q̄ Sory.

EX M. VERG. COMM.

A

Deprehenderunt metallici in Chalcitide lapide, ex quo diximus excoqui æs, tria contineri. Aes primū: mox Misy hoc de quo nunc agitur: & tertium Sory, de quo non multo post agitur: non tanq̃ eiusdem substantiæ partes, sed diuersi generis cōcreta simul, discretæq̃ quasi metalla aliqua, quæ cōdura deinde, rationibusq̃ alijs separata in usum uitæ traherentur. Quale aut̃ hoc Misy sit, satis hic, satis etiam Plinius quo diximus loco docuerunt. Hic breuissime Medicinam, & remedia eius numerauit, æquale uiribus Chalcitidi faciens. Plinius tamē longiorē certiorēq̃ historia multa addidit, quæ uidisse in eo operæ precium fuerit. Docentur autē ab eo quo diximus paulo ante capite & libro. Cæteri etiam græcorum medici in genere exulcerantium medicamentorum cum ualidiore adstrictione Misy hoc numerauerunt: minus tamen q̃ Chalcitis erodere, quia tenuius ea sit. Addidit præterea Galenus Chalcitum: & quod nō multo post dicitur Sory, uetustate in Misy hoc mutari a superficie incipiente statim mutatione.

De Melanteria.

CAP. CIX.

Melanteria geminæ est originis. Quædam in faucibus cuniculorum quibus æs eruitur, salis modo cōcrefcit. Alia uero in summa facie supradictorum locorū cōit, quæ terrena est. Quinetiam inuenitur in Cilicia, & alijs quibusdam regionibus fossilis quædā. Præstat quæ sulphuris colorem trahit, læuis, pura, æquabilis & quæ contactu aquæ confestim nigrescit. Vim causticam obtinet Misy similem.

μελαντηρία

Melanteria, ex nomine quidem ipso atramentum significat: quemadmodum & Melan de quo post dicemus. Differt: q̃ Melan factitium & librarium, siue scriptorium atramentum est: Melanteria uero terra.

EX M. VERG. COMM.

Fecit Melanteriæ nomē color, qui in metallica natiur, sin fossili contactu aquæ illi accedens, semperq̃ & in omni niger est: nō male a latinis Atramentum metallicum dicta aliquando est. Græcis tamen uocibus in hoc Romana medicina plerumq̃ usa est: uocaruntq̃ latini nō minus q̃ græci Melanteriam metallicum hoc atramentum, in ærarijs fodinis concrefcens, & ut uerisimile est, æris naturæ. Veteres græcorū medici in genere efficacissime astringentium eam nominauerunt: facilem ex historia huius in ærarijs metallis inuentu.

B

De Sory.

CAP. CX.

Sory existimarunt aliqui Melanteriam esse, aberrantes. Siquidem sui generis est Sory, ei non absimile. Verum Sory uirus inest graue, & nauseam mouens. Inuenitur etiam in Aegypto, & alijs quibusdam regionibus, ut in Libya, Hispania, & Cipro. Præfertur Aegyptiū, quodq̃ frianti nigrius apparet, spongiosum, suppingue, insup adstringens, & olfactu, deuorationeq̃ magnum uirus olens, ita ut stomachus in uomitiones effundatur. Quod autem friatum scintillas Misyos modo non emittit, & alterius generis esse, & inualidum censendum est. Vim & uestionem supradictis similem habet. Dolori dentium, cauernis inditum medetur. Labantes firmat dentes. Ischiadicis ex uino infusum auxiliatur. Illitum cum aqua uaros extinguit. Medicamentis ammiscetur, quæ capillos denigrant. Hæc autem fere omnia quæ uestionem experta non sunt, perustis ualidiora esse existimantur, præter salem & uini fecem, nitrum, calcē, & consimilia, quæ cruda remissiora sunt. Combusta enim uiribus efficaciora redduntur.

σώρυ

D I O S C O R I D I S

B A R B A R I C O R O L L.

C Sory Cyprium oculis utilius, cætero superatur ab Aegypto: alterius nationis Sory, q̃ Aegyptium. Si teratur, splendet. Sory crassius est q̃ Misy. Chalchitis mediã inter ea qualitatẽ habet. Galenus auctor. Describitur Sory a Democrito, ceruleum, scabrum, semper inueniri solitum in ipso Misy, uocatum ab aliquibus Calchanthum uiride.

E X M. V E R G. C O M M.

Hoc est Sory illud nõ, multo ante dictũ a nobis in Chalchithite cõtineri. Quodq̃ ea iuetera fieri etiã Plinius ait, satis ab hoc & ab eo descriptũ, ideoq̃ non dicendũ a nobis iterũ, neq̃ ex scriptoribus antiquis repetẽda ad Soreos huius historiã modo quã in illis, præsertimq̃ Plinio parata oibus, & exposita sunt. Docet em̃ ille longius genera, bonitates, ususq̃ eius oēs.

¶ De Diphryge.

C A P. CXI.

Diphrygis tria genera esse credũtur. Quoddam enim metallicum est, quod in Cyp̃ro sola gignitur. Lutosum namq̃ desertur, ex luto cuiusdam inibi regionis, postea delatum, sole siccatur, mox circumpositis sarmentis uritur. Diphryges ideo uocatum est, q̃ & a sole, & a sarmentis uratur, arefcat, & ferme torreatur. Alterũ perfecti æris, quasi subfidens fex est. Siquidem post frigidã aquã offusione, ut supra retulimus, cum de flore æris differeremus, sublato ære fornacũ ima parte coharẽs id genus inuenitur, & adstrictionem, & gustum æris habens. Tertium sic fit. Lapidem Pyriten, ut calcem cremant, in camini aliquot diebus, cumq̃ colorem rubricã contraxerit, eximẽtes recondũt. Quidam tradunt ex sola materia lapidẽ æris gignente fieri, quoties in dictis arcis assata, & in scrobis translata peruratur. Tunc enim ambientem scrobis locũ comprehendit, & exemptis lapidibus æquale nihil inuenitur. Præfertur quod saporis æris reddit, rubiginosum, adstringens, & linguam uehementer excicans. Quod sibi exusta ochra non uendicat, quã cremata Diphrygis uice uenit. Vis eius adstringere, perpurgare, excrementa consumere, ulcera serpentina, & quã cacothie uocant, ad cicatricem perducere. Suppurationes terebinthina, aut carato excerptum discutit.

Pli. li. 34. ca. 17.

B A R B A R I C O R O L L.

Quatuor habent, qui Aes perficiunt, Aes, Scoriam, Florem, Diphryga. Aes ipsum in catino defluit, Scoria extra fornaces, Flos supernatat, Diphryges remanet, auctor Plinius. Quidam perhibent in fornacibus globos lapidis qui coquantur, ferruminari: circa hunc Aes feruere: ipsum uero non percoqui, nisi translatum in alias fornaces: & esse nodum quendam materiã, id quod relinquitur ex cocto, Diphryga uocari.

E X M. V E R G. C O M M.

Eadem huic scriptori Diphrygis Plinio undiq̃ historia est, nec quicq̃ ab eo felicius simul & breuius ex hoc scriptore redditũ aliquãdo fuit. Locus est. 34. uolumine, capite. 17. Diphryges em̃ uocari ab eo, q̃ bis torreatur, inquit. Triplicem eius originẽ esse. Fieri ex Pyrite primũ lapide in fornacibus cremato, donec in rubricã excoquatur. Fieri itidem in Cyp̃ro ex luto cuiusdam antri arefacto prius, mox paulatim circumdatis sarmentis excocto. Fieri postremo in fornacibus subsidente æris face. Differentiam esse: q̃ Aes in catino defluit, Scoria extra fornaces, Flos supernatat, Diphryges remanet. Addidit præterea, tradi a quibusdam ferruminari globos lapidis, qui in fornacibus coquũtur: circa eos feruere æs, ipsos uero non percoqui, nisi in alias fornaces translatos, & esse nodũ quendam materiã: idq̃ quod excocto superfit, Diphryga uocari. Ex quibus ratiocinari facile est, quatuor ærariis in coctura æris redire res, æs, scoriam, florem, & diphryga: quorũ quemadmodum non dissimiles, sic non penitus æquales uires in medicina sunt. Nosq̃ ex antiquo scriptore iisdem uerbis commentationibus nostris illa adtecimus: ut scirent primum legentes, recepta a latinis scriptoris huius decreta fuisse, mox ha-

berent uolentes inueniendi & colligendi Diphrygis a Plinio tradita certiorẽ rationẽ.

A

¶ De Auripigmento. CAP. CXII.

Auripigmentum in eisdem metallis, quibus Sandaracha gigni-
tur. Optimũ existimatur crustosum, aureo colore micans, nulli
materiæ permistum, fissile. Quale Mysiæ & Hellesponto nascitur. Hu-
ius duo genera fluxerunt. Vnum supra dictum est. Alterum glandis
effigie, pallidum, & colore Sandaracham imitans, glebosum. Ex Pon-
to & Cappadocia defertur. Secundum locum tenet, has nactum dotes.
Torretur in testa noua, uiuis carbonibus subiectis. Assiduoq; uersat,
donec igne flagret, & mutet colorem. Deinde refrigeratum, tritumq;
reconditur. Vim habet adstrictoriã & erodentem. Crustas cum uehe-
menti punctione excitat. Reprimit quæ excrescunt, & capillos euellit.

B A R B A R I C O R O L L.

Arsenicum, siue Arrenici tria genera. Coloris in auro excellentis. Alterum pallidius, &
Sandarachæ similis: quod sit deterius. Tertiũ quo miscetur aureus color Sandarachæ, quasi
ex prioribus duobus iunctum. Vtræq; hæc squamosa: illud uero siccum, purumq; gracili ue-
narum discursu fissile. Arsenicum nos, & Auripigmentũ uocamus: ut Paulo, & Vitruiuo,
& Plinio, & Celso placet, Democritij Chymistæ Androdamanta quandoq; hoc appellãt. In
Carmania duos haberi montes Onesicritus tradit, alterum Arsenici, alterum Salis.

E X M. V E R G. C O M M.

Auripigmentũ in pingendo adhuc usus aliquis est, ex quo Romani quondam illi nomen fe-
cerunt, utunturq; eo nunc passim in pingendis librorum frontibus bibliopolæ. Accessit no-
stra ætate etiam, qui antiquioribus, ut credimus, nullus erat alius Auripigmenti usus. Tritũ
enim, pediculosos accipitres suos aucupes inspergunt, presentĩ contra eã labem remedio. Du-
plex eius genus hic fecit. Alterum quod fulgore auri splendet. Alterum quod *βανδαχιδις* uo-
cavit. Significatq; ea uox, ut omnes uertimus, quod glandis formam & speciem habet. Non
tamen respondere his quæ sequuntur id uidetur. Qui enim potest aliquid glandis figura esse,
quod glebosum paulopost dicitur. Ob eam causam suspicati sumus, ad colorem posse eam per-
tinere uocem: & eum quidem puniceum, qualis non in glandibus simpliciter, sed qualis in ma-
turis palmulis est: quas græci cõmuni aliarum glandium nomine Balanos aliquando uocant:
ut primo cõmentario in Palmulis & Balanis testati sumus. Vbiq; enim & passim coloris hoc
discrimen in Auripigmento uidetur, præcipueq; in pingendo apparet: quo tempore dilutum
humore aliquo ad eam rem necessario puniceum illum quem diximus colorem representat.
Facitq; ad hoc quod coniunctum illi statim est *σανδαχιδις*, id est, colore Sandarachæ, cuius co-
lor flammeus & rubens describitur. In hanc partem diu inclinauit animus nobis, & adhuc pro-
pensiores sumus. Nihil tamen contra aliorum interpretum æditiones mutare in re non satis
certa uoluimus.

B

¶ De Sandaracha. CAP. CXIII.

Sandaracha probatur ruffa, & aliena materia uacans, friabilis, Cin-
snabaris colore, sulphuris uirus redolens. Dos eadẽ & uestio, quæ
Auripigmento. Explet alopecias, resina excepta. Scabros ungues exi-
mit. Contra phthiriasin ex aceto efficax est. Tubercula cum adipe dis-
cutit. Prodest ad narium orisq; ulcera, & cæteras papularum eruptio-
nes cum rosaceo. Item condylomata. Datur ex mulso purulenta ex-
tussientibus. Suffitur quoq; cum resina, aduersus ueterem tussim, rapto
per fistulam nidore. Vocem expedit, cum melle delincta. Suspiriosis,
cum resina in catapotio, optime datur.

σανδαχιδις

D I O S C O R I D I S

B A R B A R I C O R O L L.

C Sandaracha inuenitur & in insula rubri maris Topazono : ut Ochra . Sed inde ad nos importari negant. Inuenitur autem & in aurarijs, & argentarijs metallis : ut in Paphlagonia Pimolifeno tractu, urbe Pompeiopoli. Sed & in Scythia proxime flumen Hypanin optima. Fit & adulterina ex Psimythio, in fornace cocto : idq; incendio facto ex casu repertum est. Colos esse debet flammeus, precium in libras asses quini. Viêtruuius multo meliorem usum præstari ex ficticia, q̃ ex fossili Sandaracha pictoribus existimat.

E X M. V E R G. C O M M.

DVplex quondam græcis & latinis scriptoribus cunctis Sandaracha fuit. Metallica pluribus locis fossilis, ut testati Plinius, Viêtruuius, pluresq; alij sunt : qui ad Hispanim Scythiæ fluiui optimam omniū inueniri tradiderunt. Ficticia deinde & adulterina, quæ ex cocta cerussa fieret. Illa aptius medici, hac pictores felicius usi sunt. Auripigmento æqualem in censu remedium uita græcorū medici eam fecerunt, discutientibus & repurgantibus medicamentis eam miscentes. Cerussæ substantia Sandaracha est : indicatq; id Viêtruuius septimo suæ architecturæ cōmentario, dicens. Cerussa uero cum in fornace coquitur, mutato colore ad ignem incendiij Sandaracha fit. Id autem incendio facto ex casu didicerunt homines, & ea meliorem usum præstat, q̃ quæ de metallis per se nata foditur. Et hæc Viêtruuius. Plinius addidit, flammeum debere in ea esse colorem : & si hæc ipsa torreatur, æqua parte admixta rubrica, Sandycem fieri : qui ueteribus poetis, præsertimq; Maroni color notissimus est. Et si crediderunt aliqui herbam Maroni Sandycem esse cum cecinit, Sponte sua Sandyx pascens ueliet agnos. cum tamen id nullam eius intellectus necessitatem habeat. Quod enim ab eo dicitur est, fore eam tunc felicitatem, ut sponte sua colores in ouium uelleribus nascentur, & inter pascendum agni colorentur : neq; id pastu Sandycis futurum, sed quod nos credimus, colorem Sandycis contrahendum simpliciter ab eo dici.

¶ De Alumine.

C A P. CXIII.

5978/12

OMne Aluminis genus fere in Aegypto, & eisdem metallis inuenitur. Est enim scissile quoddam, quasi flos sudorue eiecticius terræ. Gignitur & in alijs quibusdam locis, in Melo, in Macedonia, in Liparis, Sardonis, Hierapoli Phrygiæ, Aphrica, Armenia, & plarissq; alijs regionibus, Rubricæ modo. Plurimæ eius species, uerum ad mendi usum scissile, rotundum & liquidum expetuntur. Optimum est scissile, præsertim recens, candidissimum, gustu perq; adstringens. Calculorum expers, nec glebulose, aut assulose compactum, sed sigillatim in capillamenta quædam canescentia dehiscens. Quale est quod Trichitis, quasi capillare nominatur, in Aegypto natum. Reperitur quoq; lapis huic Alumini persimilis, qui gustus iudicio dignoscitur, q̃ non adstringat. Damnat in rotundi genere, qd manu confictū est. Sed ex figura deprehendit. Assumendum aut suapte natura rotundū, bullis turgens, albo propius, atq; ualidius adstringens. Præterea nōnihil palloris cū quadam pinguedine præ se ferens, sine harenis, friabile, natione Aegyptiū, aut ex insula Melo. Liquidum probatio, ut sitlympidū, lacteum, æquale, & semper succo madens, sine lapidibus, atq; quendā caloris igniculū expirans. Vim habent ex calfaciendi, stringendi, sanandi, & expurgandi, quæ caliginē pupillis oculorū offundunt. Genarū carnem, cæterasq; excrescentias extenuant. Scissile rotundo efficacius intelligit. Vri & torreris Chalcidis modo debent. Putrescentia ulcera cōpescunt. Sanguinis fluctiones inhibent. Gingiuas humore præguates comprimūt. Motus dentium cum

aceto et melle firmant. Profunt cum melle ulceribus oris, eruptionibus papularum, & fluctionibus aurium, cum sanguinalis hærbae succo. Lepis conueniunt cum brassicae folijs, aut melle cocta. Item pruritui & unguium scabrie, pterigijs & pernionibus, aspersa cum aqua. Valent cum aceto, faece & galla, pari pondere cremata, ad phagedænas ulcerum, & cum salis duabus partibus, ad uitia quæ pascunt. Fursures cum eruo & pice illita abstergunt. Ad lendes, pediculos, ambusta, cum aquæ illita auxilio sunt. Contra tumores, et graue alarum inguinumque uirus, illinuntur. Ex melo autem aduectum, mulieribus præstat ne concipiât, ante coitum ori uulua inditum. Partus quoque extrahit. Gingiuis si caro excreuit, uua, ac tonsillis accommodantur. Auribus & uerendis cum melle illinitur.

BARBARI COROLL.

Alumen Græcis ab astringendo Stypteria dicitur. Qui uolunt hoc exprimere, salsuginem terræ finiunt. In Cypro candidum, & nigrum, exigua coloris differentia, cum sit usus magni: quoniam inficiendis claro colore lanis, pellibusque, candidum liquidumque utilissimum est, contra fuscis, atque obscuris nigrum: ob id Byrsodephicon utrumque cognominatur. Et aurum nigro purgatur. Fit autem omne ex aqua limoque, hoc est, terræ exudantis natura, corruatū hyeme. Solibus aestiuis maturatur. Quod fuerit ex eo præcox, candidum efficitur. Laudatissimum in Aegypto Alumen: proximum in Melo. Quamque in medicina Aegyptio prælatum. Nascitur & in Hispania, & Ponto, & Strongyle insula. Phorimon uocatur liquidum, cui notæ optimi respondere. Quod an sit adulteratum, deprehendit succo punici mali. Sincrum enim mixtura eius nigrescit. Est & genus alterum, quod Paraphoron uocant, pallidæ, & scabrae naturæ, & quod inficitur galla. Concreti uero Aluminis genus id quod Trichitin appellauere: fieri arbitrantur ex lapide, propterea & Chalcitin uocant, quem Hippocrates Meliada, quia sit e Melo, nominat: ut sit sudor quidam eius lapidis, in spumam coagulati. Strongyle duas habet species. Fungosum, atque omnium ore dilui facile: quod in totum reijcitur. Melius pumicosum: & foraminum fistulis simile spongiae: nec inficiens nigritia. Optimum ex omnibus rotundis, Melinon. Aluminis, ut breui comprehendam, sex habentur Galeno summa genera. Scissum, siue scissile. Rotundum, Astragalotes, hoc est, talare. Hygron, id est, liquidum. Placitis, & Plinithitis, hoc est, crustarium. Et Latercularium. Alumine prælita non incenduntur: id quod & obfidione Athenarum sub, L. Sylla Quadrigarius compertum scribit.

EX M. VERG. COMM.

Quæ sit uniuerso Aluminis præcipua dos & uis, nomen indicat. Ab astringendo enim quam multam & egregiam potestatem habet, græci Stypteriam uocauerunt. Longe plura quæ hic discrimina eius & genera Galenus & Græcorum medici alij numerauerunt: monstrante, ut par est, quotidie nouum aliquid natura, & adijciente antiquorum inuentis experientia quod ab illis nondum inuentum, aut obseruatum fuerit. Ea nos in scriptoribus illis cognoscenda relinquimus. Scriptori huic tantum inferuientes, qui a principio statim dicens esse Alumen scissile, *ἰσχυρὸν τὸν βολεῖν δὲ οὐκ ἔστιν*. Quod ab alijs, nobisque pariter ueluti glebosi flos uersum est, non leuè suspicionem nobis iniecit, potuisse quodam aliter legi: quoniam in toto Aluminum censu nulum Bolitidis nomine indicatur. Præterea glebam *βόλον* græci dicunt, & *ω*, litera scribunt. In cūctis autem, quos hactenus uidere licuit, scriptoris huius græcos codices, *o*, paruo uox illa legitur. Accessit his Plinius etiam lib. 35. cap. 14. de scissili Alumine hoc his uerbis agens. Concreti Aluminis unum genus Schiston, id est, scissile græci appellant, in capillamenta quædam canescentia dehiscens. Vnde quidam Trichitin potius appellauere. Hocque fit ex lapide: ex quo & id Chalcitim uocant: ut sit sudor quidam eius lapidis in spumam coagulati. Hæc nescio quomodo historiarum & uocibus scriptoris huius respondere omnia uidentur. Id quidem in confesso est, de eodem scissilis Aluminis genere ambos agere. Potuitque hic florem, quem ille sudorem nominat, dicere. Et si id sit, non sine ratione dubitauerit aliquis, Bolitidē scriptoris huius in Chalcitidem Plinii mutandam esse: qui Chalcitim uocari alumen etiam hoc ait, quod ex lapide fiat: fitque

C ueluti sudor quidam eius lapidis in spumam coagulati. Hoc nos monemus, eruscandæ ueræ lectionis & inueniendæ rei non contemnendam occasionem hanc legentibus porrigentes.

De Sulphure. CAP. CXV.

Sulphur optimum existimatur uiuum, quod Apyron uocant, niter dulæ modo splendidum, perlucens, minime lapidosum. Probatum in genere Sulphuris ignem non experti, quod uiret ac præpingue spectatur. Plurimum in Melo & Lipara gignitur. Supradictum Sulphur calfacit, discutit, & celeriter concoquit. Prodest tussibus, suspiriosis, purulentis extussientibus, in ouo sumptum, aut suffitum. Præterea partus, uisti nidore extrahit. Lichenas, scabros ungues, cum resina terebinthina mistum, aufert. Cum aceto autem illitum, ad lepras efficax est. Vitiligines tollit. Scorpionis ictibus addita resina medetur. Cum aceto uero, draconis marini, scorpionisq; plagas sanat. Pruritus toto corpore erumpentes, cum nitro detersum sedat. Regium morbum emendat, inspersum fructu cochlearis mensura, aut in sorbili ouo sumptum. Facit ad grauedinē, & destillationes. Sudores quoq; conspersum inhibet. Podagricis cum aqua & nitro illitum, conducit. Grauitatē auditus, suffiti nidore raptim per fistulam hausto, sanat. Lethargicos suffitu excitat. Erumpentē undecūq; sanguinem sistit. Fractis auribus cum uino & myrrha illitum medetur.

BARBARICOROLL.

Pli. li. 7. ca. 14.

Sulphur Græce Thion, nascitur in insulis Acolijs, inter Siciliam, & Italiam, quas ardere cernimus. Nobilissimum in Melo. Sed & Neapolitano, Campanoq; agro collibus: qui uocantur Leucogæi. Libyæ cuniculis effossum, curatur igni. Genera quatuor. Viuum, hoc est, Apyron, siue ignes non expertum: gignitur solidum, id est, glebosum, eoq; uno ex omnibus generibus medicum utuntur: cetera liquore constant, & perficiuntur oleo incocta. Viuum effoditur, transluetq; ac uiret. Alterum genus appellant Bolon. Quidam pro Sulfure tantum crudo Bolon capiunt. Tertium uocat Egitia, cuius unus dicitur usus, ad suffiendas lanas fullonū officinis, quoniam candorem mollicieq; confert. Quarto utuntur ad Ellychnia maxime conficienda: ex eo Cauton uocant. Ceterum tanta ei uis est, ut morbum fonticum deprehendat nidore. Lusit & Anaxilaus eo, condens in calice nouo, prunaq; subdita circūferens, exardescens percussu, pallore dirit, uelut defunctos effundente conuiuis. Harpacticon, siue Harpax appellatur in medicamentis, a celeritate uel lendi. Habet & in religionibus locum, ad expiandas suffitu domos. Sentitur uis eius & in aquis feruentibus. Neq; alia res facilius accenditur. Fulmina quidem, & fulgura Sulfuris odorem habent. a lux ipsa eorum sulfurea est. Porro sulfur in uenis terræ ceu decoctus quidam adeps est, tam ualida & firma confusione partium, ut oleum eius arte nulla separari possit in rebus ceteris. Propterea cum oleacea, & ignea, non sulfurea sit eius natura, haud facile diluitur. In spiritum, siue nebulam facit. Sunt hæc chymistis notissima, non aliud magis in conficiendo auro commendantibus, quam Sulphur: quippe quod splendorem, & colorem metallis afferat: ut corpus, & materiam hydrargyros: proinde sit maris uice Sulphur, Hydrargyros uero, id est, Argentum uiuum foemina: ut Democritus propterea omnis generis metallici spumam esse Argentum uiuum prodiderit. Duobus istis, pharmacum illud famigeratum potius quam compertum etiam, Philosophici lapidis nomenclatura nobile. Conficitur ab Ostiane, Mercurio, Chane, Zosimo, Agathodæmone, Democrito. Quamq; & alij scripserunt de miris, ne dicam figmentis huius peritis, Orus, chrysorychites, Pebichius, Comerius, Ioannes, Apuleius, Petasius, Pelagius, Africanus, Theophilus, Synesius Olympiodorus Alexandrinus: recentiores istis Stephanus ad Heracleum Cæsarem, Heliodorus ad Theodosium. Iam foemina, Cleopatra uirgo, Taphnutia, quæ minus probatur, & Iudeæ gentis Maria, quam plurimi sequuntur. Auctores istos, occulentes rei gratia, nihil fere suis nominibus, appellant: ut ipsam Sulphuris, & Hydrargyri, fuliginē Argyrion nama, hoc est, Argenteum fontem dicant, Alsemon uero, fuliginis eius ferruginē.

EX M. VERG. COMM.

Fecerunt Sulphuris quatuor alij genera, quæ ut græcos omittamus, a Plinio. 35. suæ historie commentario cap. 14. suis nominibus, notisq; priuatim indicantur & numerantur: hic duo tantum: alterum ignem non expertum, quod uiuum nominant: alterum uero quod igne confectum fuerit. Diuersitatiscq; eius non alia fuit causa, q̃p cæteri pluribus locis & multiplex nascens Sulphur, quale in plerisq; artibus & uitæ necessitatibus aliquot quæsiisse id oporteat, docet: hic medicinam tantum tractans, ex omnibus generibus uiuo, & ignem non experto illo præcipue indigebat. Eo enim medici plerumque utuntur: quoniam natua, & sua uis efficacior illi quam cæteris est. Eamq; ob causam in uniuerso Sulphure una illa differentia merito usus est. Græci *ἀπυρον* uiuum illud uocant, non alia uocis indicatione q̃p igne careat. Celsus libro quarto, cap. 15. altera nota idem indicauit, Sulphuris ignem non experti quod Apyron uocatur, dicens. Maro contra Georgicorum suorum. 3. commentario, in pecoris medicina uiua Sulphura appellauit. Contrarium uero illi alterum genus iisdem græci *πυρρῶν* uocant, igne incoctum intelligentes. Quotidianus, & numerosus inter homines Sulphuris usus est. Indiget em̃ eo plærq; artes. Indiget & ad quotidiana igniaria, expiationesq; domus: sed nullibi utilius q̃ in morbis, quibus numero multis, & periculo grauib; medet. Quæ omnis ratio ab hoc scriptore, & quo paulo ante diximus loco, a Plinio copiosissime tractata, reperti a nobis inutiliter non debet.

De Pumice.

CAP. CXVI.

Pumicis probatio, ut magnopere leuis, spongiosus, teri facilis, nec harenosus, item fragilis, & candidus. Crematur flagrantissimis carbonibus obrutus, et ubi canduerint, extractus, uino restinguitur odorato. Iterumq; incensus extinguitur: & tertia uestione exemptus, & per se refrigeratus, ad usum conditur. Vis eius adstringere, gingiuas abstergere. Purgat cum calfactione, quæ caliginem pupillis offundunt. Explet ulcera, & ad cicatricem perducit. Excrecentia cohibet. Fit ex farina eius dentifricium. Corpori crustam obducit. Auellendis capillis aptus. Theophrastus autor est, si quisq; in bullientem urseum uini Pumicem iniecerit, feruorem statim sedari.

BARBARI COROLL.

Pumicis farinam, potores in certamine bibendi præsumere, sed nisi uniuerso potu impleantur, periclitari Theophrastus autor est: qui & Eudemum pharmacopolam, in uigilias secundas uices durasse scribat. Ingressumq; balneas, nihil omnino reiecit: sed quasi non bibisse, ita coenitasse, Pumice uidelicet, ab septima statim potione hausto, primum ex aceto aspero, mox ex uino. Vt errauerint qui locum eum in Theophrasto de uiginti duabus Ellebori portionibus accepere, cum ex Plinio id facile deprehendi possit. Pumice in musti cados addito, non ad præsens modo, sed in totum feruere uina desinunt ui sicifica. Pumicis duo significatus. Alter notus omnibus. Altero dicuntur ita & cætera saxa erosa annis, qualia in ædificijs, ut Plinius inquit, Musea uocant dependentia, ad imaginem specus natui arte reddendam. Nunc inde Musaica uulgo nominantur, preciosissimis dicata templis. Inuentum id Agrippæ quidam referunt acceptum. Huiusmodi operis artifices Musæarios Cassiodorus, & Iustiniani leges uocant, etiã si musæarios corrupte multi lætent. Amianus Marcellinus, Musiciū opus nominat. In uitis cæsari, quas ab Adriano Iulius Capitolinus, & alij complures scripsere, pictura de Musæo nominat, etiã si mendose legebatur, de musæo. Laudatissimi Pumices sunt in Melo, Scyro, Æolijsq; insulis. Probantur teri faciles. Poliendis libris accommodatur: unde Repumicatos appellamus. Pumex græce Cissaris uocat: qd nomen aliud nihil significat, q̃ erosum. Etem uermiculus triticarius, et ordearius Cis dicit, ut ips cornicularius, Trips lignarius, Sis uestiarius, Ix nitiarius, si Phorid graminico fides habenda est. Pumicem ueteres etiã spongiā uocabant. Nā & e maris quoq; spuma coalescit aliq̃: itemq; ex arena littorali: ut in insula Cyclade Nisyro. Vitruuius, quæ nunc inquit, sub Vesuuio monte Spongia, siue Pumex Pompeianus uocatur, ex cocto alio genere lapidis, in hæc redactus uidetur generis qualitatem. Talis autē Pumex inquit, & circū AEmam gignitur, & collibus Myssiæ, qui catacecaumenos a græcis, hoc est, deustus appellatur. Talis &

uicij

B

Pli. li. 36. ca. 36

li ij

D I O S C O R I D I S

C Lipareus est, ut inquit Theophrastus: alioquin antequam uratur, niger, levis, atque factus. In Meso quoque insula, idem auctor est, Pumices quandoque in altero gigni lapide: ponderosum, & nigrum esse Siculum: qui & ceteris praefertur.

E X M. V E R G. C O M M.

C Redimus scriptoris huius Pumici ab aliquo, qui omnem eius historiam eodem loco habere uoluerit, accreuisse quod in extremo capite ex Theophrasti. 9. de plantarum historia acceptum legitur. In uetustioribus enim graecis nulla est ea pars, neque in medicina necessitatem aliquam habet. Nec Dioscoridis etiam historiae, decretisque omni ea reiecta parte nocuerit aliquis. Retulit id Theophrastus quo diximus loco: acceptamque ab eo rem eam omnem Plinius etiam docuit, 36. uolumine, cap. 16. quo loco tractata itidem omnium Pumicum historia & medicina, scriptoris huius decretis omnibus subscribit: additisque aliquibus, cocturae, usuique Pumicum non parum profuisse uidebitur. Nos breuitati consulentes, ea relinquimus: monemus tamen omnes, non fore inutilem eadem haec in eo scriptore legentibus operam. Aut si Plinium audire noluerint, Barbarum saltem uisere, in quo omnia ex Plinio huiusmodi uerbis tradita leguntur. Notissimus nunc etiam omnibus Pumex, a graecis Cissaris, ob fistulosas concauitates quas habet, nominatus. Ciss enim ab eis dicitur, qui in tritico & hordeo cum referbuerunt, nascitur uermis. Cui natura est, semina illa cuspe potius, quam ore quam habet exiguis foraminibus terebrare: quibus foraminibus quoniam similis fit fistulosus ille Pumicum habitus, quasi ab his uermibus perforatus fuerit, Cissaris Pumex dictus est.

De Sale. C A P. C X V I I.

S Al fossilis efficacior est, communiter si est candidus, calculis uacans, & perspicuus, densus, aequali compage. Peculiariter Ammoniacum genere laudatur, si modo findi facile possit, rectisque segminibus diducti. In marino Sale eligendus est candidus, aequalis. Probatissimus in Cypro fit, & Salamine Cypri, & Megaris, in Sicilia & Africa. Sed inter dicta salis genera lacustris praefertur: sed multo ualidissimus est Phrygius, nomine tapeus, ut tritaeus, aut ganteus. Salis natura, in commune praeterquam utilis est. Adstringit, abstergit, expurgat, dissipat, reprimat, extenuat, & crustas inducit. Sed hoc interest, quod alius alio sit praestantior. Quin & a putredine uindicat. Ammiscetur medicamentis psoras abstergentibus. Excrecentia in oculis reprimat, & pterygia consumit. Caeterasque carnis extuberationes tollit. Clysteribus infunditur. Discutit lassitudines ex oleo illitus. Contra hydropicorum tumores auxiliatur. Dolores in saccis fotu mitigat. Et pruritus sedat, ex oleo & aceto infricatus, donec ad ignem sudent. Item lichenas, lepras, psorasque. Anginam ex melle, aceto, & oleo illitus leuat. Tonsillis, uuaeque cum melle tostus, ulceribus in ore manantibus, gingiuis quas humor uexat, & phagedaenis ulcerum cum polenta crematus illinitur. Aduersus scorpionum ictus cum lini semine. Contra serpentium morsus cum origano, melle, hyssopo. Aduersus cerasten cum pice, aut cedria, aut melle auxiliatur. Contra scolopendreae morsus cum melle & aceto. Aduersus uesparum ictus, & crabrones, albidasque capitis pustulas, thymos, & tubercula cum seuo uitulino. Furunculos cum uua passa, aut suillo adipe, aut melle discutit. Testium tumores cum origano & fermento maturius concoquit. Crocodilorum moribus auxiliatur, tritus in linteolo & intinctus aceto, ita ut uinculis loca constringantur. Prodest ad bestiarum morsus, sugillationes in fa-

cie, ex melle. Contra haustum opium & fungos, cū aceto mulso bibit. **A**
 Luxatis imponit cum farina & melle. Ambustis igni cum oleo impos-
 situs, pustulas erumpere non patit. Podagricis itidem imponitur, & au-
 rium doloribus cum aceto. Ignis sacros & ulcera quæ serpunt cum ace-
 to, aut hyssopo illitus sistit. Vritur fictili, diligenter opertus, conditusq;
 prunis, usq; dum efferuescat. Aliqui fossilem subacto polline, obliniunt,
 & carbonibus subijciunt, usq; dū pollen exuratur. Solet & sal cōmunis
 eodem modo uri. Sed aqua semel abluitur & siccatus in ollam cōoper-
 tam mittitur, subdito igne, moueturq; donec iam non exiliat.

BARBARI COROLL.

SAL omnis, græci halas uocant, Panaceam Lucretius, a remediorum multitudine. Aut sit, ut
 palustris, & maritimus; aut gignitur, ut fossitius: utrumq; pluribus modis, sed causa gemina.
 Coacto humore, aut siccato, siccatur in lacu Tarentino. Item lacu Cocanico, in Sicilia, & alio
 iuxta Gelan, & Pachynum, tanti splendoris, ut sentiat imaginem. Item in Phrygia, Cappado-
 cia Aspendi, ubi tantum noctu subuenit, quantum inrerdiu auferas. Omnis est alius Sal minu-
 tus, atq; non gleba. Lacus duo in Baetris salē æstuāt. In Cypro, Citrieum, ab oppido id nomiē.
 Extrahit & Memphi, e stagno: dein sole siccant. Apud Caspias portas, quæ Salis flumina ap-
 pellantur, superficie densantur in salem, amne reliquo fluente uelut sub gelu. Itē circa Mardos,
 & Armenios, & in Baetris amnes Ochus, & Oxus, ex apposis montibus deferunt Salis ra-
 mēta. Lacus in Africa, & quidem turbidi, salem ferunt. Calidi quoq; fontes, sicut Pegase. Oro-
 menus, salis mons natiui est apud Indos, in quo ceditur renascens, magno uectigali Regū. Car-
 ris Arabiæ oppido muros, domosq; massis salis faciunt, aqua ferruminātes. Inuentus & iuxta
 Pelusium, inter Aegyptum quoq; & Arabiam etiam per Africæ squalētia detractis harenis, usq;
 ad Hammonis oraculum, qualis crescere affirmatur cum luna noctibus. Hammoniācus tra-
 ctu Cyrenaico celeberrimus, sub harenis, unde nomen, similis est colore alumini fissili, longis
 glebis, neq; perlucidis, ingratus sapore, sed medicinæ utilis, leuissimus, intra specus suos in lucē
 uniuersam prolatus, uix credibili pondere ingrauescens. Adulteratur cocanico & cyprio, mirē
 simili. In Hispania citeriore Egelesē, ceditur glebis pene translucentibus, cui iam pridem palma
 a plerisq; medicis tributa. In Medis Atropatena regione, stagno cui Spauta est nomen, sal cōit,
 pruritus & dolorem tactu ciens. Remedium, oleo inungere. Omnis locus in quo reperitur sal,
 sterilis est. Vulgaris plurimus in salinis, mari affuso, non sine aqua dulci, sed imbre maxime iu-
 uante, ac super omnia sole multo. Africa circa Vticam, construit acervos salis ad collium speci-
 em: & in agro Rauēnati, Ceruia: ob id, ita ut puto, nominata, quali Aceruia: qui sole & luna in-
 durati, nullo humore diluuntur, uix ut ferro cedi possint. Fit tñ & in Creta, sine riguis aquæ
 dulcis, & in Aegypto. Fit & puteis in salinas ingestis. Prima densatio Babylonē, in bitumē liq-
 dum cōgit oleo simile, quo et in lucernis utunt. Detracto subest sal. Et in Cappadocię puteis, ac
 fonte quem in salinas ingerunt, ubi & specularium modo lapidum effodit, magno glebarum
 pondere: quas uulgo Micas uocat. In Chaonia excoquunt aquā ex fonte, refrigerandoq; salē
 faciunt inertem, nec candidū. Gallie, Germaniæq; aquam salinam lignis ardentibus infundunt.
 Hispaniæ quadam sui parte puteis hauriūt saluginem, Muria appellantes. Quercus ad id opti-
 ma, alibi Corylus laudat. Carbo etiā in salē uertit. Quicq; ligno conficit sal, niger est. Vmbri
 harundinū, & iuncorum cinerem excoquūt aqua, donec exiguū super sit humoris. Quin & mu-
 ria falsamentorum recoquit ad naturam suā consumpto rediens liquore, uulgo e menis io-
 cundissimis. E stagnis maxime laudat Phrygius, Tattæi cognomento: et Tarentinus, quē antiq;
 ad medicinæ usum uehementer probant. Tattæus e Cappadocia, magna Phrygię parte stagno.
 Tatra Morimenorum gente nascit. Nam q; fossilis in Cappadocia sal est, in laterculis affertur.
 Colopeno et Camiseno tractu multus, ut Straboni placet, sceminis gratissimus, q; cutis nitore
 faciat. Magis tamen extendit Citrieus. Salissimum Salem putant, q; sit siccissimus. Suauissimū
 esse Tarentinū, eundemq; candidissimum. Fragilis q; cūq; candidus, pluuia dulcescit ois. Su-
 auiore rores faciunt, copiosum aglones. In igni nec exilit, nec crepitat Acathius, ab oppido ubi
 nascit uocatus. Nec Tragaseus, ppe Smynthiū in Troade, ab aq; quę Tragasa dicunt, appella-
 tus: siue ut Iulius Pollux, a Trageo, cui Neptunus agros in Salē uerterit. Licebat hūc omnibus

Pli. li. 3. ca. 7.
& 9.

B

C gratuito colligere. Vectigalem fecit Lyfsmachus, obaruit; uetigalibus remissis, denuo erupit. Sed nec ullius spiritu crepitat in igne, nec rametum, aut tenuis Sal. Agrigentinus, ignis paties, ex aqua crepitu exilit. Rubens Memphi, croceus in Cappadocia, idemq; odoratissimus. In Baetris rufius circa Oxum Ceturupis, et in Aetna purpureus, & in Lusitania, ut inquit Strabo, purpureus albet. Iumentor, & boi oculis Tragaseus, & Beticus pferit. Ad obsoniū, & cibū utilior quisq; facile liquefit. Item humidior. minus em amari sunt, ut Articus, & Euboicus. Seruadīs carnibus aptior Megaricus; qm acer, & ficcus est. Condit Sal odoribus, quo & pulmentarij uice uti ueteres. Adeoq; necessariū elementū est, ut transferit intellectus ad uoluptates animi q; . Nam ita, ut inquit Plinius, Sales appellant. Hinc dicta falsa, & uia salaria: qm ea sal ad populos portari consueuisset. Ancus Martius salinas primus instituit, & populo congiarium e Sale dedit. Sine Sale, hoc est, mola falsa, nullū sacrū fiebat. Caunites efficax i collyria. Tebaicus ad pruritum. Laudat & a Sodomis Galeno. Sal, uitrū, atq; nitrū, sulfuri cōcoctū, in lapidē uertit. Cornea piscatorū corpora dicunt, qā sole, & sale obduruerūt. De Agrico sale mentionē in Columella inuenias; nisi p gñe nitri capiat, qd Agrion uocari docebimus: haud scio pterea qualis sit.

¶ De Spuma salis. CAP. CXVIII.

ἀλὴν ἄχνη

Halos achne spumosi salis ramentum, in exilibus petris inuentum, cui uis eadem quæ sali.

BARBARI COROLL.

Pli. li. 31, ca. 7.

Halos achne salis genus, & hoc sponte natum, spuma ex aquis maris in extremis littoribus ac scopulis relicta. Hæc enim omnis rore densatur, & est acrior quæ in scopulis inuenitur. In igni nec crepitat, nec exilit. Ad omnia in quæ sales, probatur: spuma iocundior & utilior, Halo achnen uocant, & unum e quinque Alcyonij generibus.

EX M. VERG. COMM.

Salis seipsam solo nomine cōcrefcens in littoralibus petris, & in mari scopulis, fluctuū aspergine, salis lanugo potius q; spuma indicat. Plinius Spumam. 31. uolumine, cap. 7. appellat, ex propria achnes in græcis significatione. Hic tamen ἁλὴν ἄχνην eam esse dicens, lanuginem magis, cum iam in faxis concreuit, describere uidetur, facilem cognitu & inuentu rem.

¶ De Muria. CAP. CXIX.

ἀλμύρα

DMuria effectus salis præbet. Abstergitq; . Dysentericis infunditur, etiā si nome intestina corripit. Ischiadicis ueteribus ad fortus, aquæ marinæ usum præstat.

BARBARI COROLL.

Pli. li. 31, ca. 8.

Salsugo, id est, Halme, iteq; Muria uocari pōt, q; q; & aliud genus Murij inter sales diximus. A Garo differt Halme, etiā si utrūq; ad pisces Galeno teste pñet. Garus est sanies intestinorum ipsa, ut diximus secundo libro. Halme uero muries & falsilago pisciū inueterator, hoc ē, ius salum in q; seruant, quā mulieres nostræ uulgo Salimuriā appellant. Hæc a ueteribus & Salsugo thasia uocari solita est: ita condebant, inueterabantq; pisces ij, q; cūq; in pruna et craticula cōmodo coq; possent. Ob id eos Aristophan. Anthracidas, hoc ē, prunarios & carbonarios uocauit. Nos ut arbitror Aleculas. Huiusmodi sunt Smarides, & Menç. Itē Chalcides, quas & Chalcidicas, & Sardas, & Sardinios q; appellāt. Nā Chalceus. i. Saber, alius piscis ē orbiculari specie, Cyzici frequēs. Carbonarij sunt & Trichides, quas & Trichias uocāt. Nā Trichiades ab Aristot. dicunt quæ Thyñides sint: quas tñ ipsas, ut Athenus, qnto de partib. animalū uolumine Trichidas nominat. Eiusdē sortis arbitror Epsetos, a coquēdo nominatos, q; Artemidorus etiā Plestos uocauit. Sed in Aristot. Theodo. Naricas interpretatus est, nescio q; uere. Piscis certe minutus ē Narica, ut Festus inquit. Plautus muriaticā Naricā i uasis stagnis apportat i comœdia. Illud in transcurfu dixerim, Sardinios ab Aristot. intelligi nōnunq; eos, q; a nōnullis Eritimi uocant. Differūt porro Eritimi, ab Erythinis. Nā Eritimos, ut dixi, sarda ē, uel sardē similis. Erythinus autē ē, q; a nostris uocat Rubellio. His gñibus pxime sunt & Thyrsæ, quas Gaza noster, et ante Gazā Georgius tiphernas, in Strabōe Alosas, cōi pisciū cū mugili & delphinis Nilo. Sed ita cur uocēt, nondū cōpi. A qbus distāt, q; Thrattē siue Thrassē nominant, et a qbusdā Thetæ. Pisciculus et hic pusillus ac uersicolor. De Alosis ē qd dubitē, sint h; q; Romanū uulgus Latias appellat, Alosas Gallia & Germania, Culpeas Venetia, in imensum platīs, quæ Tiberino amne capiant; an genus aliud, Athenæus qdem Laton piscem cōmēmorat, quem Archesstratus

poëta præstantissimū in Italia nasci cecinit, præsertimq; freto siculo. Hunc in Nilo grandissimū euadere ducentas excedentē quandoq; libras. Esse autē candidissimū, & suauissimū, oibus modis paratū, similem glandi uocato, qui amne Istro capiat. Ex aceto & muria fit, qd oxalme dicitur. Sicut apud Cratinū ex alio & muria Scorodalmē. Qui iocularē quæstionē, siue gryphum in cōuiuio propositū non soluissent, multabantur haustu muria, sed ita, ut in uino paulatim, & cum interpiratione biberet. Apud alios uictis meracū, uictoribus osculū dabatur.

EX M. VERG. COMM.

Pro comperto nobis est, deesse huic capiti uires, potestatesq; illas oēs, quas salī hic idē scriptor paulo ante assignauit. Neq; em̄ uerisimile est, ex tā multis, unā tantū extēdi scilicet dictā ab eo fuisse. Persuadetq; id non tā antiqua scriptoris huius interpretatio, in qua deinceps multæ alia numeratur, q̄ Plinius. 31. uoluminis, cap. 8. plures & ipse numerās, spissare, mordere, extenuare, siccare, & quæcūq; alia hic scriptor toto hoc capite docet; a quo ipsē uerbis oīa reddita sunt. Credimus nos factū id ab aliquo, cui satis esset, in sale ea audisse, laboriq; in scribendo iterū quæ semel scripta fuissent parcens, eas neglexerit. Repetēda itaq; et in hoc caput reuocanda ex sale oēs illę erūt. Barbarus græcorū Halmen Salfuginē uocauit, latioris forte ambitus, q̄ græcorū Halme certa res exigeret, uoce usus. Nos Muria auctoribus Columella, Plinio, Romanisq; scriptoribus alijs appellauimus: qui in medicina, & domestica re Muria semp uocauerūt. Ea duplex ueteribus fuit. Altera, qua in cōditura uini uterent; cuius cōfectionē & usum Columella docuit. 13. uolumine, capite. 26. Altera, quæ dura ab illis uocabatur: cuius cōfectionē & usum idē scriptor eodē uolumine, sed capite. 6. & 7. tractauit: qua in condituris olerū, radicū, pomorū, salgamorūq; omniū usa antiquitas est. Solūq; hoc genus Halmē Dioscorides uocat: quoniam altera illa admixto sibi melle, nullū nisi in uindemia habebat usum. Eius cōfectio a Columella his uerbis docet. Dolium q̄ patentissimi oris, locato in ea parte uillæ quæ plurimū folis accipit. Id doliū aqua celesti impleto, ea est em̄ huic rei aptissima: uel si non fuerit pluuialis, fontana dulcissimi saporis sit. Tum indito sportā iunceam, uel sparēā, quæ replenda est sale candido, ut candida Muria fiat. Cum salē per aliq̄ dies uidebis liquefcere, & ex eo intelligis nondū esse Muriam maturā, alium subinde salē tamdiu ingeres, donec in sporta permaneat, in teger sal, nec minuat. Quod cum aniaduueris, scias habere Muria maturitatē suam. Et si meliorē adhuc uoueris, in uasa bene picata diffundes, & opertā in sole habebis. Omnē enim mucorē uis solis aufert, & odorē bonū præbet. Est illud etiā maturæ Muria experimentū, ubi dulcem caseum in eam dimiseris: si pessum ibit, scias esse adhuc crudā: si innabit, maturā. Et hæc cura antiquorū Muria fuit, qua in condituris salgamorū uillici & patresfamilias utebant. Medicina autē in plerisq; morbis, præsertimq; interaneorū exulcerationibus, & coxædiciis doloribus eadem rōne, qua secundo uolumine in Garo idem hic scriptor monuit: ut exulcerata ad cicatricem perduceret, & quæ exulcerata non essent, ad ducendum ulcus proritaret.

De Flore salis.

CAP. CXX.

Flos salis flumine Nilo defluit. Lacubus tamē quibusdam innatat. Assumendus qui crocei coloris est, odore ingrato, ceu Gari. Interdum longe magis uirus olet, gustuq; mordacior, & pinguius lentus. Fuscatus aut rubrica, aut scrupulosus, improbatur. Præterea syncærus nō nisi oleo resoluitur. Adulteratur nōnulla ex parte, etiā aqua diluente facticiū colorem. Ad ulcera quæ cacoëthe uocant, & phagedænas, genitaliū nomas, & purulentas aureis efficax est. Oculorū hebetudines, cicatrices, albuginesq; tollit. Emplastris, unguentisq; coloris causa, ut rosaceo, miscetur. Sudorem cit. Aluū turbat in uino, aut aqua sumptus. Stomachū male habet. Additur acopis & smegmatis, quæ albandi capilli gratia componuntur. Et in uniuersum, acris est, & feruentis naturæ, ut sal.

BARBARI COROLL.

Flos salis, id est, Halofanthos, siue Halyanthion, non fit, nisi aquilonibus. Est autē fauilla salis, quæ leuissima: ex eo est & candidissima, in totūq; diuersa res a sale, humidiorisq; naturæ, & crocei coloris, aut rufi. Si fæces imæ concutiant in uasis, uelut rubigo salis

ἄλλος ἄριστος

Pli. li. 31. ca. 7.

li. iij

D I O S C O R I D I S

C adulteratur, & testa trita. Florem Salis Cato uocat, qui e populari Sale candidus arte factus sit. Propterea & Alabaſter a Democrito quandoq; dicitur.

E X M. V E R G. C O M M.

Peregrina, nec ſatis certa res Italiae quondā ſalis hic Floſ fuit. In Aegypto inueniri ab hoc, & ab alijs dictus, paludibusq; & fontibus quibuſdam innatare. Quo minus demiretur aliquis, nūc in medicina parum cognoſci, & nullum eius eſſe uſum. Salis ueluti rubigo quaedam ab alijs dictus ſalis Floſ eſt, quoniam colore ruſſo ſit. Commendabatur tunc, qui olei pinguitudinem quandam redderet. Quod ſane miretur aliquis, ab olei pinguitudine diuerſo penitus ſale. Certiſſime de eo Plinius. 7. uolumine, capite ſeptimo egit: nihilq; nō ab hoc ſcriptore traditum, iſdem reddidit uerbis. Ob quam cauſam longius de eo non agimus, in ſcriptore eo cognoscenda relinquentes, ſi qua nouiſſe alia de eo aliquis optauerit.

De Nitro.

C A P. C X X I.

νίτρον

Praefertur Nitru laeue, roſeo colore, aut candido, in foramina dehiſcens, perinde quaſi ſpongioſum quiddā. Quale ex Illyrico aſſertur, a Bunioru ciuitate. Humores transfert qui alicubi concreuerunt.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 7. cā. 10.

Nitrum, Graeci & Litron, uocāt attice. Veteres hoc ignorauere medici. Non multū a Sale diſtat, nec quiſq; Theophrasto diligētius de eo prodidit. Exiguū fuit apud Medos, caneſcentibus ſiccitate conuallibus, uocabant Halmirhaga, minus etiā in Thracia, iuxta Philippos. Sordidum terra, quod appellant Agrion. Omiſſum eſt e quercu cremata fieri, propter impendia. Nitroſae uero aquae, multis locis repta, ſicut & ſulphuroſae, aluminosaeq; ſed ſine uiribus denſandi. Optimū, copioſumq; in Clitis Macedoniae, qd uocant Chalaeſtricu, quo in pane utitur pro ſale: cui & proximū eſt natura, purū & candidū, nitroſo ibi lacu exiliente, e medio dulcis aquae fonte: quo ſemp emicante, nec auget tamen, nec effluit. Ibi ſit Nitru Canis ortu, nouenis diebus. Si fuere imbres, falſius, per aquilones deterius; totidēq; ceſſat, ac ruſus inatat, ac dein de ceſſat. In Aegypto non naſciū, ſed conficiū fuſcū, lapidoſumq; nitrarijs Nilo inuſo. Siccant excedente eo, decedente madēt. Succo Nitri. 40. diebus cōtinuis, non ut in Macedonia ſtatis, protinuſq; ut denſari eſt coeptū, rapitur: ne liqueſcat. Condiū in aceruis durat in lacu Aſanio, & quibuſdā circa Chalcidem fontibus. Sūmas aquas dulces, et poculentas tradunt: inferiores nitroſas. In Nitro optimū quod tenuiſſimū, & ideo Spuma melior, Aphronitru uocata, Sordidum tantū probāt ad inſciendas purpuras, tincturasq; oēs. Nitrariae circa Memphim peiores, ubi & circa Naucratin dūtaxat ſolebant eſſe in Aegypto, nunc multis in eadem prouincia locis egregie uiſunt. Lapidēſcit circa Memphim, multis ibi tumulis ex eo faxeis. Faciunt ex ijs uafa. Liquatū cum ſulphure coquētes, carbonibus ferrumināt in lapidem. Ruſſum ibi exit a colore terrae. Adulterat calce, quod & pungit guſtu, odoremq; reddit uehementē. Syncerū uero facile reſoluit. Inueterant ibi Nitro res pro ſale. Igni non exilit Nitrum, niſi & teſta: nihilq; gignit, aut alit. Cum in ſalinis herbæ, in mari tantū algæ tot anialia naſcant. Nitrariae calciamēta protinus conſumūt. Vlcerā allata, eo celerrime ſanant. Ibi facta tarde. In Nitrarijs, non lippiunt. Aegyptiū teneriores faciū Rhaphanos, ſed obſonia alba, & olera uiridiora. Salnitru uocabulo uulgi dicit, pulueri conſiciendo neceſſariū: quo ad bellica tormēta uunt, nouitia, poenitendaq; ac peſſimo publico inuenta. Diuerſum a Nitri generibus exiſtimo, indiētūq; ueteribus, etiam ſi locus in Plinio eſt, ubi de hoc gñe loqui uideat. Sed eum nos mendofum credimus.

E X M. V E R G. C O M M.

Ferunt quondam Nitri pluribus locis non aliter, q̄ aliorū metalloꝝ nitrariae fodinae: ali- quibus etiam ſiccatis ſole nitroſis aquis & paludibus fiebat. Et ne longiores ſimus, nullū quale noſtra aetate eſt, ſiticiū Nitrum tūc erat: nec eum quem noſtra aetate uſum, in miſſilibus igne tormētis habet, in antiqua militia habuit. Vtebatur eo medicina tantū. Nihilq; Apſyro in ue- terinaria medicina frequētius eſt. Quoniā ſalis modo auiditate cibi morboſo pecori excitaret. Simulq; quā habet pellendi ui purgaret. Vtebat & ganea, in qua periti eius obſeruauerāt, tene reſcere Nitro multa, praefertimq; herbæ: radices, candore obſonia contrahere, & olera uirtu- ra fieri. Ex quo uſu Martialis etiā cecinit. Ne tibi pallentes moueant faſtidia caules, Nitrata uiri- dis braſſica fiat aqua. Quod totū legentes monuiſſe placuit, ne quis ab hoc, et ab alijs de Nitro dicta, de Nitro noſtrae aetatis, quē Salem Nitrum oēs paſſim noiant, dici exiſtinet. Laudauit antiquitas Nitru ob diuerſos uſus, diuerſis locis naſcens. Hic ex bunis ſpongioſum alijs an te-

posuit: non satis certa loci indicatione. Omittimus quæ Plinius, 31. uolumine, capite. 10. retulit, optimū, copiosumq; in Clitis Macedonia nasci. Nihil enim quod ille ait ad scriptoris huius Bunos pertinet. Qui si hoc loco colles simpliciter significant, fossile & ex montanis erutū cæteris uidetur Dioscorides anteposuisse: sin contra, non colles ea uoce, sed certū aliquem significauit locū: in ambiguo tunc res est. Plures em diuersis regionibus urbes, & oppida hoc nomine in antiqua Geographia audiuntur: quia in collibus ædificatæ habitarentur sic nominatæ. Bunos enim Græci cespitibus erectas aras & tumulos uocant. Siquidem in Illyrico, in Epīro, nec procul ab Antycira eodem nomine Buni urbes & oppida fuerunt: ut testati Stephanus Byzantius, Plutarchus, pluresq; alij sunt. Nobis inclināt animus in eam quæ non procul ab Antycira a Plutarcho describitur, in commentariolo, cui titulus est, utrobi, in terrestribus, an in aquatilibus brutis maior sit prudentia.

De Spuma Nitri.

CAP. CXXII.

Spuma Nitri optima esse putatur leuissima, glebosa, friabilis, colore pene purpureo, aut spumosa, & mordens. Qualis ex Philadelphia Lydiæ defertur. Secunda est Aegyptia. Quin & in Magnesia Cariæ gignitur. Vim & uisionem salis habet tam Nitrum, q̃ Spuma eius. Præterea Nitrum tormina sedat, si tritum cum cumino bibatur, in hydromelite, aut sapa, aut aliquibus quæ inflationes discutere possunt, uti Ruta, uel Anetho. Febribus circumitu redeuntibus illinitur, ante suspectam accessionem. Miscetur emplastris, quæ extrahunt, & discutiunt, extenuant, & lepras abstergunt. Cum aqua autē calida, aut uino infusa, inflationes, purulentas aureis, & sonitus earundem sanat. Sordes expurgat cum aceto instillata. Canum moribus ex asinino adipe, aut suillo medetur. Resinæ admixta furunculos aperit. Aquæ inter cutem cum fico illinitur, opisthotonisq; iam remissioribus, & luxatis cum cerato. In resolutione linguæ pani cōmode permiscetur. Aliqui supradicta carbonibus urūt, subiecta prius testa noua, donec incandescant.

B A R B A R I C O R O L L.

Aphronitrum, siue Aphrolitron maxime laudatur, quia sit Nitri pars tenuissima. Hoc ueteres negabant fieri, nisi cum ros cecidisset prægnatibus nitrarijs, sed nondū parientibus: itaq; non fieri incitatis: etiā si caderet. Alij operimētorū, acruorūq; fermento gigni existimauere. Proxima ætas in Asia colligi tradit, in speluncis distillans molibus: specusq; eos Colycas uocant. dein siccat sole. Lydiū in pastillis affert. Aegyptiū in uasis picatis, ne lique scat. Vasa quoq; ea sole inarescentia perficiunt. Differt Aphronitru, ab Aphonitro. Id qd Spuma sit, nitum esse in pollinē affirmat. Candidū, & triticæ farinæ simile. Aphonitru uero, siue Apholitru congelati specie coit; eoq; in balneis quotidie, ut Galenus inquit, ad extendas fordes utimur.

E X M. V E R G. C O M M.

Nec eadem, nec diuersa Nitro penitus nitri Spuma antiquis fuit: iisdem locis cum Nitro nascens, & æquali illi potestate: aspectu tamen alia, quo tenuior Nitro, eo etiā melior. Discrimen in nascendo potius q̃ substantiæ eius erat. Prægnantibus enim, sed nondū parientibus nitrarijs, ut Plinius ait, Spuma colligebatur. Eratq; ob tenuitatem suam Nitri Spuma præuius, & in summū emergens, simulq; concrefcens humor. Sunt tamē in græcis, qui testentur fieri Nitri Spumā, a ceruore nitri, ueluti fermento quodam, ex quibus referuētibus hæc ueluti Spuma emergeret. Quod in multis alijs sit, seruire suo se purgātibus. Addiderūt alij, in priore illa colligendæ nitri Spumæ rōne, non concerni eā in nitrarijs, nisi nocturni accesserint rores. Quocūq; autem modo ferres habuerit, qd tenuissimū ex Nitro se proferebat, id nitri Spuma quondā dicebatur: multi, ut uidet in medicina usus, a Nitro sola bonitate diuersa. Ob quā causam, & si forte uno, eodēq; capite continuata historia de utroq; traditū quondā a Dioscoride fuerit, nos tamē aliorū omniū rationem secuti, seorsum de utroq; egimus. Neq; est quod ultra moneamus, q̃ fuisse quondā pro sale aliquibus locis Nitri huius usum: tanta illi similitudo coloris, saporis, & tē-

A

appet. virg.

B

Pli. li. 31. ca. 102

D I O S C O R I D I S

C tuis substantiæ est. Possæq; adhuc inueniri, & in eodẽ usu gentibus aliquibus esse: id tamen pro comperto nobis nõ est. Quemadmodũ sine controuersia a cunctis recipi, nullũ fuisse usum, nec confectionẽ aliquam eius; qđ nunc decocta terra ad usus belloꝝ fingit, & Salem Nitru uo cant. Magna cum illo similitudine, & naturæ id generantis imitatione excogitari.

¶ De Fæce.

C A P. CXXIII.

E Ligenda Fæx maxime a uino uetere, Italico; sin minus, ab alio con simili. Fæx aceti uiribus longe acrior est. Crematur ut alcyonium, ante diligenter siccata. Sunt qui noua testa igni largo urant, usquedum penitus incandescat. Alij uiuis carbonibus Fæcis glebam obruunt, & idem opus prosequuntur. Experimentum est legitimæ ustionis, ut aërio nitore inalbescat, linguamq; tactu urere uideatur. Eadem urendæ Fæcis aceti ratio. Visei supra modum urens, & abstergens. Vlcera ad cicatrĩ cem perducit. Vehemẽter exest, siccataq;. Sed recenti utendum est, quoz niam celeriter exanimatur, aperta, & nullo uase condita. Lauat ut Pom pholyx. Quæ ustionem experta non est, tumores & per sese, & cum myrto cohibet. Ventrĩs, stomachiq; fluctiones illita sistit. Muliebre pro fluuium, imo uentri, aut genitalibus imposita, mitigat. Panos discutit, nondum exulceratos, & tubercula. Turgentēs mammas suiq; lactis im patientes, cum aceto peruncta extinguit. Cum resina uero ambusta, & scabros unguēs aufert. Addito lentiscino oleo illita nocte tota, ruffat ca pillum. Elora, oculorum medicamentis, ut spodos adijcitur. Cicatrices, & eorum caligines eadem abstergit.

B A R B A R I C O R O L L.

V ini Fæx, græce Tryx uocatur, utiq; nõ usta, sicut usta Sphecle, quasi fæcula, interim Sphe dem pro fæce cruda quoq; Græci capiunt, ut Paulus. Fæci tanta uis est, ut descendentes in cu pas enecet. Experimentũ dimissa præbet lucerna, qđ diu extinguatur descensionis periculũ den uncians. Siccata recipit ignes, ac sine alimẽto perflagrat, cuius uis & natura quæ Nitro. Fæx cum expirauerit, lauandis corporibus, & uestibus est utilis. Fæx aceti pro materia acrior sit oportet. Vtriq; multum adijcit uirium crematio. Habet & suam sapa fæcem. Cratinus poëta comicus, hoc est, Tryga, pro uino quoq; accipit aliquando. Apud nos quoq; Fæculam, qui dixerit, pro uino meminisse uideor.

E X M. V E R G. C O M M.

S edimentũ uini, cum in dolio deferbuit, Fæx est: nota omnibus, & nisi in medicina uires ali quas habeat, homini penitus inutilis. Crude pariter & coctæ usus quondam fuit. Vocauit Fæ cem posterior græcoꝝ medicina etiam Pheclam. Copiosaq; in græcoꝝ medicis ea uox est, qua crematã priuatim significant. Eius non meminit Dioscorides, quoniã sua ætate nullũ erat forte adhuc id nomen. Illud humaniores literas profitentes nouisse, & obseruasse uolumus, quod a nobis dictum est. Vrendum recente est: ciuillime em efflata ui languet: eamq; ob causam dili gentissime operculanda; nec nisi uase aliquo clausa seruanda est: a Plinio breuius & apertius di ci, Celeriter exanimatur, non in cluso condita. In quo exanimandi uerbo usus, animam ad o mnem halitum, & ut Græci dicunt, ἀπὸ ψυχῆς, contrahit.

¶ De Calce.

C A P. CXXIII.

C A L X H O C modo fit. Marinorum buccinorum testas igni condito, aut feruenti clibano nocte dimittito: postera die si can didissima fuerit, extrahito. Sin aliter, iterum urito, usquedum uehe menter inalbuerit. Dein ubi in aquam frigidam immersa fuerit, in fictile nouum conficito, & exacte pannis operiens, noctem unam conquiesce

refinito. Mane eam extrahens, si ad intentum finem perducta est, recon-
dito. Fit & e glebis lapidum crematis, necnon e uili marmore: quæ ceteris præfertur. Vis omni Calci in commune ignea, mordens, adurens, & crustas inducens. Quibusdam alijs immista ut adipi, oleo, concoquendi uim assumit, & dissipat. Ulcera ad cicatricem perducit. Efficacior existimatur recens, nec aspersa aquis.

B A R B A R I C O R O L L.

CAlx uiua, id est, Asbestos. Differt ab ea Calce, quâ Græci Titanon appellant, ut spēs a genere: item a Maltha, quæ fit ex Calce recenti. Vino restinguit, mox tundit cum adipe suillo, et sicu duplici linamēto: quæ res omniū tenacissima, & duriciā lapidis antecedens. Quod malthatur, oleo perficitur ante. Galenus in Hippocrite, Maltham pro cera capit.

E X M. V E R G. C O M M.

Titanos inter uenena ab hoc ipso scriptore sequenti commentario nominatur, quæ hoc loco Asbestos ab eodem dicta est: specie tantū, ut aliqui crediderunt, diuersa: ut nos autē in græcis obseruauimus, solo architectorum usu: qui Titanon intellexisse uidentur, eam qua parietibus tectoria inducerentur. Et quoniam Gypso id aliquando fieret, Gypsum sæpenumero ea uox græcis etiam significat. Quinetiam *τιτανία θάι* uerbum illis inter cetera, Gypso inducto tegere & oblinire est. Verumtamen sola Calx utraq; appellatione illa indicatur. Quæ potuit ex diuersa materia, ut hic ait, facta, in architectura diuersos habere usus. In medicina tamen contra: in ueneni maleficio, utrumq; enim Calx præstat, nullum huiusmodi discrimen a natura accipit. Omnis enim Calx sine generis discrimine nocet, & prodest.

De Gypso.

CAP. CXXV.

GYPSVM VIM habet adstringendi, obstruendi. Sanguinis eruptiones, sudoresq; cohibet. Sed potum strangulat, quodam suffocationis modo.

B A R B A R I C O R O L L.

Gypsum, siue Gypsus, siue Spygos, ut Theophrastus quoq; noiat, plura habet gñā. Nam & coquitur e lapide, ut in Syria, & Phœnice, ac Thurijs. Et terra fodit, & quidē summa eius cutē, ut in Cypro. Copiosa itē Aetolia, circa Perœbiā, atq; Tymphem: a quo & Tymphaciū, siue Tympheticiū uocatur. Qui coquitur lapis, non dissimilis Alabastricæ esse debet, aut marmorifero. In Syria durissimos ad id eligūt, coquūtq; fimo bubulo, ut celerius urant. Optimū fieri comperit ex speculari lapide: qui & Diapahnes uocat, squamam uitalem habente. Gypso madido utendū est, quoniā celerrime coit. Inepta sit operi duricies: tamē rursus tundi, & in farinā resolui patitur. Natura Gypsi caloris in terendo tanti, ut rudiculis non manibus tractari possit. Tenacissimus ob id usus eius in albarijs sigillis ædificiorū & coronis gratissimus, & ad uaporaria conclauī apud nos, quæ Mappas ex nostra consuetudine uocamus. Græci pro Cymolia, uestibus poliendis, Tymphacio utebantur Gypso, Theophrasti ætate. Hinc Gypsati uenationis pedes, ut in Cymolia diceb. Est & in Gypso qd flos appellat, ueteres Chymistæ, Argentum uiuū, gelu astrictum, hoc est, spissatum, iam addensatumq;, Gypson uocabant.

E X M. V E R G. C O M M.

Cognata calci res Gypsum est. Plura numerantur eius genera, priuatimq; a Plinio libro 36. capite. 24. Poterunt uolentes ab eo singillatim omnia audire. Posteriores græcorū medici de uiribus eius certius docuerūt, siccare, & opplere Gypsum dicentes, & in compescendis sanguinis profluuijs cum farinæ polline, & oui albo usum eius esse. Cremari ut cetera Gypsum etiam, crematumq; opplendi uim amittere, sed in siccando efficacius fieri.

De Sarmenticio Cinere.

CAP. CXXVI.

Sarmentorum Cinis urendi uim habet. Cum axungia autē, uel acetō illitus, fractis neruis, articulorum collisionibus, & neruorum nodis prodest. Cum nitro & aceto excrescentias carnis in scroto reprimat. Serpentiū canumq; moribus illitus ex aceto medetur. Crustas obdu-

A

Pli. li. 36. ca. 24.

B

Pli. li. 36. ca. 24.

τίσσε αλυστήριον

D I O S C O R I D I S

Centibus medicamentis ammiscetur. Fit ex eo lixiuium contra præcipitationes, & fungorum uenena, cum aceto, sale, & melle.

Pli. li. 17, ca. 9.

B A R B A R I C O R O L L.
Cinis, Græce Conis, & Spodion, & Tephra dicitur, & Coloscertos poetice. Sed lixiuium Conia. Apud nos Lix: unde Lixiuui, & Lixiua, & ut Columella uocat Lixiua. Cinis foci uocatur: dictus forte, quia luxatis in potu proffit. Vnde Gladiatores cum delussissent, hac iuari potione uidebantur. Cineri omni uim astrictoriam inesse, Dioscorides uoluit. Negat id Galenus: utiq; siculneo. Ipsum quoq; uinum, quod anteq; prælo pressum sit, aut nimium calcatae uix in lacum musti fluxerit, Lixiuum, aut Lixiuum mustum appellatur, a Græcis uero Prochyma. Nam & Protofactum inuenio apud Paulum. Sed pro cinere Lixiuo, qui primus distillauerit, ut coniectura capio. Calidum cinerem Hippocrates Marilem appellauit.

¶ De Alcyonio.

C A P. CXXVII.

Ἀλκυονίδων

Alcyoni quinq; esse genera, compertum est. Vnum enim spissum, acerbis saporis, spongiosa facie. Item tetri odoris, ponderosum, & piscem olens, quod plerūq; in littoribus inuenitur. Alterū pinnulae oculorū, aut spongiæ simile, fistulosum, & læue, odorē algæ referens. Tertium uermiculiforma, & colore, magis purpureum, quod Milesium uocant. Quartum succidis uelleribus non dissimile, spongiosum, læue. Quintū figura fungi, sine odore, asperum, parte interna quodammodo pumicosum, foris læue, acre. Quod plurimum in Propontide iuxta insulam Besbicon appellatam gignitur. Patrio nomine Halos achnen uocāt. **D**uo priora, in fœminarū smegmata assumuntur. Contra lentigines, lepras, uirilignes, nigricias, & maculas in facie reliquoq; corpore. Tertium ijs qui difficili urina uexantur, aut harenulas in uesica colligūt, idoneum est. Item renibus affectis, aquæ inter cutem, leni. Vstum autem, & ex uirgino illitum, alopecias replet. Postremum dealbandis dentibus aptum est. In alia absterforia, psiloraq; assumitur cum sale mistum. Si quisquam Alcyonium cremare uelit, in crudum fictile mittat: & oblinens uasis spiraculum luto, ita fornaci mandet: & cum figlinum percoquetur: extrahens ad usus recondat. Lauatur ut Cadmia.

Pli. li. 32, ca. 5.

B A R B A R I C O R O L L.
Fit in mari Alcyonium ex nidis, ut aliqui existimāt Cæicum & Alcyonium: quas nostri Alcedonas uocant, quasi Algedonas, ab Algore, ut alij, e sordibus Spumarum crassescitibus, alij e limo, uel quadam maris lanugine. Quo candidius, hoc minus probabile. Dioscorides quinq; genera dinumerat. Plinius quatuor. Primum quale Dioscorides. Secundum molle, lenius, odore fere algæ. Tertium candidioris uermiculi. Quartū pumici & spongiæ putri simile, pene purpureum: quod optimum; hoc & Milesium uocatur.

E X M. V E R G. C O M M.

Non ausim ego nunc censere, an quæ in antiquis græcorū & latinorum poetis, discendentibus a se mari, aut eodem elemento ad se reuerfuris coniugibus, & amoribus suis Halcyonios precabantur dies amicæ & uxores, bona fide pro salute eorū uota, precesq; conciperent: An utliceret illis per brumam septem diebus, tranquillo mari, ad nitorem læuorēq; cutis Halcyonium tuto expiscari. Mala enim mulieris mens, & ad nouas uoluptates sedulus animus, conciliandis nouis amoribus continue studet: gaudetq; aliud agere credita, quibus subinde placeat formæ suæ lenocinio quærere. Id certe uerisimile est, & facile credat aliquis: Halcyonium, quo quotidie ad uultus decorem uterentur, certius q̃ Halcyonios dies nouisse forminas: relictaq; uiris tota maris & nauigationis obseruatione, unde speciem suam augerent diligentius curasse; neq; ex fabulosa Ceycis, & Halcyones historia aliud, q̃ Halcyonium nouisse lenocinio for-

ma nascens in mari rem: siue ex Halcyonum nidis reliquæ, siue crassæcentes spumant for-
des, siue limus & maris lanugo quædam id sit, Nomen illi Halcyones marinæ aues fecerunt,
haud sane quia ex earum nidis Halcyonium mari innatet, sed quia ex eo mari innatanti & flui-
tanti Halcyones aues nidos sibi ad forturam faciant. Prius enim Halcyonum nidis spuma &
lanugo illa maris est: tum ex ea Halcyonum nidi: & quoniam Halcyonibus ad forturam infer-
uiat, Halcyonium dictum est. Discrepat in generum numero ab hoc scriptore Plinius: ille qua-
tuor, hic quinque genera eius facit, nec iisdem notis ambo quocumque ea sint indicant. Quodque
a Plinio non numeratur, quintum illud nobis uidetur fungorum figura, sine odore, & asperum.
Poterunt id certius uolentes in Plinio uidere lib. 32, capite. 5.

De Adarce.

CAP. CXXVIII.

FIt in Cappadocia quod Adarces appellatur. Est autem concreta sal-
silago, humidis & palustribus locis siccitate emergens, & harun-
dinibus ac hærbis agglutinata, colore flori lapidis Asiatici similis, &
omni forma molli Alcyonio, & aliquantum cauo proxima, tanquam lacu-
stre Alcyonium esset. Ad euellendas lepras, lentigenes, lichenas, & ui-
cia cutis in facie accomodatur. Et in summa, uis ei acris. Humorẽ euo-
cat, qui in aliqua parte concreuit & ischiadicis prodest.

BARBRAI COROLL.

ADarca, & Adarcion, & Adarces, & Adarcos dicitur. Item Calamochnus, id est, calami
lanugo. Plinius latinum Adarcæ nomen putauit, in Italia nascentis circa tenues harundines,
hoc est, in cortice calamorum, sub ipsa coma, e spuma aquæ dulcis ac marinæ, ubi se miscent.

EX M. VERG. COMM.

Calamochnum, id est, harundinum lanuginem Adarcem hunc in græcis aliqui nominaue-
runt: factum, quia in harundinibus concretæ lanuginis modo inuenitur, illi hoc nomine. Credi-
musque nos, non excusandi lapsus Plinio occasione eam dedisse uocem. Is enim quod ante nos
alij etiam deprehenderunt, lib. 16, capite. 37, inter harundines Adarcem his uerbis numerat.
Est & in Italia nascentis Adarca nomine palustris, &c. Tum cum totâ fere naturâ percurrisset,
ageretque de aquatilibus, 32, capite. 6, inquit. Inter aquatilia dici debet & Calamochnus, latine
Adarca appellata. Nascentem circa harundines tenues, spuma aquæ dulcis, & marinæ, ubi se mis-
cent. Plura sunt duobus his locis eius scriptoris errata. Primum, quod plantâ cum hærente & ad-
nata illi spuma miscet, confunditque rei intellectum: tum quod Adarcem latinâ uocem esse affirmat,
cum græci passim pro sua ante latinos usi ea fuerint: mox in Italia nasci, contra Dioscoridis, &
aliorum omnium decreta. Barbarus etiam hoc capite quod Diosco. περι πηγνύμενος καλόμενος καὶ
χρηταρίσις ait, monetque condescere Adarcem in harundinibus, & herbarum cremis, farraginẽ
dixit, contra rei rusticæ auctores omnes, farraginis uoce in ea re usus. Habet enim farrago cet-
tæ rei in pecoris pabulo significationem: ut certius illi docuerunt.

De Spongijs.

CAP. CXXIX.

Spongijs alias mares appellauere, tenui fistula, spissas, quartum
duriores Tragos nominarunt. Fœminas autem, quæ contrariis
as dotes habent. Vruntur eæ ut Alcyonium. Recentes sine pinguitu-
dine uulnerariæ sunt, & tumores reprimunt. Recentia uulnera ex aqua
poscaue conglutinant. Veteres sinus ex decocto melle iungunt. Vetus-
tæ autem inutiles. Aridæ & ligatæ lino, si penicilli modo adigantur,
occlusa ulcera, callosque laxant. Recentes & uacuae senilia ulcera, & quæ
fluctatione laborant, aut cuniculatim exedunt, imposito siccant. Sanguis-
nis profluuium sistunt. Crematarum cinis ex aceto, aridæ lippitudini
auxiliatur. Et ubi quid abstergere, aut adstringere opus est. Vtilius,
KK

D I O S C O R I D I S

C in oculorum medicamentis lauare cinerem. Omnium cinis cum pice crematarum, profluentem sanguinem sistit. Candidæ cura fiunt, e molli-
lissimis recentes, per æstus tinctæ salis spuma, quæ petris coheret. Inso-
lantur inuersæ, hoc est, parte caua sursum spectante; et qua adhærere, de-
orsum. Si uero æstiuâ serenitate ad lunam sternantur, perfusæ salis spū-
ma, aut maris aqua, maximum candorem referent.

Pl. II. 9. ca. 35
lib. II. cap. II.

B A R B A R I C O R O L L.

Spongia, græce spongos appellatur, itemq; Spongia, ut dicunt Attice. Inter Zoöphyta, hoc
est, quæ nec animalium, nec fruticum naturam, sed tertiam ex utroq; sortiantur. Nascuntur oēs
in petris. Aluntur conchis, pisce, limo. Vbi auulforem sensere, contrahunt se, ac multo diffi-
lius uelluntur, exprimentes abundantiam humoris, abscessu uero sanie emittentes. Circa Toro-
nem, ut inquit Aristoteles, uelci conchis minoris intra eas repertis cōstitit, auulsasq; aiunt, & ex
relictis radicibus recrescere. In petris cruoris quoq; inhæret color, Africis picipue, quæ generant
in syrtibus. Maximæ fiunt Mauca, sed mollissimi circa Lyciam penicilli: in pfundo autem nec
uentoso molliores, unde ablatae sint spongiæ. In Hellesponto circa Maleam uero aspe ac densæ,
putrescunt in apricis: ideo optime in gurgitibus. Viuētes, madētesq;, ac illotæ, nigricant. Adhæ-
rent nec parte, nec toro. Interfunt em fistulæ quædam inanes, quaternæ fere, aut quinæ, per quas
pasci existimantur. Item aliæ, sed superne concretæ: & subesse membrana quædam radicibus earū
intelligitur. Viuunt longo tempore. Pessimæ sunt Aplysæ, quia erui nō possunt, in qbus maxi-
mæ sunt fistulæ, & reliqua densitas spissa. Ceterū aliter discernere genera. Earum qdam tria faciē-
do. Spissum ac predurū & asperū, qd Tragos, idest, Hirculus uocetur. Alterum spissum & mol-
lius, quod Imauos. Tertium tenue, densumq; Achilleū, inuentu rarū. Hoc galeis & ocreis infe-
ritur, ne strepitum gestatu cieant. Ex eo peniculi fiunt. Medici inscitia, ad duo eas genera rede-
gere. Africanas, quartū firmitus sit robur. Rhodiacas, quæ ad fouendū molliores. Nunc aut mol-
lissimæ circa Lyciæ urbis Aniphelli muros inueniuntur. Mares quæ dicuntur perforbent, tingū-
turq; in delicijs aliquando & purpura. Fœminis fistulæ maiores, ac perpetuæ: Tragus tenuissimæ
ac densissimæ. Ab aquilone genitas ceteris præferunt. Nec usq; diutius durare spiritum medici,
q; in Spongijs affirmant. Sic & prodesse corporibus, quia nostro suum misceant. Hoc genus re
medij Apōspongismō Archigenes, & secuti eū medici appellant. Quia uero de peniculis dixi-
mus, scire oportet, nō Spongijs mō, sed & e codis q;q; seras, Penicillos a ueteribus esse nomina-
ros, quibus calciamenta tergebant: ob id & Tergenteas uocabant eas aliq; nos uulgo Setulas.
Est em penis, idem qd cauda. Vnde Penita ossa, obsemen carnis porcinæ cū coda significat.

E X M. V E R G. C O M M.

Tertium habet in natura Spongiæ ordinem nec frutices, nec animalia, sed inter utrūq; hoc
genus medium quiddam, in quo mixta simul animalis, & plantæ natura est, Zoöphyta græci
omnia appellant. Pluribus locis in mari nascentes, diuersisq; nominibus ab antiquis distinctæ:
quoniam non una sit earum forma, bonitas, & usus. Hic quod ad faciendam ex eis homini me-
dicinam pertineat, satis hoc capite tradidit. Quod autem ad historiam, certius Aristoteles libro
quinto de animalium historia, a quo accepta omnia Plinius lib. 9. primum capite. 35. tum. 31. ca-
pite undecimo hīdem retulit uerbis. Quæ a Barbaro in Corollario suo etiam collecta, sine desy-
derio legentium a nobis relinquuntur. Quomodo autem uulnerariæ Spongiæ sint, manifeste
docuit eodem loco Plinius, dicens. Fracturæ, & uulnera spongijs utilissime fouent. Sanguis ra-
pitur in secando, ut curatio perspici possit: & ipsæ uulnerum inflammationibus imponuntur.
Multaq; alia, quæ idem scriptor & ali in uulnerum curationibus tradiderunt. Quod dictum a
nobis est: ut scirent legentes aliter uulnerarias esse Spongijs, q; plura alia sint quæ toto hoc ope-
re a Dioscoride τραυματικά, id est, uulneraria dicuntur.

De Corallio. C A P. CXXX.

καρδαμύνη

Corallium, quod aliqui Lithodendron appellarunt, marinum ef-
fice fruticem constat, qui imo extractus duratur statim, atq; emer-
git, tanq; offuso ære protinus concrescat. Plurimum inuenitur Syracu-
lis, in promontorio cui Pachino nomen est. Laudatissimum rubens, co-

lore Hastulæ regiae, aut Sandycis meri, nec secus terenti facile cedens, A
æquabili usquequaq; cōcremento, rursus algæ, aut fuci marini odore,
q̄ ramo fissimum, cinnamomi æmulum, forma fruticis. Quod autem
in lapidis duriciam cōit, scrupulosum, inane, & lacunosum, uitiosum
existimatur. Adstringit & mediocriter refrigerat. Excrecentia cōercet.
Oculorū cicatrices abstergit. Vlcera caua, & cicatrices explet. Con-
tra sanguinis reiectiones magnopere efficax est. Vrinæ difficultati au-
xiliatur. Quin & potum ex aqua lienem absumit.

B A R B A R I C O R O L L.

Q Vantum apud nos Indicis margaritis precium, tantum apud Indos Corallio. Gignitur
& in rubro mari. Sed nigrius. Item in Persico uocatur lace. Laudatissimum in Galli
eo sinu circa Orchadas: & in Siculo circa Heliam, & Drepanum. Nascitur & apud Grauiscas
in Italia, & ante Corniculum, & Neapolin Campaniæ, maximeq; tubensis: sed molle, & ideo ui-
lissimum Erythris. Color sub aqua uiridis. Baccæ eius candidæ ac molles. Extra rubescunt,
induranturq; ceu corna satiuæ magnitudine ac specie. Aiunt tactu protinus lapidescere si ui-
uat. Itaq; occupari, euelliq; retibus, aut acri ferramento præcidi, a quo & Corallio, quasi cu-
rallio ἀπὸ τοῦ κορυλλῶος nomen inditum: nec aliter sane Theophrastus, q̄ Curallium appellat, a ra-
dendo scilicet: ob id & Gorgonia quoq; dictum putatur: itemq; Dendritin, hoc est arboreum.
Probant q̄ maxime rubens, & q̄ ramosissimū. Damnant inane, aut concauū. Auctoritas Bac-
carum Indis, utroq; sexu preciosa. Religiosum etiā id gestamen Haruspices eorū, uatesq; in pri-
mis habent, priusq; hæc notescerent. Galli gladios, scuta, galeas adornabant Corallio: postea
Indis Vniones suas pro Corallio mutantibus, in penuria esse cœpit. Surculi eius infantie ad
alligati, tutelam habere creduntur. Ignibus diu repugnant. Est & lapis Corallius, uel ut qdam
scribunt Colaris, multū a Corallio diuersus, Pyrites s quibusdam appellatus: quoniā sit pluri-
mus ignis illi. Sed est alius etiamnum Pyrites, in mentionē suam seruandus. Qualis porro la-
pis Erythros, hoc est, rubens, ab Hippocrate significetur, quo mulieres inquit explorantur, an
sint prægnantes, nisi aut Corallium sit, aut Pyrites, aut etiā Hæmarites, affirmare nihil habeo.

Pli. li. 32. ca. 1.

E X M. V E R G. C O M M.

C Rescit arboris modo, & in duriciem lapidis duratur in mari Corallium. Nota nunc res
omnibus, sed in nullo fere honore, si antiqua repetatur eius gratia, qua preciosissimis in natura
gemis prælatum in gentibus aliquibus diu fuit. Siccandi, & mediocriter repurgandi uim illi
ueteres græcorum medici tribuerunt: ideoq; cruentis sputis, ut illi etiā tradiderunt, utile.

¶ De Antipathe.

C A P. CXXXI.

Q Vod Antipathes uocāt, Corallium esse arbitrantur, specie tan-
tum distans. Est autem colore nigro, arboris figura, ramosum
magis. Vires supradicti habet.

ἀντιπαθῆς

B A R B A R I C O R O L L.

A Ntipathes, pro genere Corallij, quale sit in Plinio, haud facile docuerim: nisi quis intelli-
gat fruticem circa Troglodytarum insulas, nascentē in alto, quē Isidos Plocamon uocari tra-
dit, Corallio similem, sine folijs sentiri eum, se capi, durariq; colore in nigrum, cum cadat fran-
gi, Theophrastus Corallij duo uidetur statuere fastigia. Vnum quod rubens, rotundumq; est,
ut Radicula in mari nascens. Alterum huic nō multū dissimile: quod Calamus inquit uocatur
Indicus: qui duratur in silicem. Plinius inter gēmas enumerat Corallida, minio similē: quæ in
India, Syenecq; gignatur. Fortasse per Theophrasti tēpora, minus erat Corallij uulgatus usus.

Pli. li. 37. ca. 10

¶ De Phrygio lapide.

C A P. CXXXII.

P Hrygius lapis quo infectores in Phrygia utuntur, a qua nomen
accepit. Nascitur in Cappadocia. Optimus habetur pallidus,
modice grauis, inæquali compage corporis, intercedentibus albis seg-
mentis, ut in Cadmia. Vritur autem uino optimo perfusus, uiuisq; car-

λίθος φρυγίου

KK ἦ

D I O S C O R I D I S

C bonibus obrutus perflatur assidue follibus, donec mutato colore ruffescat. Rursus eodem uino restinguitur. Hoc iterum & tertio faciendum. Attendendum tamen, ne minutim confringatur, et in fuliginem euanescat. Vis crudo uisq; adstrictoria, expurgans. Vlcerebus crustas quadamtenus inducit. Ambustis cum cerato medetur. Lauatur ut Cadmia.

BARBARI COROLL.
Pli. li. 36. ca. 19 **L**apis Phrygius, gleba est pumicosa, Plinius medicinæ utilem negauit.

EX M. VERG. COMM.
Gentis nomen habet Phrygius lapis, pumicosa, ut Plinius ait, gleba: Italiae semper peregrinus, nunc autem nulli cognitus: & ex eo, quod præcipuum habere fertur, in nullo nostra ætate usu.

De Asio lapide. CAP. CXXXIII.

Asius lapis assumi debet pumicosus, leuis, fungosus, item friabilis, scissiles uenas melini coloris ad imum actas habens. Eius flos, falsugo subflaua est, summo lapide insidens, compagine tenui, colore in aliquibus albo, in alijs pumici simili, ad luteum uergens. Admotus lingua aliquantum mordet. Vim habet uterq; adstrictoriam, et modice erodentem. Ammistus liquidæ pici, aut terebinthinæ, tubercula discutit. Longe ualidior flos existimatur. Cæterum siccatus flos, uetera ulcera et cicatrici repugnantia sanat. Excrecentia cohibet. Tetra ulcera & fungis similia, cum melle expurgat. Vlcerebus caua explet, depascentiaq; cum cerato sistit. Fit cataplasma ex eo podagris, misto fabæ lomento, & lieno sis ex aceto & calce. Prodest phthysicis linctus. Podagrici iuuantur pedibus in solio, ex eo lapide excauato inditis. Fiunt quoq; oculi, qui corpora erodunt, & luxuriantem carnem, & corporum crassiciem absumunt, uice nitri in balneo. Si lauare libet, cadmiæ modo lauatur.

BARBARI COROLL.
Pli. li. 36. ca. 17 **A**sus, et Asia petra dicitur. Est et Assius per duplex, scilicet ab Asio Troadis, ut inquit Plinius. Sed ab Asio diuersus. Ille Sarcophagos quoq; nominatur, ab effectu: qualis & in Lycia, & in Oriente habetur. Et in Mysia quoq; inueniri eum Stephanus affirmat. At nos hic per simplex, scilicet fere scribitur ab autoribus, gustu falsus. Corpora defunctorum condita Sarcophago, consumi intra 40. diem, sed illata quoq; mortuis, lapidea fieri traduntur. In Oriente adalligata uiuentibus erodunt ea.

EX M. VERG. COMM.
Longe breuius quam hic cæteri graecorum medici lapidis Asii, florisque eius uires tradiderunt: ex tenuare quidem, sed sine erosione dicentes. Eamq; ob causam humentes & flaccidas carnes absumere una *πλάκων σαρκῶν* uoce complexi, quæ tam multa singillatim a Dioscoridis numerantur.

De Pyrite lapide. CAP. CXXXIII.

Pyrites lapidis genus est, a quo æs extrahitur. Eligi debet æris similitudine, facile scintillas ædens. Vritur sic. Melle irrigatus molli pruna continuo flatur follibus, donec ruffescat. Alij in carbones igni candentes, lapidem melle perfusum deijciunt, & ubi ad fuluum colorem uergere coeperit, extrahunt. Efflatoq; cinere, rursus madefactum cremant, donec æquabili tenore assiccatus, friabilis reddatur. Si quidem sæpe facies summa solum uritur. Ita crematus, siccatusq; reconditur. Si ex toto opus sit, lauari debet ut cadmia. Tam crudi, quam uisti uis est ex calfa-

cere, abstergere, offusam oculis caliginem expurgare, duricias conco- **A**
 quere, & concoctas discutere. Resina exceptus excreſcentia in carne
 cohibet, sed calorem quendam & adſtrictionem parit. Ita uſtum non
 nulli Diphryges appellant.

PBARBARICOROLL.

PYrites, ſunt qui & Sideriten uocent, & Androdamantra, & Boſtrychiten. In Cypro rep- **Pli, li. 36. ca. 19.**
 riri uolunt, & in metallis, quæ ſunt circa Acamaniam. Vnum argenteo colore, qui & Argyri-
 tis a Democrito cognominatus uidetur. Alterum aureo. Aliqui tertium genus faciunt, quod
 plurimum ignis habeat, ponderoſiſſimumq; ſit: quos & uiuos appellamus. Hi exploratori-
 bus caſtrorum maxime neceſſarii: quia clauo, alteroue lapide percuſſis, excutuntur ſcintillæ,
 quæ ſulphure exceptæ, aut fungis aridis, aut folijs celerrime ignem trahunt. Pyrites & gemma
 eſt, nec ſcio an diuerſa ab hac. Nigram eſſe inuenio, & attritu digitos urentem. Pro Pyrite, in
 medicinas uenit Mylios, ſiue Mylitis, Cochlax appellatus, hoc eſt, molarius, inſula Niſyro plu-
 rimus, ab Hippocrate Lapis niger, ut Galeno placet. Mylias ab Theophrasto & Heliano, ex
 Aethna monte fluens, luti nigri modo in Sicilia, poſt dureſcens colore cuſtodito. Fluunt & Py-
 romachi dicti, ut idem Theophrastus ait.

EX M. VERG. COM M.

Igniarium fuit quondam, quemadmodum & nunc etiam eſt Pyrites lapis. Factumq; illi ab
 igne nomen, haud ſane quia caleat, aut ignis modo fulgeat, ſed q; inuicē attritus, aut ferramen-
 to aliquo percuſſus, ignis modo igneas ſcintillas ex ſe mittit. Dico aut igniarium, quodcunq;
 ad inſtaurandum nouum ignem homines excogitarunt, Semina ſiquando heſternæ male con-
 dita flammæ, Vt prima ſub luce ſolet cineſacta, periſſent. Habent, præſtantq; id uulgares lapi-
 des omnes, ſed omnium maxime qui duriffimi & metallici ſunt: qualis Pyrites hic eſt, cuius ab
 hac poteſtate bonitas probatur. Antepoſuit enim hic cæteris eum qui concolor æri eſt, & qui
 facillime, & quantum uoluerit aliquis leui pulſu ſcintillas ignis aget. Quod ideo adiectum illi
 a Dioſco. eſt, quoniâ plura ad inſtarandum nouum ignem lapidis huius genera & bonitates
 ſunt. Quæ ex eadem ignis poteſtate & natura eodem nomine omnia tunc cenſebantur. Egit
 de his Plinius libro. 36. capite. 19. plures & ipſe Pyrites numerans lapides: & inter eos genus **B**
 unum faciens plurimum habentium ignem, quos uiuos tunc uocabant, ponderoſiſſimos: qui
 bus exploratores in caſtris uterentur: quoniam clauo, uel altero lapide percuſſi, ſcintillas ſta-
 tim ederent: quæ ſulphure exceptæ, aut fungis aridis, uel folijs, dicto celerius ignem traherēt.
 Quos Maro etiam feliciffime in primo ſuæ Aeneidos deſcripſit dicens. Ac primū ſilicis ſcintil-
 lam excudit Achates, Succipitq; ignem folijs, atq; arida circum Nutrimenta dedit, rapuitq; in
 fomite flammam. Validiſſimum in diſcutiendis tumoribus, concretionibusq; Pyritem lapi-
 dem hunc ueteres græcorum medici dixerunt. Contra duricies, quas Scirros ea gens uocat
 utentes, cremato primum, mox acerrimo acetō reſtincto. Nec minus contra concretum in gru-
 mos puerperarum lac.

De Hæmatide lapide. CAP. CXXXV.

Hæmatites optimus habetur friabilis, puro colore niger, durus **hæmatitis**
 in ſe, & æqualis, nulla ſorde ammiſta, nulloq; zonarum diſcur-
 ſu. Vim habet adſtringentem, & excaſtoriam aliquantum. Oculorū
 cicatrices & ſcabriciam cum melle purgat. Cum lacte aut muliebri, lip-
 pitudini, colluſionibus, & oculis cruore ſuffuſis conuenit. Bibitur con-
 tra difficultatē urinae, & fluſtiones mulierū in uino, & ab ijs qui ſan-
 guinem reiecerunt, cum ſucco punici malī. Fiunt ex eo cotes & colly-
 ria oculorū uitij apta. Vritur ut Phrygius, uino tantū ſubtractio. Mo-
 dus uſtionis eſt, ut modice leuis fiat, & bullis quibuſdam inturgeſcat.
 Sunt qui Hæmatiten ita adulterant. Denſam glebā rotundamq; ſchiſti
 lapidis, cuiuſmodi ſunt quæ radices uocantur, uafe figlini operis, quod

D I O S C O R I D I S

C feruentem cinerem contineat, condūt, paucaq; interiecta mora eximūt, experiunturq; si trita ad cotem Hæmatitæ colorem reddat: q; si ita res se habet, reponunt: sin minus, iterū obruūt, & subinde conspiciētes per iculum faciunt. Siquidem in cinere diu dimissus, colore mutato dissipatur. Coarguitur male confictus, scissilibus uenis. Quippe in rectos uenarum discursus refringitur, & longe secus se in colore habet. Namq; floridū reddit, Hæmatites uero sanguineum atq; Cinnabarin imitantem, inuenitur in sinopico minio. Fit & e magnete lapide, uehementer am- busto. In Aegypto sponte naturæ cum metallis effascitur.

B A R B A R I C O R O L L
 Pli. li. 36. ca. 20 **H**æmatites reperitur in metallis. Vltus Minij colorem imitatur. Adulterant Schisto: sed distinguūt uenæ rubentes. Est & Magnetis genus unum Hæmatites appellatum. Præter hoc q; genera Hæmatitarum traduntur. Æthiopicum, cui & principatus datur. Alterum Andro- damanta uocant, colore nigro, pondere ac duricia insignem: & inde nomen, præcipueq; in A- frica. Trahere autem in se argentum, æs, ferrum. Experimētum eius esse, in cote ex lapide Bafa- nite. Reddere enim succum sanguineum. Tertium genus Arabici, uix reddentis succum san- guineum. Tertium genus Arabici, uix reddentis succum ad cotem aquariam, aliquando cro- co similem, pari duricia cum secundo. Quarti generis Helatites uocatur, q; diu crudus sit. Co- ctus uero Milites, aut etiam Militēs, ad omnia utilior q; Rubrica. Quartum ijs adjicitur Schi- stos, de quo proūus mox agitur.

E X M V E R G C O M M.
 C Ruento sanguinis colore cōspicitur Hæmatites; & inde illi nomē. Plura eius gñā numerat Plinius li. 36. ca. 20. oīa Italiæ peregrina, ut ex eorū nominibus cōjicere licet. Idem bonitatis oīm notas eodē loco docet: multaq; alia, quæ uidisse in eo inutile nō fuerit. Vtilis medicinæ & inter uitæ remedia qñdam lapis hic fuit: medebaturq; inter cætera oculis. In quorum usum fiebat ex eo collyria, ut hic ait, & Aconia: quæ a cotibus, quas græci aconas dicunt, dicta in Hebeno pī- mo uolumine certius descripta a nobis fuerunt.

D De Shisto lapide. **C A P. CXXXVI.**
 Schistos lapis in Iberia Hispaniæ contermina gignitur. Probatur maxime, qui croci colorem æmulatur, friabilis, suapte natura fissi- lis, concremento & serie cohærentium uenarum, Ammoniaco sali simi- lis. Vim exhibet Hæmatitæ, sed ad omnia infirmiolem. Quin & caua replet, muliebri lacte perfusus. Ad procidentia, rupta, item genarū cras- siciem, & uuas oculorum, magnopere efficax est.

B A R B A R I C O R O L L.
 Pli. li. 36. ca. 20 **L**apis Schistos cognitionē cum Hæmatite habet, sed peculiare in Schisto, q; splendet. Est & Schistos alterius omnino generis q; Hæmatites, quem cognominant Anthracitū, nasci tra- dentes in Africa nigrū: qui attritus reddat aquarijs cotibus ab ea parte quæ fuerit ab radice, ni- grum colorē, ab altera parte croci. Sunt & gemmæ plures hoc nomine carbunculi: quarum a- liæ preciosæ sunt, alia uiliores, ut quæ nascuntur in Græcia: Theophrastus autor, ac Plinius.

E X M V E R G C O M M.
 Q Valis habitu, concretioneq; sua lapis hic sit, nomen, sed longe certius hic scriptor osien- dit. Illud a scissili crustarum eius diuisione factum est: hic Hammoniaco sali com- parans, certissima nota totam speciem eius indicauit. Plures in græcis Hæmatitæ congenerem Schistum hunc lapidem fecerunt. Soracus tamen ex antiquissimis scriptoribus, alterius gene- ris tradidit. Plinius duplicem colorē illi tribuit, ab altera parte nigrum, ab altera croceum. Vo- cariq; a carbonum nigro colore Anthracitem: hic tamen simpliciter *κροκίον*, id est, croci co- lore esse dixit. Nosq; ad certiorē coloris eius intellectū, luteū addidimus. Vtilē oculorū medica- mētis tm Plin. Schistū lapidē hūc testatur ē. Ideoq; nos credimus, quæ multa numerata a Diosc, mala hoc capite sunt, cōcaua, rupta, pēldētia, crassas palpebras, & uuas, oīa ad oculos pūnere:

De Gagate lapide.

CAP. CXXXVII.

A

IN Gagatarum lapidum genere præferendus qui celeriter accenditur, & odorem bituminis reddit. Niger est cōmuni ex parte, squalidus, crustosus, perçq̃ leuis. Vis ei molliendi & discutiendi. Deprehendit fonticum morbum suffitus. Recreatq̃ uulua strangulationes. Fugat serpentes nidore. Podagricis medicaminibus, & acopis additur. In Cilicia nasci solet, qui influens amnis in mare effunditur, proxime oppidum quod Plagiopolis dicitur. Vocatur autem & locus & amnis Gagas, in cuius faucibus n̄ lapides inueniuntur.

Gagatē aiunt & in Leuco Pamphylia (ut arbitror) promontorio, aut Lycia, ppe Cyprū in insulā, expelli mari, atq̃ infra duodecim stadia colligi. Solinus & in Britania Gagatē gigni tradidit. Planus est, pumicosusq̃, nō multum a ligno differens, fragilis odore, si teratur grauis. Ficilia ex eo inscripta nō delentur. Accenditur aqua, oleo restinguitur. Deprehendere dicitur uirgines suffitu. Hoc & magi utunt̃ in ea quā a securis argumento uocant Axinomanciam: peruri eū negantes, si euenturū sit, quod quisq̃ optet. Dicitur a fluuio in Lycia cognominē, Diosco. affirmat. Nullum se Galenus in Lycia cōperisse tradit amnē, qui Gages, aut Gagates uocetur. Photion grāmaticus, oppidū in Lycia fuisse Gagas a Rhodis conditū scribit. Plinius Rhodiopolin a Gagis diuersam facit. Stephanus Gagas oppidū in Lycia fuisse, qd̃ Paleontichos ante diceret. Crustaceos uero lapides, atq̃ nigros, & q̃ in ignē additi exilem flāmam ederent, bituminis odore in Syria Coele inuētos sibi meminit, in collibus mari mortuo circūdatis ad orientē solē spectantibus: ubi & Bitumē q̃q̃ nascit̃: utilissimos tumoribus in genu diuturnis.

Pli. li. 36. ca. 19

EX M. VERG. COMM.

Qui Gagatem statim sequitur Thracius lapis, a Diosco. & ab alijs dictus Gagate eadem oia posse, miscendi simul utriusq̃ noras & euentus Plinio causam dedit, tradendiq̃ libro. 35. capite. 19. Accendi aqua, oleoq̃ restingui: qd̃ non Gagatē, sed Thracio lapidi Nicander in Theriacis suis, & hic in lapidum historia aperte tribuerunt. Nicandri de utroq̃ uersiculi sunt, primumq̃ de Gagatē. ἄλλοτε δ' ἀσάλην καὶ ὡν ἰσχυρὴν πύρην, ἢ ἐν δὲ μάλοισι πυρὸς περικύβηται ὀρνύ. Quorū sensus est. Aliquando aut Gagatem siccū lapidē urens, quē ualidi ignis impetus non domat. Accendi quidē igne Gagatem Nicander ait: non tamē ut cetera eo absūm̃, sed in urendo bituminis odorem tantum sentiri. Paulo deinde post de Thracio agens, inquit. ἢ ἰσχυρὴ θρηάσαν ἐν φλέγῃ πυρὶ λαὸν ἢ θ' ἰσχυρὴ βρεχθῆσα σιλάσεται ἰσχυρῇ αὐτὴν τυτθὸν ὅτ' ὀδυνητοὶ ἐπιβάντες ἰσχυρὸν, τὴν ἀπὸ θρηάσιον νοκίῃ ποταμῷ φέρονται, ὅν πόντον καλῶναι. Quorū sensus est. Aut Threiciū in igne lapidē urens, qui aqua resperfus flāmas agit. Extinguitur aut exiguō insperfo oleo. Lapidē hunc a Thracio flumine pastores quē Pontum nominant afferunt: quē totā est in scriptore hoc Thraci, non Gagatē lapidis historia. Plinius aut quo diximus loco de Gagatē inquit. Mirumq̃ accenditur aqua, restinguitur oleo. Quod, ut præmonstrauimus, in Nicandro, & ut mox in scriptore hoc in Thracio lapide patebit, nō Gagatē, sed Thracio cōpetit. Diximus nos comitales suffitu deprehendere Gagatē, quos hic ἰσχυρὴν πύρην palā nominauit. Ceteri interpres acceptā ex Plinio uocē, fonticū morbū deprehendi eo dixerunt: cōiure mali illius indicatione q̃ nunc forte oporteat usi. Alter etiā comunem secutus lectionē, in Cilicia nasci Gagatem ait: cum ex Geographis, Plinio, melioribusq̃ græcis in Lycia uertendum fuerit.

De lapide Thracia.

CAP. CXXXVIII.

B

Lapis Thracias dictus, nascitur in flumine quodam Scythia, cui Ponto nomen est. Vis ei Gagatē. Traditur aqua accendi, & oleo restringui. Quod in bitumine accidit.

It lapis Thracias, qui exemplaribus Plinij quibusdam Meiulla dicitur, trium generum, uiri dis, pallidē, sanguineis guttis. Non habeo certum proferre. Nomen gentis sug habet, ut cecinit Nicander: quemadmodum & Cappadoces in Argæo Cappadocię nascentes, simili cum prioribus natura, qui & in lacteum cremorē soluātur, ut Galenus & Paulus ægineta scribunt: qui & Ageroton lapidem cōmemorant, astrictoriam, & discussoriam uim habentem, & gutturis inflammationibus auxiliare: quo sutores uti soleant ad dandum calceis nitorem. Præter-

Pli. li. 37. ca. 10

KK iij

D I O S C O R I D I S

Cea & Hieracitin, ut Diogenes scriptū reliquit, subuirdem ex atro coloribus itē alijs respersum, quē qui gesset, mulsæ non infestent. Hunc literis quibusdā inscriptis, contra sanguinis eruptiones ualere perhibent. Addiderūt ijs & Indicū, subruiffum colore, attrituq; succo purpureo manantē, nec ualido, nec denso corpore. Inuenio & Perdicitin, siue Perdiciatin, et aliū a sorbi similitudine, ut uirū cognomēto Scythiciū, ad oēs duricias pollentes, in compositionē illam quæ sitas quæ Pamphlethes, & Diacinnabareos uocat ab Aegineta Paulo. Vitem ad oculos quoq; suffusiones cōmendat, cum felle aspidis acantiæ uocatæ, mirabili effectu, post quintum diem repræsentata curatione. Id sel, in serpentis eius dorso, iocinori annectitur, ut Actio placet.

μαγνίτης

De Magnete lapide. CAP. CXXXIX.
Magnes lapis optimus est, qui ferrum facile trahit, colore ad cæruleum uergente, nec admodum grauis. Datur cum aqua mulsa, trium obolorū pondere, ut crassos humores eliciat. Sunt qui Magnetem crematum pro Hæmatite. uendant.

Pli, li, 36, ca. 16

BARBARI COROLL.
Lapis Magnes, quē & Magnitin Græci dicunt. Itē Sideritin & Heraction, id est, Herculeū. Magnes ab inuēto uideat appellatus. In India nunc, & passim inuenit in Hispania quoq;. Reperitus autē scribitur clauis crepidarū, & baculi cuspidē ferrata hærentibus, cum armenta pasceret. Quinq; genera eius serunt. Aethiopico principatū dant, argentoq; rependit. Inuenit in Aethiopia Smiri. Ita uocat regio harenosa, lbi & sanguinei coloris, sanguinēq; reddēs, si teratur. Sed & crocum, Hæmatites cognomine, in trahendo ferrū, non eadē natura, quæ cæteri Magnetes, Aethiopici argumentū est, qd Magnetem quoq; aliū ad se trahit. Secundū genus Magnesia cum, & Magnesia, & contermina ei Macedonia, a Bebonea locatum petentibus dextra. Tales rufi, nigriq; sunt. Tertiū in Echio Boëtiæ, rufi coloris plus habens qd nigri. Quartū circa Alexandriā Troadem, nigrū, & fæminei sexus, ideoq; sine uiribus. Quintū in Magnesia Asiæ, deterrimū (nam & candidus est) neq; attrahit ferrum, similis pumici. In eadem Aethiopia mons haud procul gignit lapidem Theamedem, cui contraria Magneti natura, ferrum omne abigens respuensq;. Trahitur ad Magnetem ferrum, quia sola fere materia ea, uires ab eo lapide concæpras diu retinet. Aliud apprehendens ferrū, ut annulorū catena uideatur: quod quidem imperitum uulgus appellat, ferrum uiuū, uulneraq; ex tali asperiora fiunt. Lapis hic & in Cantabria eruitur. Non ille Magnes uerus, caute continua, sed sparsa, Bubbatione (ita appellant) nescio, an uitro fundendo perinde utilis: nondū enim expertus est quisq;. Auctor Plinius. Ferri utiq; inficit aciem, ut Magnes. Dinocrates architectus Alexandriæ templū Arsinoës concamerare cœperat Magnete lapide. Intercellit mors, & ipsius, & Ptolomæi regis, qui id sorori suæ fieri cupierat, ut simulacrū eius e ferro pendere in aëre uideret: quod genus præstigia, ad superstitionem suam Arabes cōmentū dicunt in eo feretro, ubi auctor eius lectæ conditus existimatur. Diogenianus Magnetem uerum argento scribit esse tam similem, ut decipiat. Ne hunc lapidem, qui ferrum ad se trahit, Magnetem, sed Heracleoten appellandum esse.

ἄραβικος λίθος

De Arabo lapide. CAP. CXL.
Arabus lapis elephanti maculæ similis. Is tritus illitu Hamorrhoidas exiccat. Eius cinis dentifricio optimus.

γαλακτίτης

De Galactite. CAP. CXLI.
Galactites appellatur, qd lacteum reddat. Cinerei tamen est coloris, ac gustu dulcis. Ad oculorum fluxiones conuenienter illinitur. Oportet autem in aqua tritum, pixide plumbea recondere, propter uim glutini, quod obhæret.

BARBARI COROLL.
Galactites, ait Plinius, ex uno colore lactis est, succo quoq; eius & sapore, a quo nomē: de hac intelligat, an diuersa, dubium: quando cineris colore traditur a Dioscoride, non lactis. Est & Galaxia, quam aliqui Galactitem uocant, intercurrentibus sanguineis, aut candidis uenis. Nam Chalaxia, grandinū & colorem, & figuram habet, unde appellata est, adamantinaq; duricie. Narrant etiam in ignem additæ, manere suum frigus. Ergo Pliniana Galactites, quam

aliqui & Leucogageam, & Sinephyren, & Leucographin appellant, uidetur ei proprior. Quæ A
& Morochthos, & Leucographis, & Galaxia Dioscoridi & Galeno dicit, ut paulo post lique-
bit. Vtuncq; infantium adalligata collo, saluam facere dicitur. In ore aut liquefcere: memori-
am adimere uel iniuriarum. Mittit eam Nilus, & Achelous quoq; amnis. Sunt qui & Smara-
gdum, albis uenis circumligatū, Galactiten inquit uocent, Est & gemma Galaicos, distans ab
hac, Argyrodamanti similis, paulo sordidior. Inueniuntur aut binæ, aut senæ.

De Melitide.

CAP. CXLII.

Melitites omnia Galactitæ similis. Hoc tantum interest, q̄ dul-
ciorem succum remittit. Eiusdem ut Galactites effectus.

BARBARI COROLL.

Melitites lapis dictus, quia succū tonsus melleum emittat. Differt ab hoc Melichrus: cuius
plura sunt genera. Melleus colore. Differt & Melitis a malo, cuius imitatur colorē appellatus.

De Morochtho lapide.

CAP. CXLIII.

Morochthus lapis, quem aliqui Galaxiam, aut Leucographida
uocauerunt, in Aegypto nascitur: quo utpote molli, & facile
liquefcente, linteones dealbandis uestibus utuntur. Spiracula corporis
obstruere uidetur, conueniens ijs qui sanguinem expuunt, coeliacis, &
uelicæ doloribus, cum aqua potus. Itidem fluctationibus uulvæ, imposi-
tus uelleri. Mollibus oculorum collyrijs miscetur. Explet enim caua;
atq; delachrymationes sistit. Idem cærato exceptus, ulcera quæ fiunt in
teneris partibus corporis, ad cicatricem perducit.

BARBARI COROLL.

Lapis Molochthus, aut Morochthus, siue ut Galenus & Paulus uocauit, Moroxus, &
Graphis, haud uideo eundem cum eo esse, qui Molochitis, a colore malvæ dicitur, spissius ui-
rens: nec translucida, reddendis laudata signis, & infantium custodiæ. Sit autē Morochthus,
quem Plinius in ore ait liquefcere, de quo in Galactite diximus, ex collatione Dioscoridis sub-
odorari potest aliquid, dicentis mollē eum esse, diluiq; facilem, ut uel idem cum Pliniano, uel si
milis esse uideri possit. Nominatur & Morochthos Plinio, sed inter gemmas, lacte sudans por-
raceo. Idem auctor & Leucographin inter herbas collocat: nec qualis ea sit, reperisse unq̄ fate-
tur, eosdem ei effectus reddens, quos hoc loco Dioscorides, Galenus, cæteri, ut propterea non
desint, qui Plinio quasi pro herba lapidem acceperit, increpitent. Sed auctor graulissimus, alio-
rum sententiam, non suam operē toto recitat.

De Alabastrite lapide.

CAP. CXLIIII.

Alabastrites uocatus Onyx, crematus, resina aut pice assumpta
duricias discutit. Stomachi dolores cum cærato lauat. Gingi-
uas comprimit.

BARBARI COROLL.

Alabastrites, siue Onyx in Alabaastro Aegypti, circa Thebas nascitur: quem in aedificiorū
quoq; ornamentis includunt. Nascitur in Syriæ Damasco, candore intercincto, uarijs colori-
bus. Cæteris omnibus candidior. Probatissimus in Carmania: mox India. Iam quidem & in
Syria, Asiaq; Viliissimus, & sine ullo nitore in Cappadocia. Probatur maxime mellei coloris,
in uertice maculosi, atq; non translucidi. Vitia in ijs corneus color, atq; candidus, & quicquid
uitro simile est. Alabastrites, ad unguentorū fidem laudatissimus: unde uas, id est, Onycem uir-
guentarium uocamus, quod & Alabastrum, & Alabastrū quoq; dicitur, etiā e uitro interm.
Est & Onyx inter ostrea, ut uolumine secundo paruit. Habet & Onyx gēma: in qua unguis hu-
mani similitudine candorē esse dicūt. Alabastrites porro, & in Arabiæ montibus, & Germania
quoq; reperit, ex quo & uasa potoria, & pedes lectorū, & sellæ delitijs factæ. Itē amphoræ, & ur-
cei cadorū magnitudine. Iā columnæ, 10. duos pedes longæ. Sunt q̄ hac amplitudine, nō Ony-
cem, sed Onychitin uocēt. Differt ab Alabastrite Alabandicus, siue Abalandicus; & em uroq;

D I O S C O R I D I S

C modo legitur. Color Alabandico subnigrat ex ruffo. Perspicuus est, ut ignis, & quibusdā quæ si rimulis uenisque dehiscit. Capillos albos, attritus inficit. Dicitur Alabastrus Democrito, & sal omnis, & calx uiua: quæ de putaminibus ouorum conficitur. Hæc ipsa Encephalos quoque dicitur a chymicis, & marmor Thebaicum, & Claudianum.

¶ De Thyite lapillo.

C A P. CXLV.

λίθος θυίτης

Lapis nomine Thyites, in Aethiopia gignitur, subuiridi colore, la spidem imitatus. Liquefcens tamen lacteum succum reddit. Vementer mordet. Tenebras quæ pupillis obuersione expurgat.

B A R B A R I C O R O L L.

Lapis Thyites, a Plinio Mortarium uocatur, quoniam Thya mortarium significet: etiam Acone dictum Hippocrati, ut Galeno placet.

¶ De Iudaico lapide.

C A P. CXLVI.

ιουδαϊκός λίθος

Iudaicus lapis in Iudæa nascitur, glandis effigie, candidus, scita admodum configuratione, discurrentibus lineis quasi industria detornatis. Solutus nullam qualitatem manifestam gustui repræsentat. Potest ciceris magnitudine tritus ad cotem, ut collyrium, cum calidæ aquæ cyathis tribus, potu difficultati urinæ auxiliari, & calculos in uesica comminuere.

B A R B A R I C O R O L L.

Hic & Tocolithos uocari coepit, quia calculos absumat: quod a Galeno falsum existimat.

¶ De Amianto.

C A P. CXLVII.

λίθος ἀμιάντος

Amiantus lapis in Cyprio nascitur, scisso Alumini similis, quo ut pote flexili, pannos tantum ostentationis gratia texunt, qui ad ignes coniecti ardent quidē, sed flammis inuicti splendidiore exeunt.

B A R B A R I C O R O L L.

Dapis Amiantus, ueneficis resistit omnibus, præsertim magorum. Hoc quod de lapide Adiantho dicitur. Texti ex eo uela, quorum ignis uelut aqua sordes eluat. De lapide quodam nascente in Carystho Euboicæ, Strabo retulit.

¶ De Sapphiro.

C A P. CXLVIII.

σάπφειρος

Sapphirus lapis, percussis a scorpione potu prodesse existimatur. Contra intestinas exulcerationes bibitur. Excrescentia in oculis, uasque, & pustulas inhihet, & ruptas membranas cogit.

B A R B A R I C O R O L L.

Sapphiri aureis punctis collucet, ceruleæ, raroque cum purpura. Optimæ apud Medos, nusquam tamen perlucidæ. Præterea inutiles sculpturæ, interuenientibus cristallinis centris. Sapphirum gemmarum inter laspides collocant.

¶ De Memphite.

C A P. CXLIX.

μεμφίτης

Memphites in Aegypto iuxta Memphin inuenitur, calculorum magnitudine, uersicolor. Tradunt trito & illito, quæ urenda, aut seanda sunt, sine periculo obstupescere, ita ut non sentiant cruciatum.

B A R B A R I C O R O L L.

Lapis Memphites, gemmantis est naturæ.

¶ De Selenite lapide.

C A P. CL.

σελενίτης

Selenites lapis, quem aliqui Aphroselenon appellarunt, quoniā noctu plenus, crescente luna reperitur. Nascitur in Arabia, candidus, translucens, læuis. Huius ramēta comitialibus in potu dari iubent. Eo ad

amuleta mulieres utuntur. Arbores adalligato eodē frugifere reddunt. **A**

B A R B A R I C O R O L L.

Selenites, fulgore melleo pspicius nomine accepto, quia imaginem Lunæ reddat in dies singulos augescens, minuentiq; numero. Hunc semper Galenus Aphroselenon appellat, Chymistæ Aphroselenon, etiam Comarin, & a leuitate ponderis Cupholithon, & Argyrolithon quandoq; uocitant. Habetur & Comaris apud eos Scythica, pro Arsenico & sulphure. Itemq; pro lapide philosophico, toties a nobis indicato, coarguendi potius & irridendi proposito, qm monstrandi. Seleniten Eustathius alium quoq; lapidem intelligit, qui & Asterius, & Lychnites uocetur, nascens in Thracia Pallenis litoribus; auctore Dionysio. Plinius Lychniten ab Asterio diuidit, itemq; Selenite. Sed ut herbarum, sic & lapidum uocabula confundimus.

De Iaspide lapide.

CAP. CLI.

Iaspidium quædam Smaragdum imitatura. Alia ChrySTALLUM, similis pituitæ. Alia nō dissimilis æri: ob id uocatur Aërizoufa. Alia ueluti fumo infecta, quæ Capnias ex argumento uocatur. Quædā lineis albis & resplendentibus præcingit, Assyrios appellata. Alia Terebinthinæ similis, quæ Terebinthizusa dicitur. Alia colore Calaida gemmā æmulatur. Omnes amuleta esse traduntur, & accelerare partum femoribus appensæ.

B A R B A R I C O R O L L.

Lapis sepe traslucet ac uiret. Smaragdo similis Indica est. Cypria, colore glauco & pingui. Perlica, similis æri: quæ ob id Aërizoufa uocatur. Thermodontiaca, cerulea: & Scythica inter ceruleas omnes optima. Phrygia purpurea. Cappadox ex purpureo cerulea, atq; non effulgens. Thracia Indica similis. Chalcidica turbida, præfertur omnibus, quæ purpurea quicq; habet: secunda quæ rosæ: tertia quæ Smaragdi: quarta cælo autumnali maturino similis: quæ Boëa appellat, & Aërizoufa. Similis est & Sardæ, imitata & uiolas. Non minus multæ species reliquæ: sed omnes in uitro ceruleæ, aut chrystallo similes, aut pituitæ, atq; mucosæ, siue ut Plinius, Myxis. Item Resinæ Teberinthi, quæ & Terebinthi Zusan uocant, inter ceruleas & ipsam maris existimantes. Nam quæ Iaspachates appellatur, ex Iaspide Smaragdo simili, et Achate proprietatem suam habet. Præstantiores Sphendone, id est, funda cludi solent, id est, parentes, nec præterq; margines auro amplectente. Vitium est & breuis nitor, & longesplendens, & sal & omnia, quæ in cæteris gemis nitro adulterata coarguitur, extra fulgorē spargendo, atq; nō continendo in se, nec in diuersa. Quæ Sphragides uocantur, quoniam optimæ omnium signent: ea quæ Smaragdo similis pertransuersum linea candida præcingitur. Orienti familiarissima, pro Amuleto Garāmatis uocat, quæ pluribus Polygramos. Est & Onychi puncta, quæ Iasponyx dicitur, & nubē complexa, & niues imitata, quæ stellata rutilis punctis est, & sali megarico similis, & fumida, Capnias, siue Capnitis appellata. Magnitudinē Iaspidis, undecim unciarū uidit antiquitas, effigie Neronis thoracata. Inter ceruleas, post Scythicā Cypria: post quā Aegyptia. Adulterat maxime tinctura. Idq; in gloriā Regū Aegypti ascribitur ei, q primus tinxit. Inest aliquando ceruleis aureus puluis: nō ut in Saphiris puncta. Galenus Iaspide medicinæ utilis, Chloron Iaspin, hoc est, uiridem cognominat. Inscribi iussit in Iaspide draconem radios habentē Necepsos Rex, ad stomachi futurā. Sed idem pfectus est, in torque suspensio eo rudi, ita ut os stomachi attingat.

De Aëride lapide.

CAP. CLII.

Aetides lapis est ueluti prægnans, cum quatitur alio in utero sonante. Grauidis continet partus, cum lubricæ sunt uulua & parū tenaces, sinistro brachio adalligatus. Sed parturientibus e brachio amoueatur, & feminibus alligetur, ut sine doloribus pariant. Furem deprehendit, si quis in pane conditū offerat. Fur enim mansum deuorare nō poterit. Quinetiam concoctus, furem coarguit. Quippe decocta cū eo, deuorare nō poterit. Tritus & carato exceptus, cyprino, aut gleua

D I O S C O R I D I S

Cino, aut alio excafaciente, comitiales magnifice iuuat.

B A R B A R I C O R O L L.

Lapis Aërites, quem aliqui Gagiten dixere, Strabo Gangiten, in Armenia repertū scribit: quo serpentes fugant: hunc, an alium accipiat, nondū liquet. Ina dīficatur nido aquilae, non tamen omniū, nihil igne deperdens: sed uis eius medica, non nisi nido direpti. Aiunt binos in ueniri, marem, & foeminam: nec sine ijs parere Aquilas, & ideo binos tantū. Genera eius quatuor feruntur. In Africa pusillus & mollis, ac uelut in aluo habens argillam suauem, candidam. Ipse friabilis: quem foeminam existimant. In Arabia mas durus, & similis gallae, aut subrudius: in utero continens lapidem durū. Tertius in Cypro, colore Africani, amplior tamen atq; dilatatus. Cæteris enim globosa facies. Habet in aluo harenam iocūdā, & lapillos. Ipse tam mollis, ut etiam digitis fricetur. Quarti generis Taphiusus uocatur, nascens iuxta Leucadem in Taphiufa: qui locus est dextra nauigatibus ex hac ad Leucaden: inueniturq; in fluminibus candidus ac rotundus. Huic est in aluo lapis, qui uocatur Callimus: nec quicq; tenerius. Nam Calais, aliud genus est lapidis, a quo & Calainus color, pro Veneto, si Photioni credendum est. Ego etiam sordidū colorem, Plinius secutus, Calaini appellatione possum capere. Amplius dīne inquit conspicua, sed fistulosa & sordidū plena est Calais. Hic & Augites a multis dicitur. Quae uero Calaina ostraca nominat Aëtius, pilos extenuantia, considerantibus relinquo. Apud chymistas uiuæ calcis aquam inuenio Calaiō uocari. De Calaino etiam colore, Dioscorides in laspide supra mox cōmeminit, lidem Aëtiten pro Chrysolitho, & Porphyrite, & Chrysochromo cognomine Macedonico, & Polychromo accipiunt.

De Ophite lapide.

C A P. CLIII.

οφίτης

Ophitæ genera multa. Quidam grauis est odoris, niger. Alter cinereo colore spectatur, punctis distinctus. Tertius lineis quibusdam candidis intercinctus est. Omnes contra capitis dolores, & ferpentium ictus profunt. Feruntur qui lineas habent, lethargo, & capitis doloribus auxiliari.

D

B A R B A R I C O R O L L.

Ophites, marmor est serpentū maculis simile: a quo nomen. Duo eius genera: molle candidum: nigricans durū. Ex Ophite, columnæ nisi paruae admodū inueniuntur. Inter Ophitas existimari fere possunt, propter colorem, quod Augusteum uocat & Tiberiū. In Aegypto utriusq; principis temporibus reperta. Differunt, q; maculas diuerso modo colligūt. Augusteum undatim crispatur in uertices: Tiberium sparsim, conuoluta canicie spectatur. Theophrastus lapidem Chiū uocando, uidetur Ophitem intellexisse. In Aegypto inquit, nascitur lapis niger, translucidus, Chio similis. Quem locū Plinius ita uerit. Theophrastus inquit auarior est, translucidos lapides in Aegypto inueniri, quos Ophitæ similes ait. Fortasse, quia uersicolores illas maculas, ut ait Plinius, primæ Chiorum lapidicinæ ostenderunt.

De Lapidibus Spongiarum

C A P. CLIIII.

LAPIDES in Spongijs inueniuntur, qui uescicæ calculos rum-punt, in uino poti.

B A R B A R I C O R O L L.

Lapides, qui nascuntur in Spongijs, & ipsi uocantur Spongiæ, quidam eos Cystolithos uocant: quia uescicæ medeantur. Sunt & Pumicum in genere, quos Spongijs uocant: ut in Pumice docuimus.

De Lithocolla.

C A P. CLV.

λιθοκόλλα

Lithocolla glutinum, quo lapides coniunguntur. Fit autē ex marmore, lapide pario, & taurino glutino. Potest candente specillo admotum, incommodos oculis pilos replicare.

B A R B A R I C O R O L L.

Lithocolla nomine, significat glutinum ex lapidibus.

De Ostracite. CAP. CLVI.

Ostracites testæ similitudinem habet, glebosus, & in laminas fissilis, quo mulieres ad detrahendos pilos, pro pumice utuntur. Menses drachmæ pondere potus ex uino sistit. Si quattuor diebus a coitu bibatur sicilici pondere, foeminis prestat ne concipiant, Cum melle autem impositus, manarum inflammationes lenit, & nomas cohibet.

BARBARI COROLL.

Ostracites a testa nomen habet. Transilit & ad gemmas. Si quidem, ut Plinto placuit, Ostracias, siue Ostracites, altera est testacea & durior, altera Achate similis. Nisi quod Achates politura pinguescit, Duriori tanta uis inest, ut aliæ gemmæ scalpantur fragmentis eius. Habetur & Ostracides, cui Ostrea nomen, & similitudinem dedere.

De Smyride. CAP. CLVII.

Smyris lapis est, quo annularij scalptores lapides expurgat, ad erodendum, et urendum utilis. Gingiuis quas humor uexat, prodest. Dentifricio commendatur.

BARBARI COROLL.

Nota uulgo Smyris, uel ipso nomine, quanq; Smyrium potius q; Smyrin officinæ appellant: cuius fragmentis gemmæ aliæ scalpantur: quo usu Plinius secundus non Smyrin, sed Ostraciten uocauit, ut superius proxime notauimus.

De Harena. CAP. CLVIII.

Harena e littoribus sole feruefacta, hydropicorum tumores exugit, si capite tenus in ea obruatur. Torreri solet ad aridos fortus, pro milio, aut sale.

BARBARI COROLL.

Harena littorum, græce Psammos, & Hammos Aegialitis uocatur. Quæ porro calculosa lapidiosaq; est, Acholax poetis dicitur. Harena secantur marmora premente eam serra, in præ-tenuilinea uersando, tractuq; ipso diuidente. Aethiopica ad hoc maxime probatur. Proxima Indica, & scabrior: qua combusta poliunt marmora. Scabra est & Naxia, & a Coptis quæ uocatur Aegyptia. Postea inuenta est, non minus probanda, ex quodam Adriatici maris uado festu nudante, obseruatione non facili. Fraus deinde secandi, quacunq; harena fluuiatili, quæ quod crassior est laxioribus segmentis terit, ita sectæ attenuantur crustæ. Polituris accommodant Thebaica, et quæ sit e pumice, aut Porro lapide, hoc est, Tofo. De Sabulo puteolano, Capanoue, ite de Etrusco, qd. pprie Carbunculus uocatur, nihil dicturus sum, nisi qd Campanum ex usta terra, Carbunculus ex cocta materia efficitur. Autor Vitruius, Romæ uulgo Puteolana dicitur harena quocunq; loco fossilis, modo quæ in calcem conueniat.

De Cote. CAP. CLIX.

ECote Naxia, quod exacuendo ferro detetitur, illitum alopecias ad pilum reducit. Virginum mammas cohibet, nec increfcere patitur. Potum ex aceto lienem absomit.

BARBARI COROLL.

Cotes, siue lapis Naxius, id est, Acone, sicut olearis Cotes, Elæa cone. Diu placuit Cotes, e marmore Naxio, ut & simpliciter Naxium dicatur. Ita uocant in insula Cypro genitas. Viceré postea ex Armenia. Differre putant Cotem a lapide Cotica: uon solum inueniri, nisi in flumine Timolo, siue Tmolo (nam utroq; modo recte dicitur) a mōte, ut arbitror, cognomine in terra Lydia. Nunc uero passim quæ alijs Heraclium, & Lydium appellant. Sunt autem leues, & calculi similes, quaternas uncias longitudinis, binasq; latitudinis non excedentes: siue ut Theophrastus inq; calculi amplissimi, dupla magnitudine, pēterea specie lata, non rotunda: qd a sole fuit in ijs melius, qd a terra. Sed & caloribus immodicis deterius respōdēt. Fiunt em̄ aspergi

D I O S C O R I D I S

Cne quadā ex alto reuocata, quasi lubricę, ut idē Theophrastus ait. Iis Coticulis periti cū uenā siue nūmo linia rapuerint, experimentum protinus dicunt, quantum auri, quantum argenti aut aeris habeant scrupulari differēda, nunq̃ fallente ratiōe: incipientibus a minimis notis, hoc erat granū, post colybus, tū duo chalchi, dein quatuor moria, ut Theophrasti uerbis agā. Lapis & Chrysius, & Basanos chrysochoice, hoc est, index aurarius uocat, quo, ut gręci aiunt, aurū explorat, obryzū sit, atq; probū, an improbū uitiosumq;. Quanq; Basanistes & p mortario qnq; accipit. Porro dicitur Obryzū, quasi abryzū, hoc est, delicatū sincerūq;. Vt Photionis etymo utar. Vocat aut Obryzū, q̃tiens simili colore rubet ignis, ut inqt Plinius, & aurū qd apyrō appellat, purum est: idq; habet nomen, q̃a igne nō egeat: quale arabicum esse Dioscorus tradit: qd inter Abileos, Galandosq; foditur. De arabico Auro & literę sacre meminerunt.

De Lapide Geode. CAP. CLX.

διος γινώσκω

Geodes lapis, adstringit, siccāt. Caligines oculorum discutit. Illis tus autem ex aqua, testium manarumq; inflammationes sedat.

EX M. VERG. COMM.

Geden ex argumento appellant, quoniam amplexus est terram.

EX M. VERG. COMM.

Repetemus & id quidem q̃ breuissime licebit, ex gręcorum decretis, quas uniuerso lapidū generi uires, priuatimq; singulis, & his præferim quos deinceps ex toto eorum genere hic scriptor numerauit, naturam dedisse antiquiores deprehenderunt. Quæ huiusmodi sunt. Siccāt non aliter q̃ Terra omnis lapides omnes. Priuatim tamen Magnes, quem & Heracleum lapidē uocant. Hæmatitæ æquales habere uires dictus est. Notus ubiq; hic lapis, mirabili naturæ euentu, ex interuallo ferrum ad se trahens: & quasi sensus, manusq; illi sint, omnium rerum domitricem materiam illam cedere & parere sibi cogit: non aliter q̃ toto orbe monstra cessisse quondā uiribus Herculis traduntur. Ob quam causam ab Hercule Heracleum credidere aliqui dictū fuisse. Verum tamen non defunt qui non ab Hercule, sed ab Heradia Magnesiæ dictum uelint. Et quemadmodum a Magnesia Magnes, sic Heraclius ab Heraclia dictus fuerit. Sic Lucretius libro, s. credidit dicēs. Quod superest agere incipiam, quo fœdere fiat Naturę lapis hic ut ferrum ducere possit. Quem Magneta uocant, patrio de nomine Grai, Magnetum quia sit patrijs in finibus ortum. Et si Plinius autore Nicandro, a Magnete inuentore nominatum testetur. Euripides non hunc Magnetem in carmine suo uidetur uocasse, sed Indicem, quo argentarij utuntur. Verficulus eius est, τὰς βρωτῶν γινώμας σκοπῶν ὡς μαγνήτις λίθος. Quod est, Hominū mentes ueluti Magnes lapis probans. Arabicus Ebori similis, siccandi repurgandiq; uires habet. Lactarius scissili eadem omnia, sed minore efficacia potest. Melitēs a sapore mellis nominatus quadā tenus calefacit. Morochthos, quem a candore lactis Galaxiam, & Leucographida uocari Dioscorides ait: quo prædictis omnibus mitior est, quia nullas habet efficaciores uires, eo magis sine dolore curat. Eamq; ob causam, in mollibus corporū partibus ad inducendas cicatrices usā eo antiquitas est. Plinius tertiam lapidis huius appellationem inter herbas numerauit lib. 27, nominis uicinīate cum leuce deceptus. Poterunt uidere id uolentes. Nos enim festinantes hæc tū ueteribus hibendum dederunt cibum in stomacho non continentibus. Hunc primo Onychē, ab humani unguis similitudine ueteres gręci nominauerunt: quemadmodum secundo uolumine in Indico Onyce diximus. Nunc eo loco dictis adiiciendum est, gręcos præter Onychem Alabastritem etiam uocasse, ab usu, s. qm̃ ad Alabastra unguentorū: usus eius esset. Fuerunt aut gręcis Alabastra lapideæ pixides, in quibus ob frigiditatem suam diuissime & felicissime odores seruarent: sic dicta, quoniā ob læuorem suam e manibus laberentur. Et qm̃ ex Onyche hoc alabastra illa fierent, ideo Alabastrites lapis dictus est: priusq; Onyx fuit: tum facta ex Onyche alabastra Alabastritē uocari lapidē fecerunt. AEqui uoca in gręcis, ut uidetur, ad unguem & lapidem Onycis uox est: poteritq; aliquando ubi parum certa res sit, legētes fallere: quemadmodum primo uolumine in Bdellio dubitari potest, lapidi ne, an ungui id Diosc. comparauerit. Simpliciter enim βρωξι λίθος esse ait. Nos nihil illi aliud adiectum inuenientes, unguem uertimus: id enim tutius uisum est, & si Alabastritē huic lapidi simile forte Bdellium ille fecerit. Qd tunc relictum monuisse nunc satis sit. Quemadmodum a mortuorum usu Thyitem eum qui statim sequitur dici intellexisse. De quo præter tradita a Diosc. nihil certum in antiquis gręcis inuenimus. Dissicere renum calculos dictus ab illis Iudaicus est. Ob easq; uires posteriores gręcorum medici Tecolithon, id est, calculos absumentem eum uocauerunt. Sapphirū cōtra scorpiā

num ictus bibi utiliter, idem græci dixerunt. Lunarem comitialibus utilem. Iaspidem, qui uiri di colore sit, alligatum, & in anulo gestatum, cibum in stomacho non continentibus prodesse. Qui autem subuiridi, qm̄ efficacior sit, oculorum cicatrices & pterygia extenuare. Ophitē ad alligatum, contra uiperarum morsus prodesse. Calculos in uellicis frangere, in spongijs inuehros lapides. Ostracitem, & Geodem, id est, terram intra se complexum, efficaci ad siccandum ui esse: ideoq; inflammatis tumoribus egregie prodesse. Smyrim repurgandi uim habere: ideoq; dentifricijs accommodatum esse. Refrigerandi uim habere etiam crediderunt ueteres græci, quod ex Naxia cote confricato ferramento detritum fuerit: eaq; ui crescentibus uirginum mamis, & puerorum testibus utile. Quod uero ex olearia Cote detritum pariter fuisset, capilli defluuia, quas alopecias dicunt, exple. Plures alios etiam medicinæ utiles lapides numerauerunt post hunc scriptorem posteriores græci: uerum ab eo relictos, nos etiam relinquimus: in re quæ iam pridem desijt in honore esse, legentes monuisse hactenus contenti.

¶ De Terra. CAP. CLXI.

OMnis terra ad medendi usum recepta, sumam & primam uim habet occludendi. Sed specie distant, cum alia adiunctis quibusdam, ad alia sit utilis.

BARBARICOROLL.

Terra, hoc est Ge, omnis sicca est in medicina ui, præsertim appellata Georgumene, hoc est, agricolaris. Nam terra Aegyptia, e luto eius sit. Sunt qui Aegyptiam, pro singulari terra interpretentur. In nomine est & Cretica, minus pollens, & plus habens aeris q̄ ceteræ: usus ad extirpandas sordes argenteis uasis celebratissimus. Et Armeniæ glebæ locus, siue lapis ea, siue ut Galenus mauult terra nominetur: quia madescat aqua interius, non summa tñ cute, ut lapides. Vulgato eius usu, contra pestilentiam, quæ Galeni ætate fuit, & contra deploratos phthisicos: ob id in Africâ & Alexandria nauigare solitos, ex Armenia Cappadociæ cõtermina inuehi: ui maxime siccifica, luteo colore, aut pallido, teri facilis, usui mō lapidis: minimū tñ harenosa lapido faue, sed Samio Asteri leuore similis, uerū pōderosior ac densior. Syri eā Zazinacha appellat, ut Aetius inqt, urbē in cuius mōte nascit Vagauanaga uocari: agrū in q̄ mōs ille sit Agaraces uulgo dici, cui similis ē effectus, quæ Alanæ cognominat. Est & Carasenia ex oppido Tauricorū peninsulæ, qua uulnera oīa sanant. Quod aut genus Cretæ sit, quā Hippyocrates Schediada nominauit, duorum discriminū, haud plane scio: quemadmodū nec illam quam Conchylū Xenophon, alij Cenchylū uocant lapidem, ut inqt Pollux. Agricolaris duæ sumæ differentie, in finis inter eas medijs. Nigra, quæ & pinguis est. Alba, quæ græci uocant Argilon, hoc est, Argillā, Sabuloni similē, ac ieiunā, sordidā, famelicā. Sunt & alia duo Terrę gñā. Pharmacitis, hoc est, medicata: cuius species Eretrias, & Samia, & Rubrica, & Lemnia, & quæ sequuntur ceterę. Metallicū: in quo lapides, & fere quæcunq; supra diximus, orsi a Cadmia.

¶ De Eretriade. CAP. CLXII.

Eretriæ duæ sunt, una uehementer alba est, altera cinericia. Optima habetur ad cinereum colorem uergens, perq̄ mollis, quæ si per æramenta tractim ducatur, lineam uiolaceam refert. Lauatur ut Ceresa, aut hunc in modum. Teritur ex aqua, & ubi pessum ierit, humor leuiter excolatur. Siccata solibus iterum teritur, interdū adiecta aqua, ut uespere confidat. Antelucanis colo excernitur, & demum in sole trita, si fieri potest, digeritur in pastillos. Quod si tosta desyderetur, pastilli magnitudine Ciceris in fictile perforatū conijciuntur, oreq; uasis diligenter obturato, supra carbones continenter follibus persiantur. Vbi uero cinis in fauillas se conuertit, aut areum colorem contraxit, exempti reconduntur. Vim habet adstringentem & refrigeratorem, leuiter mollientem. Caua explet, & sanguinolenta conglutinat.

BARBARICOROLL.

Eretria, & Eretrias terræ suæ nomen habet. Hac Nicomachus & Parafius usi.

LI ij

Plī. de terrę generibus lib. 17 capite. s.

B

D I O S C O R I D I S

γῆ σαμία

¶ De Terra Samia. CAP. CLXIII.

Samia præfertur candida, levis, tangenti linguæ glutinosa, mollis, succosa, friabilis. Cuiusmodi est quam aliqui Collyrion, & uocant & uocant. Duæ enim species eius. Vnam ante diximus. Altera Aster appellatur, crustacea, & cotis modo prædessa. Vritur ac lauatur ut Eretria. Vimq; consimilem habet. Sanguinis reiectiones sistit. Foemina fluctu uulue laborantibus, cum flore sylvestris punici datur. Testium & mammarum inflammationes illita ex rosaceo & aqua refrigerat. Sudores arcet. Contra serpentium morsus et uenena pota ex aqua auxiliatur.

B A R B A R I C O R O L L.

Terra samia, genus est candidi coloris, quemadmodum & Melinon, de quo in Creamelina disseritur. Porro Samia quæ Aster uocatur, globosior est quæ species eius altera Collyrion, utraq; tamen candida. Nascitur & in Samo quoq; Melinum, sed pictores eo quod sit e Samo non utebantur, propter nimiam pinguitudinem, sed eo quod e Melo. Accubantes effodiunt ibi, hoc est, non stantes, sed aut in obliquum, aut supini uenas scrutantur in faxis, autore Theophrasto: quæ ut Iulius Pollux inquit, Geophania uocantur, Aster, non nisi quarta demum aggressione proditur.

λίθον σαμία

¶ De Samio lapide. CAP. CLXIII.

Samius lapis, in Samia terra inuenitur, quo aurifices utuntur poliendo auro, ut resplendeat. Probatur candore & duricia. Vis ei adstrictoria, et refrigerans. Prodest stomachicis potus. Sensus hebetat. Verum ad lachrymationes oculorum & ulcera cum lacte efficax est. Paratus, ut tradunt, adligatus accelerat, & conceptus foeminarum custodit.

D
χία γῆ

¶ De Chia terra. CAP. CLXV.

Chia eligi debet candida, uergens ad cinereum, Samiæ similis. Est autem glebosa, albaq; sed ficticius formis differens. Vis eadem quæ & Samiæ. Extendit faciem, & erugat, atq; splendidam reddit. Colorem in facie & corpore toto commendat. In balneis pro nitro deterget.

σελινυσία γῆ

¶ De Selinusia terra. CAP. CLXVI.

Eadem præstat Selinusia. Maxime laudatur quæ uehementer resplendet, candida, friabilis & aqua dilui celerrima.

B A R B A R I C O R O L L.

Selinusia, lactei coloris est, eadēq; lacte diluta, renouandis albarijs rectoriorum probatur.

κίμωλία

¶ De Cimolia. CAP. CLXVII.

Cimoliæ duo genera, candida, & ad purpureum inclinans. Optima existimatur quæ innatam habet pinguitudinem, tactuq; frigida sentitur. Vtraq; aceto diluta, parotidas, & alia tubercula discutit. Ambusta igni si statim Cimolia oblinantur, pustulas non sentient. Testium duricias, & totius corporis collectiones cohibet. Igni sacro imponitur. In summa, utraq; multum in medicina commendatur, si incorruptæ originis, nec spuria assumatur.

BARBARI COROLL.

Terra Cimolia, siue ut Hippocrates & Pollux & Nicocharis appellant, terra Mectis, siue Smectis, ab exterfu a Cimolo quidem, una Cycladū. Sed tñ laudatur maxime Thessalica. Nascitur & in Lycia, circa Bubonem oppidum. Est & alius usus Cimoliæ in uestibus. Nam Sarda, quæ affertur de Sardinia, candidis tantum probatur, inutilis uersicoloribus: & est utilissima omnium Cimoliæ generū. Preciosior Vmblica, & quam uocant Saxū. Proprietas Saxi, q̄ crescit in macrando, atq̄ pōdere emittit: Illa uero mensura. Vmblicā nō nisi poliendis uestibus assumebant. Primū igit̄ uestibus abluebat Cimolia Sarda, dein sulphure suffiebat: mox desquamaf Cimolia, quæ est coloris ueri. Fucatus enim nigrescit, & effundit̄ sulfure: ueros aut̄ & p̄ciosos colores emollit Cimolia, & quodā nitore exhilarat contristatos sulfure. Candidis uestibus Saxū utilius a sulfure, inimicū coloribus. Græcis uicem Cimoliæ Gypsum tymphaicum implebat.

De Pnigite terra. CAP. CLXVIII.

Quæ Pnigitis dicitur, colore Eretriæ similis est, grandioribus tantum glebis. Manum si quis admoueat, refrigerabit. Tactu linguæ usq̄ adeo glutinosa, ut pensilis hæreat. Cui effectus idem qui Cimoliæ, paulo tamen infirmior. Hanc aliqui pro Eretriæ de uendunt.

BARBARI COROLL.

Pnigitis, nigra est, ut Ampelitis, glutinosior quandoq̄ q̄ Samia.

De Testis. CAP. CLXIX.

Fornaceæ Teste, uehementer tostæ, crustas ulceribus obducunt. Quare prurigini, & pabularum eruptionibus medentur. Podaḡ gricis prosunt, Strumas discutunt, cærato exceptæ.

BARBARI COROLL.

Testas, Ostraca uocant græci.

De Terra fornacum. CAP. CLXX.

FORNACVM terra, quæ retorrída fuluescit, eiusdem cum Testa effectus.

BARBARI COROLL.

Terra usta, siue tosta, itemq̄ ruffa, quæ a græcis Catopos & Caminitis atque Pyrra dicit̄, nō eadem est cū ea, de qua Plinius ita meminit. Vsta casu primū repta incēdio, Pyrræ cerussa in orcis cremata, quam primus Nicias tabulis inusserit. Optima nunc Asiatica habetur usta, quæ & Purpurea inquit uocatur. Preciū eius in libras æris quinq̄. Fit & Romæ usta cremato silice mar moroso, restinctu aceti, purpureo colore, ut inquit Vitruius. Sine usta non fiunt umbræ.

De Melia terra. CAP. CXXI.

Melia colore cineream Erethriam imitantur, aspera tactu. Ea digitis friata, derafi pumicis modo crepitat. Vim habet alumino sam, sed remissiusculam, id quod gustu deprehenditur. Modice linguā siccatur, purum corpus reddit, & colorem cōmendat. Pilos extenuat. Viti ligines & lepras abstergit. Pictoribus usum præbet, ut colores diutius perennent. Emplastris quæ Chlore dicit̄, efficaciter inseritur. Ex omni Melia terra, & omni alia in uniuersum, eligi debet recens, mollis, non lapidosa, friabilis, quæ cum humorem attigerit facile resoluatur.

BARBARI COROLL.

Colores, præter Cerussam, candidi erant antiquitus duo. Melinum, ab insula Cycladū Me lo dictum: quod & in Samo quoq̄ nascitur, ut diximus. Linguam tactu siccatur omne Melinum. Taxatur in libras, singulis sextertijs, Melinum porro, a terra Melina, siue ut græci appellant, Me

D I O S C O R I D I S

C liade, atq; Melia nihil distat. Alterum candidi genus, Paretonium uocatur. Nomen loci habens ex Aegypto. Spumam maris esse dicunt, sordidatam cum limo, propterea & minutas in eo spectari conchulas. Fit & in Creta insula, & Cyrenis. Adulteratur Cimolia decocta, conspissataq; . Preciū optimo in pōdo sex librarum. E candidis coloribus pinguisimo, & ppter leuorē tenacissimo rectorijs. Fuit & Smyrnæ terra, Theodorios ita nominata, quia Theodoti fundus is erat, in quo id genus Cretæ primo sit inuentum. Hanc Plinius inter candidas enumerat, quæ ueteres inquit, ad nauium picturas utebantur. Vitruius inter uirides, optimā credi uoluit.

De Ampelide terra. CAP. CLXXII.

EX Ampelide terra, quæ Pharmacitis nomine, in Seleucia iuxta Syriam nascitur, laudatur imprimis nigra, piceæ carbones referēs, assulosa, æquabili splendore, quæ detrita, accepto oleo statim eliquescit. Vitiosa censetur candida, & cinerea, quæ in liquorem non resoluitur. Vim dissipandi & refrigerandi habet. Ad calliblephara additur, tinguendis capillis idonea. Vfus ad illinendas uites sub germinationis tempus. Vipote cum innascentes uermiculos encet.

BARBARI COROLL.

Ampelitis, bitumini est similissima. Vocatur ita, quoniam uitibus, quæ gemant illitis, arcere creditur uermes Ipsæ, siue Senipas a grecis appellatos, a nobis Voluoces, & Conuoluolos: etiam si Voluocem alij dumtaxat intelligunt, qui prærodant pubescētes uuas. Theophrastus hæc in Cilicia coqui tradit, atq; ita lentescere, uitesq; obungere. Hæc & Pharmacitis dicitur, etiam si nomen hoc medicis omnibus commune est, ut inquit Galenus.

EX M. VERG. COMM.

Quod ad omnem terram cōmuniter priuatimq; hanc, aut illam a grecis traditum pertinet, sic se habet. Siccatur omnis terra: & nisi mixtam, coniunctamq; sibi aliam habuerint qualitatem, nullam habet erodendi vim. Sin autem feruida illi qualitas aliqua accesserit, eā omnem lotura amittit. Primumq; a ueteribus grecorum medicis efficacissime adstringere Eretia dicta est. Crematamq; & lotam sine erosione siccare, & in toto eius genere probari & antepopi cunctis alijs quæ cinereo colore est. Samiam, quoniam glutinosa lentore sit, utilem omnibus quæ leniri oporteat. Omnesq; sanguinis eruptiones, quacūq; parte erumpant, compescere. Chiam & Selinusiā maiore & efficaciore repurgandi ui esse: ideoq; mulieribus ad uicorem & leuorem cutis usum eius fuisse. Quinetiam carnibus ulcera explere, & ad cicatricem perducere, præsertimq; ambusta. Cimoliam, quam a Cimolo insula nominauerunt, mixtas refrigerandi discutienti q; habere uires: & hoc simpliciter, nec lotā: lotā uero magis refrigerare, & ambustis ex postea mederi. Pnigitim deinde pares Cimoliæ uires habere. Hanc nigro colore esse tradiderunt ueteres greci. Ampelidem a uineis appellatam ferunt: q; contra innascentes uitibus uermes, gemmasq; earum erodentes, usus quondam eius esset: siccandi discutienti q; egregias habere non sine erosione uires. Numerauerunt & alias aliquot reliq̄as ab hoc scriptore posteriores greci. Aegyptiam, cuius luto contra incipientes cutem subire aquas, & duratos lienes uteretur. Creticam, quam sine erosione similem Ampeliti constituerunt. Alanam, quam Armeniæ glebæ æqualem fecerunt. Omniumq; postremam Armeniam glebam, quam adhuc Armenium Bolum uocant. Cuius multiplex fuit & est in medicina usus. Numerabantur ab eis etiam in Terræ celsu Lemnia, Sphragis, Sinopis, Rubrica, & Fabrilis. De quibus quoniam nō multo ante priuatim actum ab hoc ipso scriptore, & a nobis est, nihil ultra hoc loco agetur.

De Fuligine pictoria. CAP. CLXXIII.

Fuligo qua pictores utuntur, ex uitrarijs officinis colligi solet. Si quidem ei palma tribuitur. Vis ei ad adstringendum & erodendum efficax. Fracta cum rosaceo carato, ad cicatricem perducit.

BARBARI COROLL.

Pli. li. 35. ca. 6

Fuligo hæc a grecis Asbolon, & Asbole uocari solet. Inuenti sunt pictores, qui e sepulchris carbones infectos effoderunt ad attramentū rectorium, siue quod idem est, Pictorium. Sed cōmodius tū sit ex fuligine, resina exusta, auripice: propter quod officinas & laconica etiam ædifi-

cauere, fumo excipiendo. Fit ex farmentis, sed laudatissimum e tædarum Schedijs, ita enim uocat assulas Vitruius. Igitur Fuligo quæ parieti & cameræ curuaturis adhærescit collecta, partim componitur ex gummi subacta ad usum atramenti librarij, partim tectores glutino ad mixto in parietibus utuntur. Adulteratur fornacium, balnearumq; Fuligine, quo ad uolumina scribenda utuntur. Sunt qui & uini faciem arefactam excoquant: quæ si ex bono uino fuerit, Indici speciem imitari uideatur. Polygnotus & Mycon e uinaceis fecere, Tryganon uocatum. Apelles commentus est, ex ebore combusto, quod Elephantium uocant. Fit & e tædis ligno combusto, tritisq; in morario carbonibus. Mira in hoc Sepiarum natura: sed ex ijs non fit. Omne autem Atramentum sole perficitur, librarium, & tectorium, glutino admixto: quod autem aceto liquefactum est, ægre ducitur.

EX M. VERG. COMM.

Facilis cognitu pictoriæ Fuliginis huius in Vitruiuo confectio est. Eam longius scriptor ille septimo suæ architecturæ libro tractauit. Poterunt uolentes ab eo non eius tantum, sed librarij Atramenti etiam, quod statim sequitur, certam audire rationem: ideoq; nos nihil ultra de his agimus. Monemus tamen, quod in hoc capite a Barbaro uersum est, fracturas perducere ad sanitatem Fuliginem hanc, assumpta cæra Rhodia, longissime a Dioscoridæ sensu ab esse. Neq; enim quod hic ait, οὐκ ῥοδίων κρητὴν ad gentem & insulam Rhodum pertinet, sed ad ceratum quod rosaceo unguento coactum fuerit. Notior res, & toto hoc opere totiens repetita, ut ostendi a nobis aliter non debuerit.

De Atramento librario. CAP. LXXIII.

Atramētum quo scribimus, Fuligine e tedis coacta colligitur. In singulas libras gummis, ternæ Fuliginis uncia adijciuntur. Fit etiam e Relinæ fumo, & pictoria Fuligine, de qua paulo ante diximus. Assumitur autem Fuliginis mina, Gonus sesquilibra, Glutinis taurini, Atramenti futorij, singulorum sesquuncia. Additur conuenienter erodentibus medicamentis. Ambustis ex aqua commode illinitur. Sed non ante soluatur q̃ cicatricem iuduxerit. Sanatis siquidem ulceribus, sua sponte decedit. Cæterum habes amicissime Ari abunde, quæ tradenda duximus, non pro operis modo, quem destinaueramus, sed pro materiæ & auxiliorum medicinalium copia.

BARBARI COROLL.

DE Atramento scriptorio, quod & librarium uocatur, & græce melan graphicon, dictum est in Fuligine pictoria, Chalcantho, Melanteria.

LI iiij

Finis LIB. Quinti.

D I O S C O R I D I S

C

PEDACII

D O S C O R I D I S

De Medicinali materia, LIB. Sextus.

IO. RVELLIO interprete.



VPERIORIBVS amicissime Ari libris, tradidimus de aromatibus, oleis, unguētis, arboribus, & corundem fructibus, lachrymīs: Item animalibus, melle, lacte, scuo, frumentis, oleribus, hærbis, radicibus, liquamentis, uinis, metallisq;. In hoc uero totius operis ultimo, facultates eorum recensuimus, quæ prodesse nobis, aut officere possunt. Vitantes itaq; nomenclationis tædia, ad institutum reuertemur. Huiusmodi autem Tractatus, cum bifariam distributus sit, in partem uenena præcauentem, ita ut ne fallant sumentes: aut si quando per imprudentiam dentur, ut tum quoq; innoxia fiant, irritaq;. Et in partem auxiliatricem. Primum disseram de præcauendi modo: quem esse difficillimum plerique Maiorum arbitrantur, quod dantes clam uenena, ita insidias temperant, ut peritissimum quemq; decipiant. Siquidem uenena sua amaritudine, permixtis dulcibus spoliant, & graue odoris uirus mistura odoramentorum eximunt. Aut medicamenta immiscent, quæ leuandæ ualetudinis gratia dari solent, & præsertim quæ infirmioribus, ut Absinthium, Tragoriganum, Cusnilam, aut Hyssopum. Quinetiam Thymum, Irim, Origanum, Castorium, aut si quid medicamenti cognatum habere saporem uideatur. Aut potionibus inserunt, aut uinis, aut iuribus, aut passo, aut mulsæ aquæ, musto, succis, lentis, polentis, aut medicaminibus. Aut concinnantes ipsi, edulj admiscunt. Quare qui in ea suspicione sunt, condita edulia uitare debent, omniq; intensa saporis qualitate, dulcium, aut salis forum, aut acrium abstinere, nec sitibundi affatim bibere, aut esurientes uoraciter comesse, semperq; ad saporem esitatorum diligenter attendere: præsertimq; bibentes, frigidam aquam præsumere. Satiato enim appetitu, qualitates ægerrime concoquuntur. In infirmis quidem facile uitare possumus poriones auxilij gratia dari solitas, quas offerunt improbi, qui beneficia moliuntur. Itaque ob id laborantes morbo, non perinde audentium iniurijs patent. Et hæc quidem, ne facile seducti homines, capiantur dolis ueneficorum, occasio est & facultas. Sed alia expeditior, ut suspitiosi aliqua præsumant, quæ uenenorum uires hebeant, & inefficaces irritasq; reddant. cuiusmodi Caricæ sunt cum Iuglandiū nucibus manducatæ, & quæ Cedromela uocant, id est, Citria, leni-

nis Napi drachma cum uino. Item folia Calaminthæ, aut terra quæ Le- **A**
mnia sphragis appellatur, pondere pari cum uino. Aut Rutæ folia, & nu-
cis luglandis nucleum, aut Caricas duas, & salis callum ieiunii sumant, &
nullo ueneni genere ledentur, Antidota ex uino sumpta eundem effectum
præbent. Inter quæ intelligitur magnum metridatium, quod scinco &
sanguine temperatur. Quin & sæpe uenenis obsistunt peculiare affectus
in corporibus, certo quodam modo constitutis, & quadam cibi potusque
qualitate, aut uini copia ita temperatis, ut cum uenenis dissentiant. Siqui-
dem ingesti ueneni uires frangunt, atque iam priore alimento farts, præ-
clusisque meatibus, obstant ne membratim per digestionem insinuetur.
Verumenimvero quoniam fortunæ temeritas interdum similia discrimi-
na, peregre agentibus affert, absque ullis insidijs hominum, non nihil disse-
rendum mihi de hac re necessariū duco. Iamprimū igitur culinam appa-
rare loco sub diali conuenit, cibosque & potus in huiusmodi loco strue-
re. Si id fieri cōmode nequit, secunda erit conditio hæc, apparandi, appo-
nendique sub tecto. Sed tum diligenter laquearia animaduertenda. Fre-
quenter enim a superioribus contabulamentis animalia decidunt, exigua
quidem, sed quæ non modicam perniciem moliantur, ut phalangia, stel-
liones, & alia quædam reptilia. Porro uinaria uasa diligenter intueri oportet.
Namque reptilia odore uini illiciuntur, quæ interdum sorbentia, no- **B**
xium uirus eructant: interdum uero delapsa, immeraque moriuntur, &
exitij causas haurientibus afferunt. Sed hæc hæcenus dicta sint, cauti &
prouidi, insidijs ne pateant. Quod si qui sua sponte, aut ex quorundam
insidijs sumpserunt, auxiliari primo quoque tempore oportebit. Siquidem
dum comites singulorum uenenorum notæ expectantur, immedicabile
fit uenenum, & paulisper neglectum, medicamentis ægre cedit. Quare si
qui compotes mentis, se uirus sumpsisse fateantur, aut eorum qui aderant
testimonio constet, protinus ad idonea remedia transeuntes, facile pecu-
liari natiuæque constitutioni restituemus. Neque enim ijs assentimur, qui
prorsus auxilia in huiusmodi frustra adhiberi contendunt. Quo enim
modo uitia, quorum causæ corporibus insident, medicinam admit-
tunt, & quæ forinsecus incurrunt uenena, medendi rationem aspernan-
tur? Aequè uero omnes morbi pro causarum ingruentium magnitudi-
ne, aut pristinis affectionibus, qualitibusque, quibus sit opportunum cor-
pus, uel medicabiles sunt, uel nullis cedunt medicamentis. Quod si qui
forsan obmutescentes, aut temulenti, aut nolentes alioqui uenenum egeri,
nullam nobis eius cognitionem præbeant, tum protinus accedendum ad
ea quæ communiter epotis quibuscunque uenenis opitulari consueuerunt.
Atqui nullum magis in omnia ualens auxilium dari potest, quam ut
proximo loco uirus foras exhauriatur, priusquam inualescat. Quare si-
ne mora, calidum oleum ex aqua, aut seorsum, ut uomitare cogantur, da-

D I O S C O R I D I S

Cri conuenit. Aut si oleum natura loci negat, butyrum cum aqua calida, aut malua, aut lini semine, aut trago, urtica, scenograeco, aut halicæ decocto uicem eius exhibebit. Hæc enim non modo uomitionibus exigent uilla sua laxatrice, aut nauseam ciente, sed aluum quoque subducent, & corporum inanitione ita aduersabuntur, ut acrimonias eorum hebetent. Id quod euidenter huiusmodi argumento deprehendere licet. Esto ut quisquam uiua calce, uel uini facie, aut cantharidibus, aut alio quouis acri corpus exulcerare statuerit, is si ipsum oleo leniter illinat, exulcerationem non accipiet. Atqui neque uehementer adstringi corpus, neque refrigerari poterit, si antea perungatur. Quinetiam uomitus non ob id modo quacueta, & noxium humorem excernat, iuuamentum adfert, sed quod assumptum uirus nonnunquam odore, coagulatis globulis, aut colore, prodat. Quippe cum odore & amaritudine meconium, colore cerusam gypsumue, globulis lac, aut sanguinem animalis recens iugulati ostendat. Nam grauis odor regestorum, leporis marini, aut rubetæ ueneficia deprehendit: ita ut nonnulla ab ijs remedia peti possint, ad idonea singulorum auxilia transeuntibus. Oleo, maluæ decoctum ammiscetur, aut glaucium, aut asdeps anserinus, aut pinguium carniū iura, lixiuium lignorum cinere factum. Vbi uero uomitus diligenter citatus fuerit, ne quid in uentre coierit, quæ hæserunt intestinis reliquæ clystere acri deuocentur. Facit & nitrum tritum, & cum hydromelite sumptum. Vina uetera liberalius epotata, gallinacea iura, præpingues pisces, uetustæ carnes, pinguesque, & quæ adipe aut recenti butyro parantur. Aluum namque subducunt, uti diximus, & stomachum resoluunt, proniorem ipsum ad uomitionem reddunt. Et uenenorum acrimonias hebetant, atque meatus obstruentia, celerem uirium penetrationem inhihent. Quinetiam medicamenta dantur, quæ comuni dote profunt, ut Lemniæ terra, Agaricum, Abrotonum, Irius, radix Eringij, semen Pastinacæ & Calaminthæ, Nardum gallicum, Castoreum, Ferulæ uirentis medula, flos Rhododendri, succus Marrubij, Laser aut Laserpitium, Sagapenum, Peucedani succus, aut Panacis, & radix quæ Magudarim appellatur, Aristolochia longa, syluestris Rutæ semen, & Beronicæ (quæ Cestron noiant) folia. Singula cum uino drachma pondosumi debent. Effectum præbet Polij decoctum, & Sesele, & liquida Pix lincta. Magnifice ferunt opem, antidota quæ in calce operis scripta reliquimus. Communis ratio præstandi auxilij, ita se habet. Ceterum ab ijs quæ conueuerunt euenire, communia remedia sumptuari possunt. Ferè enim uires uenenorum quam plurimorum, in affectus consimiles, corpus tandem reddigunt. Quam ob causam plerisque communia conducunt auxilia. Permulta etenim uenenorum genera, communes tamen, nec multi iisdem affectus oriuntur. Neque fieri potest, ut omnia quæ contingere solita sunt, unum uenenum sequantur. Alioquin superuacaneus esset uenenorum tractatus, si

gillatim remedijs ab authoribus traditis. Neq; uero in uno eodemq; **A**
promptum est inuenire, ut stomachi, iecoris, renum & uesicæ dolore ue-
hemēter crucietur, ut singultuat, erodatur, contremiscat, refrigeretur, ob-
mutescat, conuellatur, pulsus elanguescat, ueterno prematur, caligent sen-
sus, stranguletur, sitiat, sanguis erumpat, febre confluetur, ægre lotium
reddat, torminibus uexetur, crebro uomitet, nausea prematur, rubescat,
liuore suggilletur, pallefcatur, desipiat, stertat, uiribus deficiatur, & pleraq;
alia eueniant. Vnumquodq; uenenū in generales affectus diducitur: ut
pauca numero & communia demonstrantur, quæ enenire consueuerūt.
Quare in singulis quæ supra diximus, non facile fuerit deuoratum uirus
cognoscere. Nam stomachi & linguae erosio, uentris ac renum inflamma-
tio, uehemens urinæ difficultas, & interdum cruoris exitus, laceratio, &
in plurimis partibus quiddam adustionis sensus, non in Cantharidibus
modo potis reperiuntur, sed in Eruca quoq; pinorum, & Bupreste, &
Salamandra. Porro eos qui Meconium hauserunt, non modo ueterno,
aut sopore premi, stertere, liuore, suggillari, torpere, refrigerari, stupe-
re, sensu priuari constat, sed eos etiam qui Mandragorā, aut Cicutam de-
uorauerunt. Delirium non Hyoschamus tantū infert, uerū etiam quæ To-
xica appellantur. Idem aconitum, & mel quod in Heraclea pontica gi-
gnitur. Strangulatio non minus in fungis, q̃ in sanguine taurino, lacte,
aconito, cerula, gypso conspicitur. In summa, difficile unum uni ueneno **B**
propriū inuenire signum, quod haustum uirus prodere possit. Maxi-
me, q̃ hæc cæterorum etiam uitiorum, quæ in corpore exoriuntur, com-
munia sequi solent. Cæterum in his, quæ celeriter enecant, adnotari for-
tasse, quod inspectum fuerit, licet, ut postea trademus. Sed ijs qui ad lon-
gas aggritudines spectant, nihil ad medendi rationem difficile, dumtaxat,
quod pertineat ad indicia noxæ, utpote cum uenena statim atq; præsentia
neam uim illam perdiderunt, transmutata in longos affectus communia
reliquorum uitiorum remedia, compositionesq; flagitent: cum uenefica
proprietas non amplius insit. Si uero longa sit affectio, in aliquod diu-
tiorum morborum genus recidet, a quibus facile fuerit medendi ra-
tionem assumere. Sed de ijs quæ generaliter auxiliantur, hætenus.
Consequenter quæ priuatim singulis profunt, scriptis mandabimus: si
prius simul exposuerimus, quæ ex singulis ordinibus exitialem, aut maz-
leficam uim sortiunt: ut medicinæ studiosi, intra obseruationē cauti, qui-
busdam eorū medicamentorū misturis utant, quæ memoriæ literarū tra-
dita sunt, & ab authoribus descripta. Imprudentia em̃ magnas adfert no-
xas, & sæpe continuo usu eorū, homo in perniciem agitur. Proinde an-
malia quæ exitiosam uim habent, hæc sunt. Cantharides, Buprestis, Sa-
lamandra, pinorum Eruca, Lepus marinus, Rubeta, & Rana palustris
muta, deuoratæ Hirudines. Semina sunt, Hyoschamus, Coriandrū, Cicu-

D I O S C O R I D E I S

Cta, Gith, Mandragora, Psyllion. Liguamētā, Meconium, Opocarpafon, Thapfia succus, Elaterium. Radices quas mittit chamaeleo, aconitum, thapfia, ueratrum, ixia, agaricum nigrum, ephemerum, quod aliqui colchicum uocant, q̄ in Colchide nascatur. Harbæ oleraq̄, Smilax, quam aliqui thymion appellant, Romani Taxum: Solanum manicum, quod et doricium dicitur: Sardonia herba, quæ ranunculi genus est: corniculatum Papauer, Phtharicumt, Toxicum, Ruta filuestris, Fungi. Ab animalibus taurinus sanguis recens, coagulatum lac, mel Heracleæ in Ponto genitum. Metalla, gypsum, cerusa, calx, auripigmentum, duo Sandarachæ genera, spuma argenti, adarce, plumbum, & quod argentum uiuum dicitur. E uitibus uinum abunde post balneas potum, aut passum, & frigida aqua similiter.

De Cantharidibus.

C A P. I.

Cantharidis

Quibus datae sunt Cantharides, signa eueniunt grauissima. Ab ore enim ad uesicam usq̄ cuncta erodi sentiuntur. Picem, aut simile quiddam Cedriae resipiunt. Dextra praecordia inflammantur. Vrinam aegre reddunt. Et subinde cum lotio sanguinem emittunt. Strigmenta non secus atq̄ dysentericis, aluo deferuntur. Fastidia urgent. Animo linq̄untur. Obortaq̄ uertigine concidunt. Postremo mente abalienantur. Ergo anteaq̄ tale nonnihil accidat, dato oleo, aut supradictorum aliquo, uomere cogantur. Mox ubi uomitione plurima reiecerunt, halicæ aut oryzae, tragi aut pisanæ cremor, aut decoctum maluae, aut seminis lini, aut fœnigræci, aut radicum altheæ, quam latinus sermo Ebiscum appellat, clystere infundatur. Præterea Nitrum eisdem dandum, ex hydromelite: ut quæ stomacho adhuc, aut intestinis adhærent, lingendo excernantur, ac descendant. Quæ nisi intercidantur, ingesta ex Nitro aqua mulsa uacuari debent. Detur deinde uinum, aut passum, in quo pineoli nuclei, aut cucumeris semina contrita sint, aut ex lacte, aut mulsa, aut anserinus adeps in passo liquefactus, inflammatae aut partes hordei farina aut mulsa perunganter. Ab initio admodum cataplasmata nocent: q̄ citatus ab eis calor, illapsum uirus ita remoratur, ut in principes se parteis insinuet. Ipsa tamen interiecto tempore, molestissimis inflammationibus opiculantur. Vtpote quæ dolores & permulceant & leniant. Quo tempore corpus calfaciente oleo, quo facilius introeat, eluere par est. Cæterum omnibus medicina, ut noxium uirus per summa corporis excernatur. Deiectiones multas riam moliri oportet, ne affectus infigatur, & stabilitatem capeffat. Galinaceis carnibus, & hædinis, aut suillis, catulis, maxime pinguibus, & tenerrimis uesci debent. Siquidem aluum cient, atq̄ uenenorum acrimonias hebetant. Vinum dulce liberalius ebibatur. Prodest Thuris cortex, & Samia terra, quæ Aster appellatur: si quaternæ singulorum

drachmæ cum passo sumantur. Item Pulegium, ex aqua tritum. Irinum aut rosaceum cum rutæ decocto, recentes uitis ramuli, cum passo detriti. Longe omnium potentissime antidota auxiliantur, in quatuor drachmis aquæ mulsæ pota.

EX M. VERG. COMM.

INfames quotidianis experimentis, & in interiorē usu a cunctis damnatæ Cantharides semper tuere. Quales autem hæ sint, satis. i. uolumine a scriptore hoc, & a nobis dictum est. Tractataque tunc omni earum medicina & historia, nihil nisi maleficium, in quo diligentiorē esse hominem oporteat, relictum modo est. Quale autem id sit, satis in scriptore hoc patet: Patent & remedia, quæ ab eo deinceps tradita sunt. Idque tam certe & diligenter factum est, ut nihil monuisse legentes nos oporteat: & si plurima in nobis aliorū æditionibus contraria, aut diuersa saltē legantur. Quæ diligentius, & exactius prosequi posthac nobis animus non est. Festinamus enim longiore quæ a principio credidimus, opere hoc defatigati. Cupimus tamen pro nobis in eo legentes laborare: collatisque aliorum in hac parte æditionibus, scriptori huic, & in eo humanæ salutis opem ferre. Ipsi interim in Cantharidibus his uon tacebimus, discrepare alterius interpretationis æditionem a nostra, quo loco Diosc. negat inflammationibus potu Cantharidum factis, imponenda a principio ex hordeacea farina fomenta: causam afferens, *διὰ τὸ ὑπὲρ τῆς νουμίνης διαμαρτυρίας κατὰ χυλούς* & *διὰ τὴν σφίγγον ἐν τῷ τοῦ τῶπος ὄντας κυρίως*. Quod uerum ab eo est. Quia ex calfactis corporibus remedia contineantur, quæ muniendis & defendendis illata uitalibus fuere. Nos autem contrarium concipientes sensum, diximus. Propterea quæ accedente calore retinetur quod datum fuerit, uenenum uitalioribus partibus inhærens. Retulit ille *τὸ δὲ σφίγγον*, id est, quod datum est ad remedia: in quo rei, & sibi ipsi, ni fallimur, aduersari uideat. Negat hic ob calorem a principio fomentis utendum esse: reddiditque causam, quoniam. s. retineatur. &c. Manifesto argumentum sumpta a contrario ratione, uelle conarique Dioscoridem, pelli & excludi pro hominis salute quæ intra eum sunt. At in remedijs optandum querendumque id non est. Quæ quo diutius intra hominem fuerint, eo certius medebuntur. Idque nos cogitantes, de ueneno intelligi oportere in eo participio credidimus: eamque rationem secuti, locum ut in æditione nostra legitur uertimus. Dicit forte aliquis, de remedio intelligendum ob eam causam esse: quoniam nisi descendat, egrediaturque uomitione, aut alui defectione sumptum id remedium, uenenum una non educet, simulque cessans nullam afferet in hoc periculo opem. Non spernendum penitus id esset, nisi hic subiecisset, retineri quod datum fuerit uitalioribus partibus inhærens: quod si de ueneno apte intelligi non potest: & si intellexisse hoc modo etiam id oporteat, ad uenenum & unde mali principium est tota reuertitur res. Non conuenit etiam nobis cum cæteris interpretibus quo loco hic scriptor ait, dandas contra Cantharidum maleficium animalium pingues carnes, καὶ ἀπαλώματα. Eam uocem cæteri ex cōmuni eius æstimatione uerterunt, tenerrimas: nos autem, longiore coctura flaccescentes. Fecimusque id autoribus græcorum medicis, qui in scriptore locum hunc signantes, ταυρὰς in hoc usu carnes exigunt. Significat autem id quod diximus, longiore coctura, & consueque tenerescētes, ut diminutæ primum a sua quantitate, omnem etiam amiserint duriciem. Suntque coctura, non ætate tenerrimæ hoc loco intelligendæ carnes. Eadem etiam dulcis aquæ balneis in hoc periculo uti iubent.

De Pinorum Eruca. CAP. II.

IS qui Erucas Pinorum hauserunt, ilico dolor in ore & palato exoritur. Vehemēs alui, linguæ ac stomachi inflammatio torquet. Intestina dolor excruciat, ita ut pruriginem sentire uideantur. Corpus totum exæstuat, fastidium urget. Quibus est succurrendū, remedijs quæ de uoratis Cantharidibus dantur. Peculiariter tamen pro simplici Oleo et Irino, Melinum quod e cotoneis pomis & oleo temperat, accipiemus.

EX M. VERG. COMM.

Satis secundo uolumine de Erucis dictum a nobis est. Nunc legentes monuisse aliud non oportet, quæ tunc de olerum, nunc priuatim de Picearum Erucis agi: simili quidem, & natura congenere insecto, uiribus tamen & maleficio dissimili. Siquidem quæ in piceis nascunt, præsentem mortis habent causam, ab oibus passim dānatæ: priuatique a scriptore hoc, quæ salutis humanæ cōsulēs, notas

Mm

D I O S C O R I D I S

C uenient earū et remedia breuiter qdē, sed certissime tradidit. Meminisse illud tñ legēs uolumus, quē cognomines his in mari nascunt, Erucēq; adhuc passim aliq; gentibus uocant, nullū habere ueneni maleficium, sed mare incolentibus gentibus in mensarum precio & honore esse.

¶ De Bupreste. C A P. III.

Βούπρεστις

Q Vi Buprestin biberunt, non dissimile Nitro uirus sapitunt. Stomachi, uentrisq; uehemens dolor insequitur. Tam ueter q; stomachus mirum in modum ut in aqua intercutem difflatus, inturgescit. Vniuersa corporis facies contendit. Vrina supprimi. Quibus eadem quæ potis Cantharidibus auxiliantur. Priuatim post uomitus & uacuationes, quas clysteribus molimur, aridē ficus psumunt. Itē earum decoctū ex uino. Vbi uero iam fere pericula inclinantur, thebaicarū Palmularū cibo, aut earūdem tritarum in mulso, aut lactis potu iuuantur. Pyrorū etiamnū omne genus esse, & lac humanū bibere, cōuenit.

E X M V E R G. C O M M.

P Estis acerba boū Buprestis est: & inde illi a græcis nomē. Rarū in Italia animal, antiq; auctores aliqui hoc tradiderunt. Nunc frequētius q; agrestis fortuna & res patitur, interempto quod tidie boue, ruris colono, inueniri agricolę lamentantur. Scarabeo lōgipedi simillimum tradit. Fallit inter herbas, bouēq; maxime: haustumq; ita inflamat, ut rumpat. Vniuerso qdem pecori nocet, sed in maiore bouis q; aliarum quadrupedum iactura: ab eius noxa priuatim nominatū est. Cecinit in Alexipharmacis suis notissimos de eo uersiculos Nicander: nihilq; non ab hoc, & ab alijs dictum & ipse etiam in notis & remedijs monuit. Addidit tamen, colorari labra eius qui Buprestidem hauserit. Versiculus eius est. ἰδὲ ἢ τοι λίτρω μὲν ἱπποχρόνους χαλινὰ. Ex quo in lecta nobis suspicio est, quod nitrum in scriptore hoc legitur, in Nicandro autem λίτρω, potuisse quondam forte aliter legi: nec malefici Buprestidis notam in uiroso rārum odore nitri esse, sed in putris corruptiq; tabi colore simul & odore. In cōmuni tamen græcorum omnium lectione nihil mutauimus. Relinquimusq; in bubus saltem diligentioribus obseruandam rem. Quos etiam monere uolumus. 1. uolumine eiusdem numeri capite, Buprestim Plinio herbam esse, quæ tamen ille non describit: & si Græcos, magna inconstantia, in ciborum laudibus eam habuisse dicat: eosdemq; remedia tanq; contra uenenum prodidisse, boumq; uenenum esse ipso nomine indicari, quos dissilire degustata farentur. Quod quale in eo sit, legentes uiderint. Nobis enim constituisse sibi græci uidentur, nec nisi in uenenorum censu Buprestim constituisse.

D

¶ De Salamandra. C A P. IIII.

σαλαμάνδρα

S I Salamandram hauserunt, linguæ inflammatio consequitur, mens præpeditur. Tremor cum torpore, aut horror quodam ac exolutio accedit. Partes nonnullæ corporis liuoribus circumquaq; suggillantur. Sæpeq; diutius immorante ueneno, putrescentes defluunt. Quibus præstabimus cuncta quæ potis Cantharidibus. Peculiaria uero remedia, resina, pinus, aut galbanum ex melle linctum, & trifaginis decoctum, in quo nuclei pinei conterantur, urticæ quoq; folia, cum lilij & oleo decocta. Profunt etiam oua testudinis marinæ, aut terrestris, cocta. Item ranarum ius, cum quibus eringij radix incocta sit.

E X M V E R G. C O M M.

D Escribitur a ueteribus Salamandra Lacerti figura, stellato corpore, nunq; nisi magnis & continuis imbribus proueniens: tanta natui & intra se congeniti gelui, ut ignes non aliter q; glacies extinguat. Retulerunt idem, sanie, quæ lactea ore eius euomitur, quacūq; hominis parte contracta, defluere pilos: quodq; contactum fuerit, natium colorem in uiriliginem mutare. Addiderunt alij, inter quos & Plinius est. 1. uolumine, capite. 4. inter omnia uenenata maximum Salamandræ scelus & maleficium esse. Siquidem aliorum uenenis singuli, nec plures pa-

riter intereunt: Salamandra improvidos necare totos populos potest. Nam si arbori irrepit, omnia poma ueneno insicit; & eos qui ederint, frigidissima ui enecat. Idem familiae periculū est, si contacto ab ea ligno panis incoquatur. Vel si in puteum deciderit. Habet tamē talis, & tanti mali uis remedia aliquot, quæ capite hoc a Dios. docentur. In quibus a principio statim non est cum alijs idem nobis, quod ad notas haustam Salamandram sequentes pertinet. Illi enim quod nunc in Dios. legiur καὶ διανοία ἐμποδισμός, significatq; usus mentis impedimentū, ut in eo legebatur uerterunt. Nos autem ad sermonis impedimentum, auctoribus græcorum medicis eam transfulimus rem. Siquidem Paulus Aegineta de Salamandræ maleficio agens, καὶ λαλῶν ἐμποδισμός ait: significatq; illi, nō mentis, sed linguæ ad sermonē impedimentum: quod alijs eius mali notis magis cōgruit, linguæ inflammationi, resolutioni, tremorq; quæ omnia sermonis potius q̄ mentis usui officere uidentur. Accessit his etiam in Alexipharmacis suis utriusq; sane euentus testis Nicander, sed in eo quod nos dicimus, certior. Versiculi eius sunt. αἰψὰ μὲν ἐμπρήσθαι γλώσσης βατος, ἅψ' δ' ὑπομάλλουσ' ἀμύνεται, ἐμπαρῶν δὲ κακὸς τρόμος ἄψια δύνει. οἱ δὲ περίφρακτον ἀτερίφωρ ἱρπύουσι τετραπόδου, νοῖραι γὰρ ἀπόφρηνει ἀμείνονται. Eorū sensus est. Statimq; incenditur lingua: & torpore contrahitur. Vrgensq; malus tremor, membra soluit. Illi uero aberrantes, ueluti infantes quadrupedes repunt. Mens enim illis hebetatur: Vtrq; a Nicandro ueneni Salamandræ nota numeratur, & linguæ, & mentis impedimentum. Sed nos magis amauimus, quod Aeginetam & Nicandriū testes & auctores habet: præsertim dicentē hoc impedimentū, quod linguæ & sermoni aptius q̄ menti tribui uideat. Persuasitq; id etiā quod Nicander ait, inflammari linguam, & torpore contrahi. Quo loco aduerbio ἅψ' usus est, quod retro significat: & μάλλιν uoce, quæ in contractione ex gelu facta apte dicitur. Est enim ut græcorum grammatici docent, μαλκύν, frigore contrahi manus & torpere: quod suo gelu Salamandra in lingua facit: torpenteq; ea impeditur eius usus. At Nicander ait, hebetari eis mentem. Fatemur id quidem, nec multo ante diximus, probasse nos hoc magis q̄ illud, quia plures id testarentur: & q̄ aptior hic sermonis ductus nobis uideretur. Nunc autem illud addimus, non aduersari huic sententiæ Nicandrum, sed hanc ultra alias notam mali huius eum ostendere. Nos sic sentimus, & nihilominus poterūt uolentes quod magis probauerint sequi. Nobis grauius testis Paulus Aegineta est, toto huius scriptoris capite hoc in cōmentarijs suis exscripto. Testari cæteri omnes sunt, nō tam qui ex professo hæc docuerunt, sed qui obiter Salamandræ meminerunt poetæ, scriptoresq; alijs, ueneno eius defluere humani corporis pilos omnes. Sic Martialis mulieri imprecabatur. Hoc Salamandra caput, uel sæua nouacula nudet. &c. Et nihilominus a scriptore hoc, alioquin diligentissimo, nihil huiuscemodi traditur. Non tamē negligentia, ignorantiaue eius aliquis id adscripserit. Qui cum bifariam nocere, foris scilicet contactu, & intus haustu Salamandram sciret, alterumq; illud malum leuius esse, nec nisi dehonestamentū decoris facere, alterum in quo de uita ageretur diligentius obijit. Quam rationem secutus Plinius. 10. uolumine, capite. 67. quomodo cōtactu foris Salamandra homini nocet, breuius docuit. Ait enim. Sanie eius quæ lactea ore uomitur, cōtactas hominis partes totum amittere pilum, idq; quod contactum fuerit colorem in uisilignem mutare. Reliquo deinde opere, multis locis intra hominem insecti huius maleficium hoc, aut illo remedio curari præcepit: hic autē, ut diximus, τοῖς σαλαμάνδραν λαβοῦσιν id est, his qui Salamandram hauserint, remedia instituit. Crediderunt aliqui etiam, male in hoc capite legi, remedium illud quod ad Vrticæ folia cum Lilij decocta pertinet: asserētes, auctore Appollodoro, ut Plinius testatur, non cum Lilij, sed cum testudine legi oportere. Plinij uerba sunt lib. 22. capite. 13. Appollodorus & Salamandris cum iure decoctæ testudinis. Ratiocinatiq; in eo sunt, ἀπὸ τῶν χελωνῶν, quæ uox testudines significat, facile κρίναν, id est, Liliorum fieri potuisse. Verum tamen in cunctis græcis eadem lectio est, & Paulus Aegineta inquit, ἡ κνίδου φύλλα συνεικθίντα κρίνισι. Quod est, Vrticæ folia cum Lilij decocta.

De Ephemero. CAP. V.

Sympto Ephemero, quod aliqui Colchicon, aut syluestrem Bulbū ἑφύμερον appellant, pruritus in toto corpore excitatur, nō secus atq; ijs qui urtica, aut scylla laceffuntur. Interna rosionem sentiunt, Stomachus cum ingenti grauitate exæstuat. Cæterum inualecente morbo, cruor strigmentis amixtus, per aluum exigitur. Quibus ut ijs qui Salamandram

Mm ij

D I O S C O R I D I S

C dra hauserunt, uomitione, aut clysteribus auxiliari conueniet. Sed ante q̃ uenenum inualeſcat, dandum eſt decoctum frondium Quercus, aut glandium, aut florum mali granatae. Lac bibere prodeſt, in quo ſerpyllum ſit decoctum. Itē ſuccum ſanguinalis haerbae, aut ramoru uitis, aut rubi, aut medullae recetis ferulae, aut myrti. Baccae autem myrti tuſae tritaeq̃, & aqua maceratae, ut liquor inde ſumatur, opem ferunt. Medicus ſardoniarum glandium liber, ſimile effectum prebet, ſi crudus in alio quo ſupradictorum ſucco ſumptitur. Origanum quoq̃ cum lixiuio epotum. Eximie iuuantur aſinini lactis, aut bubuli potu, etiamſi in ore cōtineant. Ita, ut quibus copia lactis huius adſit, nō aliud deſyderetur.

E X M. V E R G. C O M M.

Q Vale Ephemerum hoc ſit, & quibus locis frequens naſci quondam diceretur, ſatis dictū quarto uolumine ab hoc ſcriptore, & a nobis eſt. Potuit, quia ſumptum ad unam diem uitam proroger, ſic a gr̃ecis nominari. Non aliter q̃ multa alia, quae ob hanc ipſam cauſam Ephemerum, ab eadem gente appellantur. Obſeruatum in hoc capite illud a nobis eſt: uomitiones, & clysteribus inteſtinorum inundationes, quas hic ex Salamandra ad Ephemerum remedia repeti iubet, nullas in ea legi. Oportereq̃ ob eam cauſam ſuſpicari, aut in Salamandra remedium eorum rationem deſſe, aut (in quam partem nobis inclinatur animus) quoniam Cantharidū modo curatur Salamandra: in ea em̃ hic ait, cū fecerimus omnia quae in Cantharidibus iuſſa ſunt, &c. non ex Salamandra, ſed ex Cantharidibus uomitiones, clysteribuſq̃ exinanitiones illas repetendas eſſe. Vtrūq̃ enim pariter competunt, & ex utriſq̃ pariter imperari poſſunt. Licetq̃ non legantur in ea: quia tamen ſiunt, non male id fieri percipitur. Eſt illud etiam animaduertendum, quam Dioſ. ait caſtanearum mediam tuniculam, &c. eam intelligi oportere, quae inter corium & carnem eius ferrugineo colore eſt. Et præter id, quemadmodum primo uolumine in Caſtaneis hic monuit, non tuniculam eam tantum, ſed carnem ipſam etiam contra Ephemerum uim habere: efficaciorē tamen tuniculam hanc eſſe. Quod & Nicander in Alexipharmacis ſuis etiam teſtatur.

D

De Dorycnio.

C A P. VI.

ſtopa uiridis

Dorycnion, quod & aliqui Manicon Solanū appellant, epotum, lactis ſaporē in guſtu refert. Vehementes ſingultus ciet. Humor linguā uexat. Sanguis ſubinde reſcitur. Strigmentofa quēdā perinde quaſi dyſentericis, aluo egeruntur. Itaq̃ anteq̃ aliquid ex iſis eueniat, auxilio ſunt antedicta, uomitus, clyſter, & quęcunq̃ potum uenenum expellere poſſunt. Priuatim iſis opitulatur aqua mulſa, lac caprillum, aut aſininum, dulce uinum, quod tepidum cum aniſo bibatur, nuceſ amaræ, gallinaceæ pectora decocta. Quinetiam conchyliā omnia tam cruda quam toſta eſſe ſalutare eſt. Conueniunt & locuſtae marinae, & gaminari, & pota eorundem iuſcula.

E X M. V E R G. C O M M.

Poteſt, nec male quidem, falſouē Dorycnium uocari quodcunq̃ tela, cuſpides, & ut Poeta cecinit, ferrumq̃ poteſt armare ueneno. A ferratis enim lancearum cuſpidibus, quas gr̃eci dorata uocant, factum illi nomen eſt. Præſtiterunt id, & adhuc præſtant multa. Antiquitas tamē, ſi Plinio credimus, furioſi Solani ſucco ad eam rem primatim uſa eſt: uocauitq̃ ob id Dorycnium. Verba Plinij ſunt. 21. uolumine, capite. 11. Hoc eſt uenenum, quod innocentiffimi auctores ſimpliciter Dorycnion appellauerunt, ab eo, q̃ cuſpides in prælijs tingerentur illo paſſim naſcente. Eſſeq̃ Dorycnium furioſo Solano idem, hic primum teſtatur, dicens: Dorycnium, quod quidam furioſum Solanum dicunt. Teſtatur Plinius quo diximus loco certius: teſtantur gr̃æcorum medici & herbarij omnes. Vtq̃ ab hoc ipſo ſcriptore. 4. uolumine locale ſim-

pliciter dictum Dorycnium est, sic certius, & ex professo nunc notæ & remedia eius docetur. In quibus duo tantum, ex Nicandro alterum, alterum ex Paulo Aegineta monebimus. Sequi haustum Dorycnium hic ait, *ωσπερ γαλακτος ποιότης ἐν τῇ γυνόει*. Quæ uoces nihil significant aliud, quæ lactis in gustu qualitatem, quæ nulla alia quæ: sapor est. Pertinet enim ad gustum ea tantum qualitas. Nicander tamen in Alexipharmacis de hoc ipso Dorycnio agens, inquit, *ἀλλὰ ἀγνὸν φράσειο δορυκνιον οὔτε γαλακτὶ ὥπῃ τι θρώσει τι περὶ σωματικῶν ἵκται*. Quod est. Sed age Dorycnium etiā cōtemplare. Cuius circa os lacti similis est aspectus & cibus. *ὥπῃν* enim ille uocat, quod uidetur, & oculis sentitur: id autē color est; *βρωσειν* uero quod estur: & ex eo saporem, duasque notas has numerat colorem & saporem, & utrunque lacti similem. Hic tamen solum saporem indicasse uidei. Nisi aliquis in cōmuni illa qualitatis uoce qua usus est, colorem etiā intelligi uoluit: uerumtamen eam qualitatem ad gustū hic tamen contraxit. Alterum quod ex Paulo Aegineta monemus, ad remedia pertinet. Quod enim hic ait, cum aniso tepidum passum, ab eo cum exiguo aniso dari præcipitur. Potuit ea uox scriptori huic perijisse. Eaque ob causam ignota legentibus esse nolimus.

De Aconito. CAP. VII.

AConitum statim in lingua inter bibendum, cum adstrictione quadam dulcescit, gustantibusque maxime cum exurgere conatur, uertigines offundit. Lachrymas ciet. Grauitatem pectori & præcordijs adfert. Simulque crebri spiritus deflantur. Quare uenenum uomitione abigi, aut clystere per aluū egeri opus est. Vtūmur inter arcētes potus origano, ruta, marrubio, uel absinthij decocto, cum uino absinthite, uel semperuiuo, uel abrotono, uel chamælaea, aut trisagine. Prodest etiam annuum opobalsami drachma, cum melle aut lacte, cum castorio, pipere, & ruta, æquis ponderibus ex uino. Coagulum hædi, leporis, aut hini nuli cum aceto. Ferri quoque stercus. Item uinum in quo aurum, ferrum, argentumue candens restinguatur potum. Lixiuiaque cum gallina & uino decocta, aut carniū præpinguium iura cum uino sumpta. Fertur & aiuga priuatim ipsis subuenire.

EX M. VERG. COMM.

ATestibus contra testes, ut in iudicijs quotidie fit, pro Aconito agendum nobis est: & unus contra multorum fidem audiendus, haud sane quale Aconitum sit dicentibus: letale enim omnes esse affirmant: sed unde factio nomine in poetis, scriptoribusque alijs tantopere infamis sit. Grammatici siquidem, poetæ, & qui plantarum historiam aliquando scripserunt, a cotibus & petris, in quibus nasci fertur dictum esse uolunt. Naso in Transformationibus suis lib. 7. notissimos cecinit uersus. Quæ quia nascuntur dura uiuacia caute, Agrestes Aconita uocant. Plinius. 27. uolunt mine, cap. 3. eosdem natales illi tribuens, ait. Nascitur in nudis cauitibus, quas Aconas uocant: & ideo Aconitum aliqui dixere, nullo iusto ne puluere quidem nutrire. Secuti hos plures alij, idem tradiderunt. Tamen a grammaticis id receptum est, ut non facile sit decreta eorum conuellere. Conabimur tamen, ueritati consulentes: unusque cunctis his uelut in acie obijciatur Theophrastus. Qui lib. 9. de plantarum historia nasci quidem petrosis locis Aconitum tradit: non tamen a petris nominari, sed a Periandynorum uico, quem Aconas uocabant: ad quem copiosum & efficacissimum nasceretur. Verba eius sunt. *φύεται δὲ πανταχοῦ καὶ οὐκ ἐν ταῖς ἀκόναις μόνον ἀφ' ὧν ἔχει τὴν προσηγορίαν, ἀντὶ δὲ ἰσὶ κόμῃ τις τῶν περιανδύνων, φιλίῃ δὲ μάλιστα τοῦ πετρώδους τόπου*. Quod rum sensus est. Nascitur autem ubique Aconitum, non in Aconis tantum, a quibus appellatorem habet. Vicus autem Periandynorum Aconæ sunt. Amat præcipue petrosa loca. Aequiuoca loci & cotis appellatio, diuersitati huic causam dedit: multoque magis i petris natales eius. Vtris autem magis credendum sit grammaticis censebunt. Est enim omnium grauis, nec damanda fides. Theophrasti tamen auctoritatem poetis, Plinio, grammaticisque nunquam ego ex æquo contulerim. Anceps in hoc capite etiam locus est: illic scilicet ubi contra Aconiti remedia docentur. Dubitari enim potest: iubeat ne Dioscorides sumi cum uino Lixiuia, & elixos gallinaceos: an potius contra Aconitum prodesse lixiuiam, in qua una cum uino elixati gallinacei fue-

D I O S C O R I D I S

C rint. Nos in ambiguo id elegimus quod ab alijs græcorum medicis confirmatur.

μὲν ἐν τῷ ἡρακλίᾳ

¶ De ueneno Heracliæ melle. C A P. VIII.

MEl Heracliæ in Ponto, ubi aconitum gigni solet, Athenis Ionia, Euboicæ Siderites nominatur: quod qui edunt, bibuntue, non secus affliguntur, q̃ qui Aconitum ebiberunt. Iis eadem quæ posito Aconito conueniunt. Adiuuantur in primis cōtinuo uini mulsi potu, cui rutæ folia sint adiecta.

κορίαν

¶ De Coriandro. C A P. IX.

Coriandrum ob odorem latere non potest. Epotum autem, densam uocem facit. Infaniam adfert, a temulentis non aberrantem. Qui sumpsit, pudenda dictu blaterant, totiusq̃ corporis odore uenenum fatentur. Quibus post uomitionem irino oleo concitatum, uti retulimus. Merum & per sese, & ex absinthio potum auxilium. Item oleum. Nec secus oua in eodem exinanita, si liquefacta in muria forbeantur, & epota muria, & ius salsum ex gallina & anseris. Passum quoq̃ cum lixiua sumptum.

E X M. V E R G. C O M M I

D

FAmosa in Carmine suo Coriandra appellans Columella, ancipiti uoce usus, cogitandū p̃teris reliquit, quotidianum ne eorum usum laudauerit; an magis in ueneni maleficio, q̃d habent, monere legentes ea ratione uoluerit. Vtrumq̃ enim nouisse hominem uerissimile est, præcepisseq̃ eorum inter hortensia consuetudinem: & nihilominus quoniam homini nocerent, una illa uocē, nimium, ut hic in Coriandro ait, usum eorum damnassee. Quod ab hoc ipso, uoluntate factum est, cum monuit, maiore copia sumptum Coriandrum graui periculo mentem commouere: ideoq̃ nimium, & continuum uitandum eius usum. Factum & ab alijs græcorum medicis & herbarijs omnibus, inter quos & Nicæder poeta est. Cuius antiquissimus interpres, syluestri Coriandro, non fatiū ueneni maleficio assignat. Nos tamen in plantarum, & medicæ materię historia, syluestre in hoc genere hæcenus non inuenimus. Et quoniam omnes Coriandrum simpliciter nominant, unum tantum genus eius credendum. Plura q̃ Diosc. numerauerit remedia contra Coriandri furorem a Nicandro traditū. Nolumus nos ea docere. In eo enim scriptore parata omnibus sunt. Quod autem nobis cum alijs nō conuenit, ex eo, et Paulo Aegineta confirmandum est. Id scilicet quod hic ait ὁ ἀπὸ κινωθίντα ἢ τὸ αὐτὸ καὶ διεθίντα ἐν ἀλλοτρίῳ φρούρῳ. Qui locus quomodo ab alijs & a nobis redditus fuerit, facile erit uolentibus cognoscere. Quod autem cum altero eorum nobis non conuenit, remedij huius ratio & usus est. Ille enim quæ Dioscorides ὁ ἀπὸ κινωθίντα, id est, oua omni intrinseco humore uacua appellat, nec ultra q̃ illis adijcit, Oua in patinam depleta & subacta cum salugine, uertit. Remediumq̃ instituere uidetur, quasi deplere oua oporteat: & quod ex eis depletum est, subigendum esse, & cum salugine sorbendum. Nobis contra uisum est non quod in ouo clauditur querendum esse, sed depletis omni suo humore ouis, eorum putamina. Vt utiq̃ ad hanc sententiam rationibus his: q̃ in cōstituendo ouorum usu, huic & alijs, semper satis fuit ouis uti præcepisse. Quod enim in illis usum plaurumq̃ habet, interior liquor est: & si hac magis q̃ illa parte uti oporteat, tunc uirellum aut albumen seorsum imperari. Idq̃ tam late in hoc scriptore & alijs patet, ut certius ostendi non sit opus. Hoc autem loco cum iubeat hic scriptor, depletis, id est, uacuis ouis contra Coriandrum uti, putamina eorum tantum imperari opinati sumus. In eamq̃ sententiā nos primum traxit Paulus Aegineta, qui ὁ ἀπὸ κινωθίντα ἐπὶ τὸ αὐτὸ λυαθίντα, in hac ipsa re itidem dixit, id est, euacuata oua, & in seipsa, id est, nullo alio in loco trita & infracta. Traxit & Nicæder, qui in Alexipharmacis suis inquit, πολλὰ χυλὸν ὀρεαλίων ἀπαλὴν ὁδὸν κινάσας, ἀφρόν ἐπεκείρασκει. &c. Qd̃ est, Sæpiusq̃ gallinarum mollem partum euacuans, spumam superinfundens. Manifeste iubet is, gallinarum oua deplenda esse: depletisq̃ue his nihil superest quod intelligi possit, quam putamina. Accedit his communis deinde sensus, in quo auditis depletis ouis, nihil quam putamen

Intelligi relinquitur.

¶ De Psyllio.

CAP. X.

A

PSYLLION epotum, corpori toti frigus & torporem cum exolutione & mœrore quodam affert. Cui omnia quæ exhausto Coriano auxiliantur.

EX M. VERG. COMM.

Refrigerat Psyllion, quæ Pulicaris herba est. 4. uolumine a Dioscoride tractata: suoque frigore uitæ noxias perfrictiones & algores facit. Et præter algores corporis resolutiones, & mentis tristitiam. Qualis ea sit, & quomodo ueneni maleficiû hominis uitæ afferat, ex historia eius facile legentibus patebit.

¶ De Cicuta.

CAP. XI.

Cicuta pota, uertiginem excitat, oculisque caliginem offundit, ita ut minus non cernatur. Singultus ciet. Mentem turbat. Extremi artus gelantur. Denique conuulsi suppresso arteriæ spiritu, strangulantur. Quare inter initia, uti in reliquis, Cicutam uomitu excutiemus. Postmodum deiectionem moliemur: ut quod ad intestina prolapsum sit, excernamus. Tum demum in meracam potionem, quæ maximo est auxilio, deueniemus, dantes non nihil intermissionis. In qua proderit lac bubulum potui datum: aut absinthium cum pipere, & uino castorio, ruta, mētha cum uino: aut amomi, cardamomi, aut styracis uncia: aut piperis cum semine urticæ & uino: aut lauri folia. Item laser ex oleo & passo. Passum per sese largius potum proficit.

EX M. VERG. COMM.

Sunt scriptori huic, & græcorum medicis in Cicutæ remedijs omnia eadem: pleraque tamen illi adiiciunt, quibus tota certius tractetur res. Quale uerbi causa est, quo loco hic Piper simpliciter instituit, illi commune addiderunt: utendumque communi Pipere iubent, ut longum & album ab hoc usu excluderent. Quale itidem cum Lauri folijs teneritudinem adiiciunt, tenerisque eius arboris folijs uti præcipiunt, summos ut nos credimus coliculos eius intelligentes. Quale etiam cum decernente hoc Amomi, Cardamomi, aut Styracis drachmam, illi unciam constituunt. Similiaque his pleraque alia, quæ uolentes diligentioribus in hoc studiorum genere relinquimus.

¶ De Taxo.

CAP. XII.

Smilax a quibusdam Thymion, a Latinis Taxus appellatur. Frigiditatem uniuerso corpori, strangulatus & celerem interitum infert, cui eadem quæ Cicuta conueniunt.

EX M. VERG. COMM.

Ista a nobis quarto uolumine de Taxo arbore fuerunt, quæ satis tunc fore credidimus. Nihil nunc monuisse aliud legentes oportet, quæ ex eo loco repetendam eius historiam: cognoscendamque arborem, quam ueteres græci non Smilax tantum, sed Thymion etiam uocauerint. Hæc enim altera eius appellatio quondam fuit, & si uarie in antiquis exemplaribus legitur: solaque umbra, non succo tantum homini lætalem: non tamen semper, sed ut Plutarchus Symposij sui tertio commentario monuit, quo tempore prægnas flores profert. Ex quo quod in historia scriptoris huius, quo diximus loco legitur, lætalem umbram homini Taxum esse, non nisi cum floret, intelligendum est. Nec caret ratione aliorum quorundam florum exemplo, quorum halitu homini sæpenumero nocetur.

Mm iiij

D I O S C O R I D I S

C De Carpasi succo. CAP. XIII.
E Potus Carpasi succus, soporem, citamq; strangulationem adducit. Adiuuantur autem qui hauserunt, epotæ cicutæ remedijs.

EX M. VERG. COMM.
 Carpeſiā quinto ſuæ medicinae cōmentario uocat Paulus Aegineta, cuius liquorē oēs ho-
 mini letalē faciunt. Meminit eius aliquādo Plinius. Nobis de gñe herbę nō ſatis cōſtat. Verū-
 tamē frigore noxiā intelligere oportet, ex quo iſdem Cicutæ remedijs illi ſuccurritur.

σαρδόνιος πόα
S Sardonia hærba. CAP. XIII.
SARDONIA Ranunculi herbæ generi assignatur, quæ uescen-
 tibz mentem adimit, & quadam neruorum distentione labia in-
 rictum contrahit, ut risus speciem præbeant. A qua quidem affectio-
 ne, de Sardonio Rifu adagium in uulgus aperte manauit. Post uomit-
 tum peculiariter conuenit aqua mulsa liberalius epota, lac, irrigatio,
 perunctioq; a pinguibz totum corpus excaſfacinentibz. In calidam
 aquam, oleumq; descendant. Sed tum multum perfricare & inungere
 expedit. Et in summa, curam omnem quæ conuulsioni neruorum ad-
 hibetur, exequi oportet.

EX M. VERG. COMM.
 Nouerunt nostræ ætatis herbarij Sardoniam herbam, Rifu Apium appellantes. Apulei-
 us in cōmentario illo de herbis, Sceleratam herbam nominat, manifesta a maleficio eius no-
 minis rōne. Nos longius de ea secundo uolumine in Ranunculo herba egimus: quodq; tunc
 factum est, inutiliter agi iterum hoc loco non debet. Poterunt uolentes ex cōmentationibz
 illis nostris quæcūq; opus erunt in hunc locum reuocare.

υοſκίαμορ
H De Hyosciamo. CAP. XV.
HYOSCIAMUM potum, aut comestum similem ebrijs ab alienationem
 mouet. Sed facile medicamentis cedit. Auxiliatur aqua mulsa eo-
 pioſe data, lacq; præſertim aſininum, si id deſyderatur, caprillum, uel bu-
 bulum, uel aridarum ficuū decoctum. Faciunt ad id etiā nuclei pinei, aut
 cucumis ſemen ex paſſo ſumptum, & uinum ſalſum cum adipe ſuilla rez-
 centi paſſoq; itidem urticæ ſemen, aut nitrum ex aqua, & intubus errati-
 cus, & ſinapis, & naſturtium, radix cepæ, & allium. Et hæc ſingula cum
 uino ſumantur: poſt conquieſcant, ut uinum concoquatur.

EX M. VERG. COMM.
 Quæ cognoscendæ Apollinari herbæ neceſſaria erant, quarto uolumine in hiſtoria eius
 dicta iam pridem ab hoc, & a nobis fuerunt. Quo loco, cum dictum a Dioſcoride
 fuerit *μανιόλη χυδὴ καρωτικόν* eſſe Hyoſciamum. Quarum uocum altera inſaniam, altera ſoporem
 ſignificat, dubitandum, quærendumq; legentibz reliquit, an deſit hoc loco, an abundet illic
 altera illa ſoporis uox. Ex his ſane quæ hoc capite traduntur, abundare illic uidetur. Ex quo
 inquit imperandam eſſe quietem, ut potum ebriorum modo uinum concoquant. Quæ impe-
 randa non erat, ſi *κάρων*, id eſt, ſoporem Hyoſciamus faceret. In maleficio eius præterea a græ-
 corū medicis nihil aliud, q̃ ebrietati ſimilis amentia numeratur. In anguſto uerſatur res, ut aut
 ex Hyoſciamu hiſtoria eam expunxiſſe uocem oporteat, aut quod illic *καρωτικόν* eſt, contra cō-
 munem uocis eius æſtimationem ad capitis affectionem aliam transferendum ſit. Omnia toto
 hoc capite, omnibz eadem ſunt: præterq; in extremo calce, in quo aliter uoces ſuas concipit
 Paulus Aegineta: monetq; imperandā eſſe quietem, ut non aliter q̃ ebrij potum ſomno con-
 coquit uinū. Sic etiā quiete ſua qui Hyoſciamū hauserint, ueneni eius uim pariter concoquāt,
 Nihil em̃ in re alioquin haud multifacienda mutauimus, ſatis imperatā quietē fore opinati.

¶ De Mandragora.

CAP. XVI.

A

Mandragora si bibatur, confestim sopor insequitur, exolutio, ac uchemens ueternum, nihil temere distans a lethargo. Cui antequam aliquid ex his accidat, uomitus ex aqua mulsa proderit. Postea nitrum, & absinthium, ex uino dulci aut passo sumantur. Caput rosaceo & aceto perfundatur. Proficit excitatio & motus corporis, & olfactus eupatorii, & piperis, sinapis, castorii & rutæ, tritorum in aceto, & liquidæ piscis, & odor e lucernarum extinctu. Quod si ægre si reuocentur, sternutamenta mouere, alijsq; communibus auxilijs uti conueniet.

EX M. VERG. COMM.

Sopor primum malo somno hominem Mandragoras. Idq; non tantum hoc loco Dioscorides in historia. 4. uolumine longius ab eo traditum est. Remedia nunc tam noxiæ quietis traduntur. Primumq; locum uomitiones, & mulsa aqua sibi uendicauerunt. In quibus non conuenit nobis cum alijs interpretibus. Illi enim uomitiones, & aqua mulsam coniunxerunt, uomitus ex aqua mulsa prodesse, & uomitiones moueri, & aqua mulsam dari dicentes. Nos ex Græcorum medicorum disciplina, conferre quidem uomitiones diximus, sed a uomitionibus statim mulsam dari aquam. Habuimusq; in eo auctorem Paulum Aeginetam, qui scriptoris huius caput hoc exscribens ait, ἔρμης δὲ πρὶν τούτων τὴν συνθεσὶν ὅτι ἔμειθε, καὶ μετὰ τούτων μολιπρατον. Quod est. Prodest priusq; quicq; horum fiat uomitus, & post hunc aqua mulsa. Cogitauimus etiam, quoniam ab eodem scriptore inter Mandragoræ remedia non numeratur Eupatorium, multoq; magis, quoniam nihil quod ad hoc faciat in decretis Eupatorii a Dioscoride traditur, aut abunde dare eam uocē, aut pro quapiā alia male eam illic legi. Quod signasse tantum uoluimus.

¶ De Meconio.

CAP. XVII.

B

EPoto Papaueris succo, quem Meconion uocant, consequitur ueternum, cum perfrictione & pruritu uehementi: ita ut sæpe in ualescente ueneno tanta crumpat prurigo, ut hominem excitet. Corpus id medicamentum olet. Post citatam oleo uomitionem, acres clysteres auxiliantur, acetumq; mulsam cum sale potum, aut mel cum rosaceo calido, merum cum Absinthio aut Cinnamomo copiosum, aut calidum per se acetum, nitrum ex aqua, & origanum cum lixiua, aut passo, & rutæ syluestris semen cum pipere, uino & panace, piperq; cum castorio & aceto mulso, uel cum satureia, aut origani decocto cum uino. Si olfactibus excitandi. Ob enatam pruriginem in balneas descendat, & foueantur. Post lauacrum prodest iurium pinguium usus, cum uino, aut passo. Medulla etiam ex oleo pota.

EX M. VERG. COMM.

Numerant a Nicandro in Opii potu, præ perfrictiones, soporē, languorem, pruriginē, & toto corpore Opii odorē, notæ aliæ plures: pallida facies, labrorū igneus color, exigua & frigida respiratio, liuescentes ungues, distortæ nares, & concaui oculi. Addidit illud etiā, odorem quē Dioscorides ait toto corpore reddi una cum sudore, ueluti ex labore euaporari.

¶ De Corniculato Papauere.

CAP. XVIII.

Papauer quod Corniculatum appellat, & potu, & cibo eadē inferre consuevit quæ Papaueris succus. Nec alijs expugnat auxilijs.

¶ De Pharico.

CAP. XIX.

PHARICON, quod uocant, sapore syluestre Nardum imitatur.

D I O S C O R I D I S

Catur. Resolutionem neruorum potum adfert, cum conuulsione & delirio. Oportet autem post uacuationes uinum Absinthiten potui dare, cum Cinnamomo, aut Myrrha, aut Nardo gallico, quod Serinē aliqui uocauerunt, aut Spicæ nardi duas drachmas, & myrrhæ totidem obolos, cum passo, iri, & rosīs ex uino. Derasumq; caput illinire hordeacea farina cum aceto, & trita ruta.

E X M. V E R G. C O M M.

Quid, qualeq; fuerit Pharicum, non satis inter antiquos scriptores constat: simplex alijs, alijs contra compositū tradentibus: & quod hactenus legisse me meminerim, nullo eorū, siue simplex, siue compositū fuerit genus eius, & substantiā indicante. Incerta posterioribus græcis ratio nominis etiā fuit, & si a gentibus & locis aliquot Græciæ dictum oēs testent. Quidam em̄ a Pharis in Arcadia: quidā a Pheris in Thessalia: quidā postremo a Pharide in Laconia, cuius meminit Homerus, Pharicū dictum uoluerūt. Nec defunt, qui ab inuēto sic uocatū putent. Athæneus in tertio sui Dipsosophistæ, quo loco de Cotoneis malis agit, nisi uitiū in eo sit, non Pharicum, sed Phariacum noiauit. Verba eius sunt, τὸ γὰρ φαρικὸν φάρμακον. &c. Nec ipse etiā, alioquin in huiuscemodi multus & diligens, quicq; de nomine, aut substantia ueneni huius docet. Refert tamē, quod miretur aliquis, in cæteris non legi, neq; inter remedia a quocq; numerari, infringere ueneni huius uires mala Cotonea: & ex Philarcho in. 6. hystoriarū suarum narrat, Cotonea hæc mala odoris sui bonitate letalium uenenoꝝ uires hebetare: Pharicumq; hoc uenenū, Cotoneis malis mixtū, amissa nocendi potestate euanescere: deprehensumq; id fuisse, dato homini Pharico qd̄ inter Cotonea mala fuisset, nullo mortis, aut ueneni malefici secuto euentu. Cæteri itidem oēs proposito Pharico, descripsiꝝq; notis, & traditis remedijs nihil ultra de eo docuerunt. Quo fit, ut credamus, tam notum tunc oibus fuisse Pharicum, q̄ nunc nobis incognitū est: & ut in re nota sit, tacuisse cætera omnes qui de eo agerent. Ne descripta re, male & scelerate agere, & ueneni uti discerent homines.

D
781xv

De Toxico.

C A P. XX.

Toxicum ex eo nominari uidetur, q̄ barbarorum sagittæ eo illinebantur. Qui biberint, labiorum & linguæ inflatione torquentur. Incoercitus furor uarias hīs imagines obuerset. Quare uix medicinæ locus est, raroq; qui hauserunt, euadent. Vinculis ergo cohibendi, ut uinum dulce cum rosaceo bibere, & reuomere cogantur. Rapi semen bibendum. Priuatim hīs conuenit quinquefolij radix, & hircinus sanguis, aut caprillus, eodem modo sumptus. Roboris, fagi, aut ilicis cortex cum lacte tritus. Malaq; cotonea trita esse, aut cum pulegio & aqua bibere, conueniet. Amomum & balsami semen ex uino. Sed qui periculis defuncti sunt, diu lecticis defumbunt: & ubi surrexere, stupidi reliquum uitæ tempus degunt.

E X M. V E R G. C O M M.

Plinius. 16. uolumine, cap. 11. de Taxo arbore agens, his uerbis Toxica descripsit. Hanc Scythius Smilacem a Græcis uocari dixit, & esse in Arcadia tam pſentis ueneni, ut si qui dormiat sub ea, cibūue capiant, moriant. Sunt qui & Taxica hinc appellata dicāt uenena, quæ nūc Toxica dicimus: qbus sagittæ tingunt. Sunt, ut uidet Plinio, Toxica ex Taxi arboris succo confecta uenena. Huic autē egre credat alijs, idem Plinij Toxici hoc esse. Siquidē non multo ante priuatim de Smilace. i. Taxo arbore egit, perfrictionesq; & strangulationes suo frigore facere dixerat: ideoq; non credendū aliter, & iterū de ea ab eodē nunc agi: pſertim non congruentibus, nec hīsdē in utroq; ueneno notis. Relinquit ob eā causam, ut credamus a sagittis Toxicū noiatū fuisse, certi quondā gñis uenenū, qd̄ ex q̄tidiano frequentioreq; usu antiquas sic appellauerit: scilicet tunc oēs uenenū, & ueneni propriū genus. Nunc autē in multiplici adtingēdas sagittas, cuspidēsque alias ueneno, quo passim uti, nisi obstarent leges, liceret, non facilem habet intellectum, nec discerni ex eo usu, & ab alijs potest, quæ multis cōmunem & eundem habet.

De Ixia.

CAP. XXI.

A

IXIA quæ Vlophonon appellatur, inter potandum aliquid Ocimo simile redolet. Vehementem linguæ inflammationem excitat. Mentem mouet. Omnes excrementorum exitus supprimit. Strepitum cum animi deliquio ciet. Iis intestina latrant, nec secedit quicquid. Post uomitionem, aluumque resolutam, auxilium præstat, aqua in qua Absinthii maderuerit, ex uino largiore, aut aceto mulso pota. Rutæque syluestris semen, aut laseris radix. Item Tragorigani decoctum, cum aliquo supradictorum, aut lacte, aut resina terebinthina, aut nardo, aut castorio, aut laserpicio, quorum singuli oboli conueniunt. Quin & nuces iuglandes, cum resina, castorio, & ruta tritæ, ita ut singula drachmæ pondus æquent. Idem Chamelææ, aut Thapsiæ, aut Absinthij succi sicilicum cum aqua mulsæ, & acetum calidum potum.

EX M. VERG. COMM.

Viscum pluribus locis Plinius græcorum Ixiam hunc uocauit: duo diuersi generis in plantarum historia, nulla discriminis adiecta nota, eadem appellatione indicans. Quod an uicinitate nominis in græcis deceptus fecerit (Ixon enim illi arborum Viscum, Ixiam uero quod nunc tractamus uocant) an sciens, uolensque, negata sibi in latina re appellatione, qua Visco penitus si milem rem indicaret, non est propositum nobis modo ostendere. Fecimus enim id in Chamæleon: & ante nos certius, longiusque non multo ante hæc tempora Leoniceus diligentissimæ lectionis, & egregiæ eruditionis homo, in Epistola ad Menocium Lucensem medicum idem etiam fecerit. In qua multa breuitate, summaque diligentia ueterum & posteriorum scriptorum, de tota hac re dicta collegit. Quorum summa est, aliud ab Ixia hoc Viscum esse: hoc in multis arborum ramis nasci, nec ueneni maleficii habere: illum ad radices Chamæleonis, albi spinæ noxiū adnasci, pluribusque alijs inter se notis & uiribus distinguere: patereque id in græcis, quibus Viscum *ixos* sit, non *ixos*: quæ uox a Visco quidem facta fuerit, non tamē Viscum significet, sed quod paulo ante diximus, Chamæleonē album: cui, quemadmodum hic tertio uolumine tradidit, aliquibus locis Viscum adnascitur: quo pro Mastiche ad nitorem cutis mulieres quondam utebantur. Et hunc non in arboribus natū, illud inter uenena numeratū quondam est: ideoque Vlophonos dictum: quoniam, ut in historia utriusque Chamæleonis hic docuit, canes, fues, quadrupedesque alias in cibo enecet. Non debuerat, ut uidetur, cum Visco misceri Ixias, qui Viscarius potius adiectiua forma, quæ Viscum a Græcis notatus fuisse uideri potest: ideoque nos, ne simul æquiuoca uoce duo diuersa miscerent, alterum Viscum, alterum uoce græca Ixiam notauimus. Barbarus Plinius secutus, masculino genere græcorum exemplo Viscum Ixiā hunc uocauit: quod in dispescenda re non semper satis est. Illud uolumus legentes monere hoc loco, cum proponeret a principio uoluminis huius Dioscori, quæ in rota natura ueneni maleficii habent, inter radices Chamæleonē, non Ixiā numerasse: in reddendis deinde notis & remedijs, Ixiā, non Chamæleonē notasse. Nec dubitandum alicui erat, hoc, aut illo loco uitiū esse. Idem enim Ixias, & Chamæleon est: nisi Paulus Aegineta quinto suæ medicinæ, uolumine huiusdem omnibus uerbis scriptorem hunc commentarijs suis miscens, Ixiæ & Chamæleonis duo seorsum capita legentibus cognoscenda reliquisset. In quorum altero albi, in altero nigri Chamæleonis maleficia traderet notis & remedijs penitus diuersa. Respondetque id duorum Chamæleonum historia. Vterque enim Vlophonos æqua nocendi potestate notatur. Eamque rationem, ut credimus, secutus Paulus Aegineta, seorsum de utroque inter uenena etiam docuit. Quod si easdem notas ambo haberent, ipsedemque remedijs curarentur, credere ego hunc scriptorem breuitati consulente, uno eodemque capite de utroque egisse. Sed cum diuersa in eis omnia sint, uitiū suspicari omnes cogimur: relictūque in uenenorum censu Ixiā, in notis deinde & remedijs Chamæleonē. Nec enim uerisimile est, reliquisse hunc, quod alij commentaria eius exscribentes, tradiderunt. Irrepissimamque id uitiū uerisimile est, ab aliquo, qui medicæ materiæ, & plantarum historiae parum peritus, bis repetitū idem esse ratus: tanquam superuacaneam utrobique alteram reliquerit uocem. Persuademur nos hoc facile, ex eoque præsertim, quod in censu uenenorum propositus Chamæleon, in remedijs deinde redditus Ixias est. Quod futurum non erat, nisi propositum

B

D I O S C O R I D I S

C tus a principio Ixias cum Chamæleone fuisset. Nec proponendus Chamæleon, si reddendum aliquid in eo postea non erat. Ixias tota res in scriptore hoc patet: nec repetere quæ præmonstra-
ta sunt, opus est. Quid autem in Chamæleone desiderari possit, id nos ex Paulo Aegineta repe-
temus: qui ut cætera ab hoc scriptore accepta cōmentarijs suis inseruit, sic Chamæleonē etiā
exscripsisse credendus est. Verba de Chamæleone nigro eius hæc sunt. Haustum Chamæleo-
nem nigri erosio, dolorq; ingens sequitur: & cum stomachi euerfione totius corporis tremor.
Accedit mox & conuulsio, biliosiq; & spumosi uomitus. Sunt etiā quibus singultus cum pri-
uatione uocis, distortiq; uultus fiunt. Confert triticeæ farinæ cremor pinguis calidusq;. Tum
uomitibus & lactis potus. Prodest clysteribus etiā infundi quod kene sit. Pro sunt & fomenta em-
plastri modo imposita. Verū contra strangulationes, liuoresq; facientē Chamæleonē, prode-
rit potum Absinthii, nitrūmue cum aceto mulso, aut Raphanis. Proderunt & præcordijs im-
posita fomenta. Sunt hæc nigri Chamæleonis ex Paulo Aegineta notæ & remedia. Quæ ob
cas, quas paulo ante diximus causas, ne quid huic operi deesset, addere placuit.

De Cerusa.

C A P. XXII.

φρυμίδιον

C Erusa suo colore proditur. Quippe palatum, gingiuae, lin-
gua, & commissuræ dentiū, candamore quodam inficiuntur.
Singultus, tussim ac linguæ ariditatem excitat. Iis extrema frigescunt.
Mens labat. Membra torpescunt. Quibus dare conuenit aquam mul-
sam, aut ficuum, aut maluæ decoctum, aut lac calidum, aut Sesamam
ex uino tritam, uel lixiuiam ex sarmentis factam. Amaracinum oleum,
aut Irinum, Persicorum ossa cum Lilij decocto. Columbina oua cum
thure, aut hordei decocto, aut prunis, aut gummi quod ulmus plora-
uit, aut humore quem ulmea folia reddiderunt, cum tepida aqua. Sed
tum quoq; uoiant. Conuenit etiā Thapsiæ succus, aut Scammonia
cum aqua mulsa potus.

E X M. V E R G. C O M M.

Sunt toto hoc capite plura, quæ alijs interpretibus, & nobis eadē non sunt. Diverfitatisq;
nostræ una est causa, q̄ impressum scriptoris huius illi codicem secuti, alios eiusdem rei aucto-
res non consuluerūt, nec quæ aptius & uerius dici poterant, cogitauerūt: ideoq; qualia se oīa
obtulerūt, talia etiā reddita ab eis sunt. Nos contra auctore Nicandro, & antiquis græcorū me-
dicis, q̄d in scriptore hoc erat, & Persicorū ossa cum Liliorū decocto, cum hordei decocto uer-
timus. Illi enim non σὺν κρίνῳ ἀφελήματα, quod est, cum Lilij, sed σὺν κριθῶν, quod est, hordei de-
cocto dixerūt. Eadem rōne quod legebatur, ἡ κοκκυνήλοις, significatq; cum prunis, cum pru-
norum gūmi uertimus. Quicq; folijs ulmi cōtineri humor dicebatur, folliculis eius arboris con-
tineri diximus. Illis enim, non folijs continetur. Pluraq; alia mutauimus, quæ monētibus illis
naturæ rerum, & ueneni huius remedijs male respondebant. Quæ poterunt uolentes per se
certius uidere. Cogitabunt etiā, in Persicorum ossibus, quæ Cerussæ aduersari hic ait, an
tritæ ossium eorum putamina, an interiores nucleos intellexisse oporteat. Nicander sane in Ale-
xipharmacis suis putamina intellexisse uidetur. Versiculi eius sunt. καὶ τὰ κατατριβέντα μετ' ἄρ-
γυοντος ἰλαίου σκληρὸν ἀπὸ περιστάσεως κάρνα βλάπτει διὸν ἐκρίψαι. Quod est. Quinetiam tritæ cum splenden-
te oleo duræ Persicæ arboris nuces malum egregie dissolciunt.

De Fungis.

C A P. XXIII.

μύκητες

F Ungorum alij genere, alij copia lædunt. Omnes tamen strangu-
latus suspendio similes concitant. Quibus confestim succurren-
dum. Communiter ex oleo uomere cogendi. Mirifice iuuat lixiuia ex
sarmentis, aut pyrastris furculis, epota cum sale, posca, & nitro. Pyra, aut
folia pyrastris cum fungis decocta, strangulantem illam uim auferunt,
mansaq; eisdem auxiliantur. Aduersus Fungos gallinacea qua cum po-

Isca proficiunt, adiecta aristolochiæ drachma. Item absinthium cum uino mellecq; sumptum, & ex aqua potum. Apiastrum ex nitro, Panacis radix in uino, Fax uini cremata cum aqua, Aeris flos ex aceto, Radix sinapis & nasturtium esu profunt.

EX M. VERG. COMM.

Nascuntur ab æstiuo & autumnali imbre statim euocante sole Fungi omnes. Nec minus q̃ tonitrua tubera, optabiles Fungi pluuias eo tempore hominibus faciunt: haud sane omnibus, sed his qui, ut Hesiodus cecinit, infelicitatem suam & malum amantes, naturæ potius monstris & uenenis q̃ melioribus & tutioribus cibis uesci gaudent. Male, exceptis prætensibus, autore Flacco, alijs creditur Fungis. Male etiam, autoribus græcorum & latinorum medicis, in cibos receptis uescimur. Omnes enim, ut hic a principio statim monuit, uel genere, uel copia nocent. Eamq; ob causam debueramus tam male tuto cibo abstinere omnes. Verum quoniam nouitate potius q̃ suauitate elus illecti, presenti uitæ periculo æstiuas & autumnales cœnas hoc cibo etiam instruiamus, debuerant cæteri interpretes in docendis factarum a Fungis strangulationū remedijs, diligentiores esse: meminisseq; ambo, non præcipere Diosco. contra Fungos bibendū ex aceto æris florem, sed atramentum sutoriū. Nec si etiam χαλκόν ἄνθος passim in scriptore hoc legatur, pluris librariorum incuriam, q̃ scriptoris huius decreta facere: in quo cum responderant prius ultima, & sibi inuicem omnia, facile erat ex Atramēto sutorio, quod Chalcanthum græci uocant, locum emendare. Quæ enim ipse hic scriptor pro Fungorum maleficio illi moner, huiuscemodi sunt. χαλκόν μύκητες λαβόντες βοτάνη. Quod est, Et his qui Fungos hauserint opem fert. Priuatim inter ceteras quas habet Atramentum sutorium uires, Fungis opem ferre a Diosco. dicitur. Quod Flori æris neq; ab hoc, neq; ab alijs tribuitur. Oportebat etiam alterum eorum non coniungere, copulareq; simul, salem, & nitrum, sed hoc, aut illud præcipere. Hic enim alterum uti moner. Habetq; res certam ex natura rationem: quando similis, aut non adeo diuersæ naturæ sunt nitrum & sal. Sunt etiā pleraq; alia, quæ non sunt nobis cum illis eadem, sed leuiora, & ob eam causam relicta. Monemus illud etiam, quod a legentibus forsan desiderari poterit. Quæ hic iubet simpliciter, gallinarum oua cum posca bibi, non uideri nobis integrū. Siquidem græcorum medici ἀφελμύνα ἢ ἐξυμράτι sumi iubent. Quod est, in posca elixa. Quin etiam quod hic ait, μέλι ἐστὶν ἐν τῷ βρώματι, id est, mel in cibo, illi ἐν λιχόδωρον, id est, in eclegmate dicunt. Et quam hic Panacis radicem tantum, illi radicem & semen. Addiderunt præterea, quoniā in Fungis a uenenatis corrosi aliqui non tantum strangulant, sed ex diuersa alterius ueneni ui intestina exulcerant, dandum in eo periculo copiosum absinthium, caricarumq; & origani decoctum: multa aqua cogendos ad uomitum qui in periculo sunt: calida lauari aqua: imponendaq; præcordijs emplastri modo farinam liordeaceam, hydrelgo maceratam. Relictum hoc ut credimus a Diosco. est: quoniam ad aliud ueneni genus pertineret. Quod ex suis notis cognitum suis remedijs etiam curandum esset. Hoc enim capite de Fungis, eorumq; maleficio, non uenenatorum uenenis agebat. Monuerunt hîdem græcorum medici nos etiam, ut in extremo capite contra q̃ alter ex interpretibus fecit, non Cardamomū, sed Nasturtiū uerteremus. Illi enim manifeste καὶ ναστόριον ἐστὶν ὀνόμαζον, id est, in cibo Nasturtia Fungorum maleficio aduersari testati sunt.

De Gypso. CAP. XXIII.

Lapidescens Gypsum strangulationem creat. Quare eadem proferenda sunt, quæ mansis Fungis auxilia. Inter quæ habetur maluæ decoctum, quod etiam olei uicem pensat. Vtpote cum pingue sit, euomendq; lubricitatem inducens, deradi corpora non finit. Quod ubi duratur in lapidem, efficit. Quinetiam prodest oleum ex aqua multa, aut ficorum decocto. Lixiuiā e ficulneo cinere, aut sarmentis facta, cum uino copiosiore pota. Origanum, aut thymum cum lixiuiā, aut aceto, aut passo. Loca decocto maluæ proluenda.

EX M. VERG. COMM.

Non est quod in Gypso legentes monteamus, præterq̃ autoribus hîdem græcorum medicis passum dysferibus infundi, nō cū origano, aut thymo, lixiuiāq; & aceto bibi a nobis in ex-

Nn

D I O S C O R I D I S

¶ tremo capite dictum fuisse. Illi enim remedium sic docent: uisumque est rationem habere, quod male uidentur similiter coniungi posse, & alternari diuersarum uirium acetum, & passum. Poterunt tamen legentes quod magis probauerint sequi.

αἷμα ταύρου

¶ De sanguine Tauri. CAP. XXV.

TAuri recens iugulati sanguis epotus, spirandi difficultatem strangulatumque concitat. Faucium meatus cum neruorum distentione praecludit. Lingua rubescit. Cruore dentes inficiuntur. Quaedam concreti sanguinis uestigia, inter eorum commissuras restant. Quare uomitum uitabimus. Sanguinis enim globi per extractionem eluati, magis stomacho inculcantur. Dari ergo opus est quae concretum sanguinem discutiant, aluum subducunt. Grossi lacteo succo turgent ex posca, & nitrum per sese auxiliantur. Nec secus coagulum omne, cum acetato & laserpitij radice, aut lasere. Item & brassicae semen, cinisque ficulneus. Conyzae folia, cum pipere, & rubi succus ex aceto. Alius resoluenda. Seruatis fluida per sedem ingeri consueuerunt. Stomachum, aluumque hordeacea farina ex aqua mulsa perungere oportet.

EX M. VERG. COMM.

Sunt hominis & brutorum sanguinis notae, uires, & euentus uarij. Quemadmodum. i. uolumine longius dictum in sanguinibus a nobis est. Nunc unius tantum describenda malefica uis, & in tota sanguinum historia dammandus Tauri nup iugulati: quoniam celerime coit atque durefcit, ideoque pestifer homini, praesertimque potus. Veneni maleficio infamis, miserabili genere mortis graecorum historias & poetas implet. Deprehenderunt id in diuina re mortales, cum iugularis ad sacrificium tauris, quae aderant superstitiosiores calentem adhuc biberent: noua & indigna deo ratione hac sanctitatem incolumitatemque suam augere se existimantes. Nullus tamen clarius hoc genus mortis quam Themistocles fecit, quod post pulsum e graecia Xerxes, exul a patria, accepto ab Artaxerxe exercitu, siue nolens, siue desperans quae illi contra graecos pollicitus fuerat praestare: in Ioniae Magnesia decempro cultuario ipse taurum in sacrificio tenens, exceptum poculo sanguinem repente hausit: ut esset eo tempore anteposita uitae mors, perpetuum uoluntatis honorisque sui testimonium, quod semper ciues sui meminissent. Caneretque pro se in Helena Sophocles *ταυρὸν δὲ λαόν αἷμα ταύρου γ' ὑπὸ πινύ. καὶ μέγα λίσσεται δ' ἔχον αὖθις φημίαι.* Et Aristophanes in equibus suis. *βλάτισον ἢ μὴν αἷμα ταύρου πινύ. ὁ θύμισο κλέος γὰρ θάνατος ἀπὸ τῶν τῶν.*

ταύρα ἔμπν -
ταυρὸς

¶ De Coagulato lacte. CAP. XXVI.

Eos, qui coagulatum lac hauserunt, frequens strangulatio inuadit, quod in globulos quosdam lac coalescat. Quibus pro antidoto iuuandis, coagulum ex aceto damus. Et bibere saepius cogimus. Damus & calaminthae folia arida, item succum. Aut laserpitij radicem, aut laser cum posca. Thymumque ex uino, & lixiuiam. Sed nulla salisago obijciat: quoniam magis lac coiret, & in caseum densaretur. Neque illos uomere conuenit. Siquidem concretum lac sese in stomachi angustias insinuans, strangulat.

EX M. VERG. COMM.

Non habet ueneni maleficium Lac simpliciter coagulatum, alioquin nullus esset in cibo eius usus: sed quod antequam concreuerit admixto illi coagulo aliquis biberit. Coit enim in stomacho, & coaguli uis, quod illi admixtum est, concrefcit in grumos: concretionemque illa interiores obstruit meatus: obstruuntque his, strangulationes facit. Plinius mali periculum huius genus diuersis locis diuersis uocibus indicat. Nos ex re, & ex graeci nominis uis, lac propositum quod admixtum habebit coagulum. Id enim *ἐμπνυαθῆν* participium indicat. Ceteri interpretes coagulatum simpliciter lac uerterunt. Nobis placuit certiore illam rei indicationem sequi. Placuit etiam inter remedia nihil potius quam quod ignoraremus asserere, quo loco, si relictum inane spatium non pro

cul a fine capitis est. Quem alter interpretum dissimulauit, alter lutum simpliciter dixit. Diodoridis uerba sunt, *καὶ τὴν πλοποιτικὴν κοίαν*. Pertinetq; id ad lixiuæ genus aliquod: quale autem, non satis nobis constat, nisi forte hic præceperit utendum lixiuæ quæ non per cinerem, sed terram traiecta fuerit, *πυλόν* enim lutum & aqua dilutam terrâ græci uocant. Sed nihil in ea re cõperit aliqñ nobis est. Potuit forte etiam ea imperari lixiuæ, quæ non traiecta per cinerē aqua, sed uino facta esset, *πυλόν* enim antiquissimi uinum etiam uocauerunt. Et in hanc partem inclinat nobis animus. Nihil tñ constituimus, integram rem peritioribus seruantes.

¶ De Argenti Spuma. CAP. XXVII.

Spuma Argenti pota, stomacho, uentri, & interancis grauitatem cum magnis torminibus adfert. Et nonnunq; pōdere suo intestina uulnerat. Vrinam suppressit. Corpus intumet, plumbeamq; deformitatem cōcipit. Quibus subuenit secundum uomitionem, potum syluestris hormini semen, myrrhæ drachmæ septem. Absinthium, hyssopum, apij semen, aut piper, aut ligustri flos ex uino. Aridum palumbis fimum, cū nardo & uino.

EX M. VERG. COMM.

VNa tantum litera Cypros, quæ latinis Ligustrū est, a Cypero, q̄ quadratus odoratus lunus ipsidem dicitur, differt. Ideo facile fuit in antiquis exemplaribus scriptoris huius alteram uocem pro altera scribi. Diuq; nos anxij, cum uariarent in his antiqui etiam græcorum medici, Nicandrum testem secuti, Ligustrum uertimus. In eo em̄ carminis necessitas non aliter q̄ ligustrū legi posse & debere ostendit. Versiculus eius est, *κύπρον τε βλαστία νιανθία*. Quod est. Et Ligustri nuper florentes germinationes.

¶ De Argento uiuo. CAP. XXVIII.

Argentum uiuum potum, eadem quæ Spuma Argenti infert. Eisdemq; utendum auxilijs. Lac copiose potum auxiliari constat, sed postea euomant qui hauserunt.

¶ De Calce, Sādaracha, & Auripigmēto. CAP. XXIX.

CAlx, Sandaracha, & Auripigmentum, pota, aluum et intestina cum uehementi erosione excruciant. Præbenda cuncta quæ suffrenare & soluere possunt, & facilem lubricamq; aluum reddunt. Cuiusmodi maluæ succus est. Dandum decoctum seminis lini, uel fructus Tragi hærbæ, uel Orizæ, lacq; cum aqua mulsa copiosum, iura pingui, & boni succi.

¶ De Lepore marino. CAP. XXX.

Qui Leporem marinum biberunt, piscium uirus olēt. Intercedēte aliquo tempore, aluus dolore afficitur. Vrina sistit. Et si quando eam reddere contingat, purpureum colorem referet. Omne piscis genus auersantur, & odio habent, Foetido ac graui sudore manant. Biliosus uomitus, interdum sanguini promiscuus subsequitur. His dandū lac asininū, uel passum cōtinue, aut radicis maluæ, foliorūq; decoctū, aut tria cyclamini radix cum uino, aut ueratri nigri, aut scamonij drachma cū aqua mulsa, puniciq; mali acinis. Cedria cōtrita cū uino efficax ē. Anserinus sanguis ut tepebit potus. Sed cū pisces oēs respuant, aspernenturq; solis fluuiatilibus cancris uesci possūt, bibuntq; eos admisto uino, adiutiq; præcoquunt. Cumq; comesse pisces cœpe-

Nn ij

D I O S C O R I D I S

Crint, suae salutis indicium est.

¶ De Rubeta.

C A P. XXXI.

opra

Rubeta, aut Rana palustris assumpta tumores ciet. Pallor corporis uehementer decolorat, ut plane buxeum spectetur. Spirandi difficultas torquet, & grauis halitus oris, singultusque. Inuita genitura profusio consequitur. Adiuuantur secundum uomitionem multo meri potu, & harundinis radices binis drachmis, aut cyperi. Breuiter cogendiunt, ut exercitationi & cursui se credant, ob torpore quo corripuntur. Quinetiam quotidie lauandi sunt.

¶ De Hirudine

C A P. XXXII.

βελίδια

Deuoratae cum aqua Hirudines, si ori uentri adherent, tractione partium, nonnullam suctionis imaginem praebent. Eo enim argumento hausta Hirudo deprehenditur. Has muria forbitione excutit, & syrenaeus succus, aut laserpitij folia, aut betae, cum aceto, aut pota niuis glebula, cum posca. Nitrū ex aqua gargarizetur, aut atramentum futorium aceto dilutum. Si faucibus haereant, iniecta lupinorum farina, aqua frigida ore contineatur, et ad eam Hirudines exilient. Prouidendum etiam ijs, quae & si ferendi auxilij gratia tradantur, non minora tamen caeteris uenenis pericula saepius adferunt. Qualia sunt album Veratrum, Tapsia, Elaterium, Agaricum nigrum. Siquidem ea strangulatus concitat. Aut immodicas deiectiones mouent. Quibus ea medentur quae in Fungorum mentione & similibus retulimus. Nimirum os autem deiectionum impetus, medicamentis quae excrementa suppressunt coercebimus. Neque negligenda quae gliscente sensim nocumeto, pericula ingerunt. Quo in numero sunt syluestris Ruta, Gith, et nouae Glacies.

E X M. V E R G. C O M M.

Plura & certiora pro haustis Hirudinibus docent graecorum medici. Primumque inter notas numerant quae nullae in hoc scriptore sunt, floridi, ut illi aiunt, id est, uiui sanguinis excretae. In remedijs etiam lupinorum farinam addunt. Ex eorumque disciplina, ut uidetur, nouissimorum alter interpretum scriptori huic remedium illud addidit, quod alioquin in scriptoris huius codicibus inuentum a nobis haecenus non est. Causam etiam afferunt, cur frigidae aquae sensu, quae ore contineatur, profiliant faucibus haerentes Hirudines. Ea est, quod frigidae aquae appetentes, ad eam festinant. Adijciunt & illud, Cimices dedisse aliquos: quod hic ipse secundo uolumine in Cimicibus praecipit. Nec male suspicetur aliquis, deesse huic scriptori hoc loco inter remedia, quod alibi in historia cognitum, imperatumque fuerat. Galenus priuatim Alijs usum se fuisse testatus est, nec alio indiguisse remedio.

¶ De Axe.

C A P. XXXIII.

ἀξος

Axos flos est sping eiusdem nominis. Eos qui uescantur, sola uomitio recreat.

¶ De Aqua frigida.

C A P. XXXIII.

ψυχρὴ ὕδωρ

Aqua frigida habunde pota, aut meracū uinum liberalius potum, aut passum, praesertim a balneo, aut cursu, aut uehementi

exercitatione, strangulatus, & dolores infert. Vbi sanguinis missio pro
tinus, & uacuatio imminentiā soluūt pericula. Sed de notis ueneficio- **A**
rum remedijs, & cauendi modo, hactenus dicta sint. Subiungeremus
etiā antidota necessaria quæ præclare auxiliantur, quibus utimur, quæ
le metridatium est, præsertim quod sanguine & scinco temperatur: ue-
rum quoniam alijs in locis diligentissime scripta sunt, hic ab eorum de-
scriptione superfedemus.

MONENDI hoc loco legentes sunt, quas hic scriptor Antidoros tam sæpe laudauit, & quas
subiecturum se commentarijs his in fine pollicetur, nullas ætate hac nostra in eius exemplari-
bus, quæ uidere hactenus licuit, inueniri, ideoq; non expectandas a nobis.

EX M. VERG. COMM.

¶ Finis LIB. Sexti.

PEDACII

DIOSCORIDIS

De Venenatis animalibus, & rabio-
so Cane, LIB. Septimus.

IÖ. RVELIO interprete.



DE BESTIIS quæ uirus eiulantur, & exitiali **B**
bus uenenis, ut circūitus medicinalis ad umbili-
cum perueniat, sermonem facere proposuimus,
& quidem cæteris non minus necessarium, ijs qui medicinæ artem ex-
ercent. Vtpote cum adminiculo eorū quæ in eo traduntur, doloribus,
periculis, & cruciatibus, homines liberari conueniat. Hic Tractatus in
summas parteis duas, sicuti ab initio relatū est, distribuitur. Nam qui
de feris uirus inspuentibus differit, Theriacus dici solet. Qui uero de
amoliendis ueneficijs, Alexipharmacus: de quo cōmentabimur, simul
quæ sequi consueuerunt, quæq; nonnihil auxiliij ferunt, explicabimus.
Omnia in promptu & ad manū artificem habere oportet, propter ur-
gentem sæpenumero uecessitatem. Siquidem pauca e uenenis & uiru-
lentis animantibus, tarda & grassantia sensim pericula cient, ita ut dila-
tionē admittant. Pleraq; uero presentaneam perniciem afferunt. Ho-
minum aut partim male alteris cogitantes, ingenita prauitate maleficiū
ita temperare statuerūt, ut spacium curanti liberū non relinquant: par-
tim tristi aliquo euentu oppressi, hausto sponte ueneno, mortem sibi
cōciscere conantur: qui postea deprehensi, aut resipientes, & uitæ cu-
pidi, presentaneā opem poscunt. Non desunt qui hostiles sagittas illi-
nentes, aut fontes, aquasq; puteanas hac labe poluentes, citam aduersa

Ntt iij

C rijs perniciē moliunt. In quibus ipsis maleficiū nō subito, sed aliquāto post respōdere natura sua cōparatū est, tū nisi primo quoq; tēpore cōerceat, & remedijs subīde excipiat ueneficiū, frustra postea succurrit, occupatis iā corporibus exitiali ui ueneni. Proīde nō uulgari industria diligētiq; in ea re utendū est: ut quod in alijs incōmodis ars cōsueuit, in his quoq; salutē mortalibus praebeat. Quin & apud priscos modus hic unus existimabat eius partis. Sed recētiore ipsū discreuerūt, nominātes prae cautionē & modū prae cauētē, salubris sanātisq; mediū statuēt. Qui parua & leui supra modū persuasione freti, magno in errore uersant. Siquidē treis in humanis corporibus cōstitutiōes esse cōrēdūt. Vnā, qua sani degimus. Alterā, qua sinistra ualitudine corpora laborāt. Tertiā, mediū inter utrāq; locū sibi uēdicat. In qua positi, sanitatē specie mētiunt, facileq; in morbos & pericula cōcidūt, ppter mortiferā uī quā in eorū corpus incūbit. Quēadmodū in ijs uidere licet, quos excādescēs rabie canis momorderit, necdū tamē aquā horrēt: in ijs quoq; qui cātharidas hauserūt, sed nōdū urinae tormēto cruciantur. Tripartito igit artē digeri, tripliciq; cōstitutiōi respondere tradūt. Salubrē partē esse uolūt, quē sanitatē tuet. Præcauētē, eandēq; phibentē, quē obstat q̄ minus in morbos incidant. Et in sanitatē, qua uitia discutiunt. Quibus ita respōderi pōt. Qd̄ primū p̄ illud additāmētū nō treis corporis tñ, sed quatuor haberi cōstitutiōes fatendū esset. Quippe ut aliqui sunt, q̄ necdū morbo laborāt, morbo tñ maxime ob impendentē causam sunt obnoxij: ita sunt q̄ iā priore morbo defuncti, nondū tñ secūde ualitudini restituti sūt. Id qd̄ a morbo pximo sese recolligētib. cerne re licet, q̄ uiriū rēcreationē et robur desyderāt. Sed quēadmodū agrotātū cura ad partē medicamētariā ptinet, ita qd̄ morbos amolīt, eīdē subijci par ē. Ad arcēdas em̄ ualitudines uehemētib. utimur auxilijs, altiorē scarificatu, uisionibus, amputatiōe, derodētibus epithematis, potionibus p̄niciēi occurrentibus, et plerisq; alijs. Verū enīmuero sunt usq; eorudes nōnulli, ut ne remedia qdē appellent, quā morbos arceāt. Cuius sentētię inire rationē haud p̄mptū est. Etenī cū uerbū ipsū, p̄cauere, tñ opus p̄cauētis, modū omnino auxiliarē remediariūq; p̄seferūt. Mirū uero, nisi etiā sua illa distributione partiū, eos cōplectunt q̄ in pestilentis cœli statu morbo nondū correpti sunt, pesti tñ ppter obuersionis aëris occasione, opportuni, & in morbum proni reddunt. Dicere forsitan q̄s possēt, salubris institutionis alimētaria p̄cepta nō aliud esse, q̄ arcendōrum morborum rationē. Quippe cum firma reddere corpora, et minus uitij obnoxia nitamur, ut inoffensa ualitudine degāt, nec morbis conflictentur. Necq; id silentio prættereundum, quod peculiariter ad rē pertinet: non oportere medicinā partium distributionē, totidē corporis cōstitutiōibus respōdere, sed naturas peculiarib. uniuscuiusq; notis

conſecere: ut ſuis locis oſtendimus. Cum iſs igitur, non pluribus agens **A**
dum. Illud magis adnotare cōuenit, affectus qui à uirulentis animalibus,
uenenisq; contrahuntur, cecos uocari. Quin & ea quæ eiſdem auxiliantur,
nulli ſunt addicta cauſſæ. Quapropter queſtionibus obſeruatoriæ ar
tis, quæ ratione fulciatur, annumerari ſolent. Neq; ex ſe uerū deprehendi
tur, affectus huiuſmodi cecos eſſe. Nam quod ſemper ſe protrahit, & nul
lum in quibuſdam neceſſarijs uſum exhibet, non facili coniectura colligi
potest. Et ſi ſecundū proprietates proriſ cecos eos affectus concedimus,
qui ab exitiſ alibus uenenis, & animātib; quæ uirulento morſu ſæuiunt,
contrahūtur, non tamē quod ad opus nonnullū uſum præbet, datq; me
dendi occaſionem, aut imperceptibile, aut cecum, nulliue cauſſæ obnoxi
um reputatur, ſed magis ab ipſo quis impuſſus, fidem quam habet & o
pinionem de abditorū cognitione confirmare poterit. Nam etſi ſæpe mi
nora ſunt, q̃ ut ſenſibus percipiantur, euidenter tamē ex alijs correſpon
dentibus deprehenduntur. Diocles autem in eo commentario, quem Plī
ſtarcho dicauit, ſatis modos perſtrinxit, ad hanc uerborū ſententiam ſcri
bens. Noſſe quis hoc poteſt, cum in alijs non paucis, tum in uiperis &
ſcorpionibus, & reliquis id genus, ſecum animo reputans: ut quamuis
exiguo ſint corpore, uixq; conſpectui ſubiſciantur, magnorum tamen **B**
diſcriminum ac dolorum cauſſas inferunt. In quibus nihil præter quan
dam corporis exiguitatem, uehementiamq; præ cæteris animantibus da
tam illis, facile fuerit ſpectare. Quanta enim ſcorpij magnitudo, aut cor
poris moles exiſtimari poteſt? ſi ad eius icūm comparauerimus, aut reli
quorum id genus carne perimentium, Quorum aliqua uehementes cru
ciatus excitant. Alia erodunt, & putredines cient. Nec deſunt quæ præ
ſentancam perniciem moliantur. Nonne quod a phalangij morſu uirus
ingeritur, uniuerſum corpus excruciat? At neq; quis uehementiam ipſo
rum a mole deprehendere poſſet, cum proriſ exiguo corpore cōſtent.
Ergo q̃ hæc ad affectus referantur, conſtitit inter omnes. Verum q̃ exa
cte deprehenſum ſit, uim quandam ipſis ineſſe mortiferam, quæ permi
ſta corporibus moleſtiarum quæ exoriuntur, cauſſa ſit, in conſeſſo eſt, &
omnium conſenſu defenditur. Nec quisq; offendi poſſet uſque adeo con
tentionis ſtudio flagrans, qui aliunde exoriri moleſtias aſſeueraret, q̃
a materia mortifera partem corporis attingente. Porro id fuit quod in
ter utilia artis opera dicere cogit, nos nihil proriſ lædi ab incompre
henſione per proprietatem communis cauſſæ, cum euidenter, tum in
dicari poſſit, cum deprehenſa eſt. Ideo Eraſiſtratus empiricorum per
tinaciam graui cauillatione inceſſens, cæcis affectibus cauſſas aſſignauit,
inſiciatus, communem cauſſam, quæ morbis acceſſit, eſſe incomprehen
ſibilem. Et hanc in eo quem de cauſſis ſcripſit commentario aptiſſimē
prodidit, Neq; ferendos eos eſſe cenſuit, qui ſe dicant in quibuſdam, ut

D I O S C O R I D I S

C in uenenis, serpentium ictibus, & cæteris id genus trita medendi ratione contentos esse. Obseruatio igitur comprehensionis caussarum, nobis perfecte diuidentibus satisfaciet. Primum enim per genus comprehendendi non possunt. Quod autem sit lætifera uis, corporaq; permutans, ita ut perimat, ex ijs quæ per genus, non per speciem uagantur, medellam subscribit, quæ hæc hebetare, & prorsus expugnare liceat. Quando subiunxit. Ad aquam dulcem, & potui idoneam uenit quis, & ante obseruationem in uomitū, propter ferientis uehementiam, & demorsæ partis fracturam, Cucurbitulas adfixit: urentia medicamēta, aut ea quæ uim eandem adipiscuntur admouit: postremo partem amputauit. Secum reputauit medicamina, quæ ad summa cutis adijciuntur, immisissæ ad intima perniciæ repugnare. Hæc itaq; quæ proposuit Erasistratus, ueritati consentanea sunt, nec arti refragantur. Sed methodicos demirari licet, qui mortiferam uim corporibus illapsam, negociorum, quæ ipsa faceffit, esse causam diffiteantur. Verū rudiuscule nomini attendūt. Nam apud ipsos palam immisa uis *φθοροποιός*, id est, mortifera nominatur, *φθοροποιόν* autem alii quid esse uolunt, quod nullius rei sit causa. Aiunt hæc nomina *μάστιππος*, & *ἀνακαλίστιν*, esse reliquis omnibus similia, in quibus partes quædam dictionum non pro uirtute, sed nuda prolatione comprehenduntur. Enim uero quemadmodum in his uocibus *μάστιππος*, & *ἀνακαλίστιν*, partes uernaculos & præcedentes non retinent significatus, sic in hoc uerbo *φθοροποιόν* partes productionis gratia non pro uirtute coaluerunt. Hinc ad caussarum differentias transeunt. Affirmantq; caussarum aliquas euidentes esse, quæ dum aduersam ualeitudinem crearūt, separantur, cuiusmodi sunt frigus, labor, insolatio, æstus, & similia. Quasdam continentes, quæ permanent postq; morbum excitarunt, hoc est, cum præsentibus sunt, & effectus eorū adsunt: cum increfcunt, effectus augentur: cum decrefcunt, minuitur: & cum desinunt, finiuntur. Quin per se prodeuntes effectus, alii cuius finis gratia esse possunt. Tales quidem probatissimæ sunt caussarū differentia, quarū nulli phthoropceon subijci potest. Euidens enī causa non est, quoniā morbus ipse permanet, nec corpore separatur. Nec continens causa dici potest, cum magna ex parte hæc adsit. Quemadmodum accidit ijs qui a rabioso cane sunt demorsi. Quod si neq; euidens causa, neq; continens fuerit: neq; ad finem coadiuuantē causam referri potest. Si uero a nulla caussarū differentia phthoropceon deducere possumus, causam non esse fatebimur. Quod autem asserunt, nomina quædam in se non habere parteis rerum significatiuas, sed nuda & simplici prolatione ficta esse: fateri necesse est. Verū non omnia, sed per pauca talem nancisci conditionem existimandum est. Namq; *ποιόν*, in hoc nomine *φθοροποιός*, perinde atq; adsumpta profertur: sed peculiarissimam usurpat significationem. Quemadmodum enim *φθορά*, id est, corruptionis nomen

mutationem in peius significat, sic hoc uerbum *πορνῆν* sumi debet, ut nihil
 in dictione *πορνῆν* sortiri se declaret, neq; prorsus id significat, quod omnes
 audiunt: & hinc simile redditur, *παρὰ τὴν φύσιν*. Si dant a corruptione sa-
 lubrem fieri morbu, concedunt utiq; ui huiusce uerbi *πορνῆν*, nisi quid cor-
 ruptionem efficiat. Omne autem quod aliquid efficit, ostenditur per sin-
 gulas causas, quæ corporibus subijciuntur, præsertim in immissis uene-
 nis. Verum nō nihil subiacere causarū differentijs produnt. Quinetiam
 aberrarunt, non exactam diuisionem assumentes. Qui uero se dogmatiz-
 cos profitentur, causam esse partim præparantem, partim continentem
 asserunt, ut inguinum ulcus, & inguinariam febrim, quod effectui tum
 assistant, tum etiam separentur, ut a fractis præcipitatio. In summa, quo-
 ties quidpiam suapte natura causa fuerit, nec ulla diuisione comprehen-
 ditur, uitiosum est, neq; causæ adscribitur eorū quæ idem genus sortiun-
 tur. Sed quod phthoropœon, id est, mortiferū causa sit, nomen ipsum ar-
 gumento est, & in ijs quæ contingunt apertius ostenditur. Quid aliud
 causæ arbitrant esse post impressum a serpentibus ictum, q̃ ex animan-
 te uim & illapsum in corpora uirus? Neq; enim frigus, neq; æstus, neq;
 cruditas, neq; aliud quicq; causari possunt. Verum quoniam causa-
 rum differentijs gaudent, & aliquas continentes, alias euidentes appel-
 lant: ipsis dicendum, altero istorū modorum euidentem dici causam, q̃
 effectum præcedit, & corporis compagem occupat: continentem uero,
 q̃ morbis præsentibus adest: qua separata recedunt, quæ cum ipsa eue-
 nerant. Sed de ijs hæcenus. Fatendum itaq; mortiferam uim intrinsecus
 manifestissimam esse causam. Ipsamq; principem facere scopum oportet.
 Et anteq; morbis confluentur, uarijs modis est certandū, donec uis
 tota corporibus excutiat. Modo in loco præsertim principatum non
 obtinente, ante coërceatur, q̃ altius irrepens uiscera tangat: aut eius per-
 nicies eluatur: aut iam membratim peruagatura suffrænctur. Itaq; uene-
 na si hausta sunt, crebris uomitionibus: si morsu impressa, scarificatio-
 ne, affixis cucurbitulis, exuctu, carnis circumscriptione, nonnunq; am-
 putatione extremæ partis, euocantur: clysteribus, & imposito medica-
 mentorū acrimia cohibentur. Hæc simul utiq; arcere uirus & eluere possunt.
 Restinguuntur meratione potu, aut passo nulla aqua diluto, uel con-
 trariorum esu, quæ acrimonia sint prædita. Postremo deiectio alui, euo-
 catus sudor, & alia quædam in commune, quæ membratim demonstra-
 bimus, auxiliantur. Verum enim uero non lætifera modo materiam,
 sed & magnitudinem, & tempus efficere scopum & propositum oportet.
 Etenim ab ijs remedia q̃ plurimum discrimen capeunt. A magni-
 tudine quidem, cum nonnulla ex uenenis, & uirosis animalibus pericu-
 la minantur. Alia putredines altas, aut exteriores excitant. Alia uehe-
 mentissimos dolores, aut cæcos cient. Alia uix medicamentis cedunt,

D I O S C O R I D I S

C & magis minusue molestias excitant. Oportet aut ea quę pericula ferunt euincētibz auxilijs expugnari, & minus infesta mitioribus. Quippe abz furdū fuerit, in maioribus tardiore medicamentorū usu homines in discri men afferre: in minoribus uero, uehementiū auxiliorū iniuria laceffere. Finitio a tēporibus in promptu est. Aut em subito in pericula & præsentes molestias adducit, aut sensim & dilatas in tempus. Itaq; præsētibz multa simul auxilia repræsētari oportet: reliquis paulatim. Hęc quadā artis formula breuiter definita sint. Iam membratim procedamus.

¶ Signa rabiosi Canis & demorsorū ab eo. C A P. I.

DE rabiosi Canis morfu sermonem alijs pręposuimus, qđ id ani mal domesticum ac frequens esse consueuit, & rabie sapius cor ripitur, ac perit, ab eoq; cauēri difficile. Inde periculum inuitabile homi nem manet, nisi multis utatur auxilijs. Canis plerumq; flagrantissimis æstibus in rabiem effertur. Interdum quoties frigora incesferunt. Rabio sus autem, potum & escam auersatur, Largam spumantemq; pituitam na ribus & ore proijcit. Torue, et solito tristius intuetur. In omnes passim si ne latratu irruit. Aequę feras, hominesq; tam familiares, q̃ ignotos mor det. Nec protinus infestum quicq; infligit, nisi ut uulnus dolorem. Exin de morbus ille, qui ab aquę metu Hydrophobicus graia est uoce appella tus, contrahitur. Euenit autē cum distentione neruorū, totiusq; corporis rubore, præsertim faciei, cum sudore & languore quodam. Aliqui aurę splendore fugiunt. Alij sine ulla doloris intercapedine uexantē. Sunt etiā qui canū more latratus ædant, interuenientesq; morfu adoriūtur, ac mor dentes simili uitio labefaciunt. Nisi forsitan narratione unū, aut alterum euasisse audiamus. Siquidem Eudemus superasse quendā affirmat. The misonem aliqui demorsum in idem uitium incidisse, & euasisse fatentur. Alij amico aquam expauescenti, morem gerentem, & officium exhiben tem, quadam naturarum concordia similem subisse affectum: sed post multos tandem cruciatus, seruatum extitisse. Molestissimum itaq; genus morbi, a quo multos anteq; ipsum experirentur, uindicauimus. Et com plures ab alijs medicis seruatos nouimus.

E X M. V E R G. C O M M.

NVmerātur ab antiquis gręcor; medicis, pręter dictas ab hoc scriptore plures alię rabi di Canis notę. Sitire scilicet tunc eos, non tamē bibaces esse. Quod Celsus libro. s. etiam in ti mente iam aquā homine testatur. Anhelos pręterea, suspiriososq; & languidis flaccidisq; auri bus uideri. Quinetiā, quod hic ait, sine latratu omnibus pariter insilire, copiosius illi explicat, docentq; muros tunc penitus, & ueluti insanos fieri: eosq; ut nec domesticos etiam noscant. Quod licet a Dioscoride constitutū etiam fuerit, cum inquit, sine latratu omnibus pariter insi lire, bestijs, hominibusq; contubernales, & alienos mordere: nescio tamē, quomodo certius illud est. Occasionem sane obtulit, ut quod male inter notas timētis iam aquā hominis in Dio scoride legebatur *ἡ ἀπυρία*, quā uocem alter interpretū, cum languore, alter, cū fastidio uer tit, ad ignorantia huiuscemodi nos transferremus; & quasi *ἀπυρία* legi oporteret, cum sui, do mesticorūq; ignorantia, uerteremus. Inter cętera enim quę docent gręcorum grāmatici, signi ficare aporian, *ἀγνωσία*, id est, cognitionis priuatio est. Aniaduertimus etiā, quo loco inane spa-

rium relictū, & uitij nota adiecta a nobis est, in male sequacis sermōis ductu deesse aliquid. Ab exceptione eī quod sequitur statim membrū principium habet: non ineleganti tantū, sed infirmo penitus sensu. Oportuit enim prius constitui aliquid, unde quod sequitur, exciperetur. Quale autē id quondam fuerit, manifeste Paulus Aegineta indicauit, qui hīdem huic scriptori uerbis eadem docens, cum eo produxisset rem, moneretq; iam & ipse accurrentes mordere rabientes homines, morsuq; suo suā in alios affectionem transferre, subiecit statim pleraq; alia, & inter cetera, τῶν δὲ ὑποκρίτων ἵς τὸ πάθος ὑδρία ἴσμεν περιεσθίοντα, πλὴν ἐξ ἰσοπλάσ ἕνα ἢ δύο. Quod rum sensus est, Omnium uero qui in hanc affectionem deuenerint, nullum uos seruātū scimus, prāterq; ex historia unum duosue. Quā si scriptori huic inferantur, apte spaciū id totum explebunt. Nos ea signamus, ut habeant uolentes, unde locum instaurare possint. Docent prāterea ijdem græcorū medici, aliorū quidem accidentiū manifestam esse causā, occupatis scilicet ueneno illo partibus cunctis. Metum uero aquæ fieri aliqui eorū dixerunt, ex nimia siccitate: quasi in contrariū habitum mutata penitus humida eorū substantia. Verūtamen Ruffus antiquæ medicinæ grauis auctor, insaniē ex atra bili genus id esse, testatus est, magna ueneni eius cum humore illo similitudine: nec secus q̄ atra bile insaniētes scimus alios aliā timere. Idq; sentire etiā uidentur, qui dicunt, Canis qui momorderit imaginem in aquis, opinari eos se uidere; eoq; metu territos aquā fugere, & auersari. Monent etiā, quoniam non statim rabidi Canis morsum sequitur metus aquæ, sed circa quadragesimā fere a morsu diem adest, & aliquando serius, opinātes aliquādo homines non rabire Canem qui momorderit, festinata morsus cicatrice causā affectioni huic dedisse. Id ne fiat, docuerūt qua indicatione usus aliquis rabire, aut non rabire Canē intelligat, lubentq; iuglandis concidi nūces, diligenterq; his uulnus obstruere & circūligare. Mox sequenti die solutas & ablatas, gallinaceis in cibo apponi: & si his a principio non pascantur, fame ad uescendū cogi: futurū enim superstitēs uiuāt, si nō rabierit Canis. Sin cōtra, postera die peribunt. Tuncq; ad uulneris dilataciōem festinandū. Iterumq; post paucos dies eadem indicatione utendū: & si non perierint gallinacei, tunc a periculo tutū uulnus ad cicatricem perducendū. Creditur indicationis huius auctor quondā fuisse Oribasius. Notumus illud etiā relinquere, uideri nobis, quod hic ait, nullum a metu aquæ seruātū sciri: & credidisse aliquos de his intelligendum esse, qui non a rabido Cane, sed rabiente & aquā iam rimentē hominē morfi fuerint. Hic tamē simpliciter tradidisse id uidetur.

Remedia demorsorum a Cane rabioso. CAP. II.
 Ratio medēdi duplex. Vna cōmunis, qua utendū in omnes morsus, quos uirulentæ animātes impresserunt. Alia peculiaris priuataq; eorū dumtaxat, quos rabiosi Canes momorderint. Quæ nōnullis quidem summā opem ferrē consueuit. Alijs uero inutilis, maxime qui ex multo iam tempore icū accaperunt. Quæ ad hanc pertinent, primū exponemus. Deinde cursim perstringemus, quæ ad cōmunem medendi rationē pertinent. Cancros itaq; fluuiatiles, cum sarmentis albæ uitis cremare oportet, & cinerem eorū q̄ minutissime tritum habere reconditū. Itidem gentianæ radicem tusam, cribratamq; reponere. Quoties autē Canis rabiosus morsum intulerit, in quaternos cyathos uini bina cineris cancrorum cochlearia, unumq; gentianæ coniiciantur. Hæc in polentæ madefactæ modū subacta, quatrīduo bibantur. Inter principia medicamentum hoc modo detur. Atqui si ab illato morsu duo, aut tres dies fluxerint, curationem auspicabimur a triplicato pondere, supra id quod ab initio retulimus. Optimū hoc aduersus rabiosorum morsus auxilium, quod & multis unum satisfecit, eoq; cum fiducia uti licet. Sed ut alijs etiamnum auxilijs contra inuitabile periculum muniamur, nihil ceteris uti prohibet. Satiū autem multo fuerit, medicamentorum scruitiā tolerare, q̄ propter negligentiam in discrimen adduci. Nec ita in demorsis

D I O S C O R I D I S

Ca rabioso animali maiora uulnera uereri oportet, uti minora, & ulcusculis cutis similia. Quippe maiori uulnere copiosus sanguis emanans, potest nonnihil uirulenti liquoris exhaurire: quod in minoribus non accidit. Quin a maioribus abscedentes carnes hinc auferre, & labia acie scapelli circumscribere, & præhensam hamo carnē amputare oportet. In utrisq; circūstantia loca altioribus ulcusculis scarificanda: ut sanguinis uacuatio resistat, ne uenenū membratim insinuetur. Cucurbitulæ cū multa flāma agglutinatæ id iuuamenti præstant, ut ueneni uis extrahatur.

E X M. V E R G. C O M M.

Quos hiciubet, Vitis albæ sarmenis crematos simpliciter seruari fluuiales cancos, nec qua ratione seruandus per se eorum sit cinis monet: græcorum medici cremari quidem præcipue, sed in æneo cyprio uase, ut purus, & per se colligi cancorū cinis possit. Et quia forte ex eo ære medica uis aliqua contra canis rabiem esset. Ex ea enim insula in omnes medicinæ usus æs laudabatur. Relinquimus hoc capite etiam cogitandum, quod in eo instituitur remedium cancorum cineris cochlearia duo, gentianæ uero unum, meraci uini cyathis quatuor mixta a prima die usq; ad quartam bibenda esse: quotidie ne hac mensura bibenda ea sint: an ex quo quatuor cyathi uini sunt singulis diebus usq; ad quartā, bibendus cyathus unus tantū sit. Nobis in priorem illam rationem inclinatur animus. Credimusq; singulis diebus totam esse illam bibendam mensuram. Arbitrarium tamen legentibus id relinquimus.

¶ De Vitione.

C A P. III.

Contra uirulentos ictus, Vitio expeditissimum est auxilium, utpote cum ignis cætera uiribus præster. Simul quod uirus domet, **D**& ferri penitus non patiat: simul q; pars ignem experta, deinceps non uilem, nec indecoram loci instaurationem efficiat, manente diutius exulceratione. Animaduertendū ex eo tempore cum crustæ decident, ne ulceris oræ coalescant, & cicatrice induantur: sed si fieri potest, ad præfinitū tempus ulcerationes, & sordidas adhuc, & inflammationē minantes, pro rogari conuenit. Quod inditum ijs salsamentū optime præstabit, & syluestre allium detritū. Item cappe, succusq; præsertim cyrenaicus, aut qui medicus, aut parthicus appellatur. Tritici grana tam mansa, q; non mansa imponantur, siquidem subacta pistaue, ob perfusionem uulnera dilatant. Sunt qui a mandentium ieiunio sibi aliquid assequere arbitrentur, quod suapte natura resistat. Verumtamen id non constat. Cæterum tempestiue his utendum. Si uero, quod persæpe accidit, ante dies præfinitos cicatrices coirent, committerenturq; manum postulabunt. Namq; eas diducere, carnemq; scapello circinare, aut iterum inurere expediet. Vbi uero propositum tempus præterijt, ulcus ad cicatricem ducendum, & emplastro quod e salibus conficitur, locus comprehendendus. Nec multo post sinapismo utendum.

E X M. V E R G. C O M M.

Quæ de Aduitione toto hoc capite a Dioscoride præcipiuntur, a Nicandro longè prius instituta pariter fuerant. Versiculi eius in theriacis sunt, ἢ ἐπεὶ δὴ οὐκ ἐκείνηται ἡ ἀντιδοχὴ ὅτι οὐκ ἔστιν ἡ ἀντιδοχὴ καὶ τὸ καλὸν ὑποστρέφει καμίνον. Iubet & Columella septimo rei rusticæ suæ uolumine, capite undecimo contra rabidi Canis morsum uetere salsamento uti. Nihilq; non idem omnibus in eodem periculo remedium est.

Q De Ratiōe uictus in morſu rabioſi Canis. C A P. IIII. **A**
 Væ ad partem iſtam pertinent præſidia, ita ſe habent. Cæterū
 uictus rationē ex ijs quæ ueneno aduerſantur, coniectura quæ
 dam colligere oportet: ſimul ut ueneni uires hebetet, reſtin
 guatq; ſimul ut arceat, quominus ad intima pernicies illabatur. Etenim
 aſſumpta, pernicioſarū uirium penetrationi reſiſtunt. Quorū utrumq;
 præſtare poteſt uini meracioris paſſi, & lactis potus. Quippe qui hæc
 oīa capiunt ad curā, non nihil ueneno obijciunt, quod omnē eiꝯ acris
 moniā obtundat. Simili modo alliorū, porrorū, caparumq; cibis: q; ea
 difficulter cōficiantur & aboleantur. Nam multos dies huiꝯ cibi quā
 litates remanent: quo tempore nec euincuntur, nec permutant a mortī
 fera ui. Cōtrarijs illa uis expugnatur. Cui rei antidotorū uſus accōmo
 datur, & theriaces, metridatij, & eiꝯ quod eupatorio temperat, deniq;
 omniū quæ magnā aromatum partē ſibi uendicant. Quippe aromata
 omnia uiribus & ſubſtantia ægre permutantur. Quare in corporibus
 euincunt. Victus ratio hoc modo ſe habet. Noſſe conuenit, pauorem
 aquæ nō ſtato, definitoq; tempore exoriri. Plurimū tamē ad quadrage
 ſimū uſq; diem neglectis deferri cōſuevit. Poſt ſemestre etiā nonnullos
 inuadit. Quendā poſt annū aquā horruiffe, nobis præſertim cōpertū
 eſt. Narrant & aliquos poſt ſeptenniū aquæ metu fuiſſe tentatos. Inter **B**
 principia demorſorū a Cane rabioſo curandi ratio talis eſt. Verūenim
 uero ſi ea quæ retulimus auxilia primis diebus prætermiſſa fuerint, nec
 ſcalpro carnē circinare, nec uſtionē experiri operæ precii eſt. Non em̄
 quod iam p̄transijt ſatis euocare poſſent. Nulla utiq; adiectionis utili
 tas, ſed in caſſum corpora doloribus ſternentur. Alter uero curationis
 modus accedat. Deiection magnū præbet iuuamentū: utpote cū mouen
 do, corporis habitū traſmutet. Et quæ colocynthidē recipit hiera, item
 lac ſciſtum quod ſimul deiectionē moueat, & uenenum domare poſſit.
 Cibi acres, & meraculi potus, quibus uis ueneni uehementer retundit
 tur, quotidie ſumi debent. Cæterū ſudores ante cibos, & poſt etiā cien
 di. Dropaciſimi, ſinapiſmiq; particulatim per corpus totum adijciendi.
 Sed longe omniū efficaciffimum auxilium, Elleboriſmus cognoscitur,
 quo cum fiducia nō ſemel atq; iterū, ſed frequentius ante quadageſi
 mum, uel poſt hoc tempus uti licet. Tantam em̄ uehementiā hoc auxi
 lium habere fertur, ut quidā qui iam aquæ metū ſentirent, ſumpto El
 leboro, ſimulac primum morbi impetum experirentur, fuerint ſeruati.
 Nam & iam uitio tentatos neq; parū adiuuare poteſt. Itaq; primū cur
 ram contra rabioſi Canis morſus, breui ſermone expoſuiſimus. Iam ad
 alia quæ uenenatis morſibus ſauire conſueuerunt, tranſeundum. No
 tas uno prætextu, deinde cōmunem medendi modū, qui omnibus con
 uenire poſſit, explicabimus. Curſim poſtremo ſubiungemus ea, quæ
 Oo

D I O S C O R I D I S

C sua proprietate nonnullis auxilium præstare possunt. Subnectentus etiam uenenata quæ nullis cedunt remedijs.

¶ Finis LIB. Septimi.

P E D A C I I

D I O S C O R I D I S



De notis eorum qui a uenenatis de-
morſi ſunt, LIB. Octauus,
IO. R V E L L I O interprete.

¶ De Phalangijs. CAP. I.

φαλαγγίς

Emorſis a Phalangijs, locus quidē ipſe, quaſi ab
impacto aculeo rubet, non intumeſcens, nec p am
bitum calidus, ſed mediocriter ſubrubens. Vbi uero contrariorum oc-
curſu refrixit, cōſequit corpore toto tremor, diſtentiones circa poplites et
inguina, cōuulſionib. nō diſſimiles. In lūbis collectio exoritur. Perpetua
D urinæ libido laceſſit, multaq; reddēdis excremētis colluctatio. Vniuerſa
cute frigidus ſudor emanat. Collachrymāt oculi, offuſiſq; nebulis caligāt

¶ De Scolopendra. CAP. II.

σκολοπένδρα

SI Scolopēdra, aut dicta Ophioctene morſum intulit, locus per am
bitū liuore ſugillat & cōputreſcit, interdumq; licet raro, ſeculētus
atq; ruber cernit. A morſu ipſo exulcerari locus incipit. Vlcus id negoci-
um exhibet, fere remedijs inuictū. Præterea toto corpore prurigo ſentit.

E X M. V E R G. C O M M.

Habet mare Scolopendras; de quibus ſecundo uolumine ab hoc, & a nobis longius actū
eſt. Habet & terra; uerum multiplices, nec eiufdem formæ, maleficiq; omnes. Eam ob cauſam
hic inter uenenata tantum numerat. Quæ quondam ab enecandis anguib; Ophioctene priua-
tim dicebatur. Notū omnibus Scolopendarum genus; priuatim tamen incognita nobis Ophi-
octene, quam unam in eo genere ueneni maleficiū habere hic oſtendere uidetur. Eſt poſterio-
res græci marinæ etiam huiusmodi uim aliquam assignarint, diſcreuerintq; utriuſq; morſus
notas; a marinæ dicentes tumorem aliquando fieri pellucidum, & aque ſimilem; a terreſtri ue-
ro rubentem; quam hic tñ propoſuiſſe credi debet, nec niſi de terreſtri monuiſſe. Addiderūt ue-
teres græci aliqd, nec tñ morſus eius liueſcere, ſed tumere, & extolli etiā locū tradiderunt.

¶ De Scorpione. CAP. III.

σκόρπιον

Scorpionis morſu inflammari ſtatim incipit locus, & indureſcit, ac
intentus rubet, uiciſſimq; dolore premitur. Modo ſiquidem exæ-
ſtuat, modo frigore occupatur, labor repente fatigat; aliquando melius-
cule habet, aliquando recrudescit. Conſequitur ſudor, horroſis ſenſus,
& tremor. Extremæ corporis partes refrigeſcunt. Inguina extolluntur.
Tubercula in ſede proſiliunt. Capilli eriguntur. Pallor membra decolo-
rat. Dolor tanq; ex pungente acu, per uniuerſam cutem ſentitur.

¶ De Pastinaca marina.

CAP. IIII.

A

SI marina Pastinaca percussit, protinus accidunt molesti dolores, assiduæ conuulsiones, labor, & imbecillitas. Mens percussis labat. Postea obmutescunt. Oculi caligant. Percussus autem locus in ambitu cum uicinis partibus denigratur, & ita obstupefeit, ut tangentem non sentiat. Hunc si quis premat, atra sanies, crassa & male olens excernitur.

EX M. VERG. COMM.

Non adeo uenenæ maleficio infamis marina Pastinaca est, ut non eadem naturæ & morbis aliquando utilis, suas ab hoc ipso scriptore laudes secundo uolumine inuenierit. Eas, omnemque eius historiam poterunt uolentes illinc, & ab alijs de natura animalium scriptoribus facile audire. Græcorum medici nullas ex morfu eius notas descripserunt: quoniam non posset piscis quod possunt uenenata alia latere, sed ex morfu eius statim mali causa omnis pateret.

¶ De Mure aranco.

CAP. V.

AMure aranco percussis, circa morsum in orbem inflammatio exoritur, nigraq; pustula diluta sanie turgens exurgit. Proximæ partes liuent. Rupta pustula, deuorans ulcus, non ei dissimile quod serpit occupat. Intestinorum quoque tormina, difficultas urinæ, et humoris offusio consequuntur.

EX M. VERG. COMM.

Addiderunt ueteres græcorum medici Muris aranei morfibz, quæ ab hoc scriptore non dicuntur has etiam notas. Dolores, qui pulsuum modo per interualla pulsant: & in singulis dentium eius animalis ictibus rubores: disruptam præterea pustulam illam candidum ostendere ulcus: nec solum propinqua depasci loca, sed corruptas etiam decidere ex his locis partes. Erant de araneo Mure dicenda multa quæ ueteres tradiderunt, nisi quæ satis esse possint secundo uolumine dicta a nobis iam pridem fuissent.

¶ De Vipera.

CAP. VI.

SI Vipera momordit, corpus intumet, uehementer arescit, subalbidumque colorem concipit. Sanies a uulnere profunditur, suppuris, mox cruenta. Pustulæ adustis similes erumpunt, & antea depascens ulcus, quod in proxima repens non summa modo corporis, sed intima quoque corripit. Gingiuæ ipsæ cruore suffunduntur. Inflammatio circa iecur erumpit. Tormina & biliosi uomitus sequuntur. Sopor, & urinæ difficultas accedit, & frigidus sudor offunditur.

EX M. VERG. COMM.

Fieri in Vipere morfu præter numerata a Dioscoridis, græcorum medici hæc etiam dixerunt. Dolores a principio in morfu ipso: mox toto corpore etiam: uiderique in morfu exiguo spacio inter se distantia exigua duo foramina: fluereque primum ex his sanguinem, & aquosum humorem: tum oleosum tantum humorem: postremo uiridi æruginis colore, quod Vipera uenenum aliquem se crediderunt. Tumoribus præterea, quos hic numerat, liuores illi addiderunt: rubores itidem, oculorum uertigines, stomachi resolutiones, & animæ defectus. Cuncta hæc tamen illi πρὸς ἰχθῆρος, ἢ ἰχθυῶν tradiderunt, non satis certa nobis indicatione, duo ne illi serpentium genera, an unum tantum duobus nominibus indicent. Nobis, quatenus obseruauimus in scriptoribus alijs, non uidentur differre Echis, & Echidna: duplexque unius animalis potius nomen quam duorum duo esse uidentur. Paulus Aegineta duo manifeste genera constituit. Inquit enim, ἀνισχυριστὸν δὲ λεγόντων ἀπαλάττιον οἱ ἀρχαῖοι τὸ πρὸς ἰχθυῶσιν ἢ ἰχθῶσιν. Quod est. Minore autem periculo euadere creduntur qui ab Echidna, quam qui ab Echi morfu fuerint, Ceteri tamen, ut diximus, duo hæc genera

Oo

D I O S C O R I D I S

C miscent, præsertimque latini, Viperam utriusque appellantes: tanta est similitudo, tamque in cunctis con-
gener earum natura. Barbarus inter pestis huius notas, κρόνον ab hoc scriptore fieri dictum, ca-
pitis grauitatem interpretatus est. Cum tamen ad soporem, ut sæpe alias testati sumus, ea uox
tantum in græcis pertineat. Alter ne bis de uomitu ageret, tremores reliquit: nesciens τριτον cor
ruptam illic uocem, τριτον legi oportere: quod meliores græci omnes indicant.

σχυτάλη
ἀμφισβῆνα

De Amphibæna. CAP. VII.

C onsimilia eueniunt ijs qui ab Scytala nomine, aut Amphisbæ-
na demorsi sunt. Eademque fere auxiliantur. Quare hoc uenenum
priuatam descriptionem sortitum non est, quæuis non eidem generi as-
signandum sit.

EX M. VERG. COMM.

D iuersa duo hæc animalia sunt. Indicant id Lucanus poeta in 9. omnemque alij. Eapropter cum
male in scriptore hoc locus hic legere, coniungerentque simul Scytale, & Amphibæna, quasi
duplex unius tantum nomen esset, nos & rei ipsius, & aliorum scriptorum auxilio, locum in in-
tegrum restituiamus.

ἀφρίνο

De Druino. CAP. VIII.

A druino morsis pustulæ, molestique dolores incidunt, præsertim
qua dilutæ saniei emissarium subest. Quinetiam erosio, tormi-
næque consequuntur.

EX M. VERG. COMM.

L ibet ex Paulo Aegineta addere quæ cum maleficio suo hanc pestem certius aperiant. Eius
de Dryino uerba hæc sunt. In radicibus Quercus, a qua arbore nomen inuenit, uitam Dryinus
agit: tam malefica, parataque ad nocendum ui, ut calcatus tantum cute nudos hominis pedes re-
linquat, totisque cruribus tumorem faciat. Ferunt præterea, quod magis mirentur omnes, nuda-
ri cute manus pariter eorum, qui curationem eius tractauerint: & si quis interfecerit, male olere
bestiolam, suoque illo odore omnium aliorum odoris sensum auferre. Inter notas morsus eius,
numerauit idem Paulus, etiam cum rubore circa morsus locum tumorem fieri. Desyderauimus
& nos Dryini morsus notas uertentes, qua parte corporis erosiones illæ fiant: uerbi causa, sto-
machi, aut alterius cuiuspiam in homine partis. Nobis in stomachum inclinat animus: sed in
nullo græcorum ea uox inuenta a nobis est.

ἄμωρροο

De Hæmorrhoo. CAP. IX.

A B Hæmorrhoo ictus uehementes cruciatus accidunt, qui breuē
strigofamque prorsus raritatē ex continuo dolore præbent. Ex
plaga copiosus cruor effluit. Et si qua cicatrix corpore nonnullo adfue-
rit, frangetur, & sanguine manabit. Excrementa per aluum cruenta eij-
ciuntur. Profluensque sanguis in globos coit. A pulmone sanguinem ex-
tussunt, & nullo denique remedio euomunt.

EX M. VERG. COMM.

F oeminino genere nono sui carminis uolumine Lucanus serpentem hanc Hæmorrhoidem
dixit: descriptumque longissime cunctis eius euentibus, miserabile omnibus Romani militis mor-
rem fecit. Nos præterea in alijs de Hæmorrhoo hoc tradidimus. Eamque ob causam relicta nunc
omni eius historia, quæ etiam ex eo poeta repeti potest, monemus, uideri nobis in hoc capite
male legi locum cui uicij notam adieciimus, & in quo discrepant a nobis reliqui interpretes: ide-
oque relinquere peritioribus instaurandum quod in eo uarie legitur, ex dolorum continuitate
breuia, angustaque reddi corpora. Alij enim id totum aliter reddiderunt. Nos cōmuniorem secuti
lectionem eo quo legitur modo uertimus. Et quem reliquit Barbarus sanguinem, quoniam in
Dioscoride non legerat, ex alijs græcorum scriptoribus reddidimus. Ille enim e loco ictus mul-
tum excerni liquorem tantum ait, nulla eius liquoris indicatione: cum tamen sanguinis ea sit,
& sic in melioribus adhuc legatur.

¶ De Dipsade. CAP. X.

QVos Dipsas percussit, intolerabilis ardor premit. Sitiscq; usq;
co pertinax, ut satiari non possit, ac sine ulla intercapedine ex-
cruciet. Et si potum affatim trahant, ilico in eandem sitim re-
labuntur. Is uero qui per initia potum nō hauserunt, simile quiddam
prorsus accidit. Quare propter cōtinuam sitim, & Prester, & Causon,
aut Psas appellatur.

¶ De Hydro. CAP. XI.

AB Hydro demorsis ulcus dilatatur, & liuidum ac ingens eua-
dit. Sanies ex eo multa & atra & male olens, non secus atq; ijs
quæ serpunt ulceribus expuitur.

EX M. VERG. COMM.

AB aquis græci Hydron, Romani a natatu, qui tutus in eo elemento terrestrium animalium
mōtus est, Natricem nominauerunt. Pulcherrimum hoc anguium genus, qd in aqua uiuit nul-
lis serpētū ueneno inferius aut ignauius. Ex quo Romanus Cæsar, turpis & malefici ingenij ho-
minem, Natricem se Populo Romano nominis & imperij sui hæredem alere lamentabatur.

¶ De Cenchro. CAP. XII.

Cenchri morsum, qui uiperino ictui similis est, putridū ulcus se-
quitur. Carnes antea ut in aqua inter cutem prætumide, deflu-
unt. Letargo corripuntur, et ueterno pressi, somnos captant. Erasistra-
tus eos iocinere, uesica, colocq; conflictari autor est. Quippe dissectis i-
psis, omnes fere partes corruptæ reperiantur.

EX M. VERG. COMM.

PLuribus hic maculis uariata tingit aluū, ut Lucanus cecinit. Quæ qm Milij seminibus simi-
les sunt, quam frugem græci cenchron uocant, nomen serpenti hoc fecerunt. Plura quo dixi-
mus loco poeta ille de serpente hac egit, quæ poterunt uolentes ab eo audire.

¶ De Ceraſte. CAP. XIII.

ACeraſte percussis locus attollitur, cum duricia pustulosus. E pla-
ga sanies profluit, modo atra, modo pallidior, sed circa concre-
mentum totum rutileſcit, genitale intenditur, mens labat, oculorum ca-
ligo exoritur, deniq; rigore neruorum distenti commoriuntur.

EX M. VERG. COMM.

HAbet Ceraſtes hic cornu figura callosam in fronte carunculam, unde illi nomen factū est.
Cornu enim ceras, græci uocant. Diuersus hic ab his uermibus est quos Plinius in Cossorum
genere in arboribus nasci tradit: & Ceraſtas pariter appellat. Sunt Dioſco. & græcorum medi-
cis, præsertimq; Paulo Aegmetæ de Ceraſte hoc omnia eadem; præterq; ubi hic *κίρροειδης* fieri, et cæ-
quod interpretes aliq ad colorem simpliciter contraxerunt, rutileſcere & ruffescere dicētes. Nos
κίρροειδης in alijs legentes, eorum sententiam potius secuti, uaricum modo tumere totum cor-
pus his diximus. Id enim magis placuit, cæteris notis magis congruere uisum. Tument enim
uarices, quam in hac peste præcipuam notam hic numerauit.

¶ De Aspide. CAP. XIII.

AB Aspide ictis, uulnus exiguum prorsus, quasi ab adacta acu ci-
tra eleuationē conspicit. Sanguis exiguus ille qdem, sed ater de-
stillat. Caligo uelox oculos obnubit. Labor in totū corpus multiplex,
omnino leuis, & nō sine uoluptate cōsequit. Ideo Nicāder perpulchre
cecinit. At uir perit absq; labore, discolor, atq; uirēs. Aliquātulus cordis

Cæstus afficit. Frons ppetuo reuellitur. Genæ cōtemiscūt, quasi sine sensu in somno uacillent. Hos mors tollit ad dici trientē non dilata.

E X M. V E R G. C O M M.

Tria Galenus Aspidum genera esse testatur: numeratq; primum eius quam Chersæam uocant; mox eam quæ Chelidonia dicta est; tertiam postremo quam Ptyada nominauerunt. In omnium nominibus naturæ earum indicatio & nota aliqua est: sed nulla certior, & quam solam cognouisse nunc satis sit Ptyade illa, quæ omnium perniciosissima est. Siquidem erecto in anteriorem partem collo, ex interuallo quod satis ea fore coniecerit, uenenum in hominem iaculat, eoq; nihil aliquando huiusmodi timentem, & incautum conspuens perimit. Et quoniam græcis ptyin, expuere sit, ideo Ptyada eam nominauerunt. Ex hoc genere ferunt Aegypti reginam Cleopatram, cum deuictō Antonio Augustum uictorem timeret, sinistræ mammæ admouisse, morusq; eius seruitutem, & uictoris triumphalem pompam euasisse.

De Basilisco. C A P. XV.

Erasistratus in libro quem de medicaminibus & uenenis condidit, de uocato Basilisco scite ita refert. Cum Basiliscus momorderit, uulnus ad auri colorem exflauescit. Itaq; in plurimis quæ uirus eiāculantur, comites notæ ita se habent. Transeuntes utiq; ad medendi rationem, primum, ut fieri poterit, de communibus differemus.

E X M. V E R G. C O M M.

DAro, ut græcorum scriptores retulerunt, uidetur Basiliscus: totius ideo historiæ eius fidē penes autores hic esse uoluit. Eo enim pertinet quod Diosc. inquit in cōmentario de uenenis & remedijs, Erasistratum de Basilisco testatum fuisse: cum momorderit, sufflauo, & quasi aureo colore plagam fieri. &c. Vidisse tamen eum eos oportuit, qui traiectam per caput eius diadematis figura, candidam lineam contemplati, Regulum ob eam causam nominauerunt. Lucanus nihil de Basilisco aliud inquit, q; Sibilaq; effundens cunctas terrentia pestes, Ante uenena nocens late sibi summo uet omne Vulgus, & in media regnat Basiliscus harena. Quod Plinius 29. uolumine, cap. 3. cōfirmavit dicens. Basilisci, quē etiā serpentes ipsi fugiunt, alios olfactu necantē: qui hominē uel si aspiciat tātum dicē interimere. &c. Veneni eius penetrālē per oīa uim, non multo post idem poeta descripsit. Quod totum poterunt uolentes in eo uidere.

Cōmunis curatio in oēs ictus uirulentos. C A P. XVI.

ADuersus quidem omnem animalis ictum, quod uenenum uibrat, oris suctio conuenit. Sugentem uero oportet iciunum nō esse, sed & cibum sumpsisse, & uino os abluisse. Postea exigū olei in ore continens ictum exugat. Locus ipse spongia fouendus. Deinde scarificandus. Sed ulcuscula altius imprimere expedit: quo uirosa materies profundo euocetur. Circinatio autē carnis, & sectio, scarificatione longe potentius opitulant. Namq; ab ijs duo peculiaria p̄sidia sunt. Vnū, q; uirus e loco tollitur. Alterum, q; ante occurrens q; interna subeat, cū sanguine copioso excernit. Quod si locus carnis circūscriptionē nō admittat, cucurbitulæ cum largiori flāmā adfigendę sunt. Sed iā de ustiōne supra in rabiosorum morfu disseruimus. Si uero icta pars, utpote extrema, sectionē cōmode nō respuat, p̄sertim in omnibus serpētibz, ut aspide, cerasæ, & similibz, p̄culdubio amputanda est. Conuenientiora supradictis auxilia sunt quę Epithemata uocant. Imponat sarmēticius cinis, aut ficulnus, cum lixiuio, subacta stacte, garo, & acri salsamento, Porri, cepe, & allia mō minutissime cōtrita illinunt, mō cremata uul-

neribus inſciunt. Quinetiã diſſecti gallinarũ pulli cũ maxime tepent, **A**
 percuffo loco conuoluunt. Nec defunt q̃ hiſce tanq̃ discordia quadam
 naturali pugnantibus utant. Verũ huius rationẽ inire facillimũ fuerit.
 Gallinẽ em̃ calida natura p̃ditæ ſunt: argumẽto, q̃ deuoratũ inſigne uir-
 rus eliquẽt, & aridiſſima quẽq̃ ſemina conſumãt. Itẽ nõnunq̃ harenas,
 lapilloſq̃, q̃s faucibus inſinuarint, diſſoluunt. Itaq̃ animãtis calore, ſpũs
 ic̃te partis impetũ capelcẽs, uenenũ exigit. Nec me fugit, qd̃ i ægypto fi-
 eri ſoleat. Cũ ſpicas Aegyptij metũt, ollã picis paratã habent, et appen-
 ſam faciã. Tunc em̃ maxime ſerpentiũ iniurias expaueſcũt, tum p̃pter
 ſpicilegij tempus, tũ q̃ opacis ſimul abdite ſpeluncis, & cauernis, denſo
 q̃ aruorum ceſpite deliteſcunt. Moleſtiõra em̃ animalia, et uirus eructã
 tia Aegyptus in campis ferre conſueuit. Vbi ergo aut in pedẽ, aut par-
 tem aliã morſum intulerunt, aſſidentes, faciã in ollam picis conijciũt,
 & ſemel, aut iterum brachiũ, aut crus paulum ſupra uulnus obligãt, &
 arctiſſime duo e p̃ſentibus diſtringũt: locũq̃ ſecantes qua circũactus
 eſt laqueus, picẽ inſtillant. Cũq̃ ſatis uulnus excepiſſe uideãt, laqueũ re-
 ſoluunt, et cepis, alijsq̃ ſupra memoratis illiniunt. P̃terea pix liq̃da cũ
 fale trito et feruẽte illita, p̃ſentanco eſt auxilio, ſi iugiter innouet. Con-
 uenit et cedrus, & fimũ caprarũ ex uino decoctũ. Locũ aceto calido, ca- **B**
 lamintha in lotio, maris aqua, aut acida muria decocta, foueri ſalutare
 eſt. Quinetiã nõ defunt emplaſtra uehementiſſima, & calidiſſima, quæ
 uenenum elicere, expugnare & diſcutere poſſunt. Cuiuſmodi ſunt quẽ
 ex fale, aut nitro, ſinapi, & ſemine roriſmarini componuntur. De qui-
 bus conſequenter erit tractandum. Eraſiſtratus aut̃ nõ iniuſta reprehẽ-
 ſione eos inceſſit, q̃ incognitas ad hunc uſum facultates conſcripſerũt:
 ut elephantĩ fel, teſtudinĩ ſanguinẽ, aut crocodili oua, & cõſimilia. Nã
 cũ iuuantia quẽdã literis tradidiſſe uident, plane in hæc ſola incidenti-
 bus impoſuerunt. Quare talia deuitanda ſunt: cũ difficile, niſi regia fa-
 cultate, perueſtigari poſſint: neq̃ quo noſtra fides n̄s obſtringatur, fre-
 quẽti obſeruatiõe ſufficiẽs expimentũ p̃ſtiterint. Quæ aut̃ ad cõmunẽ
 omniũ uſum p̃tinẽt, quẽq̃ facile ſuppeditari, & omnibus a ſerpente p̃-
 cuſſis auxiliũ ferre queũt, ſubiungẽda uident. Intubus itaq̃, & Erica, &
 Aſtragalus cũ aceto potus, contra oẽs ſerpentiũ morſus auxiliant. Itẽ Bi-
 tumẽ, et uirẽtes Platani pillulẽ in uino diluto coctẽ, & Paliuri decoctũ,
 radix Ariſtolochiẽ, et Bringij. Decoctẽ etiam Lauri bacẽ, et deuoratẽ,
 Piperq̃ largius elitatũ, Ruta, Anetũ, et Cyclaminus. Coma porrorũ pri-
 uatĩ ex panẽ, aut alliũ, aut cepe, ſaſamẽtaq̃ q̃pacerrima, origani decoctũ
 cũ uino potũ, foeniculi, pulegij, calamithẽ porrorũq̃ ſuccus cũ melle de-
 ſorptus. Hęc qdẽ a plãtis congrunt. Ab animãtibus uero quẽdã cõmo-
 de peti ſolẽt. Gallinaceorũ cerebella in cibo, leporinũ coagulũ cũ uino.
 Itidẽ caſtorij ſextãs. Teſtes marinæ teſtudinĩ ſumpti, multũ p̃deſſe tra-

C dunt. Mustella sale inueterata inter auxiliaria medicamenta est. Inuenitur etiam prius exenterata, saleq; siccescens inueteratur: ex aqua binas drachmas cum uino bibisse satis est. Sed de simplicibus quæ dari solent hætenus. Percussis a serpente prodest alui deiection, diffuens sudor, urina copiose reddita. Composita etiã quædam recenter remedia polliceri traduntur. Vt opij, & myrrhæ singuli oboli, piperis quicunx. Ea melle excipiuntur, & instar ægyptiæ fabæ dantur. Itidem syluestris rutæ seminis, nes tritæ, & cum cruce succo subactæ, digeruntur in pastillos, qui drachmæ pondus æquent. Dantur ex ijs terni cyathi cum uino. Hæc habui de cõmunibus auxilijs quæ dicerem. De peculiaribus remedijs cõtra bestias quæ uenena uibrant, consequenter est dicendum.

E X M. V E R G. C O M M.

C Opiofiores, certioresq; in cõmunibus his contra uenenata remedijs posteriores græcorum medici fuerunt. Neq; iñmerito, accrescentibus arti quotidie nouis eorum experientijs. Quas deinceps obseruantes, qui saluti humanæ diligentius consulere, monuerunt, non esse cucurbitulis simpliciter utendum, sed anteq; uulneri admoventur, propinquas confodiendas esse partes: ut pluribus quali canalibus una cum sanguine & spiritu uenenum foras trahatur. Addiderunt præterea, in repleto hominis corpore, secta uena mittendum esse sanguinem: quod nullibi a scriptore hoc præcipitur. Et in admouendis moribus, aut ictibus uenenatorum, dissectis galinaceis, cæteris omnibus mares anteposuerunt. Deficientibusq; his, ne quid ad faciendam homini medicinam deesset, dissecta eodem modo, & admota animalia alia in eum usum receperunt. Aliam a Dioscoride causam reddentes: q; scilicet uenenum in se trahunt, & dolores leuât. Quinetiam uri locum, & ignis crustâ uulneri induci iusserunt. Quod in scriptore hoc tm signat, cū de adustione dictū a se fuisse ait. Pluraq; alia, quæ longius poterunt uolentes ab eis audire.

¶ Finis. L I B. Octauus.

P E D A C I I

D I O S C O R I D I S



Cõtra Venenatos morsus L I B. Nonus,
I O. R V E L L I O interprete.

I H I L inter ferientium uenenatorū notas de Vespis, et Apibus articulatim digessimus: q; conspicuę omnibus forēt, & nihil excellens, aut nota tu dignū in his obseruaretur: inter remedia tamē earum meminisse non fuit alienum.

A ¶ De Remedijs cõtra Vespārū, Apūq; ictus. C A P. I.
Ducrus Apū, Vespārūq; ictus, prodest illita malua, & hordea cea farina cū aceto, ficulneum lac in uulnus instillatum, a muria, aut maris aqua forus.

E X M. V E R G. C O M M.

Q Veneglexit Diosc. Apū & Vespārū ictus, notas & signa posteriores excerpunt. Ab Apis ictu dicētes statim sentiri dolorē, rubere locū, tumere, ppinquas & inercescere partes, spī

culūq; in uulnere relinqui. In Vespis deinde eadem, sed intensiora omnia: nec relinqui spiculū. Addiderūtq; in remedijs, lutū, & bubulum finitū, quibus illeuisse ictus utile sit: & p̄ter hæc con-
cisa, & posita mori arboris folia. Relinquit autē ab Apibus in ictu spiculū Aristoteles. i. de anima
sua historia, & Nicander in Theriacis suis testant: suoq; illo telo castratas perire.

De ictis a Phalangio.

CAP. II.

Phalangiorū ictibus ficulneū cinerem, adiecto sale trito & uino im-
ponere oportet, aut radicem sylvestris punici q̄tenuissime trita,
aut aristolochiā hordei farina & aceto subactam. Vlcera aqua maris pro-
luenda, aut apiastrī decocto. Folia eiusdem illinenda. Lauacris perpetim
utendū, & potionibus quæ hæc medicamēta recipiant, abrotoni semen,
anifum, aristolochiam, cicer sylvestre, cuminū æthiopicum, cedrides tri-
tas, platani corticem, & trifoliæ hærbae semen. Priuatim autē singulorum
ex ijs binas drachmas dare cum uini hemina conuenit. Item myricæ fru-
ctus, & chamæpityos, & uiridiū cupressi pillularū decoctum, ammisso ui-
no. Sunt qui fluuiatilem cancrū in succum redactū, cum aqua, aut lacte,
assumpto apij semine confestim molestijs liberare prodant.

EX M. VERG. COMM.

Sunt in græcis nec reprobandæ fidei codices, in quibus non Aniso, sed Anetho contra Pha-
langiorum morsus pugnatur. Nos tamen eiusdem scriptoris huius decreta in Aniso secuti,
quod utile his quæ uenenum ictu, aut morsu relinquunt, ab eo dictum est, Anifum, ut in com-
muni lectione erat, reddidimus.

De morfu Scolopendræ.

CAP. III.

Si Scolopendra morsum infixit, sal q̄leuissime tritus ex aceto uulne-
ri inspargendus, aut ruta sylvestris superponenda. Locus acida mu-
ria perluendus. Danda in potu aristolochia cum uino, aut serpillum, aut
calamintha, aut ruta sylvestris.

EX M. VERG. COMM.

Adicerunt remedijs his ueteres græcorum medici pleraq; alia. Cinerem aceto macera-
tum, aut scyllam uulneri iubentes imponi. Quodq; hic iubet, oxhalme fortendum esse locum,
auctore Archigene antiquissimo medico, calido oleo fieri aliqui instituerūt. In potionibus eti-
am asphodeli radice usi sunt.

Remedia ad Scorpionis ictum.

CAP. IIII.

Percussis a Scorpione, præsentī est auxilio ficulnum lac in uulnus
instillatum. Scorpūs ipse qui ictum uibrauit, tritus, & percussio
loco impositus, suæ plagæ remedium est: ob quandam, ut constat discor-
diam. Præterea tritus, & impositus cum sale, lini semine, & althæa conue-
nit. Sulphur ignem non expertum, resina terebinthina exceptum, & em-
plastrī modo adiectum, auxiliatur. Eidem galbanum ad splenij formam
ductum, & calamintha, quæ trita illinatur. Et farina hordei in uino para-
ta, in decocto rutæ. Semen trifoliæ hærbae tritum, & uulneri iniectum, o-
pitulatur. Hæc ad affectum locū pertinent. Post hæc q̄fficacissimis po-
tionibus utendum: cuiusmodi sunt aristolochiæ, præsertim corticis binæ
drachmæ cum uino. Tusa gentiana, & pulegiū decoctum, & bacca lauri
paucō numero trita, & calamintha cum posca, in qua magnopere discor-
di qui debet. Cupressus cum uino, & ruta. Nec secus ficulneum lac, la serpi-

D I O S C O R I D I S

C tium si adsit: sin defyderetur, peucedani succo utendum. Efficax est potus trifolij succus, & ocimi semē. Omnibus autem ijs perpetuus lauacri usus, euocatus sudor, & diluta uini potiones registrum.

E X M. V E R G. C O M M.

Non poterat sine græcorū latinorumq; scriptorū aliquot ope integra huic scriptori Scorpionū morsus curatio nunc esse: tam longe ab antiquæ lectionis ueritate deuia, parum diligentes græcorū librarij eam fecerant: pro parthico lasere, peucedanū: & pro cyperide, cupressum modo nobis ostendentes. Id cæteri interpretes, aut in extremo opere festinantes, aut scorpionum iniurias parū timentes, qualia in impresso scriptoris huius codice omnia legebātur, talia etiam uerterūt. Cum tamē utriq; facillimū fuisset: & si græcorū medicos, præsertimq; Paulum Aeginetam nunq; antea legissent, ex Plinio locum emendare: qui. 11. uolumine, capite. 18. de Cypero agens, inquit. Cypero uis in medicina. &c. pauloq; post. Radix aduersus serpentium ictus, & scorpionum præsertim remedio est. Aut si ex Plinio id etiam agere noluisse, in scriptore hoc saltem meminisse debuerāt, contra scorpionum ictus Cyperi radicem præcipue laudari. Sed omniū aliorum certissimus instaurandi eius loci auctor Paulus Aegineta illis fuisse, Cyperide contra scorpionum ictus manifeste utens. Debuerat & illud homines monere, nihil huiuscemodi cupressu, aut ab hoc, aut ab alijs tribui. Eodemq; modo pro Peucedano, cui nulla contra scorpiones uis est, parthicum laserpiciū mutare. Quod hic ipse scriptor contra uenena omnia in Silphio laudauit, id alter ex eis melioris codicis, quem ipsi etiam uidimus, ope adiutus, animaduertit, & felicius uertit. Sed certius totam & ipse scorpionum rem absoluisse, si eundem Paulum Aeginetam libro. 5. de his agentem diligentius audisset. Sunt enim in reliquo capite pleraq; alia, quæ ab eo, & ab altero parum apte uersa fuerunt: quæ nos breuitati consulentes, relinquimus. Multoq; magis, ut quæ addiderunt, mutaueruntue in his posteriores græcorum medici, breuiter dicamus: quæ huiuscemodi sunt. Althea, quæ hibiscus est, simpliciter hic uti iubet. Respondetq; hoc decretis ab eo in ea herba: in qua testatus est, Altheæ folia uenenatorum moribus, & ambustis mederi. Illi autem semini has tribuerunt uires. Et quas hic iubet sumi pauciores lauri baccas, illi decem tantū decernunt. Quinetiam, argenti laminā uulneri impolitam, egregie prodesse testantur. Bibendum præterea Sulphur uiuum in uino additis piperis granis octo. Lasers liquorem cum tritis cancris, Nigellæ, & Aethiopici Cymini, & Viticis semen, cunctaq; æquali pondere cum uino iubent.

D

E Aduersus marinæ Pastinacæ, Scorpj marini, & Draconis ictus. C A P. V.

El qui a marina Pastinaca icitur, omnia quæ de Viperarū morsu paulo post referemus, simili modo conueniunt. Peculiariter autem ictus a marino Scorpione, & Dracone inferuntur, qui molestos cruciatus ciēt. Interdum autem, sed raro nomas excitant. Quibus absinthij, saluicæ, aut sulfuris ex aceto triti potio subuenit. Pastinaca diuulsa, & uulneri imposita, sui ictus medela est.

E X M. V E R G. C O M M.

Venenis ex mari addidit hoc loco Dioscorides Draconem, & Scorpionem, nullis tamen descriptis antea eorum maleficijs notis & signis. Quod quare factum ab eo sit, non facile est conijcere. Nisi forte, quia alia piscium q̃ terrestrium ratio sit: possuntq; terrestria fallere incautos, marina autem nisi in aperto nocere homini nequeunt, ideo relicta a scriptore hoc illa fuerint. Siquidem posteriores græcorum medici, & ipsi nihil huiuscemodi addiderunt. In remedijs tamen copiosiores præter ab hoc scriptore dicta præceperunt, plumbo confricandum esse marini Draconis ictum, Triti serpillio, aut elixa lente, aut uiuo sulphure obstruendum locum: eundemq; hoīs urina fouendū. Et absinthiū in diluta uini potione dandū: dandum & ficulneorum succulorū in dulci uino dilutum. Contra Scorpj uero ictus, nullum piscem dissectum imponi iubent. Quod miretur aliquis a scriptore hoc relictum fuisse: cum secundo uolumine de Mullo pisce agens, inter cætera uim hanc illi tribuerit. Nisi satis fore credidit, semel quocunq; loco de eo traditum fuisse. Adijciunt præterea, uiuo sulphure confricandum esse locum, bibendasq; tritas lauri baccas numero tres.

De morfu Muris aranci.

CAP. VI.

A

SI Mus araneus momorderit, auxiliatur ex galbano splenium per se uulneri exterius impositum, aut medicamenti modo aceto tritum, & hordeacea farina cum aceto mulso illita. Quinetiam Mus ipse, qui morsum intulit, si dissectus apponatur, ictus sui ueneficia luit. Resistunt quoque acini dulcis punici decocti, & illiti. Item porri, & allia contrita, nec non aquæ calidæ fots. Sed hæc ad locum pertinent. Prodest potum abrotoni decoctum, maxime si in uino detur. Præterea serpyllum, & galbanum, & eruca uino madefacta, recentes cupressi pillulæ cum aceto, & cyclaminus ex aceto mulso, & pyrethrum cum uino, & chamælaonis hærbæ radix. Nec desunt qui literarum monumentis tradiderunt, tritum Murem araneum contra suos ictus cōmode bibi. Quam historiam apud alios inuentam, dignam dumtaxat censuimus, quæ annotaretur. Alij asseuerant, demorsum non alias exulcerari, nisi extrinsecus Mus araneus astiterit, tum quoq; auxiliari referunt.

EX M. VERG. COMM.

Multa sunt quæ alia, & aliter pro Muris aranei morfu ueteres græcorū medici docent. Primumq; inter ea quæ emplastri modo imponuntur, non dulcis punicæ acinos, ut cōmunis fereletio habet, sed Malicoriū imponi iubent, aptiore remedij genere q̄ si quis acinos dixerit. Numerant mox agrestem maluam, & ex aceto tritum sinapis semen. Cumq; & ipsi calida aqua, uerumtamen marina (quam uocem deesse huic scriptori suspicamur) locum foueri præceperint, adiiciunt statim, cremata hordea ex aceto imponenda esse. In portionibus deinde, non numerata ab hoc scriptore, adiiciunt sisymbrium, saluiam, hedinum agninumue coagulum, genianæ radicem, aut uerbenacam, cunctaq; cum uino. Quinetiā cum uino bibendum tritum Murem araneum dicunt. Facere ad hoc ueneni genus myrrham pondere semillis drachmæ, & aristolochiæ corticis drachmas quatuor. Sunt & alia ab eis in huiusmodi malo obseruata & tradita remedia, sed efficacissima, & præcipua hæc sunt. Post quæ erat dicendum nobis, cur in extremo capite uitij nota æditioni huic nostræ addita sit. Sed tam aperta erit græca intelligentibus eius consilij ratio, ut nihil iacturæ sit eam non tradidisse, præsertim in extremo opere ad ea quæ supersunt festinantibus.

B

Ad morsum Viperae remedia.

CAP. VII.

SI Vipera morsum impressit, finum caprinum cum uino impositum sopitatur. Item laurus & abrotonum & galbanum splenij loco superiectum. Origanum uiride inditum. Pulli gallinarū discerpti, & confestim admoti. Erui farina, aceto mulso subacta. Radicis cortex usq; eo tussus, ut in puluerem solutus abeat, & scylla tosta detritum chamæmelum, hordeaceum cataplasma in aceto mulso præparatum: sed locus ante calidafoueat. Hæc loco imponuntur. Contra uiperinos ictus rubus cum uino prodest. Aliqui anchusam tenui folio constantem auxiliari prouident. Leporini coaguli in uino terni oboli bibuntur, & porracei succi hemina in mero, & foliorum apiastris succus, & syluestris ruta. Hæc in uino potari debent. Merum continuo bibendum, allia mandenda, & cepe, & porri recentes, salsamenta acerrima, & opipara. Simplicia hæc sunt. Percussis a Serpente præclare auxiliatur medicamentum quod myrrhæ, piperis, castorij, floris portulacæ seminiscq; dimidio acetabulo constat.

D I O S C O R I D I S

C Hæc omnia in cretico passo teruntur, aut in alio probato uino. Erasistratus in eo libro, qui *περὶ δυνάμεων*, id est, de uiribus inscribitur, pleraque alia tradidit, quæ ictis ab Vipera auxilium ferre possunt. Inter quæ talia maxime laudantur, gallinacea cerebella cum uino pota, semen satiuæ brassicæ tritum, & acetabuli mensura cum uino potū. Quinetiam bonum est digitum in liquidā picem intingere, deinde uinū, quo digitus fuerit clutus bibere. Hæc sunt quæ contra Serpentium ictus auxiliantur.

E X M. V E R G. C O M M.

Sunt roto hoc capite a scriptore hoc decreta, quæ contra Viperas imponi, comedi & bibi oporteat. Quæ item simplicia, & quæ composita eius mali remedia sunt. Adiecerunt his alij græcorum medici plura alia. Elixas in cibo ranas: in poculis meraci uini portiones, tam presentis remedio, ut si quis remedio eo utatur, nullo alio opus sit: Marina testudinis, cum agrestis cimini succum, sanguinemque: Leporis, inulue tribolari pondere coagulum: Siccati ceruini genitalis drachmam: Panacis cum uino radicem: Agarici drachmā: Luniperi baccas: Asphodeli radicem: Concisa pistacia: Viticis semen: inueteratæ mustelæ drachmas duas: Fluuiiales marinosue caneros perse, & cum pediculari herba, quam Staphidagrium uocant, saleque & polio: Aristolochiæ, cum myrrha radicem: Gentianæ, baccarumque lauri parem mensurā melile exceptam. Oribasius præterea priuatim, quam alij Aristolochiæ radicem, radice ille corticem sumi iubet. Addit & castorium, & opium: iubetque, habita uirium ratione, in diluta uini portione dari. Lycus Sandaracam & Anethum adijciebat. Archigenes Lauri folia in oleo decocta imponi iubebat. Tamque in roto hoc genere remediorum abundant græci, ut multum illis merito secuta tempora debeant: qui dum salutis humanæ consulunt, nihil intentatum reliquerunt. Poterant plura alia etiam numerari, sed ex multis satis hæc fore opinati sumus. Poterunt enim uolentes a Paulo Aegineta & hæc & plura alia certius audire.

D

De Amphisbænæ morfu. C A P. VIII.

DE Amphisbænæ mentionem hoc loco fecimus, quoniam ferere medijs ad Viperas scriptis, percussis ab ea, adiuuari soleant.

E X M. V E R G. C O M M.

Reue quidem, non leuiter tamen corruptum in cunctis fere græcis, quos hactenus uidimus, hoc caput erat. Id aliorum scriptorum, & eius qui mihi omnium uetustissimus & probatissimus græcus codex est ope, & ex hoc ipso scriptore in eam quæ legitur in editione nostra formam restitutum est.

Contra Druini ictus remedia. C A P. IX.

ADruino ictis conuenit aristolochia cum uino pota, trifoliū hærbæ, radix hastulæ regiæ similiter assumpta, & fructus ex omni quercus genere. Tusæ ilicis radices, & illitæ parti ictæ auxiliantur.

E X M. V E R G. C O M M.

Quas hic dolorem lenire tantum Illicis radices tusas, & loco impostas ait, cæteri remedio esse dixerunt. Hic *παραπορεύειν*, quod ad leniendum dolorem pertinet, inquit, illi *ἀπὸ τοῦ*, quod ad opem remediumque & salutem.

De Hæmorrhoi, & Dipfadis ictu. C A P. X.

HÆMORRHOI, Dipfadisque morfus, uelut immedicabiles a plerisque maiorū deplorati relinquebantur. Quare si pecuniaribus contra Dipfadem remedijs egeamus, cōmunia experiri operæ precium erit. Protinus aut scarificatione uti, uisionem facere, & si locus patiat, amputatōe opus erit. Consequenter quæcerrima cataplasmata admouere, de quibus sepe nūero diximus. Nec me fugit, acres cibos maxime a falsamē

tis utiles esse. Meracæ potiones, & lauacra profunt, quæ subinde interie- **A**
cto breui spacio assumenda sunt, priusq̃ morbi genus emerferit: quo se-
mel erumpente, opem ferre non potest ulla medici opera. In ictu Hæmor-
rhoi eadem profunt. Insuper quæ in commune opitulantur, ut scarificati-
ones, uisiones, acres cibi, meraci potus, & quæ nunc in Diplade definiui-
mus. Quinetiam decocta uitis folia, & cum melle trita.

EX M. VERG. COMM.

Inuenisse se ab antiquioribus tradita Paulus Aegineta, quæ præter supra dicta uulneri impo-
nerentur, hæc etiam inquit. In Dipladis morfu concisa portulacæ folia ex aceto: Polentam iti-
dem: Rubicq̃ concisa cum melle folia. Plantaginem præterea, Hyssopum, Allium, Elaphobo-
scum, Porrum, Rutamq̃ & Vrticam. In Hæmorrhoi autem hæc ipsa, & præter hæc elixa uitis
folia cum melle concisa. Nec minus Hæmorrhoi ipsius crematum caput in portione datum:
aut cum Irino oleo Scordion herbam: comedendasq̃ in periculo hoc passas uuas. Non con-
uenit deinde nobis in hoc capite cum alijs, quo loco hic scriptor ait, *ἰδὲναι δριμυφάγας χραιμύων*
καὶ μάδια τὰς ἀπὸ τῶν τριχυνῶν. Illi enim Drimyphagias frequentem in hoc scriptore uocem,
ad acres tantum cibos contraxerunt. Nos ut est communis & propriam uocis in medicina
æstimatio, ad eas uomitiones retulimus quæ accremento ciborum quærentur. De quibus a-
ctum longius secundo uolumine a nobis in Omotharicho est.

De morfu Hydri.

CAP. XI.

Si morfum Hydrus adegit, prodest origanum tritum, & aqua suba-
ctum, lixiuia cum oleo indita, aut aristolochiæ cortex, aut quærna
radix minutim contrita, & hordei farina cum aqua & melle colliquato. **B**
Bibuntur etiam binæ aristolochiæ drachmæ in diluto uino, aut poscæ
cyathis duobus: deinceps marrubij succus, uel decoctum utriusq̃ cum
uino. Fauus recens datur in aceto.

EX M. VERG. COMM.

Non satis certa in hoc capite omnia in græcis sunt. Pluribus enim locis a reliquis græco-
rum disciplina uariant, quæ hic scriptor pro Natricis morfu constituit: non tam adeo diuersa
nobis uisa sunt, ut mutare aliquid, aut addere placuerit. Illud tantum monemus, quod Barbarus
ait, bibendū porri succum. &c. nos Marrubij dixisse, concordi in hanc uocem græcorum ali-
um medicorū præcepto: qui prasi, id est, marrubij, non prasi, id est, porri succo uti iubent.
Porrit ille suorum codicum fidem sequi: nos cōmunem lectionem, & ueterum auctoritatem
magis amauimus. Addiderunt græcorū medici remedijs ab hoc scriptore numeratis Nastur-
cium, Asphodeli semen, floremq̃, & cum uino fœniculi semen.

De morfu Cenchridij.

CAP. XII.

Morsus a Cenchridio auxiliatur lactucæ fructus cum lini semi-
ne illitus, & satureia trita, & syluestris ruta, & serpyllum cum
duodecim hastulæ regiæ drachmis, & tribus uini cyathis, aut aristolo-
chiæ radix. Item cardamomum, & gentiana.

EX M. VERG. COMM.

Corruptū, maleq̃ habitum a librarijs aliquot locis caput hoc est. Licetq̃ Pauli Aeginetæ
auxilio totum restitui posset, satis tamen nobis fuit pro Cardamomo, quod passim in eo lege-
batur, Cardamon, id est, Nasturcium uertere. Factumq̃ id est, non tam quia ut diximus Carda-
mo græcus ille scriptor manifeste uidetur, q̃ quia hic ipse scriptor in Nasturcio dixerat, *ἰππετῶν*
τὸ ἐστὶν ἀντιφάρμακον πινόμενον. Quod est, Porum serpentibus remediū est. At Cardamomū etiam
id præstat. Scimus id quidem: sed utentibus ad hanc rem Nasturcio alijs in ambiguo, id potius
elegimus, qd̃ græci alicuius scriptoris auctoritate defendi posset. Vitiū suspicati fumus illic etiā
esse, quo loco non integræ lectionis notā adieciimus. Credimus em̃ legi quondam potuisse ali-

D I O S C O R I D I S

Cter cum locū, καὶ ἱππῖλος σὺν ἀσφοδελῶ λελωμένος, ποτισθεὶς δὲ παραχρῆμα κινταυρίου τῆς ῥίζης δρασ-
μαὶ δύο σὺν οἷνῳ κνέθοις γ. Quorū sensus est. Et Serpillū cum Asphodelo tritum. Portiones autē
statim Centaurij radices drachmæ duæ cum uini cyathis tribus. Nihil nos tamen mutauimus,
locum legentibus signasse contenti. Sumusq; ad hoc Pauli Aeginetæ disciplina, & præceptis
usī: qui totum scriptoris huius caput iisdem uerbis commentarijs suis adscribens & miscens,
quo diximus modo totam hanc rem docet.

¶ De percussis a Ceraсте.

C A P. XIII.

Si Cerastes, aut Aspis percussit, cita partis amputatio suffragatur.
Quare sine mora istam partem amputare, aut scalpro confestim cir-
cumcidere, & ijs similia prosequi oportet. Vrentia insuper admouenda.
Siquidem uirus hoc ueneno Basilici simile est.

¶ De morfu Aspidis.

C A P. XIII.

Is qui ab Aspide feriuntur, quæ de Ceraсте scripta sunt auxilia da-
ri debent. Nam uenenum hoc quemadmodum Basilisci, aut sanguis
bubulus, celerrime in arterijs sanguinem cogit

E X M. V E R G. C O M M.

Seorsum, duobusq; capitibus de Ceraсте hic scriptor & Aspide egit, contra q̄ in Græcis ali-
j omnes fecerunt: qui simul de utroq; docuerunt, certius remedia hæc etiam tradentes. Dico
autem certius, non quia plura, aut alia, sed quia expositis remedijs illorum causis & tracta-
tionibus, certior legentibus totā hanc rem fecisse uidentur. Nos eam relinquimus, non tam
breuitati consulentesq; q̄ quia nihil huic scriptori contrarium, aut aliud in eis est.

¶ De Basilisci morfu.

C A P. XV.

D Basilisci morsum, ut Erasistratus author est, auxiliatur ca-
storij drachma in uino pota. Item papaueris succus.

¶ Ictuum remedia ita se habent.

E X M. V E R G. C O M M.

Quæ ab Erasistrato contra Basilici morsum instituta quondam fuisse Diosco. ait, ueteres
græcorum medici incerta sibi esse tradiderunt: propterea, q̄ eorū periculum nunq̄,
aut rarissime ab aliquo factum fuerit. Et hæc quidem hætenus. Nobis sane longe plura, & ma-
iore q̄ a principio cogitauimus operis incremento aucta. Dioscoridi uero, & legentium desy-
derio (tam late tota hæc res patuit, & nos tam multa, quod iam pridem sentimus, parum certe
diximus) nunq̄ satis futura: nisi uoluntatem nostram magis q̄ officium manes eius amaue-
rint: & qua solent humanitate bonarum artium; & humanitatis professores nostra hæc excæ-
perint: nec quatenus aliquid præstitimus, sed quid conati fuerimus, in honoris & officij cen-
su nobis numerauerint. Relinquimus nos in extremo hoc opere quæ ab interpretibus alijs im-
portune, & contra suam etiam iudicium addita huic scriptori fuerunt. Pro comperto enim
nobis est, non esse eius, quæ tam leuiter, superstitioseq; in eis docentur. Relinquimus & quæ ali-
quando polliciti sumus in ultimo opere, addituros nos esse, Colorū proprias cum suis disci-
minibus uoces: & antiquorum ponderum, mensurarumq; omnium antiquas rationes; præfer-
timq; quibus græcorum mensuris & ponderibus antiqua Romanorum, & nostrorum tempo-
rum pondera & mensuræ respondeant. Non tamen auferetur, quod nunc non datur. Cogita-
mus enim ueterum quorundam exemplo, & ex Theophrasti disciplina, de floribus commenta-
rium, in quo certior Colorum omnium, in natura sumptis ab ea exemplaribus, ratio & histo-
ria tradet. Adicieturq; illi quod ad pondera illa, & mensuras pertinet. Nunc enim ampliore
uolumine librariorum & legentes defatigare, uisum non est.

¶ Finis L I B. Noni.

Q V A E S E Q V V N T V R, N O N V I D E N S
tur esse Dioscoridis.

¶ De Rhamno.
Rhamnū, si quis eruat filente luna, & secū ferat, contrā uenena, & improbos hoīes proderit. Pecoribus iuuādīs appendit. Nauigīs circūponi solet. Valet cōtra capitis dolores, & laruas.

ῥάμνον

¶ De Artemisia.
Artemisiā hærbam, si quis teneat dum iter facit, lassitudinem discutiet: & si in pedibus ferat, bestias, & lemures abiger. Si sanguis circa artus cōaluerit, ramulos ex rosaceo in olla ferue facito, & locum totum oblinito, cum somno indulgendum est. Strangulatui uulū mirum in modum auxiliatur. Vrinæ sūllicidia, & opisthothonum leuat.

ἀρτεμισία

¶ De Pentadactylo.
Pentadactylū, si q̄s circū corpus portet, nullo dolore afficiet. Oculos, strumas, callosos tōn- fillas, tumores, uuā, articulos sub lingua, neruorū dolores, & dentes, p̄forā perniciali fame cō- tractā iuuat. Remoratos a partu mēses eiicit. Infusa manibus ex aqua tepida cōtra terrores, fa- scinū, & laruas mirū in modum cōmēdatur. Vellito hærbam cum luna crescit oriente sole.

πενταδάκτυλος

¶ De Verbenaca.
Verbenaca recta genitale intendit, sed supina exicat. Recta appensa, doloribus oculorū au- xiliat. Contra hebetudines eorundē & capitis dolorē efficac est. Trita ex aceto, lassitudinē refi- cit. Strumas, callosos fauciuū tumores statim discutit. Febriliū horrores sanat, si q̄s solū ex aduer- so stans ramulos tenuerit.

ῥιρίδιον

¶ De Distammo.
Distammū siccātū manibus terito, & redigens in farinā adiecta uini stilla corpus tangito. Si quidē contra oēs serpentiuū iniurias auxiliatur. Vlcerā, & putrescentes nomas prapurgans ex- plet. Adactis corpori aculeis obliniū, ut p̄senti sit auxilio. Ad lientē, et in abditis locis uitiā inflā- matione turgentia, redactū in farinā illinito. Hærba uere, magnis æstibus, autūnoq̄ eruit.

διστάμνον

¶ De Saluia.
Saluia singultū, tussimq̄ discutit. Omnibus malis ulceribus cum cæra & rosaceo sumpta au- xiliat. Lienis dolorē, dysenteriaq̄ pota cū uino albo pari modo sanat. Sanguinē excreantibus, potu medet. Ad extrahenda uulū onera efficac est. Pessimæ mulieres pessum ex ea subiiciūt, ut partus excutiant.

ἐλισσώμενον

¶ De Cupressō.
Cupressus herba cōtra raucedines auricularūq̄ pdest. Induratos tōsillas, tumores, aquā inē- cutē, & coxendici cruciatus p̄sanat.

κυνάριον

¶ De Centaurio.
Centauriū contra inflāmata uitiā, & pulsantes ictus ualeat. Foeminis uulū malo laboranti- bus auxiliat. Sūllicidiū urinae, calculorūq̄ tormēta leuat. Hærbam uere oriente sole legito.

κιντάριον

¶ De Buphthalmo.
Buphthalmū crescente luna legerē oportet. Facit autē contra pauores, laruas, & mala medi- camēta, fascinationes, ut pote cū eas auertat. Radicē si quis mandat, dentē expuet, fluctionēq̄ cōfestim sistens auxiliat. Quin & uentrē resoluit.

βούφθαλμον

¶ De Pæonia.
Pæonia hærba per æstus caniculæ ante solis ortū uellit, appensaq̄ cōtra uenena, fascinū, pa- uores & laruas pdest. Itē contra febrē cū horrore uenientē, diurnā nocturnāue, & aduersus ter- rianā. Prodit lemures a mōte in q̄ nascebat fugallē.

παιονία

¶ De Moly hærba.
Moly hærba si secta radice feratur, ueneficiorum & fascinationis amuletum est.

μῶλον

¶ De Marina quærcu.
Marinā quærcū, cū rosaceo & oleo misceto, & faciē illinito cū ad negocia te cōferes. Vegeti- ores reddit pueros imo uentri appensa, & ad arcēdos pauores nocturnos manu teneto. Cōtra fascinū, & oīa maleficia pdest. Corpus tue. Cum enī fascinātes recedūt, arecentē ramulū oc- cludit: & cū p̄pius accedūt, aperit.

¶ De Chrysanthemo.
Chrysanthemō, si terra ante solis ortū eruat, & collo appendat, ueneficas mulieres, oīs q̄ fascinātes amoliū.

¶ De Brysimo.
Brysimon cū uino tritū, aduersus uentris dolorē bibi. Si q̄s grana septē domū ingesserit, ri- xx & iurgia concitabunt.

¶ De Elleborine.
Elleborine aliquibus Epipactis, alijs Borion dicit. Frutex est exiguus, minimis folijs constans. Bibi contra omne uenenū, & iocineris uita.

760.

ARGENT. APVD IOANNEM SCHOT-
tum librariū, 18. Augusti, Anno Christ. M. D. XXIX.

Chartarum numerus, præter Indicem, 183.

Joh. Gargius Hermolaeus.
1529.

INDEX VOCVM

ferè omnium quæ pafsim in COROL:
LARIIS Hermolai Barbari, Anno:
tationibus M. VERG. ipsiusq;
DIOSCORIDIS
Simplicium descriptione continentur.



I. Schottus Librarius
Lectori. S. D.

Polliciti sumus Lector candidi-
de, idq; ab ipso Operis nostri fron-
tispicio, binos Indices, quod inge-
nue quidem fatemur. Verum ut
est sapientis, pro tempore mutare
consilia, longe melius compendi-
um in animum subiit, ut duos, in
unum contraheremus: nō tam ut
tibi uestriganti singula quæq; obui-
am, & ob oculos essent, q̃ ut pen-
si quoq; nostri finem felicius adse-
queremur. Id ut boni consulas,
rogamus. Vale.

¶ Litera A.

ABACVS

Alabandicus 337 a
Abies duplex 335 c
Abietarij 62 c
abrotonum ibi. d 162 a
ablinthium 161 a b
ablinthij genera eo. c
ablinthium marinum eo. b c d
ablinthium Santonicum eo. c d
Acacalis 49 b c
acacia 55 c
acanthos ibi. 158 c d
acantha 92 a 158 c d
Acani 115 d
Acantha leuce 159 b
acanthica mastiche 224 a
acanthium 158 b
acanus seminalis 224 a
acarna 190 b
Accipenser 103 c
Acesa insula 321 c
acellis 317 c
acerabulum 142 d. 235 b
aceraria 142 d
acetum 297 d. 298 a b
acetum mulsum eo. b c
acetum scyllinum 299 b c
acetum stychadicum 203 a
Acherois 45 d
Acherusion ibi.
achillea 223 a
achrosyalos 320 b
achudon 68 d
Achy 7 b. 69 d
achyra 68 d
acidamuria 298 d

acinea
acini
acinoē
acinos
acis
Acocion
aconia
Aconitum 239 d. 240 a b
aconitum alterum 240 b c
aconos 169 d
acorma 190 b
acorus. um. 2 a b
Acridophagi
acris
acrodrya
Acra
Acylon 59 c. 71 c
Adamas 104 a
adarce 331 a
Adeps 100 d. 102 b c
adiantos 258 c d
adianti miracula ibi.
& 259
adianti genera eo. b
Adipion 68 c
adipos 61 c
Adnata 139 b
Ador 110 a
adoreia
adoreum
Adorei quatuor discrimina ibi.
Adrachne 71 b c
Aduſtio 314 d
Aedon 89 d
Aera 113 d
aeromel 16 a c
aerizusa 336 a
Agallochum 7 c d
ægis 35 c
ægidion 64 b
ægylos 207 c
ægylops 160 a b c d
ægolethros 106 b
æmalea 104 a
æmation ibi.
æris coctura quatuor parit 323 d
æris flos 310 d
æris species 311 c
æruſo rafa 311 d. 312 b
æruſo scolecia 312 b c d
æruſo aurificij eo. d
æruſo ferri ibi.
æruſo uermicularis ibi.
ærinauratum 310 b
æruſum 310 c d

æthylopi 159 d
æsculus 64 b
æsculetum 169 d
æthal ibi.
æther 64 b
ærites 95 b
æritis genera 333 d
Agaricum 251 b. d
ageroton 231 a
agne 36 b
agneltra 57 d
agnos 56 b. 49 d
agonos 56 c
agria 44 b
ægriandrys 58 d
Agricofal 327 c
agrifolium 75 c
Aiuga 212 a b
aiuga altera 210 a
aizoon 244 c d
aizoon genera ibi. & 245 b
Alabandicus 335 c
alabaſter 328 c
alabaſtrum 335 b
alabaſtrus ibi.
alabaſtrites ibi.
alapathron 120 c
alarea 72 a
alaria ibi.
albucus 143 b. 50 b
alburna 102 c
Alcea 309 d. 210 a
Alcyonium 330 c d
Alæ 339 b
alec 86 c
Alecula 87 c 86 c
Alectorolophos 231 d
Alex 87 c
Alga maris 247
Aliata 109 d
alicacabus 237 d
aliciae 229 a
alima 21 c
alipenon 58 c
alipetes 24 c
alipaſton 102 b
alison 189 c
alifum 219 d 211 a
Allectoris 51 a
allectryenæ ibi.
allectryon ibi.
allium 235 b d
Alemani 23 b
almytis 50 a
aloe 160 b c d
aloidarium 63 a. 160 d
A ij

249 a
59 b
ibi.
34 c
103 c
336 b c
ibi. c
251 b. d
231 a
36 b
57 d
49 d
56 c
44 b
58 d
327 c
75 c
212 a b
210 a
244 c d
ibi. & 245 b
335 c
328 c
335 b
ibi.
ibi.
120 c
72 a
ibi.
143 b. 50 b
102 c
309 d. 210 a
330 c d
339 b
86 c
87 c 86 c
231 d
87 c
247
109 d
237 d
229 a
21 c
58 c
24 c
102 b
189 c
219 d 211 a
51 a
ibi.
ibi.
235 b d
23 b
50 a
160 b c d
63 a. 160 d
A ij

I N D E X

aloemon	21 c	anchusæ genera	220 a c	apimelis	71 b
alopecæ	89 b	anchusæ alia	220 b c	apinthium	161 b
Alphica	108 G.	anchusæ tertia	eo. c	apludæ	109 d
Alpine	244 b	Andrachne	71 b	Apöthyma	40 b
althea	121 c. 209 b c d	androsace	205 b c	apocynon	86 242 b
Alumeg	324 c d. 325 a b c	Androsfemon	211 c	apocrypha Dioscoridi annexa.	
alumen scissile	325 b	androsfemon duplex	ibi.	folio ult.	
aluminis genera	ibi.	andrachon	239 a	apollinaris	235 c. & seq.
alus	215 d	andraclon	ibi.	apollo myriceus	49 a
alofus	327	andracelon	ibi.	apospematismus	120 b
alutarij	90 c	androdamas	324 a	Appendix spina	158 d
alutamentum	ibi.	Anemo	146 b	appherema	109 d
Alyson	189 b c	anectos	108 c	Apumictus cura	158 d
Alypon	231 b c	anethum	176 b	apospingismus	331 d
Amala	96 d	anifum	175 d	Apraginos	64 c
amaracus	26 d. 27 a	Anguium senectus	82 d	Apteros	92 b
amaracinum duplex	ibi.	Anonis	159 a	Apuas	87 c
amara	46 b c	anosteos	78 d	apulas	ibi.
amarice	48 c	Anthalion	206 b	Apyrena	62 d
amamelides	71 b	Anthemis	eo. b d. 140 b	apyrenon	ibi.
amaracus	168 c d	anthemidis genera	eo. d	Aqua	198 c d
amaranthus	ibi. 230 b c	anthemea	ibi.	aquarum discrimina	ibi.
Ambrosia	197 d. 298 a	antheles	48 a	aqua marina	297 b c
ambra	46 b d. 47 a	antherices	108 a	aqua multa	295 c d
Amellum	23 a b	anthracidæ pisces	327 c	item folio	296 b
amentum	60 d	anthyllis	106 b	aqua frigida	30 d
Amiantus lapis	335 c	anthias	102 c	aquifolium, ia.	102 d.
Ammi	176 d. 177 a	anthrenæ	106 b	item folio	59 d
amilla	23 b	antinoius	271 d	aquiceli	36 b
ammium	ibi.	antispodos	310 b	Arabis	137 b
ammoniacum	187 a b	antiora	192 b	arabus lapis	174 d
Amomis	9 d	antirrhinum	257 d	aracus	115 d
amomum	eo c d	antitaura	192 b	arachnion	57 d
amorgis	56 a	Apalos panis	108 b	araneus	91 a
amorgynæ	ibi.	aparathe	71 c	araneorum genera	ibi.
Amurca	55 d	aparine	189 a	Arbores resinæ ferentes sex	
Ampeloprasum	134 d	Aper	90 b	folio	55 d
amphibia	160 d	Aphenum	7 c d	arbutus	71 a
amphicaustis	109 d	aphi	17 d	arbuti genera	ibi.
ampelitis	339 c	aphroditarium	63 a	Archemora	57 d
amphisbenæictus	356 c	apharca	71 b c d	arcton	249 b
Cura eius	360 d	aphritis	87 c	arcton	ibi. & c
Amygdalus	71 c	aphros	ibi.	Arenga	86 c
amygdalæ	ibi.	aphrya	ibi.	Argemone	146 c d
amylum	113 d. 114 a b	aphryæ	ibi.	argemone altera	147 a
Anabasis	227 b	aphyæ	ibi.	argentum uiuum	150 b
anagallis	147 a b c d	aphaca	133 d. 134 a	item folio	110 a b c d
anacabæa	69 c	aphia	134 a	argenti uiui genera	320 d
anacabos	ibi.	aphonitrum	329 b	Argyrion nama Chymistarum	
anacollia	177 c	aphroniteum	328 c. 329 b	folio	325 d
anatis	104 a	aphroselenon	335 d	Aria	44 b. 111 c
anatum differentia	ibi.	aphurca	71 c	arinca	111 c d
anagyris	210 b c	Apium	166. 178 a b	aris	142 c
anagnostis	272 d	apia	68 c	arifarum	142 c
anarrhion	457 d	apios	ibi. 230 a b	aristæ	108 a
anchusa	219 d. 220 a b	apiastrum	145 d. 193 d. 194 a		

I		N		D		E		X	
Aristolochia rotunda	141 d.	Antiplex	111 e d	Berberi	79 c				
item folio	143 a	Atharathrion	111 c	berberion	ibi.				
aristolochia longa	143 d	atramentum librarium	340 a b	bellis	166 c				
aristolochiae genera	160 a	Aureon	50 a	bellio	ibi.				
Armamentarij	47 c	auricula muris	149 d	Beta	113 b c				
armenius lapis	118 b	auricula muris altera	150 a b	betæ genera	ibi.				
armillini	97 a	Auena	260 a b	beta sylvestris	218 b				
Aron	141 b.	auripigmentum	324 a.	betonica	112 d.				
Arsacus	142 b c	item folio	350 a b	berylus	213 a				
arsenicum	44 c	Axinomantia	334 a	Bia	113 c				
Artemisia	324 a	axos	350 d	Biblos	104 a				
artemisia tenuior	197 b c.			Bilis	49 b c				
artemidorus	160 d			bilis duplex	103 c				
artheredones	250 c			bilis flauæ genera	ibi.				
Aruina	106 b			Bitumen	ibi.				
Afarum	102 c			bitumen ex fulmine	40 c				
afarus	5 d.			Blachnon	40 d				
Ascion chalcon	6 a b			Blastus muscelitis	134 b				
asclepias	142 c			Blatta pistrina	7 c				
ascyroides	311 a			blattarum genera	88 d				
ascyrum	189 c			blattaria	ibi.				
Assius lapis	211 c			Blechthon	248 d				
Asphaltus	160 b c			blethrum	164 a				
asphaltus	332 c d			Bliton	234 c				
asphaltites	12 c			blitomama	121 a b				
asphodelus	40 c			Boacæ	ibi. a				
asparagus	ibi.			boecæ	86 d				
asperugo	143 a b			bolbiton	ibi.				
aspidum genera	124 b c d			boletus	121 b				
aspidis ictus	271 c			Borrage	243 a				
Cura eius	357 c			Bosmorus	ibi.				
asphenium	317 b			Botis	156 c d				
aspris	363 c			botrys	112 b				
Assulæ	205 c d.			Brabylla	116 d				
Astacia	2 a b			Brassica	198 b				
Astacia	11 a			brassicæ genera	79 d				
astaphus	72 a			brassica sylvestris	112 a b c d				
astaphylinum	267 c d			Bredon	160 b c				
asterius	174 b			bregma	113 a				
aster	95 b			bretanica	135 b				
astorgion	255 c d			Bria	213 b				
astragalus	95 b			Brõmus	48 c				
Attacos	95 b. 211 a			Bruchus	112 a. 260 d.				
atraga	211 a			bruscandula	92 b				
atragenus	92 a			brutia	124 d				
athea	103 d			Brenthia	19 b				
attega	ibi.			bryon	150 b				
attelabis	121 c			bryon marinum	59 c				
Athera	133 c			bryonia	247 b				
ateramnon	92 b			bryton	232 d. 233 a b c d				
ateramna	111 c d			Bublerton	110 b				
atinia	116 c			bubonios	121 b				
Atractylis	ibi.			Buceras	155 a b				
atramentum sutorium	190 a b			buckeides	114 d				
d. item folio	321 c				201 a				
Et differentia eius	322 a								
atramentum metallicum	ibi.								
	323 a								

I	N	D	E	X
Buccina	78 c	cánchryæ	110 a	caros sylvestre 1 d
Buffo	96 a	canchry	181 d, 182 a	Carpalium 262 d
Buglossa, os.	256 a b	Candidum oui	91 c	carpasi succus 346 c
bulbina	143 d	candaulos	111 c	carpesium 262 d
bulbus uomitorius	143 b, 269 c	candylos	ibi.	carpæ 58 d
bulbus cibarius	143 c	Canicæ	103 c	Carpinum 38 c
bulborum genera eo. d.	144 a	canis ponticus	85 b	carpatinæ 217 d
Bumelia	45 b	canis marinus	ibi.	carpisculus ibi.
Bunias	119 a	carnis rabiosi signa	353 c d.	carpophyllos 262 a
buni	329 a	item folio	354 a	carphos 114 d
bunion 120 d, 121 a.	355 a b	Contra canis rabiosi morsum re-	354 b c	carpum ibi.
Buprestis	94 c, 343 c	media	354 b c	Carthamus 39 d
buphthalmus	207 b c	Cura uictus idem in morfu canis	355 a b	Carubum 78 d
Butomus	207 c	rabiosi	355 a b	carubulum ibi.
butyrum	98 d, 99 a	canirubus	51 a	carus, um. 178 a
Byrsodepsicon	325 a	Canna	47 c	Caryon 72 b c
byssos	203 d, 209 a	cannabis sylvestris	210 a	caryophyllos 118 c, 170 c
		cannabis sativa	eo. b	caryotidum genera 61 d
		cannabus	ibi.	Cafeus 92 b
		Cantharus	94 c	cafeorum genera eo. c
		cantharides eo. b c.	342 d	cafeorum differentia eo. d
		item folio	343 a b	Cassia 7 b, 8 b, 48 b
		cantharidum genera	ibi.	cassia fistula 8 b
		cantharis	108 a	cassia cathartice ibi.
		cantherij equi	89 b	cassia myrrha ibi.
		canthelij	ibi.	cassia siliqua ibi. c
		canthelci	ibi. c	cassia lignea ibi.
		canthonæ	ibi. c	cassia genera 277 d
		Caper	90 b	Castanea 59 a, 60 a b
		capis	44 b	castanearum genera eo. b
		capnos	250 b c, 92 d	castor 14 c, 85 a b
		Capra	90 b	castoreum 85 c
		caprificatio	75 c	Catacharce 258 a
		caprificus	35 c, 221 d	catacecaumene 294 a
		Capparis	144 d, 145 a b	cattyma 90 c
		& eius genera	ibi.	Caucalis 14 a, 131 c
		capparoculæ	79 b	caulias 134 d
		Cara	176 a	Cedrelion 43 d
		Carbasa	217 d	cedria 39 b, 43 b d
		Carbasinus color	217 d	cedrus 43 a
		carbatinæ	ibi.	cedri genera ibi.
		Carcinos	80 c	cedrelate ibi. & d
		Carchesium poculum	37 c	cedris eo. b
		Cardamon	9 a	cedromelon 68 b
		cardamomum	3 c d	cedrula ibi.
		cardamomi genera	eo. d	cedrium eo. d
		cardia	4 d	cedrea ibi.
		carduus	155 d, 117 b	cedrites ibi.
		Carea	72 b	cedrinus liquor ibi.
		Carides	239 d	Celester 51 d
		caries lignorum	46 c	celtica spica 5 b
		carion myristicon	46 a	celtis 69 c
		Carmafinus colo	217 d	Cenchridæ 113 a
		carmes	ibi.	cenchri morsus 357 a
		Caro	10 c, 176 a	Cura eius 361 b
		caron	ibi.	centaurium magnum 154 a b

¶ Litera C

Acabis	181 d	Cacabos	ibi.
cacalia	14 a, 254 d, 255 a	Cadmia	307 d, 308 a b c d
cachrys	46 b, 60 d	cadmiæ colores	308 b
caddiscus	217 b	cactos	241 d
Calais	336 c	calainus color	ibi.
calamintha	166 a b	calamites	86 a b
calamochnus	331 a b	calamus odoratus	10 c d
calamus	47 b	calamus Indicus	332 b
calcifraga	231 d	calistephanos	58 d
callistephanos	58 d	callielea	58 b
callichthys	103 c	callimus	336 c
calx	330 b, 328 d	Camarias	108 a
Camarias	108 a	cammarata	44 b
cammatida	ibi.	cammatari	87 c
campanæ	94 a	campe	78 a
camphora	40 a	campanæ	21 c
camptauli	47 d	Cancanus	14 a
Cancanus	14 a	cancanum	13 d
cancanum	13 d	cancer	80 d

I		N		D		E		X
Centaurium minus	154 d	Chamæ Platani		45 a	chymistarum uanitas	320 c		
item folio.	155 a	chamēga	19 d	277 c d.	chymiae scriptores	325 d		
ccentaurea	154 a b	item folio		278 a b	Chytlon	16 d		
centipedes	81 b	chamæleon albus		155 b	Ciboris	87 c		
Centuculus	199 a.	chamæleon niger	eo. d.	156 a	ciborium	116 d		
Cepa	134 d.	chamæcerasi		65 a	Cinnamomis	9 c		
ceparum genera	135 b	chamerhaphanus		119 d	cinnamomum	8 c		
cepæa	210 c d	chamædryas		191 c	cinnamomi genera	eo. d.	9 b	
cephalo	61 d	chamæleuce	197 a.	255 c	cinnamomū mosylicū	s d.	9 a	
Cera	107 a	chamæzeleo		225 d	cinnabaris	319 b c		
ceræ confectio	eo. b	chamæryphes		241 d	cinera	157 a		
cerana	70 c	chamæcillus		255 c	Cimbalaris	245 c		
ceranthemos	193 b	chamædaphne		263 d.	Cimices lectularij, & planta-			
ceras	93 d	item folio		264 a	rum	88 b		
cerasbolon	116 c	chamæmalum		206 d	Cimolia	339 d.	339 a	
cerastes	75 b	chamæfyce		276 c	cinerula	310 a		
ceratophyllax	218 c	chamæzolon		62 b	Cinis foci	330 c		
cerastē morfus	157 b	chamæpytis		212 b	cinis sarmentitius	ibi.		
Cura eius	167 c	Characias	273 b c.	275 a b	cinaura	102 b		
cerasia	64 d.	charadrans		227 b	Cicadæ	92 a		
cerasus	ibi.	charites		41 d	cicer	115 b c		
cerasorum genera	ibi.	charma		193 a	ciceris genera	eo. c		
cerasa amarasia	ibi.	charmi		217 d	cicercula, um.	ibi.	321 a	
ceratia	eo. b c	Cheiri		254 b	Cices	62 b		
ceratonia	eo. b c	chelidonia		148 d	cici	272 c d		
Cercis	210 a	chelidonia minor		149 a	cica	ibi.		
Cerea	5 d	chelidonium lapis		93 b	cicatrix	14 a		
cercia	60 b	chelones piscēs		83 c	cicuta	346 a b.	140 d.	141 a b
cerebellum gallinaceum	90 d	chelonia		140 c	cicutæ genera	241 b		
cereum	107 c	chenes		102 d	cicum	63 b		
Ceribia	108 c	chenoboscion		ibi.	cicures	ibi.		
cerinthe	193 c	chelidonia phragnites		250 b	cicuri	ibi.		
cerinthus	eo. b c	chenopus		170 a	cicerbita	117 b c		
Ceroma	17 d	Cichria		109 b	cichorium	118 b		
ceromata	21 c	chidros		ibi.	citreoli	129 d		
ceronia	65 b	chironias		55 a	cicutaria	198 c d		
Ceruleus lapis	138 b c d	Chole		103 c	Cion	272 c d.	78 d	
cerulei genera	eo. b c	chondros	112 a c d		cionion	78 d		
cernas	93 c	choridiosa		320 c	Ciphilion	241 d		
ceruiocellus	179 d	chorus Aphrodisias		2 a	Circæa	199 c d		
cerusa	348 c d	choroni		64 b	Cirri	285 b		
cerussa	316 c d.	Chrima		21 c	Cis	272 d.	326 b c	
Ceryx	78 c	Chrisma		ibi.	Cistus	52 a b		
Cesypium	52 d	Chroma		26 d	cistōs	eo. d		
cestrum	213 b	chromasius color		ibi.	cistaros	ibi.		
Chalaxia	314 d	chryfocollæ genera		317 d	cissus, os.	ibi. & d.	143 c	
chalcan	207 c	Chryfocolla	150 b c.	312 d	cissanthemon	140 c		
chalcis	96 b	item folio		317 b	cissophyllon	ibi.		
chalcidica	ibi.	chryfobalanus		61 c	cisseris	116 b		
chalcanthos	312 a.	chryfocorallium		79 d	cissybon	143 c		
chalcanthum	ibi.	chryfocome		239 c d	Citron	7 c		
chalcanthum uiride	323 c	Chrysanthemus		230 c d	citrus	67 d		
chalcitis	322 b.	chryfagonon	229 d.	230 a	citromela	ibi.		
chalcus piscis	327 d	chryfomela		66 c	citrium pomum	ibi.		
Chamæ	29 c d	Chydræ		64 b	citrea mala	eo. c d		
chamarum genera	ibi.	Chymistæ		320 b	citrago	194 a		

I.	N	D	E	X
Citynus	63 b	colybista	ibi.	corydalis 92 d
citynum	ibi.	Comaros	71 a	ibi.
Cleonia	15 c	comaron	ibi.	corymbia 183 a
Clinopodium	190 d	Comites	47 b	corymbus ibi.
Clematis 214 d.	215 a, 232 a	comaris	335 d	corythalion 57 d
clematis altera	215 a b	Conchis	116 c	Colimofandalos 64 b,
Clymenos	216 d.	conchylium	79 d	item folio 332 c
Cnacon	286	Condylus	eo. d	Costus 9 d
Cnicus 19 d.	285 a	condrilla	118 c d	costus trifarius ibi.
cnipes	46 c	Congros	57 c	costi tria genera 10 a
enceros	277 d.	Conia	76 a,	Cottabis 34 b
cnestron	ibi.	coniasis	319 d	cottabus ibi.
Coagulum	100 b c	coniata chrisia	20 c	cottabica ibi.
Cocalia	80 c	conis	17 d	Cothon 115 b
Coccalus	36 b	conifalon	17 d	Corinos 57 b, 58 a
coccalus	157 d	coniferium	ibi.	coronea 66 b
cochleæ	80 b c	Conos	36 b	Cotes 317 b
cochleis	eo. c	conum	33 d.	cotricula ibi.
cochlax	ibi.	connarus	50 c	cotula 107 a, 215 d
cochlia	ibi.	consecratrix	1 a c d	Coyledon 245 c
cochlearum genera	ibi.	consiligo	111 b	Courmi 110 a
cochleare	142 a	conspersio	102 b	Crada 75 b
coccinea uestis	218 a	conuoluolus	215 b	Crambe 112 b, 123 a
coccomelea	70 c	Conyza magna	200 a	crambalea 122 b
cocomelos	ibi.	conyza parua	eo. b	crambus 127 a
coccus	275 c	conyza tertia	ibi.	Cranius 70 a
coccus	227 b c	Coptica fidelia	33 d	Crataegonum 102 c
Codia	225 b	Corallium	331 d.	crategos ibi.
Codymalon	66 b c	item folio	147 c	crategona ibi.
Cole	10 b	corallius	ibi.	Creocaccabos 104 a
Coggigrya	70 c	coralis	ibi.	Crepis 169 b
Coicina	227 d	coralij fastigia duo	332 b	erepula ibi, 251 a
coix	ibi.	Corchorus	147 c	Cremes 14 a
Colchicon	243 c d	Cordylon	175 c	Cretura 108 c
colocynthis	23 c d	cordumeni	3 d	Cremor lactis 97 c
collection	58 c	Corianum	177 a b	Cribana 108 d
Colocalia	116 d	coriandrum	ibi.	crithanias 109 c
Colorum ratio duplex	318 d	corion	ibi.	Crina 24 c
color melinus	339 b c	coris	211 d.	Crimmon 110 d, 111 a
color paretanius	eo. c	Corma	110 b	Crinonia 193 a
colores floridi	318 a	Cornea	64 c	Crision 253 b
colores austeri	ibi.	cornocerasium	65 a	Crithmum 116 c d
color sanguineus	319	cornus	70 a	crispina 50 d
colostre	97 c	cornus indica	ibi.	Crocum 14 c d
colostrati	ibi.	cornopæ	92 b	Croci genera eo. d
colostratus mons	ibi.	cornu ceruinum	93 c.	crocotula 170 c
colostrum, a.	ibi.	Coroneola	54 b	crocus sarracenus 286 a
colossinus	140 c d	coronarum genera	64 b	erocomagma 15 b c
Columbarum genera	104 d	corona	eo. c	crocodilos 156 b, 96 c
columbaris	231 b	corolla	ibi.	crocodilca 105 a
colluthra	116 a	Coroneola	51 a	crocodilina ibi.
colymbades oliuæ	58 a b	coronopus	117 a b.	crocodilitis ibi.
columbarium	78 d	corruda	124 d	Crotones 18 d
columnarium	ibi.	Corfion	251 d.	croton 57 c
colythra	75 a	Cortex thuris	33 d	Crymodes 111 a
Colybus	115 d	Corylus	73 a	Crucialis herba 189 c

I	N	D	E	X	
Crucialis herba	139 c	Damalis	102 d	Droxanus	188 c
Cyaneus	318	Damalioſi	ibi.	Druini morſus	356 d
Cyanioſ	116 b	Daphnitiſ	7 b c. s a	Curaciuſ	366 d
Cyanuſ	201 d. 318 d	daphnoiſ	7 c	Drunculi	241
Cydyomalon	66 c	Daphnideſ	44 d	Druppa	16 d. 20 c
Cyclaminuſ	140 a b c	daphnoideſ	ibi. 263 c d	Dryoſ	58 d
cyclaminuſ altera	eo. c d	daphnococci	ibi.	dryopeteſ	86 a
item folio	141 a	Darcuſ	7 c	dryopteriſ	285 c d
Cyllaſtiſ	108 c	Daliſpodion	53 d	Duracina	90 d
Cyma	122 c	Daucuſ, um.	131 c d. 174 b	¶ Litera E.	
cymbium	148 c	c d. item folio	180 c	E Benuſ	53 b c
Cynocrambe	242 c. 286 c	Daucorum genera plura	ibi. c	Ebeni	58 c
cynoctonoſ	ibi.	item folio	180 d	Ebur 93 b.	Ebuluſ 279 b c
Cynopa	120 d	Delphax	89 b	Ecidioſi	85 d
Cynomaron	156 a	delphinum	180 b	Echiſ	81 d
cynomoroſ	242 c	delphinum alterum	181 a	echidnae	ibi.
cynomorphoſ	14 c	Demoſ	102 b	echioſ	220 d. 221 a b
cynorhodoſ	51 d	Dendroideſ	274 b	echioſ genera	221 a b
cynorhoda	54 b	dendrolibanuſ	33 d	Echinuſ marinuſ	27 b
cynomyæ	272 d	denſ caninuſ	90 c	echinorum genera	ibi.
Cynogloſſoſ	256 d	Derceumenoſ	83 d	echinometrae	ibi.
Cynobateſ	256 d	Detiſ	135 d	echneiſ	ibi.
Cypariſſiaſ	274 a	Dialptarioſi	51 d	Elaphoboccuſ	279 d
Cyperuſ	3 a. 10 b	Diacheron	12 d	elaphioſ	93 c
Cyperuſ indica	ibi. b	dialeucon	15 a	elanæ	60 a
Cyperiſ	ibi.	diaphaneſ	330 b	elata palma	12 c
cyperida	ibi.	diaporphyron	13 a	elaterium	226 d. 227 a b
Cypiruſ	2 d. 3 a c	diaxyton	12 c d. 13 a	elatine	224 d. 225 a
cyphi	14 b c	dictamuſ	164 a b c d	Electrum	46 d
cypſella	17 d	dictamuſ Cretica	ibi.	Electri genera	ibi.
cypruſ	51 c	diglaucion	187 d	elegia	47 c
Cyribia	108 c	Didaliſ	110 a	Eleomel	16 a b
Cyſteolithoſ	356 d	Diphrygeſ	523 c d	Eleoſ	57 d
Cytinoſ	52 c	Dioſbalanoſ	72 d	eleoſelinum	178 c
cytiſuſ, um.	271 b	diopſpyroſ	208 b. 64 d	eleothrepton	ibi.
Cubebe	262 d. Cuci 272 c	Dipſaſ	81 d	eleliſphacuſ	165 b
Cucurbita	129 a b	dipſacuſ	156 b c d. 12 d	Elleboroſum album	264 b c d
Cucumer ſatiuſ eo. c d.	267 b	dipſadiſ morſuſ	357 c	elleboroſum nigrſ ibi. & 265 a b	
cucumer ſylueſtre	366 c	Curaciuſ	360 d	eleogaron	87 d
Cucurbitula	380 c d	Diſcuſ Soliſ	320 b	Elephaſ	93 c
eucumiſ	ibi. c	Dolichuſ	117 d. 262 a	elephantuſ	ibi.
Culmuſ	108 a	domiporta	80 d	Elymaeuſ	31 d
Cuminum ſatiuſum	276 b c	dorciſ	13 b	elymaei	ibi.
cuminum ſylueſtre	eo. c d	dorcidium	ibi.	elydrion	286 a
Cuniculuſ	83 d	dorx	93 d	Embafiſ	47 d
cunila	267 b c	dorcaſ	ibi.	Embrion	46 c
cunila gallinacea	167 a	doryon	238 a	empetron	281 d
item folio	267 b c	dorycnion	ibi. & b. 344	Encardiſ	61 d
cunila genera	200 b c d	& ſequenti.		Encephaloſ	eo. d
item folio	201 a b	doſſuariz pelles	97 a	enorchos	ibi.
Cunilaginiiſ genera	200 a	draba	137 b	Enula campana	15 c
Cupreſſiſ	41 b c d	Draco marinuſ	81 a	enoplion	47 d
Curallium	332 a	dracuuculuſ	141 a b c d	enthæmon	58 c
D	¶ Litera D.	dracunculuſ parvuſ	eo. c d	Epalelima	21 c
		item folio	142 a	epargos	38 c
Dama	93 c	Dropax	136 c	Epatica	229 b
Damale	102 d			B	

I	N	D	E	X
Epeda	44 b	F Litera F	Foeniculum	180 a b
ephemeron	244 a b, 144 b	Folium sylvestre	Foeniculum erraticum	ibi.
ephemeron duplex	243 c d	Flos achaicus	Ferula	181 d
Ephialtion	208 a	Flos syriacus	Ferulae genera	183 a
Ephithon	312 a	Flomus	Ferulago	ibi.
Epidormisnata	44 b	Fuligo	Furfugium	197 a
epidiphnides	ibi.	sumus	farfaria	ibi.
Epimelis	69 b	fuliginis compositio	flammea	201 a
epimelon	71 b	fuliginis Resinae	flammea rj	ibi.
epimelida	ibi.	fuligo picis liquidæ	fungi	242 d
epimedium	218 d	fraxinus	fungorum genera	243 a b
epimetron	169 d, 170 a	fraxini genera	fucus marinus	247 c d
epipactis	250 a	fraxinula	fuci genera	ibi.
epispastron orchomenium	48 a	fraxinago	fumaria	250 b c
epipetron	169 d, 170 a	februa	fidicula	259 c
epithymbrium	167 b	fagus	Filix	283 d
epithymbiton	92 d	fragi duo genera	Filicones	284 a
epithymum	98 c, 166 d	fagus Scissima	Filix foemina	284 a
item folio	281 a b	ficus Aegyptia	Filicula	285 a b
epityum	58 b	fabagrica	fuligo pictoria	339 d
Equisetum	226 d, 227 a	fabas Syriaca	fungi	340 a b
equisetum alterum	227 b	fraga montana	ferrum	343 b
eranthemon	206 d	ficus Cypria	flos æris	310 d
eretræ terra	338 b c	Ficor genera	flos salis	328 b
Eresios	57 d	ficorum nomina	Fex uini	329 c d
Ergasima myrrha	29 d	Frugilega	Fex acet	ibi.
Erica	49 a	Fiber	Fecula	ibi.
ericeum mel	ibi.	fibri testes	Flos gypsi	330 b
erinaceus terrestris	77 c	felis	Litera G	
erinos	221 d	Fulica	Ladiola, Iris	1 a d
eritimus	327 d	Ficedula	Geu	2 d
erichinus	ibi.	Fel	Gallica Nardus	5 b
erigeron	246 d, 247 a	Fimus	Gizer	7 c
eruca	131 d, 94 a	fimi differentie	Gazella	13 b
eruca pinorum	343 b	Fruentum	Glocon	17 d
Eruilia	118 a	Frit	Galbanum, Metopum	19 a b
eruum	117 d, 118 a	Fertini	gabireæ myrrha	29 d
Erisisceptron	12 c	farinae nomina	galbuli	41 d
erythacus	44 c	furfures	galbæ	ibi.
erythros	61 b	farris quatuor discrimina	gingros	75 c
erysimon	137 b c d	fabilla	gerra cefyma	47 b
eryngion	159 d, 160 a	fabulus albus	gerandryon	56 c
eryngiatum	ibi.	farrago	glans	58 d
erythrodanum	208 d	farraginaría	glans Iouis	59 a b
Elcharule	106 d	foenugrecum	garbion	60 a
Eufragia	218 a	foenigræci farina	galla	60 b c
eupatorium	225 a	fabâ	gallæ genera	ibi.
euphorbium	186 b c	fabulum	grossi	75 d
euphorbia	ibi.	fabalica	grossuli	76 a
eumphalos	53 d	fabago	Galeos	76 a
eupteros	359 d	fabægyptia	Gefentera	81 b
exhalme	60 d	Fremium	Gobius	80 c
exalipites	21 c	Fel terræ	Garrum	86 d
exalburnare	102 c	item folio	Garus, um	87 b c d
exalburnatum robur	ibi.		Galecula	ibi. & c
Excantare	132 b			87 c

Manna thuris	34 a b	Memecylon	ibi. & d	Marciatum unguentum	ibi.
Manna	ibi.	Moraciae	71 c	Marci pastilli	ibi.
Maza	34 c	moracillae	ibi.	Mydas	103 a 115 e
Mastiche	45 d. 37 a.	mollusca	ibi.	Mola falsa	109 b
mastiche, Silphium	44 b	morus	73 a b	Maza	110 a
mastichis duo genera	ibi.	maratha	eo. b	milium	111 d
maltha	41 b	moreos	eo. c	miliarium uas	113 a
mustax	44 a	morofycos	ibi. d	miliaridae aues	ibi.
mustacea	ibi.	metrae	77 b	mel frugum	ibi.
martiae	ibi. b	myaces	79 a	malua	121 b e
magides	ibi.	myes	ibi.	metacharon	126 d
male	ibi.	Myiscæ	ibi.	medica	133 d
magis	ibi.	musce	ibi.	molyra	135 d
Mileca	45 b	musculus	ibi.	malum terræ	140 b
Melea	ibi.	mytulus	ibi. & b	mysora, tis	146 d. & seq.
milon, Taxus	ibi.	myxa	80 c	Murtiolum	157 e
inacer	45 d.	marali	81 d	Murtius campus	ibi.
magadis tibia	47 d	marfi angues	ibi.	Murtea Venus	ibi.
Myrica	48 c	milus piscis	84 b.	mullus.	ibi.
mices	57 d	multella	85 c d	myrtus	ibi.
morfa	eo. d	mutili	86 a	myrtella	ibi.
Melandryon	50 d	maris	eo. c	melitis	162 a
myrobalanus	61 c	maruda	ibi.	mentha	165 c d
malum punicum	63 c d	maenæ	ibi.	minttha	eo. e
malorum punicorum genera	ibi. d	inelandrys	87 b	menthastrum	eo. d. 166 a
Malicorium	61 c	muria	eo. d	melilotos	169 b
myrtus, a.	ibi.	muries	ibi.	marum	eo. b c. maru ibi. c
murta	ibi.	millepeda	88 c d	niagnesia	eo. c
murratum	ibi.	matalis	89 b	Moly	171 d. 172 a
murtatulum	ibi.	Mafones	92 a	Molon	eo.
myrtatum opsonium	ibi.	Mafonia	ibi.	melanthium	183 d. 184 a
Myrsine	ibi.	mafon	ibi.	melanthemon	184 a
Myrti genera	ibi.	mastace	92 b	melandryum	ibi.
myrta coniugalis	ibi.	moloris	eo. b	magydaris	185 a b c
myrtæ	ibi.	malleolus	93 b	malpeton	185 b
melilotini	64 b	mulus	eo. d	Myxa	188 d
myrtidanum	eo. c d	myrmecion	95 b	marrubium nigrum	Myxaria ibi.
myrtida	ibi.	muscarius	ibi. c	marrubium	193 c d
Malus, um.	65 d.	mus araneus	ibi. & 96 d	marrubium duplex	194 b c
Mala urena	ibi.	mygale	96 d. 97 a	mithridation	196 c
malorum genera	ibi.	Mus	97 a	malanthemon	196 d
melea	65 a	marmotæ	ibi.	Muralium	197 a
mustea	eo. c d	molce	100 c	Matricaria	eo. b
mala dulcia	eo. d	melandryon	102 c	malua	209 d
Melimela	ibi.	moschos	eo. d. 103 a	maluæ genera	ibi.
Mala orbiculata	ibi.	moscheuma	ibi.	medion	218 c d
mala sylvestria	ibi. a	medulla	eo. d. 103 a	mathieronion	219 a
mala persica	eo. b	Myma	104 a	macheronij pastilli	ibi. & b
mala præcocia	eo. c	Mel	105 d. 106 a b	macherion	ibi. b
malum Medicum	eo. c d	mel Sardoum	eo. c	millefolia	223 b
malum Hespericum	ibi. d	mel Ponticum	ibi.	mercurialis	224 b c d
Mespilus, um.	69 a	mel Hereacleoticum	ibi.	mamiras	226 d
Mespilorum genera	ibi.	mel Manicum	106 c	Melancranis	229 d
mespilum trigranum	eo. b	mel Menomenon	ibi.	Meconium	234 b
myxa	70 d	Mazapanis	106 c	Mandragora	235 a b c d
triadrya	ibi.	Marcipanis	ibi.	item folio	239 a b c

I	N	D	E	X
* Limax	90 c	Lactuca	190 a b c	Laurus Alexandrina 269 a b
Lepus marinus	83 b	Lactucæ genera	eo. b	Licium 270 c
Lepus terrestris	ibi. c	Lactuca sylvestris	eo. c d	lappago 271 c d
Leporum genus triplex	ibi. d	& eius genera	ibi.	lactuca 274 c
Loligo	84 a	lanaria herba	189 c d	lactaria eo. b c
lolliguncula	ibi.	lepidium	145 b	lactariæ genera eo. d
lutra	85 a	lepidij genera	ibi.	lathyrus 275 c d
lytra	ibi.	lutea	150 b c	labrusca 282 a b
liquiminarij	87 c	lepton	155 a	linozostis 286 b
lupus piscis	ibi.	labrum Veneris	156 b c	lora 288 a
liquor fociorum	ibi.	luma	eo. d	lapidum aliquot uires 337 c d.
Lagonoponos	89 b	lumeſta	ibi.	item folio 338 a
Lactes	ibi.	Lumaræ falces	ibi.	lapis Samius 339 c
larinæ larini	eo. b	Leucacantha	159 b	lac coagulatum 343 d
lerini	ibi.	ligusticum	173 c d	lepus marinus 350 b
lebias	89 c	libanotidis genera	182 a b	Lutea 357 b c
lichenes equorum	90 a	laſer	184 b d.	lomentum 358 c
lyllon	eo c	laſerpitium	ibi.	Lutum Venerum 361 a
locuſtæ	92 a b	leucoporon	188 a	libri repumicati 366 b
Loba	92 b	leucophæon	ibi.	latos piscis 368 a
Lacerta uenenaria	94 d	Lithocolla	ibi.	lixium muſtum 350 a
Lupus araneus	95 c	Lappa	189 b	lapis Iudaicus 355 c
lacterta, um.	95 d.	leontopetalon	191 a	lapides ſpongiarum 356 d
lumbrici	96 c	leucas	191 d.	lathocolla ibi.
lactis uſus	97 b	leucæ genera	192 a	
lactarium opus	eo. c	lychnis	eo. a b	¶ Litera M.
lac muliebre	98 a b	lucernula	ibi. b	
lanarum medicina	99 b	lychnis ſylueſtris	eo. c d	M Artia radix, Iris 1 a
lanæ ſuccidæ	ibi. c	Lilium	192 d.	Meon, Meu. a c d
lanæ uſtæ	ibi.	Liliij genera	193 b	Meu duo genera eo. d
Lana, Erion	ibi. c	lomentum	198 d.	Melligera 3 d
Lanarum discrimina	99 c	lilium ſylueſtre	201 b c	Malabathrum 6 d
lipos	102 b	liguſtrum candidum	201 d	Malabathri genera 7 a
laridum	eo. c	lutearum genera	202 a	Mortodes 7 c
lotium	105 c	lithoſperma	203 b	moſelytis blaſtos 7 d. 89 a
Lyncurium	ibi.	Lonchitis	209 a b	myrrha caſſia 8 b
Lynx	ibi.	Lonchitis altera	eo. b	muſcus 13 a b
libum	109 b.	Lyſimachia	213 d	moſchuſ odoratus ibi.
lutum Vulcani	109 c	limonium	218 a b	muſcilion 13 b
lepyria	111 a	lagopus	218 b c	magma 15 c
leſſus	113 a	lagopyros	eo. c	medica 15 c
lolium	eo. c d	lycopliſ	220 d	Manna 16 a c
linum	115 a	Lichen	229 a b	Melligo eo. c
Lecithos	115 d.	Lycocſtonos	240 c	Metopium 19 a
Lcithopolæ mulieres	116 a	lens paluſtris	244 b c	Melanthemom 20 a
legumẽ omne tribus modis man- ditur.	ibi.	laſtoris	248 a	moſchata 21 c
lenticula	ibi.	lychnitis	eo. d	moſchomyra ibi.
Lens	117 b c	lotus urbana	250 d	moſcholea ibi.
Lupinus	118 a b	Lorophagi	ibi.	myra 21 d. 30 b
Lapathum	120 a b	Lotus ſylueſtris	250 d.	myracopa ibi.
lampſana	eo. d	item folio	251 a	myrrha 29 d. 30 b
lupulus	124 d	lotus Aegyptia	251 c d.	myrrha troglodytica ibi.
lupus ſaliſtarius	ibi.	lotometra	eo. d	Myrrha Caucaſis ibi. 30 c
lupus reptitius	ibi.	Leontopodion	257 a b	Myrrhæ genera 30 b
Lauer	125 d.	Lappa minor	259 d	Myrrhæ probatio eo. c
		lapparum genera	260 a	Myrrha Bœotica 31 b

[illegible]

I	N	D	E	X
Gonos Thalassios	37 c	Gramen Cilicium	ibi. c	Hippomani testes 34 c d
Gallaria piscis	38 c	granum tinctorium	227 c	Hyrca 57 b
Genitale Cerui	39 d	Galiopsis	246 b c	Hysca ibi.
Gallina	90 d	galion	eo. c d	Hyn ibi.
Gigleria	91 a	glauz	261 a b	Hyccara ibi.
Gallinarum tria genera	ibi.	genista	269 a b	hyena eo. c
Gallinaria	ibi.	Glans unguentaria	269 d	halme 37 d
Galerita	92 d	item folio	270 a	halos achne ibi.
Ginni	93 d	geodes	337 c d	hepar 39 c
Gygenij	ib.	gypsum	349 b	hepatus ibi.
Gaphagæ	96 c	item folio	350 a b	hippomanes 90 a
Grassos	102 b	Gypsi genera	ibi.	hippi 91 a
Grasson	ibi.	galena	315 a b	herodius 91 c
grassonia	ibi.	gastra	317 a	hirundo 91 a
grasson	ibi. 108 a	gluma	327 d	hirundinum genera ibi.
gerania	109 d	gorgonia	332 a	Hinnus 93 d
grastis	111 b	gagates	334 a	Hinnulus ibi.
gossampinus	115 b	gagis	ibi.	Holcos araneus 95 d
gossipion	ibi.	Galactites lapis	eo. d	Hippace 98 d
Githon	ibi.	item folio	335 a	Hippace ibi.
gry.	116 c	Galaxia	334 d	Hordæ 101 c
Gongyle, lis.	118 d	Galaicos	335 a	hordicalia festa ibi.
Gingidium	130 d.	Hierida, Iris.	Litera H	hellops 103 c
gedyum	134 c	Hirculus	1 b	hypotrimna 104 a
gingiber	138 d	Helis	4 c. 5 a	hyposphagma ibi.
glastum	150 b	Hieracunta	10 b	hordeum 109 c
Glastum syluestre	eo. c d	Haormia	21 d	hordei genera ibi. d
Gentiana	152 b	Heliacón	13 c	halica 112 c
glycyrrhiza	153 c d	Helenius	14 b	halix ibi.
glycis ancon	162 a	Hydrleon	15 c. & 16 b	helymos 113 a
gordylon	175 c	Halmon, oleū.	16 d	Hium 116 c
gith	184 a	Hygromyza	19 a	Halisparton 108 c
Girago	184 a	Hydrorofara	21 c	Hippolapathum 110 c
galbanum	186 c d	Hemisomata	22 a	humulus 114 d
galbeum	ibi. d	Herba	34 c	hydropiper 119 a
glaucium	187 d	Harundo	43 a	hastula regia 142 d
Glutinium	188 a	Harundinum genera	47 a b	item folio 143 a
Gluten	ibi.	harūdo obliqua	ibi. 48 a	Hedera 147 d. 148 b c
glutinium genera	ibi.	halimus	eo. c	Hederæ genera ibi.
gluten atticum	eo. a	halimi genera	48 c	Hyssopus, um 162 b
gluten piscium	ibi.	Hemicypus	49 d. 50 a	Hedyosmos 165 c
geranion	198 b	hypocistis	50 a	harmela 171 d
geranion alterum	eo. c	hebenus	51 c	hieracia 177 b c d
gruina	198 c	hebeni genera	52 b	hieracia parua ibi. c d
gnaphalion	eo. d.	Halmades oliuæ	53 b	Hipposelinum 179 a
gnapheus	198 d	hala	ibi. c	Hippomarathrum 180 b c
gnaphos	ibi.	hemeris	78 a b	Hippophanes 198 d
gnaphalus	ibi.	haliphlocos	ibi.	hemerocallis 201 c
gnaphalides	199 a	hypothymis	eo. d	horminum 204 a b
glycysis	208 a	hypomelides	59 c	hedyfaron eo. a b
gladiola	219 a b	homomelis	64 b	hemionion 205 d 206 a
gladiolus	ibi. b	hegeteria	71 b	hemionitis ibi.
gramen	221 d.	Halicacabus	eo. b	heluron 207 c
graminis genera	ibi.	Hippocampus.	74 c	helurios ibi.
gramen harundinaceum	eo. b		76 d	Hypericum 211 b
Gramen Parnali	ibi. b c		78 a	Holostæon 216 b

I		N		D		E		X	
Mala infana	239 a b	Nardi species nouem	4 b	Nitrum	328 c d				
Myctonos	239 d	Nardus Syriaca duplex	eo. c	Nittaria	eo. d				
mycophonos	ibi.	Nardus Indica	ibi.	¶ Litera		O.			
margyllios	241 d	nardus Celtica	4 d. 5 a	O Zis		7 c			
margarides	ibi.	nardum montanum	5 b	Oxyfchænos		10 b			
millefolium	252 b	niris	5 b	Olofchænos		ibi.			
myriophyllon	ibi.	nardum syluestre	eo. d	Opobalfamum		11 c			
myrrhis	eo. c	nardum rusticum	ibi. 170 b	Orefitum		15 c			
myla	eo. c	nardum syluestre	6 c	Opitais		16 c			
Myagros	eo. d	nardum Creticum	ibi.	Oleum omphacinum		ibi. & d			
Melampyros	ibi.	Ner	13 b	& fit duobus modis		eo. d 17 a			
myrtus syluestris	262 c d	Narcaphthum	13 d	Omotribes		16 d			
myrobalanos	269 d	nectarion	15 c	omphacium		ibi.			
mollugo	271 c	nenuphar	16 c	omphax		ibi. 17 a			
myrsinite	273 d	nigella	20 a	omphaciomel		ibi.			
meconium	276 a	nux Indica	21 c	oleum Druppæ		ibi. &			
Mercurialis	286 b	nuces pinæ	36 b	proba eius		ibi.			
Mulfum	295 a b	nucum pinearum. 4. genera	ibi.	oleum syluestris oliuæ		17 a b			
melicaron	ibi. d	nux Sapinea	ibi.	oleum Candidum		ibi.			
muria acida	98 d	naphtha	41 a b	omiotribes		ibi. b			
mel Heraclæ	345 c	neurospastus	31 a	oliuitates uariæ		ibi. b			
mandragora	347 a	neruus passus	ibi.	oleum Sicyonium		17 c			
Meconium	eo. b	Naucus	57 c	Oleum Cicorum		18 c d			
Muris aranei icus	356 a	Nacæ	ibi.	Oleum Amygdalinum		19 a			
Cura eius	360 a	Netrindes oliuæ	58 a	Oleum Balaninum		eo. b c			
melomeli	301 a	naueratites	64 a	Oleum Sefaminum		ibi.			
molibdojdes	314 c	nux	66 b	oleum Carinum		ibi.			
molibdena	315 a b	nucipruna	70 d	oleum Hyofciaminum		eo. c			
Minium	319 c d	nelia	71 a	oleum Cnidium		ibi.			
miniare	eo. d	nux regia	72 b c	oleum Cnicinum		19 d			
minium Sinopici	320 d. 321 a	nux perfica	ibi. c d	oleum Rhaphaninum		ibi.			
mitos	321 a b	nux Auellana	eo. d	oleum Melanthini		ibi. & 20 a			
Mitopariæ naues	ibi.	narce	81 b c	oleum Myrteum		20 b			
Misy	322 d. 323 a	napunculum	91 b	oleum Laurinum		ibi. c			
melan	323 a	Nebron	93 c	oleum Lentifcinum		eo. d			
melaneria	ibi.	Notiaos	103 a	Oleum Mafichinum		21 a			
musæa	326 b	Nectâ	104 a	Oleum Rosacium		eo. d 22 a			
musæarij	ibi.	Naftos	105 d. 114 c	Oleum Elatinum		22 c			
Muficiumopus	ibi.	nelinos	113 a	Oleum Melinum		ibi.			
Muria	327 d. 328 a	nafsturtium	136 c	oleum Oenanthinum		ibi. d			
Muria duplex	328 a	nycteris	147 c	oleum Anthinum		ibi.			
Maltha	330 a	nycteritis	ibi.	oleum Telinum		23 a			
Milios	333 a	nepita, eta	146 b	oleum Sampfuchinum		eo. b			
militis	ibi.	nephastum	178 b	oleum Ociminum		eo. c d			
magnes	334 c d	Narthea	183 a	oleum Abrotoninum		ibi.			
magnetis genera	ibi.	nigella	184 b	oleum Narciflinum		24 d			
melitites	335 a	Nymphæa	204 d. 205 a b	oleum Crocinum		25 a			
Morochithus	ibi. a b	nymphæa altera	205 b	Oleum Gleucinum		26 b c			
Molochitis	ibi. b	nautea	210 c	Oleum Aegyptium		28 b			
Memphites	315 d	neuras	229 b	Orobia		31 a			
¶ Litera N		nerion	242 c d	oleum Picinum		29 d			
N	Ar. Iris.	Nux odorata	270 a	oxycedrus		43 a b			
		Narciffus	270 a b c.	oriptelea		46 b			
		item folio	271 a b	oxycantha		50 d			
		Nummus uenerus	320 c	Olea syluestris		57 a			
		Narica	327 d	Oleaster		ibi. & b 58 a			
Nardus, dum.	1 a								
Nardi genera	3 d. 4 a								
	ibi. & seq.								

I	N	D	E	X
Oleastellum	eo. c	Oschos	eo. d	onyx 315 b
olea cilihraca	ibi.	Ocae	ibi.	Onychipuncta 316 b
olea medulla	ibi.	omphalos	106 b	Ophites. 316 c d
ollarij	ibi.	oxylepes	108 d	Ostracite 317 a
olea Arabica	ibi.	offa	110 a	¶ Litera P
olea uita longissima	ibi.	olyra	111 b	Parallelæ 2 a
olea Orchitis	eo. d	oryza	112 b	Piper aqueum ibi. b
ostracifinus	39 a	Onobleton	111 b	piperapium ibi.
oliuæ Colymbades	eo. a	olus	112 d	pseudocypirus 3 b
oliuæ uariæ	ibi.	olla	ibi.	pifon 4 b
oliuæ cibariæ	ibi. b	ocimum	131 d, 132 a b	pyritis 5 c
oleum syluestris oliuæ	eo. b	ocymum	132 a	perpensa eo. d. 6 a
olea Aethiopica lachryma	38 c	orobanche	eo. c	perpensa 6 a
Onicicidæ	60 c	ornithogalum	133 a	Phu 6 c
oxyphoenicæ	62 b	Oxybaphon	141 d	phyllon unguentum 7 a
oporothea	66 b	Omoconitidis	143 d	pseudocafia 8 a b
opora	ibi.	Othonna	149 b c	pseudocinnamon 9 b
oxymala	67 d	ononis	159 a	Pyxacantha 11 c
Oen	70 b	origanum	162 d	Porrigo 12 c
Oien	ibi.	origani nomina	163 a	Phafganon ibi. & d
Oa	ibi.	onitis	163 b	piperella 13 c
onomalidæ	71 b	Origanum syluestre	eo. b	perlica 15 c
Opifihocarpion	75 a	Ocimastrum	169 d	puluifculus 17 d
olynthos	76 a	Oreofelinum	173 c	patos ibi.
Odynolylon	77 b	olufatrum	179 a	phafelus Romanus 18 d
Ostrum	78 b	opos	185 a	pæderos 18 b
ostrea	ibi. 79 c	omphacocarpon	189 a	plaste ibi. 30 b
onyx	79 d. 80 a	oenanthe	199 d	pediafmos myrrha 39 d
ostracon	eo. d	organorum notæ	200 c d	plafinx 34 b
ostracium	ibi.	orchis Serapias	203 c	pinus 34 d 35 a d
Ophloctena	81 b	Onofina	204 d	picea ibi. 35 a d
omotarichos	87 a b	oxofina	ibi.	paniculæ 35 a
oxalme	87 d	Onobrychis	211 a b	Piceafter eo. b c d
oxygarum	ibi.	ocimastrum	221 b c d	Pix ibi. b. 36 a. 39 a. 43 d
oxyporum	ibi.	ocimoides	ibi.	pinus germinatio terna ibi. b
oxyliparon	ibi.	oxyfa	226 c	peuce ibi. c
onos	88 c	oxys	ibi. d	pinus duo genera ibi. d
onifcos	ibi.	ophrys	ibi. d	peda ibi. d
orthagorifcus	89 a	Oxyfchoenos	228 d	pityida ibi. d
Opla	89 d	Opium	234 b	pinæ nuces 36 b
Ouorum natura	91 c	Oenagra	253 a	Pitynon phyfema 38 c
oui Candidum	ibi.	ofyris	261 c	Pixliquida eo. d
ouorum differentia	91 c	opocarpafum	262 d	Picis confectio 39 a b
oua pnieta	ibi. d	oleastellum	277 d 278 a	picis uitia, & experimentu ibi. d
oua chifta	ibi.	olea cilihraca	ibi.	picis genera ibi.
ouum	91 c d	Oenanthe	289 d. 290 a	Pix, & Refina quo differant 39 e
onos	92 b	Omphacium	290 b c	piffæleon eo. d
ollifragus	92 c	omphax	eo. d	pix ficca 40 a
ollifraga	ibi.	oxycratum	298 a	palimpiffa ibi. b
Ophion	93 d	oxyrhodon	eo. b	piffaphaltos 40 d
Oogala	97 c	oxymeli	ibi. c	Panduna 44 b
Oxygala	99 b.	oxalme	eo. d. 299 a	Pfefta ibi.
Oelyptira	99 c	oftracites	317 a	Platanus eo. d
Oelypus, um.	eo. d. 100 a	obryzum	eo. c	platanifitos 45 a
Oes	100 a	omphacomeli	301 b	platanio eo. a
oxyngion	102 c	ochra	318 b. 319 a	platanos ibi.

N^o 45 12